

**UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL HERBA
PATIKAN KEBO (*Euphorbia hirta.*) TERHADAP BEBERAPA BAKTERI
PENYEBAB DIARE DENGAN METODE DIFUSI AGAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ALAUDDIN
M A K A S S A R
EKA AHRIANI

NIM. 70100108021

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 Desember 2012

Penulis,

EKA AHRIANI
NIM. 70100108021



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol herba patikan kebo (*Euphorbia hirta.*) Terhadap beberapa bakteri penyebab diare dengan metode Difusi Agar” yang disusun oleh Eka Ahriani, NIM: 70100108021, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari kamis tanggal 20 Desember 2012 bertepatan dengan tanggal 7 shafar 1434 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi.

Makassar, 20 Desember 2012 M
7 Shafar 1434 H

DEWAN PENGUJI

Ketua penguji : Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH., MH. Kes . (.....)

Sekretaris : Dra. Hj. Faridha yenny nonci, M.si., Apt (.....)

Pembimbing I :Hj. Gemy Nastity Handayani S.Si., M.Si., Apt. (.....)

Pembimbing II : Haeria S.Si., M.Si (.....)

Penguji I :Isriany Ismail S.Si., M.Si., Apt. (.....)

Penguji II : DR. H. Lomba Sultan, M.Ag (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH., MH. Kes
Nip. 19530119 198110 1001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah atas nikmat akal dan pikiran yang diberikan serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini walaupun masih banyak kekurangan.

Shalawat dan salam untuk sang revolusioner Nabi Muhammad saw yang telah mengubah pola pemikiran manusia dari jahiliyyah menuju qur'aniyyah.

Skripsi dengan judul “Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*.) Terhadap beberapa bakteri Penyebab diare dengan metode difusi agar” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari tentang banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini, baik itu yang bersifat teknis maupun non-teknis. Namun berkat do'a, motivasi dan kontribusi dari berbagai pihak, maka kendala-kendala tersebut mampu teratasi dan terkendali dengan baik.

Untuk itu penulis Mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Hamili, dan Ibunda Nanni, serta keluarga yang tak putus-putus memberikan restu dan do'anya, kasih sayang, nasehat dan bantuan moril maupun materi selama menempuh pendidikan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
2. Suami tersayang, Junanda Jamal S.sos yang telah memberikan banyak dukungan, do'a, kasih sayang, nasehat dan bantuan moril maupun materi selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, H.T., M.S. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Dekan dan Para Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Gemy Nastity Handayany, S.Si.,M.Si, Apt. selaku pembimbing pertama serta sebagai Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang penuh kasih sayang, sabar, dan pengertian dalam memberikan bimbingan dan arahan serta berbagai bantuan baik secara fisik maupun moril selama penelitian hingga penyusunan akhir skripsi ini.
6. Ibu Haeria, S.Si., M.Si., Sebagai pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt. selaku Penguji yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan.

8. Bapak DR. H. Lomba Sultan, M.Ag Selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan pengarahannya serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
9. Bapak, Ibu Dosen, serta Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi, melaksanakan pendidikan hingga selesainya skripsi ini.
10. Para Laboran Laboratorium Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah sabar dalam mendukung penelitian ini. Serta teman seperjuangan angkatan 2008 dan rekan mahasiswa Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin pada umumnya yang telah dan akan terus memberikan semangat serta bantuan baik berupa materi maupun dukungan mental selama penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan di Asama NURJANNAH, Ponakan dan sepupu Irmayani S.Pd, Wiwi Pratiwi S.hum, Andi Nur Azakiyah S.kom, Dan Asrawati Yang telah memberikan semangat serta bantuan baik berupa materi maupun dukungan mental selama penyelesaian skripsi ini.

Besar harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Makassar, Desember 2012

Penulis,

Eka Ahriani


NIM : 70100108021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
ABTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Uraian Tentang Tanaman</i>	5
1. Klasifikasi tanaman	5
2. Nama daerah	
3. Morfologi tanaman	6
4. Kandungan kimi	6
5. Penggunaan	6
6. Penyebaran.....	7

B. <i>Uraian Mikroba Uji</i>	7
1. <i>Eschericia Coli</i>	7
2. <i>Vibrio Sp</i>	8
3. <i>Salmonella typhi</i>	9
4. <i>Staphylococcus aureus</i>	10
5. <i>Shigella dysenttri</i>	11
C. <i>Uraian Diare</i>	11
a. <i>Klasifikasi Diare</i>	12
b. <i>Jenis-jenis Penyakit diare</i>	14
c. <i>Patofisiologi</i>	17
D. <i>Ekstraksi</i>	19
E. <i>Mikroorganisme</i>	21
F. <i>Fase pertumbuhan mikroorganisme</i>	22
G. <i>Uraian Umum antimikroba</i>	23
a. <i>Definisi Antimikroba</i>	23
b. <i>Prinsip Kerja Antimikroba</i>	24
c. <i>Pembagian Antimikroba</i>	25
d. <i>Mekanisme kerja Antimikroba</i>	25
e. <i>Pengujian Aktifitas Antimikroba</i>	26
H. <i>Tinjauan Islam Tentang Tanaman Obat</i>	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. <i>Alat dan Bahan</i>	33
B. <i>Prosedur Kerja</i>	33
a. <i>Penyiapan sampel</i>	33
b. <i>Pengolahan sampel</i>	34
c. <i>ekstraksi sampel penelitian</i>	34
d. <i>Pembuatan sampel penelitian</i>	34
e. <i>Sterilisasi alat</i>	35
f. <i>Pembuatan medium</i>	36

g. Penyiapan Bakteri Uji.....	37
h. Pengujian skrining antimikroba	37
i. Pengujian Daya Hambat	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
<i>A. Hasil Penelitian</i>	39
<i>B. Pembahasan</i>	41
BAB V KESIMPULAN	
<i>A. Kesimpulan</i>	45
<i>B. Saran</i>	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN.....	49
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Uji skrining anti mikroba ekstrak etanol herba patikan kebo (<i>Euphorbia hirta</i>)	35
2. Uji Aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol herba patikan kebo (<i>Euphorbia hirta</i> .) terhadap bakteri uji menggunakan metode difusi agar.....	36
3. Rata – rata diameter hambatan ekstrak etanol herba patikan kebo (<i>Euphorbia hirta</i>) terhadap bakteri uji dengan metode rancangan acak kelompok.....	45
4. Analisis Varians beserta F. tabel.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Fase pertumbuhan mikroorganismen.....	23
2. Skema Kerja Skrining Uji Aktivitas Ekstrak etanol herba patikan kebo (<i>Euphorbia hirta</i>).....	44
3. Skema Kerja Ekstraksi herba patikan kebo (<i>Euphorbia hirta</i>) dengan metode Maserasi.....	45
4. Skema Kerja Skrining Uji Aktivitas Ekstrak herba patikan kebo (<i>Euphorbia hirta</i>).....	46
5. . Skema Kerja Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Herba patikan kebo (<i>Euphorbia hirta</i>) terhadap beberapa bakteri penyebab diare.....	47
6. Hasil skrining ekstrak herba patikan kebo (<i>Euphorbia hirta</i>) terhadap bakteri <i>Vibrio sp</i>	50
7. Hasil skrining ekstrak herba patikan kebo (<i>Euphorbia hirta</i>) terhadap bakteri <i>Eschericia coli</i>	50
8. Hasil skrining ekstrak herba patikan kebo (<i>Euphorbia hirta</i>) terhadap bakteri <i>Salmonella typhi</i>	51
9. Hasil skrining ekstrak herba patikan kebo (<i>Euphorbia hirta</i>) terhadap bakteri <i>Shigella dysentri</i>	51
10. Hasil skrining ekstrak herba patikan kebo (<i>Euphorbia hirta</i>) terhadap bakteri <i>Staphylococcus aureus</i>	52

11. Hasil pengamatan uji daya hambat ekstrak etanol herba patikan kebo (<i>Euphorbia hirta</i>) terhadap bakteri <i>Eschericia coli</i>	52
12. Hasil pengamatan uji daya hambat ekstrak etanol herba patikan kebo (<i>Euphorbia hirta</i>) terhadap bakteri <i>Shigella dysentri</i>	53
13. Hasil pengamatan uji daya hambat ekstrak etanol herba patikan kebo (<i>Euphorbia hirta</i>) terhadap bakteri <i>Vibrio sp</i>	53
14. Gambar Herba Patikan kebo (<i>Euphorbia hirta</i>).....	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema kerja.....	37
2. Hasil Skrining Ekstrak etanol herba patikan kebo (<i>Euphorbia hirta</i>) terhadap bakteri penyebab diare.....	41
3. Hasil Uji Daya Hambat Ekstrak etanol herba patikan kebo (<i>Euphorbia hirta</i>) terhadap bakteri uji	42
4. Data statistik uji daya hambat ekstrak etanol herba patikan kebo (<i>Euphorbia hirta</i>).....	44

ABSTRAK

Nama Penulis : Eka Ahriani
NIM : 70100108021
Judul Skripsi : Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) terhadap beberapa bakteri penyebab diare dengan metode difusi agar.

Telah dilakukan penelitian uji aktifitas antibakteri ekstrak etanol herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) terhadap beberapa bakteri penyebab diare dengan metode difusi agar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktifitas antibakteri dari ekstrak etanol herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) terhadap mikroba uji. Mikroba uji yang digunakan yaitu : *Escherichia Coli*, *Staphilococcus aureus*, *Shigella dysentri*, *salmonella typhi*, dan *vibrio.sp.* uji skrining antibakteri ekstrak etanol herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) dapat menghambat bakteri *Escherichia Coli*, *Staphylococcus aureus*, *vibrio sp* dan *Shigella dysentri* pada konsentrasi 0,1%. Ekstak etanol heba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) dapat menghambat menghambat bakteri *Escherichia Coli* dan *Shigella dysentri* pada konsentrasi 0,5% sedangkan pada bakteri *Vibrio Sp* pada konsentrasi 2%

Dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) memiliki aktifitas antibakteri terhadap bakteri *Escherichia Coli*, *Staphylococcus Aureus*, dan *Shigella dysentrie*. Semakin tinggi konsentrasi yang digunakan semakin besar pula hambatan yang dihasilkan. Perbedaan diameter hambatan dapat dipengaruhi oleh jenis bakterinya, karena setiap bakteri memiliki tingkat kepekaan tersendiri.

ABSTRACT

Name : Eka Ahriani

NIM : 70100108021\

Thesis title : Test the antibacterial activity of ethanol extract of herbs patikan Kebo (*Euphorbia hirta*) against some of the bacteria that causes diarrhea by agar diffusion method.

A study testing the antibacterial activity of the ethanol extract of herbs patikan Kebo (*Euphorbia hirta*) against some of the bacteria that causes diarrhea by agar diffusion method. This study aims to determine the antibacterial activity of the ethanol extract of herbs patikan Kebo (*Euphorbia hirta*) on microbial testing. Microbial tests used were: *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Shigella dysentri*, *salmonella typhi*, and *vibrio.sp.* screening test antibacterial herb extract ethanol patikan kebo (*Euphorbia hirta*) can inhibit the bacteria *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Vibrio Sp* and *Shigella dysentri* at a concentration of 0.1%. Ekstak ethanol heba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) can inhibit inhibit bacteria *Escherichia coli* and *Shigella dysentri* at a concentration of 0.5%, while the bacteria *Vibrio sp* at a concentration of 2%

t can be concluded that the ethanol extract of herbs patikan Kebo (*Euphorbia hirta*) has antibacterial activity against *Escherichia coli* bacteria, *Staphylococcus Aureus* and *Shigella dysentrie*. The higher the concentration used, the greater the resistance generated. The difference in the diameter of the barriers can be influenced by the type of bacteria, because each bacterium has its own level of sensitivity.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diare sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan yang sangat umum terjadi, tidak saja di negara berkembang tetapi juga di negara maju. Penyakit diare masih sering menimbulkan kejadian luar biasa dengan penderita yang banyak dalam waktu yang singkat. Diare adalah buang air besar (defekasi) lebih dari tiga kali sehari dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair dimana kandungan air pada tinja lebih banyak dari biasanya. Hal ini diakibatkan karena gangguan saluran pencernaan, salah satu faktor penyebabnya karena infeksi oleh bakteri. Bakteri adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat diamati menggunakan mikroskop. Bakteri dapat memasuki saluran pencernaan melalui makanan, minuman dan melalui jari tangan yang terkontaminasi. (Umar, 2004: 1 dan Pratiwi, 2008: 9)

Obat tradisional adalah bahan dari tumbuhan, hewan, mineral atau campuran dari bahan tersebut yang diolah secara tradisional dan digunakan sebagai obat. Obat tradisional umumnya lebih mudah pembuatannya dan dapat dibuat atau ditanam sendiri, selain itu dengan menggunakan tanaman obat sebagai alternatif pengobatan, merupakan usaha untuk memanfaatkan sumber daya alam, sekaligus melestarikan lingkungan hidup disekitar kita. Pemanfaatan sumber alam

di sekitar kita sangat perlu dikembangkan, terlebih pemanfaatannya dalam bidang kesehatan.

Masyarakat sampai sekarang lebih mengandalkan pengobatan dari bahan alam dengan cara tradisional. karena selain relatif lebih aman juga lebih terjangkau, resikonya sangat kecil jika dibandingkan dengan obat dari bahan kimia. akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa bahan-bahan alam tidak menimbulkan satu efek yang merugikan apabila penggunaannya kurang tepat, namun apabila penggunaannya tepat baik takaran, waktu, cara penggunaan, pemilihan bahan, serta penyesuaian dengan indikasi tertentu akan bermanfaat dan aman jika digunakan (Katno, 2002: 2).

Pada umumnya sebagian orang menganggap bahwa diare merupakan penyakit yang tidak berbahaya karena diare merupakan penyakit yang umum terjadi, namun perlu kita ketahui bahwa diare yang berlangsung dalam beberapa waktu tanpa penanggulangan medis yang kuat dapat menyebabkan kematian karena kekurangan cairan di dalam tubuh yang mengakibatkan gangguan irama jantung, rasa haus, berat badan berkurang, mata menjadi cekung, lidah kering, tulang pipi menonjol, turgor kulit menurun serta suara menjadi serak. (Umar, 2004:1)

Adapun beberapa Bakteri penyebab diare ialah *Escherichia coli*, *Sallmonella thypi*, *Vibrio sp*, *Shigella dysentrie*, dan *Staphylococcus aureus*, perlu adanya alternative obat lain, seperti tanaman berkhasiat obat Patikan kebo (*Euphorbia hirta*) dapat digunakan untuk membantu mengatasi penyakit diare dan disentri,

Adapun senyawa antibakteri yang terkandung dalam tumbuhan patikan kebo (*Euphorbia hirta*) ini adalah *flavonoid* dan *tannin* (Hariana, 2006 : 57)

Yanti Hamdiyanti, telah melakukan pengujian aktivitas antibakteri daun patikan kebo (*Euphorbia hirta*) terhadap pertumbuhan bakteri *Staphylococcus epidermidis*. Berdasarkan hasil analisisnya diketahui bahwa nilai KHM ekstrak daun patikan kebo berada pada konsentrasi 20 mg/ml dengan rata-rata diameter daya hambat sebesar 7,67 mm yang berbeda secara signifikan dengan kontrol negative yaitu 6,90 mm. Penghambatan yang terjadi pada bakteri *Staphylococcus epidermidis* tersebut membuktikan bahwa daun patikan kebo mengandung senyawa aktif yang bersifat antibakteri, seperti *flavonoid*, *tanin*, *alkaloid*, dan *terpenoid*.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah ekstrak etanol herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) mempunyai aktivitas terhadap beberapa bakteri penyebab diare.

B. Rumusan masalah

1. Apakah ekstrak etanol herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) memiliki aktivitas antibakteri terhadap beberapa bakteri penyebab diare (*Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Vibrio sp*, *Salmonella typhi* dan *Syella dysentri*?)
2. Pada konsentrasi berapa ekstrak etanol herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) dapat memberikan aktivitas antibakteri terhadap beberapa bakteri penyebab diare (*Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Virio Sp*, *Salmonella typhi* dan *Syella dusentri*?)

3. Bagaimana pandangan Islam mengenai herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) sebagai pengobatan alami?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui aktivitas ekstrak etanol herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) terhadap beberapa bakteri penyebab diare (*Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Vibrio sp*, *Salmonella typhi* dan *Sygella dysentri*).
2. Untuk menentukan konsentrasi yang dapat memberikan aktivitas antibakteri pada ekstrak etanol herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) terhadap beberapa bakteri penyebab diare (*Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Vibrio Sp*, *Salmonella typhi* dan *Sygella dusentri*).
3. Untuk menegetahui perspektif Islam yang digunakan sebagai pengobatan secara alami pada herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari latar belakang tentang penggunaan herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*), maka manfaat penelitian yang akan diperoleh :

1. Mengetahui pemanfaatan herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) sebagai alternatif pengobatan dari bahan alam.
2. Menjadi dasar untuk memperkuat data ilmiah tentang aktivitas antibakteri dari herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tanaman

1. Klasifikasi (Lukman 2008:4)

Regnum : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Sub divisi : Angiospermae
Kelas : Dicotyledonae
Ordo : Euphorbiales
Famili : Euphorbiaceae
Genus : Euphorbia
Spesies : *Euphorbia hirta*

2. Nama Daerah

Sulawesi: Daun lita-lita (Palopo), Pakkacoma (Bugis), Bera-berasa (Makassar), Jawa: Gelang susu, nanakaan, kukon-kukon, patikan jawa, patikan kebo, nangkaan, Sumatera: (Daun bii kacang), Maluku (sosononga), Isu ma ibi (Ternate), Madura (kak-sekakan) (Wijayakusuma, 2002: 57).

3. *Morfologi tanaman*

Herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) merupakan herba semusim, terna, kecil, batang tegak atau naik sedikit demi sedikit, tinggi 0,1-0,6 m. Batang dan daun berambut agak kemerahan. Apabila batang dipatahkan

akan mengeluarkan getah putih. Daun bersirip genap, berhadapan, kecil, bulat telur, memanjang dengan pangkal miring, setidaknya pada ujungnya bergerigi-gerigi, berbau wangi. Sisi bawah berambut jarang 0,5-5 cm. Panjangnya (setengah) bola, yang sendiri-sendiri atau dua-dua terkumpul menjadi karangan bunga yang bertangkai pendek, duduk diketiak daun, piala panjang 1 mm, berambut menempel. Bunga dan buah berwarna merah muda. Tumbuhan ini berkembang biak dengan biji. Umumnya tumbuh pada daerah yang berumput, halaman, tepi jalan, tanggul, tegalan dan krbun (Hernani 2004 : 57).

4. Kandungan kimia

Kandungan kimia dari herba patikan kebo (*Euphorbia Hirta*) adalah *mirisil alkohol, terakserol, triedlin, beta amirin, beta sitosterol, beta eufol, eufobrol, triterpenoid, tirrikalol, eufosterol, hentriacontane dan ellagic acid* (bunga). Selain itu mengandung *flavonoid* dan *tannin* (wijayakusuma, 1992 : 74).

5. Penggunaan Tanaman

Bagian yang digunakan pada Patikan kebo (*Euphorbia hirta*) adalah seluruh bagian tanaman, berguna untuk mengobati disentri, panas, diare, wasir berdarah, eksem, herpes, alergi, gatal-gatal, abses payudara dan bintik pada kornea mata (Djauhariya dan Permadi, 2004 : 57).

6. Penyebaran Tanaman

Tumbuhan liar ini asli dari india dan Australia dan sekarang tersebar didaerah tropis. Patikan kebo (*Euphorbia hirta*) merupakan gulma dan

terdapat di tempat terbuka di sekitar pantai, padang rumput, pinggir jalan, atau kebun. Patikan kebo (*Euphorbia hirta*) di temukan sampai ketinggian 1.400 m .

B. Uraian Mikroba Uji

1. *Escherichia coli* (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn 2004: 24-141)

a. Klasifikasi

Domain : Bacteria
 Phylum : Proteobacteria
 Class : Gammaproteobacteria
 Ordo : Enterobacteriales
 Familia : Enterobacteriaceae
 Genus : *Escherichia*
 Spesies : *Escherichia coli*

b. Sifat dan morfologi.

Escherichia coli merupakan bakteri Gram negatif berbentuk batang lurus, 1,1 – 1,5 µm x 2,0 – 6,0 µm, motil dengan flagellum peritrikum atau non motil. Tumbuh dengan mudah pada medium nutrien sederhana. Laktosa difermentasi oleh sebagian besar galur dengan produksi asam dan gas (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S 2008 : 949).

2. *Vibrio Sp* (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn 2004: 24 - 109)

a. Klasifikasi

Domain : Bacteria
Phylum : Proteobacteria
Class : Gammaproteobacteria
Ordo : Vibrionales
Familia : Vibrionaceae
Genus : *Vibrio*
Spesies : *Vibrio sp*

b. Sifat dan morfologi.

Vibrio Sp adalah bakteri Gram negatif. Batang pendek, tidak membentuk spora, sumbuhnya melengkung atau lurus, $0,5 \mu\text{m} \times 1,5-3,0 \mu\text{m}$, terdapat tunggal atau kadang-kadang bersatu dalam bentuk S atau spiral. Motil dengan satu flagelum polar, atau pada beberapa spesies dengan dua atau lebih flagelum dalam satu berkas polar; hanya sesekali non motil. Seringkali mempunyai sferoplas, biasanya dibentuk dalam keadaan lingkungan yang kurang menguntungkan. Tidak tahan asam. Tidak membentuk kapsul. Tumbuh baik dan cepat pada medium nutrisi baku Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi (menggunakan oksigen) dan fermentatif. Anaerobik fakultatif Suhu

optimum berkisar dari 18-37 °C (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S 2008 : 956).

3. *Salmonella typhi* (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn 2004 : 24 - 122).

a. Klasifikasi

Domain : Bacteria

Class : Gammaproteobacteria

Ordo : Enterobacteriales

Familia : Enterobacteriaceae

Genus : *Salmonella*

Spesies : *Salmonella typhi*

b. Sifat dan morfologi.

Salmonella typhi adalah bakteri Gram negatif bebrbentuk batang lurus dengan ukuran 0,7-1,5 µm, biasanya tunggal dan kadang-kadang membentuk rantai pendek, jenis yang bergerak berflagel peritrik, hidup secara aerobik atau anaerobik fakultatif, meragikan glukosa dengan menghasilkan asam kadang-kadang gas. Tumbuh optimal pada suhu 37 °C dan berkembang baik pada suhu kamar, bakteri ini dapat ditemukan di saluran pencernaan manusia dan hewan. Bakteri ini merupakan penyebab demam tifoid karena adanya infeksi akut pada usus halus manusia dan hewan (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S 2008 : 953).

4. *Staphylococcus aureus* (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn 2004 : 24 – 187)

a. Klasifikasi

Dunia : Bacteria

Filum : Firmicutes

Kelas : Bacilli

Bangsa : Bacillales

Suku : Staphylococcaceae

Marga : *Staphylococcus*

Jenis : *Staphylococcus aureus*

b Sifat dan morfologi

Staphylococcus aureus adalah bakteri Gram positif. Sel-sel berbentuk bola, berdiameter 0,5 – 1,5 μm , terdapat dalam tunggal dan berpasangan dan secara khas membelah diri pada lebih dari satu bidang sehingga membentuk gerombolan yang tak teratur. Non motil. Tidak diketahui adanya stadium istirahat. Dinding sel mengandung dua komponen utama yaitu peptidoglikan dan asam teikoat. Berasosiasi dengan kulit, dan selaput lendir hewan berdarah panas. Kisaran inangnya luas, dan banyak galur merupakan patogen potensial (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S 2008 : 954).

5. *Shigella dysenteriae*

a. Klasifikasi (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn 2004 : 24-123)

Dunia : Bacteria
Filum : Proteobacteria
Kelas : Gammaproteobacteria
Bangsa : Enterobacteriales
Suku : Enterobacteriaceae
Marga : *Shigella*
Jenis : *Shigella dysenteriae*

b. Sifat dan Morfologi

Batang non motil. Gram negative, tidak berkapsul, tumbuh baik pada medium nutrient dan tidak memerlukan faktor tumbuh khusus, tidak dapat menggunakan sitrat atau malonat sebagai sumber karbon satu-satunya. Pertumbuhan dihambat oleh KCN. Tidak menghasilkan H₂S, glukosa dan karbohidrat lain difermentasi dengan produksi asam, tetapi tanpa gas (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S 2008 : 954-955).

C. Uraian Diare

Diare atau sering kita sebut dengan mencret dapat didefinisikan sebagai buang air besar dengan feses yang berbentuk cair atau setengah cair (setengah padat) dengan frekuensi buang air besar encer lebih dari 3 kali dalam 24 jam. Diare dapat digolongkan menjadi 2 yaitu diare akut dan diare kronik, diare yang terjadi selama kurang dari 2 minggu disebut diare akut sedangkan apabila diare berlangsung 2 minggu atau lebih digolongkan sebagai diare

kronik. Diare dapat disebabkan karena infeksi maupun non infeksi. (Zein Umar, dkk 2004 : 25)

a. *Klasifikasi Diare*

Banyak macam klasifikasi dari diare, diantaranya Mellinkoff yang membaginya menurut gangguan faal dan Moses yang membaginya menurut etiologinya. Berdasarkan gangguan faal (Hadi 2002: 96) yaitu:

1. Dorongan di dalam usus normal yang terlalu cepat, yang dapat di sebabkan oleh rangsangan saraf yang abnormal yang biasanya terdapat *psychogenic diarrhea* atau keracunan *mecholyl* dan pengaruh zat kimia terhadap motilities yang abnormal misalnya pada *sindroma karsinoid*, penyakit *Addisons*, dan *Thirotoksikosis*. Selain itu, bisa juga di sebabkan oleh iritasi pada intestine misalnya pada pemakaian *oleum ricini*, *koletis ulserativa*, *parikolil abses*, *amebiasis*, *uremik colitis*, dan lain-lain serta biasa oleh hilangnya simpanan di kolon misalnya pada dekstruksi *sphincterani*, *ileostomi*, dan lain-lain.
2. Gangguan pencernaan makanan yang dapat di sebabkan oleh hilangnya fungsi breservior dari lambung misalnya pada postagastrektomis yang menimbulkan sindroma dumping, penyakit pankreas, *infusiensi* sepanjang *intestine*, serta kemungkinan adanya sekresi abnormal dari HCL misalnya pada sindroa *Zollinger Ellison*.
3. Absorpsi abnormal pada pencernaan makanan, misalnya pada penyakit hati, penyakit pada intestine, dan obstruksi mesentrik (pada karsinomatosis atau pada TBC).

Sedangkan klasifikasi diare berdasarkan etiologinya atau penyebabnya (Hadi 2002 : 98)

1. Infeksi, misalnya pada infeksi oleh parasit (*amebiasis, balantidialis, helmintiasis*), infeksi oleh bakterial (*Basiler disentri, para cholera Eltor, salmonellois, tuberculosis enterokolitis, enteropatogenik escheria coli, staphylococcus enterokolitis*), dan infeksi oleh enteroviral (*Virus gastroenteritis*).
2. Keracunan makanan, misalnya karena toksin bakteri (*botulisme, enteroksin staphylococcus*) atau karena toksin yang dikeluarkan dengan antibiotika dan makanan itu sendiri.
3. Obat-obatan, misalnya post antibiotik diare yang dapat terjadi pada penderita yang dirawat di rumah sakit dan mendapat terapi dengan antibiotika yang lama sehingga bakteri sudah resisten terhadap antibiotika. Diare dapat timbul secara sekunder karena dosis berlebihan dari *quinidin, cholchicin, digitalis, reserpin*, aksatif, dan obat-obatan lain lagi.
4. Diare yang etiologinya penyebabnya tidak pasti, misalnya *brans enterocolitis*.
5. Keadaan lain yang berhubungan dengan diare kronis : pada sindroma *Zollinger Ellison, karsinoma dari pancreas dengan steatorrhea, pankreatitis kronis dengan steatorrhea, intestinal amyloidosis*, diabetes mellitus dengan *neuropati dan steatorrhea, fistula gastroduodenal, gastroileostomi (iatrogenic)*, reseksi Gster dengan atau tanpa *vagotomi, enteritis*

regionalis, tebercolosis enteritis, ileokolitis, colitis ulselative, diverkulitis dari kolon, pellagra, penyakit Addison"s, *hiperthyroidi, alkoholisme, uremi*, dan lain-lain

b. *Jenis-jenis penyakit diare*

1. Diare sekretorik

Ada dua kemungkinan timbulnya diare sekretorik, yaitu diare sekretorik pasif dan diare sekretorik aktif. Diare sekretorik pasif disebabkan oleh tekanan hidrostatik dalam jaringan, hal ini terjadi pada ekspansi air dari jaringan kelumen usus. Hal ini terjadi pada peninggian tekanan vena mesenterial, obstruksi sistem limfatik, intestinal iskemik, pada proses peradangan (Gastroenterologi Hepatologi, 2005 :23).

Etiologi diare sekretorik :

a. Infeksi

- a) Toksikogenik. *Vibrio cholerae, eltor, Escherichia pathogen, shigella dysenterie, staphylococcus aureus, clostridium perfringens, pseudomonas aeruginosa.*
- b) Invasif ke mukosa *Shigellosis, Salmonellosis, Escherichia coli, entamoeba hystolytica.*

b. Neoplasma

- a) Adenoma vilosa.
- b) Ganglioneuroma.
- c) Karsinoma meduler tiroid.
- d) Gastrinoma (*sindrom Zollinger Ellison*)
- e) Kolera pankreatik (*syndrome diare, air, hipokalemia, hipokloremia*)
- f) *Sindrom karsinoid.*

Di pandang dari sudut kelainan usus, diare yang disebabkan oleh bakteri di bagi 2 golongan yaitu:

1. Non-invasif (yang tidak merusak mukosa), Invasif (yang merusak mukosa)

Bakteri non-invasif menyebabkan diare karna toksin yang disekresi oleh bakteri tersebut, yang juga di sebut diare toksigenik. Sebagai prototip diare toksogenik adalah pada cholera (Eltor). *Vibrio cholera* (Eltor) memproduksi enterotoksin berupa suatu protein dengan berat molekul 84.000 gr.mol. protein tersebut mempunyai bagian (gugus) yang aktif yang dapat menempel pada epitel usus 15-30 menit sesudah di produksi oleh *vibrio*. Atas pengaruh nikotinamide adenine di nukleotida pada dinding sel usus, terbentuklah adedonin monofosfat siklik (AMF siklik) yang makin lama makin banyak yang akibatnya terjadilah sekresi aktif anion klorida yang diikuti oleh air, ion bikarbonat dan kation natrium dan kalium (Gastroeterologo Hepatologi, 2005 : 23).

2. Diare akibat gangguan (hambatan) terhadap absorpsi elektrolit.

Diare jenis ini terdapat pada penyakit seliak (gluten enteropathy) dan pada *sprue tropic*. Kedua jenis ini menimbulkan diare karna ada kerusakan vili pada mukosa usus secara difus dan menyeluruh hingga merusak semua mekanisme absorpsi elektrolit dan air sehingga timbul diare yang terus menerus.

3. Diare akibat peninggian motilitas (peristaltis)

Diare jenis ini yang sering terjadi pada sindrom kolon iritabel (iritatif) yang asalnya psikogen dan juga pada *hiperyroid*. *Sindrom karsinoid* sebagian juga di sebabkan oleh peninggian peristaltis akibat pengaruh serotonin.

4. Diare akibat eksudasi cairan, elektrolit dan mucus

Diare ini terjadi pada *colitis ulserosa* dan pada penyakit *Crohn*. Selain itu diare pada *Amebiasis*, *shigelosis* *Kampilobakter*, *yersinia* dan infeksi yang mengenai mukosa menimbulkan peradangan dan eksudasi cairan serta mucus.

5. Diare kronik

Diare kronik berarti diare yang melebihi jangka 15 hari sejak awal diare (ini berlaku pada bayi dan anak) atau yang berlangsung lebih dari 3 minggu sejak awal diare (ini berlaku pada orang dewasa). Batasan waktu tersebut semata-mata suatu kesepakatan, karena banyaknya usulan untuk menentukan batas waktu diare.

Diare kronik memiliki penyebab dan bervariasi dan tidak seluruhnya diketahui. Untuk menentukan penyebabnya, banyak sarjana yang mengemukakan pendapatnya diantaranya ada yang membagi diare kronik berdasarkan atas etiologi, patologi atau berdasarkan atas lokasi anatomi. Kesulitan lainnya adalah banyak macam bentuk diare yang penyebabnya dapat menimbulkan tidak hanya disatu tempat saluran cerna saja. Sebagai contoh adalah diare yang disebabkan oleh infeksi, dapat menyebabkan kelainan disebagian besar dari saluran cerna yaitu menyebabkan kelainan di

usus halus dan usus besar. Kemungkinan lainnya yaitu timbulnya faktor yang dapat menyertai dan mempengaruhi, misalnya :

1. kelainan endokrin

Gangguan kelenjar endokrin bisa menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari malnutrisi, gondok, diabetes, gangguan jantung, hipertensi, hingga tumor ganas pada sistem pencernaan. Gangguan kelenjar endokrin umumnya disebabkan perubahan gaya hidup yang cenderung meninggalkan pola sehat..

2. faktor defisiensi

pembekuan yang didapat biasanya akibat sesuatu penyakit lain dan umumnya dua atau lebih faktor pembekuan terserang. Faktor-faktor yang biasanya terlibat umumnya faktor yang dihasilkan di hati atau yang pembentukannya dipengaruhi oleh vitamin.

3. faktor onstitusi

Faktor konstitusi yaitu kondisi saluran cerna yang dijumpai pada keadaan intoleransi laktosa, malabsorpsi lemak dan intoleransi protein.

4. faktor nerologis, yang dapat mempengaruhi kondisi penderita.

Diare kronik pada umumnya masih belum jelas penyebab utamanya, Diare kronik bukan suatu kesatuan penyakit, melainkan suatu sindrom yang penyebab dan patogenesisnya multikompleks. Kemungkinan penyebab diare kronik sangat beragam, dan tidak selalu disebabkan kelainan usus. Diberbagai negara maju Diare kronik dapat terjadi pada

kelainan endokrin, kelainan pankreas, kelainan hati, infeksi, dan sebagainya (dewa nyoman wibawa, 2007 : 123).

c. Patofisiologi

Diare akut mengakibatkan terjadinya:

1. Kehilangan air dan elektrolit serta gangguan asam yang menyebabkan dehidrasi, asidosis metabolic dan hipokalemia.
2. Gangguan sirkulasi darah dapat berupa renjatan hipovolemik atau prerenjatan sebagai akibat diare dengan atau tanpa disertai dengan muntah, perfusi jaringan berkurang sehingga hipoksia dan asidosismetabolik bertambah berat, peredaran otak dapat terjadi, kesadaran menurun (soporokomatososa) dan bila tak cepat diobati,
3. Gangguan gizi yang terjadi akibat keluaarnya cairan berlebihan karena diare dan muntah, kadang-kadang orang tuanya menghentikan pemberian makanan per-os karna takut bertambahnya diare dan muntah pada anak atau bila makanan tetap diberikan dalam bentuk diencarkan. Hipoglikemia akan lebih sering terjadi pada anak yang sebelumnya telah menderita malnutrisi atau bayi dengan gagal bertambah berat badan. Sebagai akibat hipoglikemia dapat terjadi edema otak yang dapat mengakibatkan kejang (Suharyono,2008: 72).

D. Ekstraksi

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia yang diekstrak mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan

senyawa yang tidak dapat larut seperti serat, karbohidrat, protein dan lain-lain. (Ditjen POM, 1986 : 21).

Adapun metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut, terdiri :

1. Cara dingin

a. Maserasi

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang diluar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan diluar sel dengan larutan di dalam sel (Djoko Hargono, dkk. 1986 : 25).

b. Perkolasi

Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Kekuatan yang berperan pada perkolasi antara lain: gaya berat, kekentalan, daya larut, tegangan permukaan, difusi, osmosa, adesi, daya kapiler dan daya geseran atau friksi.

2. Cara panas

a. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur pada titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga proses ekstraksi sempurna.

b. Soxhletasi

Soxhletasi adalah ekstraksi yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik.

c. Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur kamar, secara umum dilakukan pada temperatur 40-50⁰C.

d. Infus

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur 96-98 ⁰C selama waktu 15-20 menit dipanaskan air, dapat berupa bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih (Djoko Hargono dkk.1986 : 30).

E. Mikroorganism

Mikroorganism atau mikroba adalah organism hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya dapat diamati menggunakan mikroskop. Organism yang termasuk kedalam golongan mikroorganism adalah bakteri, archaea,

fungi (kapang dan khamir), protozoa, algae, dan virus. Mikroorganisme terdapat dimana-mana, dan sangat sering diaplikasikan dengan penyakit-penyakit infeksi. Dalam hal ini salah satu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri adalah diare (Pratiwi, 2008 : 97).

Substansi yang umum diperlukan oleh bakteri adalah :

1. Air

Bakteri umumnya memerlukan air dalam jumlah tinggi karena air merupakan pengantar semua bahan gizi yang diperlukan sel, dan untuk membuang zat-zat yang tidak diperlukan diluar sel.

2. Garam-garam organik

Untuk mempertahankan keadaan koloidal dan tekanan osmotik di dalam sel, dan untuk memelihara keseimbangan asam basa.

3. Mineral

Diperlukan sejumlah mineral untuk pertumbuhannya, seperti belerang (sulfur), fosfat, magnesium, Fe, kalium, dan Ca


4. Sumber nitrogen

Kebutuhan nitrogen untuk bakteri. Beberapa tipe bakteri menggunakan senyawa nitrogen anorganik dan yang lain membutuhkan nitrogen organik.

5. CO₂

Diperlukan dalam proses sintesa dengan timbulnya asimilasi CO₂ di dalam sel.X

E. Fase pertumbuhan mikroorganismen



Gambar 1. fase pertumbuhan mikroorganismen

Ada empat macam fase pertumbuhan mikroorganismen yaitu fase lag, fase log (fase eksponensial), fase stasioner, dan fase kematian.

1. Fase lag merupakan fase adaptasi, yaitu fase penyesuaian mikroorganismen pada suatu lingkungan baru. Ciri fase lag adalah tidak adanya peningkatan jumlah sel, yang ada hanyalah peningkatan ukuran sel.
2. Fase log merupakan fase dimana mikroorganismen tumbuh dan membelah pada kecepatan maksimum. Hal yang dapat menghambat laju pertumbuhan adalah bila satu atau lebih nutrisi dalam kultur habis, sehingga hasil metabolisme yang bersifat racun akan tertimbun dan menghambat pertumbuhan.

3. Fase stasioner merupakan fase dimana pertumbuhan mikroorganisme berhenti dan terjadi keseimbangan antara jumlah sel yang membelah dengan jumlah sel yang mati.
4. Fase kematian dimana jumlah sel yang mati meningkat. Faktor penyebabnya adalah ketidak tersediaan nutrisi dan akumulasi produk buangan yang toksik (Pratiwi, 2008: 102).

G. Uraian Umum Antimikroba

a. Definisi Antimikroba

Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obatan yang digunakan untuk membunuh infeksi mikroba pada manusia termasuk diantaranya antibiotik, antiseptik, desinfektan, dan preservative (Pratiwi, 2008:101).

Antimikroba (AM) adalah obat pembasmi mikroba, khususnya mikroba yang bersifat merugikan manusia (mikroba patogen). Berdasarkan sifat toksisitas selektif, ada antimikroba yang bersifat menghambat pertumbuhan mikroba yang dikenal sebagai aktifitas bakteristatik, dan ada yang bersifat membunuh mikroba dikenal sebagai aktivitas bakterisid. Kadar minimal yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan mikroba atau membunuhnya, masing-masing dikenal sebagai kadar minimal (KHM) dan kadar bunuh minimal (KBM). Metoda ini mengukur MIC (*minimum inhibitory concentration* atau kadar hambat minimum, KHM) dan MBC (*minimum bactericidal concentration* atau kadar bunuh minimum, KBM). Caranya dengan membuat pengenceran antimikroba pada medium cair yang ditambahkan dengan mikroba uji. Larutan uji antibiotik pada kadar terkecil

yang terlihat jernih tanpa adanya pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang ditetapkan sebagai KHM selanjutnya dikultur ulang pada media cair tanpa penambahan mikroba uji ataupun antibiotik, dan diinkubasi selama 18-24 jam. Media cair yang tetap terlihat jernih setelah diinkubasi ditetapkan sebagai KBM (Djide, 2008: 63).

Obat-obat yang digunakan untuk membasmi mikroorganisme yang menyebabkan infeksi pada manusia, hewan ataupun tumbuhan harus bersifat toksisitas selektif artinya obat atau zat tersebut harus bersifat toksik terhadap mikroorganisme penyebab penyakit tetapi relative tidak toksik terhadap jasad inang atau hospes (dwyana, 2006:105).

b. Prinsip kerja Antimikroba

Suatu antimikroba memperlihatkan toksisitas yang selektif, dimana obatnya lebih toksis terhadap mikroorganisme dibandingkan pada sel hospes. ini terjadi karena pengaruh obat yang selektif terhadap mikroorganisme atau karena obat pada reaksi biokimia penting dalam sel parasit lebih unggul dari pada biokimia penting dalam sel parasit lebih unggul daripada pengaruhnya terhadap sel hospes. Disamping itu juga struktur sel mikroorganisme berbeda dengan struktur sel manusia (hospes inang) (Djide M.Natsir 2008: 27).

c. Pembagian Antimikroba

Antimikroba berdasarkan spektrum atau kisaran kerja antimikroba dapat dibedakan menjadi :

1. Spektrum sempit, yaitu antimikroba yang hanya mampu menghambat satu golongan bakteri saja, contohnya hanya mampu membunuh atau menghambat bakteri dari gram negatif saja atau gram positif saja.
2. Spektrum luas, yaitu antimikroba yang dapat menghambat atau membunuh bakteri baik gram negatif maupun gram positif (Pratiwi 2008 : 123).

d. Mekanisme kerja Antimikroba

1. Penginaktifan enzim tertentu

Penginaktifan enzim tertentu adalah mekanisme umum dari senyawa antiseptika dan desinfektansia, seperti turunan aldehida, amida, karbanilida, etilen-oksida, halogen, senyawa-senyawa merkuri dan senyawa ammonium kuarternar.

2. Denaturasi protein

Turunan alkohol, halogen, dan halogenator, senyawa merkuri, peroksida, turunan fenol dan senyawa ammonium kuarternar bekerja sebagai antiseptika dan desinfektansia dengan cara denaturasi dan konjugasi protein sel bakteri.

3. Mengubah permeabilitas membran sitoplasma bakteri.

Cara ini adalah model kerja dari turunan amin dan guanidin, turunan fenol dan senyawa-senyawa tersebut dapat menyebabkan bocornya konstituen sel yang esensial, sehingga bakteri mengalami kematian.

4. Interkalasi ke dalam DNA

Beberapa zat warna seperti turunan trifenilmetan dan turunan akridin, bekerja sebagai antibakteri dengan mengikat secara kuat asam nukleat, menghambat sintesa DNA dan menyebabkan perubahan kerangka mutasi pada sintesis protein.

5. Pembentukan khelat

Beberapa turunan fenol, seperti *heksokloroform* dan *oksikuinolin* dapat membentuk khelat dengan ion Fe dan Cu, kemudian bentuk khelat tersebut masuk ke dalam sel bakteri. Kadar yang tinggi dari ion-ion logam di dalam sel menyebabkan gangguan fungsi enzim-enzim, sehingga mikroorganismenya mengalami kematian (Djide, 2008: 63).

e. Pengujian Aktifitas Antimikroba (Djide, 2005 :25)

Dikenal beberapa cara pemeriksaan dan pengujian secara mikrobiologi terhadap kemampuan antimikroba dari bahan-bahan kemoterapeutika seperti antibiotik. Walaupun pada umumnya pengujian dilakukan terhadap kebanyakan antibiotik, namun ada juga bahan-bahan lain yang diduga mempunyai daya hambat mikroba. Secara umum dilakukan dengan cara:

1. Metode Difusi (Penyerapan)

Pada metode ini kemampuan antimikroba ditentukan berdasarkan hambatan yang terjadi. Beberapa modifikasi metode ini adalah :

a. Cara Difusi dengan Lempeng Silinder

Cara ini berdasarkan difusi antibiotik dari silinder yang dipasang tegak lurus pada lapisan agar padat dalam cawan petri atau lempeng, sehingga mikroba yang ditambahkan dihambat pertumbuhannya pada daerah berupa lingkaran atau zona sekeliling silinder yang berisi antibiotik.

b. Cara difusi dengan kertas saring atau Kirby-Bauer

Cara ini menggunakan kertas saring dengan bentuk dan ukuran tertentu, biasanya berbentuk bulat dengan diameter 0,7-1,0 cm, yang akan dicelup pada larutan sampel dan larutan pendamping. Kertas saring tersebut di keringkan dan diletakkan diatas media agar yang telah ditanam mikroba uji. Setelah diinkubasi akan terlihat daerah hambatan yang terbentuk.

2. Metode Dilusi

Pada metode ini yang biasa disebutkan dengan turbidimetri atau tabung, menggunakan pengenceran secara seri dari antimikroba dalam media broth dengan konsentrasi yang berbeda-beda, kemudian ditanami dengan mikroba uji pada konsentrasi tertentu.

3. Metode Tabung (Turbidimetri)

Pada metode ini media yang digunakan adalah media cair yang diinokulasikan dengan mikroorganisme uji yang sensitif dalam tabung reaksi steril. Selanjutnya dipipet senyawa antimikroba yang diuji dan kemudian diinkubasikan. Pertumbuhan mikroorganisme ditandai dengan

terjadinya kekeruhan dalam tabung sesuai dengan tingkat pengenceran dari senyawa yang diuji dan antimikroba baku.

Prinsip pengujian potensi antimikroba dengan metode ini adalah membandingkan derajat hambatan pertumbuhan mikroorganisme uji oleh dosis antimikroba yang diuji terhadap hambatan yang sama oleh dosis antimikroba baku pembanding dalam media cair.

Dalam metode ini, koefisien difusi antimikroba tidak lagi berperan dalam hambatan pertumbuhan mikroorganisme uji yang digunakan. yang mempengaruhi keberhasilan uji potensi dengan metode ini adalah lama waktu inkubasi dan keseragaman suhu selama waktu inkubasi (Djide, 2005 : 28).

H. Tinjauan Islam Tentang Tumbuhan Obat

Keanekaragaman tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan pengobatan, segala sesuatu yang diciptakan Allah swt memiliki fungsi sehingga di hamparkan di bumi. Salah satu fungsinya adalah bahan pengobatan. Hanya saja untuk mengetahui fungsi dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut.

Diriwayatkan oleh *Abi Hurairah r.a* bahwa Rasulullah bersabda :

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا

خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Allah swt memerintahkan untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi yang baik, dan tidak berefek negatif bagi kehidupan manusia. Dalam pemanfaatannya manusia jangan sampai mengikuti langkah syaitan yang sering memutar balik pemanfaatan apa yang diciptakan oleh Allah swt.

Kebutuhan akan obat-obatan di era modern seperti sekarang ini sangat besar seiring dengan munculnya berbagai macam penyakit dikalangan masyarakat (*Ali Al-Ju'aisin* 2001, 59).

Diriwayatkan pula oleh Muslim dari *Jabir r.a* bahwa Rasulullah bersabda :

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى.
(رواه مسلم)

Artinya :

Setiap penyakit ada obatnya. Dan jika suatu obat mengenai tepat pada penyakitnya, ia akan sembuh dengan izin Allah Ta'ala. (HR. Muslim).

Jadi setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah SWT ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah SWT yang menyembuhkan, akan tetapi Allah SWT menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhannya.

Kita sadari bahwa Allah telah menciptakan berbagai macam makhluk termasuk tumbuhan yang ada disekeliling kita. Tumbuhan merupakan salah satu ciptaan Allah swt yang memiliki manfaat yang sangat besar sekali. Hal ini telah terangkum dalam al-Qur'anul Karim dan Hadist Nabi saw. Sesuai dengan firman Allah dalam Qs. Thaha ayat 53 yang berbunyi :

Firman Allah swt dalam Q.S *Thaahaa* (20) : 53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ
شَتَّىٰ

Terjemahnya :

Yang Telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang Telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa banyak jenis tumbuhan yang mampu tumbuh dibumi dengan adanya air hujan, baik yang tumbuh dengan cara ditanam maupun yang tumbuh dengan sendirinya dimana dapat kita lihat di tepi jalan sebagaimana sampel yang digunakan oleh peneliti herba Patikan Kebo (*Euphorbia hirta* Linn) yang dapat kita temui di daerah pegunungan maupun di sawah-sawah (Savitri, 2008 : 9-10).

Tumbuh-tumbuhan yang baik yang dapat bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan. Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat berbagai penyakit, dan ini merupakan anugerah Allah swt yang harus dipelajari dan dimanfaatkan sebagaimana dalam Qs. Al-Qashash : 57 yang berbunyi

وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَتَّخِطُفَ مِنْ أَرْضِنَا
 أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجِبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ
 شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَلْمُونَ

Terjemahnya :

Dan mereka berkata: "Jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami". dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah Haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) untuk menjadi rezki (bagimu) dari sisi kami? tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (Departemen Agama RI, 2002 : 552)

Ayat tersebut mengisyaratkan agar kita mencari dan mempelajari berbagai tumbuhan yang menjadi rezeki yaitu yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan menjadi rezeki bagi makhluk hidup karena merupakan bahan pangan, bahan sandang, papan dan bahan obat-obatan. Subhanallah, begitu banyak manfaat tumbuh-tumbuhan bagi makhluk hidup lain, sedangkan tumbuhan adalah makhluk yang tidak pernah mengharapkan balasan dari makhluk lain (Savitri, 2008 : 5-6)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Alat dan Bahan yang Digunakan

1. Alat yang Digunakan

Alat maserasi, autoklaf(*Smic model YX-280 B*), botol coklat, cawan petri (*Iwaki pyrex*), cawan porselin, erlenmeyer(*pyrex*), vial, Vortex, gelas kimia, inkubator(*memmert*), jangka sorong, juicer, Laminar Air Flow(LAF), lampu spiritus, oven(*memmert*), penangas air, pinset, pipet tetes, sendok besi, spoit 1ml(*One Med*), spoit 10 ml(*One Med*), tabung reaksi, dan timbangan analitik(*kern*).

2. Bahan yang Digunakan

Bahan yang digunakan adalah agar, air suling, biakan murni bakteri *Escherichia coli*, *Salmonella typhi*, *Vibrio Sp*, *Stapilococcus aureus*, dan *sygella dysentriae*, DMSO, etanol, paper disk, Medium Glukosa Natrium agar (GNA), Natrium agar (NA), Sampel Ekstrak etanol herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*).

B. Prosedur Kerja

a. Penyiapan sampel

Sampel herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*). diambil dari Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba.

b. Pengolahan sampel

Herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) dikeringkan di udara terbuka tanpa terkena cahaya matahari langsung. Setelah kering sampel diserbukkan dan siap diekstraksi.

c. Ekstraksi sampel penelitian

Herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) yang sudah diserbukkan sebanyak 500 gr di masukkan kedalam bejana maserasi lalu ditambahkan etanol hingga simplisia terbasahi sempurna, selanjutnya ditambahkan etanol sebanyak 1 L, biarkan selama 1 hari dalam bejana tertutup dan terlindung dari cahaya sambil di aduk sesering mungkin. Setelah 1 hari, kemudian di saring ke dalam wadah penampung dan ampasnya diekstraksi kembali dengan cairan penyari etanol yang baru, maserasi dilakukan sebanyak 3 kali penyarian. Hasil penyarian yang diperoleh kemudian dipekatkan dengan cara diuapkan dengan menggunakan penangas dan kipas angin hingga diperoleh ekstrak etanol kental yang tidak mengandung etanol lagi.

d. Pembuatan Sampel Penelitian

Ekstrak etanol herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) yang telah diperoleh kemudian dibuat konsentrasi 0,5%, 1%, 1,5%, 2% dan 2,5%. Untuk konsentrasi 0,5% ditimbang sebanyak 50Mg ekstrak etanol herba patikan kebo kemudian dilarutkan dalam 1ml DMSO, Untuk konsentrasi 1% ditimbang 100Mg ekstrak etanol herba patikan kebo dan dilarutkan

dalam 1ml DMSO, untuk konsentrasi 1,5% ditimbang 150mg ekstrak etanol herba patikan kebo dan dilarutkan dalam 1ml DMSO, untuk konsentrasi 2% ditimbang 200mg ekstrak etanol herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) dan dilarutkan dalam 1ml DMSO dan untuk konsentrasi 2,5% ditimbang 250mg ekstrak etanol herba patikan kebo dan dilarutkan dalam 1ml DMSO. Masing-masing setiap konsentrasi di cukupkan 10 ml dengan menambahkan aquadest steril.

e. Sterilisasi Alat

Peralatan gelas seperti cawan petri, tabung-tabung reaksi, pipet dan sebagainya digunakan untuk membiakkan mikroorganisme harus disterilkan dalam autoklaf pada tekanan 2 atm pada suhu 121°C selama 15 menit. Untuk pipet yang telah dipakai untuk mengambil mikroorganisme harus didesinfeksi dengan larutan fenol 5% selang waktu tertentu. Kemudian peralatan gelas tersebut di cuci dengan deterjen atau digodok dalam larutan Na_3PO_4 1% sampai mendidih beberapa menit. Kemudian dicuci dengan air sampai bersih dan rendam dalam larutan HCl 1% selama beberapa jam atau 24 jam untuk melarutkan sisa fosfat pada gelas. Cuci kembali dengan air dan kemudian dibilas dengan air suling. Keringkan dalam oven dengan suhu 170°C selama kurang lebih 2 jm. Sebelum disterilkan cawan petri dibungkus terlebih dahulu dengan kertas sedangkan pipet ujungnya di sumbat sedikit dengan kapas. Selanjutnya pipet dibungkus dengan kertas. Jarum ose

disterilkan dengan membakar langsung alat tersebut diatas lampu spiritus sampai pijar dan diulangi beberapa kali.

f. Pembuatan Medium

1. Medium Nutrient Broth (NB)

Ekstrak daging	5 gram
NaCl	2,5 gram
Pepton	10 gram
Air suling	1000 ml
pH	7,0

Cara pembuatan:

Semua bahan dimasukkan kedalam gelas Erlenmeyer dilarutkan dengan air suling sampai 800 ml, kemudian di panaskan sampai larut, lalu dicukupkan dengan air suling hingga 1000 ml. Selanjutnya disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121⁰C selama 15 menit.

2. Medium Glukosa Nutrien Agar (GNA)

Glukosa	10 g
Ekstrak Beef	5 g
Pepton	10 g
Natrium Klorida	2,5 g
Agar	15 g

Air suling sampai 1000 ml

pH 7,0

Cara pembuatan :

Bahan-bahan diatas dimasukkan ke dalam erlenmeyer dilarutkan dalam air suling sampai 800 ml, dipanaskan sampai larut, dicukupkan sampai 1000 ml air suling kemudian diatur pH 7,0. Selanjutnya disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121° C dengan tekanan 2 atm selama 15 menit.

g. Penyiapan Bakteri Uji

Peremajaan biakan murni bakteri uji Bakteri uji yang berasal dari biakan murni, masing-masing di ambil 1 ose kemudian diinokulasikan dengan cara digoreskan pada medium Nutrien Agar (NA) miring, selanjutnya diinkubasi pada suhu 37° C selama 24 jam.

h. Pengujian Skrining Antimikroba

Sebanyak 10 mg ekstrak etanol masing-masing dilarutkan dalam 0,2 ml DMSO dengan menggunakan mikropipet, kemudian dicampurkan dengan 9,8 ml medium NA hingga diperoleh volume akhir 10 ml. Campuran dituangkan kedalam cawan petri secara aseptis dengan digoyang-goyangkan agar merata dan dibiarkan memadat. Biakan mikroorganisme kemudian digoreskan diatas medium dan diinkubasi pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam.

i. Pengujian Daya Hambat

Pengujian daya hambat dari ekstrak etanol herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) dilakukan dengan menggunakan metode difusi agar dengan menggunakan kertas cakram (*piper disk*).

Disiapkan medium steril dari masing – masing biakan dengan suhu yang sesuai sebanyak 10 ml kemudian dicampur dengan 0,2 ml suspensi bakteri yang telah disiapkan sebelumnya, selanjutnya dituang secara aseptik kedalam cawan petri steril dan dibiarkan hingga memadat. Selanjutnya kertas cakram yang telah rendam dengan masing – masing konsentrasi lalu dibiarkan hingga kering serta pada kontrol diletakkan diatas permukaan medium secara aseptik dengan jarak titik tengah kertas cakram dengan yang lain kurang lebih 3 cm dan jarak dari pinggir cawan petri 2 cm. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37° C selama 24 jam. Diamati zona hambatan yang terbentuk.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada penelitian yang telah dilakukan pada sampel ekstrak etanol Herba Patikan kebo (*Euphorbia hirta*) terhadap beberapa bakteri penyebab diare diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Uji skrining antibakteri

Sampel	Mikroba Uji				
	EC	VB	SA	SD	ST
ekstrak etanol herba patikan kebo	+	+	+	+	-

Keterangan :

+ = Mengambat

- = Tidak menghambat

EC : *Eschericia coli*

VB : *Vibrio sp*

SA : *Staphylococcus aureus*

SD : *Sygella dysentri*

ST : *Salmonella thypi*

B. *Pembahasan*

Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obatan yang digunakan untuk membunuh infeksi mikroba pada manusia termasuk diantaranya antibiotik, antiseptik, desinfektan, dan preservatif. Dalam penelitian ini digunakan salah satu bahan alam yang banyak digunakan dimasyarakat yaitu herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) untuk diketahui aktivitas anti bakterinya, di mana bakteri uji yang digunakan adalah *Escherichia coli*, *Syggella dysentri*, *Vibrio Sp*, *Staphilococcus aureus*, dan *Salmonella thypi*. Kelima jenis bakteri tersebut merupakan bakteri yang dapat tumbuh pada saluran pencernaan. *Escherichia coli* penyebab utama diare kronik, *Salmonella thypi* penyebab utama penyakit tifoid dan infeksi pada saluran kemih, *Staphilococcus aerus* penyebab infeksi kulit, *Shygella dysentri* penyebab utama penyakit disentri (gangguan usus), dan *Vibrio sp* penyebab utama penyakit kolera (infeksi saluran usus).

Dalam penelitian ini digunakan larutan penyari etanol, etanol merupakan pelarut yang dapat melarutkan semua senyawa polar, sedangkan senyawa yang memiliki aktifitas antiibakteri dalam herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) ini adalah tanin yang merupakan salah satu komponen kimia yang terkandung dalam herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*).

Penyarian dari sampel dilakukan dengan cara maserasi, karena maserasi merupakan metode ekstraksi yang paling sederhana. Metode ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya penguraian senyawa aktif yang terkandung oleh pemanasan karena maserasi merupakan metode ekstraksi cara dingin.

Terlebih dahulu herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) dimaserasi dengan menggunakan etanol 70% sehingga diperoleh ekstrak etanol kental, Ekstrak etanol kental yang diperoleh selanjutnya dirotavapor untuk memisahkan pelarut dengan ekstraknya, Ekstrak yang diperoleh kemudian dibebaskan dari pelarut etanol dengan cara dipanaskan diatas penangas dan ditambahkan sedikit air suling sambil diaduk-aduk beberapa saat etanol yang terkandung dalam ekstrak akan menguap bersamaan dengan pemanasan. Tujuan ekstrak dibebaskan dari pelarut etanol agar pada saat dilakukan pengujian benar-benar senyawa dari herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) yang memiliki aktiivitas bukan etanolnya yang memberi efek. Setelah itu ekstrak yang diperoleh dilakukan uji skrining aktivitas antimikroba dengan menggunakan metode difusi agar terhadap beberapa bakteri penyebab diare, bakteri yang digunakan adalah *Escherichia coli*, *Vibrio Sp*, *Staphyloococcus aureus*, *Sygella dysentri*, dan *Salmonella typi* yang diinkubasi pada suhu 37⁰ C.

Pemilihan metode difusi agar pada uji skrining, karna metode ini relative sangat sederhana dan hasil pengamatannya yang diperoleh cukup teliti untuk mengamati aktivitas penghambatan antimikroba ekstrak herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) Uji ini merupakan uji pendahuluan untuk mengetahui aktivitas antibakteri suatu sampel dimana hasil yang diperoleh dapat menjadi patokan untuk pengujian selanjutnya. Dalam pengujian skrining antibakteri ini diperoleh hasil bahwa ekstrak etanol herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) dapat

menghambat mikroba uji *Eschericia coli*, *Vibrio sp*, *Stapylococcus aureus*, dan *Sygella dysentri*.

Uji selanjutnya yaitu pengujian aktivitas antibakteri ekstrak etanol herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) dengan menggunakan metode difusi agar. Metode ini merupakan metode yang efektif dan efisien dalam menentukan besarnya diameter hambat suatu sampel pada bakteri uji dengan menggunakan paper disk yang dicelupkan dalam sampel selama beberapa menit dengan konsentrasi yang berbeda-beda, Pada metode ini digunakan medium Glukosa nutrient Agar (GNA) karena didalam medium ini merupakan medium yang baik tempat tumbuh bakteri yang dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi bagi pertumbuhan bakteri.

Perbedaan besarnya daya hambat disebabkan perbedaan besarnya kandungan zat aktif pada masing-masing konsentrasi. Daerah hambatan yang diamati terlihat bahwa daya hambatnya besar sejalan dengan tingginya konsentrasi. Hasil pengukuran daerah hambatan memperlihatkan diameter hambatan rata-rata meningkat dengan makin naiknya konsentrasi dimana diameter hambatan rata-rata terbesar terhadap bakteri *Escherichia Coli* adalah 15,53 mm pada konsentrasi 2,5%, untuk bakteri *Vibrio sp* diameter hambatannya sebesar 13 mm pada konsentrasi 2,5%, dan pada *Shigella Dysentrie* diameter hambatan terbesarnya adalah 12,9 mm juga pada konsentrasi 2,5%.

Adanya perbedaan hambatan diameter juga dapat dipengaruhi oleh jenis bakteri uji yang di gunakan. Setiap bakteri memiliki kepekaan yang berbeda-beda terhadap sampel dalam hal ini senyawa antibakteri, dimana suatu bakteri akan membentuk resistensi dalam dirinya yang merupakan mekanisme alamiah dalam mempertahankan hidupnya (Mutscler,1991, 542-543). Selain pengaruh dari jenis bakteri, perbedaan diameter hambatan juga disebabkan oleh konsentrasi sampel dalam hal ini kemampuan dari tannin dalam menghambat pertumbuhan bakteri uji. Mekanisme kerja senyawa tannin dalam menghambat sel bakteri, yaitu dengan cara mendenaturasi protein sel bakteri, menghambat fungsi selaput sel (transpor zat dari sel satu ke sel yang lain) dan menghambat sintesis asam nukleat sehingga pertumbuhan bakteri dapat terhambat (Purwanti,2007 : 58).

Dari hasil nilai statistik pada sumber koefisien keragaman, F.hitung Bakteri (9,1) lebih besar dari F.tabel pada taraf kepercayaan 5% (4,46) dan 1% (8,65). Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang nyata antara diameter hambatan bakteri uji dengan konsentrasi ekstrak etanol herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) yang diujikan. Dapat dikatakan bahwa kemampuannya dalam menghambat bakteri itu berbeda-beda. Sedangkan pada sumber koefisien keragaman F.hitung perlakuan yaitu F.hitung (9,1) lebih kecil dari F.tabel 5% (3,84) dan 1% (7,01). Maka tidak ada perbedaan yang nyata dari pengaruh variasi konsentrasi zona hambatan bakteri uji. Hal ini disebabkan karena tingkatan dalam menentukan konsentrasi tidak jauh berbeda.

Dari hasil uji BNJ, dapat dilihat bahwa pertumbuhan antara bakteri *Escheichia coli*, dan *Shygella dysentri* tidak ada perbedaan aktivitas penghambatan tiap konsentrasi ekstrak etanol herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) Terhadap bakteri yang dapat dihambat, Sedangkan pada bakteri *Vibrio Sp* ada perbedaan penghambatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada etanol herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) di peroleh kesimpulan bahwa :

1. Pada hasil uji skrining antibakteri ekstrak etanol herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*) hanya dapat menghambat bakteri *Escherichia coli*, *Vibrio sp*, *Staphylococcus aureus* dan *Syggella dysentri*.
2. Ekstrak etanol herba patikan kebo (*Euphrbia hirta*) Dapat menghambat bakteri *Escherichia coli* dan *Shigella dysentri* pada konsentrasi 0,5% sedangkan pada bakteri *Vibrio sp* pada konsentrasi 2%.
3. Semua yang telah diciptakan oleh Allah swt tidak ada yang sia-sia, semua mempunyai manfaat jika manusia itu sendiri mau berfikir dan berusaha.

B. Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang identifikasi dan isolasi senyawa aktif yang terdapat dalam ekstrak etanol herba patikan kebo (*Euphorbia hirta*).

DAFTAR PUSTAKA

AL-QURAN dan Terjemahannya.

Corwin. Elizabeth, *Patofisiologi*, (2003), Penerbit buku kedokteran, Jakarta.

Djide, M.N, Sartini & Syahrudin, 2007. *Analisis Mikrobiologi Farmasi*, Laboratorium Mikrobiologi & Bioteknologi Farmasi, Fakultas MIPA, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Djide, M.N, Sartini.(2008). *Dasar-dasar Mikrobiologi Farmasi*. Makassar : Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin.

Dalimartha.,Setiawan.(2008). *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia*, Jilid 5, Trubus Agriwidya, Jakarta.

Dirjen Pom. (1989) *Sediaan Galenik*, Departemen Kesehatan RI.

Djauhuriya, Endo dan Bernani, (2004), *Gulma Berkhasiat Obat*. Jakarta, Penebar Swadaya.

Daldiyono, B.T, M. J.Hall, RE. Barry, (1997),*Gastroenterologi*, Binarupa Aksara, 43.

Dirjen. Pom.(1989), *Sediaan Galenik*, Departemen Kesehatan RI.

Dwynya, Saraswati, (2006), *Mikrobiologi Farmasi*, Universitas Hasanuddin.

Firdaus.muh, (2005) *Uji efek anti diare ekstrak metanol daun rambutan (Nephelium lappaceum, L.) pada mencit (Mus-musculus)*. Fakultas ilmu kesehatan uin alauddin Makassar.

Garrity GM, Bell JA, Lilburn TG., Bergeys.2003. *Manual of Determinative Bacteriology*, Eight Edition The Williams.

Ganiswara, Sulistia. 1995. *Farmakologi dan Terapi*. Fakultas kedokteran universitas Indonesia, Jakarta

Hadi Sujono, (2002), *Gastroenterologi*, penerbit Alumni Bandung.

Katno, (2002). *Tingkat manfaat dan keamanan tanaman obat dan obat tradisional*.Fakultas farmasi. Universitas Gadhja Mada

- Mustaina, (2006) Uji Efek Anti Piretik Infus Herba Patikan kebo pada mencit (*Mus-musculus*). Fakultas ilmu kesehatan uin alauddin Makassar.
- Nyoman I dewa.(2007). *Pendekatan diagnostic Dan Terapi Diare Kronis*.Denpasar
- Pratiwi, Sylvia T. (2008). *Mikrobiologi Farmasi*. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Purwanti, E. (2007). *Senyawa Bioaktif Tanaman Sereh (Cymbopogon nardus) Ekstrak Kloroform dan Etanol serta Pengaruhnya Terhadap Mikroorganisme Penyebab Diare*. Jurusan Pendidikan Biologi. Fakultas Pendidikan Biologi dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rahardja Kirana, (1993), *Swamedikasi, Cara-cara mengobati gangguan sehari-hari dengan obat-obat bebas sederhana*, Gramedia
- Savitri, Evika sandi. (2008), *Rahasia tumbuhan berkhasiat obat perspektif islam*. Malang : UIN malang press.
- Suharyono, (2008), *Diare akut klinik dan laboratorik.*, Rineka cipta, Jakarta.
- Taufik, H lukman, (2008), *Efek antiinflamasi ekstrak etanol herba patikan kebo (Euphorbia hirta Linn) pada tikus putih jantan galur wistar*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Zein, umar dkk.(2004). *Diare akut disebabkan oleh bakteri*. Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Sumatra utara.

RIWAYAT HIDUP



Eka Ahriani, lahir dibulukumba, tanggal 26 desember 1988 merupakan anak bungsu dari enam bersaudara pasangan Ayahanda Hamili, dengan Ibunda Nanni. Jenjang pendidikannya ditempuh mulai dari SD Negeri 126 borong, pada Tahun 1994 kemudian melanjutkannya pada tingkat selanjutnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada SMP Negeri 2 Bontotiro pada tahun 2000, lalu kemudian melanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) pada SMA Negeri 1 Herlang pada Tahun 2003, hingga pada tahun 2008 ia melanjutkan pada jenjang Strata satu (S1) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Jurusan Farmasi.