

**PENETAPAN KADAR NIKOTIN DALAM
ROKOK PUTIH YANG BEREDAR DI MAKASSAR**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN

Oleh


M A SRI WAHYUNI A R

NIM. 70100107079

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagian, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, April 2012

Penulis

SRI WAHYUNI

NIM.70100107079

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ Penetapan Kadar Nikotin dalam Rokok Putih yang Beredar di Makassar” yang disusun oleh Sri Wahyuni, NIM : 70100107079, Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari sabtu tanggal 13 April 2012 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1433 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar, 13 April 2012 M

21 Jumadil Awal 1433 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. Rasyidin Abdullah, MPH., MH. Kes ()
Sekretaris : Drs. M. Arif Alim, M.Ag ()
Pembimbing I : Drs. H. Hasyim Bariun, M.Si., Apt ()
Pembimbing II : Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt ()
Penguji I : Haeria, S.Si., M.Si ()
Penguji II : DR. Abdullah, S.Ag., M.Ag ()

Diketahui:

**Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Dr. dr. Rasyidin Abdullah, MPH., MH. Kes.
NIP. 19530119 198110 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tiada kata yang lebih patut diucapkan oleh seorang hamba selain mengucapkan puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan segala pemilik ilmu karena atas berkat hidayah-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Salawat dan salam kita haturkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan kepada kita, menjadi pembaharu dan menjadi cahaya hingga saat ini.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis dengan judul **“Penetapan Kadar Nikotin dalam Rokok Putih yang Beredar di Makassar”**, untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penghargaan dan rasa terima kasih yang tiada tara terkhusus penulis persembahkan kepada Ayahanda H. Tumpu dan Ibunda Santi yang telah banyak mengorbankan segala sesuatunya baik berupa materi maupun dorongan serta doa untuk anak-anaknya dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kakakku syahrul dan Syamsuriani Begitu pula penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. H. Hasyim Bariun, M.Si., Apt. selaku pembimbing pertama dan Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, MSi Apt. selaku pembimbing kedua atas segala keikhlasannya memberikan bimbingan, motivasi serta meluangkan waktu, tenaga, pikiran kepada penulis sejak rencana penelitian sampai

tersusunnya skripsi ini, semoga bantuan dan bimbingannya selama kami menempuh pendidikan dan melakukan penelitian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. DR. H. A. Qadir Gassing, HT, MS selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Rasyidin Abdullah, MPH., MH.Kes. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Gemy Nastity Handayani, S.Si, M.Si, Apt selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Haeria, S.Si, M.Si, selaku penguji pertama dan Bapak DR. H.Abdullah, S.Ag., M.Ag selaku penguji kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
5. Bapak/Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasa-jasanya mendapat balasan dari Allah SWT, serta seluruh staf Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
6. Kakakku tercinta Syamsuryani dan Syahrul dan Kakak Iparku Fachrunad Maha Abin Dan Jumiati. Juga sahabatku Rizka Tahir terima kasih atas dorongannya dan semangatnya

Selain itu pula terima kasih kepada sepupuku, keluarga besar serta teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas doa, kasih sayang, bimbingan dan bantuannya. Penulis hanya berharap, semoga apa yang telah

diberikan kepada kami senantiasa dilimpahkan rahmat dan perlindungan dari Allah SWT.

Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, olehnya itu penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Amin

Makassar, April 2012



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Maksud Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Pengamanan rokok bagi kesehatan	6
B. Kandungan yang terdapat pada rokok.	7


C. Peraturan pemerintah No. 81 Tahun 1999 ...	9
D. Jenis-jenis rokok ...	9
E. Uraian tembakau ...	10
F. Metode titrimetri	21
G. Uraian ekstraksi	24
H. Spektroskopi ultra violet	25
I. Smooking machine	27
J. Kromatografi gas	28
K. Tinjauan Islam mengenai rokok	29
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Alat Dan Bahan	35
B. Pengambilan Sampel	35
C. Penentuan Kadar Nikotin	35
D. Pembakuan Larutan HCl	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan	38
BAB V PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	43

DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	47
BIODATA	54



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1	: Hasil analisis kadar nikotin yang terdapat dalam rokok putih 50




DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. : Tembakau Rokok	48
2. : Lapisan atas eter yang jernih.....	48
3. : Larutan eter saat dititrasi.....	49
4. : Larutan eter setelah dititrasi.....	49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. : Skema kerja	47
2. : Gambar	48
3. : Hasil analisis kadar nikotin dalam rokok putih	50
4. : Perhitungan kandungan kadar nikotin	51
5. : Perhitungan % penyimpanan	53



ABSTRAK

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 70100107079
Jurusan : Farmasi
Skripsi : “Penetapan Kadar Nikotin dalam Rokok Putih yang Beredar di Makassar”.

Nikotin merupakan komponen toksik utama yang terdapat di dalam rokok. Telah dilakukan penelitian kandungan nikotin dalam rokok putih yang beredar di Makassar. Penelitian dilakukan dengan cara titrimetri secara asidimetri dengan tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kadar Nikotin dalam rokok putih yang beredar di Makassar supaya dapat memberikan informasi kepada masyarakat akan bahaya rokok (Nikotin) sehingga perokok bisa membatasi diri dan melengkapi tentang informasi ilmiah tentang kadar nikotin pada rokok putih yang beredar di Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar nikotin yang terdapat dalam rokok putih dari 3 merek yang dianalisis yaitu rokok C adalah 1,83 mg, 1,74 mg, 1,78 mg; rokok D adalah 0,85 mg, 0,81 mg, 0,80 mg; rokok M adalah 1,03 mg, 1,03 mg, 1,01 mg. penelitian ini membuktikan bahwa kadar nikotin rokok merek D dan M memenuhi syarat batas keamanan yang ditetapkan pemerintah, yaitu kadar nikotin dalam tiap batang rokok tidak boleh melebihi 1,5 mg/batang.



ABSTRAC

Name : Sri Wahyuni
Reg. Number : 70100107079
Majors : Pharmacy
Thesis : " Determination of nicotine levels in cigarettes white that circulate in Makassar"

Nicotine is main toxic component which there is in cigarette. has been done the research of nicotine content in white cigarette circulating in Makassar. Research is done by the way of titrimetry in acidimetry with a purpose to this research is to determine rate Nikotin in white cigarette circulating in Makassar so that can give information to public would danger of cigarette (Nicotine) so that smoker can limit x'self and complements about scientific information about nicotine rate at white cigarette circulating in Makassar.

Result of research indicates that nicotine rate which there is in white cigarette from 3 brand analysed that is cigarette C is 1,83 mg, 1,74 mg, 1,78 mg; cigarette D is 0,85 mg, 0,81 mg, 0,80 mg; cigarette M is 1,03 mg, 1,03 mg, 1,01 mg. this research proves that brand cigarette nicotine rated D and M qualified boundary condition of security and safety specified by government, that is nicotine rate in every cigarette bar may not exceed 1,5 mg/batang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tembakau merupakan jenis tanaman yang sangat dikenal di kalangan masyarakat Indonesia. Tanaman ini tersebar di seluruh Nusantara dan mempunyai kegunaan yang sangat banyak terutama untuk bahan baku pembuatan rokok. Bahan utama rokok adalah daun tembakau (*Nicotiana tabacum*) kering yang merupakan sumber utama nikotin. (Yuni Susilowati, Eka. 2006)

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu maupun masyarakat, oleh karena itu diperlukan berbagai kegiatan pengamanan rokok bagi kesehatan. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum l*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

Rokok Filter (RF) adalah rokok yang pada bagian pangkalnya terdapat filter semacam gabus. Rokok Non Filter (RNF) adalah rokok yang pada bagian pangkalnya tidak terdapat gabus. Kandungan Rokok itu sendiri, sebenarnya mengandung lebih dari 4000, Adapun Rokok berdasarkan penggunaan filter. Bahan kimia berbahaya yang akan menimbulkan penyakit-penyakit dalam tubuh manusia.

Rokok adalah silindris dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah di cacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lain.

Pada zaman modern ini, rokok bukanlah benda asing lagi, bagi mereka yang hidup di kota maupun di desa, sebagian orang, rokok sudah menjadi kebutuhan hidup yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa alasan yang jelas seseorang akan merokok, baik setelah makan, setelah minum kopi atau teh, bahkan sambil bekerja pun seringkali diselingi dengan merokok. Rokok sudah menjadi budaya manusia. (Jaya Muhammad, 2009)

Rokok mengandung lebih dari empat ribu zat-zat dan dua ribu diantaranya telah dinyatakan berdampak tidak baik bagi kesehatan kita, diantaranya adalah *Aceton* (bahan pembuat cat), *Naftalene* (bahan kapur barus), *Arsenik* (penyebab kematian aktivis HAM, Munir), *Tar* (bahan karsinogen penyebab kanker), *metanol* (bahan bakar roket), *Vynil Chloride* (bahan plastik PVC), *Fenol Butane* (bahan bakar korek api), *Potassium Nitrat* (bahan baku pembuatan bom dan pupuk), *Polonium -201* (bahan radioaktif), *Amonia* (bahan untuk pencuci lantai), *DDT* (digunakan untuk racun serangga), *Hidrogen Sianida* (gas beracun yang digunakan dikamar eksekusi hukuman mati), *Nikotin* (zat yang menimbulkan kecanduan), *Cadmium* (digunakan untuk aki mobil), dan *Karbonmonoksida* (asap dari knalpot kendaraan). Dan zat pada

rokok yang paling berbahaya adalah Tar, Nikotin dan Karbonmonoksida. (Muhammad jaya, 2009)

Contoh penyakit akibat rokok ialah: kanker mulut, kanker rahim impotensi (pada laki-laki), kanker payudara (pada perempuan), kerontokan rambut, bronkitis kronis, emfisema, kanker paru-paru, larink, mulut, faring, esofagus, kandung kemih, penyempitan pembuluh nadi dan lain-lain. Namun demikian masih banyak orang baik laki-laki maupun perempuan yang belum atau tidak dapat meninggalkan kebiasaan merokok ini.

Pada tahun 2000 saja, terjadi sekitar 4,8 juta kasus kematian prematur di seluruh dunia yang diakibatkan kebiasaan merokok. Angka rata-rata itu diambilkan dari sedikitnya 3,9 juta sampai tertinggi 5,9 juta kasus kematian akibat rokok. Penyakit-penyakit kardiovaskuler tercatat sebagai penyebab 1,7 juta kasus kematian itu, 970.000 kasus penyempitan pernapasan akut dan 850.000 lainnya karena kanker paru-paru.

Dalam 20 batang rokok per hari akan menyebabkan berkurangnya 15 % hemoglobin, yakni zat asasi pembentuk sel darah merah. Hasil penelitian mengungkapkan, menghisap rokok menyebabkan lima juta orang meninggal dunia setiap tahun. Ini akan terus meningkat bila kebiasaan buruk itu tidak di kurangi, khususnya di Negara-negara berkembang. Angka tersebut dihimpun oleh epidemiolog Majid Ezzati dan Alan Lopez

Nikotin adalah zat yang terdapat dalam rokok yang dapat menyebabkan ketagihan, ini yang menyebabkan para pengguna rokok sulit sekali untuk berhenti

merokok. Nikotin merupakan zat pada rokok yang menyebabkan penyakit jantung, 25 persen dari para pengidap penyakit jantung disebabkan oleh kegiatan merokok. (Jaya Muhammad 2009)

Nikotin adalah zat atau bahan senyawa *pirrolidin* yang terdapat dalam *Nicotiana tabacum l*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dan dapat mengakibatkan ketergantungan. Merokok dapat menyebabkan gangguan kesehatan, gangguan kesehatan ini dapat disebabkan oleh nikotin yang berasal dari asap arus utama dan asap arus samping dari rokok yang di hisap oleh perokok. Dengan demikian penderita tidak hanya perokok sendiri (perokok aktif) tetapi juga orang yang berada di lingkungan.

Nikotin adalah suatu alkaloid yang sudah lama dikenal, dalam asap rokok lama kelamaan akan terakumulasi pada dinding pembuluh darah perokok menyempitkan pembuluh darah. Nikotin dalam asap rokok yang masuk ke paru-paru dengan cepat diabsorpsi dari paru-paru ke dalam darah dan efisiensinya hampir sama dengan apabila diberikan secara intravena. Senyawa ini mencapai otak dalam waktu 8 detik setelah inhalasi. (Yuni Susilowati, Eka. 2006)

B. Rumusan Masalah

Apakah kadar nikotin dalam rokok putih yang beredar di Makassar memenuhi standar berdasarkan PP NO. 81 tahun 1999.

C. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah menganalisis kandungan nikotin yang terdapat pada rokok putih yang beredar di Makassar.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan kadar nikotin dalam rokok putih yang beredar di makassar.

E. Manfaat Penelitian

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat melengkapi informasi ilmiah tentang kadar nikotin pada rokok putih yang beredar di masyarakat saat ini.
2. Dapat memberikan informasi pada masyarakat tentang akan bahaya rokok (nikotin) sehingga perokok bisa membatasi diri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

Kadar nikotin yang diukur adalah kadar nikotin dalam rokok putih yang terdapat dalam beberapa merk rokok yang banyak dijual di pasaran. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi dan gangguan kehamilan dan janin, demikian peringatan yang tertulis pada setiap bungkus rokok, sebagaimana diatur dalam pasal 8 (2), PP 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Pemerintah Indonesia Mengeluarkan PP No. 81/1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, diantaranya menentukan kadar maksimum kandungan nikotin pada setiap batang rokok.

Di dalam peraturan pemerintah ini diatur adanya kawasan yang tanpa rokok agar tak mengganggu hak orang lain. Namun kenyataannya banyak yang belum tahu soal PP ini termasuk para pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat pada umumnya. Kawasan dilarang merokok tidak bertujuan menghentikan perokok aktif melainkan sekedar menunda waktu yang justru menyebabkan perokok menggandakan jumlah batang rokok yang diisap untuk mencapai kenikmatan. Hal yang sama terjadi dengan pembatasan kandungan nikotin tidak boleh melebihi 1,5 mg dan kandungan tar 20 mg

setiap batang rokok seperti diatur dalam pasal 4 (1) PP No. 81 Tahun 1999. (Istiqomah Umi , 2008)

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lingkungan asap rokok adalah penyebab berbagai penyakit, dan juga dapat mengenai orang sehat yang bukan perokok. Paparan asap rokok yang dialami terus-menerus pada orang dewasa yang sehat dapat menambah resiko terkena penyakit paru-paru dan penyakit jantung sebesar 20 - 30 persen. Lingkungan asap rokok dapat memperburuk kondisi seseorang yang mengidap penyakit asma, menyebabkan bronkitis, dan pneumonia. Asap rokok juga menyebabkan iritasi mata dan saluran hidung bagi orang yang berada di sekitarnya. Pengaruh lingkungan asap tembakau dan kebiasaan ibu hamil merokok dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada anaknya bahkan sebelum anak dilahirkan. Bayi yang lahir dari wanita yang merokok selama hamil dan bayi yang hidup di lingkungan asap rokok mempunyai resiko kematian yang sama. (istiqomah, umi. 2008)

B. Kandungan Yang Terdapat Pada Rokok

Kandungan yang terdapat pada rokok antara lain :

1. Nikotin Zat yang paling sering dibicarakan dan diteliti orang, meracuni saraf tubuh, meningkatkan tekanan darah, menimbulkan penyempitan pembuluh darah tepi, dan menyebabkan ketagihan dan ketergantungan pada pemakainya. Kadar nikotin 4-6 mg yang diisap oleh orang dewasa setiap hari sudah bisa membuat seseorang ketagihan. Di Amerika Serikat, rokok putih yang beredar di pasaran

memiliki kadar 8-10 mg nikotin per batang, sementara di Indonesia berkadar nikotin 17 mg per batang.

2. Timah Hitam (Pb) Timah hitam yang dihasilkan oleh sebatang rokok sebanyak 0,5 ug. Sebungkus rokok (isi 20 batang) yang habis diisap dalam satu hari akan menghasilkan 10 ug. Sementara ambang batas bahaya timah hitam yang masuk ke dalam tubuh adalah 20 ug per hari. Bisa dibayangkan, bila seorang perokok berat menghisap rata-rata 2 bungkus rokok per hari, berapa banyak zat berbahaya ini masuk ke dalam tubuh.
3. Gas Karbon Monoksida (CO) memiliki kecenderungan yang kuat untuk berikatan dengan hemoglobin dalam sel-sel darah merah. Seharusnya, hemoglobin ini berikatan dengan oksigen yang sangat penting untuk pernapasan sel-sel tubuh, tapi karena gas CO lebih kuat daripada oksigen, maka gas CO ini merebut tempatnya misalnya aceton yang biasa digunakan sebagai zat penghilang kutek atau campuran cat. Pestisida, digunakan untuk membunuh hama di tumbuhan tembakau, yaitu bahan pokok pembuatan rokok itu sendiri.
4. Tar adalah kumpulan dari beribu-ribu bahan kimia dalam komponen padat asap rokok dan bersifat karsinogen. Pada saat rokok dihisap, tar masuk kedalam rongga mulut sebagai uap padat. Setelah dingin akan menjadi padat dan membentuk endapan berwarna coklat pada permukaan gigi, saluran pernafasan, dan paru-paru.
(Elizabet)

Terus juga ada Arsenik yang biasa digunakan sebagai campuran pembersih lantai dan masih banyak lagi, ternyata kandungan/pengaruh negatif yang di bawa

rokok itu sendiri lebih banyak di banding pengaruh positif yang di timbulkannya, coba bayangkan semua bahan-bahan tadi itu masuk ke dalam tubuh kita.

C. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 1999

Dikeluarkannya peraturan pemerintah tersebut diatas berdasarkan pertimbangan bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu maupun masyarakat dan dalam pelaksanaan ketentuan pasal 44, Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 1999, Tentang pengamanan rokok bagi kesehatan pasal 4 (1) menetapkan bahwa kandungan nikotin dalam setiap batang rokok tidak boleh melebihi 1,5 mg/batang. Penyelenggaraan pengamanan rokok bagi kesehatan bertujuan untuk mencegah penyakit akibat penggunaan rokok bagi individu dan masyarakat dengan :

- a) Melindungi kesehatan masyarakat terhadap insiden penyakit yang fatal dan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup akibat pengguna rokok;
- b) Melindungi penduduk usia produktif dan remaja dari dorongan lingkungan untuk penggunaan rokok dan ketergantungan terhadap rokok ;
- c) Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat terhadap bahaya kesehatan terhadap pengguna rokok.

D. Jenis-jenis Rokok

1. Rokok Berdasarkan Bahan Pembungkus

- a. Kawung adalah rokok yang bahan pembungkusnya daun aren.

- b. Sigaret ialah rokok yang bahan pembungkusnya berupa kertas
- c. Cerutu adalah rokok yang bahan pembungkusnya berupa daun tembakau

2. Rokok Berdasarkan Bahan Baku Atau Isi

- a. Rokok Putih yaitu rokok yang bahan baku atau isinya hanya daun tembakau yang di beri saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
- b. Rokok Kretek yaitu rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau dan cengkeh yang di beri saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu.
- c. Rokok Klembak yaitu rokok yang bahan baku atau isinya berupa daun tembakau, cengkeh, dan menyan yang di beri saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma tertentu. (Yuni Susilowati, Eka, 2006)

E. Uraian Tembakau

1. Klasifikasi tembakau

- Dunia : Plantae
- Divisi : Spermatophyta
- Kelas : Magnoliopsida
- Bangsa : Solanales
- Marga : Nicotiana
- Jenis : *Nicotiana tabacum l*

2. Sejarah Tembakau

Tembakau (*Nicotiana tabacum.l*) adalah genus tanaman yang berdaun lebar yang berasal dari Amerika Utara dan Amerika Selatan. Daun dari pohon ini sering di gunakan sebagai bahan baku rokok, baik dengan menggunakan pipa maupun di gulung dalam bentuk atau cerutu. Daun tembakau dapat pula di kunyah atau di kulum. Tembakau mengandung zat alkaloid nikotin, sejenis neurotoksin yang sangat ampuh jika di gunakan pada serangga. Zat ini di gunakan sebagai bahan utama insektisida.

Tanaman tembakau pertama kali masuk ke Indonesia kira-kira tahun 1630, kemudian berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Melalui proses adaptasi yang cukup lama akhirnya terbentuk populasi tembakau yang mempunyai sifat morfologi dan fisiologi yang khas. Pusat penanaman tembakau di Indonesia adalah sumatera utara, sumatera selatan, lampung, jawa barat, jawa tengah, Yogyakarta, Madura, nusa tenggara barat dan Sulawesi selatan. Daerah yang dapat di Tanami tembakau yaitu daerah yang berketinggian antara 200-300 m dari permukaan laut.

Nicotiana tabacum dan *Nicotiana rustica* mempunyai perbedaan yang jelas. Pada *Nicotiana tabacum*, daun mahkota bunganya memiliki warna merah muda sampai merah, mahkota bunga berbentuk terompet panjang, daunnya berbentuk lonjong pada ujung runcing, kedudukan daun pada batang tegak, merupakan induk tembakau sigaret dan tingginya sekitar 120 cm. Adapun *Nicotiana rustica*, daun mahkota bunganya berwarna kuning, bentuk mahkota bunga seperti terompet berukuran pendek dan sedikit gelombang, bentuk daun bulat yang pada ujungnya

tumpul, dan kedudukan daun pada batang mendatar agak terkulai. Tembakau ini merupakan varietas induk untuk tembakau cerutu yang tingginya sekitar 90 cm.

Dalam spesies *Nicotiana tabacum* terdapat varietas yang amat banyak jumlahnya, dan untuk tiap daerah terdapat perbedaan jumlah kadar nikotin, bentuk daun, dan jumlah daun yang dihasilkan. Proporsi kadar nikotin banyak bergantung kepada varietas, tanah tempat tumbuh tanaman, dan kultur teknis serta proses pengolahan daunnya (eka yuni susilowati.2006).

A. Jenis-jenis Tanaman Tembakau

Berdasarkan penggunaannya, tanaman tembakau spesies *Nicotiana tabacum* dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:

a. Jenis Tembakau Cerutu

Secara umum tembakau cerutu dikenal ada 3 macam sesuai dengan fungsinya pada pembuatan rokok cerutu yaitu :

1) Tembakau Pengisi

Tembakau yang biasa digunakan sebagai tembakau pengisi adalah tembakau Vorstenland. Tembakau ini berdaun banyak sehingga tampak rimbun, warna daun hijau, ketebalan daun tipis sampai sedang, daun terkulai sehingga kedudukannya tampak mendatar dan habitus piramidal.

Krosok tembakau Vorstenland setelah pengolahan berwarna coklat kemerahan. Krosok yang terbaik diperoleh dari daun kaki, sedangkan daun yang berada di atas umumnya digunakan sebagai pembalut dalam industri rokok cerutu.

Budidaya tembakau Vorstenland pada umumnya di lereng kaki gunung Merapi sebelah tenggara, yang terdiri dari tanah vulkanis (tanah abu muda yang berwarna kelabu). Pusat tanaman tembakau berada di sekitar Kabupaten Klaten yang membujur dari arah Solo–Jogya, sedang sebagian lain terletak di sekitar Kecamatan Bangak, yakni antara Kartasura dan Boyolali (Cahyono.1998).

2) Tembakau Pembalut

Tembakau yang biasa digunakan sebagai tembakau pembalut adalah tembakau Besuki. Tembakau ini memiliki sosok ramping dan ketinggiannya sedang sampai agak tinggi. Daunnya berbentuk oval, kedudukan daun pada batang agak tegak, jarak daun satu dengan yang lain agak berjauhan, lebar daun sedang sampai lebar, habitus silindris, ketebalan daun tipis, daunnya lunak, dan memiliki aroma yang khas.

Krosok yang baik dari tembakau Besuki berwarna coklat tua, coklat muda, dan kuning. Daun terbaik untuk pembalut cerutu ataupun pembungkus cerutu adalah yang berasal dari daun kaki.

3) Tembakau Pembungkus

Tembakau yang biasa digunakan sebagai pembungkus adalah tembakau Deli. Tembakau ini bercirikan dengan keadaan tanaman yang kokoh dan besar dengan ketinggian tanaman sedang, daunnya tipis dan elastis, bentuk daun bulat dan lebar, kedudukannya pada batang tampak mendatar, bermahkota tipe silindris, dan warna daun cerah.

Daun tembakau Deli yang telah mengalami pengolahan dengan pengeringan berwarna coklat agak kelabu yang merupakan ciri khas krosok tembakau Deli. Krosok yang demikian umumnya diperoleh dari daun pasir (daun yang letaknya paling dekat dengan tanah) dan sebagian daun kaki. Warna krosok tersebut sangat berbeda dengan warna krosok tembakau Kuba yang berwarna coklat kemerahan sehingga sangat mudah dibedakan antara tembakau Deli dan tembakau Kuba.

3. Sejarah Nikotin


Nikotin pertama kali diisolasi dari daun tembakau, *Nicotiana tabacum* Oleh Posselt dan Reiman pada tahun 1828, kemudian Orlifia berinisiatif untuk melakukan studi Farmakologik pertama dari alkaloid ini pada tahun 1843. Langley dan Dickinson 1889, Mendemonstrasikan bahwa tempat kerjanya pada ganglion lebih baik di bandingkan dengan preganglion dan post ganglion saraf.

Nikotin merupakan alkaloid alam berbentuk cairan tidak berwarna suatu basa yang mudah menguap berubah menjadi warna coklat dan berbau seperti tembakau setelah terpapar udara. Nikotin penting bukan dalam pengobatan tapi bersifat toksik dalam tembakau yang menimbulkan ketergantungan pada pengguna rokok. (Murdiyanti A.S., sembiring, H.2004)

Nikotin ($C_{10}H_{14}N_2$) merupakan cairan berwarna hingga kuning muda, sangat higroskopis, memiliki bau yang tidak menyenangkan, berubah menjadi kecoklatan bila terpapar udara atau cahaya. Larut dalam air, alkohol, kloroform, eter, petroleum ether, minyak tanah dan beberapa minyak tertentu. Memiliki titik

dididih 247°C , berat molekul 162,4 mg/mol dan banyak digunakan sebagai insektisida pertanian dalam bentuk uap ataupun spray. (Reynold)

Rumus bangun nikotin sebagai berikut:



Gambar.1 Rumus Bangun Nikotin (Reynold, 1982)

4. Keracunan Nikotin

Tembakau rokok biasanya mengandung 1 % - 2 % nikotin. Absorpsi nikotin melalui mulut terjadi lambat karena terjadi penundaan pengosongan lambung sehingga muntah yang di sebabkan oleh efek sentral fraksi yang di absorpsi akan mengeluarkan tembakau yang tersisa pada saluran gastrointestinal.

Mula kerja gejala akut keracunan nikotin termasuk mual, salivasi, nyeri perut, muntah, diare, keringat dingin, sakit kepala, pusing, pendengaran dan penglihatan terganggu, kebingungan dan otot-otot menjadi lemah. Setelah pingsan dan kelemahan maka tekanan darah menurun, gangguan pernapasan, denyut nadi lemah, *collapse* yang di akhiri dengan kejang serta kematian dapat terjadi dalam waktu beberapa menit setelah kegagalan pernapasan.

5. Aksi Farmakologik Nikotin

Perubahan yang terjadi di dalam tubuh setelah penggunaan nikotin sangat kompleks dan sering tidak dapat diramalkan. Hal ini disebabkan karena kerja nikotin

yang sangat cepat terhadap ganglion simpatis maupun parasimpatis. Sebagai contoh Nikotin dapat meningkatkan kecepatan denyut jantung melalui eksitasi saraf simpatis atau paralisis ganglion parasimpatis pada jantung dan Nikotin juga dapat menurunkan denyut jantung melalui paralisis saraf simpatis atau stimulasi ganglion parasimpatis pada jantung. Selain itu Nikotin dapat menstimulasi medulla adrenal dengan melepaskan epinefrin yang meningkatkan kecepatan denyut jantung dan tekanan darah.

a. Sistem Saraf Perifer

Kerja utama Nikotin pada awalnya hanya merupakan stimulasi sementara namun kemudian berlanjut dengan depresi persisten pada semua ganglion. Perangsangan ganglion secara langsung dapat terjadi pada dosis kecil yang disebabkan oleh depolarisasi, namun dengan dosis yang lebih besar Nikotin menghambat transmisi impuls pada ganglion karena efek depolarisasi persisten (efek bifasik). Efek bifasik ini juga dapat terjadi pada medulla adrenal; pada dosis kecil merangsang pelepasan katekolamin dan pada dosis yang lebih besar mencegah pelepasan katekolamin.

b. Sistem Saraf Pusat

Nikotin merupakan perangsang SSP yang kuat dan dapat menimbulkan tremor dan konvulsi pada dosis besar. Stimulasi SSP pada dosis besar diikuti oleh depresi dan kematian yang merupakan hasil kegagalan respirasi baik dari paralisis sentral maupun penghambatan perifer pada otot-otot pernapasan.

c. Sistem Kardiovaskuler

Efek pada sistem ini dipengaruhi oleh stimulasi ganglion dan medulla adrenal yang secara karakteristik menyebabkan peningkatan denyut jantung dan tekanan darah akibat pelepasan katekolamin dari ujung saraf simpatik

d. Saluran Gastrointestinal

Nikotin menyebabkan aktivasi ganglion parasimpatis pada usus dengan efek peningkatan tonus usus dan peristalsis meninggi, mual, muntah, dan kadang-kadang terjadi diare ketika nikotin diabsorpsi secara sistemik pada perokok pemula.

e. Kelenjar Eksokrin

Nikotin menyebabkan stimulasi salivasi dan secret bronkus dan diikuti penghambatannya.

6. Nikotin sebagai insektisida

Nikotin pertama kali digunakan sebagai insektisida pada tahun 1763, dan alkaloid murninya diisolasi tahun 1828 oleh Posset dan Reimann, kemudian disintesis tahun 1904 oleh Piclet dan Rotschy. Alkaloid nikotin, nikotin sulfat dan senyawa nikotin lainnya digunakan sebagai racun kontak, fumigasi, dan racun perut. Insektisida ini diperdagangkan sebagai *Black Leaf 40*^R mengandung 40 % nikotin, untuk mengendalikan serangga yang lunak tubuhnya.

Nikotin didapatkan dari *Nicotiana tabacum* dengan kadar 2 – 5 % dan *Nicotiana rustica* dengan kadar 5 – 14 %. Nikotin diekstrak dengan alkali dan

didistilasi uap air menggunakan benzene, trikloro etilen, atau eter. Nikotin pada umumnya terdiri atas 97 % alkaloid dari tembakau (Baehaki.1993).

7. Isolasi Nikotin

Nikotin adalah suatu jenis senyawa kimia yang termasuk ke dalam golongan alkaloid karena mempunyai sifat dan ciri alkaloid.

1. Alkaloid

Alkaloid merupakan senyawa yang bersifat basa yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen dan biasanya berupa sistem siklis. Alkaloid mengandung atom karbon, hidrogen, nitrogen dan pada umumnya mengandung oksigen. Senyawa alkaloid banyak terkandung dalam akar, biji, kayu maupun daun dari tumbuhan dan juga dari hewan. Senyawa alkaloid merupakan hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan dan digunakan sebagai cadangan bagi sintesis protein. Kegunaan alkaloid bagi tumbuhan adalah sebagai pelindung dari serangan hama, penguat tumbuhan dan pengatur kerja hormon. Alkaloid mempunyai efek fisiologis. Sumber alkaloid adalah tanaman berbunga, angiospermae, hewan, serangga, organisme laut dan mikroorganisme. Famili tanaman yang mengandung alkaloid adalah Liliaceae, solanaceae, rubiaceae, dan papaveraceae (Tobing. 1989).

2. Sifat – sifat alkaloid :

- a. Biasanya merupakan kristal tak berwarna, tidak mudah menguap, tidak larut dalam air, larut dalam pelarut organik. Beberapa alkaloid berwujud

cair dan larut dalam air. Ada juga alkaloid yang berwarna, misalnya berberin (kuning).

- b. Bersifat basa (pahit, racun).
- c. Mempunyai efek fisiologis serta aktif optis.
- d. Dapat membentuk endapan dengan larutan asam fosfowolframat, asam fosfomolibdat, asam pikrat, dan kalium merkuriiodida.

(Tobing, 1989)

8. Efek penggunaan nikotin dalam tubuh

Nikotin yang terdapat di tembakau, merupakan salah satu zat aditif yang dikenal. Nikotin adalah penghambat susunan syaraf pusat (SSP) yang mengganggu keseimbangan syaraf. Ketergantungan fisik dan psikologi pada nikotin berkembang sangat cepat. Menghisap tembakau menghasilkan efek nikotin pada SSP dalam waktu kurang lebih sepuluh detik. Jika tembakau dikunyah, efek pada SSP dialami dalam waktu 3–5 menit.

Efek nikotin tembakau yang dipakai dengan cara menghisap, menguyah atau menghirup tembakau dengan sedotan, menyebabkan penyempitan pembuluh darah, peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, nafsu makan berkurang, sebagian menghilangkan perasaan cita rasa dan penciuman serta membuat paru-paru menjadi nyeri. Penggunaan tembakau dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru, jantung, dan pembuluh darah .

Nikotin membuat ketagihan. Itulah sebabnya para perokok ingin terus menghisap tembakau secara rutin karena mereka ketagihan nikotin. Ketagihan

tersebut ditandai dengan keinginan yang menggebu untuk selalu mencari dan menggunakan, meskipun mengetahui akan konsekuensi negatif terhadap kesehatan.

Dari sifat ketergantungan alami yang muncul ditemukan bahwa nikotin mengaktifkan jaringan otak yang menimbulkan perasaan senang, tenang, dan rileks. Sebuah bahan kimia otak termasuk dalam perantara keinginan untuk terus mengonsumsi, yakni neurotransmitter dopamine, dalam penelitian menunjukkan bahwa nikotin meningkatkan kadar dopamine tersebut. Efek akut dari nikotin dalam beberapa menit menyebabkan perokok melanjutkan dosis secara frekuentif per harinya sebagai usaha mempertahankan efek kesenangan yang timbul dan mempertahankan diri dari efek ketergantungan.

Nikotin dapat berlaku sebagai sebuah stimulan dan obat penenang atau penghilang rasa sakit. Secara langsung setelah kontak dengan nikotin maka timbul rangsangan terhadap kelenjar adrenal yang menyebabkan terlepasnya hormon adrenalin. Hormon adrenalin ini merangsang tubuh dan menyebabkan pelepasan glukosa secara mendadak yang akhirnya kadar gula dalam darah menurun, dan tekanan darah juga meningkat. Begitu pula pada pernapasan dan detak jantung.

Reaksi ini hampir sama seperti yang terlihat pada kasus penyalahgunaan obat misalnya kokain dan heroin yang diduga dapat menimbulkan sensasi senang. Namun di sisi lain nikotin dapat menimbulkan efek sebagai obat

penenang atau penghilang rasa sakit, tergantung dari kadar yang dikonsumsi dalam sistem dan dosis yang digunakan.

Nikotin dalam metabolisme dapat menghilang dari tubuh dalam beberapa jam, namun jika perokok terus menerus merokok dan semakin lama bertambah kuat sehingga merokok hanya untuk mendapatkan rangsangan yang diinginkan. Sayangnya jika menghentikan masukan nikotin biasanya diikuti dengan reaksi ketergantungan (*withdrawl syndrome*) yang mungkin membutuhkan waktu sekitar satu bulan atau lebih. Hal tersebut termasuk gejalanya, yakni muncul sifat lekas marah, terlalu sensitif, kecanduan, pengurangan fungsi kognitif tubuh dan pemusatan perhatian, serta terjadi gangguan tidur.

Efek paling berbahaya dari mengkonsumsi tembakau dan ketergantungan nikotin adalah menyebabkan kanker dan sepertiga dari semua penyakit kanker itu yakni kanker paru-paru. Penyakit ini pembunuh pertama pada pria maupun wanita dan menguasai sekitar 90% dari semua kasus kanker paru-paru pada perokok. (Eka yuni susilowati.2006)

F. Metode Titrimetri

Metode titrimetri masih digunakan secara luas karena merupakan metode yang tahan, murah, dan mampu memberikan ketepatan (presisi) yang tinggi. Keterbatasan metode ini adalah bahwa metode titrimetri kurang spesifik.

Dalam analisis titrimetri atau analisis volumetri atau analisis kuantitatif dengan mengukur volume, sejumlah zat yang diselidiki direaksikan dengan

larutan baku (standar) yang kadar konsentrasinya telah diketahui secara teliti dan reaksinya berlangsung secara kuantitatif. Larutan baku tiap literinya berisi sejumlah berat ekivalen senyawa baku, larutan baku diteteskan dari buret kepada larutan yang diselidiki dalam labu erlenmeyer atau gelas piala. Larutan baku yang diteteskan disebut titran.

A. Berdasarkan Cara Titration

a. Titration Langsung

Cara ini dilakukan dengan melakukan titration langsung terhadap zat yang akan ditetapkan. Cara ini mudah, cepat, dan sederhana.

b. Titration Kembali

Dilakukan dengan cara penambahan titran dalam jumlah berlebihan, kemudian kelebihan titran dititrasi dengan titran lain. pada cara ini ada 2 sumber kesalahan karena menggunakan 2 titran sehingga kesalahan menjadi lebih besar. Disamping itu cara ini juga memakan waktu yang lama.

B. Berdasarkan Jumlah Sampel

a. Titration Makro

1. Jumlah Sampel : 100-1000 mg
2. Volume Titran : 10-100 ml
3. Ketelitian Buret : 0,02 ml

b. Titrasi Semi Mikro

1. Jumlah Sampel : 10-100 mg
2. Volume titran : 1-10 ml
3. Ketelitian Buret : 0,001 ml

c. Titrasi mikro

1. Jumlah Sampel : 1-10 mg
2. Volume Titran : 0,1-1 ml
3. Ketelitian Buret : 0,001 ml

C. Titrasi Asam-Basa

Titrasi Asam basa dapat memberikan titik akhir yang cukup tajam dan untuk itu digunakan pengamatan dengan indikator bila pH pada titik ekuivalen antara 4-10. Demikian juga titik akhir titrasi akan tajam pada titrasi asam atau basa lemah jika penitrasian adalah basa atau asam kuat dengan perbandingan tetapan disosiasi asam lebih besar dari 10^{-4} . Selama titrasi asam basa, pH larutan berubah secara khas. pH berubah secara drastis bila volume titrannya mencapai titik ekuivalen. Reaksi asam basa bersifat reversibel.

Mengukur volumetri larutan adalah jauh lebih cepat dibandingkan dengan menimbang berat suatu zat dengan suatu zat dengan suatu metode gravimetri. Analisis volumetri juga dikenal sebagai titrimetri, dimana zat yang akan dianalisis dibiarkan bereaksi dengan zat lain yang konsentrasinya diketahui dan dialirkan dari buret dalam bentuk larutan. Konsentrasi larutan yang tidak diketahui (analit)

kemudian dihitung. Syaratnya adalah reaksi harus berlangsung secara cepat, reaksi berlangsung kuantitatif dan tidak ada reaksi samping, selain itu jika reagen penitrasi yang diberikan berlebih, maka harus dapat diketahui dengan suatu indikator. (S.M.Khopkar, konsep dasar kimia analitik.1990)

G. Uraian Ekstraksi

Definisi Ekstrak

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair di buat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari langsung.

Ekstrak adalah sediaan kental yang di peroleh dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut di uapkan dari massa atau serbuk yang tersisa di perlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah di tetapkan. (Dirjen POM.1979)

Pemilihan metode ekstraksi sangat diperlukan untuk mencapai hasil maksimal sesuai yang diinginkan. Zat aktif dalam simplisia tidak sama karakteristiknya ada yang tahan terhadap pemanasan dan ada pula yang tidak tahan pemanasan sehingga metode ekstraksi dapat digolongkan ke dalam dua golongan yaitu:

- a. Metode ekstraksi secara dingin yaitu metode ekstraksi yang dalam prosesbkerjanya tidak memerlukan pemanasan. Metode ini diperuntukan untuk simplisia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut, tidak tahan

terhadap pemanasan dan simplisia yang mempunyai tekstur yang lunak dan tipis. Cara ekstraksi ini misalnya maserasi, perkolasi, dan sokhletasi (ada yang menggolongkan metode ekstraksi panas).

- b. Metode ekstraksi secara panas adalah metode ekstraksi yang didalam prosesnya dibantu dengan pemanasan. Dengan pemanasan dapat mempercepat terjadinya proses ekstraksi karena cairan penyari akan lebih mudah menembus rongga-rongga sel simplisia dan melarutkan zat aktif yang ada dalam sel simplisia tersebut. Metode ini diperuntukkan untuk za aktif yang tahan terhadap pemanasan dan simplisia mempunyai tekstur keras. Cara estraksi ini misalnya refluks, destilasi uap air dan infundasi. (Anonim.1979)

Salah satu proses ekstraksi yang biasa dilakukan adalah sokhletasi. Prinsip soxhletasi adalah uap cairan penyari naik ke atas melalui pipa samping, kemudian diembunkan kembali oleh pendingin tegak. Cairan turun ke labu melalui tabung yang berisi serbuk simplisia. Cairan penyari sambil turun melarutkan zat aktif serbuk simplisia. Karena adanya sifon maka setelah cairan mencapai permukaan sifon, seluruh cairan akan embali ke labu. Cara ini lebih menguntungkan karena uap panas tidak melalui serbuk simplisia, tetapi melalui pipa samping. (Anonim.1979)

H. Spektroskopi Ultra Violet

Penyerapan sinar ultra violet - visible oleh suatu molekul akan menghasilkan transisi di antara tingkat energi elektronik molekul tersebut, oleh karena itu

sering dinamakan spektrofotometri elektronik. Transisi tersebut pada umumnya antara anti ikatan atau orbital bukan ikatan. Panjang gelombang serapan merupakan ukuran perbedaan tingkat tinggi dari orbital yang bersangkutan. Supaya elektron dalam ikatan sigma tereksitasi maka diperlukan energi paling tinggi dan akan memberikan serapan pada panjang gelombang 120 – 200 nm. Daerah ini dikenal sebagai daerah ultra violet hampa. Identifikasi spektrofotometri ultraviolet suatu senyawa dengan cara melewatkan cahaya monokromatis pada panjang gelombang tertentu melalui larutan encer senyawa tersebut dalam pelarut yang tidak menyerap misalnya air, etanol dan heksana.

Analisa kualitatif dengan metode spektrofotometri hanya dipakai untuk data sekunder atau data pendukung. Pada analisa kualitatif dengan metode spektrofotometri UV-Vis yang dapat ditentukan ada dua yaitu :

- a. Pemeriksaan kemurnian suatu senyawa pada spektrum UV-Vis.
- b. Penentuan panjang gelombang maksimum (λ_{maks}).

Pada penentuan panjang gelombang maksimum didasarkan atas perhitungan pergeseran panjang gelombang maksimum karena adanya penambahan gugus pada sistem kromofor induk

Data spektrofotometer UV-VIS berupa panjang gelombang maksimum suatu senyawa yang memiliki gugus kromofor, misalnya senyawa alkena, enon, ester, karboksilat, aldehid, dan aromatis. Panjang gelombang maksimum suatu senyawa perlu diketahui karena berkaitan dengan ada atau tidaknya gugus

kromofor. Senyawa yang tidak memiliki gugus kromofor akan memiliki panjang gelombang maksimum dibawah 220 nm, sedang senyawa yang memiliki gugus kromofor pun dapat diketahui jumlah ikatan rangkap berkonjugasinya berdasarkan besarnya panjang gelombang maksimum diduga ikatan rangkap yang terkonjugasi lebih dari dua.

Kaidah Woodward dan Fieser membahas secara terperinci tentang pergeseran panjang gelombang maksimal (λ_{maks}) yang disebabkan substitusi berbagai gugus kedalam diena terkonjugasi, aromatik karbonil, keton tak jenuh dan poliena. (Mulja.2005).

Kerja alat ini adalah sebagai berikut suatu radiasi dikenakan secara bergantian atau simultan melalui sampel dan blanko yang dapat berupa pelarut atau udara. sinar yang di transmisikan oleh sampel dan blanko kemudian diteruskan ke detektor, sehingga perbedaan intensitas ini diantara kedua berkas sinar ini dapat memberikan gambaran tentang fraksi radiasi yang diserap oleh sampel. Detektor alat ini mampu untuk mengubah informasi radiasi ini menjadi sinyal listrik yang jika di amplifikasikan akan dapat menggerakkan pena pencatat diatas kertas grafik.

I. Smoking Machine

Sejak tahun 1966, standar pengujian dan pelaporan komponen dalam asap rokok untuk semua produk rokok, merupakan tanggung jawab setiap pabrik rokok dan tembakau. Namun kemudian otoritas dan kebebasan untuk menentukan sendiri standar pengujian, dibatasi. Pada tahun 1967 US Federal Trade

Commission (FTC) membuat sedikit perubahan pada metode Cambridge Filter dan menjadikan metode tersebut menjadi suatu metode standar pengujian rokok untuk semua industri rokok di Amerika Serikat. Metode pengujian yang sama diadopsi oleh International Standards organization (ISO) yang kemudian digunakan oleh negara-negara di luar Amerika Serikat. (ISO.Routine Analytical Cigarette-Smoking Machine-Definition and Standard Condition).

Di Indonesia kadar Tar dan Nikotin dalam rokok ditetapkan dengan alat pemeriksaan yang sesuai dengan standar ISO (Smoking Machine). Prinsip kerja alat ini yaitu rokok dinyalakan dan dihisap melalui pengisapan dengan menggunakan pompa, asap yang dihisap melalui ujung filter, keluar melalui *smoking port* (celah atau lubang dari mekanisme pengisapan yang dilekatkan pada *smoke trap*) dan *smoking trap* (alat untuk mengumpulkan asap rokok dari sampel rokok yang dihisap sesuai dengan yang dibutuhkan selama penetapan komponen dalam rokok) kemudian ditampung pada *Cambridge pad* dan dinyatakan sebagai Total Particulate Matter (TPM). (Hammond D.Human smoking behaviour, cigarette testing protocols and constituent yields)

J. Kromatografi Gas

Kromatografi gas adalah metode pemisahan dengan menggunakan gas sebagai fase gerak (fase mobil) dan padatan atau cairan sebagai fase diam (fase stasioner). Fase diam dapat berupa zat penyerap aktif misalnya alumina, silikagel atau karbon (kromatografi gas-padat) atau dapat berupa cairan yang dilapiskan sebagai lapisan tipis pada zat penyangga netral yang halus, misalnya kieselguhr

atau bahan lain yang cocok (kromatografi Gas-Cair). Yang banyak digunakan adalah kromatografi Gas-Cair dan biasanya disebut kromatografi gas, maka yang dimaksud adalah kromatografi Gas-Cair. Gas pembawa harus dialirkan ke dalam kolom dan jika ada campuran senyawa maka campuran senyawa ini akan terbawa aliran gas pembawa sepanjang kolom. Kecepatan Bergeraknya tergantung dari absorpsi dan adsorpsi komponen campuran pada permukaan fase diam yang sangat luas. Dengan pemilihan fase diam yang sesuai maka partisi antara fase gerak (gas) dan fase diam untuk tiap komponen akan berbeda sedemikian sehingga pada waktu sampel sampai pada ujung kolom, masing-masing komponen akan terpisah dan keluar lalu masuk ke detektor. Respon detektor terhadap masing-masing senyawa diamplifikasi dan sinyal yang terjadi akan tercatat pada recorder. (Dirjen POM.kromatografi gas dan Gritter J Roy, Bobbit, M .james , schwarting E Arthur. Pengantar kromatografi)

K. Tinjauan Islam Mengenai Rokok

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berbuat baik bukan hanya terhadap sesama, tetapi terhadap semua makhluk ciptaan-nya. Bersikap baik dengan cara memeliharanya agar dapat berkembang biak dan tumbuh dengan baik yang nantinya memberikan manfaat bagi kita semua bukan malah sebaliknya.

Rokok terbukti mengandung berbagai jenis bahan kimia berbahaya, diantaranya ialah nikotin. Menurut Pakar atau Ahli Kimia, telah jelas di buktikan bahwa nikotin yang terdapat dalam setiap batang rokok atau pada daun tembakau ternyata adalah sejenis bahan kimia memabukkan yang di istilahkan sebagai

candu. Pengharaman ini adalah jelas dengan berpanduan dari syara sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ


Artinya:

Dari Ubaidullah telah mengabarkan kepada kami Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata -dan saya tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam-, beliau bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamer dan setiap khamer adalah haram."(4)

Dalam perkara ini ada yang berkata bahwa rokok itu tidak sama dengan arak. Mereka beralasan bahwa rokok atau tembakau itu adalah dari jenis lain dan arak itu dari jenis lain pula yang tidak sama atau serupa dengan rokok. Memang rokok dan arak tidak sama pada ejaan dan rupanya, tetapi hukum dari kesan bahan yang memabukkan yang terkandung di dalam kedua benda ini tidak berbeda dari segi syara karena kedua benda ini tetap mengandung bahan yang memabukkan dan memberi kesan yang memabukkan kepada pengguna atau pecandunya. Bukan karena sedikit atau banyaknya kandungan yang terdapat atau yang digunakan, yang menjadi perbincangan hukum ialah bendanya yang dapat memabukkan, baik jenis cair, serbuk, atau gas apabila nyata memabukkan baik

itu jumlahnya banyak atau sedikit maka hukumnya tetap sama, yaitu haram sebagaimana keterangan dari hadis sahih di atas.

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 219:



Terjemahnya:


"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir.

Bapak Quraisy Shihab dalam bukunya tafsir Al-misbah menjelaskan bahwa Yang disebut *khamr* adalah segala sesuatu yang memabukkan, apapun bahan mentahnya. Minuman yang berpotensi memabukkan bila diminum dengan kadar normal oleh seorang normal, maka minuman itu adalah khamar sehingga haram hukum meminumnya, baik diminum banyak maupun sedikit serta baik ketika ia diminum memabukkan secara faktual atau tidak. Dari sini dapat dipahami bahwa rokok meskipun terkadang tidak menyebabkan mabuk

sebagaimana halnya khamar namun pada rokok terdapat zat yang dapat merusak kesehatan dan menimbulkan kecanduan bagi konsumennya.

Berdasarkan hasil ijtihad ulama, dadah (bahan yang memabukkan) telah disamakan hukumnya dengan arak oleh Nabi Muhammad Saw disebabkan kedua benda ini dapat memberi kesan mabuk dan ketagihan yang serupa kepada penggunaannya (pecandu arak dan dadah). Bahkan dadah ini akan menjadi lebih buruk lagi setelah mengganggu kesehatan seorang penggunaannya sehingga penderitaan akibat penyakit yang bermula dari rokok tersebut mengakibatkan kematian. Rokok pastinya menambah racun (toksin) yang terkumpul di dalam tubuh badan sehingga menyebabkan sel-sel dalam tubuh seseorang itu mengalami kerusakan, mengganggu tubuh sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik, membuka serangan kuman, dan gangguan darah.

Dalam ayat lain dijelaskan dalam surah Al-Maaidah ayat 90:



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

menghalangi dirinya dari merokok. Bahkan, alangkah berat dirinya berinteraksi dengan orang-orang saleh karena tidak mungkin mereka membiarkan asap rokok mengepul di hadapan mereka. Semua i'tibar itu menunjukkan bahwa merokok hukumnya diharamkan.



Terjemahnya;

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Hasil penelitian secara medis, merokok sangat merugikan kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Menghisap rokok secara teratur atau rutin, sama saja menumpuk-numpuk nikotin dan tar yang merusak kesehatan. Jika dikaitkan dengan surah An-Nisa ayat 29 diatas, maka merokok termasuk bunuh diri pelan-pelan sehingga hukumnya adalah haram. Orang yang kecanduan rokok akan terus membeli dan menghisap rokok walaupun sebenarnya ia tak memerlukan, bahkan dada terasa sesak. Larangan membunuh diri sendiri

mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.



A. Alat dan Bahan

1. Alat-alat yang di gunakan Batang Pengaduk, Buret, Labu Erlenmeyer 50 ml, Gelas Kimia, Gelas Ukur, Karet Penghisap, Penangas Air, Pipet Ukur, Statif Klem, Timbangan Analitik,
2. Bahan yang di gunakan Aquades, Indikator Methyl Red, Nikotin Murni, HCl 0,01, NaOH 20 %, Petroleum Eter, Tembakau Rokok Putih Merek C, Merek D Dan Merek M,

B. Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini sampel yang akan di analisa adalah berupa rokok putih dengan 3 jenis merek berbeda yang beredar di makassar

C. Penentuan Kadar Nikotin

Penentuan kadar nikotin dilakukan dengan menimbang 1 batang rokok tanpa kertas dan filternya, kemudian dimasukkan ke dalam erlenmeyer 50 ml yang tertutup dan ditambahkan 1 ml larutan 20% NaOH dengan menggunakan pipet ukur. Diaduk sampai merata dengan gelas pengaduk. Ditambahkan 20 ml petroleum eter dan ditutup dengan rapat. dikocok sampai merata sambil menekan tutupnya supaya tidak tumpah. Diamkan selama 24 jam hingga bagian atas (eter) menjadi jernih. Dipipet 10 ml cairan eter ini dengan alat penghisap dan dipindahkan ke dalam Erlenmeyer yang telah ditarer. Lalu diuapkan eternya di atas penangas air sampai cairan tinggal lebih kurang 2 ml. Ditambahkan aquades 10 ml dan dua tetes indikator methyl red. Kemudian dititrasi dengan 0,01 N HCl sehingga warna hijau kekuningan berubah menjadi merah muda. Titrasi dihentikan.

Prosedur kerja penetapan kadar nikotin untuk 3 jenis merek rokok masing-masing dilakukan 3 replikasi (triplo).

D. Pembakuan Larutan HCl

Ditimbang seksama 1,5 g natrium karbonat anhidrat P yang sebelumnya telah dikeringkan pada suhu 270°C selama 1 jam, dilarutkan dalam 100 ml air suling, dititrasi dengan asam klorida menggunakan indikator larutan metil merah P. dipanaskan larutan hingga mendidih didinginkan dan dilanjutkan titrasi. dipanaskan lagi hingga mendidih dan titrasi lagi hingga warna merah jambu pucat tidak hilang dengan pendidihan lagi, dihitung normalitas larutan

1 ml HCl 1 N setara dengan 52,99 mg Na_2CO_3



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 3 sampel rokok putih yang beredar di masyarakat khususnya di wilayah Makassar dan setiap sampel rokok dilakukan tiga kali pengulangan percobaan (Triplo).

- 1) Rokok C yang berat sampel pertama 1014,4 mg, berat sampel kedua 990,2 mg dan berat sampel ketiga 1010,6 mg dengan volume titrasi pertama 1.40 ml, kedua 1,30 ml dan volume titrasi ketiga 1,35 ml dimana berat rata perbatang adalah 819.6 mg dengan kandungan nikotin perbatang pertama 1,82 mg, kedua 1,75 mg dan ketiga 1,78 mg.
- 2) Rokok D yang berat sampel pertama 1075,0 mg, berat sampel kedua 1051,3 mg dan berat sampel ketiga 995,6 mg dengan volume titrasi pertama 0.80 ml, kedua 0,75 ml dan volume titrasi ketiga 0,70 ml dimana berat rata perbatang adalah 702,3 mg dengan kandungan nikotin perbatang pertama 0,85 mg, kedua 0,81 mg dan ketiga 0,80 mg
- 3) Rokok M yang berat sampel pertama 993,9 mg, berat sampel kedua 1055,6 mg dan berat sampel ketiga 1009,0 mg dengan volume titrasi pertama 0,85 ml, kedua 0,90 ml dan volume titrasi ketiga 0,85 ml dimana berat rata

perbatang adalah 742,8 mg dengan kandungan nikotin perbatang pertama 1,03 mg, kedua 1,08 mg dan ketiga 1,02 mg.

B. Pembahasan

Nikotin termasuk salah satu jenis obat perangsang yang dapat merusak jantung dan sirkulasi darah, serta nikotin membuat pemakainya kecanduan. Rumus molekul $C_{10}H_{14}N_2$ dengan berat molekul 162,23. Berasal dari daun tembakau (*Nicotiana Tabacum* Dan *Nicotiana Rustica*). Daun tembakau kering mengandung 2-8 % nikotin, yang terikat dengan asam sitrat dan asam malat.

Nikotinlah yang menyebabkan ketergantungan yang menstimulasi otak untuk terus menambah jumlah nikotin yang dibutuhkan, semakin lama, nikotin dapat melumpuhkan otak dan rasa, serta meningkatkan adrenalin, yang menyebabkan jantung di beri peringatan atas reaksi hormonal yang membuatnya berdebar lebih cepat dan bekerja lebih keras. Artinya, jantung membutuhkan lebih banyak oksigen agar dapat terus memompa. Nikotin juga menyebabkan pembekuan darah lebih cepat dan meningkatkan resiko serangan jantung. Nikotin membuat ketagihan. Itulah sebabnya para perokok ingin terus menghisap tembakau secara rutin karena mereka ketagihan nikotin. Ketagihan tersebut ditandai dengan keinginan yang menggebu untuk selalu mencari dan menggunakan, meskipun mengetahui akan konsekuensi negatif terhadap kesehatan.

Dari sifat ketergantungan alami yang muncul ditemukan bahwa nikotin mengaktifkan jaringan otak yang menimbulkan perasaan senang, tenang, dan rileks.

bahan kimia otak termasuk dalam perantara keinginan untuk terus mengkonsumsi, yakni neurotransmitter dopamine, dalam penelitian menunjukkan bahwa nikotin meningkatkan kadar dopamine tersebut. Efek akut dari nikotin dalam beberapa menit menyebabkan perokok melanjutkan dosis secara frekuentif per harinya sebagai usaha mempertahankan efek kesenangan yang timbul dan mempertahankan diri dari efek ketergantungan.

Nikotin dapat berlaku sebagai sebuah stimulan dan obat penenang atau penghilang rasa sakit. Secara langsung setelah kontak dengan nikotin maka timbul rangsangan terhadap kelenjar adrenal yang menyebabkan terlepasnya hormon adrenalin. Hormon adrenalin ini merangsang tubuh dan menyebabkan pelepasan glukosa secara mendadak yang akhirnya kadar gula dalam darah menurun, dan tekanan darah juga meningkat. Begitu pula pada pernapasan dan detak jantung.

Pada penelitian ini dilakukan penetapan kadar nikotin dalam rokok kretek yang beredar di Makassar kemudian dibandingkan dengan batas keamanan kadar nikotin yang telah ditetapkan pemerintah yaitu tidak boleh melebihi kadar kandungan nikotin 1,5 mg /batang.


Pemilihan metode secara asidimetri dalam penelitian ini berdasarkan alat instrument dan reagensia yang mudah didapatkan.

Penambahan 20% NaOH pada penelitian sebagai pembasah pada tembakau rokok. Pembasahan sebelum dilakukan penyarian dimaksudkan memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada cairan penyari memasuki seluruh pori-pori pada tembakau rokok sehingga mempermudah penyarian selanjutnya.(Anonim 1986)

Petroleum ether sebagai larutan penyari untuk mengekstraksi nikotin yang terdapat dalam tembakau rokok. Didiamkan selama 24 jam untuk memberi waktu pada cairan penyari untuk mengekstraksi nikotin dalam tembakau rokok.

Asidimetri adalah salah satu metode penetapan kadar dengan larutan standart asam sebagai titrannya. Prinsip penetapannya adalah reaksi penetralan asam basa, nikotin yang merupakan basa lemah bereaksi dengan HCl akan mengikat satu atom H^+ dan melepaskan ion Cl^- . Reaksi ini terjadi pada kisaran pH 6,0-6,2 sehingga dipakai indikator metal merah, titik akhir titrasi diketahui dengan terbentuknya warna merah konstan.

Reaksi yang terjadi:



$$\% \text{ nikotin} = \frac{V.HCl \times 1,6223}{\text{berat sampel (mg)}} \times 100\%$$

$$1 \text{ ml HCl } 0,01 \text{ N} \infty 1,6223 \text{ mg nikotin}$$

$$\text{Kandungan nikotin /batang} = \% \text{ nikotin} \times \text{berat rata-rata per batang (mg)}$$

(Sudarmadji, 2007)

Hasil analisis kandungan nikotin per batang yang diperoleh dari rokok merek C yaitu 1,82 mg, 1,75 mg dan 1,78 mg (pada label 1,7 mg). Hasil analisis kandungan nikotin per batang yang diperoleh dari rokok merek D yaitu 0,85 mg, 0,81 mg dan 0,80 mg (pada label 0,8 mg). Hasil analisis kandungan nikotin per batang yang diperoleh dari rokok merek M yaitu 1,03 mg, 1,08 mg dan 1,02 mg (pada label 1,0 mg).

Dari hasil yang diperoleh hanya rokok merek D dan M yang memenuhi syarat batas keamanan yang ditetapkan pemerintah yaitu kandungan nikotin dalam sebatang rokok tidak melebihi 1,5 mg.

Dalam agama Islam mengatakan merokok itu adalah haram, Dalam penelitian secara medis, merokok sangat merugikan kesehatan bahkan bisa menyebabkan kematian. Menghisap rokok secara teratur atau rutin sama saja menumpuk-numpuk nikotin dan tar yang merusak kesehatan.

Dalam kondisi tertentu unsur yang terdapat dalam rokok berguna bagi kehidupan manusia, misalnya digunakan sebagai insektisida dalam membunuh hama pada pertanian atau perkebunan, dalam kondisi ini, unsur nikotin rokok tidaklah haram, melainkan dianjurkan untuk hasil yang maksimal bagi pertanian dan perkebunan. Dengan demikian sesuatu yang dianjurkan dalam syariat semakna dengan sunnat dalam pelaksanaannya.

Unsur nikotin dalam rokok dapat pula dikategorikan makruh, bila mana dalam penggunaannya belum nampak membahayakan bagi yang mengkonsumsinya. Olehnya itu lebih baik ia meninggalkannya dalam artian tidak mengkonsumsi nikotin

atau rokok. Dalam kondisi ini penggunaan nikotin dapat dikategorikan makruh, artinya lebih baik meninggalkannya atau tidak memakainya.

Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat Gusrizal Gazahar mengatakan ulama sepakat merokok tidak bisa di hukum mubah atau boleh, ada yang makruh dan ada yang haram. Merokok di anggap haram bila merokok di tempat umum, merokok bagi anak-anak, merokok bagi wanita hamil dan merokok juga di haramkan bagi pengurus Majelis Ulama Indonesia. Pengurus MUI mengatakan aturan bagi ulamanya itu di maksudkan agar bisa menjadi teladan bagi umat untuk berangsur-angsur meninggalkan rokok.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Kadar nikotin rata-rata dalam sebatang rokok C yaitu 1,78 mg, rokok merek D yaitu 0,82 mg, rokok merek M yaitu 1,04 mg, sesuai label masing-masing merek.
2. Rokok merek C tidak memenuhi syarat batas keamanan, sedangkan rokok merek D dan M memenuhi syarat batas keamanan yang ditetapkan pemerintah yaitu kandungan nikotin dalam sebatang rokok tidak melebihi 1,5 mg

B. Saran

Disarankan untuk melakukan penentuan kadar nikotin dengan cara menseragamkan berat tembakau untuk setiap batang, sesuai keseragaman bobot berdasarkan FI edisi III.

DAFTAR PUSTAKA


- Al-Qur'an terjemahan*. Departemen Agama RI. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002.
- Anonim. *Farmakope Indonesia III*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1979.
- Badan Standarisasi Nasional. 2003. *Kajian Penerapan SNI Rokok dan PP No.81 tahun 1999*. Jakarta. <http://www.Bsn/org.co.id>.
- Baehaki. 1993. *Insektisida Pengendalian Hama Tanaman*. Bandung : Angkasa.
- Cahyono, Bambang. 1998. *TEBKAU, Budi daya dan Analisis Tani*. Yogyakarta : Kanisius.
- Gilman, A. G. (Eds). 1991. *The Pharmacological Basis of Therapeutics*, Vol. I, Pergaman Press, Singapore.
- Hadist Riwayat Imam Muslim No.3735.2002,
- Harris, E., Jeffrey. 2004. *Cigarette Smoke Components and Disease: Cigarette Smoke is More Than a Trier of Tar, Nicotine, and Carbon Monoxide*. <http://www.cancercontrol.gov/tcrb/monographs/7/m7/s.pdf>.
- Herman, J.G., Limbird, L. E., Gilman, Alfred Goodman (editor). 2001. *Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics*. Tenth Editor. McGraw. Hill Medical Publishing Division, New York.
- Istiqomah, Umi. *Upaya Menuju Generasi Tanpa Rokok*. Yogyakarta: Penerbit Setaji, 2008.
- ISO 3308. 2000. Routine analytical cigarette-smoking machine-definition and standard condition. Fourth edition. Switzerland
- Jaya, Muhammad. *Pembunuh Berbahaya itu Bernama Rokok*. Yogyakarta: Riz'ma, 2009.

- Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI. 2004. *Pedoman Cara Uji Kandungan Kadar Nikotin dan Kadar Tar Rokok*, No.62/MPP/Kep/2/2004. Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Jakarta.
- Mulja, M. 2005. *Aplikasi Analisis Spektrofotometri Ultraviolet-Visibel*. Surabaya: Penerbit Mechipso grafika.
- Khopkar, S, M. *Konsep Dasar Kimia Analitik*. Terjemahan Saptorahardjo. Penerbit Universitas Indonesia, 1990
- Gubernur Provinsi DKI Jakarta. 2005. *Kawasan Larangan Merokok*. Pergub Prov DKI Jakarta No. 75 Tahun 2005.
- Murdiyati A.S., Sembiring, H. 2004. Balai Penelitian Tembakau dan Tanaman Serat. <http://warintek.Progessio.Or.id/perkebunan/tembakau>.
- Peraturan Pemerintah N0.81 tahun 1999. *Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*. Jakarta.
- Dinas Pelayanan Kesehatan Walikota Madya Jakarta Utara. 2005. *Masalah Rokok di Indonesia*. <http://www.sudin.yankes/html>.
- Tobing, Rangke. 1989. *Kimia Bahan Alam*. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga kependidikan.
- Yuni Susilowati, Eka. 2006, "Identifikasi Nikotin dari Daun Tembakau (*Nicotina tabacum*) kering dan Uji Efektivitas Ekstrak Daun Tembakau sebagai Insektisida Penggerek Batang Padi (*Scirpophaga innonata*)".
- Lokakarya Achmad, D. dan Mukani. 2001. *Keragaan Industri Sigaret Kretek*. Prosiding Pengembangan Agribisnis Tembakau. Malang 6 Nov 2001
- Daroji, M. 2009. *Peran Petugas Puskesmas Dalam Promosi Kesehatan Berhenti Merokok Pada Pasien dan Masyarakat di Kabupaten Sleman*. Tesis MPPK tidak diterbitkan. Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi, IPB. <http://kawbing.ui.ac.id/bebas/vi2/artikel/pangan/IPB/permenkeras.pdf>. akses 3 Juni 2010.

- Menperindag RI. 2004. *Pedoman Cara Uji Kandungan Nikotin dan Tar Rokok*. SK No 62 /MPP/Kep/2/2004.
- Mensekneg RI. 1999. *Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*. PP No. 81 Tahun 1999, lembaran Negara RI, Tahun 1999 No 186.
- Tambahan Lembaran Negara No 3906. PP No 38 Tahun 2000, Tentang Perubahan Atas PP No 81 Tahun 1999 meliputi Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Ketentuan Pasal 39. Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 87.
- Pramudisain. *Sejarah Rokok* <http://pramudisain.blogspot.com/2010/01/sejarah-Rokok.html>. diakses 14 Pebruari 2010.
- Susanna, D. Hartono, B. Fauzan, H. 2003. *Penentuan Kadar Nikotin Dalam Asap Rokok*. Makara Kesehatan Vol. 7 No.2 . 2003.
- Syarbaini. 2007. *Rokok Mengandung Unsur Radioaktif*. Buletin Alara, Vol.9. No. 1 & 2, 47 – 52.
- Elizabet aula, Lisa. 2010. *Stop merokok (sekarang atau tidak sama sekali)*. Cetakan pertama

Lampiran 1

SKEMA KERJA




Lampiran 2**Gambar 1. Tembakau Rokok**

Lapisan ether

Gambar 2. Lapisan bagian atas (ether) yang jernih



Gambar 3. Larutan ether saat dititrasi



Gambar 4. Larutan ether setelah dititrasi

Lampiran 3

Tabel.1 Hasil analisis kadar nikotin yang terdapat dalam rokok putih

Merek Rokok		Berat Sampel (mg)	Volume Titration (ml)	% Nikotin	Kandungan Nikotin /batang (mg)	Rata-rata /batang (mg)	Kandungan Nikotin Label mg/batang
C	1	1014,4	1,40	0,2239	1,82	1,78	1,7 mg
	2	990,2	1,30	0,2130	1,75		
	3	1010,6	1,35	0,2167	1,78		
D	1	1075,0	0,80	0,1207	0,85	0,82	0,8 mg
	2	1051,3	0,75	0,1157	0,81		
	3	995,6	0,70	0,1141	0,80		
M	1	993,9	0,85	0,1387	1,03	1,04	1,0 mg
	2	1055,6	0,90	0,1460	1,08		
	3	1009,0	0,85	0,1367	1,02		

Lampiran 4

Perhitungan kandungan kadar nikotin

$$\% \text{ nikotin} = \frac{V.HCl \times 1,6223}{\text{berat sampel (mg)}} \times 100\%$$

$$1 \text{ ml HCl } 0,01 \text{ N} \infty 1,6223 \text{ mg nikotin}$$

$$\text{Kandungan nikotin} = \% \text{ nikotin} \times \text{berat rata-rata per batang (mg)}$$

a. Rokok putih merek C:

$$\text{Berat rata-rata rokok /batang} = 819,6 \text{ mg}$$

$$1. \quad \% \text{ nikotin} = \frac{1,40 \times 1,6223}{1014,4} \times 100\% = 0,2239\%$$

$$\text{Kandungan nikotin /batang} = \frac{0,2239 \times 819,6}{100} \text{ mg} = 1,8351 \text{ mg /btg}$$

$$2. \quad \% \text{ nikotin} = \frac{1,30 \times 1,6223}{990,2} \times 100\% = 0,2150\%$$

$$\text{Kandungan nikotin /batang} = \frac{0,2130 \times 819,6}{100} \text{ mg} = 1,7457 \text{ mg /btg}$$

$$3. \quad \% \text{ nikotin} = \frac{1,35 \times 1,6223}{1010,6} \times 100\% = 0,2167\%$$

$$\text{Kandungan nikotin /batang} = \frac{0,2167 \times 819,6}{100} \text{ mg} = 1,7761 \text{ mg /btg}$$

b. Rokok putih merek D

$$\text{Berat rata-rata rokok} = 1135,5 \text{ mg}$$

$$1. \quad \% \text{ nikotin} = \frac{0,80 \times 1,6223}{1075,0} \times 100\% = 0,1207\%$$

$$\text{Kandungan nikotin /batang} = \frac{0,1207 \times 702,3}{100} \text{ mg} = 0,8477 \text{ mg /btg}$$

$$2. \quad \% \text{ nikotin} = \frac{0,75 \times 1,6223}{1051,3} \times 100\% = 0,1157\%$$

$$\text{Kandungan nikotin /batang} = \frac{0,1532 \times 702,3}{100} \text{ mg} = 0,8126 \text{ mg /btg}$$

$$3. \quad \% \text{ nikotin} = \frac{0,70 \times 1,6223}{995,6} \times 100\% = 0,1141\%$$

$$\text{Kandungan nikotin /batang} = \frac{0,1141 \times 702,3}{100} \text{ mg} = 0,8013 \text{ mg /btg}$$

c. Rokok putih M

Berat rata-rata rokok=742,8 mg

$$1. \quad \% \text{ nikotin} = \frac{0,85 \times 1,6223}{993,9} \times 100\% = 0,1387\%$$

$$\text{Kandungan nikotin /batang} = \frac{0,1387 \times 742,8}{100} \text{ mg} = 1,030 \text{ mg /btg}$$

$$2. \quad \% \text{ nikotin} = \frac{0,90 \times 1,6223}{1055,6} \times 100\% = 0,1383\%$$

$$\text{Kandungan nikotin /batang} = \frac{0,138302 \times 742,8}{100} \text{ mg} = 1,0273 \text{ mg /btg}$$

$$3. \quad \% \text{ nikotin} = \frac{0,85 \times 1,6223}{1009,0} \times 100\% = 0,1367\%$$

$$\text{Kandungan nikotin /batang} = \frac{0,1367 \times 742,8}{100} \text{ mg} = 1,0154 \text{ mg /btg}$$

Lampiran 5

Perhitungan % Penyimpangan

$$\% \text{ penyimpangan rokok C} = \frac{1,78-1,7}{1,7} \times 100 \%$$

$$= 4,7 \%$$

$$\% \text{ penyimpangan rokok D} = \frac{0,82-0,8}{0,8} \times 100 \%$$

$$= 2,5 \%$$

$$\% \text{ penyimpangan rokok M} = \frac{1,04-1,0}{1,0} \times 100 \%$$

$$= 4 \%$$



Riwayat Hidup

Sri wahyuni anak bungsu dari 3 bersaudara lahir di Bantaeng pada tanggal 29 Nopember 1989, anak dari pasangan Ayahanda H. Tumpu dan ibunda Santi. Penulis memasuki jenjang pendidikan pada tahun 1996 di SDN 47 Ganrang Batu. Setelah itu, melanjutkan pendidikan di sekolah lanjutan tingkat pertama MTSN Kelara pada tahun 2004. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di sekolah menengah atas SMA Negeri 2 Binamu Jenepono, memasuki program IPA dan keluar sebagai alumni 2007. Pada tahun yang sama penulis diterima sebagai Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Kesehatan Jurusan Farmasi.