

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN
TUBERKULOSIS PARU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
MACCINI SAWAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2012**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR
Oleh

JUMRIANA S.
NIM. 70200108043

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2012**

ABSTRAK

Nama	: Jumriana S.
NIM	: 70200108043
Program Studi	: Kesehatan Masyarakat
Judul	: Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Tuberkulosis Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Tahun 2012.
Pembimbing	: 1. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes. 2. Nurdyianah S, SKM., MPH.

Saat ini diperkirakan terdapat 9 juta orang menderita TB setiap tahunnya dan 3 juta diantaranya terdapat di Negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Faktor resiko yang dapat menimbulkan penyakit Tuberkulosis adalah faktor genetik, malnutrisi, vaksinasi, kemiskinan dan kepadatan penduduk. Tuberkulosis terutama banyak terjadi di populasi yang mengalami stress, nutrisi jelek, penuh sesak, ventilasi rumah yang tidak memenuhi standar, perawatan kesehatan yang tidak cukup. Genetik berperan kecil, tetapi faktor lingkungan rumah berperan besar pada insidensi kejadian TB. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian TB Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan analitik observasional dengan rancangan *Cross Sectional Study*. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari pasien yang tercatat pada rekam medik yang pernah berkunjung di ruangan Pemberantasan Penyakit TB sebanyak 66 orang yang diambil secara acak sederhana (*Simple Random Sampling*). Metode analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat.

Kesimpulan hasil penelitian :1)Keadaan ventilasi mempunyai hubungan bermakna dengan kejadian TB Paru. Hasil analisis statistik diperoleh nilai $P=0,002$ lebih kecil dari alfa $=0,05$. 2)Pencahayaan rumah mempunyai hubungan bermakna dengan kejadian TB Paru. Hasil analisis diperoleh nilai $P= 0,024$ lebih kecil dari alfa $0,05$. 3)Faktor kepadatan hunian mempunyai hubungan bermakna dengan kejadian TB Paru. Hasil analisis statistik diperoleh nilai $P= 0,021$ lebih kecil dari alfa $=0,05$. 4) Faktor kontak serumah mempunyai hubungan bermakna dengan kejadian TB Paru. Hasil analisis statistik diperoleh nilai $P= 0,023$ lebih kecil dari alfa $0,05$. 5)Faktor kebiasaan merokok tidak mempunyai hubungan bermakna dengan kejadian TB Paru. Hasil analisis statistik diperoleh nilai $P=0,161$ lebih besar dari alfa= $0,05$.

Dengan penelitian ini diharapkan peran serta dan kerja sama dari berbagai pihak dalam upaya peningkatan derajat kesehatan melalui penyuluhan kesehatan kepada serta perbaikan sanitasi dan kondisi lingkungan rumah untuk menghindari penularan penyakit Tuberkulosis Paru

Kata Kunci : Kejadian TB Paru, Ventilasi, Pencahayaan, kepadatan hunian, kontak serumah, kebiasaan merokok.

Daftar Pustaka : 30 (1989-2011)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyakit Tuberkulosis (TB) adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, *Mycobacterium bovis* atau *Mycobacterium africanus*. Namun hampir semua penyakit Tuberkulosis pada manusia disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*. Sebagian besar kuman Tuberkulosis menyerang paru, tetapi dapat pula menyerang organ lainnya. Penyebaran kuman TB melalui udara (batuk, tertawa dan bersin) dengan melepaskan droplet, sinar matahari dapat mematikan kuman tersebut, akan tetapi kuman tersebut dapat hidup beberapa jam dalam suhu kamar. Penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet, orang dapat terinfeksi kalau droplet tersebut terhirup ke dalam saluran pernafasan. Daya penularan dari seseorang penderita ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dari parunya. Semakin tinggi derajat positif hasil pemeriksaan dahak, makin menular penderita tersebut, bila hasil pemeriksaan dahak negatif (tidak terlihat kuman), maka penderita tersebut dianggap tidak menular (Subdirektorat TB Depkes RI, 2008:1).

Saat ini diperkirakan terdapat 9 juta orang menderita TB setiap tahunnya dan 3 juta diantaranya terdapat di Negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Negara berkembang lainnya. Setiap tahunnya, sekitar 2 juta orang meninggal karena menderita penyakit TB di seluruh dunia. Oleh

karena itu jika tidak dilakukan antisipasi pencegahan dan pengobatan yang adekuat, maka antara tahun 2002 sampai dengan 2020, diperkirakan 1 miliar orang akan terinfeksi dengan *Mycobacterium tuberculosis*. Sekitar 150 juta orang akan menderita sakit dan diperkirakan pula sekitar 36 juta orang akan meninggal. Disamping itu dengan menurunnya kualitas pelayanan kesehatan serta meningkatnya penyebaran penyakit HIV/AIDS akan semakin meningkatkan jumlah penderita TB dan munculnya *strain mycobacterium* yang resisten terhadap beberapa obat TB standar (Multi Drug Resistant TB/MDR-TB), serta semakin meningkatkan kekhawatiran pandemik penyakit TB (Warta Gerdunas TB, 2010:1).

Berdasarkan data dari WHO, di Indonesia setiap tahun terjadi 583 kasus baru dengan kematian 130 penderita dengan tuberkulosis positif pada dahaknya. Sedangkan menurut hasil penelitian kusnindar 1990, Jumlah kematian yang disebabkan karena tuberkulosis diperkirakan 105,952 orang pertahun. Kejadian kasus tuberkulosis paru yang tinggi ini paling banyak terjadi pada kelompok masyarakat dengan sosio ekonomi lemah. Terjadinya peningkatan kasus ini disebabkan dipengaruhi oleh daya tahan tubuh, status gizi dan kebersihan diri individu dan kepadatan hunian lingkungan tempat tinggal (Depkes RI, 2002:2).

Beberapa hasil dan pencapaian program TB Indonesia mengalami kemajuan yang cepat dengan penemuan kasus 69,8% (2007) dan 73,1% (2009). Sedangkan angka keberhasilan pengobatan sebesar 91% pada tahun 2008 (melebihi target global 85% selama 7 tahun terakhir). Target pencapaian

angka penemuan kasus TB *Case detection rate* (CDR) adalah 70%, dan tahun 2009 sudah mencapai 73,1%. Untuk target pencapaian angka keberhasilan pengobatan adalah 85%, tahun 2009 sudah 86,4%. Insiden TB sejak tahun 1998 sampai tahun 2005 trennya menurun dan rata-rata penurunan insiden TB positif tahun 2005-2007 adalah 2,4% (Global TB Control WHO Report 2008 dan 2009).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Subdin Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan melalui Profil Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Tahun 2009 tercatat penderita BTA positif jumlahnya menurun yaitu 4.856, dan Kabupaten/Kota yang tertinggi masih di Kota Makassar yakni sebanyak 1.302, terendah di Kabupaten Pangkep 55, klinik sebanyak 55, diobati sebanyak 245 dan sembuh sebanyak 191 pasien.

Data dari Dinas Kesehatan kota Makassar tahun 2009 menyebutkan, pada triwulan I Januari-Maret 2009, 627 orang, triwulan kedua april-Juni , 596 orang, dan triwulan ketiga Juli-September 420 orang. Jadi jumlah keseluruhan 1.643 orang. Penderita TB didominasi usia produktif antara 15-54 tahun. Umumnya warga yang hidup di lingkungan kumuh dan tidak memiliki perilaku sehat mudah teridap penyakit TB. Penderita penyakit yang banyak menyerang paru-paru ini paling tinggi di Kelurahan Pannambungan Kecamatan Mariso dan Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar. Berdasarkan laporan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Maccini Sawah, Kelurahan Maccini Kecamatan Makassar, temuan penderita TB

mencapai 41 jiwa (Data penderita TB Dinas Kesehatan Kota Makassar, 2009).

Faktor resiko yang dapat menimbulkan penyakit Tuberkulosis adalah faktor genetik, malnutrisi, vaksinasi, kemiskinan dan kepadatan penduduk. Tuberkulosis terutama banyak terjadi di populasi yang mengalami stress, nutrisi jelek, penuh sesak, ventilasi rumah yang tidak memenuhi standar, perawatan kesehatan yang tidak cukup. Genetik berperan kecil, tetapi faktor lingkungan rumah berperan besar pada insidensi kejadian Tuberkulosis. Lingkungan merupakan hal yang tidak terpisahkan dari aktivitas kehidupan manusia. Lingkungan, baik secara fisik maupun biologis, sangat berperan dalam proses terjadinya gangguan kesehatan masyarakat, termasuk gangguan kesehatan berupa penyakit Tuberkulosis (Hopwell 1988 dalam Rahman 2005:22).

Lingkungan sendiri mempunyai 2 unsur utama yaitu fisik dan sosial. Lingkungan fisik adalah semua hal yang berhubungan langsung dengan kesehatan dan perilaku seseorang. Sedangkan lingkungan sosial yaitu adanya masalah kesenjangan sosial yang nantinya akan menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan inilah yang nantinya berdampak terhadap status kesehatan masyarakat dimana akan timbul penyakit berbasis lingkungan. Masalah kesehatan berbasis lingkungan disebabkan oleh berbagai hal antara lain yaitu kondisi lingkungan yang tidak memadai, baik kualitas maupun kuantitasnya serta perilaku hidup sehat masyarakat masih rendah. Kondisi tersebut akan menimbulkan berbagai penyakit mengakibatkan : TB paru dan lain-lain,

kelompok komponen lingkungan rumah yang perlu mendapat perhatian adalah jendela kamar tidur, jendela ruang keluarga, ventilasi dan pencahayaan (BPKPM, 2009). Sehingga dengan perbaikan komponen lingkungan rumah akan menjadi solusi bagi persoalan yang dihadapi masyarakat karena Islam tidak membiarkan manusia terbelenggu dalam persoalan yang tidak dapat dipecahkan (Nafis, 2007).

Hal ini sebagaimana Firman Allah swt pada QS Ali-Imran/3:179

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيرَ الْخَبِيثَ مِنَ الظَّيِّبِ

Terjemahnya :

Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk dari yang baik. (Departemen Agama RI,2008:73)

Islam adalah agama *Rahmatan lil 'alamin* yang berarti Islam adalah agama pembawa kasih sayang, karena itu salah satu tujuan dari ajaran Islam ialah menghilangkan kemudharatan/bahaya yang menimpa manusia baik bahaya yang mengancam fisik maupun psikis.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini sawah Kota Makassar Tahun 2012”, sehingga memberikan kontribusi terhadap pemerintahan daerah dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, memberi dasar kepada peneliti merumuskan pokok masalah yaitu faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah dengan beberapa sub masalah yaitu:

1. Apakah ada hubungan antara ventilasi rumah dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah.
2. Apakah ada hubungan hubungan antara pencahayaan dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah.
3. Apakah ada hubungan antara kepadatan hunian rumah dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah.
4. Apakah ada hubungan antara kontak serumah dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah.
5. Apakah ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahuinya hubungan antara ventilasi rumah dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah.
- b. Diketahuinya hubungan antara pencahayaan dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah.
- c. Diketahuinya hubungan antara kepadatan hunian rumah dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah.
- d. Diketahuinya hubungan antara kontak serumah dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah
- e. Diketahuinya hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dan bahan bacaan civitas akademik UIN Alauddin, khususnya pada mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat pada umumnya Fakultas Ilmu Kesehatan.

2. Manfaat Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan kepada pemerintah dan instansi terkait dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan kebijakan perencanaan kesehatan khususnya mengatasi

permasalahan terjadinya Tuberkulosis Paru pada wilayah kerja Puskesmas
Maccini Sawah

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini menambah pengetahuan dan merupakan pengalaman berharga bagi penulis serta merupakan salah satu syarat meraih gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tuberkulosis (TB) Paru

1. Pengertian Tuberkulosis Paru

Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (*Mycobacterium tuberkulosis*). Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga mengenai organ tubuh lainnya (Depkes RI, 2002).

2. Penyebab Penyakitnya

Soeparman dalam Herdianto P (2011), menyatakan bahwa penyakit tuberkulosis paru merupakan penyakit infeksi yang dapat menyerang jaringan organ atau jaringan tubuh. Penyebab penyakit ini adalah sejenis kuman terbentuk batang (basil) yang dikenal dengan nama *Mycobacterium Tuberculosis*. Kuman ini berbentuk batang mempunyai ukuran $0,5 - 4 \mu \times 0,3 - 0,6 \mu$ dengan batang tipis, lurus agak bengkok bergranula atau tidak, tunggal berpasangan atau berkelompok, tidak berspora, tidak mempunyai selubung, tetapi mempunyai lapisan luar yang tebal, terdiri dari lipoit. Kuman ini mempunyai sifat istimewa terhadap penghilang warna dengan asam dan alkohol, sehingga disebut Basil Tahan Asam (BTA).

3. Gejala-gejala Tuberkulosis

- a. Batuk terus menerus dan berdahak selama tiga minggu atau lebih.
Setiap orang yang datang pada unit pelayanan kesehatan dengan

gejala utama ini harus dianggap sebagai penderita tuberkulosis atau penderita tersangka TB paru dan segera diperiksa dahak Sewaktu-Pagi-Sewaktu (SPS) di laboratorium.

- b. Mengeluarkan dahak bercampur darah, sesak nafas dan rasa nyeri pada dada.
- c. Badan lemah, nafsu makan menurun, berat badan turun, rasa kurang enak badan (malaise), berkeringat malam walaupun tanpa kegiatan, demam meriang lebih dari sebulan (Depkes RI, 2002).

4. Cara Penularan

Sumber penularan adalah penderita TB BTA positif. Pada waktu batuk atau bersin, penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet (percikan dahak). Droplet yang mengandung kuman dapat bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam. Orang dapat terinfeksi kalau droplet tersebut terhirup ke dalam saluran pernafasan. Setelah kuman TB masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernafasan, kuman TB tersebut dapat menyebar dari paru kebagian tubuh lainnya, melalui sistem peredaran darah, sistem saluran limfe, saluran nafas, atau penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya. Daya penularan seorang penderita ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dari paru-parunya. (Depkes RI, 2002)

5. Perjalanan penyakit

a. Infeksi primer

Infeksi primer terjadi saat seseorang terpapar pertama kali dengan kuman TB. Droplet yang terhirup sangat kecil ukurannya, sehingga dapat melewati sistem pertahanan mukosilier bronkus, dan terus berjalan sehingga sampai di alveolus dan menetap di sana. Infeksi dimulai saat kuman TB berhasil berkembang biak dengan cara pembelahan diri di paru, yang mengakibatkan peradangan di dalam paru. Saluran limfe akan membawa kuman TB ke kelenjar limfe disekitar hilus paru, dan ini disebut sebagai kompleks primer. Waktu antara terjadinya infeksi sampai pembentukan kompleks primer adalah sekitar 4-6 minggu. Adanya infeksi dapat dibuktikan dengan terjadinya perubahan reaksi tuberkulin dari negatif menjadi positif.

Kelanjutan setelah infeksi primer tergantung banyaknya kuman yang masuk dan besarnya respon daya tubuh (imunitas seluler). Pada umumnya reaksi daya tahan tubuh tersebut dapat menghentikan perkembangan kuman TB. Meskipun demikian, ada beberapa kuman akan menetap sebagai kuman persister atau dormant (tidur). Kadang-kadang daya tahan tubuh tidak mampu menghentikan perkembangan kuman, akibatnya dalam beberapa bulan, yang bersangkutan akan menjadi penderita TB. Masa inkubasi yaitu waktu yang diperlukan mulai terinfeksi sampai menjadi sakit, diperkirakan sekitar 6 bulan. (Depkes RI, 2002)

b. Tuberkulosis pasca primer

Tuberkulosis paska primer biasanya terjadi setelah beberapa bulan atau tahun sesudah infeksi primer, misalnya karena daya tahan tubuh menurun akibat terinveksi HIV atau status gizi buruk. Ciri khas dari tuberkulosis paska primer adalah kerusakan paru yang luas dengan terjadinya kavitas atau efusi pleura.

c. Pencegahan

Pemerintah selain melakukan tindakan pemberantasan TB di seluruh wilayah Indonesia juga melakukan beberapa program pencegahan penyakit TB yang dilaksanakan di setiap Puskesmas yang ada diseluruh Indonesia. Adapun upaya yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai penyakit TB.
2. Meningkatkan kualitas lingkungan yang ada seperti lingkungan, perumahan, lingkungan kerja dan lingkungan sosial.
3. Meningkatkan kualitas hygiene perorangan guna mencegah masuknya sumber penyakit TB ke dalam tubuh seseorang.
4. Meningkatkan gizi penduduk.

5. Pengobatan

Upaya untuk menjamin kesembuhan dan mencegah resistensi serta keteraturan pengobatan dan pencegahan drop out atau lalai, perlu dilakukannya pengawasan dan pengendalian pengobatan dan pendekatan DOTS (Directly Observed Treatment Shotcours) atau pengawasan langsung menelan obat jangka pendek oleh

pengawas pada setiap hari. Pengawasan penderita sangat berperan dan menentukan keberhasilan pengobatan, kegiatan ini mencakup :

1. Penyusunan jadwal pengobatan setiap penderita.
2. Pengawasan dan ketekunan keteraturan dalam pengobatan yang sesuai dengan jadwal pengobatan.
3. Pengamatan timbulnya efek samping obat.
4. Pengawasan konfirmasi hasil pengobatan pada awal bulan keempat dan pada akhir pengobatan untuk menentukan status penderita sembuh atau gagal (Depkes RI, 2002).

B. Tinjauan Umum tentang Ventilasi Rumah

Ventilasi adalah usaha untuk memelihara kondisi atmosfir yang menyenangkan dan menyehatkan bagi manusia. Tersedianya udara segar dalam rumah atau ruangan amat dibutuhkan manusia. Fungsi ventilasi adalah untuk menjaga agar aliran udara di dalam rumah tersebut tetap segar. Hal ini berarti keseimbangan O₂ yang diperlukan oleh penghuni rumah tersebut tetap terjaga. Kurangnya ventilasi akan menyebabkan kurangnya O₂ di dalam rumah yang berarti kadar CO₂ yang bersifat racun bagi penghuninya menjadi meningkat. Disamping itu tidak cukupnya ventilasi akan menyebabkan kelembaban udara di dalam ruangan naik karena terjadinya proses penguapan cairan dari kulit dan penyerapan. Kelembaban ini akan merupakan media yang baik untuk bakteri-bakteri patogen, sehingga apabila dalam ruangan terjadi pencemaran bakteri (oleh penderita TBC) akan memudahkan

terjadinya penularan. Fungsi kedua pada ventilasi adalah untuk membebaskan udara ruangan dari bakteri-bakteri, terutama bakteri patogen karena disitu selalu terjadi aliran udara yang terus menerus, sehingga bakteri yang terbawa oleh udara akan selalu mengalir. Fungsi ketiga adalah untuk menjaga agar ruangan rumah selalu tetap di dalam kelembaban yang optimum (Patanding S, 2005:17-18).

Dalam suatu ruangan rumah yang memiliki ventilasi jelek menyebabkan rasa tidak nyaman bagi penghuninya. Hal ini disebabkan oleh 3 faktor yaitu:

1. Berkurangnya O₂ dalam udara
2. Bertambahnya konsentrasi CO₂
3. Adanya bahan racun organik yang ikut terhirup

Ketidaknyamanan ini mulai terasa bila udara tidak jenuh dengan keringat dan temperatur ruangan sudah mendekati atau sama dengan temperatur tubuh (37⁰C). Bila sistem ventilasi berfungsi baik maka udara akan bergerak, sehingga kejemuhan udara segera berkurang dan perasaan nyaman terasa kembali. Ventilasi yang baik dalam ruangan harus memenuhi syarat-syarat ventilasi sebagai berikut :

- a. Temperatur udara ruangan harus lebih rendah paling sedikit 4⁰C dari temperatur udara luar untuk daerah tropis.
- b. Luas ventilasi 10% dari luas lantai ruangan
- c. Udara yang masuk harus udara bersih, tidak dicemari oleh asap dari sampah, pabrik, knalpot kendaraan, debu, dan lain-lain

- d. Aliran udara diusahakan *cross ventilation* dengan menempatkan lubang hawa berhadapan antara dua dinding ruangan.
- e. Aliran udara jangan menyebabkan orang masuk angin, untuk itu jangan menempatkan tempat tidur atau tempat duduk persis pada aliran udara.

Ventilasi merupakan salah satu sarana yang dapat memberikan kenyamanan bagi penghuni rumah dan harus mutlak ada di setiap rumah. Oleh karena itu, sesuai dengan peletakannya ventilasi dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Sistem penghawaan balik

Dalam hal ini udara segar dan udara kotor melewati jalan yang sama, sistem ini baik digunakan di daerah-daerah yang terbuka dan banyak angin.

2. Sistem penghawaan silang

Udara segar yang masuk dalam ruangan langsung berputar secara merata keseluruhan ruangan dan kemudian keluar melalui lubang yang lain. Sistem ini paling baik digunakan untuk lingkungan rumah yang tidak banyak.

3. Sistem penghawaan langsung

Udara segar yang masuk ke dalam ruangan keluar melalui lubang angin yang terletak berhadapan satu sama lainnya. Sistem ini baik digunakan untuk rumah yang padat penghuninya. Sedangkan fungsi ventilasi dalam ruangan yaitu :

- a. Memasukkan udara segar dan mengeluarkan udara kotor dari ruangan
- b. Sebagai jalan masuknya sinar matahari ke dalam rumah
- c. Menciptakan estetika dalam ruangan
- d. Memberikan perasaan nyaman bagi penghuninya
- e. Mengatur suhu dan kelembaban dalam ruangan

Keadaan perumahan adalah salah satu faktor yang menentukan keadaan hygiene dan sanitasi lingkungan. WHO mengemukakan perumahan yang tidak cukup dan terlalu sempit mengakibatkan tingginya kejadian penyakit dalam masyarakat. Menurut Entjang (2000) dalam Rahman S (2005:20), luas kamar tidur adalah kurang lebih $5m^2$ per kapita per luas lantai. Salah satu indikator rumah yang sehat adalah luas bangunan rumah. Luas lantai bangunan rumah sehat harus cukup untuk penghuninya, artinya luas lantai bangunan tersebut harus disesuaikan dengan jumlah penghuni. Luas bangunan yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni akan menyebabkan kepadatan (*overcrowded*). Hal tersebut tidak sehat, sebab disamping menyebabkan kurangnya komsumsi oksigen juga dapat menyebabkan mudahnya penularan penyakit apabila salah satu anggota keluarga terkena penyakit infeksi.

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2003) dalam Rahman S (2005:20), luas bangunan yang optimun adalah apabila dapat menyediakan $2,5 - 3 m^2$ untuk tiap orang atau anggota keluarga. Jadi semakin banyak anggota keluarga maka luas bangunan rumah pun seharusnya semakin luas.

Secara umum, penilaian ventilasi rumah dengan cara membandingkan antara luas ventilasi dan luas lantai rumah, dengan menggunakan *role meter*. Menurut indikator pengawasan rumah, luas ventilasi yang memenuhi syarat kesehatan adalah 10% luas lantai rumah dan luas ventilasi yang tidak memenuhi syarat kesehatan adalah < 10% luas lantai rumah (Kepmenkes RI, 1999).

Rumah dengan luas ventilasi yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan membawa pengaruh bagi penghuninya. Menurut Notoatmodjo (2003) dalam Rahman (2005:21), salah satu fungsi ventilasi adalah menjaga aliran udara di dalam rumah tersebut tetap segar. Luas ventilasi rumah yang <10 % dari luas lantai (tidak memenuhi syarat kesehatan) akan mengakibatkan berkurangnya konsentrasi oksigen dan bertambahnya konsentrasi karbondioksida yang bersifat racun bagi penghuninya. Disamping itu, tidak cukupnya ventilasi akan menyebabkan peningkatan kelembaban ruangan karena terjadinya proses penguapan cairan dari kulit dan penyerapan. Kelembaban ruangan yang tinggi akan menjadi media yang baik untuk tumbuh dan berkembang biaknya bakteri-bakteri patogen termasuk kuman Tuberkulosis.

Dalam QS al-A'raf/7:57 dijelaskan tentang udara yang membawa kesegaran

وَهُوَ الَّذِي يُرِسِّلُ الْرِّيحَ بُشِّرًا بَيْنَ يَدَيِ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا
ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلَنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجَنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الْثَّمَرَاتِ
كَذَلِكَ خُرُجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti Itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. (Departemen Agama RI, 2008: 157)

Dijelaskan bahwa angin sebagai pembawa berita gembira, biasanya jika Al-quran menggunakan bentuk jamak, angin dimaksud adalah angin yang membawa rahmat dalam pengertian umum, baik hujan maupun kesegaran (Shihab, 2009).

Sungguh nikmat udara merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Dengan demikian, manusia dituntut untuk memanfaatkannya sesuai dengan karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka, dengan melestarkannya bukan dengan mencemarinya dan merusaknya, yang akan membawa mudharat bagi dirinya dan makhluk ciptaan Allah swt lainnya.

C. Tinjauan Umum tentang Pencahayaan Rumah

Rumah yang sehat memerlukan cahaya yang cukup, tidak kurang dan tidak terlalu banyak. Kurangnya cahaya yang masuk ke dalam ruangan rumah terutama cahaya matahari, disamping kurang nyaman juga merupakan media atau tempat yang baik untuk hidup dan berkembangnya bibit-bibit penyakit. Sebaliknya terlalu banyak cahaya di dalam rumah akan menyebabkan silau dan akhirnya akan merusak mata. Cahaya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Cahaya alamiah, yakni matahari. Cahaya ini sangat penting karena dapat membunuh bakteri-bakteri patogen di dalam rumah, misalnya Bakteri TBC. Oleh karena itu, rumah yang sehat harus mempunyai jalan cahaya yang cukup. Seyogianya jalan masuk cahaya (jendela) luasnya sekurang-kurangnya 15% sampai 20% dari luas lantai yang terdapat di dalam ruangan rumah. Perlu diperhatikan di dalam membuat jendela diusahakan agar sinar matahari dapat langsung masuk ke dalam ruangan, tidak terhalang oleh bangunan lain. Fungsi jendela disini, disamping sebagai ventilasi, juga sebagai jalan masuk cahaya. Lokasi penempatan jendela pun harus diperhatikan dan diusahakan agar sinar matahari lama menyinari lantai (bukan menyinari dinding). Maka sebaiknya jendela itu harus ditengah-tengah tinggi dinding (tembok). Jalan masuk cahaya alamiah juga diusahakan dengan genteng kaca. Genteng kaca pun dapat dibuat secara sederhana, yakni dengan melubangi genteng biasa waktu pembuatannya, kemudian menutupnya dengan pecahan kaca.

2. Cahaya buatan, yaitu menggunakan sumber cahaya tapi bukan alamiah seperti lampu minyak tanah, listrik, api dan sebagainya. Untuk memperoleh cahaya cukup pada siang hari, diperlukan luas jendela kaca minimum 20% luas lantai. Jika peletakan jendela kurang baik atau kurang leluasa maka dapat dipasang genteng kaca. Cahaya ini sangat penting karena dapat membunuh bakteri-bakteri patogen di dalam rumah, misalnya basil TB, karena itu rumah yang sehat harus mempunyai jalan masuk cahaya yang cukup. Intensitas pencahayaan minimum yang diperlukan 10 kali lilin atau kurang lebih 60 lux, kecuali untuk kamar tidur diperlukan cahaya yang lebih redup. Semua jenis cahaya dapat mematikan kuman hanya berbeda dari segi lamanya proses mematikan kuman untuk setiap jenisnya. Cahaya yang sama apabila dipancarkan melalui kaca tidak berwarna dapat membunuh kuman dalam waktu yang lebih cepat daripada yang melalui kaca berwarna. Penularan kuman TB Paru relatif tidak tahan pada sinar matahari. Bila sinar matahari dapat masuk dalam rumah serta sirkulasi udara diatur maka resiko penularan antar penghuni akan sangat berkurang (Notoatmodjo,2003).

Berdasarkan Kepmenkes RI Nomor. 829/menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan rumah tinggal, rumah harus cukup mendapatkan penerangan baik siang maupun malam hari. Yang ideal adalah penerangan listrik. Diusahakan agar ruangan-ruangan mendapatkan sinar matahari terutama pagi hari. Pencahayaan alam atau buatan langsung

atau tidak langsung dapat menerangi seluruh bagian ruangan minimal intensitasnya 60 lux dan tidak menyilaukan.

Secara umum pengukuran pencahayaan terhadap sinar matahari adalah dengan menggunakan *lux meter*, yang diukur ditengah-tengah ruangan, pada tempat setinggi < 84 cm dari lantai. (Nurhidayah Dkk, 2007:16).

Menurut Sukidjo Notoatmodjo (2003), cahaya matahari mempunyai sifat membunuh bakteri, terutama kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Menurut Depkes RI (2002), kuman tuberkulosis hanya dapat mati oleh sinar matahari langsung. Oleh sebab itu, rumah dengan standar pencahayaan yang buruk sangat berpengaruh terhadap kejadian tuberkulosis. Kuman Tuberculosis dapat bertahan hidup pada tempat yang sejuk, lembab dan gelap tanpa sinar matahari sampai bertahun-tahun lamanya, dan mati bila terkena sinar matahari, sabun, lisol, karbol dan panas api dan rumah yang tidak masuk sinar matahari mempunyai resiko menderita Tuberkulosis 3-7 kali dibandingkan dengan rumah yang dimasuki sinar matahari.

D. Tinjauan Umum tentang Kepadatan Hunian

Beberapa persyaratan suatu rumah agar dapat menjamin kesehatan penghuninya, baik secara fisik maupun psikologis antara lain menyangkut: Ventilasi, kelembaban, pencahayaan, kamarisasi, dan kepadatan hunian.

Semakin banyak penghuni suatu rumah semakin menuntut ruangan yang banyak dan luas, misalnya kamar tidur (Rahman S, 2005:26)

Kepadatan penghuni dalam satu rumah tinggal akan memberikan pengaruh bagi penghuninya. Luas rumah yang tidak sebanding dengan jumlah penghuninya akan menyebabkan perjubelan (*overcrowded*). Hal ini tidak sehat karena disamping menyebabkan kurangnya konsumsi oksigen, juga bila salah satu anggota keluarga terkena penyakit infeksi, terutama Tuberkulosis akan mudah menular kepada anggota keluarga yang lain (Notoatmodjo, 2003 dalam Nurhidayah dkk:17).

Semakin padat penghuni rumah akan semakin cepat pula udara di dalam rumah tersebut mengalami pencemaran. Karena jumlah penghuni yang semakin banyak akan berpengaruh terhadap kadar oksigen dalam ruangan tersebut, begitu juga kadar uap air dan suhu udaranya. Dengan meningkatnya kadar CO₂ di udara dalam rumah, maka akan memberi kesempatan tumbuh dan berkembang biak lebih bagi *Mycobacterium tuberculosis*. Dengan demikian akan semakin banyak kuman yang terhisap oleh penghuni rumah melalui saluran pernafasan (Fatimah, 2008).

Kepadatan penghuni adalah perbandingan antara luas lantai rumah dengan jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tinggal. Persyaratan kepadatan hunian untuk seluruh perumahan biasa dinyatakan dalam m² per orang. Luas minimum per orang sangat relatif, tergantung dari kualitas bangunan dan fasilitas yang tersedia. Untuk perumahan sederhana, minimum 8 m²/orang. Untuk kamar tidur diperlukan minimum 2 orang. Kamar tidur

sebaiknya tidak dihuni > 2 orang, kecuali untuk suami istri dan anak dibawah dua tahun. Apabila ada anggota keluarga yang menjadi penderita penyakit tuberkulosis sebaiknya tidak tidur dengan anggota keluarga lainnya. Secara umum penilaian kepadatan penghuni dengan menggunakan ketentuan standar minimum, yaitu kepadatan penghuni yang memenuhi syarat kesehatan diperoleh dari hasil bagi antara luas lantai dengan jumlah penghuni ≥ 10 m²/orang dan kepadatan penghuni tidak memenuhi syarat kesehatan bila diperoleh hasil bagi antara luas lantai dengan jumlah penghuni < 10 m²/orang (Lubis, 1989).

Dari segi penularan penyakit, kepadatan hunian rumah juga sangat berperan terutama penyakit-penyakit yang disebarluaskan lewat udara seperti penyakit infeksi pernafasan. Dalam rumah dengan penghuni yang padat, penularan penyakit sangat mudah terjadi bila salah satu atau beberapa orang penghuninya menderita suatu penyakit menular karena adanya kontak yang sangat erat antar penghuninya. Kondisi perumahan seperti ini menyebabkan masih tingginya angka penyakit infeksi pernafasan di negara-negara berkembang seperti indonesia (Rahman S, 2005:27).

Pada beberapa penelitian sebelumnya ditemukan adanya hubungan yang bermakna antara kepadatan hunian rumah dengan kejadian TB paru, seperti penelitian yang dilakukan oleh Muh. Nawir tahun 1994, Salvato dalam Rahardi tahun 2002, demikian dengan juga penelitian yang dilakukan oleh Parhan di Gorontalo tahun 2004 (Rahman S, 2005:27)

E. Tinjauan Umum tentang Kontak Serumah

Kontak serumah adalah adanya keluarga yang serumah dan sudah diketahui menderita TB dengan sputum BTA (+) . Apabila ada anggota keluarga yang menjadi penderita penyakit tuberkulosis sebaiknya tidak tidur dengan anggota keluarga lainnya. Kamar adalah pembagian ruangan / sekat dalam rumah tersebut. Apabila rumah tersebut tidak terdapat kamar atau ruangan, maka akan lebih mudah terjadi penularan penyakit. Sebagai contoh bila rumah tersebut ada sumber penularan (penderita TBC ataupun ISPA), maka potensi penularan akan dapat lebih mudah dan cepat terhadap orang yang tinggal bersama dalam suatu ruangan tersebut (Nurhidayah dkk, 2007:15).

Kontak serumah dengan penderita TBC merupakan salah satu faktor risiko terjadinyaTBC.Semua kontak penderita TBC positif harus diperiksa dahak. Kontak erat seperti dalam keluarga dan pemaparan besar-besaran seperti pada petugas kesehatan memungkinkan penularan lewat percikan dahak. Faktor risiko tersebut semakin besar bila kondisi lingkungan perumahan jelek seperti kepadatan penghuni, ventilasi yang tidak memenuhi syarat dan kelembaban dalam rumah merupakan media transisi kuman TBC untuk dapat hidup dan menyebar. Untuk itu penderita TBC dapat menularkan secara langsung terutama pada lingkungan rumah,masyarakat disekitarnya dan lingkungan tempat bekerja, makin meningkatnya waktu berhubungan dengan penderita memberi kemungkinan infeksi lebih besar pada kontak. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa pemaparan kuman TBC dapat

dipengaruhi oleh faktor individu, keeratan kontak dan faktor lingkungan rumah seseorang (Riadi, 2011).

Menurut penelitian Atmosukarto dari Litbang kesehatan (2000), didapatkan data bahwa: a. Rumah tangga penderita mempunyai kebiasaan tidur dengan balita mempunyai resiko terkena TB 2,8 kali dibanding dengan yang tidur terpisah. Tingkat penularan TB di lingkungan keluarga penderita rata-rata dapat menularkan kepada 2-3 orang didalam rumahnya. Besar resiko terjadinya penularan untuk rumah tangga dengan penderita lebih dari 1 orang adalah 4 kali dibanding rumah tangga dengan hanya 1 orang penderita TB (Nurhidayah dkk, 2007:16).

Berdasarkan Depkes RI, 2011 pengawasan terhadap penderita, kontak dan lingkungan sebagai berikut:

1. Oleh penderita, dapat dilakukan dengan menutup mulut sewaktu batuk dan membuang dahak tidak disembarangan tempat.
2. Oleh masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kekebalan terhadap bayi diberikan vaksinasi.
3. Oleh petugas kesehatan dengan memberikan penyuluhan tentang penyakit TB yang antara lain meliputi gejala , bahaya dan akibat yang ditimbulkannya.
4. Isolasi, pemeriksaan kepada orang-orang yang terinfeksi, pengobatan khusus TBC. Pengobatan mondon dirumah sakit hanya bagi penderita yang kategori berat yang memerlukan pengembangan program

pengobatannya yang karena alasan – alasan sosial ekonomi dan medis untuk tidak dikehendaki pengobatan jalan.

5. Des-Infeksi, cuci tangan dan pengawasan kebersihan alat rumah tangga yang ketat, selain itu perlu perhatian khusus terhadap muntahan dan ludah (piring, tempat tidur, pakaian) serta ventilasi rumah dan sinar matahari yang cukup.
6. Imunisasi orang–orang kontak. Tindakan pencegahan bagi orang–orang sangat dekat (keluarga, perawat, dokter, petugas kesehatan lain) dan lainnya yang terindikasi dengan vaksinasi dan tindak lanjut bagi yang positif tertular.
7. Penyelidikan orang–orang kontak. Tuberculin-test bagi seluruh anggota keluarga dengan foto rontgen yang bereaksi positif, apabila cara–cara ini negatif, perlu diulang pemeriksaan tiap bulan selama 3 bulan, perlu penyelidikan intensif.
8. Pengobatan khusus. Penderita dengan TBC aktif perlu pengobatan yang tepat obat–obat kombinasi yang telah ditetapkan oleh dokter di minum dengan tekun dan teratur dalam waktu yang lama (6 atau 12 bulan). Diwaspadai adanya kebal terhadap obat-obat, dengan pemeriksaan penyelidikan oleh dokter.

F. Tinjauan Umum tentang Kebiasaan Merokok

Merokok atau menghisap tembakau merupakan salah satu kebiasaan yang lazim dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sejak 600 tahun sebelum masehi, tembakau telah ditanam di Amerika Serikat dan pada tahun 1 masehi, penduduk Amerika sudah mulai merokok. Sementara itu pada tahun 600 masehi, seorang filosof Cina bernama Farg Yizhi mulai menyampaikan bahwa kebiasaan merokok dalam jangka lama akan dapat merusak paru. Pada tahun 1871 dilakukan studi pertama tentang dampak meroko yang dilakukan oleh John Hill. Merokok sebenarnya sudah merupakan masalah nasional bahkan internasional, oleh karena berdampak luas pada segi ekonomi dan kesehatan (Patanding S, 2005:28).

Demikian juga rokok akan menimbulkan masalah kesehatan paling tidak dianggap sebagai faktor resiko dari berbagai macam penyakit. Rokok merupakan produk industri dan komoditi internasional yang mengandung sekitar 1500 bahan kimiawi. Unsur-unsur yang penting antara lain: tar, nikotin, benzopyrin, metilklorida, aseton, amoniak, dan karbon monoksida. Diantara semua bahan-bahan yang berbahaya itu terdapat 3 yang paling penting khususnya dalam hal kanker yaitu tar, nikotin, dan karbon monoksida. Kebiasaan merokok akan merusak mekanisme pertahanan paru yang disebut *Muccociliary clearance*. Bulu-bulu getar dan bahan lain tidak dapat dengan mudah membuang infeksi yang sudah masuk ke paru-paru karena bulu getar dan alat lain di paru rusak akibat asap rokok. Selain itu asap rokok meningkatkan tahanan jalan nafas, dan menyebabkan mudah

bocornya pembuluh darah di paru juga akan merusak makrofag yang merupakan sel pemakan bakteri pengganggu. Asap rokok juga diketahui dapat menurunkan respon terhadap antigen sehingga kalau ada benda asing yang masuk ke paru tidak cepat dikenali dan dilawan (Aditama, 2004).

Menurut Bustan (2000) dalam Arief (2011) jumlah rokok yang dihisap dapat dalam satuan batang, bungkus, pak per hari. Kategori perokok dapat dibagi atas 3 kelompok yaitu:

1. Perokok ringan

Disebut perokok ringan apabila merokok kurang dari 10 batang per hari

2. Perokok sedang

Disebut perokok sedang jika menghisap 10-20 batang perhari.

3. Perokok berat

Disebut perokok berat jika menghisap lebih dari 20 batang perhari.

Bila sebatang rokok dihabiskan dalam sepuluh kali hisapan rokok, maka dalam tempo setahun bagi perokok sejumlah 20 batang (satu bungkus) perhari, akan mengalami 70.000 hisapan asap rokok. Beberapa zat kimia dalam rokok yang berbahaya bagi kesehatan bersifat komulatif (ditimbun), suatu saat dosis racunya akan mencapai titik toksis sehingga akan mulai kelihatan gejala yang ditimbulkan (Sitepoe 1997 dalam Arief 2011).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan ada hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian dan proses perjalanan penyakit TB paru. Ternyata ada hubungan antara prevalensi reaktifitas tes tuberkulin dengan kebiasaan merokok. Penelitian lain menunjukkan hubungan antara kebiasaan merokok

dengan aktif tidaknya penyakit TB paru dan faktor resiko terjadinya TB paru pada orang dewasa (Rahman S, 2005:27).

Rokok memang belum ada di masa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wa Sallam. Namun Islam telah datang dengan membawa kaidah-kaidah yang umum yang mengharamkan setiap perkara yang membahayakan badan atau mengganggu orang lain atau merugikan harta.

Sesuai dengan firman Allah swt pada QS al-Baqarah/2: 195

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيهِكُمْ إِلَى الْتَّحْلُكَةِ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. (Departemen Agama RI,2008:30)

Rokok menimbulkan penyakit-penyakit yang membinasakan seperti kanker, TBC, dan lain-lain.

G. Pandangan Islam tentang Tuberkulosis Paru

Tuberkulosis paru adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium Tuberculosis yang sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga menyerang organ tubuh lainnya. Dilihat dari esensi penyakit dan kerugian masyarakat dunia akibat penyakit TB sungguh sangat membahayakan. Menurut data WHO, bahwa sepertiga penduduk dunia terinfeksi TB, setiap tahun ada sembilan juta kasus baru dan tiga juta berujung dengan kematian, 95% kasus TB dan 98% kematian TB terjadi di negara berkembang yang 75% masih dalam usia produktif (Nafis, 2007).

Dalam pandangan Islam, kematian atau ajal manusia di tetapkan oleh Allah swt, namun corak atau kondisi kematian manusia yang berbeda misalnya kematian karena penyakit.

Sesuai QS al-A'raf/7:34 tentang kematian manusia

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

Terjemahnya

Dan setiap umat mempunyai ajal (batas waktu), maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya. (Departemen Agama RI, 2008:154)

Menurut Shihab (2009), ayat di atas mengisyaratkan bahwa upaya untuk memperlambat atau mempercepat kedatangan ajal walau dilakukan secara sungguh-sungguh, tidak akan berhasil sedikitpun. Tapi bukan berarti tidak ada upaya yang dilakukan untuk menambah harapan hidup. Manusia dapat berusaha, usaha dapat berhasil, tetapi keberhasilan mereka tidak akan mengubah ajal yang ditetapkan Allah swt.

Penyakit yang diderita seseorang adalah buruk menurut penilaian yang bersangkutan tetapi baik buat banyak orang, karena orang akan mengetahui nilai kesehatan. Bahkan, sakit itu menjadi baik untuk si sakit karena dengan demikian ia mendapat pelajaran agar terhindar sebabnya atau karena dengan penyakit itu jika dia bersabar dia memperoleh ganjaran atau pengampunan dosa. Demikian semua *Sunnatullah* atau hukum-hukum yang ditetapkan Allah swt (Shihab, 2009)

Menurut Shihab (2009). Kematian tetap mengejar kita, betapapun kesehatan yang kita usahakan berhasil. Namun demikian, kita tidak boleh menyerah kepada takdir tanpa ikhtiar. Kita harus tetap berusaha menjaga kesehatan kita.

Menurut, H. L Blum faktor perilaku merupakan faktor yang berpengaruh terhadap status kesehatan. Perilaku sebagian masyarakat yang menganggap bahwa penyakit TB paru merupakan penyakit memalukan sehingga tidak mau segera mengunjungi pelayanan kesehatan untuk segera mendapatkan pengobatan. Masyarakat masih memiliki adat istiadat yang kental dan terkadang masih ada yang percaya terhadap kekuatan ghaib, menganggap bahwa penyakit TB paru merupakan penyakit yang disebabkan oleh kekuatan ghaib sehingga penderita TB paru melakukan pengobatan secara tradisional. Perilaku masyarakat banyak memberikan peranan dalam penyebaran TB paru dan kegagalan dalam pengobatan secara tuntas, sehingga setiap tahunnya selalu ada kasus baru yang tercatat. Sikap masyarakat yang beranggapan bahwa TB paru merupakan penyakit batuk biasa yang dapat sembuh dengan sendirinya dengan mengkonsumsi obat batuk biasa yang dijual secara bebas juga menghambat upaya penanggulangan dan penyembuhan TB paru (Tobing, 2009:22).

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt, QS al-Ra'du/13:11

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ ذُونَهُ مِنْ وَالٰ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Departemen Agama RI, 2008:250)

Selain perilaku, lingkungan terutama kondisi rumah juga memiliki peranan dalam penyebaran bakteri TB paru ke orang yang sehat. Bakteri TB paru yang terdapat di udara saat penderita TB paru bersin akan dapat bertahan hidup lebih lama jika keadaan udara lembab dan kurang cahaya. Penyebaran bakteri TB paru akan lebih cepat menyerang orang sehat jika berada dalam rumah yang lembab, kurang cahaya dan padat hunian (Tobing, 2009:24).

Dari hidup bersih menuju hidup sehat. Islam mengantisipasi sesuatu yang mengganggu kesehatan, yaitu penyakit. Penyakit dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang harus diberantas. Sebab, orang yang terjangkit penyakit pastilah mengganggu pelaksanaan ibadah secara sempurna dan menghambat produktivitas manusia. Islam mengajarkan pengobatan, tetapi Islam lebih menekan pada pencegahan terkena penyakit.

Oleh karena itu, perlu umat Islam mempunyai perspektif bahwa membangun kesadaran hidup bersih, sehat dan mengobati penyakit adalah bagian dari dakwah Islam. Karena itu, salah satu tujuan dari ajaran Islam ialah menghilangkan kemudharatan/bahaya (daf'u al-dharar) yang menimpa manusia baik bahaya yang mengancam jasad maupun rohani. Tujuannya adalah agar manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai makhluk Allah SWT, menyembah dan mengabdi kepada-Nya di muka bumi ini dengan baik.

Jika kondisi jasad atau rohani seseorang tidak sehat tentu ia tidak akan dapat menunaikan tugas tersebut dengan baik. Karena itu, Islam sangat memperhatikan masalah kesehatan dan menganjurkan agar manusia menjaga kesehatan. Di samping itu, untuk mencapai tubuh yang sehat, dalam pandangan Islam tidak cukup hanya mengandalkan faktor internal tubuh manusia saja, tetapi juga faktor lingkungan. Sebaik apapun makanan yang dikonsumsi manusia, jika lingkungannya tidak sehat atau tidak bersih, maka ancaman penyakit masih tetap besar. Karena penyakit akan datang melalui makanan yang dikonsumsi dan juga melalui udara dan lingkungan yang kotor. Maka dari itu, Islam juga sangat menekankan kebersihan. Satu ungkapan tentang kebersihan yang sangat terkenal

النظافة من الإيمان

Artinya

Kebersihan itu merupakan dampak dari keimanan

Maksudnya orang beriman mesti bersih dan jika tidak bersih maka keimanannya kurang. Kebersihan dalam pandangan Islam sangat erat hubungannya dengan kesehatan. Tujuan Islam mengajarkan hidup yang bersih dan sehat adalah menciptakan individu dan masyarakat yang sehat jasmani, rohani, dan sosial sehingga mampu menjadi umat pilihan dan khalifah Allah untuk memakmurkan bumi. “Kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia”. Karena kesehatan merupakan hak asasi manusia, sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, maka Islam menegaskan perlunya kesehatan untuk menjalankan agama secara sempurna (Nafis, 2007).

BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel Peneliti

Penyakit TB paru adalah merupakan suatu penyakit kronik pada saluran pernafasan bagian bawah yang disebabkan oleh kuman berbentuk batang yang disebut *Mycobacterium tuberculosis*. Penyakit Tuberkulosis sampai saat ini masih merupakan salah satu masalah kesehatan di masyarakat di Indonesia maupun dunia secara umum. Hal ini ditandai dengan tingginya angka kesakitan yang dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan. Demikian juga dengan angka kematian TB yang sangat tinggi dimana setiap tahunnya sekitar 3 juta orang didunia dan tidak kurang 140 ribu di Indonesia meninggal akibat TB (Aditama,1994).

Penularan penyakit ini dapat terjadi secara langsung melalui saluran nafas dengan cara inhalasi ‘droplet’ yang berasal dari penderita TBC yang mengandung kuman, kemudian dikeluarkan dari tubuh dengan cara batuk, bernyanyi atau tertawa. Tetapi dapat pula menular secara tidak langsung dimana droplet tersebut jatuh ke lantai dan kemudian terhisap orang lain bersama debu sehingga terjadi penularan (Depkes RI, 2002)

Walaupun berbagai upaya telah dilaksanakan untuk menanggulangi antar lain upaya pencegahan seperti imunisasi, perbaikan lingkungan pemukiman, penyuluhan untuk merubah perilaku masyarakat maupun upaya

pengobatan penderita dalam rangka penanganan sumber penularan yang ada akan tetapi penyakit TB tetap meningkat

Tingginya angka kesakitan TB paru disebabkan oleh berbagai faktor yaitu keadaan sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah, tindakan pengobatan yang masih terbatas, rendahnya status gizi masyarakat dan kondisi perumahan yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Dalam hal penularan langsung/kontak langsung maka usaha penanggulangannya tergantung pada ketepatan penanganan sumber penularan yaitu diarahkan pada upaya menghilangkan sumber penularan yang ada dengan cara pengobatan penderita. Sedangkan untuk penyakit yang penularannya melalui udara/ tidak langsung, peranan konstruksi bangunan sangat berpengaruh.

Penelitian ini ditujukan untuk melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian TB paru yang menyangkut ventilasi rumah, pencahayaan dalam rumah, kepadatan hunian rumah, riwayat kontak serta kebiasaan merokok. Masing-masing faktor-faktor tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut:

1. Ventilasi

Pertukaran udara di dalam ruangan sangat diperlukan agar udara segar dapat masuk ke dalam rumah. Ventilasi yang tidak baik akan meningkatkan suhu udara dan juga akan mempermudah pertumbuhan kuman penyakit. Adapun luas ventilasi disesuaikan dengan luas ruangan yaitu 10-15% dari luas ruangan.

Ventilasi yang tidak memenuhi syarat akan mengakibatkan penyakit TB paru yang dari udara pernafasan tetap berada dalam ruangan karena pergerakan udara tidak lancar. Akibatnya penghuni rumah memiliki resiko yang tinggi untuk tertular.

2. Pencahayaan

Cahaya matahari disamping berguna untuk menerangi ruangan juga mengurangi kelembaban ruangan dan mengusir serangga (nyamuk) maupun tikus. Matahari berguna sebagai *germicide* (pembunuhan kuman dan bakteri), disamping penyembuhan untuk beberapa penyakit. Telah dapat dibuktikan bahwa beberapa jenis parasit dapat dimatikan dengan penyinaran matahari langsung diantaranya kuman TB paru. Secara umum pengukuran pencahayaan terhadap sinar matahari adalah dengan menggunakan *lux meter*, yang diukur ditengah-tengah ruangan, pada tempat setinggi < 84 cm dari lantai, dengan ketentuan pencahayaan alam atau buatan langsung atau tidak langsung dapat menerangi seluruh bagian ruangan minimal intensitasnya 60 lux dan tidak menyilaukan (Kepmenkes, 1999).

3. Kepadatan hunian rumah

Rumah sebagai tempat berlindung keluarga tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih baik dari segi keindahan maupun kesehatan. Salah satu fungsi rumah ditinjau dari segi kesehatan adalah untuk mencegah terjadinya penularan penyakit. Namun fungsi rumah akan berubah menjadi sumber penularan penyakit apabila tidak diperhatikan.

Salah satu contohnya adalah rumah dengan jumlah penghuni yang banyak. Kepadatan hunian rumah menunjukkan perbandingan volume ruangan di dalam rumah dengan jumlah penghuni. Perumahan yang padat dan buruk akan menimbulkan masalah-masalah kesehatan diantaranya penularan beberapa penyakit. Hunian yang padat pada suatu rumah mengakibatkan kontak yang sangat erat dengan para penghuninya sehingga memudahkan terjadinya penularan penyakit seperti TB. Seorang anggota keluarga yang menderita TB paru dengan cepat akan menulari anggota keluarga lain dalam satu rumah.


4. Kontak serumah

Variabel kontak serumah adalah ada tidaknya riwayat kontak dalam rumah antara responden atau penderita kontak dengan penderita TB paru hingga menjadi sakit. Variabel ini dianggap memegang peranan penting dalam terjadinya penularan kontak serumah dengan penderita TB paru . Orang yang serumah dengan penderita TB paru dapat lebih mudah tertular penyakit TB paru.

5. Kebiasaan merokok

Merokok merupakan kebiasaan masyarakat yang kurang menguntungkan dari segi kesehatan. Kebiasaan merokok akan merusak mekanisme pertahanan paru-paru yang disebut micropelly, meningkatkan tahanan jalan nafas, merusak makrofag yang merupakan sel pemakan bakteri pengganggu.

B. Skema Hubungan Antara Variabel



Keterangan

→ : Variabel yang diteliti

→ : Variabel yang tidak diteliti

[] : Variabel independen (bebas)

() : Variabel dependen (terikat)

C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Penderita Tuberkulosis Paru

Penderita Tuberkulosis Paru dalam penelitian ini adalah responden yang menderita TB dan diberi pengobatan (OAT) berdasarkan data rekam medik di ruangan Pemberantasan Penyakit (P2) TB.

Kriteria Objektif :

Penderita : jika responden memiliki sputum dahak BTA (+)

Bukan penderita : jika responden memiliki sputum dahak BTA (-)

2. Kondisi fisik rumah

Kondisi Fisisk rumah dalam penelitian ini adalah keadaan dari rumah responden yang dinilai berdasarkan ventilasi dan pencahayaan yang memenuhi persyaratan kesehatan menurut Permenkes RI Nomor.829/menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan rumah tinggal

a. Ventilasi

Ventilasi dalam penelitian ini adalah lubang atau tempat udara dapat keluar masuk secara bebas antara dinding dan atap yang diukur berdasarkan ukuran panjang dan lebar.

Kriteria objektif :

Memenuhi syarat bila $\geq 10\%$ luas lantai.

Tidak memenuhi syarat bila $<10\%$ luas lantai.

b. Pencahayaan

Pencahayaan dalam penelitian ini adalah banyaknya sinar matahari yang masuk ke dalam rumah responden yang diukur di dalam kamar responden dengan menggunakan *Lux Meter*.

Kriteria objektif :

Memenuhi syarat bila ≥ 60 lux dan menyilaukan

Tidak memenuhi syarat bila <60 lux dan menyilaukan

3. Kepadatan hunian

Kepadatan hunian dalam penelitian ini adalah perbandingan antara luas lantai rumah dengan jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tinggal.

Kriteria Objektif:

Memenuhi syarat bila diperoleh hasil bagi antara luas lantai dengan jumlah penghuni $\geq 10 \text{ m}^2$ per orang.

Tidak memenuhi syarat bila diperoleh hasil bagi antara luas lantai dengan jumlah penghuni $< 10 \text{ m}^2$ per orang.

4. Riwayat kontak serumah

Adalah ada tidaknya keluarga yang serumah dan menderita TB dengan sputum BTA (+).

Kriteria objektif:

Ada : bila dalam rumah responden ada anggota keluarga lain yang menderita TB

Tidak ada : bila dalam rumah responden tidak ada anggota keluarga lain yang menderita TB

5. Kebiasaan merokok

Kebiasaan merokok pada penelitian ini adalah suatu perbuatan ketika responden menghisap rokok (tembakau).

Kriteria objektif :

Ya : Jika responden merokok pada saat dilakukan penelitian.

- a. Perokok ringan : bila responden merokok kurang dari 10 batang perhari
- b. Perokok sedang : bila responden merokok 10-20 batang perhari.
- c. Perokok berat : bila responden merokok lebih dari 20 batang perhari.

Tidak : jika responden tidak merokok

D. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis nol (Ho)

- a. Tidak ada hubungan antara ventilasi rumah dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah.

- b. Tidak ada hubungan antara pencahayaan dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah.
- c. Tidak ada hubungan antara kepadatan hunian rumah dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah.
- d. Tidak ada hubungan antara kontak serumah dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah.
- e. Tidak ada hubungan antara perilaku merokok dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah.

2. Hipotesis Alternatif (Ha)

- a. Ada hubungan antara ventilasi rumah dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah.
- b. Ada hubungan antara pencahayaan dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah.
- c. Ada hubungan antara kepadatan hunian rumah dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah
- d. Ada hubungan antara kontak serumah dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah.
- e. Ada hubungan antara perilaku merokok dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analitik Observasional dengan pendekatan rancangan *Cross Sectional Study*, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel independen yaitu kondisi fisik rumah meliputi ventilasi dan pencahayaan, kepadatan hunian rumah, riwayat kontak serumah dan kebiasaan merokok dengan variabel dependen yaitu kejadian Tuberkulosis Paru.

B. Lokasi Penelitian .

Adapun lokasi penelitian yaitu di wilayah kerja Puskesmas Maccini sawah, kelurahan Maccini Kota Makassar yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli sampai 19 Juli 2012. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penemuan penderita Tuberkulosis Paru pada puskesmas Maccini sawah merupakan yang tertinggi setelah puskesmas pannambungan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan kota makassar tahun 2009.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien yang berkunjung dan tercatat pada rekam medik di ruangan Pemberantasan Penyakit (P2) TB Puskesmas Maccini Sawah mulai bulan Januari sampai Juni 2012 sebanyak 190 orang.

2. Sampel

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel secara acak sederhana (*Simple Random Sampling*). Cara teknik memilih yaitu dengan cara mengundi (*Lottery Technique*).

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian dari pasien yang tercatat pada medical record yang pernah berkunjung di ruangan P2 TB paru Puskesmas Maccini Sawah, baik yang tidak menderita maupun yang menderita TB yang berjumlah 66 orang.

Cara perhitungan sampel dengan menggunakan rumus Toro Yamani, di dalam Sastroasmoro (2008), sebagai berikut

$$n = \frac{N}{1+N \cdot d^2}$$

Keterangan :

n = Besar Sampel

N = Besar Populasi

d = Tingkat kepercayaan atau ketepatan yang diinginkan
(10%)

Berikut adalah cara perhitungan sampel:

Dik : N = 190

$$d = 0,1 (10\%)$$

$$n = \frac{N}{1+N \cdot d^2}$$

$$n = \frac{190}{1+190.(0,1)^2}$$

$$n = \frac{190}{1+1,90}$$

$$n = \frac{190}{2,90}$$

$$n = 65,51 / 66 \text{ responden}$$

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung mendatangi responden dengan cara wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari puskesmas Maccini Sawah mengenai data-data pasien yang pernah berkunjung dan memeriksakan diri di ruangan P2 TB serta dari buku-buku, literatur dan jurnal.

E. Instrumen (Alat Pengumpulan data)

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, berupa kuesioner mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Tuberkulosis Paru.

F. Pengolahan dan Penyajian Data

Cara Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS

16. Penyajian data disajikan dalam bentuk tabel distribusi disertai penjelasan-penjelasan dan penyajian data penyajian data juga dilakukan dalam bentuk tabel analisis hubungan antara variable yaitu tabel 2x2.

G. Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji adalah Hipotesis nol (H_0) dengan kemaknaan 0,05 yang menggunakan uji statistik Chi Square, dengan rumus sebagai berikut:

$$X^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

Dinyatakan berhubungan bila X^2 hitung lebih besar dari X^2 tabel atau nilai p lebih kecil dari 0,05 ($p < 0,05$), maka H_0 ditolak.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar pada tanggal 13 Juli sampai 19 Juli Tahun 2012. Sampel yang diteliti adalah pasien yang tercatat pada rekam medik di ruangan Pemberantasan Penyakit (P2) TB baik yang menderita maupun yang tidak menderita yang di ambil secara acak. Pada penelitian banyaknya sampel yang diteliti adalah sebanyak 66 responden.

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang telah dilakukan di lapangan, maka dilakukan olah data serta analisis data. Hasil pengolahan data yang telah dilakukan disajikan secara sistematis.

1. Karateristik Responden

a. Jenis Kelamin

Tabel 5.1.1
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
di Wilayah Kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar
Tahun 2012

Jenis Kelamin	Jumlah (n)	Per센 (%)
Laki-Laki	38	57,6
Perempuan	28	42,4
Jumlah	66	100,0

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 5.1.1 di atas, dapat diketahui bahwa dari 66 responden terdapat 38 responden (57,6 %) berjenis kelamin laki-laki dan 28 responden (42,4 %) berjenis kelamin perempuan.

b. Umur Responden

Tabel 5.1.2
Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur
di Wilayah Kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar
Tahun 2012

Umur (Tahun)	Jumlah (n)	Persen (%)
≤ 19 tahun	6	9,1
20-39 tahun	33	50
40-59 tahun	18	27,3
≥60 tahun	9	13,6
Jumlah	66	100,0

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 5.1.2 di atas dapat diketahui bahwa dari 66 responden, sebagian besar berumur antara 20-39 tahun yaitu sebanyak 33 responden (50 %), sedangkan 18 responden (27,3 %) berumur 40-59 tahun, 6 responden (9,1 %) berumur kurang dari 19 tahun dan 9 responden (13,6%) berumur lebih dari 60 tahun.

2. Analisis Univariat

a. Kejadian Tuberkulosis (TB) Paru

Tabel 5.2.1
Distribusi Responden Berdasarkan Kejadian Tuberkulosis Paru
di Wilayah Kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar
Tahun 2012

Kejadian Tuberkulosis	Jumlah (n)	Persen (%)
Menderita	22	33,3
Tidak menderita	44	66,7
Jumlah	66	100,0

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 5.2.1 di atas dapat diketahui mengenai kejadian Tuberkulosis paru, dimana dari 66 responden, 22 responden (33,3 %) menderita Tuberkulosis Paru dan 44 responden (66,7 %) tidak menderita Tuberkulosis Paru.

b. Keadaan Ventilasi Rumah Responden

Tabel 5.2.2
Distribusi Rumah Responden Berdasarkan Keadaan Ventilasi di Wilayah Kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar
Tahun 2012

Keadaan Ventilasi	Jumlah (n)	Persen (%)
Memenuhi syarat	26	39,4
Tidak Memenuhi syarat	40	60,6
Jumlah	66	100,0

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 5.2.2 di atas, dapat diketahui keadaan ventilasi rumah responden. Dari 66 rumah responden, 26 rumah (39,4 %) yang ventilasinya memenuhi syarat dan 40 rumah (60,6 %) yang ventilasinya tidak memenuhi syarat.

c. Pencahayaan Rumah Responden

Tabel 5.2.3
Distribusi Rumah Responden Berdasarkan Pencahayaan di Wilayah Kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar
Tahun 2012

Pencahayaan	Jumlah (n)	Persen (%)
Memenuhi syarat	34	51,5
Tidak Memenuhi syarat	32	48,5
Jumlah	66	100,0

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 5.2.3 di atas, dapat diketahui pencahayaan rumah responden. Dari 66 rumah responden, 34 rumah (51,5 %) yang pencahayaannya memenuhi syarat dan 32 rumah (48,5 %) yang pencahayaannya tidak memenuhi syarat

d. Kepadatan Hunian Rumah Responden

Tabel 5.2.4
Distribusi Rumah Responden Berdasarkan Kepadatan Hunian
di Wilayah Kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar
Tahun 2012

Kepadatan Hunian	Jumlah (n)	Persen (%)
Memenuhi Syarat	40	60,6
Tidak Memenuhi Syarat	26	39,4
Jumlah	66	100,0

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 5.2.4 di atas, dapat diketahui kepadatan hunian rumah responden. Dari 66 rumah responden, 40 rumah (60,6 %) yang kepadatan huniannya memenuhi syarat dan 26 rumah (39,4 %) yang kepadatan huniannya tidak memenuhi syarat

e. Riwayat Kontak Serumah

Tabel 5.2.5
Distribusi Responden Berdasarkan Kontak Serumah di Wilayah
Kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar
Tahun 2012

Kontak Serumah	Jumlah (n)	Persen (%)
Ada	29	43,9
Tidak Ada	37	56,1
Jumlah	66	100,0

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 5.2.5 di atas, dapat diketahui riwayat kontak serumah responden. Dari 66 responden, 29 responden (43,9 %) yang memiliki riwayat kontak serumah dan 37 responden (56,1 %) yang tidak memiliki riwayat kontak serumah.

f. Kebiasaan Merokok Responden

Tabel 5.2.6
Distribusi Responden Berdasarkan Kebiasaan Merokok di Wilayah Kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar
Tahun 2012

Perilaku Merokok	Jumlah (n)	Persen (%)
Ya	29	43,9
Tidak	37	56,1
Jumlah	66	100,0

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 5.2.6 di atas, dapat diketahui kebiasaan merokok responden. Dari 66 responden, 29 responden (43,9 %) yang mempunyai kebiasaan merokok dan 37 responden (56,1 %) yang tidak mempunyai kebiasaan merokok.

Tabel 5.2.7
Distribusi Responden yang Merokok Berdasarkan Kategori Perokok di Wilayah Kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar Tahun 2012

Kategori Perokok	Jumlah (n)	Persen (%)
Ringan	16	55,2
Sedang	9	31,0
Berat	4	13,8
Jumlah	29	100

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 5.2.7 di atas, dapat diketahui kategori perokok responden yang merokok. Dari 29 responden yang merokok, 16 responden (55,2 %) sebagai perokok ringan, 9 responden (31,0 %) sebagai perokok sedang dan 4 responden (13,8 %) sebagai perokok berat.

3. Analisis Bivariat

a. Hubungan antara Ventilasi Rumah dengan Kejadian Tuberkulosis Paru

Tabel 5.3.1

Analisis Hubungan Keadaan Ventilasi Rumah dengan Kejadian TB Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar Tahun 2012

Ventilasi	Kejadian TB Paru				Jumlah		Hasil Uji Statistik	
	TB		Tidak TB					
	n	%	n	%	N	%		
Memenuhi Syarat	3	11,5	23	88,5	26	100	$P=0,002$	
Tidak Memenuhi Syarat	19	47,5	21	52,5	40	100		
Jumlah	22	33,3	44	66,7	66	100		

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 5.3.1 di atas, dapat diketahui bahwa dari 66 responden terdapat 26 responden yang ventilasi rumahnya memenuhi syarat dan 40 responden yang ventilasi rumahnya tidak memenuhi syarat. Dari 66 responden terdapat 22 responden (33,3 %) yang menderita TB paru dan 44 responden (66,7 %) yang tidak menderita TB. Dari 26 responden yang ventilasi rumahnya memenuhi syarat

terdapat 3 responden yang menderita TB dan 23 responden yang tidak menderita TB paru. Dari 40 responden yang ventilasi rumahnya tidak memenuhi syarat terdapat 19 responden yang menderita TB dan 21 responden yang tidak menderita TB.

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji *Chi-Square* diperoleh nilai $P=0,002 (<0,05)$, yang menunjukkan adanya hubungan bermakna antara keadaan ventilasi dengan kejadian Tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar Tahun 2012.

b. Hubungan antara Pencahayaan dengan Kejadian Tuberkulosis Paru

Tabel 5.3.2
Analisis Hubungan Pencahayaan Rumah dengan Kejadian TB Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Maccini Sawah
Kota Makassar Tahun 2012

Pencahayaan	Kejadian TB Paru				Jumlah	Hasil Uji Statistik		
	TB		Tidak TB					
	N	%	n	%				
Memenuhi Syarat	7	20,6	27	79,4	34	100		
Tidak Memenuhi Syarat	15	46,9	17	53,1	32	100		
Jumlah	22	33,3	44	66,7	66	100		

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 5.3.2 di atas, dapat diketahui bahwa dari 66 responden terdapat 34 responden yang pencahayaan rumahnya memenuhi syarat dan 32 responden yang pencahayaan rumahnya tidak memenuhi syarat. Dari 66 responden terdapat 22 responden (33,3 %) yang menderita TB paru dan 44 responden (66,7 %) yang tidak

menderita TB. Dari 34 responden yang pencahayaan rumahnya memenuhi syarat terdapat 7 responden yang menderita TB dan 27 responden yang tidak menderita TB paru. Dari 32 responden yang pencahayaan rumahnya tidak memenuhi syarat terdapat 15 responden yang menderita TB dan 17 responden yang tidak menderita TB.

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji *Chi-Square* diperoleh nilai $P=0,024 (<0,05)$, yang menunjukkan adanya hubungan bermakna antara pencahayaan rumah dengan kejadian Tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar Tahun 2012.

c. Hubungan antara Kepadatan Hunian dengan Kejadian Tuberkulosis Paru

Tabel 5.3.3
Analisis Hubungan Kepadatan Hunian dengan Kejadian TB Paru
di Wilayah Kerja Puskesmas Maccini Sawah
Kota Makassar Tahun 2012

Kepadatan Hunian	Kejadian TB Paru				Jumlah	Hasil Uji Statistik		
	TB		Tidak TB					
	n	%	n	%				
Memenuhi Syarat	9	22,5	31	77,5	40	100		
Tidak Memenuhi Syarat	13	50	13	50	26	100		
Jumlah	22	33,3	44	66,7	66	100		

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 5.3.3 di atas, dapat diketahui bahwa dari 66 responden terdapat 40 responden yang kepadatan hunian rumahnya memenuhi syarat dan 26 responden yang kepadatan hunian rumahnya tidak memenuhi syarat. Dari 66 responden tersebut terdapat 22

responden (33,3 %) yang menderita Tuberkulosis Paru dan 44 responden (66,7 %) yang tidak menderita Tuberkulosis Paru. Dari 40 responden yang kepadatan hunian rumahnya memenuhi syarat terdapat 9 responden (22,5%) yang menderita Tuberkulosis Paru dan 31 responden (77,5%) yang tidak menderita Tuberkulosis Paru. Dari 26 responden yang kepadatan hunian rumahnya tidak memenuhi syarat terdapat 13 responden (50%) yang menderita Tuberkulosis Paru dan 13 responden (50%) yang tidak menderita Tuberkulosis Paru.

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji *Chi-Square* diperoleh nilai $P=0,021$ atau lebih kecil dari nilai alfa (0,05), yang berarti bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima. Dari nilai P tersebut menunjukkan adanya hubungan bermakna antara kepadatan hunian rumah dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar Tahun 2012.



d. Hubungan antara Riwayat Kontak serumah dengan Kejadian Tuberkulosis Paru

Tabel 5.3.4
Analisis Hubungan Riwayat Kontak Serumah dengan Kejadian TB Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar Tahun 2012

Kontak Serumah	Kejadian TB Paru				Jumlah		Hasil Uji Statistik	
	TB		Tidak TB					
	n	%	n	%	N	%		
Ada	14	48,3	15	51,7	29	100	$P=0,023$	
Tidak Ada	8	21,6	29	78,4	37	100		
Jumlah	22	33,3	44	66,7	66	100		

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 5.3.4 di atas, dapat diketahui bahwa dari 66 responden terdapat 29 responden yang memiliki riwayat kontak serumah dan 37 responden yang tidak ada riwayat kontak serumah. Dari 66 responden terdapat 22 responden (33,3 %) yang menderita TB paru dan 44 responden (66,7 %) yang tidak menderita TB paru. Dari 29 responden yang ada riwayat kontak serumah terdapat 14 responden yang menderita TB paru dan 15 responden yang tidak menderita TB paru. Dari 37 responden yang tidak ada riwayat kontak serumah terdapat 8 responden yang menderita TB paru dan 29 responden yang tidak menderita TB paru.

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji *Chi-Square* diperoleh nilai $P=0,023 (<0,05)$, yang menunjukkan adanya hubungan bermakna antara riwayat kontak serumah dengan kejadian Tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar Tahun 2012.

e. Hubungan antara Kebiasaan Merokok dengan Kejadian Tuberkulosis Paru

Tabel 5.3.5
Analisis Hubungan Kebiasaan Merokok dengan Kejadian TB Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Maccini Sawah
Kota Makassar Tahun 2012

Kebiasaan Merokok	Kejadian TB Paru				Jumlah	Hasil Uji Statistik		
	TB		Tidak TB					
	n	%	n	%				
Ya	7	24,1	22	75,9	29	100		
Tidak	15	40,5	22	59,5	37	100		
Jumlah	22	33,3	44	66,7	66	100		

Sumber : Data Primer, 2012

Berdasarkan tabel 5.3.5 di atas, dapat diketahui bahwa dari 66 responden terdapat 29 responden yang mempunyai kebiasaan merokok dan 37 responden yang tidak mempunyai kebiasaan merokok. Dari 66 responden terdapat 22 responden (33,3 %) yang menderita TB paru dan 44 responden (66,7 %) yang tidak menderita TB paru. Dari 29 responden yang merokok terdapat 7 responden yang menderita TB paru dan 22 responden yang tidak menderita TB paru. Dari 37 responden

yang tidak merokok terdapat 15 responden yang menderita TB paru dan 22 responden yang tidak menderita TB paru.

Hasil uji statistik dengan menggunakan uji *Chi-Square* diperoleh nilai $P=0,161$ ($>0,05$), yang menunjukkan tidak ada hubungan bermakna antara kebiasaan merokok dengan kejadian Tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar Tahun 2012.

B. Pembahasan

1. Hubungan antara Ventilasi Rumah dengan Kejadian Tuberkulosis Paru

Hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah kota Makassar berdasarkan uji hipotesis menunjukkan bahwa ada hubungan bermakna antara keadaan ventilasi dengan kejadian Tuberkulosis paru. Keadaan ventilasi rumah merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian Tuberkulosis paru. Hal tersebut dapat dipahami, karena ventilasi memiliki berbagai fungsi diantaranya adalah untuk membebaskan ruangan rumah dari bakteri-bakteri patogen, terutama kuman tuberkulosis. Kuman TB yang ditularkan melalui *droplet nuclei*, dapat melayang di udara karena memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu sekitar 50 mikron. Apabila ventilasi rumah memenuhi syarat kesehatan, maka kuman TB dapat terbawa keluar ruangan rumah, tetapi apabila ventиласinya buruk maka kuman TB akan tetap ada di dalam rumah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, letak bangunan rumah responden juga mempengaruhi keadaan ventilasi rumah mereka karena jika letak bangunan rumah berada di belakang rumah-rumah permanen dan bertingkat maka keadaan rumah responden pasti tidak memiliki ventilasi. Begitupun rumah yang memiliki ventilasi sebagian besar masyarakat hanya menjadikan ventilasi rumahnya sebagai hiasan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Ikeu Nurhidayah dkk di Sumedang (2007), membuktikan bahwa keadaan ventilasi rumah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kejadian Tuberkulosis paru dan penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah di Cilacap (2008) yang menyatakan bahwa ventilasi merupakan faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian Tuberkulosis Paru.

2. Hubungan antara Pencahayaan dengan Kejadian Tuberkulosis Paru

Pengukuran pencahayaan dilakukan pada masing-masing rumah responden pada ruang tengah dengan mengukur di 5 titik. Kemudian untuk menentukan memenuhi syarat atau tidaknya pencahayaan rumah responden maka hasil yang diperoleh dibandingkan dengan standar pencahayaan rumah berdasarkan Kepmenkes RI Nomor.829/menkes/SK/VII/1999 tentang persyaratan kesehatan rumah tinggal yaitu minimal intensitasnya 60 lux atau tidak menyilaukan.

Hasil penelitian didapatkan nilai $P=0,024$ berarti H_0 ditolak atau H_a diterima yang menunjukkan bahwa ada hubungan bermakna antara pencahayaan rumah dengan kejadian Tuberkulosis paru di wilayah kerja

Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar. Dengan demikian keadaan pencahayaan yang tidak memenuhi syarat mempunyai hubungan dengan kejadian Tuberkulosis Paru. Karena banyak jenis bakteri dapat dimatikan jika bakteri tersebut mendapatkan sinar matahari secara langsung, demikian juga kuman tuberkulosis dapat mati karena cahaya sinar ultraviolet dari sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan. Diutamakan cahaya matahari pagi karena cahaya matahari pagi mengandung sinar ultraviolet yang dapat membunuh kuman TB sehingga tidak ada kesempatan terjadi infeksi kuman TB terhadap penghuni rumah tersebut. Transmisi penularan TB paru terjadi di ruangan, dimana *Droplet nuclei* dapat tinggal di udara dalam waktu yang lama.

Selain itu, penempatan ventilasi yang tidak memenuhi syarat kesehatan akan mengakibatkan terhalangnya sinar matahari masuk ke dalam rumah, padahal kuman TB hanya dapat terbunuh oleh sinar matahari alamiah secara langsung (Depkes RI, 2002).

Dalam al-Quran dijelaskan dalam QS Al-Duha/93:1-2

وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ

Terjemahnya:

1. *Demi waktu Dhuha (ketika matahari naik sepenggalah).*
2. *Dan demi malam apabila telah sunyi (gelap), (Departemen Agama RI, 2008:596)*

Menurut Shihab (2009) dijelaskan bahwa matahari, ketika naik sepenggalah, cahayanya memancar menerangi seluruh penjuru, pada saat yang sama ia tidak terlalu terik sehingga tidak mengakibatkan gangguan sedikit pun, bahkan panasnya memberikan kesegaran, kenyamanan dan kesehatan. Matahari tidak membedakan antara satu lokasi dan lokasi yang lain kalaupun ada sesuatu yang tidak disentuh oleh cahayanya, hal itu bukan disebabkan oleh matahari itu tetapi karena posisi lokasi itu sendiri yang dihalangi sesuatu. Oleh karena itu penempatan jendela harus diperhatika sesuai ketentuan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tonny Lumban Tobing di Tapanuli Utara (2008) bahwa pencahayaan sinar matahari mempunyai hubungan yang signifikan dengan potensi penularan TB Paru dan juga penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah di Cilacap (2008) yang menunjukkan bahwa pencahayaan merupakan faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian Tuberkulosis Paru dengan analisis bivariat menunjukkan $OR=4,214$ yang berarti bahwa seseorang yang tinggal di dalam rumah dengan pencahayaan yang tidak memenuhi syarat mempunyai resiko 4,214 kali lebih besar menderita Tuberkulosis paru dibandingkan dengan orang yang bertempat tinggal dalam rumah dengan pencahayaan yang memenuhi syarat.

3. Hubungan antara Kepadatan Hunian dengan Kejadian Tuberkulosis Paru

Kepadatan hunian adalah perbandingan antara luas lantai rumah jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tinggal. Kepadatan penghuni rumah juga dapat mempengaruhi kesehatan, karena jika suatu rumah yang penghuninya padat dapat memungkinkan terjadinya penularan penyakit dari satu manusia kemanusia lainnya. Kepadatan penghuni didalam ruangan yang berlebihan akan berpengaruh, hal ini dapat berpengaruh terhadap perkembangan bibit penyakit dalam ruangan. Kepadatan penghuni dalam rumah merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan insiden penyakit Tuberkulosis Paru dan penyakit-penyakit lainnya yang dapat menular.

Suatu rumah dikatakan padat apabila diperoleh hasil bagi antara luas lantai dengan jumlah penghuni $\geq 10 \text{ m}^2/\text{orang}$. Oleh sebab itu jumlah penghuni di dalam rumah harus disesuaikan dengan luas rumah agar tidak terjadi kepadatan yang berlebihan (Lubis, 1989) .

Teori tersebut diatas dihubungkan dengan penderita tuberkulosis paru dimana hasil penelitian kepadatan penghuni menunjukkan bahwa dari 66 responden yang kepadatan rumahnya tidak memenuhi syarat 40 rumah dan terdapat 26 rumah yang kepadatannya memenuhi syarat.

Pada penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar, dari 66 responden ditemukan 26 (39,4%) responden yang memiliki rumah yang padat penghuni dan dari 26 responden yang memiliki rumah padat penghuni atau tidak memenuhi

syarat tersebut terdapat 13 responden yang merupakan penderita Tuberkulosis Paru. Rata-rata dalam satu rumah tinggal dihuni oleh beberapa KK(Kepala Keluarga) sehingga rumah mereka dianggap tidak memenuhi syarat karena tidak sebanding antara luas lantai rumah dengan jumlah penghuni.

Hasil uji statistik *Chi-Square* didapatkan nilai $P=0,021$ yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima yang berarti ada hubungan yang bermakna antara kepadatan hunian dengan penyakit tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juslan (2011) di Kendari yang menyatakan bahwa secara statistik ada hubungan antara Kepadatan hunian dengan penderita tuberkulosis paru. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Tonny Lumban Tobing (2008) di Tapanuli Utara yang menyatakan bahwa kepadatan hunian mempunyai hubungan yang signifikan dengan potensi penularan TB Paru.

4. Hubungan antara Riwayat Kontak serumah dengan Kejadian Tuberkulosis Paru

Riwayat kontak Tuberkulosis didefinisikan sebagai keberadaan penderita TB dalam rumah sehingga berpotensi menularkan kuman TB terhadap anggota keluarga yang lain. Hasil penelitian yang dilakukan didapatkan dari 66 responden, ada 29 (43,9%) responden yang ada riwayat kontak serumahnya dan 37 (56,1%) responden yang tidak

memiliki riwayat kontak serumah. Dari hasil analisis *Chi-Square* didapatkan nilai $P=0,023$ yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima yang berarti ada hubungan bermakna antara riwayat kontak serumah dengan kejadian Tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar Tahun 2012. Hal ini karena kontak di dalam rumah dengan anggota keluarga yang sakit TB atau pernah sakit TB dan satu kamar dengan penderita TB di malam hari terutama bila satu tempat tidur.

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya riwayat kontak serumah angka kejadian Tuberkulosis Paru pada responden lebih rendah dibandingkan yang tidak menderita Tuberkulosis Paru. Hal ini dikarenakan dalam mendiagnosis kejadian Tuberkulosis Paru harus dilakukan beberapa tahap seperti pemeriksaan jasmani maupun pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan bakteriologis, pemeriksaan darah dan uji tuberkulin, namun tidak semua anggota keluarga mendatangi pelayanan kesehatan untuk memeriksakan diri sehingga mereka tidak terdiagnosa menderita Tuberkulosis Paru.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan terjadinya penularan melalui kontak serumah pada beberapa responden. Terdapat tiga orang penderita yang ketiganya adalah memiliki hubungan keluarga dekat serta tinggal dalam satu rumah. Terdapat pula responden yang mengaku mendapat penularan TB Paru dari suaminya, kakeknya dan saudaranya. Riwayat kontak serumah sangat mempengaruhi mekanisme penularan TB

Paru terutama untuk keluarga yang tinggal dalam satu rumah ataupun bertetangga dan sering beraktifitas bersama dengan penderita TB Paru. Dalam satu keluarga apabila terdapat satu orang penderita maka keluarga yang lain beresiko untuk tertular penyakit Tuberkulosis Paru dan akan lebih beresiko lagi apabila didukung oleh perilaku penderita Tuberkulosis Paru yang tidak sehat.

Perilaku adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Skinner (Notoatmodjo, 2003) merumuskan determinan perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu determinan atau faktor internal dan faktor eksternal.

Berdasarkan teori Skinner, dapat dikatakan perilaku penderita TB Paru yang tidak menutup mulut pada saat batuk dan tidak membuang dahaknya ke tempat khusus ludah merupakan tindakan yang nyata dalam bentuk kegiatan yang dapat dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri si penderita (faktor internal) yakni pengetahuan si penderita . Penderita tidak menyadari bahwa dengan perilaku yang tidak menutup mulut pada saat batuk dan tidak membuang dahaknya ke tempat khusus ludah akan semakin meningkatkan resiko terjadinya penularan melalui udara yang kemudian akan terhisap oleh anggota keluarga yang lain.

Dalam QS Al-Tahrim/66: 6 perintah untuk selalu menjaga keluarga.

يَأَيُّهَا الْذِينَ إِمَانُوا قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Departemen Agama RI, 2008:560).

Hasil penelitian ini sama dengan yang dilakukan oleh Dwi Purnomo Sidhi di Semarang (2010) yaitu riwayat kontak merupakan faktor resiko terhadap kejadian infeksi TB pada anak dengan OR 3,759 dan penelitian yang dilakukan oleh Salman Patanding di Kabupaten Enrekang (2005) yang menyatakan bahwa riwayat kontak serumah mempunyai hubungan bermakna dengan kejadian Tuberkulosis Paru.

5. Hubungan antara Kebiasaan Merokok dengan Kejadian Tuberkulosis Paru

Dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa dari 66 responden ada 37 (56,1%) responden yang tidak memiliki kebiasaan merokok dan 29

(43,9%) responden yang memiliki kebiasaan merokok, dengan hasil analisis *Chi-Square* didapatkan nilai $P= 0,161$ yang menunjukkan bahwa Ho diterima atau Ha ditolak yang berarti tidak ada hubungan yang bermakna antara kebiasaan merokok dengan kejadian Tuberkulosis paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar.

Variabel kebiasaan merokok tidak berhubungan dengan kejadian TB karena responden yang diteliti tidak semua perokok terutama yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini mempengaruhi hasil penelitian karena penderita Tuberkulosis Paru bukan hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Jumlah seluruh penderita Tuberkulosis Paru sebanyak 22 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 13 orang dan perempuan sebanyak 9 orang.

Berdasarkan data hasil penelitian didapatkan jumlah responden yang sama antara responden yang tidak menderita TB dan memiliki kebiasaan merokok dengan responden yang tidak menderita TB dan tidak memiliki kebiasaan merokok sehingga tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan kejadian TB. Kebiasaan merokok dalam hal ini tidak mempengaruhi angka kejadian TB karena diperoleh hasil yang sama atau seimbang antara responden yang memiliki kebiasaan merokok dan responden yang tidak memiliki kebiasaan merokok.

Kebiasaan merokok ini pun juga banyak dilakukan oleh kalangan laki-laki yang tidak menderita TB dibandingkan dengan yang menderita TB. Hal ini karena mereka yang menderita TB menghentikan kebiasaan

merokok beberapa tahun sebelumnya sehingga mereka sudah tidak terhitung lagi sebagai perokok.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Aditama (2009) yang menunjukkan ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan aktif tidaknya penyakit Tuberkulosis, serta faktor resiko terjadinya Tuberkulosis paru pada dewasa muda, dan terdapat *dose-response relationship* dengan jumlah rokok yang dihisap perharinya.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menunjukkan besarnya hubungan (kemaknaan) beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian Tuberkulosis Paru yakni, ventilasi, pencahayaan, kepadatan hunian, riwayat kontak serumah dan perilaku merokok. Dimana diketahui ada banyak faktor yang mempengaruhi kejadian Tuberkulosis Paru namun karena penguasaan ilmu pengetahuan peneliti tentang Tuberkulosis Paru masih banyak kekurangan serta keterbatasan waktu, tenaga, dana dan peralatan maka peneliti hanya menunjukkan hubungan beberapa faktor saja.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Tuberkulosis Paru yang telah dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar Tahun 2012, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada hubungan bermakna antara keadaan ventilasi rumah dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar.
2. Ada hubungan bermakna antara pencahayaan rumah dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar .
3. Ada hubungan bermakna antara kepadatan hunian rumah dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar.
4. Ada hubungan bermakna antara riwayat kontak serumah dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar.
5. Tidak ada hubungan bermakna antara keadaan perilaku merokok dengan kejadian Tuberkulosis Paru di wilayah kerja Puskesmas Maccini Sawah Kota Makassar

B. Saran

1. Kepada pemerintah setempat melalui tenaga kesehatan, perlu ditingkatkan upaya penjaringan terhadap penderita Tuberkulosis Paru baik secara aktif di lapangan maupun pasif di tempat pelayanan kesehatan dengan melibatkan langsung petugas kesehatan serta memberikan pengobatan khusus kepada penderita Tuberkulosis Paru.
2. Untuk mengurangi resiko penularan Tuberkulosis Paru, agar dilakukan perbaikan kondisi lingkungan rumah dan diharapkan kepada masyarakat yang memiliki riwayat kontak serumah untuk mengurangi kontak dengan penderita dan kepada bayi diberikan vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan.
3. Diharapkan adanya kerjasama antara pihak puskesmas dengan masyarakat melalui penyuluhan kesehatan tentang penyakit TB paru, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, serta memberikan pemahaman khusus kepada penderita TB dan keluarga.
4. Bagi peneliti selanjutnya, agar dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melihat faktor-faktor lain demi kesempurnaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama T.Y. 2004 . *Rokok dan tuberkulosis paru.* Di akses melalui <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0304/16/ilpeng/259139.htm>, pada tanggal 30 Mei 2012.
- Arief. 2011. *Lama Menghisap Rokok.* Diakses melalui <http://www.scribd.com/doc/45480624/37/Lama-Menghisap-Rokok>. Pada Tanggal 1 Juli 2012.
- BPBM. 2009. *Lingkungan sehat untuk TB.* Diakses melalui <http://bbkpmska.com/2009/05/lingkungan-sehat-untuk-tb.html>, pada tanggal 30 Mei 2012.
- Departemen Agama RI. 2008. *Al-Quran dan terjemahannya.* Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Departemen Kesehatan RI. 2006. *Kerangka Kerja Strategi Pengendalian TBC di Indonesia 2006-2010.* Jakarta
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2008. *Pedoman Nasional penanggulangan Tuberkulosis.* Jakarta. Direktorat Jenderal Pemerantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan(P2PL).
- Dekkes RI. 2002. *Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis.* Cetakan kedelapan. Jakarta
- Departemen Kesehatan RI. 1989. *Pengawasan Penyehatan Lingkungan Pemukiman.* Jakarta: Depkes RI
- Departemen Kesehatan RI. 2011. *Strategi Nasional Pengendalian TB di Indonesia 2011-2014.* Jakarta: Depkes RI
- Dinas Kesehatan Kota Makassar. 2009. *Data Penderita TB.* Makassar
- Entjang I. 2000. *Ilmu Kesehatan Masyarakat.* Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Fatimah. 2008. *Faktor Kesehatan Lingkungan rumah yang berhubungan dengan kejadian TB Paru Di Kabupaten Cilacap (kecamatan: Sidareja, Cipari, Kedungreja, Patimuan, Gandrungmangu,Bantarsari) tahun 2008.* Diakses melalui http://eprints.undip.ac.id/24695/1/SITI_FATIMAH.pdf. Pada tanggal 1 Juli 2012.

Global TB Control WHO Report 2008 dan 2009. Diakses melalui <http://m.infeksi.com/news> (diakses pada tanggal 5 Februari 2011) pada tanggal 14 Juni 2012.

Herdianto P. 2011. Skripsi: *Pelaksanaan dan pengawasan pengobatan terhadap kepuasan penderita TB paru Di Puskesmas Mamajang Kota Makassar tahun 2011*: Makassar

Juslan. 2011. Skripsi. *Hubungan Kepadatan Hunian, Ventilasi Rumah Dan Pengetahuan Dengan Kejadian Penyakit Tuberkulosis Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Poasia Kota Kendari Tahun 2011*: Kendari

Kepmenkes RI No.829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Tinggal

Lubis, P. 1989. *Perumahan Sehat*. Depkes RI: Jakarta

Mukono, 2006. *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press

Patanding. S. 2005. Skripsi: *Beberapa Faktor Yang Berhubungan Dengan Dengan Kejadian Tuberkulosis Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Kota Enrekang Tahun 2005*. Maksasar: Universitas Hasanuddin.

Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel 2009

Nafis, Cholil. 2007. *Penanggulangan TB Perspektif Islam*. diakses melalui <http://nafisinststitute.blogspot.com/2007/12/penanggulangan-tb-perspektif-islam.html?m=1>, pada tanggal 5 Juni 2012

Naiem, Furqaan dkk. 2009. *Panduan Penulisan Skripsi*. Fakultas Ilmu Kesehatan. Makassar: UIN Alauddin.

Notoatmodjo, S. 2003. *Ilmu Kesehatan Masyarakat, Prinsip-prinsip Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nurhidayah DKK. 2007. *Hubungan antara Karakteristik Lingkungan Rumah dengan Kejadian Tuberkulosis (TB)pada anak di Kecamatan Paseh kabupaten Sumedang*. Diakses melalui http://resources.unpad.ac.id/unpad-content/uploads/publikasi_dosen/MAKALAH%20TUBERKULOSIS-IKEU.pdf, pada tanggal 5 Juni 2012.

Rahman.S. 2005. Skripsi: *Studi faktor resiko lingkungan terhadap kejadian tb paru diwilayah kecamatan manggala kota makassar tahun 2005*.Makassar. Universitas Hasanuddin.

Riadi R. 2011. Serumah dengan penderita TB. Diakses Melalui [http://www.scribd.com/doc/61446544/24/Serumah-dengan-Sumber Penular](http://www.scribd.com/doc/61446544/24/Serumah-dengan-Sumber-Penular). Pada tanggal 5 Juni 2012

Sastroasmoro, Sudigo. 2008. *Dasar-dasar metode penelitian klinis*. Jakarta: CV. Sagung seto.

Shihab, M.Quraish. 2009. *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati. Jakarta.

Tobing T.L. 2008. *Pengaruh Perilaku Penderita TB Paru dan Kondisi Rumah terhadap pencegahan Potensi Penularan TB pada Keluarga di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2008*. Diakses melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/6656/1/09E01348.pdf>, pada tanggal 5 Juni 2012.

Warta Gerdunas TB. 2010. *Tingkatkan Inovasi Percepat aksi melawan Tuberkulosis*. Volume 16. Jakarta



KUESIONER PENELITIAN

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN TUBERKULOSIS PARU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MACCINI SAWAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2012

Nomor Kuesioner :

Tanggal wawancara :

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur :
3. Alamat :

B. KEJADIAN TB PARU

Berdasarkan hasil diagnosis yang tercantum dalam rekam medik maka responden didiagnosa?

- a. BTA (+)
- b. BTA (-)
- c. Tidak ditemukan BTA

C. KEPADATAN HUNIAN


1. Berapa jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah ini.....
2. Tingkat kepadatan hunian rumah ini? $\frac{\text{Luas lantai}}{\text{jumla h peng huni}} = \frac{\dots}{\dots} = \dots$

D. RIWAYAT KONTAK SERUMAH

1. Apakah ada anggota keluarga yang menderita/pernah menderita TB?
 - a. Ada (lanjut no.2-7)
 - b. Tidak ada (lanjut no.8-9)
2. Kapan diketahui menderita TB paru?bulan.....tahun.....
3. Apakah sementara dalam pengobatan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah penderita sering bersama anggota keluarga yang lain?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Jika batuk, apakah dahaknya dibuang ke tempat khusus ludah?
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Jika batuk, apakah penderita menutup mulut?
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Apakah dalam 3 bulan ada anggota keluarga yang datang menginap?
 - a. Ada
 - b. Tidak ada
8. Apakah ada tetangga yang menderita TB?
 - a. Ada (jika ada, lanjut no.9)
 - b. Tidak ada
9. Apakah anda sering bersama tetangga yang menderita TB?
 - a. Ya
 - b. Tidak

E. KEBIASAAN MEROKOK

1. Apakah anda merokok sekarang?
 - a. Ya (lanjut No. 2 dan 3)
 - b. Tidak (lanjut No.4)
2. Jika anda merokok sekarang, berapa batang yang anda habiskan dalam sehari?
 - a. Kurang dari 10 batang
 - b. 10-20 batang
 - c. Lebih dari 20 batang
3. Dimana anda paling sering merokok?
 - a. Di dalam rumah
 - b. Di luar rumah
4. Apakah anda pernah merokok?
 - a. Ya, kapan berhenti?
 - b. Tidak



LEMBAR OBSERVASI

A. VENTILASI

No	Item	Keterangan
1	Ada ventilasi	a. Ada b. Tidak ada
2	Jumlah ventilasi	
2	Luas ventilasi	m^2
3	Luas Lantai	m^2

B. PENCAHAYAAN

No	Item	Keterangan
1	Pencahayaan	Lux

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR