

**ISOLASI MIKROBA PENGHASIL ANTIBIOTIKA DARI
TANAH TEMPAT PENGOLAHAN AYAM DI JALAN
ABU BAKAR LAMBOGO, KOTA MAKASSAR**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Farmasi Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Oleh

**SUFYAN TSAURI
NIM. 70100108081**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2012**

**ISOLASI MIKROBA PENGHASIL ANTIBIOTIKA DARI
TANAH TEMPAT PENGOLAHAN AYAM DI JALAN
ABU BAKAR LAMBOGO, KOTA MAKASSAR**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Farmasi Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Oleh

**SUFYAN TSAURI
NIM. 70100108081**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 10 Agustus 2012

Penyusun,

Sufyan Tsauri
NIM: 70100108081



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Isolasi Mikroba Penghasil Antibiotika dari Tanah Tempat Pengolahan Ayam di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar” yang disusun oleh Sufyan Tsauri, NIM: 70100108081, mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Jum’at tanggal 10 Agustus 2012 bertepatan dengan 21 Ramadhan 1433 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar, 10 Agustus 2012 M
21 Ramadhan 1433 H

DEWAN PENGUJI:

- Ketua** : **Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH., MH. Kes.**(.....)
- Sekretaris** : **Drs. Wahyuddin G, M.Ag.** (.....)
- Pembimbing I** : **Haeria, S.Si., M.Si.** (.....)
- Pembimbing II:** **Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt.** (.....)
- Penguji I** : **Mukhriani, S.Si., Apt.** (.....)
- Penguji II** : **Prof. Dr. H. Bahaking Rama, MS.** (.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, M.PH., MH. Kes
NIP. 19530119 198110 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah adalah kata yang pantas kita ucapkan karena berkat limpahan rahmat dan karunia Allah SWT sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan tak lupa pula kita panjatkan salam dan shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan lainnya untuk tegaknya syiar Islam yang pengaruh dan manfaatnya hingga kini masih terasa. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda H. Muh. Dahlan Yaring dan Ibunda Hj. Basse Asia serta kakanda Nurwahyuni yang tiada henti-hentinya mendoakan, mencurahkan kasih sayangnya, dan selalu memberikan nasehat, kritik, semangat serta motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.
2. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., M.S selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. dr Rasjidin Abdullah M.PH., M.H.Kes. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Ibu Fatmawaty Mallapiang, S.KM., M.Kes., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan pembimbing kedua yang telah memberikan banyak masukan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan dan bimbingannya selama penulis menempuh pendidikan dan melakukan penelitian mendapatkan rahmat dari Allah SWT. Amin.
6. Bapak Drs. Wahyuddin G, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Ibu Gemy Nastity Handayani S Si. M.Si., Apt., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Ibu Haeria, S.Si., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus sebagai pembimbing pertama dan Pembimbing Akademik atas segala keikhlasannya memberikan bimbingan, motivasi serta meluangkan waktu, tenaga, pikiran kepada penulis sejak rencana penelitian sampai tersusunnya skripsi ini. Semoga bantuan dan bimbingannya selama penulis menempuh pendidikan dan melakukan penelitian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.
9. Bapak Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M.S dan Ibu Mukhriani, S.Si., Apt. selaku penguji atas semua saran dan kritiknya demi perbaikan skripsi ini.

10. Bapak Muh. Fitrah, S.Si., Apt., Ibu Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt, Ibu Surya Ningsih., S.Si., Apt., dan dosen-dosen Jurusan Farmasi baik yang berada di luar maupun di dalam lingkup Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
12. Laboran di laboratorium Farmasi Andi Armisman Edy Paturusi, S.Farm., Muh. Rusydi S.Farm., Apt., Khizrin Mirwan., S.Farm., Apt., dan Ahmad Irsyad Aliyah, S.Farm, Apt., serta Muh. Firdaus, S.Farm yang telah membantu kelancaran pada saat penelitian dilakukan.
13. Rekan-rekan seperjuangan, Emulsi 2008 khususnya anak-anak Barsa Community yang terus menemani dan memberikan semangat yang tak pernah padam bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
14. Kepada kakak-kakak angkatan 2005, 2006, dan 2007 serta adik-adik angkatan 2009, 2010, dan 2011 penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala kebersamaannya selama ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Makassar, 10 Agustus 2012

Sufyan Tsauri

ABSTRAK

Nama Penyusun : SUFYAN TSAURI

NIM : 70100108081

Judul Skripsi : Isolasi Mikroba Penghasil Antibiotika dari Tanah Tempat Pengolahan Ayam di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar

Telah dilakukan penelitian isolasi mikroba penghasil antibiotika dari tanah tempat pengolahan ayam di Jalan Abu Bakar Lambogo Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh isolat mikroba penghasil antibiotik yang dapat menghambat mikroba uji dari tanah pengolahan ayam. Tahap pertama isolasi mikroba dilakukan pengenceran 10^{-1} hingga 10^{-7} dengan menggunakan metode tuang pada medium Glukosa Nutrient Agar (GNA) dan Potato Dextrosa Agar (PDA), kemudian difermentasi menggunakan medium Maltosa Yeast Broth (MYB). Aktivitasnya diujikan menggunakan metode difusi agar dalam medium Glukosa Nutrient Agar (GNA) terhadap mikroba uji. Tahap selanjutnya dilakukan pengamatan morfologi, secara makroskopik dengan melihat pertumbuhan bakteri pada medium NA tegak, NA miring, dan medium NB, sedangkan secara mikroskopik dilakukan pengecatan Gram. Kemudian dilakukan pengujian aktivitas biokimia yang meliputi uji motilitas, uji katalase, uji sitrat, uji pertumbuhan variasi suhu dan pH.

Hasil isolasi didapatkan 4 isolat bakteri dan 2 isolat jamur dan semua isolat memberikan aktivitas : untuk bakteri uji *Escherichia coli* dihambat oleh isolat IB 2. Untuk bakteri uji *Staphylococcus aureus* dihambat oleh isolat IB 1, IB 2, IB 3, dan IB 4. Untuk bakteri uji *Streptococcus mutans* dihambat oleh isolat IB 2 dan IB 4. Untuk bakteri uji *Vibrio sp* dihambat oleh isolat IB 4. Untuk bakteri uji *Bacillus subtilis* dan *Staphylococcus epidermidis* dihambat oleh isolat IB 1, IB 2, dan IB 3. Untuk bakteri uji *Pseudomonas aeruginosa* dihambat oleh isolat IB 2, IB 3, dan IB 4. Untuk bakteri uji *Salmonella typhi* dihambat oleh isolat IB 2. Untuk jamur uji *Candida albicans* dihambat oleh isolat IB 2 dan IB 4. Hasil dari pengujian mikroskopik yaitu semua isolat termasuk bakteri Gram Negatif berbentuk bulat dan untuk uji aktivitas biokimia diketahui bahwa semua isolat bersifat motil (bergerak), mengandung enzim katalase, dan termasuk dalam mikroba mesofilik (mesotermik).

ABSTRACT

Author : SUFYAN TSAURI
Student Reg. Number : 70100108081
Title : Isolation of Microbes Producing Antibiotic from Soil of
Chicken Processing Place at Abu Bakar Lambogo Street,
Makassar City.

A research about isolation of microbe producing antibiotic from from Soil of Chicken Processing Place at Abu Bakar Lambogo Street, Makassar City. This research aims to get microbes from soil of chicken processing place. In first step, isolation of microbe was done by diluting at concentration 10^{-1} to 10^{-7} by using pour method on Glukosa Nutrient Agar (GNA) medium and Potato Dextrose Agar (PDA) medium, then fermented by using Maltosa Yeast Broth (MYB) medium. Their activity was tested by using agar diffusion method on Glukosa Nutrient Agar (GNA) medium to tested microbe. Next step, observation of morphologi was done in a macroscopic manner by looking growing of upright NA medium, sloping NA medium, and NB medium and in a microscopic manner by gram painting. Next, biochemistry activity testing was done that include motility test, catalase test, citrate test, and growing at variant temperature and pH test.

The result of isolation was 4 bacteria isolat and 2 fungus and all isolates which gives the activity : for bacteria test *Escherichia coli* inhibited by isolate IB 2. For bacteria test *Staphylococcus aureus* inhibited by isolate IB 1, IB 2, IB 3, and IB 4. For bacteria test *Streptococcus mutans* inhibited by isolate IB 2 and IB 4. For bacteria test *Vibrio sp* inhibited by isolate isolat IB 4. For bacteria test *Bacillus subtilis* and *Staphylococcus epidermidis* inhibited by isolate IB 1, IB 2, and IJ 2. For bacteria test *Pseudomonas auroginosa* inhibited by isolate IB 2, IB 3, and IJ 1. For bacteria test *Salmonella typhi* inhibited by isolate IB 4. For fungus test *Candida albicans* inhibited by isolate IB 2 and IB 4. The result observation of morphologi that all isolates were included gram Negative bacteria that the shapes were coccus and result of biochemistry activity testing that all isolates are motile (moving), contain enzyme catalase, and included mesophilic (mesothermic) microbes.

M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Uraian Sampel	6
B. Antibiotik	8
C. Uji Antibiotika dengan Metode Difusi Agar	13
D. Pengecatan Gram	14
E. Pengujian Aktivitas Biokimia	16
F. Uraian Mikroba Uji	20
G. Tinjauan Islam Mengenai Mikroba Penghasil Antibiotik	28

BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. <i>Alat dan Bahan yang Digunakan</i>	35
B. <i>Cara Kerja</i>	36
C. <i>Penyiapan Mikroba Uji</i>	38
D. <i>Karakterisasi Mikroorganisme</i>	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. <i>Hasil Penelitian</i>	43
B. <i>Pembahasan</i>	49
BAB V PENUTUP.....	67
A. <i>Kesimpulan</i>	67
B. <i>Saran</i>	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70
BIOGRAFI	96

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Hasil Pemurnian Isolat Mikroba Tanah	44
Tabel 2 Hasil Pengukuran Zona Hambat Fermentat Isolat Mikroba Terhadap Mikroba Uji.....	44
Tabel 3 Hasil Pengecatan Gram Mikroba Tanah	46
Tabel 4 Hasil Pengamatan Morfologi Bakteri Secara Makroskopik	46
Tabel 5 Hasil Pengamatan Morfologi Jamur Secara Makroskopik.....	47
Tabel 6 Hasil Pengamatan Morfologi Bakteri dan Jamur Secara Makroskopik melalui Metode Agar Lempengan.....	47
Tabel 7 Hasil Pengamatan Uji Aktivitas Biokimia	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Skema kerja Isolasi dan Karakterisasi Mikroba
	Penghasil Antibiotik..... 70
Gambar 2	Foto Hasil Isolat Bakteri dari Tanah pada Media Agar..... 71
Gambar 3	Foto Hasil Isolat Jamur dari Tanah pada Media Agar..... 72
Gambar 4	Foto Hasil Pemurnian Isolat Bakteri dari Tanah dengan Metode Kuadran pada Medium NA 73
Gambar 5	Foto Hasil Pemurnian Isolat Jamur dari Tanah dengan Metode Kuadran pada Medium PDA..... 73
Gambar 6	Foto Hasil Isolat Murni Bakteri dari Tanah pada Medium NA Miring..... 74
Gambar 7	Foto Hasil Isolat Murni Jamur dari Tanah pada Medium PDA Miring 75
Gambar 8	Foto Hasil Fermentasi Bakteri dari Tanah pada Medium MYB 76
Gambar 9	Foto Hasil Fermentasi Jamur dari Tanah pada Medium MYB..... 77
Gambar 10	Foto Hasil Pengujian Penghambatan Fermentat Isolat Bakteri terhadap Mikroba Uji..... 78
Gambar 11	Foto Hasil Pengujian Penghambatan Fermentat Isolat Jamur terhadap Mikroba Uji..... 79

Gambar 12	Foto Hasil Pengecatan Gram Isolat Bakteri Murni	80
Gambar 13	Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Bakteri pada Medium Agar Miring.....	81
Gambar 14	Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Bakteri pada Medium Agar Tegak	82
Gambar 15	Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Bakteri pada Medium Cair.....	83
Gambar 16	Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Bakteri pada Medium Agar Lempengan	83
Gambar 17	Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Jamur pada Medium Agar Miring.....	84
Gambar 18	Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Jamur pada Medium Agar Tegak	85
Gambar 19	Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Jamur pada Medium Cair.....	86
Gambar 20	Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Jamur pada Metode Agar Cawan	86
Gambar 21	Foto Sampel Tanah yang di ambil dari 4 titik	87
Gambar 22	Foto Blank Disk yang Digunakan	88

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Skema Kerja	70
Lampiran 2 Gambar Hasil Pengamatan	71
Lampiran 3 Pembuatan Medium	89
Lampiran 4 Pembuatan Pereaksi	93



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah secara alamiah terbentuk sebagai hasil dari kombinasi proses fisik, kimia dan biologi. Tanah merupakan media yang baik sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya beraneka ragam mikroorganisme. Baik itu di tanah yang kering dan kasar, maupun pada tanah yang lembab mikroorganisme akan tetap tumbuh pada tanah tersebut (Panagan, 2008: 37).

Kandungan dan jenis mikroba yang ditemukan dalam tanah tergantung pada jenis dan keseragaman mikroba adalah komposisi tanah, pH, kelembaban dan kedalaman tanah. Pada tanah yang ber-pH asam, populasi fungi lebih dominan, sedangkan pada tanah yang digenangi air, populasi mikroba anaerob lebih dominan (Bibiana, 1994: 129).

Timbulnya berbagai penyakit infeksi baru yang membutuhkan antibiotik di satu sisi dan adanya sifat resistensi kuman terhadap antibiotik yang telah ada di sisi lain, mendorong terus dilakukannya penelitian untuk menghasilkan antibiotik jenis baru yang lebih ampuh untuk membunuh kuman penyakit (Ambarwati dan Azizah, 2009: 102).

Sumber mikroorganisme penghasil antibiotika antara lain berasal dari tanah, air laut, lumpur, kompos, isi rumen, limbah domestik, bahan makanan busuk dan lain-lain. Namun kebanyakan mikroba penghasil antibiotika diperoleh dari mikroba tanah terutama jenis streptomices dan jamur (Suwandi, 1989: 1).

Bakteri merupakan kelompok mikroorganisme dalam tanah yang paling dominan dan mungkin meliputi separuh dari biomassa mikroba dalam tanah. Bakteri terdapat dalam tanah, tetapi populasinya menurun sesuai dengan bertambahnya kedalaman tanah. Bakteri tanah yang paling umum termasuk dalam genus *Pseudomonas*, *Arthrobacter*, *Clostridium*, *Achromobacter*, *Bacillus*, *Micrococcus*, *Flavobacterium*, *Corynebacterium*, *Sarcina*, dan *Mycobacterium* (Rao, 1994: 34-35).

Teknik isolasi mikroorganisme adalah suatu usaha untuk menumbuhkan mikroba di luar dari lingkungan alamianya. Pemisahan mikroorganisme dari lingkungannya ini bertujuan untuk memperoleh biakan bakteri yang sudah tidak bercampur lagi dengan bakteri lainnya dan ini disebut dengan biakan murni (Dwyana, 2006: 24).

Allah berfirman dalam Q.S. Ar Ruum/30; 20 yang berbunyi (Departemen Agama RI, 2009: 477):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak"

Dari ayat di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwa sumber kehidupan itu berasal dari tanah. Sebagai contoh, manusia yang merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah itu sejatinya diciptakan dari tanah, begitupun mikroorganisme yang merupakan makhluk yang paling sederhana yang diciptakan oleh Allah SWT. Hal ini berkaitan erat

dengan penelitian ini karena tanah merupakan asal dari semua kehidupan makhluk hidup, seperti mikroba penghasil antibiotik yang akan diisolasi dari tanah tempat pengolahan ayam.

Allah menciptakan manusia dari saripati tanah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al Mu'minuun/23; 12 (Departemen Agama RI, 2009: 475):

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ

Terjemahnya:

“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.”

Pada ayat ini diterangkan kejadian manusia itu berasal dari sari pati tanah yang merupakan suatu kejadian yang tidak langsung dari manusia. Hal ini untuk membandingkan antara proses dari arti tanah yang mati dan tidak bergerak dengan manusia yang hidup dan bergerak. Dengan pernyataan ini, dapat diketahui bahwa Allah SWT dapat menjadikan sesuatu yang hidup itu dari benda mati yakni tanah. Sebagai contoh manusia, yang diciptakan oleh Allah dari sari pati tanah. Sama halnya dengan mikroorganisme yang terdapat di dalam tanah yang akan diisolasi sebagai penghasil antibiotik (Shihab,1996: 280).

Pada dasarnya tanah merupakan tempat bertumbuhnya mikroorganisme. Populasi mikroorganisme paling banyak terdapat di dalam tanah, sehingga memudahkan peneliti untuk memperoleh berbagai mikroorganisme yang dapat dijadikan sebagai penghasil antibiotik yang baru. Tanah tempat pengolahan ayam di Jalan Abu Bakar Lambogo merupakan tanah

yang gembur dimana di sekelilingnya tumbuh berbagai tumbuhan, sehingga di dalam tanah tersebut mengandung berbagai mikroorganisme yang dapat dijadikan sebagai sumber antibiotika baru. Tempat pengolahan ayam merupakan tempat pemeliharaan, pemotongan, dan pembuangan dari olahan ayam yang telah dipotong sehingga tanah tersebut mengandung sumber nutrisi bagi mikroorganisme dari limbah yang telah membusuk dan kotoran ayam yang dapat mendukung pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu, pada tanah tersebut belum diketahui apakah benar mengandung mikroba penghasil antibiotik karena belum pernah diadakan penelitian tentang isolasi mikroba penghasil antibiotik dari tanah tempat pengolahan ayam tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukanlah penelitian ini untuk memperoleh mikroba yang berfungsi sebagai penghasil antibiotik dari tanah tempat pengolahan ayam di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah diperoleh isolat mikroba penghasil antibiotik yang terdapat di tanah tempat pengolahan ayam di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar.
2. Jenis mikroba apa yang dapat dihambat oleh isolat dari tanah tempat pengolahan ayam di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memperoleh isolat mikroba penghasil antibiotika yang terdapat di tanah tempat pengolahan ayam di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar.

- b. Untuk mengetahui jenis mikroba apa yang dapat dihambat oleh isolat dari tanah tempat pengolahan ayam di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumber rujukan dan data ilmiah bagi peneliti dan mahasiswa dalam pengujian mikroba penghasil antibiotika dari tanah tempat pengolahan ayam di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar.
- b. Sebagai salah satu sumber mikroba penghasil antibiotika untuk pengembangan produksi antibiotika baru.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Sampel

Tanah terbentuk dari pencampuran komponen penyusun tanah yang bersifat heterogen dan beraneka. Komponen tanah dipilah menjadi tiga fase penyusun tanah, yakni (Sutanto, 2005: 22):

1. Fase padat : bahan mineral dan bahan organik
2. Fase cair : lengas tanah dan air tanah
3. Fase gas : udara tanah.

Tanah merupakan salah satu habitat bagi mikroorganisme, dalam satu gram tanah terdapat jutaan bakteri, fungi, protozoa dan mikroorganisme lain. Menurut Budiyanto (2004), populasi mikroorganisme dalam tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (Ambarwati dan Azizah, 2009: 103):

1. Jumlah dan jenis zat hara dalam tanah
2. Kelembaban
3. Tingkat aerasi
4. Suhu
5. pH
6. Perlakuan pada tanah, seperti pemupukan atau terjadinya banjir.

Tanah terbentuk secara alamiah sebagai hasil dari kombinasi proses fisik, kimia dan biologi. Walaupun di tanah yang keras, kering dan lembab, mikroba akan tetap tumbuh. Sebagian besar mikroba tumbuh dan berkembang

biak di permukaan tanah, bahkan pada segumpal tanah dapat tumbuh beraneka ragam mikroorganisme (Panagan, 2008: 37-38).

Populasi mikroba di dalam tanah terbagi menjadi tiga golongan besar yaitu (Waluyo, 2004: 312-313):

1. Golongan autohtonus, merupakan golongan mikroba yang tetap didapatkan di dalam tanah dan tidak tergantung pada pengaruh-pengaruh lingkungan luar, seperti iklim, temperatur, dan kelembaban.
2. Golongan zimogenik, merupakan golongan mikroba yang kehadirannya di dalam tanah diakibatkan oleh adanya pengaruh-pengaruh luar yang baru misalnya dengan adanya penambahan senyawa organik.
3. Golongan transien, yaitu golongan mikroba yang kehadirannya bersama dengan adanya penambahan secara buatan, misalnya dalam bentuk inoculum (preparat hidup mikroba) *Rhizobium* atau *Azetobacter* ke dalam tanah.

Bakteri merupakan kelompok mikroorganisme dalam tanah yang paling dominan dan mungkin meliputi separuh dari biomassa mikroba dalam tanah. Bakteri terdapat dalam berbagai macam segala tipe tanah tetapi populasinya menurun dengan bertambahnya kedalaman tanah. Bakteri hidup dalam tanah sebagai kokus (bulat $0,5 \mu$), basil (batang $0,5 - 3,0 \mu$) atau spirillum (spiral). Bentuk basil secara umum terdapat dalam tanah sedangkan spirillum sangat jarang terdapat dalam lingkungan alami. Bakteri tanah yang paling umum termasuk dalam genus *Pseudomonas*, *Arthrobacter*, *Clostridium*,

Achromobacter, *Bacillus*, *Micrococcus*, *Flavobacterium*, *Corybacterium*, *Sarcina*, dan *Mycrobacterium* (Rao, 1994: 34-35).

Teknik isolasi mikroorganisme adalah suatu usaha untuk menumbuhkan mikroba di luar dari lingkungan alaminya. Pemisahan mikroorganisme dari lingkungannya ini bertujuan untuk memperoleh biakan bakteri yang sudah tidak bercampur lagi dengan bakteri lainnya dan ini yang disebut dengan biakan murni (Dwyana, 2006: 24).

Banyak cara mengisolasi mikroorganisme bergantung dari lingkungan mana dan substrat apa isolasi tersebut dilakukan. Waktu akan melakukan pengambilan sampel perlu diperhatikan metode mana yang akan digunakan dan peralatan apa yang perlu disediakan. Mikroorganisme dapat diisolasi dari tanah, buah-buahan, bunga, daun-daun, ranting tumbuhan, makanan atau minuman fermentasi (misalnya tape, tuak, cider), selai buah, buah kering, madu, hewan, ragi pasar, dan air. Medium umum yang biasa digunakan untuk mengisolasi mikroorganisme adalah medium NA (*Nutrient Agar*) untuk bakteri dan medium PDA (*Potato Dekstrosa Agar*) untuk jamur atau khamir (Ginandjar, 2006: 165).

B. Antibiotik

Antibiotika berasal dari kata "anti" yang berarti lawan dan "bios" yang berarti hidup. Antibiotik merupakan senyawa-senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme terutama fungi dan bakteri yang memiliki khasiat mematikan dan menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. Antibiotika pertama kali ditemukan oleh dr

Alexander Fleming dari Inggris tahun 1928. Secara umum antibiotik dibuat secara mikrobiologi dengan membiakkan bakteri dalam tangki yang berisi nutrient khusus bagi bakteri. Oksigen dan udara steril disalurkan ke dalam cairan pembiakan guna mempercepat pertumbuhan bakteri dan meningkatkan produksi antibiotiknya. Setelah diisolasi dari cairan kultur, antibiotik dimurnikan dan aktivitasnya ditentukan (Omura, 2008: 335).

Pada awalnya istilah yang digunakan adalah antibiosis, yang berarti substansi yang dapat menghambat pertumbuhan organisme hidup yang lain, dan berasal dari mikroorganisme. Namun pada perkembangannya, antibiosis ini disebut sebagai antibiotik dan istilah ini tidak hanya terbatas untuk substansi yang berasal dari mikroorganisme, melainkan semua substansi yang diketahui memiliki kemampuan untuk menghalangi pertumbuhan organisme lain khususnya mikroorganisme (Pratiwi, 2008: 151).

Berdasarkan toksisitasnya antibiotika dibagi dalam 2 kelompok, yaitu antibiotika dengan aktivitas bakteristatik yang bersifat menghambat pertumbuhan mikroba dan aktivitas bakterisid yang bersifat membunuh perkembangan mikroba. Antibiotika tertentu aktivitasnya dapat ditingkatkan dari bakteristatik menjadi bakterisid bila konsentrasinya ditingkatkan (Suwandi, 1989: 3).

Antibiotika yang baik idealnya mempunyai aktivitas antimikroba yang efektif dan selektif serta mempunyai aktivitas bakterisid. Antibiotika yang sesuai untuk terapi penyakit infeksi pada manusia harus mempunyai sifat toksisitas selektif yaitu aktivitas gangguan pada mikroba penginfeksi lebih

besar daripada gangguan pada sel hospes. Derajat toksisitas selektif tergantung pada struktur yang dimiliki sel bakteri dan manusia, sehingga antibiotika dengan mekanisme kegiatan pada dinding sel bakteri mempunyai toksisitas selektif relatif tinggi. Toksisitas selektif rendah kurang dapat diterima, karena dapat mengganggu proses esensial sel hospes. Banyak proses esensial pada bakteri yang dipengaruhi antibiotik mempunyai kemiripan dengan proses esensial pada sel manusia, seperti sintesis protein sehingga antibiotika tersebut juga akan dapat mengganggu proses pada sel manusia (Suwandi, 1989: 3).

Antibiotika menghambat pertumbuhan mikroba dengan cara bakterostatik dan bakteriosid. Hambatan ini terjadi sebagai akibat gangguan reaksi yang esensial untuk pertumbuhan. Reaksi ini mungkin merupakan satu-satunya jalan untuk mensintesis makromolekul, seperti protein atau asam nukleat, sintesis struktur sel seperti dinding sel atau membran sel dan sebagainya (Suwandi, 1989: 4).

Berdasarkan mekanisme kerjanya, antibiotika dibagi dalam 5 kelompok (Ganiswarna, 2008: 586-587):

1. Antibiotika yang menghambat metabolisme sel mikroba

Mikroba membutuhkan asam folat untuk kelangsungan hidupnya. Berbeda dengan mamalia yang mendapatkan asam folat dari luar, mikroba patogen harus mensintesis sendiri asam folat dari para asam amino benzoat (PABA) untuk kebutuhan hidupnya. Apabila sulfonamid atau sulfon menang bersaing dengan para asam amino benzoat (PABA) untuk diikutsertakan dalam pembentukan asam folat, maka terbentuk analog asam

folat yang nonfungsional. Akibatnya, kehidupan mikroba akan terganggu. Berdasarkan sifat kompetisi, efek sulfonamid dapat diatasi dengan meningkatkan kadar PABA. Contoh obat yaitu sulfonamida, trimetoprim, asam p-aminosalisilat (PAS) dan sulfon.

2. Antibiotika yang menghambat sintesis dinding sel mikroba

Dinding sel bakteri terdiri dari peptidoglikan, yaitu suatu kompleks polimer mukopeptida (glikopeptida). Sikloserin menghambat reaksi yang paling dini dalam proses sintesis dinding sel, diikuti berturut-turut oleh basitrasin, vankomisin dan diakhiri oleh penisilin dan sefalosporin, yang menghambat reaksi terakhir (transpeptidasi) dalam rangkaian reaksi tersebut. Oleh karena tekanan osmotik dalam sel kuman lebih tinggi dari pada di luar sel maka kerusakan dinding sel kuman akan menyebabkan terjadinya lisis, yang merupakan dasar efek bakterisidal pada kuman yang ada. Obat yang termasuk dalam kelompok ini ialah penisilin, sefalosporin, basitrasin, vankomisin, dan sikloserin.

3. Antibiotika yang mengganggu keutuhan membran sel mikroba

Membran sitoplasma mempertahankan bahan-bahan tertentu di dalam sel dan mengatur aliran keluar masuknya bahan-bahan lain. Membran sel memelihara integritas komponen-komponen seluler. Kerusakan pada membran ini akan mengakibatkan menghambatnya pertumbuhan sel atau matinya sel, akibatnya mikroba akan mati.

Jika fungsi integritas membran sitoplasma dirusak, makromolekul dan ion keluar dari sel, kemudian sel akan rusak. Dalam hal ini antimikroba

dapat berinteraksi dengan sterol sitoplasma pada jamur, dan merusak membran sel bakteri gram negatif.

Contoh obat yang termasuk kelompok ini yaitu amfoterisin, kolistin, imidasol, polien, dan polimiksin.

4. Antibiotika yang menghambat sintesis protein sel mikroba

Hidupnya suatu sel tergantung pada terpeliharanya molekul-molekul dalam keadaan alamiah. Suatu kondisi atau substansi mengubah keadaan ini yaitu mendenaturasikan protein dengan merusak sel tanpa dapat diperbaiki kembali. Suhu tinggi dan konsentrasi beberapa zat kimia dapat mengakibatkan koagulasi irreversibel komponen-komponen seluler yang vital ini.

Antibiotika mempengaruhi fungsi ribosom pada mikroorganisme yang menyebabkan sintesis protein terhambat. Dimana dapat berikatan dengan ribosom 30S yang dapat menyebabkan akumulasi sintesis protein awal yang kompleks, sehingga salah dalam menerjemahkan tanda m-RNA dan menghasilkan polipeptida yang abnormal. Selain itu juga dapat berikatan dengan ribosom 50S yang dapat menghambat ikatan asam amino baru pada rantai peptida yang memanjang. Contoh obat yang termasuk kelompok ini adalah aminoglikosida, kloramfenikol, tetrasiklin, eritromisin dan linkomisin.

5. Antibiotika yang menghambat sintesis asam nukleat sel mikroba

DNA dan RNA memegang peranan penting dalam proses kehidupan normal sel. Hal ini berarti bahwa gangguan apapun yang terjadi pada

pembentukan atau pada fungsi zat-zat tersebut dapat mengakibatkan kerusakan total pada sel. Dalam hal ini mempengaruhi metabolisme asam nukleat, seperti berikatan dengan enzim DNA-dependen, RNA-polymerase bakteri, memblokir helix DNA. Contoh quinolon, pyrimethamin, rifampisin, sulfonamid, trimethoprim, dan trimetrexat.

C. Uji Aktivitas Antibiotika dengan Metode Difusi Agar

Difusi adalah proses perpindahan molekul dari satu posisi ke posisi lain. Pada metode ini didasarkan atas perbandingan antara luas daerah difusi silinder pipih, difusi dengan mangkuk pipih, difusi dengan kertas saring, difusi Kirby-Bauer, dan difusi agar berlapis (Djide, 2003: 105):

1. Cara difusi pipih. Cara ini didasarkan atas perbandingan antara luas daerah hambatan yang dibentuk larutan contoh pada pertumbuhan mikroba dengan daerah hambatan yang dibentuk oleh larutan pembanding. Pada cara ini digunakan plat silinder yang diletakan pada media, kemudian larutan dimasukan ke dalamnya.
2. Cara difusi dengan mangkuk pipih. Cara ini sama dengan silinder pipih namun perbedaannya menggunakan lubang yang dibuat langsung pada medium.
3. Cara difusi kertas saring. Cara ini menggunakan kertas saring dengan bentuk ukuran tertentu, biasanya dengan garis tengah 0,7-1 cm, yang nantinya akan dicelupkan ke dalam larutan contoh dan pembanding. Pengamatan dilakukan setelah masa inkubasi dengan melihat daerah hambatan yang terbentuk.

4. Cara difusi Kirby-Bauer. Cara ini menggunakan alat ukur dengan meletakkan kertas saring dan cawan yang digunakan berukuran 15x15 mm sehingga langsung dapat diuji dengan berbagai larutan.
5. Cara difusi agar berlapis. Cara ini merupakan modifikasi dari Kirby-Bauer. Perbedaannya pada cara ini menggunakan dua lapis agar. Lapis pertama (*based layer*) tidak mengandung mikroba, sedangkan lapis kedua (*seed layer*) mengandung mikroba.

D. Pengecatan Gram

Pengecatan Gram adalah pewarnaan diferensial yang sangat penting, ditemukan oleh Cristian Gram pada tahun 1884. Pada umumnya bakteri bersifat tembus cahaya yang sulit untuk dilihat atau diteliti sekalipun di bawah mikroskop. Hal tersebut disebabkan karena banyak mikroba yang tidak mempunyai zat warna, umumnya didapatkan pada bakteri. Berbeda dengan mikroalga yang jelas mempunyai butir-butir serta warna dalam selnya. Bakteri yang masih hidup tidak tampak jelas bentuk maupun sifat-sifat morfologi lainnya. Bakteri tunggal yang berupa satu sel saja, sulit untuk dilihat di bawah mikroskop walaupun bakteri itu diambilkan dari suatu koloni tertentu. Oleh karena itu untuk memperlihatkan bagian-bagian sel diperlukan pewarnaan (Waluyo, 2004: 150).

Prosedur pewarnaan terdiri atas 4 langkah, yaitu: 1) olesan dibasahi dengan larutan kristal violet atau gram A, 2) setelah 60 detik zat warna tersebut dicuci atau dibilas dan selanjutnya dikeringkan dan ditetesi dengan larutan iodium, didiamkan selama 60 detik, 3) selanjutnya larutan iodiumnya

dicuci dan dibilas dengan alkohol 95%, didiamkan selama 15-30 detik, 4) gelas preparat diwarnai dengan larutan safranin (warna merah), didiamkan selama 30 detik. Untuk orang yang buta warna merah, dapat digunakan coklat Bismarck.

Campuran zat peluntur dapat digunakan campuran aseton dan alkohol dengan perbandingan 50:50, karena campuran tersebut cepat terjadi reaksi daripada hanya menggunakan larutan alkohol 95% saja. Zat warna kristal violet (lembayung) dengan larutan iodium akan membentuk senyawa yang kompleks (Djide, 2008: 66-67).

Dalam proses ini olesan bakteri yang terfiksasi diwarnai dengan larutan-larutan seperti kristal ungu, larutan iodium, alkohol (bahan pemucat), dan safranin atau beberapa pewarna tandingan lain yang sesuai. Bakteri yang diwarnai dengan metode pengecatan ini dibagi menjadi dua kelompok. Salah satu diantaranya bakteri gram positif, yang mempertahankan zat pewarna kristal ungu sehingga tampak berwarna ungu tua. Kelompok yang lain, bakteri gram negatif, yang kehilangan kristal ungu ketika dicuci dengan alkohol, dan sewaktu diberi pewarna tandingan dengan warna merah safranin, tampak berwarna merah (Pelczar, 2008: 82-83).

Dengan pewarnaan gram, bakteri dibagi dalam 2 golongan. Bakteri yang berwarna ungu dengan pewarnaan gram disebut bakteri gram positif, sedangkan yang berwarna merah disebut gram negatif (Entjang, 2003: 77).

E. Pengujian Aktivitas Biokimia

Aktivitas biokimia sangat penting dalam pengidentifikasian suatu bakteri. Pada setiap jenis bakteri memiliki jenis reaksi biokimia yang berbeda-beda. Dapat dikatakan bahwa reaksi biokimia merupakan sidik jari organisme dalam pengidentifikasian. Tiap jenis bakteri berbeda kode DNANYa untuk sintesis protein, maka berbagai jenis bakteri harus mempersatukan berbagai protein enzim agar dapat diperoleh DNA yang khas dengan rangkaian nucleotide base (Waluyo, 2004: 151).

Adapun beberapa pengujian aktivitas biokimia yang biasa dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri, antara lain:

a. Uji H₂S

H₂S diproduksi oleh beberapa jenis mikroorganisme melalui pemecahan asam amino yang mengandung unsur belerang (S) seperti lisin dan metionin, H₂S dapat juga diproduksi melalui reduksi senyawa-senyawa belerang anorganik misalnya: tiosulfat, sulfat atau sulfat. Adanya H₂S dapat diamati dengan menambahkan garam-garam logam berat ke dalam medium. H₂S akan bereaksi dengan senyawa-senyawa ini membentuk logam sulfat yang berwarna hitam (Presscot, 2002: 131).

b. Uji Pertumbuhan pada Daerah Aktivitas pH Mikroba

Sebagian besar bakteri memiliki nilai pH minimum dan maksimum antara 4 dan 9 dalam pertumbuhannya. Pada umumnya pH optimum pertumbuhan bakteri terletak antara 6,5 dan 7,5. Namun, beberapa spesies dapat tumbuh dalam keadaan asam atau basa. Berdasarkan pH-nya mikroba

dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu: (a) *mikroba asidofil*, ialah kelompok bakteri yang dapat hidup pada pH 2,0-5,0, (b) *mikroba mesofil (neutrofil)*, ialah kelompok bakteri yang dapat hidup pada pH 5,5-8,0, dan (c) *mikroba alkalifil*, ialah kelompok bakteri yang dapat hidup pada pH 8,4-9,5 (Sumarsih, 2003: 83).

c. Uji Motilitas

Uji ini dapat digunakan untuk memeriksa kemampuan bakteri untuk bergerak. Dimana gerakan bakteri tersebut dipengaruhi oleh adanya flagella. Bakteri diinokulasikan secara tusukan ke dalam medium SIM (Semisolid Indol Motility). Bila positif artinya bersifat motil (bergerak), yang dimana bakteri akan tumbuh menyebar di sepanjang garis tusukan inokulasi (Waluyo, 2004: 175).

d. Uji Katalase

Dengan banyak oksigen bebas di lingkungannya, kebanyakan bakteri akan memproduksi H_2O_2 yang bersifat toksis terhadap bakteri yang masih hidup. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, enzim katalase memecah H_2O_2 menjadi molekul air dan oksigen, sehingga sifat toksiknya hilang (Benson, 2001: 46).

e. Uji Indol

Uji ini untuk mendeteksi adanya indol yang dihasilkan oleh suatu bakteri tertentu. Bakteri tersebut dapat memecah asam amino triptofan dan menghasilkan senyawa yang berbau busuk yang disebut indol. Kemudian diberi pereaksi Kovacz atau Ehrlich yang mengandung amil alkohol

sehingga dengan adanya indol akan menyebabkan amil alkohol berubah warnanya menjadi merah. Dimana uji ini menunjukkan adanya indol yang dihasilkan oleh suatu bakteri tertentu. Apabila terjadi warna merah, maka reaksi dikatakan positif dan jika terjadi warna jingga, maka reaksi dikatakan negatif (Benson, 2001: 162).

f. Uji Sitrat

Penanaman dalam medium pembiakan sitrat (Simons Citrate Medium) dimaksudkan untuk mengetahui apakah senyawa sitrat dapat dipakai sebagai satu-satunya sumber karbon bagi mikroorganisme. Dalam medium ini digunakan natrium sitrat sebagai sumber karbon. Bila natrium sitrat ini dapat diuraikan maka amonium hidrogen posfat ikut terurai dan akan melepaskan NH_3 sehingga menyebabkan medium menjadi alkalis, dan indikator brom timol biru (Iranto, 2006: 60).

g. Uji Metil Merah

Untuk mendeteksi keasaman yang tinggi akibat pertumbuhan bakteri tertentu dalam pembedihan pada medium MRVP. Prinsipnya adalah pendeteksian derajat keasaman dimana selama proses fermentasi suatu bakteri menghasilkan asam lebih banyak dari bakteri lain dengan menurunkan pH medium yang mengandung 0,5 % glukosa sehingga mencapai pH 5,0 yang menyebabkan indikator metil merah tersebut menjadi merah yang berarti hasilnya positif, sedangkan hasil yang negatif ditandai dengan warna kuning (Presscot, 2002: 125).

h. Uji Voges-Proskauer

Menurut Voges-Proskauer pengujian yang dilakukannya adalah untuk mengetahui apakah dalam proses pertumbuhan organisme terbentuk asetilmetilkarbinol sebagai produk-antara (*intermediate product*) dari proses metabolisme karbohidrat. Asetilmetilkarbinol dalam lingkungan yang mengandung kalium hidroksida dan udara, teroksidasi menjadi senyawa diasetil. Senyawa ini dengan alfa-naftol dan inti guanidin dari asam aminoorganina (dari pepton) menghasilkan warna merah (Irianto, 2006: 59).

i. Uji Hidrolisis Urea

Hidrolisis urea Genus *proteus* dapat dibedakan dari beberapa bakteri Gram negatif lain karena kesanggupannya menghasilkan banyak enzim urease. Bila biakan terdapat urease dan urea hidrolisis, maka terbentuk amonia yang merubah warna indikator kuning menjadi merah. Untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat medium pembiakan diinkubasi di atas penangas air (Presscot, 2002: 132).

j. Uji Fermentasi Karbohidrat

Sifat karakteristik suatu spesies mikroba antara lain adalah determinasinya terhadap gula-gula (dekstrosa, laktosa, sukrosa dan hidrolisis pati). Gula dapat difermentasi menjadi bermacam-macam zat, seperti: alkohol, asam, dan gas tergantung macam gula dan spesiesnya. Terbentuknya asam dapat diketahui dengan adanya perubahan warna indikator dalam medium, sedangkan terbentuknya gas dapat dilihat dengan tabung fermentasi lainnya. Amilum dapat dihidrolisis menjadi gula oleh

bakteri tertentu. Penguraian karbohidrat dapat terjadi dalam keadaan aerob dan anaerob.

Sifat-sifat fermentasi karbohidrat dari tiap mikroorganisme dapat diketahui dengan menginokulasikan mikroorganisme tersebut ke dalam tabung yang berisi medium karbohidrat yang diberi indikator dan tabung durham. Tabung durham adalah suatu tabung kecil yang diletakkan terbalik dalam medium karbohidrat tadi. Hasil akhir fermentasi biasanya berupa asam dan gas atau asam saja. Terjadinya asam dapat diketahui dengan adanya perubahan warna indikator, sedangkan gas yang terjadi akan tertampung di dalam tabung durham (Irianto, 2006: 61-62).

k. Uji Fenylalanin Deaminase

Uji ini untuk mendeteksi adanya enzim fenilalanin yang dihasilkan oleh bakteri tertentu dalam medium phenylalanin agar. Pendeteksian enzim phenylalanin deaminase yang terdapat pada bakteri tertentu yang diinokulasikan pada medium phenylalanin agar. Mikroorganisme yang memiliki enzim diaminase akan mengkatalisis pemindahan gugus amino (NH_2) dari asam amino dan molekul yang mengandung NH. Hasil positif jika terjadi warna hijau pada permukaan medium (Presscot, 2002: 133).

E. Uraian Mikroba Uji

1. Escherichia coli

a. Klasifikasi (Garrity, 2004: 24-141).

Domain : Bacteria

Phylum : Proteobacteria

Class : Gammaproteobacteria
Ordo : Enterobacteriales
Familia : Enterobacteriaceae
Genus : Escherichia
Spesies : *Escherichia coli*

b. Sifat dan morfologi (Pelczar, 2008: 949).

Batang lurus, $1,1-1,5 \mu\text{m} \times 2,0-6,0 \mu\text{m}$, motil dengan flagellum peritrikus atau nonmotil. Gram negatif. Tumbuh dengan mudah pada medium nutrisi sederhana. Laktosa difermentasi oleh sebagian besar galur dengan produksi asam dan gas. Kandungan G+C DNA ialah 50 sampai 51 mol %.

2. *Staphylococcus aureus*

a. Klasifikasi (Garrity, 2004: 24-187).

Domain : Bacteria
Phylum : Firmicutes
Class : Bacilli
Ordo : Bacillales
Familia : Staphylococcaceae
Genus : Staphylococcus
Spesies : *Staphylococcus aureus*

b. Sifat dan morfologi (Pelczar, 2008: 954-955).

Staphylococcus aureus adalah bakteri Gram positif. Sel-sel berbentuk bola, berdiameter $0,5 - 1,5 \mu\text{m}$, dengan bentuk sel yang tunggal dan

berpasangan serta secara khas membelah diri pada lebih dari satu bidang sehingga membentuk gerombolan yang tak teratur. Non motil. Tidak diketahui adanya stadium istirahat. Dinding sel mengandung dua komponen utama yaitu peptidoglikan dan asam teikolat yang berkaitan dengannya. Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi dan fermentatif. Anaerob fakultatif, tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dalam keadaan aerobik. Suhu optimum 35 – 40⁰ C. Berasosiasi dengan kulit, dan selaput lendir hewan berdarah panas. Kisaran inangnya luas, banyak galur dan merupakan patogen potensial.

3. *Pseudomonas aeruginosa*

a. Klasifikasi (Garrity, 2004: 24-95).

Domain : Bacteria
 Phylum : Proteobacteria
 Class : Gammaproteobacteria
 Ordo : Pseudomonadales

Familia : Pseudomonadaceae

Genus : *Pseudomonas*

Spesies : *Pseudomonas aeruginosa*

b. Sifat dan morfologi (Pelczar, 2008: 952).

Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri Gram negatif dengan berbentuk sel tunggal, batang lurus atau melengkung, namun tidak berbentuk heliks. Pada umumnya berukuran 0,5 – 1,0 µm. Motil dengan flagelum polar, monotrikus atau multitrikus. Tidak menghasilkan

selongsong prosteka. Tidak dikenal adanya stadium istirahat. Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi, tidak pernah fermentatif. Beberapa merupakan kemolitotrof fakultatif, dapat menggunakan H₂ atau CO sebagai sumber energi. Oksigen molekuler merupakan penerima elektron universal, beberapa dapat melakukan denitrifikasi dengan menggunakan nitrat sebagai penerima pilihan.

4. *Streptococcus mutans*

a. Klasifikasi (Garrity, 2004: 24-203).

Domain : Bacteria
 Phylum : Firmicutes
 Class : Bacilli
 Ordo : Lactobacillales
 Familia : Streptococcaceae
 Genus : Streptococcus
 Spesies : *Streptococcus mutans*

b. Sifat dan morfologi (Pelczar, 2008: 955).

Streptococcus mutans termasuk bakteri Gram positif berbentuk bola sampai lonjong, berdiameter 0,5-1,5 µm, koloni bulat cembung dengan permukaan licin atau sedikit kasar dan tepi seluruhnya atau sebagian tidak beraturan. Koloni buram berwarna biru terang, bersifat fakultatif aerob, dapat tumbuh pada suhu 45⁰ C dan suhu optimumnya. Dinding sel terdiri dari 4 komponen antigenik yaitu peptidoglikan, polisakarida, protein dan asam lipokoat.

5. *Salmonella typhi*

a. Klasifikasi (Garrity, 2004: 24-203).

Domain : Bacteria

Phylum : Proteobacteria

Class : Gammaproteobacteria

Ordo : Enterobacteriales

Familia : Enterobacteriaceae

Genus : Salmonella

Spesies : *Salmonella typhi*

b. Sifat dan morfologi (Pelczar, 2008: 948).

Salmonella typhi adalah bakteri Gram negatif berbentuk batang lurus dengan ukuran 0,7-1,5 μm , biasanya tunggal dan kadang-kadang membentuk rantai pendek, jenis yang bergerak berflagel peritrik, hidup secara aerobik atau anaerobik fakultatif, meragikan glukosa dengan menghasilkan asam kadang-kadang gas. Tumbuh optimal pada suhu 37⁰ C dan berkembang baik pada suhu kamar, bakteri ini dapat ditemukan di saluran pencernaan manusia dan hewan. Bakteri ini merupakan penyebab demam tifoid karena adanya infeksi akut pada usus halus manusia dan hewan.

6. *Vibrio sp*

a. Klasifikasi (Garrity, 2004: 24-109).

Domain : Bacteria

Phylum : Proteobacteria

Class : Gammaproteobacteria
Ordo : Vibrionales
Familia : Vibrionaceae
Genus : Vibrio
Spesies : *Vibrio sp*

b. Sifat dan morfologi (Pelczar, 2008: 956).

Vibrio sp adalah bakteri gram negatif. Batang pendek, tidak membentuk spora, tumbuhnya melengkung atau lurus, 0,5 μm x 1,5-3,0 μm , terdapat tunggal atau kadang-kadang bersatu dalam bentuk S atau spiral. Motil dengan satu flagelum polar, atau pada beberapa spesies dengan dua atau lebih flagelum dalam satu berkas polar, hanya sesekali non motil. Seringkali mempunyai sferoplas, biasanya dibentuk dalam keadaan lingkungan yang kurang menguntungkan. Tidak tahan asam. Tidak membentuk kapsul. Tumbuh baik dan cepat pada medium nutrisi baku. Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi (menggunakan oksigen) dan fermentatif. Anaerobik fakultatif. Suhu optimum berkisar dari 18-37 $^{\circ}\text{C}$.

7. *Bacillus subtilis*

a. Klasifikasi (Garrity, 2004: 24-172).

Domain : Bacteria
Phylum : Firmicutes
Class : Bacilli

Ordo : Bacillales
 Familia : Bacillaceae
 Genus : Bacillus
 Spesies : *Bacillus subtilis*

b. Sifat dan morfologi (Pelczar, 2008: 947).

Bacillus subtilis merupakan bakteri gram positif memiliki sel batang 0,3 – 2,2 μm x 1,27-7,0 μm . Sebagian besar motil, flagelum khas lateral. Membentuk endospora tidak lebih dari satu dalam sel spongarium. Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi sejati, fermentasi sejati, atau kedua-duanya, yaitu respirasi dan fermentasi. Aerobik sejati atau anerobik fakultatif. Umumnya dijumpai dalam tanah. Kandungan G+C DNA berkisar dari 32 sampai 62 mol %.

8. *Staphylococcus epidermis*

a. Klasifikasi (Garrity, 2004: 24-187).

Domain : Bacteria
 Phylum : Firmicutes
 Class : Bacilli
 Ordo : Bacillales
 Familia : Staphylococcaceae
 Genus : Staphylococcus
 Spesies : *Staphylococcus epidermis*

b. Sifat dan morfologi (Pelczar, 2008: 954).

Staphylococcus epidermis adalah bakteri Gram positif. Sel-sel berbentuk bola, berdiameter 0,5 – 1,5 μm , terdapat dalam bentuk tunggal dan berpasangan dan secara khas membelah diri pada lebih dari satu bidang sehingga membentuk gerombolan yang tidak teratur. Anaerob fakultatif, tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dalam keadaan aerobik. Suhu optimum 35 – 40⁰ C. Terutama berosiasi dengan kulit, dan selaput lendir hewan berdarah panas.

9. *Candida albicans*

a. Klasifikasi (Kill, 1995: 136).

Domain : Bacteria

Phylum : Thallophyta

Ordo : Deuteromycota

Class : Deuteromycetes

Familia : Cryptococaceae

Genus : *Candida*

Spessies : *Candida albicans*

b. Sifat dan morfologi (Pelczar, 2008: 953).

Candida albicans mempunyai bentuk sel yang bermacam-macam. Menghasilkan banyak pseudomiselum, dapat dijumpai pada posisi yang khas menurut pengucapan multilateral. Disimilasi oksidatif, tetapi pada banyak spesies juga sangat fermentatif. Di dalam medium cair dapat berbentuk endapan, cincin dan pelikel.

G. Tinjauan Islam Mengenai Mikroba Penghasil Antibiotik

Apa yang ada di dunia ini adalah merupakan ciptaan dan milik Allah SWT tanpa terkecuali, seperti mikroorganisme-mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Thaahaa/20; 6 (Departemen Agama RI, 2009: 113):

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ﴿٦﴾

Terjemahnya:

“Kepunyaan-Nyalah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya, dan semua ada yang di bawah tanah.”

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa semua yang ada di langit, di bumi, di antara langit dan di bumi, begitu juga semua yang ada di dalam tanah, baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui adalah kepunyaan Alla. Dialah yang menguasai segalanya, dan mengatur sekehendak-Nya. Dialah yang mengetahui segala yang ada, baik yang gaib maupun yang nyata. Tidak ada sesuatu yang bergerak, diam, berubah, tetap, dan lain-lain sebagainya kecuali dengan izin-Nya, sesuai dengan kodrat iradat-Nya. Hal ini berkaitan dengan penelitian ini yang akan mengisolasi mikroba dari tanah yang terdapat di bumi. Sehingga dengan izin dari Allah SWT, segala sesuatu yang sebelumnya kita tidak ketahui ternyata memberikan manfaat dan faedah yang besar bagi kita seperti di dalam tanah terdapat mikroba yang akan diisolasi sebagai penghasil antibiotika (Departemen Agama RI, 2009: 117).

Allah menciptakan manusia dari saripati tanah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al Mu'minuun/23; 12 (Departemen Agama RI, 2009: 475):

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah.”

Pada ayat ini diterangkan kejadian manusia itu berasal dari sari pati tanah yang merupakan suatu kejadian yang tidak langsung dari manusia. Hal ini untuk membandingkan antara proses dari arti tanah yang mati dan tidak bergerak dengan manusia yang hidup dan bergerak. Dengan pernyataan ini, dapat diketahui bahwa Allah SWT dapat menjadikan sesuatu yang hidup itu dari benda mati yakni tanah. Sebagai contoh manusia, yang diciptakan oleh Allah dari sari pati tanah. Sama halnya dengan mikroorganismenya yang terdapat di dalam tanah yang akan diisolasi sebagai penghasil antibiotik (Shihab,1996: 280).

Sesungguhnya Kami (Allah) telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Ada segolongan ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia di sini ialah keturunan Adam termasuk kita sekalian, yang berasal dari air mani. Dari hasil penelitian ilmiah, sebenarnya air mani itupun berasal dari tanah setelah melalui beberapa proses perkembangan. Makanan yang merupakan hasil bumi, yang dimakan oleh manusia, dan alat pencernaannya berubah menjadi cairan yang bercampur dengan darah yang menyalurkan bahan-bahan hidup dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh manusia ke seluruh bagian anggotanya (Departemen Agama RI, 2009: 477).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanah pada dasarnya merupakan sumber segala kehidupan yang ada di dunia ini. Baik itu pada

kehidupan manusia yang merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT, maupun pada mikroorganisme yang merupakan makhluk yang paling sederhana yang diciptakan oleh Allah SWT. Hal ini sangat berkaitan erat dengan penelitian ini yang mengisolasi mikroba penghasil antibiotika yang berasal dari tanah.

Setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah SWT pasti ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang dideritanya memang Allah SWT yang menyembuhkan, akan tetapi Allah SWT menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخارى)

Terjemahnya:

“Dari Abu Hurairah Ra. dari Nabi Saw. bersabda : Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia Juga menurunkan obatnya.” (H.R. Al-Bukhari)

Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari oleh ilmu pengetahuan, penelitian, dan eksperimen ilmiah. Oleh karena itu setiap pengobatan hendaklah ditangani oleh para ahlinya (Qardhawi, 2001: 159). Dari hadits di atas dapat diperoleh pemahaman bahwa tidak ada penyakit yang diturunkan oleh Allah, kecuali Allah juga menurunkan obatnya. Oleh karena itu segala penyakit itu hendaklah dipelajari dan ditangani oleh ahlinya, sesuai dengan bidang yang mereka kuasai. Seperti dengan penemuan antibiotika dari

tanah pengolahan ayam yang dapat bermanfaat bagi ilmu kesehatan dalam penyembuhan penyakit.

Obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan dapat berasal dari bahan sintetik maupun dari bahan alam. Dewasa ini bahan alam khususnya tanah telah banyak diteliti oleh para ahli untuk dikembangkan menjadi suatu bahan obat, yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Tidaklah yang diciptakan oleh Allah SWT adalah sia-sia, sekecil atau sesederhana apa pun itu misalnya mikroorganisme atau yang lebih sederhana darinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Ali Imran/3; 191 (Departemen Agama RI, 2009: 95):

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ رِئًا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.”

Salah satu bukti nyata dari ayat di atas yang menerangkan bahwa sekecil apa pun makhluk itu baik yang ada di langit dan di bumi pasti memiliki manfaat dan tidak sia-sia, seperti pada penelitian ini dimana dilakukan pencarian senyawa antibiotika yang berasal dari mikroorganisme-mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat baik di bidang ilmu pengetahuan maupun di bidang kesehatan.

Allah SWT telah menciptakan makhluk hidup termasuk mikroorganisme secara sempurna atau kurang pada diri makhluk hidup tersebut termasuk mikroorganisme. Sehingga kita sebagai makhluk hidup harus bersyukur dengan pemberian Allah SWT, termasuk penciptaan mikroorganisme yang banyak memberi manfaat kepada manusia, salah satunya digunakan sebagai sumber penghasil antibiotika.

Allah berfirman dalam Q.S. Al An'am/6; 2 (Departemen Agama RI, 2009: 66):

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسِيٌّ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ada pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu).”

Pada ayat ini Allah lebih merinci dalam penciptaan-Nya pada makhluk yang banyak memiliki kekuasaan dalam hidupnya di muka bumi ini, yakni manusia. Allah telah menciptakan nenek moyang manusia yaitu Adam dari bahan yang sederhana, yakni tanah. Manusia yang sekarang ini menjadi besar dan dewasa juga dari saripati tanah, dan berbagai zat makanan yang ditumbuhkan dari tanah. Dari penjelasan di atas, kita dapat mengambil pemahaman bahwa tanah yang di dalamnya mengandung mikroorganisme merupakan sumber dari penciptaan manusia dan banyak makanan berupa hewan dan tumbuhan yang dimakan oleh nenek moyang kita yang menjadi

daging dan kekuatan bagi manusia lain yang semuanya berasal dari tanah (Departemen Agama RI, 2009: 69).

Dalam ayat lain, Allah juga berfirman dalam Q.S. Shaad/38; 71 (Departemen Agama RI, 2009: 395):

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ﴿٧١﴾

Terjemahnya:

“(ingatlah) Ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah".”

Menurut ilmu pengetahuan, dua komponen penting yang harus ada dalam permulaan terjadinya kehidupan adalah material genetika dan membran sel. Kedua material ini saling bekerja sama mendukung kehidupan. Di dalam keduanya, material tanah lebih dominan. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya penelitian terhadap tanah, yang menemukan bahwa tanah dapat merangsang dengan cepat pembentukan kantung membran yang berisi cairan, dan membuktikan juga bahwa cairan yang ada di dalam kantung membran tersebut mengandung material tanah. Kantung ini ternyata dapat tumbuh dengan pembelahan sederhana. Cara pembelahan ini merupakan gambaran dari apa yang terjadi pada sel yang primitif, seperti halnya bakteri atau mikroba yang akan diisolasi sebagai penghasil antibiotik dari sampel tanah tempat pengolahan ayam (Departemen Agama RI, 2009: 480-481).

Allah yang menciptakan seluruh makhluk dengan bentuk yang baik, serasi serta dengan faedah dan kegunaan yang hanya Dia saja yang mengetahuinya. Jika diperhatikan seluruh makhluk yang ada di alam ini mulai

dari besar sampai kepada yang sekecil-kecilnya (mikroorganisme) akan timbul dugaan bahwa di antara makhluk itu ada yang besar faedahnya dan adapula yang tidak dirasa faedahnya atau tidak berguna sama sekali, bahkan dapat menimbulkan bahaya bagi manusia, seperti ular berbisa, hama-hama penyakit menular, tanaman yang mengandung racun, dan sebagainya. Dugaan ini akan timbul jika masing-masing makhluk itu dilihat secara terpisah, tidak dalam satu kesatuan alam semesta ini.

Jika makhluk-makhluk itu dilihat dalam satu kesatuan alam semesta, dimana antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang erat, akan terlihat bahwa semua makhluk itu ada faedah dan manfaatnya dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian alam semesta ini. Sebagai contoh, cacing dan bakteri membantu dalam menyuburkan tanaman dan pembusukan makanan atau kotoran-kotoran Hal ini berkaitan erat dengan penelitian ini adalah bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah, mikroba yang terdapat dari tanah memiliki manfaat bagi manusia untuk dijadikan sumber antibiotika baru dan perkembangan produksi antibiotik. (Departemen Agama RI, 2009: 583).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Alat dan Bahan yang Digunakan*

1. Alat-alat yang digunakan

Autoklaf, botol steril, cool box, cawan petri, deck glass, erlenmeyer 250 ml dan 100 ml, gelas kimia 250 ml, gelas ukur 100 ml, inkubator, lampu spiritus, laminar air flow (LAF), lemari pendingin, mikroskop, neraca O’Haus, objek glass, ose bulat, ose lurus, oven, penangas air, sendok stainless stell, tabung reaksi, tabung durham, dan timbangan analitik.

2. Bahan-bahan yang digunakan

Air suling, air steril, aluminium foil, amonium hidroksida, asam asetat, biakan murni (*Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhosa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*, *Candida albicans* dan *Vibrio sp*), cat A, B, C dan D, disk blank (oxid), alkohol 70%, kapas, kertas timbang, kertas indikator pH, larutan HCl 0,1 %, larutan H₂O₂ 3% , medium Glukosa Nutrient Agar (GNA), medium Maltose Yeast Broth (MYB), medium Nutrient Agar (NA), medium Nutrient Broth (NB), medium Potato Dekstrosa Agar (PDA), medium Simon’s Citrat Agar (SCA), medium Semisolid Indole Motility (SIM), dan spoit 1 ml dan 10 ml.

B. Cara Kerja

1. Pengambilan dan Pengolahan Sampel

Sampel tanah diambil pada empat titik pengambilan pada tempat pengolahan ayam yang terdapat di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar dengan menggunakan sendok *stainless steel* yang telah disterilkan di oven dan disemprot dengan alkohol 70 % pada kedalaman 5-15 cm dari permukaan tanah, sampel dimasukkan ke dalam botol steril dan disimpan dalam *coolbox*, selanjutnya dibawa ke laboratorium.

2. Sterilisasi Alat

Alat-alat yang diperlukan dicuci dengan deterjen, wadah mulut lebar dibersihkan dengan direndam dengan larutan deterjen panas selama 15-30 menit diikuti dengan pembilasan pertama dengan HCl 0,1% dan terakhir dengan air suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik di udara terbuka setelah kering dibungkus dengan kertas perkamen. Tabung reaksi dan gelas erlemeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dari kaca disterilkan di oven pada suhu 180°C selama 2 jam. Alat-alat suntik dan alat-alat plastik lainnya (tidak tahan pemanasan tinggi) disterilkan dalam otoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit dengan tekanan 2 atm. Jarum ose disterilkan dengan pemanasan langsung hingga memijar.

3. Pembuatan Suspensi Sampel

Sampel tanah ditimbang seberat 1 gram lalu dimasukkan ke dalam botol pengencer dan dicukupkan dengan air suling steril hingga 10 ml

(pengenceran 10^{-1}). Suspensi sampel dari pengenceran 10^{-1} kemudian dibuat pengenceran 10^{-2} , 10^{-3} sampai pada pengenceran 10^{-7} .

4. Isolasi dan Pemurnian Mikroba Tanah

Masing-masing pengenceran dipipet 1 ml dan dimasukkan ke botol pengencer bersama 9 ml medium GNA lalu dituang ke masing-masing cawan petri kemudian dihomogenkan. Begitupun untuk medium PDA. Dibiarkan memadat lalu diinkubasi selama 1×24 jam pada suhu 37°C untuk medium GNA dan suhu kamar untuk medium PDA selama 3×24 jam.

Dari koloni yang memperlihatkan adanya zona hambatan, diambil 1 ose lalu digoreskan pada medium PDA dan medium GNA dengan metode kuadran pada cawan petri yang lain lalu diinkubasikan selama 1-3 hari. Selanjutnya dipindahkan 1 ose koloni yang terpisah baik ke dalam medium PDA miring dan medium GNA miring sebagai stok dan inkubasikan selama 1-3 hari. Isolat bakteri yang diperoleh dimurnikan dengan diinokulasikan dengan metode kuadran.

5. Peremajaan dan Pembenihan Isolat Mikroba

Dijambil sebanyak 1 ose koloni yang murni dan digoreskan pada medium agar miring. Diinkubasikan selama 1-3 hari pada suhu yang sesuai. Diinokulasikan 1-2 ose ke dalam 10 ml medium pembenihan MYB, lalu inkubasikan selama 1×24 jam sambil dishaker.

C. Penyiapan Mikroba Uji

1. Peremajaan Mikroba Uji

Bakteri uji yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *Bacillus subtilis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella tyhposa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans* dan *Vibrio sp.* Bakteri yang berasal dari kultur koleksi Laboratorium Mikrobiologi Farmasi Fakultas Ilmi Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang diremajakan dalam medium Nutrient Agar (NA) miring dan diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 37⁰ C.

Jamur uji yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *Candida albicans* diambil satu ose lalu diinokulasikan pada suhu kamar selama 3 x 24 jam.

2. Pembuatan Suspensi Mikroba Uji

Kultur bakteri yang berumur 1 x 24 jam yang telah diremajakan dalam medium NA miring disuspensikan dengan NaCl fisiologis (NaCl 0,9%) kemudian diukur transmisinya 25% T untuk bakteri dan 75% T untuk jamur dengan menggunakan spektrofotometer UV-Visibel.

D. Karakterisasi Mikroorganisme

1. Pengamatan Morfologi Secara Makroskopik

- a. Medium Nutrient Agar (NA) dipipet 10 ml dibiarkan memadat dalam tabung reaksi dengan posisi tegak. Setelah memadat isolat IB 1 diinokulasikan dengan cara tusukan , selanjutnya diinkubasi pada suhu 37⁰ C selama 1 x 24 jam. Pengamatan dilakukan dengan melihat

bentuk koloni, warna dan keadaan permukaannya. Dilakukan hal yang sama pada isolat IB 2, IB 3, dan IB 4. Untuk isolat IJ 1 dan IJ 2, menggunakan medium PDA (Potato Dekstrosa Agar) dan diinkubasi pada suhu kamar selama 3 x 24 jam.

- b. Medium Nutrient Agar (NA) dipipet 10 ml dibiarkan memadat dalam tabung reaksi dengan posisi miring. Setelah memadat isolat IB 1 diinokulasikan dengan cara digores, selanjutnya diinkubasi pada suhu 37° C selama 1 x 24 jam. Pengamatan dilakukan dengan melihat bentuk koloni, warna dan keadaan permukaannya. Dilakukan hal yang sama pada isolat IB 2, IB 3, dan IB 4. Untuk isolat IJ 1 dan IJ 2, menggunakan medium PDA (Potato Dekstrosa Agar) dan diinkubasi pada suhu kamar selama 3 x 24 jam.
- c. Medium Nutrient Agar (NA) dipipet 10 ml lalu dimasukkan ke botol dan ditambahkan 1 ml isolat IB 1 kemudian dihomogenkan. Dituang kedalam cawan petri steril dan dibiarkan memadat. Setelah memadat kemudian diinkubasi pada suhu 37° C, selama 1 x 24 jam. Pengamatan dilakukan dengan melihat bentuk koloni, elevasi, tepi dan struktur dalam. Dilakukan hal yang sama pada isolat IB 2, IB 3, dan IB 4. Untuk isolat IJ 1 dan IJ 2, menggunakan medium PDA (Potato Dekstrosa Agar) dan diinkubasi pada suhu kamar selama 3 x 24 jam.
- d. Medium Nutrien Broth (NB) dipipet 10 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian diinokulasikan isolat IB 1 dengan menggunakan ose bulat. Diinkubasi pada suhu 37 °C, selama 1x24

jam. Pengamatan dilakukan dengan melihat bentuk koloni, warna dan keadaan permukaannya. Dilakukan hal yang sama pada isolat IB 2, IB 3, dan IB 4. Untuk isolat IJ 1 dan IJ 2, menggunakan medium GNB (Glukosa Nutrient Broth).

2. Pengecatan Gram

Objek glass dibersihkan dengan menggunakan etanol 96% sehingga bebas lemak, kemudian dipanaskan di atas lampu spiritus. Isolat IB 1 diletakkan di atas objek glass, kemudian diratakan seluas 1-2 cm. kemudian difiksasi di atas lampu spiritus. Setelah dingin ditetesi dengan cat Gram A (gentian violet) sebanyak 3 tetes dan dibiarkan selama 20 detik. Selanjutnya dicuci dengan air mengalir selama 2 detik. Ditetesi cat Gram B (mordan), dibiarkan selama 1 menit dan dicuci dengan air mengalir, kemudian dikeringkan di udara, ditetesi dengan cat Gram C (peluntur), dibiarkan selama 10-20 detik dan dicuci dengan air mengalir selama 2 menit. Terakhir ditetesi dengan cat Gram D (zat penutup), dibiarkan selama 2 menit. Dikeringkan di atas kertas, dan diamati di bawah mikroskop. Dilakukan hal yang sama pada isolat IB 2, IB 3, IB 4, IJ 1, dan IJ 2.

3. Pengujian Aktivitas Biokimia

a. Uji Motilitas

Medium SIM dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing sebanyak 10 ml, tabung pertama diisi dengan isolat IB 1 biakan mikroba dengan cara ditusukkan dan tabung yang kedua sebagai

kontrol, diinkubasikan selama 1 x 24 jam pada suhu 37°C, bila terdapat pertumbuhan di sekitar daerah tusukan berarti motilitas positif, dan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan kontrol, dilakukan hal yang sama pada isolat IB 2, IB 3, IB 4, IJ 1, dan IJ 2.

b. Uji Katalase

Dibersihkan objek glass, lalu diteteskan beberapa tetes larutan H₂O₂ 3% di atas gelas objek tersebut. Kemudian diambil sedikit biakan isolat IB 1 biakan mikroba dengan ose, diletakkan dalam tetesan H₂O₂ diamati adanya gelembung-gelembung O₂ di dalam tetesan H₂O₂ di bawah mikroskop. Dilakukan hal yang sama pada isolat IB 2, IB 3, IB 4, IJ 1, dan IJ 2.

c. Uji Sitrat

Medium SCA dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing sebanyak 10 ml, dibiarkan memadat, tabung reaksi pertama diisi dengan isolat IB 1 biakan mikroba, tabung kedua sebagai kontrol, diinkubasikan selama 1 x 24 jam pada suhu 37°C, diamati perubahan yang terjadi. Bila hasilnya positif medium berubah warna menjadi biru dan hasil yang diperoleh dibandingkan dengan kontrol dilakukan hal yang sama pada isolat IB 2, IB 3, IB 4, IJ 1, dan IJ 2.

d. Uji Pertumbuhan pada Beberapa Variasi Suhu

Medium NB dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi masing-masing sebanyak 10 ml, tabung pertama diinokulasikan dengan isolat IB 1 biakan mikroba, tabung kedua sebagai kontrol, diinkubasikan

selama 1 x 24 jam, di dalam lemari es untuk 4° C, dilakukan hal yang sama untuk suhu inkubasi 25° C dan 37° C di inkubator, dan pada isolat IB 2, IB 3, IB 4, IJ 1, dan IJ 2. Diamati perubahan yang terjadi. Bila hasil positif terjadi kekeruhan dan dibandingkan dengan kontrol.

e. Uji Pertumbuhan pada Beberapa Variasi pH

Medium NB dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi, ditambahkan asam asetat hingga pH 4, tabung reaksi pertama diisi dengan isolat IB 1 biakan mikroba, tabung kedua sebagai kontrol, diinkubasikan selama 1 x 24 jam dalam inkubator, dilakukan hal yang sama dengan penambahan ammonium hidroksida hingga pH 12 dan pada isolat IB 2, IB 3, IB 4, IJ 1, dan IJ 2. Diamati perubahan yang terjadi. Bila hasil positif terjadi kekeruhan pada medium dan dibandingkan dengan kontrol.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Isolasi Mikroba dari Tanah pada Media Agar

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada sampel tanah tempat pengolahan ayam, berhasil diperoleh isolat mikroba penghasil antibiotika. Untuk isolat bakteri diperoleh 4 isolat yang memperlihatkan adanya hambatan berupa daerah bening disekeliling medium GNA yaitu pada pengenceran 10^{-4} , 10^{-5} , 10^{-6} , dan 10^{-7} sedangkan isolat jamur diperoleh 2 isolat yang memperlihatkan adanya hambatan pada medium PDA yaitu pada pengenceran 10^{-4} , dan 10^{-5} . Adapun hasilnya dapat dilihat pada gambar 2 dan gambar 3.

2. Pemurnian Isolat Mikroba

Koloni mikroba yang memperlihatkan zona hambatan kemudian dimurnikan dengan metode kuadran menggunakan medium GNA di cawan petri lalu diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 37°C untuk bakteri dan medium PDA yang diinkubasi selama 3 x 24 jam pada suhu kamar untuk jamur. Sehingga diperoleh kultur koloni mikroba yang murni, yaitu isolat yang hanya mengandung satu bentuk morfologi koloni yang sama. Isolat murni tersebut kemudian dibuat menjadi kultur dalam media agar miring sebagai stok. Dari hasil isolasi diperoleh 4 isolat murni dari bakteri dan 2 isolat murni dari jamur. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 1, gambar 4, gambar 5, gambar 6, dan gambar 7.

Tabel 1. Hasil Pemurnian Isolat Mikroba Tanah

No.	Kode Isolat	Keterangan
1.	IB 1	Isolat Bakteri ke-1
2.	IB 2	Isolat Bakteri ke-2
3.	IB 3	Isolat Bakteri ke-3
4.	IB 4	Isolat Bakteri ke-4
5.	IJ 1	Isolat Jamur ke-1
6.	IJ 2	Isolat Jamur ke-2

3. Fermentasi Isolat Mikroba

Isolat yang telah dimurnikan kemudian difermentasi menggunakan medium MYB selama 1 x 24 jam sambil dishaker dengan kecepatan 200 rpm. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 8 dan gambar 9.

4. Uji Aktivitas Antibiotik dari Fermentat Isolat Bakteri

Uji aktivitas antibiotik dari hasil fermentasi dapat dilihat pada tabel 2 dan gambar 10, gambar 11. Fermentat isolat yang tidak memberikan zona hambat pada mikroba uji tidak dicantumkan pada tabel.

Tabel 2. Hasil Pengukuran Zona Hambat Fermentat Isolat Bakteri Terhadap Mikroba Uji.

NO	Bakteri Uji	Kode Isolat	Zona Hambat (mm)			
			I	II	III	\bar{x}
1	<i>Escherichia coli</i>	IB 2	16,18	16,30	16,26	16,25
2	<i>Bacillus subtilis</i>	IB 1	18,70	20,00	18,60	19,10
		IB 2	31,80	25,32	26,62	27,91
		IB 4	13,49	12,89	13,76	13,38
		IJ 2	16,88	16,43	16,27	16,19
3	<i>Vibrio sp</i>	IB 4	12,00	11,26	12,90	12,06

4	<i>Staphylococcus aureus</i>	IB 1	13,70	12,90	13,00	13,20
		IB 2	19,12	19,44	20,10	19,72
		IB 3	14,22	13,34	14,12	13,89
		IB 4	10,26	18,32	12,98	13,85
5	<i>Pseudomonas aureginosa</i>	IB 2	26,70	24,60	24,98	25,43
		IB 3	11,51	11,82	11,74	11,69
		IJ 1	10,45	10,53	10,48	10,48
6	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	IB 1	20,40	22,40	22,30	21,70
		IB 2	30,68	30,62	30,00	30,43
		IJ 2	15,72	15,47	15,08	15,42
7	<i>Salmonella thypi</i>	IB 4	15,42	16,74	16,10	16,09
8	<i>Streptococcus mutans</i>	IB 2	34,18	30,80	32,46	32,48
		IB 4	11,28	11,32	11,50	11,37
9	<i>Candida albicans</i>	IB 2	19,70	20,00	20,34	20,01
		IB 4	11,58	11,10	11,20	11,29

Keterangan :

IB 1 = isolat bakteri ke-1

IB 2 = isolat bakteri ke-2

IB 3 = isolat bakteri ke-3

IB 4 = isolat bakteri ke-4

IJ 1 = isolat jamur ke-1

IJ 2 = isolat jamur ke-2

5. Pengamatan Morfologi Secara Mikroskopik dengan Pengecatan Gram

Pengamatan dilakukan dengan melihat bentuk morfologi dan warna dari mikroba tanah. Dimana warna ungu menunjukkan bakteri Gram positif, dan warna merah menunjukkan bakteri Gram negatif. Hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel 3, dan gambar 12.

Tabel 3. Hasil Pengamatan Gram Mikroba Tanah

NO	Kode Isolat	Pengamatan		
		Warna	Bentuk	Keterangan
1	IB 1	Merah	Coccus	Gram Negatif
2	IB 2	Merah	Coccus	Gram Negatif
3	IB 3	Merah	Coccus	Gram Negatif
4	IB 4	Merah	Coccus	Gram Negatif

Keterangan :

IB 1 = isolat bakteri ke-1

IB 2 = isolat bakteri ke-2

IB 3 = isolat bakteri ke-3

IB 4 = isolat bakteri ke-4

6. Pengamatan Morfologi Secara Makroskopik

Pada pengamatan morfologi secara makroskopik kita dapat melihat bentuk koloni pada medium NA tegak, NA miring, medium NB, dan metode agar lempengan pada medium NA untuk bakteri dan medium PDA tegak, PDA miring, medium GNB, dan metode agar lempengan pada medium PDA untuk jamur. Adapun hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel 4, 5, dan 6 serta gambar 13 dan 14.

Tabel 4. Hasil Pengamatan Morfologi Bakteri Secara Makroskopik

NO	Kode Isolat	Pengamatan		
		NA Tegak	NA Miring	NB Cair
1	IB 1	Beaded	Berbutir	Sedimen
2	IB 2	Beaded	Menyebar	Sedimen
3	IB 3	Papilliate	Menyebar	Sedimen
4	IB 4	Papilliate	Menyebar	Sedimen

Keterangan :

IB 1 = isolat bakteri ke-1

IB 2 = isolat bakteri ke-2

IB 3 = isolat bakteri ke-3

IB 4 = isolat bakteri ke-4

Tabel 5. Hasil Pengamatan Morfologi Jamur Secara Makroskopik

NO	Kode Isolat	Pengamatan		
		PDA Tegak	PDA Miring	GNB Cair
1	IJ 1	Plumose	Folipora	Pelikel dan Sedimen
2	IJ 2	Papilliate	Berbutir	Pelikel

Keterangan :

IJ 1 = isolat jamur ke-1

IJ 2 = isolat jamur ke-2

Tabel 6. Hasil Pengamatan Morfologi Bakteri dan Jamur Secara Makroskopik melalui Metode Agar Lempengan

NO	Kode Isolat	Pengamatan		
		Dari Atas	Pinggiran Koloni	Dari Samping
1	IB 1	Bulat	Cembung	Timbul
2	IB 2	Bulat	Cembung	Timbul
3	IB 3	Bulat	Cembung	Timbul
4	IB 4	Bulat	Cembung	Timbul
5	IJ 1	Berbenang	Bersemak	Timbul
6	IJ 2	Berbenang	Bersemak	Timbul

Keterangan :

IB 1 = isolat bakteri ke-1

IB 2 = isolat bakteri ke-2

IB 3 = isolat bakteri ke-3

IB 4 = isolat bakteri ke-4

IJ 1 = isolat jamur ke-1

IJ 2 = isolat jamur ke-2

7. Uji Aktivitas Biokimia Mikroba dari Tanah

a. Hasil Pengamatan pada Uji Motilitas

Isolat bakteri penghasil antibiotik yakni IB 1, IB 2, IB 3, dan IB 4 memperlihatkan adanya pertumbuhan bakteri pada daerah tusukan pada medium SIM. Hal ini menandakan bahwa keempat isolat bersifat motil (bergerak). Adapun hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel 7.

b. Hasil Pengamatan pada Uji Sitrat

Pada uji sitrat menunjukkan semua isolat bakteri tidak mengalami perubahan warna dari hijau menjadi biru. Hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel 7.

c. Hasil Pengamatan pada Uji Katalase

Pada uji ini, keempat isolat bakteri penghasil antibiotik memperlihatkan adanya gelembung gas dipermukaan objek gelas pada saat ditetesi H_2O_2 . Hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel 7.

d. Hasil Pengamatan pada Uji Pengaruh pH

Pada uji ini, keempat isolat penghasil antibiotik tumbuh baik pada pH netral (pH 7), tumbuh sedang pada pH basa (pH 12), dan tidak tumbuh pada pH asam (pH 4). Adapun hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel 7.

e. Hasil Pengamatan pada Uji Pengaruh Suhu

Untuk uji pengaruh suhu, keempat isolat penghasil antibiotik tumbuh baik pada suhu 37° C, tumbuh sedang pada suhu 25° C, dan tidak tumbuh pada suhu 4° C. Hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Hasil Pengamatan Uji Aktivitas Biokimia

NO	Uji Biokimia	IB 1	IB 2	IB 3	IB 4	
1	Uji Motilitas	+	+	+	+	
2	Uji Sitrat	-	-	-	-	
3	Uji Katalase	+	+	+	+	
4	Pengaruh Suhu	Kulkas (4° C)	-	-	-	-
		Kamar (25° C)	+	+	+	+
		Inkubator (37° C)	++	++	++	++
5	Pengaruh pH	Asam (pH 4)	-	-	-	-
		Netral (pH 7)	++	+	+	+
		Basa (pH 12)	+	+	+	+

Keterangan :

IB 1 = isolat bakteri ke-1

IB 2 = isolat bakteri ke-2

IB 3 = isolat bakteri ke-3

IB 4 = isolat bakteri ke-4

B. Pembahasan

Sumber mikroorganisme penghasil antibiotika antara lain berasal dari tanah, air laut, lumpur, kompos, isi rumen, limbah domestik, bahan makanan busuk dan lain-lain. Namun kebanyakan mikroba penghasil antibiotika diperoleh dari mikroba tanah terutama streptomices dan jamur. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang menciptakan segala makhluk yang terdapat di dunia

ini berasal dari tanah. Baik itu manusia yang diciptakan dalam bentuk yang sempurna maupun makhluk yang sederhana mungkin seperti mikroorganisme yang diciptakan Allah dari tanah. Semua makhluk ciptaan Allah merupakan anugrah bagi kita semua dan Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia, melainkan semua ada manfaatnya bagi makhluk hidup yang lain, seperti mikroorganisme yang berukuran kecil dapat bermanfaat bagi manusia untuk dijadikan sebagai penghasil antibiotika yang baru. Olehnya itu, kita sebagai makhluk ciptaan Allah hendaknya mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah SWT.

Pada penelitian ini, dilakukan isolasi mikroba dari tanah tempat pengolahan ayam di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar yang memiliki karakteristik tanah yang gembur, dimana tumbuhan banyak tumbuh di sekitar tanah tersebut. Selain itu, kebersihan dari tempat pengolahan ayam ini terjaga karena setiap seminggu sekali kandang ayam dibersihkan dan kotoran dari ayam dibuang ke tanah sekitar tempat pengolahan ayam untuk dijadikan pupuk. Hal ini menandakan bahwa semua makhluk ciptaan Allah memiliki manfaat bagi makhluk yang lain, sehingga kita hendaknya saling tolong menolong antar sesama makhluk ciptaan Allah SWT.

Adapun akhlak kita terhadap hewan ternak, antara lain : memberinya makan dan minum apabila hewan itu lapar dan haus, menyayangi dan kasih sayang kepadanya, tidak menyiksanya dengan cara penyiksaan apapun, atau dengan membuatnya kelaparan, memukulinya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, menyiksanya atau membakarnya.

Langkah awal dari isolasi ini adalah pengambilan sampel tanah yang kemudian ditumbuhkan ke medium GNA untuk bakteri dan medium PDA untuk jamur atau kapang. Kemudian dilanjutkan dengan pemurnian isolat, lalu fermentasi isolat bakteri, dilanjutkan pengujian aktivitas antibiotik, pengecetan gram, dan pengamatan morfologi secara mikroskopik, serta uji aktivitas biokimia.

Pengambilan sampel dari tanah dilakukan pada 4 titik yang berbeda-beda, hal ini bertujuan agar dapat mengisolasi bakteri yang berlainan sifatnya dengan harapan untuk menemukan isolat murni yang lebih baik, mengingat dalam komposisi zat kimia dalam tanah yang berbeda dapat tumbuh mikroba yang berbeda pula. Dengan memperhatikan sifat morfologi dan warna yang terbentuk pada medium yang sama, dapat menunjukkan bahwa masing-masing sampel tanah mengandung isolat yang berbeda.

Pada saat pengerjaan dilakukan hendaknya dalam keadaan aseptis dan tingkat kesterilan dijaga dengan baik agar tidak terjadi kontaminasi yang tidak diinginkan. Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu hal dalam kehidupan kita melainkan Islam telah memberikan arahan dan petunjuknya. Semua kandungan ajaran dalam Islam bertujuan untuk menjadikan umatnya hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Salah satu aspek kehidupan yang menjadi perhatian Islam adalah thaharah, kesucian dan kebersihan.

Sehingga dengan hidup sehat dan bersih kita akan terhindar dari berbagai penyakit, dengan demikian kita akan dapat bekerja dan beribadah dengan lancar dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah

yang bertaqwa kepada-Nya. Sangat mudah bagi kita mendapatkan petunjuk Allah SWT dan Rasul SAW tentang prinsip-prinsip hidup sehat dan bersih ini

Kesucian dan kebersihan merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan Allah kepada hambaNya, karena bersih merupakan modal awal dari hidup sehat, kesehatan merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya.

Di samping masalah kebersihan diri, Islam juga sangat memperhatikan kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita, karena sebagai agama yang menjadi rahmat bagi sekalian alam, Islam tidak akan membiarkan manusia merusak atau mengotori lingkungan sekitarnya. Kebersihan lingkungan itu sendiri akan sangat berpengaruh terhadap keselamatan manusia yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu menjaga kebersihan lingkungan sama pentingnya dengan menjaga kebersihan diri.

Adapun metode yang digunakan dalam isolasi kali ini adalah metode tuang, dimana dibuat pengenceran dari 10^{-1} sampai 10^{-7} . Hal ini dimaksudkan untuk menurunkan jumlah mikroorganisme agar diperoleh penyebaran koloni yang baik dan tidak mengalami penumpukan sehingga memudahkan dalam proses pengisolasian. Selain itu untuk memudahkan proses pengamatan. Adapun koloni-koloni mikroorganisme yang diisolasi hanya yang memberikan daerah bening di sekitarnya, yang membentuk fase stasioner karena menurut Sermonti (1969) pembentukan antibiotika umumnya terjadi pada fase stasioner yaitu mikroorganisme tersebut akan berusaha mempertahankan hidupnya dengan cara menghasilkan metabolit sekunder yang berupa bahan-bahan toksik yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Hal ini sesuai

dengan teori yang dikemukakan oleh Wattimena (1989) bahwa mikroba-mikroba penghasil antibiotika membentuk suatu zat yang dapat mempertahankan hidupnya dari kompetisi nutrien pada medium tempat tumbuhnya.

Adapun media yang digunakan untuk mengisolasi mikroba tanah yaitu media GNA untuk bakteri dan media PDA untuk jamur. Karena kedua media tersebut mengandung nutrien untuk kehidupan dan pertumbuhan mikroba tanah, yaitu ekstrak beef sebagai sumber protein, pepton sebagai sumber asam amino, ekstrak kentang sebagai sumber karbohidrat, dan dekstrosa sebagai sumber karbon.

Dari penjelasan mengenai medium yang digunakan, maka dapat diambil nilai-nilai keislaman, seperti makanan yang bernutrisi dan memenuhi nilai gizi yang baik. Karena kebersihan makanan dan minuman merupakan faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia, maka Islam memerintahkan ummatnya untuk memperhatikan kebersihan dan mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi. Makanan halal melahirkan kesehatan rohani pemakannya, sementara makanan bergizi membangun kesehatan jasmani mereka.

Mikroba tanah yang diperoleh ditunjukkan dengan adanya koloni bakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri di sekitarnya. Pada media GNA diperoleh 4 isolat yang diisolasi dari pengenceran 10^{-4} , 10^{-5} , 10^{-6} , 10^{-7} , yang kemudian diberi kode isolat IB 1, IB 2, IB 3, dan IB 4, sedangkan pada media PDA diperoleh 2 isolat yang diisolasi dari pengenceran 10^{-4} dan 10^{-5} dan diberi kode isolat IJ 1 dan IJ 2.

Selanjutnya hasil isolat dimurnikan dengan metode kuadran pada medium GNA untuk bakteri dan PDA untuk jamur, sehingga diperoleh kultur koloni mikroba yang murni, yaitu isolat yang hanya mengandung satu bentuk morfologi koloni yang sama, dengan metode kuadran yang diperoleh goresan yang berbeda pada empat daerah goresan, daerah pertama merupakan goresan awal sehingga masih mengandung banyak sel mikroorganisme. Goresan selanjutnya dipotong atau disilangkan dari goresan pertama sehingga jumlah semakin sedikit dan akhirnya terpisah-pisah menjadi koloni tunggal. Metode kuadran hampir sama dengan metode goresan T, tapi untuk metode goresan kuadran cawan petri dibagi menjadi 4 bagian sedangkan metode goresan T cawan petri dibagi 3 bagian. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh isolat yang betul-betul murni karena goresannya 4 kali. Metode ini berbeda dengan metode goresan sinambung karena goresan sinambung umumnya untuk peremajaan mikroba ke cawan atau ke medium yang baru. Isolat murni tersebut kemudian dibuat menjadi kultur dalam media agar miring sebagai stok. Media agar yang dimaksud adalah medium GNA untuk isolat bakteri dan medium PDA untuk isolat jamur.

Setelah memperoleh isolat yang murni, kemudian dilanjutkan dengan fermentasi dalam medium Maltosa Yeast Broth (MYB) selama 1 x 24 jam, sambil dishaker dengan kecepatan 200 rpm agar selama fermentasi bakteri akan mencapai fase stasioner dan menghasilkan metabolit sekunder, hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Salle A.J (1961) bahwa untuk mempertahankan hidup mikroorganisme dapat membuat pertahanan sendiri

dengan menghasilkan metabolit sekunder yang mempengaruhi mikroorganisme lain sehingga mikroorganisme lain itu tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Bahan-bahan toksik yang dihasilkan mikroorganisme itu disebut antibiotika, sehingga untuk melihat potensi dari hasil metabolisme sekunder maka dilakukan pengujian aktivitas antibiotika.

Media fermentasi yang digunakan adalah Maltosa Yeast Broth (MYB), karena media ini merupakan media cair yang mengandung ekstrak yeast sebagai sumber protein, maltosa dan dekstrosa sebagai sumber karbon dan pepton sebagai sumber asam amino yang dibutuhkan dalam pertumbuhan, sintesis sel, dan keperluan energi dalam metabolisme mikroorganisme.

Uji aktivitas antimikroba dilakukan dengan menggunakan mikroba uji *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus mutans*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhi*, *Escherichia coli*, *Vibrio sp*, *Staphylococcus epidermidis* dan jamur *Candida albicans*. Adapun pemilihan mikroba uji tersebut karena sifat-sifatnya yang patogenik. *Bacillus subtilis* penyebab bisul, *Staphylococcus aureus* penyebab infeksi kulit, bisul yang hebat, dan furunkel, sedangkan *Streptococcus mutans* yang dapat menyebabkan karies pada gigi. *Escherichia coli* penyebab utama diare kronik, *Salmonella typhi* penyebab demam tifoid dan infeksi saluran kemih. *Pseudomonas aeruginosa* yang bersifat invasif dan toksigenik dapat menimbulkan kebutaan, *Vibrio sp* merupakan bakteri penghasil enterotoksin dan penyebab kolera, *Staphylococcus epidermidis* penyebab jerawat puru dan *Candida albicans* penyebab vaginitis atau keputihan (Brooks, 1996).

Metode yang digunakan dalam pengujian aktivitas antibiotik yaitu metode difusi agar dengan menggunakan *antimicrobial susceptibility test disc*. Metode ini efektif dan efisien, karena tidak membutuhkan sampel yang banyak pada saat diujikan. Paper disk akan menyerap sampel yang kemudian diletakkan pada medium sehingga berdifusi ke medium padat (agar) lalu diukur zona bening di sekitar paper disk. Selain itu, dalam satu kali pembenihan mikroba dapat diujikan 4 macam isolat antibiotik sekaligus dengan meletakkan paper disk yang telah direndam pada larutan isolat ke dalam 1 cawan petri yang bersamaan. Medium yang digunakan adalah Glukosa Nutrien Agar (GNA) karena medium tersebut mengandung glukosa sebagai sumber karbon, ekstrak yeast sumber protein, pepton sebagai sumber asam amino, dan NaCl untuk menjaga sifat isotonik dari sel mikroba uji.

Hasil pengujian aktivitas antibiotik menunjukkan tidak semua isolat memberikan aktivitas terhadap mikroba uji, hal ini ditunjukkan tidak terdapat zona hambatan. Adapun isolat yang menunjukkan aktivitas terhadap mikroba uji adalah isolat IB 1 memberikan daya hambat terhadap 3 mikroba uji, yakni *Staphylococcus epidermidis* sebesar 21,70 mm, terhadap *Bacillus subtilis* sebesar 19,1 mm, dan terhadap *Staphylococcus aureus* sebesar 13,20 mm. Isolat IB 2 memberikan daya hambat terhadap 7 mikroba uji, yakni terhadap *Escherichia coli* sebesar 16,25 mm, terhadap *Bacillus subtilis* sebesar 27,91 mm, terhadap *Staphylococcus aureus* sebesar 19,72 mm, terhadap *Pseudomonas aureginosa* sebesar 25,43 mm, terhadap *Staphylococcus epidermidis* sebesar 30,43 mm, terhadap *Streptococcus mutans* sebesar 32,48

mm, dan terhadap *Candida albicans* sebesar 20,01 mm. Isolat IB 3 memberikan daya hambat terhadap 2 mikroba uji, yakni terhadap *Staphylococcus aureus* sebesar 13,89 mm dan terhadap *Pseudomonas aureginosa* sebesar 11,69 mm. Isolat IB 4 memberikan daya hambat terhadap 6 mikroba uji, yakni terhadap *Vibrio sp* sebesar 12,06 mm, terhadap *Staphylococcus aureus* sebesar 13,85 mm, terhadap *Salmonella thypi* sebesar 16,09 mm, terhadap *Streptococcus mutans* sebesar 11,37 mm, terhadap *Basillus subtilis* sebesar 13,38 mm, dan terhadap *Candida albicans* sebesar 11,29 mm.

Sedangkan hasil pengujian aktivitas antibiotika untuk isolat jamur yakni pada isolat IJ 1 memiliki aktivitas yang dapat menghambat 1 mikroba uji yakni *Pseudomonas aureginosa* sebesar 10,48 mm sedangkan isolat IJ 2 dapat menghambat 2 mikroba uji yakni *Basillus subtilis* sebesar 16,19 mm dan *Staphylococcus epidermidis* sebesar 15,42 mm.

Dari hasil pengujian antibiotika yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa isolat IB 1 memiliki daya kerja spektrum sempit karena hanya menghambat pertumbuhan bakteri patogen gram positif, seperti *Basillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*, dan *Staphylococcus epidermidis*. Isolat IB 2 memiliki daya kerja spektrum luas karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen gram positif dan gram negatif, seperti *Escherichia coli*, *Basillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aureginosa*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*, dan jamur *Candida albicans*. Isolat IB 3 memiliki daya kerja spektrum luas karena dapat

menghambat pertumbuhan bakteri patogen gram positif dan gram negatif, seperti *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aureginosa*. Isolat IB 4 memiliki daya kerja spektrum luas karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen gram positif dan gram negatif, seperti *Basillus subtilis*, *Vibrio sp*, *Salmonella thypi*, *Streptococcus mutans*, dan jamur *Candida albicans*.

Untuk isolat IJ 1 memiliki daya kerja spektrum sempit karena hanya menghambat pertumbuhan bakteri patogen gram negatif, yakni *Pseudomonas aureginosa* sedangkan isolat IJ 2 juga memiliki daya kerja spektrum sempit karena hanya menghambat pertumbuhan bakteri patogen gram positif, yakni *Basillus subtilis* dan *Staphylococcus epidermidis*.

Selanjutnya dilakukan dua tahap identifikasi yaitu pengamatan secara morfologi makroskopik maupun mikroskopik dan pengujian aktivitas biokimia mikroba. Dapat dilihat dari hasil penelitian bentuk koloni bakteri penghasil antibiotik pada medium NA tegak, untuk isolat IB 1 dan IB 2 berbentuk Beaded, sedangkan isolat IB 3 dan IB 4 berbentuk Papilliate. Bentuk koloni bakteri pada medium NA miring, untuk isolat IB 1 berbentuk Berbutir, dan isolat IB 2, IB 3, dan IB 4 berbentuk Menyebar. Sedangkan bentuk bakteri pada medium cair yakni NB, semua isolat bakteri penghasil antibiotik berbentuk Sedimen. Dan pada metode agar lempengan, semua isolat bakteri jika dilihat dari atas, bentuk koloninya bulat, pinggiran koloninya menyebar, dan jika dilihat dari samping bentuknya koloninya timbul.

Adapun bentuk koloni jamur pada medium PDA tegak, untuk isolat IJ 1 berbentuk Plumose dan isolat IJ 2 berbentuk Papillate. Bentuk koloni jamur

pada medium PDA miring, untuk isolat IJ 1 dan IJ 2 bentuknya Filipora. Sedangkan bentuk jamur pada medium cair yakni GNB, untuk isolat IJ 1 Pelikel dan Sedimen sedangkan IJ 2 bentuknya Pelikel. Dan pada metode agar lempengan, semua isolat jamur jika dilihat dari atas, bentuk koloninya berbenang, pinggiran koloninya bersemak, dan jika dilihat dari samping bentuknya koloninya timbul.

Mikroba yang morfologinya sama mungkin berbeda dalam kebutuhan nutrisi dan persyaratan ekologiannya. Karena menurut Waluyo (2004), suatu mikroba tidak dapat diidentifikasi hanya berdasarkan sifat-sifat morfologinya saja, perlu dilakukan uji lanjutan seperti sifat biokimia dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhannya.

Selanjutnya dilakukan pengamatan secara mikroskopik, yaitu dengan pengecatan gram dimana pengecatan gram isolat bakteri dilakukan untuk mengidentifikasi bakteri yang diperoleh agar dapat diklasifikasikan sebagai bakteri gram positif atau bakteri gram negatif. Bakteri yang berwarna ungu pada pewarnaan gram disebut bakteri gram positif, sedangkan yang berwarna merah disebut bakteri gram negatif. Namun sebelum dilakukan pengecatan gram, terlebih dahulu dilakukan fiksasi pada objek glass yang di atasnya telah diletakkan bakteri. Hal ini dilakukan untuk melekatkan bakteri pada objek gelas, mencegah mengerutnya globula-globula protein sel, merubah afinitas cat, dapat membunuh bakteri di atas objek glass, dan membuat sel-sel lebih kuat tanpa menyebabkan lisisnya sel serta melarutkan konstituen-konstituen sel bakteri (Bibiana, 1994).

Pewarnaan gram memberikan hasil yang baik, bila digunakan biakan segar yang berumur 24-48 jam. Bila digunakan biakan tua, terdapat kemungkinan penyimpangan hasil pewarnaan gram. Pada biakan tua, banyak sel mengalami kerusakan pada dinding selnya. Kerusakan pada dinding sel ini menyebabkan zat warna dapat keluar sewaktu dicuci dengan larutan pemucat. Ini berarti bahwa bakteri gram positif dengan dinding yang rusak tidak lagi dapat mempertahankan kompleks warna kristal violet-yodium sehingga terlihat sebagai bakteri gram negatif.

Cat-cat yang digunakan dalam pengecatan gram adalah cat A (Kristal violet), cat B (larutan iodium), cat C (alkohol), dan cat D (safranin). Cat-cat yang digunakan merupakan senyawa organik yang mengandung gugus kromofor dan gugus ausokrom yang terikat dalam suatu cincin benzen.

Pada pengecatan gram digunakan cat A (kristal violet) merupakan cat yang bersifat basa. Zat warna basa yang bermuatan positif ini akan berikatan dengan dinding sel, membran sel, dan sitoplasma yang bermuatan negatif pada sel sehingga berubah warna menjadi ungu.

Penambahan cat B (larutan iodium) merupakan larutan membran yang berfungsi untuk meningkatkan afinitas pengikatan zat warna pada bakteri agar lebih kuat. Pewarna cat B menyebabkan terbentuknya persenyawaan kompleks kristal violet di dalam sel bakteri.

Penambahan cat C (alkohol) sebagai deklorikasi atau zat peluntur zat warna. Bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tebal sehingga dinding sel mengalami dehidrasi. Pori-pori pada lapisan tersebut akan

menyusut dan merapat, daya rembes dinding sel dan membran menurun, kompleks kristal violet-iodium tidak dapat keluar dari sel, sehingga warna sel tetap ungu sedangkan untuk bakteri gram negatif mempunyai kandungan lipid yang tinggi dan senyawa ini mudah luntur dengan zat peluntur alkohol. Dan hal inilah yang memungkinkan terjadinya pelunturan zat warna awal (cat A/kristal violet).

Penambahan cat D (safranin), sebagai (counterstain) untuk memberikan warna kontras pada sel-sel bakteri. Penambahan cat ini yang membedakan bakteri gram negatif dan bakteri positif yang akan diamati pada mikroskop. Jika pada penggunaan tetap berwarna ungu maka dinyatakan sebagai bakteri gram positif, sedangkan jika terjadi perubahan warna merah dinyatakan sebagai bakteri gram negatif.

Adapun hasilnya semua isolat termasuk ke dalam bakteri gram negatif, dimana gram negatif memiliki dinding sel yang tipis sehingga pada pemberian cat penutup (Safranin) dapat terwarnai. Sedangkan bakteri gram positif mempunyai kadar lipid dan protein yang rendah sehingga mengalami denaturasi protein pada dinding selnya oleh pencucian dengan alkohol sehingga protein menjadi keras dan beku, pori-pori mengecil sehingga kompleks kristal violet dan iodium dipertahankan karenanya sel bakteri berwarna biru atau ungu.

Selanjutnya diadakan pengujian aktivitas biokimia untuk isolat bakteri yakni uji motilitas, uji katalase, uji sitrat, uji pengaruh suhu, dan uji pengaruh pH. Menurut Djide (2003), diagnosa mikroskopik hanya merupakan dugaan.

Untuk itu agar diperoleh diagnosa yang konklusif, sifat-sifat biokimia merupakan keharusan yang harus dilakukan. Uji aktivitas biokimia dilakukan setelah diperoleh koloni yang terpisah atau biasa disebut isolat murni.

Uji motilitas dilakukan untuk mengetahui kemampuan bakteri untuk bergerak dimana gerakan bakteri tersebut dipengaruhi oleh adanya flagella. Pada uji motilitas, ke-4 isolat bakteri pada medium SIM (Semisolid Indol Motility) menyebar pada daerah tusukan. Hal ini menunjukkan bahwa keempat isolat bersifat motil (bergerak) dan memiliki flagella sebagai alat gerak.

Pada uji katalase, dengan adanya gelembung gas pada objek gelas setelah diinokulasikan bakteri dan ditetesi dengan larutan H_2O_2 3% menunjukkan ke-4 isolat positif. Tes ini untuk mendeteksi adanya enzim katalase, dimana enzim ini melindungi bakteri dari H_2O_2 yang dapat terakumulasi selama proses metabolisme aerobik. Jika H_2O_2 terakumulasi, maka dapat menjadi toksik bagi mikroorganisme. Dengan adanya enzim katalase yang dapat memecah H_2O_2 menjadi molekul air dan oksigen, sehingga tidak toksik lagi.

Pada uji Sitrat di medium SCA, ke-4 isolat menunjukkan hasil negatif dimana tidak mengalami perubahan warna dari hijau menjadi biru. Hal ini disebabkan bakteri tersebut tidak menggunakan garam sitrat sebagai sumber karbon, karena pada dasarnya garam sitrat satu-satunya yang digunakan oleh bakteri sebagai sumber karbon. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah bakteri menggunakan garam sitrat sebagai sumber karbon. Jika bakteri mampu menggunakan sitrat, maka asam akan dihilangkan dari medium biakan,

sehingga akan meningkatkan pH dan menyebabkan perubahan warna yang terjadi pada medium dari hijau menjadi biru.

Untuk uji pengaruh pH yang telah dilakukan, ke-4 isolat tumbuh dengan baik pada pH 7, tumbuh sedang pada pH 12, dan ke-4 isolat tidak tumbuh pada pH 4. Hasil tersebut terjadi karena kerja enzim yang mengkatalisis berbagai reaksi metabolisme sel dipengaruhi oleh tingkat pH. Sesuai dengan pendapat Pelczar (1986), daya kerja enzim sangat dipengaruhi oleh pH. Jika pH di atas atau di bawah pH optimum (pH 7) maka kerja enzim akan terhambat. Terhambatnya kerja enzim menyebabkan terhambatnya pula metabolisme sel sehingga sel terhambat untuk tumbuh dan berkembang. Perbedaan sensitifitas isolat bakteri terhadap pH tergantung oleh jenis enzim yang mengkatalisis berbagai reaksi metabolisme.

Untuk uji pengaruh Suhu, semua isolat pada suhu 37° C memiliki tingkat kekeruhan yang sangat keruh karena pertumbuhan bakteri sangat baik pada suhu tersebut. Pada suhu 25° C mengalami kekeruhan pada tabung yang menandakan terjadinya pertumbuhan, tetapi tidak sekeruh pada suhu 37° C, sedangkan pada suhu 4° C ke-4 isolat tidak mengalami pertumbuhan. Sehingga dapat diketahui ke-4 isolat tersebut termasuk dalam mikroba mesofilik (mesotermik).

Obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan dapat berasal dari bahan sintetik maupun dari bahan alam. Pada dasarnya semua penyakit berasal dari Allah, maka yang dapat menyembuhkan juga Allah semata. Akan tetapi untuk mencapai kesembuhan tersebut tentunya dengan usaha yang maksimal

dan tergantung bagaimana cara mengatasi penyakit tersebut sehingga penyakit tersebut dapat sembuh dengan izin Allah. Sehingga kita dapat mengambil pelajaran mengenai betapa pentingnya obat untuk dijadikan untuk menyembuhkan penyakit. Dewasa ini bahan alam khususnya tanah telah banyak diteliti oleh para ahli untuk dikembangkan menjadi suatu bahan obat, yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Tidaklah yang diciptakan oleh Allah swt adalah sia-sia sekecil atau sesederhana apa pun itu misalnya mikroorganisme atau yang lebih sederhana darinya.

Salah satu bukti bahwa sekecil apa pun makhluk itu pasti memiliki manfaat, sama seperti pada penelitian ini dimana dilakukan pencarian senyawa antibiotika yang berasal dari mikroorganisme-mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat baik di bidang ilmu pengetahuan maupun di bidang kesehatan. Dan kita sebagai makhluk ciptaan Allah hendaknya mensyukuri atas segala pemberian dari Allah SWT.

Kita mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia dari saripati tanah. Diterangkan kejadian manusia itu berasal dari sari pati tanah yang merupakan suatu kejadian yang tidak langsung dari manusia. Hal ini untuk membandingkan antara proses dari arti tanah yang mati dan tidak bergerak dengan manusia yang hidup dan bergerak. Dengan pernyataan ini, dapat diketahui bahwa Allah SWT dapat menjadikan sesuatu yang hidup itu dari benda mati yakni tanah. Sebagai contoh manusia, yang diciptakan oleh Allah dari sari pati tanah. Sama halnya dengan mikroorganisme yang terdapat di dalam tanah yang telah diisolasi sebagai penghasil antibiotik. Semua makanan

yang dimakan oleh manusia sebenarnya berasal dari tanah, seperti buah-buahan, sayur, nasi, dan sebagainya yang kemudian diolah melalui proses pencernaan kemudian menjadi sumber energi, nutrisi, dan vitamin bagi manusia serta menjadi air mani dan kemudian menjadi darah bagi manusia.

Adapun cara pemotongan hewan yang sesuai dengan syari'at Islam, adalah sebagai berikut:

- a. Gunakan pisau yang setajam mungkin. Semakin tajam, semakin baik.
- b. Tidak mengasah pisau dihadapan hewan yang akan disembelih. Karena ini akan menyebabkan dia ketakutan sebelum disembelih.
- c. Menghadapkan hewan ke arah kiblat. Hewan yang hendak disembelih dihadapkan ke kiblat pada posisi tempat organ yang akan disembelih (lehernya) bukan wajahnya. Karena itulah arah untuk mendekatkan diri kepada Allah karena semua makhluk ciptaan Allah sesungguhnya beribadah kepada Allah. Dengan demikian, cara yang tepat untuk menghadapkan hewan ke arah kiblat ketika menyembelih adalah dengan memosisikan kepala di selatan, kaki di barat, dan leher menghadap ke barat.
- d. Membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. Karena ini akan memudahkan penyembelih untuk memotong hewan dengan tangan kanan dan memegang leher dengan tangan kiri. Hewan yang hendak disembelih dibaringkan ke sebelah kiri, sehingga memudahkan bagi orang yang menyembelih. Karena penyembelih akan memotong hewan dengan tangan kanan, sehingga hewannya dibaringkan di lambung sebelah kiri.

- e. Mengucapkan nama Allah ketika hendak menyembelih. Beberapa saat sebelum menyembelih, harus membaca *basmalah*. Ini hukumnya wajib, menurut pendapat yang kuat.
- f. Dianjurkan untuk membaca takbir (Allahu akbar) setelah membaca *basmalah*.
- g. Disembelih dengan cepat untuk meringankan apa yang dialami hewan kurban.
- h. Pastikan bahwa bagian tenggorokan, kerongkongan, dua urat leher (kanan-kiri) telah pasti terpotong. Terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat leher. Ini adalah keadaan yang terbaik. Jika terputus empat hal ini maka sembelihannya halal menurut semua ulama.
- i. Sebagian ulama menganjurkan agar membiarkan kaki kanan bergerak, sehingga hewan lebih cepat meregang nyawa.
- j. Tidak boleh mematahkan leher sebelum hewan benar-benar mati. Karena akan semakin menambah rasa sakit hewan kurban. Demikian pula menguliti binatang, memasukkannya ke dalam air panas dan semacamnya. Semua ini tidak boleh dilakukan kecuali setelah dipastikan hewan itu benar-benar telah mati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Isolasi mikroba penghasil antibiotika dari tanah pengolahan ayam di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar menghasilkan 4 isolat bakteri dan 2 isolat jamur. Keduanya memiliki aktivitas antimikroba pada beberapa mikroba uji.
2. Adapun mikroba uji yang dapat dihambat oleh keenam isolat yang telah diisolasi dari tanah pengolahan ayam di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar adalah *Bacillus subtilis*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Pseudomonas*, *Streptococcus mutans*, *Candida albicans*, *Escherichia coli*, *Vibrio sp* dan *Salmonella thypi*.

B. Saran


Disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut untuk karakterisasi dan identifikasi golongan senyawa antibiotik dari tanah pengolahan ayam di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA


- Ambarwati dan Azizah. 2009. *Jurnal Penelitian Sains dan Teknologi "Isolasi dari Tanah Sawah Sebagai Penghasil Antibiotik"*.
- Benson, V. 2001. *Microbiological Application Laboratory Manual 8th Edition*. The Mc Graw-Hill. Company.
- Bibiana, W. Lay. 1994. *Analisis Mikroba di Laboratorium*. Jakarta: PT. Grafindo Perkasa.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Djide, N. dkk. 2003. *Mikrobiologi Farmasi Terapan, Laboratorium Mikrobiologi Farmasi dan Bioteknologi Farmasi*. Makassar: Jurusan Farmasi Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin.
- Djide, M Natsir dan Sartini. 2008. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Farmasi*. Makassar: Lephaz UNHAS.
- Dwyana, Z. 2006. *Penuntun Praktikum Mikrobiologi Farmasi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Entjang. 2003. *Mikrobiologi dan Parasitologi untuk Akademi Keperawatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ganiswarna, S. G. 1995. *Farmakologi dan Terapi Edisi 5*. Jakarta: UI Press.
- Garrity, G. M. Bell dan Lilburn. 2004. *Taxonomic Outline of The Procaryotes Bergey's Manual of Systemic Bacteriologi, 2th Edition*. United States of America: Springer, New York Berlin Hendelberg.
- Ginandjar, Indrawati dkk. 2006. *Mikrobiologi Dasar dan Terapan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Irianto, Koes. 2006. *Menguak Dunia Mikroorganisme*. Bandung: Yrama Widya.
- Kill, M. A. 1995. *Candida Pracital Hand Book for Suffereers, Boomsburry*.
- Madigan. M. C., Martinko, J. M., and Parker, J. 2000. *Biology of Microorganism*. USA: Prentice Hall.
- Naid, T. 1999. *Potensi Bioteknologi dalam Produksi dan Pengembangan dan Antibiotika Baru Menuju Paradigma Sehat*. Makassar. Hasanuddin University Press.
- Omura, S. dan Takahashi, Y. 2008. *Actinomadura Maheshkhaliensis sp. No 01 Anovelactinomycetes Isolated From Mangrove Rhizosphere soil of Maheshkali*. Bangladesh.

- Panagan, Almunadi T. *Jurnal Penelitian Sains "Isolasi Mikroba Penghasil Antibiotika dari Tanah Kampus Unsri Indralaya Menggunakan Media Ekstrak Tanah"*. 2008.
- Pelczar, Michael J. dan Chan, E. C. S. 2008. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*. Terjemahan Hadioetomo, Ratna Sari dkk. Jakarta: UI Press.
- Pratiwi, Sylvia T. 2008. *Mikrobiologi Farmasi*. Jakarta: Erlangga.
- Presscot, H. 2002. *Laboratory Exercises in Microbiology 8th Edition*. The Mc Graw-Hill. Company.
- Qardhawi, Yusuf. 2002. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Rao, S.N.S. 1994. *Mikroorganisme Tanah dan Pertumbuhan Tanaman Edisi II*. Jakarta: UI Press.
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan Al Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Sumarsih, Sri. 2003. *Diktat Kuliah Mikrobiologi Dasar*. Yogyakarta: Fakultas Pertanian UPN "Veteran".
- Sutanto, Rachman. 2005. *Dasar - Dasar Ilmu Tanah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suwandi, U. 1989. *Mikroorganisme Penghasil Antibiotik*. (<http://www.kalbefarma.com>)
- Waluyo, L. 2004. *Mikrobiologi Umum*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Lampiran 1. *Skema Kerja*




Lampiran 2. Gambar Hasil Pengamatan



Gambar 2. Foto Hasil Isolat Bakteri dari Tanah pada Media Agar

Keterangan :

- A = GNA bakteri pengenceran 10^{-1}
- B = GNA bakteri pengenceran 10^{-2}
- C = GNA bakteri pengenceran 10^{-3}
- D = GNA bakteri pengenceran 10^{-4}
- E = GNA bakteri pengenceran 10^{-5}
- F = GNA bakteri pengenceran 10^{-6}
- G = GNA bakteri pengenceran 10^{-7}



Gambar 3. Foto Hasil Isolat Jamur dari Tanah pada Media Agar

Keterangan :

A = PDA jamur pengenceran 10^{-1}

B = PDA jamur pengenceran 10^{-2}


C = PDA jamur pengenceran 10^{-3}

D = PDA jamur pengenceran 10^{-4}

E = PDA jamur pengenceran 10^{-5}

F = PDA jamur pengenceran 10^{-6}

G = PDA jamur pengenceran 10^{-7}



Gambar 4. Foto Hasil Pemurnian Isolat Bakteri dari Tanah dengan Metode Kuadran pada Medium NA

Keterangan :


- A = Koloni Pemurnian Isolat Bakteri IB 1
- B = Koloni Pemurnian Isolat Bakteri IB 2
- C = Koloni Pemurnian Isolat Bakteri IB 3
- D = Koloni Pemurnian Isolat Bakteri IB 4



Gambar 5. Foto Hasil Pemurnian Isolat Jamur dari Tanah dengan Metode Kuadran pada Medium PDA

Keterangan :

- A = Koloni Pemurnian Isolat Jamur IJ 1
- B = Koloni Pemurnian Isolat Jamur IJ 2



Gambar 6. Foto Hasil Isolat Murni Bakteri dari Tanah pada Medium NA Miring

Keterangan :

A = Koloni Isolat Murni Bakteri IB 1

B = Koloni Isolat Murni Bakteri IB 2

C = Koloni Isolat Murni Bakteri IB 3

D = Koloni Isolat Murni Bakteri IB 4




Gambar 7. Foto Hasil Isolat Murni Jamur dari Tanah pada Medium PDA Miring

Keterangan :

A = Koloni Isolat Murni Jamur IJ 1

B = Koloni Isolat Murni Jamur IJ 2



Gambar 8. Foto Hasil Fermentasi Bakteri dari Tanah pada Medium MYB

Keterangan :

A = Fermentat Isolat Murni Bakteri IB 1

B = Fermentat Isolat Murni Bakteri IB 2

C = Fermentat Isolat Murni Bakteri IB 3

D = Fermentat Isolat Murni Bakteri IB 4




Gambar 9. Foto Hasil Fermentasi Jamur dari Tanah pada Medium MYB

Keterangan :

A = Fermentat Isolat Murni Jamur IJ 1

B = Fermentat Isolat Murni Jamur IJ 2



Gambar 10. Foto Hasil Pengujian Penghambatan Fermentat Isolat Bakteri terhadap Mikroba Uji

Keterangan :

A = *Bacillus subtilis*

1 = IB 1

B = *Escherichia coli*

2 = IB 2

C = *Streptococcus mutans*

3 = IB 3

D = *Pseudomonas aeruginosa*

4 = IB 4


E = *Staphylococcus aureus*

F = *Staphylococcus epidermidis*

G = *Salmonella typhi*

H = *Vibrio sp*

I = *Candida albicans*



GUNIVERSITAS ISLAM NEGERI I

Gambar 11. Foto Hasil Pengujian Penghambatan Fermentat Isolat Jamur terhadap Mikroba Uji

Keterangan :

A = *Bacillus subtilis*

1 = IJ 1

B = *Escherichia coli*

2 = IJ 2

C = *Streptococcus mutans*

3 = Kontrol

D = *Pseudomonas aeruginosa*


E = *Staphylococcus aureus*

F = *Staphylococcus epidermidis*

G = *Salmonella typhi*

H = *Vibrio sp*

I = *Candida albicans*



Gambar 12. Foto Hasil Pengecatan Gram Isolat Bakteri Murni.


Keterangan :

A = Koloni Bakteri IB 1

B = Koloni Bakteri IB 2

C = Koloni Bakteri IB 3

D = Koloni Bakteri IB 4



Gambar 13. Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Bakteri pada Medium Agar Miring.


Keterangan :

A = Koloni Bakteri IB 1

B = Koloni Bakteri IB 2

C = Koloni Bakteri IB 3

D = Koloni Bakteri IB 4



Gambar 14. Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Bakteri pada Medium Agar Tegak.


Keterangan :

A = Koloni Bakteri IB 1

B = Koloni Bakteri IB 2

C = Koloni Bakteri IB 3

D = Koloni Bakteri IB 4



Gambar 15. Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Bakteri pada Medium Cair.


Keterangan :

A = Koloni Bakteri IB 1

B = Koloni Bakteri IB 2

C = Koloni Bakteri IB 3

D = Koloni Bakteri IB 4



Gambar 16. Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Bakteri pada Medium Agar Lempengan.

Keterangan :

A = Koloni Bakteri IB 1

B = Koloni Bakteri IB 2

C = Koloni Bakteri IB 3

D = Koloni Bakteri IB 4

**A****B**

Gambar 17. Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Jamur pada Medium Agar Miring.

Keterangan :

A = Koloni Bakteri IJ 1

B = Koloni Bakteri IJ 2




Gambar 18. Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentasi Jamur pada Medium Agar Tegak.

Keterangan :

A = Koloni Bakteri IJ 1

B = Koloni Bakteri IJ 2



Gambar 19. Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Jamur pada Medium Cair.

Keterangan :

A = Koloni Bakteri IJ 1

B = Koloni Bakteri IJ 2



Gambar 20. Foto Hasil Pengujian Makroskopik Fermentat Jamur pada Metode Agar Cawan.

Keterangan :

A = Koloni Bakteri IJ 1

B = Koloni Bakteri IJ 2



Gambar 21. Foto Sampel Tanah yang di ambil dari 4 titik.

Keterangan :

A = Titik ke-1 Pengambilan Sampel

B = Titik ke-2 Pengambilan Sampel

C = Titik ke-3 Pengambilan Sampel

D = Titik ke-4 Pengambilan Sampel



Gambar 22. Foto Blank Disk yang Digunakan

Lampiran 3. *Pembuatan Medium*

a. Glukosa Nutrient Agar (GNA)

Komposisi :

Ekstrak Beef	3,0 g
Pepton	5,0 g
Agar	15,0 g
Glukosa	10,0 g
Air suling hingga	1000 ml

Pembuatan :

Semua bahan tersebut dimasukkan ke dalam gelas erlenmeyer dan dilarutkan dalam aquadest kemudian dipanaskan sampai mendidih hingga semua larut. Disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121° C selama 15 menit dengan tekanan 2 atm.

b. Maltosa Yeast Broth (MYB)

Komposisi :

Maltosa	10 g
Yeast Extract	3 g
Pepton	5 g
Dekstrosa	10 g
Aquadest hingga	1000 ml

Pembuatan :

Semua bahan tersebut dimasukkan ke dalam gelas erlenmeyer dan dilarutkan dalam aquadest kemudian dipanaskan sampai mendidih hingga

semua larut. Disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121° C selama 15 menit dengan tekanan 2 atm.

c. Nutrient Agar (NA)

Komposisi :

Ekstrak Beef	3,0 g
Pepton	5,0 g
Agar	15,0 g
Air suling hingga	1000 ml

Pembuatan :

Ditimbang bahan sebanyak 23,0 g dilarutkan dalam 1000 ml sampai larut, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121° C selama 15 menit.

d. Nutrient Broth (NB)

Komposisi :

Ekstrak Beef	3,0 g
Pepton	5,0 g

Air suling hingga 1000 ml

Pembuatan :

Semua bahan di masukkan ke dalam erlemeyer dilarutkan dalam air suling hingga 800 ml, dipanaskan sampai larut, dicukupkan sampai 1000 ml aquadest, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121° C selama 15m menit.

e. Potato Dextrosa Agar (PDA)

Komposisi :

Potato	200 g
Dextrosa	10 g
Agar	15 g
Air suling hingga	1000 ml

Pembuatan :

Semua bahan dimasukkan ke dalam gelas erlenmeyer dilarutkan dalam air suling hingga 800 ml, dipanaskan sampai larut, dicukupkan sampai 1000 ml air suling, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121° C selama 15 menit.

f. Semisolid Indol Motiliti (SIM)

Komposisi :

Pepton dari Casein	20,0 g
Peptic dari daging	6,1 g
Ferri Amonium sulfat	0,2 g
Natrium thiosulfat	0,2 g
Agar	3,5 g
Air suling hingga	1000 ml

Pembuatan :

Ditimbang medium SIM sebanyak 3 g, dilarutkan dalam 100 ml dipanaskan diatas penangas air hingga melarut. Disterilkan pada suhu 121° C selama 15 menit.

g. Simon's Citrat Agar (SCA)

Komposisi :

Natrium Citrat	2,0 g
NaCl	5,0 g
Dikalium Hidrogen Pospat	1,0 g
Ammonium Dihidrogen pospat	1,0 g
Magnesium Sulfat	0,2 g
Brom timol biru	0,08 g
Agar	15,0 g
Air suling hingga	1000 ml

Pembuatan :

Ditimbang medium Simon'S Citrat Agar sebanyak 3,5 g, dilarutkan dalam 100 ml dipanaskan diatas penangas air hingga melarut. Disterilkan pada suhu 121° C selama 15 menit.

Lampiran 4. *Pembuatan Pereaksi*

a. Cat A

- Larutan pokok kristal violet

Komposisi :

Kristal violet 20,0 g

Etanol 95% 100,0 ml

- Larutan oksalat

Ammonium oksalat 1,0 g

Air suling 100,0 ml

Larutan yang digunakan dilaboratorium :

Larutan pokok Kristal violet 1 bagian

Air suling 10 bagian

Larutan pokok ammonium oksalat 4 bagian

Pembuatan :

Dicampur larutan (1) dan (2), kemudian disimpan dalam wadah tertutup gelas.

b. Cat B

- Larutan Iodium

Komposisi :

Kristal iodium 1,0 g

Kalium Iodida 2,0 g

Air suling 5,0 g

Pembuatan :

Setelah kedua bahan tersebut larut, ditambahkan air suling 240 ml dan 60 ml cairan Natrium bikarbonat 5%.

c. Cat C

- Larutan pemucat

Komposisi :

Etanol 95% 250 ml

Aseton 250 ml

Pembuatan :

Dicampurkan kedua bahan tersebut, kemudian disimpan dalam wadah tertutup gelas.

d. Cat D

- Larutan pokok safranin

Komposisi :

Safranin O 2,5 g

Etanol 95% 100,0 ml

Larutan yang digunakan dilaboratorium

Diencerkan dengan safranin,

Larutan pokok safranin 1 bagian

Air suling 5 bagian

Pembuatan :

Dicampurkan kedua bahan tersebut, kemudian disimpan dalam botol tertutup gelas.

e. Larutan HCl 0,1 %

Komposisi :

HCl pekat 12 % 0,83 ml

Aquadest 100 ml

Pembuatan :

Dipipet 0,83 ml HCl pekat 12 % lalu dimasukkan ke dalam gelas ukur yang berisi aquadest. Ditambahkan aquadest sampai tanda 100 ml. Larutan disimpan di dalam botol coklat tertutup pada suhu ruang.

f. Larutan H₂O₂ 3 %Komposisi :H₂O₂ 3 ml

Aquadest 10 ml

Pembuatan :

Sebanyak 3 ml H₂O₂ diencerkan dengan aquadest 10 ml. Larutan disimpan di dalam botol gelap tertutup pada suhu ruangan.

BIOGRAFI PENULIS



Sufyan Tsauri, lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Maret 1990. Anak bungsu dari 2 bersaudara ini merupakan buah hati dari pasangan H. Muh. Dahlan Yaring dan Hj. Basse Asia. Memulai pendidikan di TK Aisyiah Tana Toraja pada tahun 1995 kemudian melanjutkan pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Makale, Tana Toraja pada tahun 1996. Pada tahun 2002 melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah Negeri Rantepao, Tana Toraja kemudian pindah di Madrasah Tsanawiyah Madani UIN Alauddin Makassar, Gowa pada tahun 2003. Pada tahun 2005 melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Makassar dan lulus pada tahun 2008. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikannya di Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan Alhamdulillah berkat skripsi ini penulis mendapatkan gelar Sarjana Farmasi di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2012.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Akan tetapi besar harapan penulis kiranya dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang farmasi. Amin,,