

**GAMBARAN MORTALITAS IBU HAMIL  
BERDASARKAN INDIKASI SEKTIO CAESAREA  
DI RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH MAKASSAR  
TAHUN 2009-2011**



**Karya Tulis Ilmiah(KTI)**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan  
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar**

**OLEH**

**SYAMRINA  
70400009050**

**JURUSAN KEBIDANAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2012**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penulis yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya tulis ilmiah ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka karya tulis ilmiah dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Makassar, Oktober 2012

Penyusun

SYAMRINA  
70400009050

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, pencipta langit dan bumi, semoga rahmat, hidayah, tercurahkan bagi kita semua sehingga segala aktifitas bernilai ibadah disisi Allah SWT. Pada baginda Rasulullah SAW kita haturkan salam dan do'a tercurahkan yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah yang berjudul **“Gambaran Mortalitas ibu hamil berdasarkan Indikasi Sektio Caesarea di RSKD Ibu dan Anak Sitti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011”**.

Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis sangat menyadari akan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun merupakan

masuk dalam penyempurnaan selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Mengawali ucapan terima kasih ini disampaikan penghargaan yang istimewa kepada ayahanda Abdullah dan ibunda Norma tercinta atas segala perhatian, kasih sayang, doa restu serta pengorbanannya yang tak terhingga dan juga kepada adik-adikku. Begitupula kepada pihak keluarga yang senantiasa memberikan nasehat, doa serta bantuan dalam bentuk apapun semoga keikhlasannya dibalas Allah SWT.

Ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga nilainya juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT.M.S., selaku rektor UIN Alauddin Makassar beserta stafnya.
2. Bapak Dr.dr.H.Rasyidin Abdullah, MPH., MH.Kes selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan beserta staf-stafnya.
3. dr.Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes, selaku pembimbing yang senantiasa memberikan masukan dan motivasi dalam penyusunan karya tulis ilmiah.
4. Firdayanti Djafar, S.Si.T, M.Keb selaku penguji yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
5. Alm. Dr. Muh. Arief Alim, M.Kes selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.

6. Sebagai pengganti penguji II bapak Drs.Wahyudin G, M.Ag bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak masukan dalam karya tulis ilmiah ini.
7. Bapak dr.H.Leo Prawirohardjo,Sp.OG(K), M.Kes, M.M, PhD selaku Kepala RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar dan seluruh stafnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan.
8. Kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan dalam mendidik penulis selama pendidikan
9. Kepada seluruh teman-teman Prodi Kebidanan Angkatan 09 terutama untuk sahabat-sahabatku Ayu, Hj Esa, Fitri, Qadry, Atti, yang telah memberikan dukungan dan saran hingga penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi, materi maupun non materi, penulis ucapkan banyak terima kasih. Semoga mendapat limpahan rahmat dan selalu diberi perlindungan serta kesehatan oleh Allah SWT. Amin... Ya Rabbal 'Alamiin...

Makassar , Oktober 2012

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KTI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang persalinan

1. Pengertian persalinan ..... 7
2. Tanda-tanda persalinan ..... 7
3. Pelaksanaan persalinan normal ..... 9

### B. Tinjauan khusus Tentang Seksio sesarea

1. Defenisi Seksio Sesarea ..... 10
2. Etimiologi Seksio Sesarea..... 10
3. Sejarah seksio sesarea ..... 11
4. Jenis-jenis seksio sesarea ..... 12
5. Indikasi seksio sesarea ..... 13
6. Keuntungan dan kerugian seksio sesarea ..... 18
7. Efek samping seksio sesarea ..... 18
8. Komplikasi seksio sesarea..... 21

### C. Tinjauan Tentang Mortalitas ibu

1. Pengertian mortalitas..... 23
2. Penyebab kematian ibu ..... 23
3. Upaya menurunkan tingkat kematian ibu ..... 27

### D. Tinjauan Tentang Variabel Penelitian

1. Indikasi..... 31
2. Mortalitas ibu ..... 31

E. Tinjauan Menurut Pandangan Islam .....	32
---	----

### BAB III KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti.....	37
B. Pola Pikir Variabel yang Diteliti.....	38
C. Definisi Operasional Variabel yand Diteliti.....	38

### BAB IV METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
C. Populasi dan Sampel .....	41
D. Teknik Pengambilan Sampel.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Pengolahan Data.....	43
G. Analisis Data.....	43

### BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian .....	44
B. Pembahasan.....	52

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....60

B. Saran.....60


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 5.1 Distribusi indikasi terhadap kejadian SC di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011.....	44
Tabel 5. 2 Distribusi Mortalitas terhadap kejadian SC di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011 .....	51



## DAFTAR GAMBAR

<b>Tabel Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 5.1 Distribusi indikasi berdasarkan Cephalopelvik disproportion di RSKD di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011...	46
Gambar 5.2 Distribusi indikasi berdasarkan Kelainan Plasenta di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011.....	47
Gambar 5.3 Distribusi indikasi SC berdasarkan Masalah pada ibu di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011.....	47
Gambar 5.4 Distribusi indikasi berdasarkan Gangguan kemajuan persalinan di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011.....	48
Gambar 5.5 Distribusi indikasi SC berdasarkan Preeklamsi dan eklampsia di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011 .....	49
Gambar 5.6 Distribusi berdasarkan indikasi Masalah usia kehamilan di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011.....	49
Gambar 5.7 Distribusi indikasi SC berdasarkan Indikasi Sosial di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011.....	50
Gambar 5.8 Distribusi indikasi berdasarkan Kelainan Serviks di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011 .....	51

## ABSTRAK

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
KARYA TULIS ILMIAH, JULI 2012**

**Syamrina, Nim : 70400009050**

**Pembimbing :**

**“Gambaran Mortalitas Ibu Hamil Berdasarkan Indikasi Sektio Caesarea di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011”**

**Xiv + 6 Bab + 61 Halaman + 2 Tabel + 6 Lampiran**

Angka sektio caesarea (SC) di Negara-negara maju meningkat dari 5 % pada 25 tahun yang lalu menjadi 15 %. Adapun pada tahun 1985 WHO mengusulkan bahwa angka SC secara nasional tidak melebihi angka 10% dari seluruh persalinan. Persalinan dengan SC sangat berbeda dengan persalinan pervagina. Sebagian ibu-ibu beranggapan bahwa persalinan dengan operasi berguna dalam membantu mereka menghindari persalinan, mengetahui kapan bayinya akan lahir sehingga memungkinkan mereka untuk membuat perencanaan dan secara psikologis mempersiapkan diri untuk menghadapi operasi dan pemulihan.

Jenis persalinan yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dimana jumlah populasi sebanyak 2341 orang dan sampel 390 orang, menggunakan teknik pengambilan sampel dengan *purposive sampling* dan sumber data diperoleh melalui data sekunder dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai penjelasan tabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SC yang terjadi berdasarkan indikasi yaitu dengan riwayat SC sebelumnya sebanyak 61 orang (15,64%), dan yang paling sedikit kelainan serviks sebanyak 6 orang (1,54%). Pada mortalitas yaitu 1 orang (0,26%) dengan indikasi plasenta akreta yang menyebabkan perdarahan.

Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian SC berdasarkan indikasi yaitu dengan riwayat SC sebelumnya sebanyak 61 orang (15,64%), dan yang paling sedikit kelainan serviks sebanyak 6 orang (1,54%). Pada mortalitas yang terjadi yaitu 1 orang (0,26%) dengan indikasi plasenta akreta yang menyebabkan perdarahan.

Daftar pustaka : 37 (2001-2012)

Kata kunci : Indikasi, Mortalitas, Sektio Caesarea

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut *World Health Organization* (WHO) 2007, kematian ibu adalah kematian perempuan selama masa kehamilan, persalinan, maupun dalam 42 hari setelah persalinan, tidak dipengaruhi lamanya dan lokasi kehamilan dari beberapa penyebab yang berhubungan dengan atau diperburuk oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan karena kecelakaan atau kebetulan. Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai AKI yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Berdasarkan laporan WHO (2007), pada tahun 2005 AKI di Indonesia 230/100.000 kelahiran hidup, Malaysia 62/100.000 kelahiran hidup, Filipina 230/100.000 kelahiran hidup, Thailand 70/100.000 kelahiran hidup, Vietnam 40/100.000 kelahiran hidup (M. Ridwan, 2008).

Jumlah kematian ibu maternal yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan pada tahun tahun 2007 sebanyak 143 kematian atau 92,89 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk tahun 2008 jumlah kematian ibu maternal mengalami penurunan menjadi 121 orang atau 85,17 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2009 menurun lagi menjadi 118 orang atau 78,84 per 100.000 KH. Kematian ibu maternal tersebut terdiri dari kematian ibu hamil (19%), kematian ibu bersalin (46%), dan kematian ibu nifas (35%) (Profil kesehatan provinsi sul-sel tahun 2009, 2010).

*World Health Organization* (WHO) yang dikutip oleh Prawirohardjo Tahun 2005 memperkirakan lebih dari 585.000 meninggal saat hamil dan bersalin, hal ini dapat terjadi di Negara berkembang. Angka kematian ibu di Indonesia mencapai 228/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 ([www.depkesri.co.id](http://www.depkesri.co.id)).

Menurut Bensons dan Pernolls angka kematian ibu yang mengalami persalinan SC adalah 40-80 tiap 100.000 kelahiran dan memiliki resiko kematian 25 kali lebih besar dibanding persalinan pervaginam. Persalinan dengan SC memiliki resiko infeksi 80 kali lebih tinggi dibandingkan dengan persalinan pervaginam (M.Ridwan, 2008).

*Making Pregnancy Safer* (MPS) merupakan strategi sektor kesehatan dalam penurunan kematian/kesakitan ibu dan perinatal. MPS Indonesia 2001-2010 merupakan salah satu strategi dalam konteks Rencana Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010. Visi MPS adalah kehamilan dan persalinan di Indonesia berlangsung aman, serta bayi yang dilahirkan hidup dan sehat, sedangkan misinya adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi baru lahir. Salah satu sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2010 adalah menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 125/100.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Bayi (AKB) baru lahir menjadi 16/1.000 kelahiran hidup.

Komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas merupakan masalah kesehatan yang penting, bila tidak ditanggulangi akan menyebabkan angka kematian ibu yang tinggi. Kematian seorang ibu dalam proses reproduksi merupakan tragedi yang tinggi. Kematian seorang ibu dalam proses reproduksi merupakan tragedi yang mencemaskan. Keberadaan seorang ibu merupakan tonggak untuk

tercapainya keluarga yang sejahtera dan kematian seorang ibu merupakan suatu bencana bagi keluarganya. Dampak sosial dan ekonomi kejadian ini dapat dipastikan sangat besar, baik bagi keluarga, masyarakat maupun angkatan kerja (Saifuddin, 2002).

Data yang di peroleh dari Rekam Medis di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar menunjukkan bahwa dari 3711 kelahiran pada Tahun 2009 tercatat 668 kasus SC, Tahun 2010 kelahiran 3904 tercatat 668 kasus SC, sedangkan pada tahun 2011 terjadi peningkatan yaitu 4146 tercatat 954 kasus SC. Penanganan SC rata-rata dilakukan di Rumah sakit rujukan seperti Rumah Sakit kesehatan Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar (Rekam medis RSIA Fatimah Makassar).

*Casarean section* dalam Inggris-Amerika), disebut juga dengan c-section (disingkat dengan CS) adalah proses persalinan melalui pembedahan berupa irisan di perut ibu (laparotomi) dan rahim (histerotomi) untuk mengeluarkan bayi. SC umumnya dilakukan ketika proses persalinan normal melalui vagina tidak memungkinkan karena komplikasi medis lainnya. Sebuah prosedur persalinan dengan pembedahan umumnya dilakukan oleh tim dokter yang beranggotakan spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis anestesi serta bidan (Lestari, 2009).

Indikasi SC bisa indikasi absolut atau relatif. Setiap keadaan yang membuat kelahiran lewat jalan lahir tidak mungkin terlaksana merupakan indikasi absolut untuk sectio abdominal. Diantaranya adalah kesempitan panggul yang sangat berat dan neoplasma yang menyumbat jalan lahir. Pada indikasi relatif, kelahiran lewat vagina bisa terlaksana tetapi keadaan adalah sedemikian rupa

sehingga kelahiran lewat SC akan lebih aman bagi ibu, anak ataupun keduanya (Oxorn, 2010).

Risiko untuk wanita yang mengalami SC berulang adalah peningkatan angka morbiditas dan mortalitas yang terkait dengan SC sebagai operasi abdomen mayor. Penyebab morbiditas dan mortalitas mencakup resiko anesthesia, cedera pada kandung kemih dan usus yang terjadi karena tidak hati-hati, perdarahan, infeksi luka dan peningkatan masalah pernafasan pada bayi baru lahir (varney, 2007).

Adapun faktor-faktor yang berhubungan atau yang merupakan indikasi dilakukan SC yaitu faktor ibu seperti panggul sempit absolut, tumor-tumor jalan lahir, plasenta previa, ketidaksesuaian antara kepala janin dan panggul ibu sehingga janin tidak dapat keluar melalui vagina, dll. Sedangkan faktor janin seperti kelainan letak dan gawat janin (Wiknjosastro, 2007)

Mengingat komplikasi yang dapat timbul, maka menghindari persalinan melalui SC adalah penting, untuk itu perlu diperhatikan faktor risiko yang terlihat dari indikasi-indikasi tindakan SC, yang kiranya semakin meningkatkan kejadian SC. Dengan demikian ibu yang sedang hamil dan memiliki risiko untuk menjalani persalinan melalui SC dapat lebih menjaga dan memelihara kesehatan diri dan kandungannya utamanya melalui pelayanan kesehatan yang optimal (Nunung, 2009).

Dari banyaknya kasus SC, dan meningkatnya angka kematian Ibu dalam menjalani persalinan SC, maka penulis berminat untuk mengambil kasus dengan judul. “Gambaran mortalitas ibu hamil berdasarkan indikasi SC pada ibu hamil di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran indikasi ibu hamil dengan SC di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011?
2. Bagaimana gambaran mortalitas ibu hamil berdasarkan indikasi SC di di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Umum  
Untuk mengetahui Gambaran indikasi dan mortalitas ibu hamil dengan SC.
2. Tujuan khusus
  - a. Memperoleh gambaran indikasi ibu hamil dengan SC di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011.
  - b. Memperoleh gambaran mortalitas ibu hamil berdasarkan indikasi SC di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat ilmiah**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan tentang persalinan SC

### **2. Manfaat praktis**

#### **a. Bagi peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan bagi peneliti tentang indikasi ibu yang menjalani SC serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Kebidanan UIN Alauddin Makassar.

#### **b. Bagi institusi**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk memperluas wawasan mahasiswa jurusan kebidanan.

#### **c. Bagi tempat penelitian**

Diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi pihak RSIA Siti Fatimah Makassar dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program upaya penurunan angka kematian ibu yang menjalani persalinan dengan SC.

### **3. Manfaat komunitas**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pengetahuan masyarakat tentang persalinan SC.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan umum tentang persalinan

##### 1. Definisi persalinan

- a. Persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu (Varney, 2008).
- b. Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, sehingga janin masuk ke dalam jalan lahir (Saifuddin, 2006).
- c. Persalinan adalah merupakan proses untuk mendorong keluar (ekspulsi) hasil pembuahan (yaitu janin yang viable, plasenta dan ketuban) dari dalam uterus lewat vagina ke dunia luar (Farrer, 2001)
- d. Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar (Wiknjosastro, 2002).

##### 3. Tanda-tanda persalinan

- a. *Lightning* “terbenangnya kepala janin kedalam rongga panggul karena berkurangnya tempat di dalam uterus dan sedikit melebarnya simfisis; keadaan ini sering meringankan keluhan pernafasan serta heart burn dan pada primigravida kepala janin mulai turun kedalam rongga panggul pada umur kehamilan 36 minggu sementara pada multigravida kepala janin

baru turun kerongga panggul setelah persalinan dimulai mengingat otot-otot abdomennya lebih kendur.

b. Sering buang air kecil disebabkan oleh tekanan kepala janin pada kandung kemih.

c. Kontraksi Braxton-Hicks pada saat uterus yang teregang dan mudah dirangsang itu menimbulkan pelebaran pada dinding abdomen sehingga dinding abdomen menjadi lebih tipis dan kulit menjadi lebih peka terhadap rangsangan.

d. His/kontraksi

His atau kontraksi uterus yang terjadi secara teratur dan menimbulkan dan ketidaknyamanan serta kadang-kadang nyeri, merupakan tanda persalinan yang sebenarnya.

e. Dilatasi serviks

Pelebaran dan pendataran serviks yang terjadi secara bertahap merupakan indikator yang menunjukkan kemajuan persalinan kalau proses persalian tersebut disertai dengan kontraksi uterus.

f. Engagement presenting part

Presenting part (yang biasanya kepala janin) akan mengalami "*engagement*" atau proses penurunan kepala janin kedalam panggul. Pada primigravida, peristiwa ini terjadi 3-4 minggu sebelum proses persalinan ini dimulai. Dinding abdomen pada multipara tidak begitu

kencang sehingga *engagement* baru terjadi setelah proses persalinan dimulai.

g. Pembentukan tonjolan ketuban

Pembentukan tonjolan ketuban atau *bag of forewater* (cairan amnion/ketuban yang terperangkap dalam serviks di depan (*presenting part*) dapat diraba melalui pemeriksaan pervaginam (Farrer, 2001).

4. Penatalaksanaan persalinan

Faktor-faktor yang perlu dinilai dan dicatat dalam persalinan.

- a. Waktu terjadinya kontraksi uterus pertama kali, frekuensi kontraksi uterus, keadaan selaput ketuban, riwayat perdarahan atau gangguan pada gerakan janin,
- b. Riwayat alergi, medikasi, saat makan terakhir.
- c. Tanda vital ibu, protein urine dan glukosa serta pola kontraksi uterus
- d. Denyut jantung janin, preasetasi dan tafsiran berat janin.
- e. Keadaan selaput ketuban, dilatasi dan pendataran serviks dan derajat penurunan bagian terendah janin diketahui melalui pemeriksaan dalam (VT) kecuali bila terdapat perdarahan antepartum tidak melakukan pemeriksaan dalam (VT) (Rusda, 2004)

## B. Tinjauan umum tentang sektio caesarea.

### 1. Definisi sektio caesarea.

Ada beberapa pengertian mengenai SC, yaitu sebagai berikut :

- a. SC merupakan lahirnya janin melalui insisi di dinding abdomen (laparotomi) dan dinding uterus (histeroktomi) (Cuningham, 2005).
- b. SC didefinisikan sebagai lahirnya janin melalui insisi pada dinding abdomen (*laparotomi*) dan dinding uterus (*histerektomi*) (Rasjidi, 2009).
- c. SC adalah suatu tindakan untuk melahirkan bayi dengan berat di atas 500 gr, melalui sayatan pada dinding uterus yang masih utuh (Sarwono, 2009).

Sesuai pengertian di atas maka penulis mengambil kesimpulan, SC adalah suatu pembedahan guna melahirkan janin lewat insisi pada dinding abdomen dan uterus, yang dilakukan atas indikasi tertentu bila persalinan pervaginam tidak memungkinkan.

### 2. Etimologi sektio caesarea

Ada beberapa unsur yang dapat menjelaskan asal kata "Caesar".

- a. Istilah dari kata kerja bahasa Latin *caedere* yang berarti "membedah". Dengan demikian "bedah caesar" menjadi gaya bahasa retorik.
- b. Istilah yang mungkin diambil dari pemimpin Romawi kuno Julius Caesar yang disebut-sebut dilahirkan dengan metode tersebut. Dalam sejarah, hal ini sangat tidak memungkinkan karena ibunya masih hidup ketika ia mencapai usia dewasa (bedah caesar tidak mungkin dilakukan pada masa

tersebut terkait dengan teknologi yang tidak mendukung), tetapi legenda tersebut telah bertahan sejak abad ke-2 SM.

- c. Hukum Romawi yang menjelaskan bahwa prosedur tersebut perlu dilakukan pada ibu hamil yang meninggal untuk menyelamatkan nyawa sang bayi. Hal ini dikenal dengan istilah *lex caesarea*, sehingga hukum Romawi mungkin menjadi asal usul istilah ini. Secara umum, istilah "bedah sesar" merupakan gabungan dari hal-hal tersebut di atas. Kata kerja *caedo* dalam kalimat *a matre caesus* ("membedah ibunya") digunakan pada masa Romawi untuk mendeskripsikan operasi tersebut (Wikipedia, 2012).

### 3. Sejarah operasi sektio caesarea

Pada 1316, Robert II dari Skotlandia dilahirkan dengan bedah caesar, ibunya Marjorie Bruce, kemudian meninggal. Bukti pertama mengenai ibu yang selamat dari bedah sesar adalah di Siegershausen, Swiss tahun 1500: Jacob Nufer, seorang pedagang babi, harus membedah istrinya setelah proses persalinan yang lama. Prosedur bedah sesar di waktu lampau mempunyai angka kematian yang tinggi. Di Britania Raya dan Irlandia, angka kematian akibat bedah sesar pada 1865 adalah 85%.

Beberapa penemuan yang membantu menurunkan angka kematian antara lain:

- a. Pengembangan prinsip-prinsip aseptis.
- b. Pengenalan prosedur penjahitan rahim oleh Max Sänger pada 1882.
- c. Bedah sesar extraperitoneal dilanjutkan dengan sayatan mendatar rendah.

- d. Perkembangan teknik anestesi.
  - e. Transfusi darah.
  - f. Antibiotik (Wikipedia, 2012)
4. Jenis-jenis seksio sektio caesarea

Ada beberapa jenis bedah sesar:

- a. Jenis klasik yaitu dengan melakukan sayatan vertikal sehingga memungkinkan ruangan yang lebih besar untuk jalan keluar bayi. Akan tetapi jenis ini sudah sangat jarang dilakukan hari ini karena sangat berisiko terhadap terjadinya komplikasi.
- b. Sayatan mendatar di bagian atas dari kandung kemih sangat umum dilakukan pada masa sekarang ini. Metode ini meminimalkan risiko terjadinya pendarahan dan cepat penyembuhannya.
- c. Histerektomi caesar yaitu bedah caesar diikuti dengan pengangkatan rahim. Hal ini dilakukan dalam kasus-kasus dimana pendarahan yang sulit tertangani atau ketika plasenta tidak dapat dipisahkan dari rahim.
- d. Bedah sesar berulang dilakukan ketika pasien sebelumnya telah pernah menjalani bedah sesar. Umumnya sayatan dilakukan pada bekas luka operasi sebelumnya (Wikipedia, 2012).

## 5. Indikasi sektio caesarea

Indikasi dilakukan SC, terbagi menjadi atas :

### a. Indikasi ibu

#### 1) Panggul sempit absolut.

Dalam obstetrik yang terpenting bukan panggul sempit secara anatomi melainkan secara fungsional artinya perbandingan antara kepala dan panggul. Kesempitan panggul dibagi sebagai berikut:

- (a) Kesempitan pintu atas panggul.
- (b) Kesempitan bidang tengah panggul.
- (c) Kesempitan pintu bawah panggul.
- (d) Kombinasi kesempitan pintu atas panggul, bidang tengah dan pintu bawah panggul.

Pengaruh panggul sempit pada persalinan:

- (a) Persalinan lebih lama dari biasanya.
- (b) Gangguan pembukaan .
- (c) Menggunakan banyak waktu untuk moulage kepala anak (Ningri, 2010).

#### 2) Stenosis serviks/vagina

Stenosis serviks bisa juga disebut dengan penyempitan ruang pada serviks.

### 3) Plasenta previa

Plasenta previa adalah plasenta yang letaknya abnormal, yaitu pada segmen-bawah uterus sehingga dapat menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. Pada keadaan normal plasenta terletak di bagian atas uterus. Klasifikasi plasenta previa di dasarkan atas terabanya jaringan plasenta melalui pembukaan jalan lahir pada waktu tertentu (Saifuddin, 2008).

### 4) Solusio plasenta

Solusio plasenta adalah terlepasnya sebagian atau seluruh permukaan maternal plasenta dari tempat implantasinya yang normal pada lapisan desidua endometrium sebelum waktunya yakni sebelum anak lahir. Klasifikasi berdasarkan tanda klinis dan derajat pelepasan plasenta yaitu:

- (a) Ringan: luas plassenta yang terlepas tidak sampai 25%, atau ada yang menyebutkan kurang dari  $\frac{1}{6}$  bagian. Jumlah darah yang keluar biasanya kurang dari 250 ml. Tumpahan darah yang keluar terlihat seperti pada haid bervariasi dari sedikit menstruasi yang banyak. Gejala-gejala perdarahan sukar dibedakan dari plasenta previa kecuali warna darah yang kehitaman. Komplikasi terhadap ibu dan janin belum ada.
- (b) Sedang: luas plasenta yang terlepas telah melebihi 25%, tetapi belum mencapai separuhnya (50%). Jumlah darah yang keluar

lebih banyak dari 250 ml tetapi belum mencapai 1.000 ml. Umumnya pertumpahan darah terjadi ke luar dan ke dalam bersama-sama. Gejala-gejala dan tanda-tanda sudah jelas seperti rasa nyeri pada perut yang terus menerus, denyut jantung janin menjadi cepat, hipotensi dan takikardia.

(c) Berat: luas plasenta yang terlepas sudah melebihi 50 %, dan jumlah darah yang keluar telah mencapai 1.000 ml atau lebih. Pertumpahan darah bisa terjadi ke luar dan ke dalam bersama-sama. Gejala-gejala dan tanda-tanda klinik jelas, keadaan umum penderita buruk disertai syok, dan hampir semua janinnya telah meninggal. Komplikasi koagulopati dan gagal ginjal yang ditandai pada oliguri biasanya telah ada (Saifuddin, 2008).

#### 5) Pre-eklamsi dan eklamsi

Pre-eklamsi dan eklamsi merupakan kesatuan penyakit, yang langsung disebabkan oleh kehamilan, walaupun belum jelas bagaimana hal itu terjadi. Istilah kesatuan penyakit harus diartikan bahwa kedua peristiwa dasarnya sama dan bahwa eklamsia merupakan peningkatan yang lebih berat dan berbahaya dari pre-eklamsia, dengan tambahan gejala-gejala tertentu. (Saifuddin, 2008).

6) Riwayat Sectio Caesarea

Persalinan atau kelahiran pada pasien dengan riwayat kelahiran bayi melalui insisi perut (laparotomi) dan insisi uterus (histerotomi). Luka sayat di perut dapat transversal maupun vertikal, sedangkan di uterus dapat transversal (*SC Transperitonealis Profunda*) maupun insisi vertikal (*SC klasik/corporal*).

7) Gamelli

Beberapa tahun belakangan kehamilan kembar atau lebih dari satu sedang meningkat. Secara umum, hal ini karena peningkatan penggunaan obat untuk fertilitas (kesuburan), tapi kehamilan kembar juga dikarenakan sebab lainnya, seperti usia ibu saat kehamilan, wanita dengan riwayat persalinan yang sering, wanita yang hamil segera setelah berhenti minum pil KB dan juga lebih tinggi pada orang yang memiliki keturunan atau genetik kembar.

8) Kala II lama

Kala II persalinan ketika pembukaan serviks sudah lengkap 10 cm dan berakhir dengan lahirnya bayi. Kala II juga dikenal juga sebagai kala pengeluaran.

Ada beberapa tanda dan gejala kala II persalinan:

- (a) Ibu merasa ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi.
  - (b) Ibu merasakan semakin meningkatnya tekanan pada rectum dan vaginanya.
  - (c) Perineum terlihat menonjol
  - (d) Vulva-vagina dan spingter ani terlihat membuka
  - (e) Peningkatan pengeluaran lendir dan darah.
- 9) Primi gravida tua
- Umur terbagi menjadi :
- (a) Umur muda : <20 tahun (primi muda)
  - (b) Umur ideal : 20-34 tahun
  - (c) Umur tua :  $\geq 35$  tahun

Ibu yang terlalu muda, perkembangan alat-alat reproduksinya belum optimal. Sebaliknya pada ibu yang terlalu tua, fungsi alat reproduksinya telah mengalami kemunduran. Selain itu, pada usia tua komplikasi semakin besar. Hal inilah yang menjadi indikasi medis untuk dilakukannya SC (Wiknjosastro, 2007).

10) Serotinus.

Kehamilan serotinus, kehamilan lewat waktu, kehamilan lewat bulan, *prolonged pregnancy, extended pregnancy, postdate/pos datisme* atau pascamaturitas, adalah: kehamilan yang berlangsung sampai 42

minggu (294 hari ) atau lebih, dihitung dari haid pertama dan haid terakhir merutut rumus neagle dengan siklus haid rata-rata 28 hari (WHO1997, FIGO 1986) (Saifuddin, 2008).

6. Keuntungan dan kekurangan sektio caesarea

a. Keuntungan dari SC

Membuat persalinan menjadi lebih singkat, tidak ada kompresi jalan lahir, tidak ada sepsis dari jalan lahir, menurunkan resiko ruptur uterus setelah riwayat SC.

b. Kemungkinan merusak kandung kemih dan usus, trombosis dan emboli, gangguan penyembuhan luka, kekhawatiran terjadinya ruptur pada SC berikutnya (Rabe, 2002).

7. Efek-efek samping sektio caesarea

SC adalah pilihan pertama ketika masalah tertentu muncul. Sebagian wanita berfikir bahwa persalinan akan berjalan lancar dan lebih mudah lewat SC, sekalipun tidak ada masalah. SC sebenarnya tidak mudah bagi sang ibu maupun bayinya, seperti yang anda pikirkan. Ketika anda dan bayi anda sehat, kelahiran normal adalah pilihan terbaik. Adapun beberapa resiko yang mungkin muncul dari SC:

a. Bagi ibu

- 1) Masalah-masalah yang berhubungan dengan anestesi yang digunakan untuk pembedahan.
- 2) Rasa sakit selama beberapa minggu pasca persalinan.

- 3) Resiko infeksi dan kehilangan darah lebih besar dari pada kelahiran via vagina.
- 4) Lebih sulit bagi anda untuk merawat bayi.
- 5) Lebih banyak masalah dengan kehamilan selanjutnya (termasuk masalah untuk hamil kembali dan memiliki plasenta yang sehat).
- 6) Resiko SC yang lebih besar untuk persalinan berikutnya.  
(Walley, 2005).

b. Bagi janin

- 1) Gangguan pernafasan

*Transient tachypnea of the new Born* (TTNB) adalah gangguan pernafasan yang paling sering dikhawatirkan terjadi pada bayi sesar. Gangguan ini terjadi akibat cairan di paru-paru janin selama berada dalam rahim tidak berkompresi mengingat bayi sesar tinggal “terima jadi”. Proses persalinan pervaginam melewati jalan lahir inilah yang memungkinkan cairan yang memenuhi paru-paru janin berada dalam rahim dipompa habis keluar.

Selain itu, proses kompresi juga terjadi berkat kontraksi rahim ibu secara berkala. Kontraksi yang lama-kelamaan semakin kuat ini akan menekan tubuh bayi, sehinggalah otomatis cairan dalam paru-parunya ikut keluar. Pada bayi SC, kedua proses kompresi tadi tidak terjadi dengan sempurna.

2) Rendahnya sistem kekebalan tubuh

Data berdasarkan *evidence based* memang belum ada. Namun pada proses persalinan normal, bayi berpindah dari rahim yang nyaris steril ke lingkungan lain melalui proses yang berlangsung lama dan melibatkan kontraksi selama berjam-jam. Saat lahir pun, tidak tertutup sehingga banyak kuman yang masuk kedalam mulut, bahkan sampai ke pencernaan. Akibatnya, bayi mengalami kontak alami dengan mikroba flora dalam jalan lahir ibunya yang kemudian berkoloni di ususnya. Hal ini sangat berpengaruh pada perkembangan.

3) Rentan alergi

Baik dari kondisi kotor di jalan lahir yang tidak dilalui si bayi yang dilahirkan secara SC, maupun tertundanya pemberian ASI segera mungkin, membuat resiko alergi pada bayi jadi lebih tinggi. Belum lagi paparan antibiotik yang biasanya diberikan kepada bayi SC sebagai langkah berjaga-jaga dari kemungkinan infeksi, juga meningkatkan resiko alergi.

4) Emosi cenderung rapuh

Meski belum terbukti melalui penelitian ilmiah, kondisi psikologi bayi sesar diduga cenderung lebih rapuh dibandingkan bayi yang dilahirkan secara normal. Faktanya, bayi yang lahir normal memang dihadapkan pada kondisi tidak nyaman dimana ia harus melewati jalan lahir yang sempit dan berliku disertai tekanan hebat akibat kontraksi rahim.

5) Terpengaruh anestesi

Kondisi ini mungkin saja terjadi, karenanya, tim dokter yang terdiri dari dokter kebidanan dan kandungan, dokter anak, dan dokter anestesi harus berhitung secermat mungkin agar pembiusan pada bayi berpengaruh seminim mungkin. Untuk itu, umumnya anestesi yang digunakan adalah anestesi spinal yang berdosisi rendah. Penggunaan bius total membuat bayi terlihat agak ngantuk karena dikeluarkan saat masih di bawah pengaruh anestesi.

6) Minim peluang Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Bayi SC kurang mendapatkan kesempatan untuk menjalani Inisiasi Menyusu Dini (IMD). Karena kondisi bayi sesar berbeda dari kondisi bayi lahir normal yang bisa langsung ditempelkan di dada ibunya dengan reflex yang cukup kuat untuk mencapai payudara ibu. Sementara pada SC, hal yang tidak bisa segera dilakukan mengingat bayi biasanya langsung dipasang infuse dan selang oksigen guna membantu pernafasannya. Si ibu pun umumnya masih dalam keadaan teler akibat pengaruh obat anestesi (Alaudine, 2009).

8. Komplikasi sektio caesarea

a. Komplikasi pada ibu

Menurut Wiknjosastro (2007), komplikasi yang terjadi setelah tindakan

SC adalah sebagai berikut:

1) Infeksi Puerpural (nifas)

Infeksi puerpural terbagi 3 tingkatan, yaitu:

- a) Ringan: dengan kenaikan suhu tubuh beberapa hari saja
- b) Sedang: dengan kenaikan suhu tubuh lebih tinggi, disertai dehidrasi dan sedikit kembung.
- c) Berat: dengan peritonitis, sepsis dan ileus paralitik. Hal ini sering kita jumpai pada partus terlantar, dimana sebelumnya telah terjadi infeksi intrapartal karena ketuban yang telah pecah terlalu lama.

2) Perdarahan

Perdarahan dapat disebabkan karena banyaknya pembuluh darah yang terputus dan terbuka, atonia uteri, dan perdarahan pada placentar bed. Perdarahan dapat mengakibatkan terbentuknya bekuan-bekuan darah pada pembuluh darah balik di kaki dan rongga panggul.

3) Luka Kandung Kemih

Tindakan SC, apabila dilakukan dengan tidak hati-hati dapat mengakibatkan luka pada organ lain seperti kandung kemih, yang dapat menyebabkan infeksi.

b. Pada anak

Seperti halnya pada anak yang dilahirkan dengan SC banyak tergantung dari

keadaan yang menjadi alasan untuk melakukan SC. (Wiknjosastro, 2005).

## C. Tinjauan Tentang Mortalitas Ibu

### a. Pengertian Mortalitas Ibu

Kematian ibu atau kematian maternal adalah kematian wanita sewaktu hamil, melahirkan, atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan, tidak tergantung dari lama dan lokasi penanganannya, tetapi tidak secara kebetulan atau oleh penyebab tambahan lain. Berdasarkan definisi ini, kematian ibu dapat digolongkan sebagai berikut:

#### 1) Kematian obstetrik langsung

Kematian obstetrik langsung disebabkan oleh komplikasi kehamilan, persalinan, nifas, atau penanganannya.

#### 2). Kematian obstetrik tidak langsung

Kematian obstetrik tidak langsung disebabkan oleh penyakit atau komplikasi lain yang sudah ada sebelum kehamilan atau persalinan, misalnya hipertensi, penyakit jantung, diabetes, hepatitis, anemia, malaria, dan lain-lain.

#### 3). Kematian yang terjadi bersamaan tetapi tidak berhubungan dengan kehamilan dan persalinan, misalnya kecelakaan.

### b. Penyebab Kematian Ibu

#### 1. Faktor- faktor reproduksi

##### a. Usia

Dalam kurun reproduksi sehat dikenal bahwa usia aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20-30 tahun. Kematian maternal pada

wanita hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi dari pada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun. Kematian maternal meningkat kembali setelah usia 30-35 tahun.

b. Paritas

Paritas 2-3 merupakan paritas yang paling aman ditinjau dari sudut kematian maternal. Paritas 1 dan paritas tinggi (lebih dari 3) mempunyai angka kematian ibu lebih tinggi. Risiko pada paritas 1 dapat ditangani dengan asuhan obstetrik lebih baik, sedangkan risiko pada paritas tinggi dapat dikurangi atau dicegah dengan keluarga berencana. Sebagian kehamilan pada paritas tinggi adalah tidak direncanakan.

2. Faktor obstetrik

a. Perdarahan pada abortus

Perdarahan per vaginam yang terjadi pada kehamilan trimester pertama umumnya disebabkan oleh abortus, dan hanya sebagian kecil saja karena sebab-sebab lain. Abortus inkomplit dapat pula didahului oleh upaya abortus propokatus pada kehamilan yang tidak diinginkan. Data tentang abortus, termasuk abortus provokatus, sangat sulit diperoleh, bahkan di negara-negara maju sekali pun.

b. Kehamilan ektopik

Penyakit radang panggul, penyakit hubungan seksual, atau infeksi pasca abortus sering merupakan faktor predisposisi pada kehamilan ektopik.

c. Perdarahan pada kehamilan trimester ketiga.

Penyebab utama perdarahan ini adalah plasenta previa dan solusio plasenta. Pada keadaan ini tindakan segera sangat diperlukan. Jika perdarahan terjadi di tempat yang jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan, atau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut tidak mampu melakukan tindakan yang diperlukan, maka umumnya kematian maternal akan terjadi.

d. Perdarahan postpartum yang disebabkan oleh atonia uteri atau sisa plasenta sering berlangsung sangat banyak dan cepat. Renjatan karena perdarahan banyak segera akan disusul dengan kematian maternal, jika masalah ini tidak dapat diatasi secara cepat dan tepat oleh tenaga yang terampil dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.

e. Infeksi nifas

Infeksi nifas dapat terjadi pada pertolongan persalinan yang tidak mengindahkan syarat-syarat asepsis-antisepsis, partus lama, ketuban pecah dini, dan sebagainya.

f. Gestosis

Penyebab gestosis sampai saat ini belum diketahui benar. Namun, tanda-tanda dini gestosis perlu dikenal oleh bidan atau dukun terlatih. Primipara dan gravid pada usia di atas 35 tahun merupakan kelompok risiko tinggi untuk gestosis. Kematian maternal akan meningkat tinggi jika sudah menjadi eklampsia.

g. Distosia

Keadaan lingkungan yang kurang sehat, malnutrisi, penyakit infeksi semasa kanak-kanak dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan ukuran-ukuran panggul yang kecil. Panggul kecil dapat menyebabkan timbulnya distosia. Persalinan pada usia sangat muda sering juga menyebabkan distosia. Selain itu distosia dapat pula terjadi pada kelainan presentasi janin. Jika distosia tidak diatasi secara dini, dapat timbul partus lama, bahkan ruptur uteri. Pada keadaan demikian, kematian maternal akan meningkat sangat tinggi.

h. Pengguguran kandungan

Pengguguran kandungan yang dilakukan secara ilegal, merupakan salah satu penyebab kematian maternal yang penting. Sisa jaringan, serta tindakan yang tidak steril serta tidak aman secara medis akan berakibat timbulnya perdarahan dan sepsis.

### 3. Faktor-faktor pelayanan kesehatan

Selain faktor-faktor reproduksi dan komplikasi obstetrik yang diuraikan di atas, ternyata faktor-faktor pelayanan kesehatan mempunyai peran sangat besar pula dalam kematian maternal. Faktor-faktor tersebut meliputi:

- (1). Kurangnya kemudahan untuk pelayanan kesehatan maternal.
- (2). Asuhan medik yang kurang baik.
- (3). Kurangnya tenaga terlatih dan obat-obat penyelamat jiwa.

### 4. Faktor-faktor sosiobudaya

Kemiskinan, ketidak tahuan, kebodohan, dan rendahnya status wanita merupakan beberapa faktor sosiobudaya yang berperan pada tingginya angka kematian maternal. Transportasi yang sulit, ketidakmampuannya membayar pelayanan yang baik, pantangan makanan tertentu pada wanita hamil, dan sebagainya juga merupakan faktor-faktor yang ikut berperan.

### c. Upaya menurunkan tingkat kematian maternal

#### a. Pencegahan

##### 1). Keluarga Berencana

Jika para ibu yang tidak ingin hamil lagi dapat memperoleh pelayanan kontrasepsi efektif sebagaimana diharapkan, maka akan berkurang prevalensi abortus provokatus serta prevalensi wanita hamil pada usia lanjut dan paritas tinggi. Dengan berkurangnya faktor risiko tinggi ini maka kematian maternal akan turun pula secara bermakna. Oleh

karena itu pelayanan keluarga berencana harus dapat mencapai sasaran seluas-luasnya di masyarakat, khususnya golongan risiko tinggi.

2). Pemeriksaan kehamilan dan pelayanan rujukan

Pemeriksaan antenatal yang baik dan tersedianya fasilitas rujukan bagi kasus risiko tinggi dapat menurunkan angka kematian maternal. Petugas kesehatan harus dapat mengidentifikasi faktor- faktor risiko yang berhubungan dengan usia, paritas, riwayat obstetrik buruk, dan perdarahan selama kehamilan. Mereka harus mampu memberi pengobatan pada penyakit kehamilan, misalnya anemia. Mereka juga harus mampu mengenal tanda-tanda dini infeksi, partus lama, perdarahan berlebihan, dan mengetahui bilamana saat yang tepat untuk merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap.

b. Perbaikan pelayanan gawat darurat

1). Perdarahan

Perdarahan postpartum sering memerlukan tindakan cepat dari penolong persalihan, misalnya pengeluaran plasenta secara manual, memberikan obat-obatan oksitosin, massase uterus, dan pemberian cairan pengganti transfusi darah.

2). Infeksi nifas

Kematian karena infeksi nifas dapat dikurangi dengan meningkatkan kebersihan selama persalinan. Kepada penolong persalinan senantiasa perlu diingatkan tentang tindakan aseptis pada pertolongan

persalinaan. Antibiotika perlu diberikan pada persalinaan lama dan pada ketuban pecah dini. Parturienn dan kelurganya perlu diberi penerangan tentang tanda-tanda dini infeksi nifas.

### 3). Gestosis

Petugas kesehatan harus mampu mengenal tanda-tanda awal gestosis seperti edema, hipertensi, hiperrefleksia, dan jika mungkin, proteinuria. Jika gestosis memberat, maka diperlukan rujukan.

### 4). Distosia

Gravid dengan postur tubuh kecil atau terlalu pendek, primi atau grandemultigravida, perlu dicurigai akan kemungkinan terjadinya distosia oleh karena disproporsi sefalopelvik. Pemamfaatan partograf untuk mendeteksi secara dini persalinaan lama terbukti dapat menurunkan angka kematian maternal.

### 5). Abortus provokatus

Kematian karena abortus provokatus seharusnya dapat dicegah, antara lain dengan pelayanan kontrasepsi efektif sehingga kehamilan yang tidak diinginkan dapat dihindari. Pada abortus provokatus perlu diberikan antibiotika, walaupun belum ada tanda-tanda infeksi. Jika sudah terjadi infeksi, perlu diberikan antibiotika dosis tinggi secara intravena.

c. Perbaiki jaringan pelayanan kesehatan

1). Pengadaan tenaga terlatih di pedesaan

Di Indonesia sebagian besar persalinan masih ditolong oleh dukun, khususnya yang berlangsung di desa-desa. Para dukun ini harus dimanfaatkan dan diajak bekerja sama antara lain dengan melatih mereka dalam teknik aseptis dan pengenalan dini tanda-tanda bahaya, serta kemampuan pertolongan pertama dan mengetahui kemana rujukan harus dilakukan pada waktunya.

2). Peningkatan kemampuan puskesmas

Puskesmas yang merupakan fasilitas rujukan pertama dari petugas, perlu dilengkapi dengan dokter terlatih serta kelengkapan yang diperlukan untuk mencegah kematian maternal. Petugas kesehatan harus mampu mengatasi perdarahan akut, tersedia antibiotika dan cairan yang cukup, dan mampu memberikan pertolongan bedah obstetri sederhana.

3). Rumah sakit rujukan

Rumah sakit rujukan harus dilengkapi dengan fasilitas transfusi darah, listrik, air bersih, alat-alat operasi, anesthesia, antibiotika dan obat serta bahan lain, dan petugas kesehatan terlatih. (Wiknjosastro, 2007).

## D. Tinjauan Tentang Variabel Penelitian

### a. Indikasi sektio caesarea

Berbagai indikasi yang ada janin pada ibu dan janin yang dikandungnya menentukan apakah SC dapat dilakukan atau tidak, yakni berupa indikasi medis. Indikasi dilakukannya SC, terbagi menjadi atas :

- 1). Panggul sempit absolut
- 2). Stenosis serviks/vagina
- 3). Plasenta previa
- 4) Solusia plasenta
- 5) Preeklamsi dan eklamsi
- 6) Riwayat SC sebelumnya
- 7) Gameli
- 8) Kala II memanjang
- 9) Primi tua
- 10) Serotinus
- 11) Gawat janin
- 12) Kelainan letak/situs janin ( lintang, sungsang, dll)

### b. Mortalitas ibu

Kematian ibu atau kematian maternal adalah kematian seorang ibu sewaktu hamil atau dalam waktu 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan, tidak bergantung pada tempat atau usia kehamilan.

### **E. Timjauan Islam tentang SC**

Sesungguhnya operasi apapun bentuknya yang akan dilakukan oleh dokter ahli, bidan (tim medis) dalam upaya penyelamatan nyawa manusia (pasien; sang ibu dan bayi yang dikandungnya), yang umumnya sering disebut sebagai alasan “demi kemaslahatan”, maka selama itu pula tidak boleh ada pihak-pihak yang dapat melarangnya. Bahkan merupakan suatu keharusan yang mendesak untuk tetap dilakukan (Said, 2005).

Hal ini sesuai dengan penerapan dari sebuah kaidah ushul fiqh yang artinya “kemudharatan-kemudharatan itu dapat memperbolehkan larangan-larangan (keharaman)”. Maksudnya manakala dalam suatu keadaan sangat memaksa, yakni suatu keadaan yang mengharuskan seseorang untuk melakukan SC sesuatu yang pada hakekatnya mungkin dilarang, maka melakukan perbuatan tersebut dibolehkan, karena apabila tidak demikian mungkin akan menimbulkan suatu mudharat pada ibu dan bayi.

Sehubungan dengan khususnya SC ini dengan sketsa pemahaman seperti yang telah dikemukakan, bahwa yang penting harus diperhatikan secara mendalam dan sekaligus mengundang jawaban adalah mengapa SC hingga dapat dilakukan? atau mengapa wanita masa kini (sebahagian) lebih cenderung untuk melahirkan dengan melalui penanganan SC, dan apa sesungguhnya yang dijadikan sebagai alasan fundamental.

Kalaulah dilakukan SC oleh tim medis atas dasar alasan satu-satunya jalan alternatif terakhir yang harus dilakukan demi keselamatan sang ibu dan sang bayi

dari kandungan, maka upaya tersebut sangat didukung oleh hukum Islam, sesuai maksud beberapa ayat al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ  
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Terjemahannya :

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Termasuk juga dalam hal melahirkan yaitu tidak dipaksa melalui vagina bila mana kondisinya tidak memungkinkan bagi ibu yang akan melahirkan atau berakibat fatal bagi ibu dan anak yang akan lahir. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa menjalani SC di kala mendapat halangan melahirkan secara alami atau lewat rahim adalah diperbolehkan bahkan wajib, karena menyelamatkan nyawa dari kebinasaan lebih diutamakan dan merupakan kewajiban.

Lain halnya ibu hamil sesungguhnya sangat boleh jadi dapat melahirkan secara alamiah, akan tetapi dengan berbagai alasan menyebabkan ia rela untuk melakukan SC, maka dalam hal tersebut ada ketegasan menurut hukum Islam yang perlu diperhatikan.

Teknologi SC positif adanya, dan menjalani SC bagi wanita yang mampu (biaya) dengan berbagai alasan tanpa rasa sakit, aman, bisa awet muda, cepat sembuh

dan sebagainya. Memahami dasar tersebut, maka melahirkan melalui SC perlu pertimbangan-pertimbangan yang serius.

Sungguh besar pahala bagi wanita-wanita yang sedang hamil, menyusui dan mereka yang sedang mengasuh anak, sebagaimana Rasullulah SAW telah bersabda dalam hadisnya :

"Apakah salah seorang diantara kamu senang, hai kaum isteri, kalau kamu sedang mengandung dari hasil hubungan dengan suaminya, sementara suaminya merasa senang, sesungguhnya perempuan yang sedang hamil memperoleh pahala seperti pahalanya orang yang sedang berpuasa sambil berperang di jalan Allah. Apabila mencapai pincak rasa sakit mendekati melahirkan, semua penduduk langit tidak ada yang tahu perkara apa yang disamarkan baginya, berupa ketenangan batinnya. Apabila telah melahirkan, maka tidak ada tetes air susu yang keluar dari susu ibunya dan tidaklah si bayi menghisap air susu ibunya, kecuali pada setiap tetesan isapan dicatat sebagai satu kebaikan. Jika diwaktu malamnya ia terjaga maka ia memperoleh pahala, bagaikan pahala memerdekakan tujuh puluh budak yang di merdekaka di jalan Allah secara ikhlas. ( diriwayatkan oleh Hasan bin Sufyan dan Thabrani, Ibnu Asakir dari Salamah ). (Ashabul, 2011).

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli usul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan kelima unsur pokok tersebut adalah agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nast) dan harta (hifz al-mal).

#### 1. Memelihara Agama (Hifz al-din)

Secara umum Agama berarti : kepercayaan kepada Tuhan. Sedangkan Secara khusus Agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum dan undang- undang yang disyari'atkan oleh Allah SWT. Untuk mengatur hubungan manusia.dengan

Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkan Agama Islam telah mensyari'atkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar Agama Islam, yaitu: persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah.

## 2. Memelihara Jiwa (Hifzh al-Nafs)

Agama Islam dalam rangka mewujudkannya mensyari'atkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan atau mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi manusia.
- b. Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyat, seperti diperbolehkan memburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halai. Kalau kegiatan ini diabaikan maka menyebabkan eksistensi manusia terancam tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan hidup.
- c. Memelihara jiwa dalam peringkat thasiniyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika yang tidak akan mengancam eksistensi hidup manusia dan tidak pula

mempersulitnya jika tidak dilaksanakan. Hal ini berbeda dengan pemeliharaan jiwa pada peringkat atas.

3. Memelihara Akal (Hifz al-Aql),

Untuk memelihara akal agama Islam mensyari'atkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukkan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau mempergunakan segala yang memabukkan.

4. Memelihara Keturunan (Hifzh al-Nas)

Untuk memelihara kehormatan Agama Islam telah mensyari'atkan hukum had bagi laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina dan hukum hal bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa saksi.

5. Memelihara Harta (Hifzh al-Mal)

Untuk menghasilkan dan memperoleh hartakekayaan, agama Islam mensyari'atkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperoleh berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerjasama dalam usaha. Sedangkan untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyari'atkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penimpunan dan pengkhianatan serta merusakkan harta orang lain, pence-gahan orang yang bodoh dan lalai serta menghidarkan bahaya dilihat dari kepentingannya (Anan, 2011).

### **BAB III**

#### **KERANGKA KONSEP**

##### A. Dasar pemikiran Variabel yang Diteliti

Prosedur SC merupakan salah satu alternatif yang sering dilakukan dibidang kedokteran obstetrik dan ginekologi dalam pelaksanaan kelahiran, terutama bila terdapat komplikasi, misalnya *cephalopelvic disproportion (CPD)*, *fetal distress*, distosia karena kelainan tenaga ibu yang melahirkan, atau ibu dengan penyakit jantung. Seiring dengan kemajuan dan informasi, kemajuan kedokteran anestesi, peningkatan strata perekonomian, maka SC trend saat ini.

Pada pelaksanaan ibu melahirkan angka operasi semakin naik, dan ini bila dikaitkan dengan angka pelayanan pemantauan ibu hamil (*antenatal care/ANC*), merupakan gagalnya ANC. Pada masyarakat seksio sesarea ini banyak dilakukan dengan pertimbangan dalam bidang medis misalnya, umur ibu, paritas, indikasi baik pada ibu maupun pada janin, namun banyak faktor yang juga ikut berperan, antar lain sosial ekonomi, ingin bebas dari rasa sakit, rasa nyaman dan mungkin ini menjadi fenomena sosial dalam proses melahirkan saat ini.

Variabel yang di teliti adalah sebagai berikut :

### 1. Indikasi sectio sesarea

Berbagai indikasi yang ada janin pada ibu dan janin yang dikandungnya menentukan apakah SC dapat dilakukan atau tidak, yakni berupa indikasi medis.


### 2. Mortalitas ibu

Kematian ibu atau kematian maternal adalah kematian seorang ibu waktu hamil atau dalam waktu 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan, tidak bergantung pada tempat atau usia kehamilan.


kriteria objektif

- a. Perdarahan
- b. Infeksi

### B. Pola Pikir variabel yang diteliti



Keterangan



### C. Defenisi operasional dan kriteria objektif

#### 1. Sektio Caesarea

SC merupakan persalinan melalui pembedahan untuk mengeluarkan bayi dari rahim lewat irisan/sayatan pada perut bagian bawah rahim.

## 2. Indikasi sektio Caesarea

Indikasi medis SC adalah kriteria dalam bidang kedokteran obstetrik dan ginekologi untuk dilakukan SC. Dalam penelitian ini yang dimasukkan dalam indikasi medis untuk SC, antara lain :

- a. Panggul sempit absolut
- b. Stenosis serviks/ vagina
- c. Plasenta previa
- d. Solusio plsentia
- e. Preeklampsi dan eklampsi
- f. Riwayat SC sebelumnya
- g. Gameli
- h. Kala II memanjang
- i. Primi tua atau muda
- j. Serotinus
- k. Gawat janin
- l. Kelainan letak/situs janin (lintang, sungsang, dll).

## 3. Mortalitas ibu

Kematian ibu atau kematian maternal adalah kematian seorang ibu waktu hamil atau dalam waktu 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan, tidak bergantung pada tempat atau usia kehamilan.

kriteria objektif

- a. Perdarahan
- b. Infeksi

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif (Notoatmodjo, 2005).

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar yang terletak di Jl. Gunung Merapi No 75, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan bahwa RSIA Siti Fatimah tersebut merupakan salah satu Rumah Sakit rujukan dan pendidikan yang mudah dijangkau dan tempatnya strategis di tengah kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Sungai Poso.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Sungai Lohun.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Sungai Pareman.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Gunung Merapi.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni – Juli 2012.

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti (Notoatmodjo, 2005) yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah adalah semua ibu SC di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar tahun 2009-2011 sebanyak 2341 orang.

### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoadmojo, 2005). Sampel dalam penelitian ini adalah ibu bersalin dengan SC di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar tahun 2009-2011.

### 3. Besar sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah populasi ibu SC di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011 sebanyak 2341 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$N =$  Besar populasi

$d =$  Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan.

$n =$  Besar sampel (Notoatmodjo, 2005)

$$n = \frac{N}{1+N(d^2)}$$

$N = 2341$

$$d = 0,05 \longrightarrow d^2 = 0,0025$$

$$n = \frac{N}{1+N(d^2)}$$

$$n = \frac{2341}{1+2341(0,0025)}$$

$$n = \frac{2341}{1+5}$$

$$n = \frac{2341}{6}$$

$$n = 390$$

Jadi terdapat 390 ibu bersalin dengan SC yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini.

#### **D. Tehnik Pengambilan Sampel**

Tehnik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel untuk tujuan tertentu dengan kriteria ibu bersalin dengan SC, yang memiliki kelengkapan data yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Purposive sampling dalam penelitian ini adalah ibu bersalin dengan SC di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh data dengan cara menelusuri nomor register ibu bersalin SC yang terdapat di Ruang Persalinan kemudian dilanjutkan di Rekam Medik dengan menggunakan instrumen penelitian.

## F. Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui pengumpulan dan selanjutnya diolah secara sederhana yaitu menggunakan kalkulator dan penyajiannya dilakukan dengan cara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentasi disertai dengan penjelasan.

## G. Analisis Data

Data yang telah diolah selanjutnya dianalisis secara deskriptif, dengan rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :  $P$  : Persentase yang dicari

$f$  : Frekuensi

$n$  : Jumlah populasi

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabulasi

Lampiran 2. Lembar Kegiatan Konsul

Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Pengambilan Data

Lampiran 4. Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 5. Surat keterangan telah meneliti di RSKD Ibu Dan Anak Siti Fatimah  
Makassar.

Lampiran 6. Riwayat Hidup



## BAB V


### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil penelitian

Setelah melakukan penelitian selama dua minggu mengenai gambaran mortalitas ibu hamil berdasarkan indikasi SC di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011, maka diperoleh sampel sebanyak 390 orang.

**Tabel 5.1**  
**Distribusi indikasi terhadap kejadian SC di RSKD**  
**Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar**  
**Tahun 2009-2011**

<b>Indikasi</b>	<b>N</b>	<b>f (%)</b>
Riwayat SC sebelumnya	61	15,64%
Kelainan letak	57	14,62%
Cephalopelvic disproportion	50	15,82%
Kelainan plasenta	43	11,02%
Masalah pada ibu	39	10,00%
Gangguan kemajuan persalinan	38	9,74%
Gawat janin	30	7,69%
Preeklamsi dan eklamsia	30	7,69%
Masalah usia kehamilan	21	5,38%
Indikasi sosial	15	3,84%
Kelainan serviks	6	1,54%
<b>Jumlah</b>	<b>390</b>	<b>100%</b>




Sumber : Rekam medic RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009 2011.

Tabel 5.1, melihat ibu bersalin dengan SC di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011 yang tertinggi adalah dengan riwayat SC sebelumnya yaitu sebanyak 61 orang (15,64%), disusul kelainan letak sebanyak 57 orang (14,62%), Cephalopelvik disproportion sebanyak 50 orang (12,82%), kelainan plasenta sebanyak 43 orang (11,03%), gawat janin 30 orang (7,69%), preeklamsia dan eklampsia 30


orang ( 7,69 % ), masalah usia kehamilan 21 orang ( 5.38 % ), indikasi sosial 6 orang ( 1.54 % ).

**Gambar 5.1**  
**Distribusi indikasi berdasarkan Cephalopelvik disproportion**  
**di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar**  
**Tahun 2009-2011**




Gambar 5.1, tampak ibu bersalin dengan SC di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011. Indikasi berdasarkan Cephalopelvik disproportion yaitu sebanyak 50 orang (15,82%) yang digabung berdasarkan Cephalopelvik disproportion sebanyak 21 orang (5,38%), anak besar 16 orang (4,10%) dan panggul sempit 13 orang (3,33%)

**Gambar 5.2**  
**Distribusi indikasi berdasarkan Kelainan Plasenta di RSKD**  
**Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar**  
**Tahun 2009-2011**




Gambar 5.2, tampak ibu bersalin dengan SC di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011. Indikasi berdasarkan kelainan plasenta yang paling tinggi yaitu plasenta previa sebanyak 41 orang (11,02%), dan yang paling rendah yaitu plasenta akreta 1 orang (0,26%), solusio plasenta 1 orang (0,26%).

**Gambar 5.3**  
**Distribusi indikasi SC berdasarkan Masalah pada ibu di RSKD**  
**Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar**  
**Tahun 2009-2011**




Gambar 5.3, tampak ibu bersalin dengan SC di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011. Indikasi berdasarkan masalah pada ibu yang paling tinggi yaitu KPD sebanyak 22 orang (5,68%), dan disusul dengan oligohidramnion sebanyak 10 orang (2,56%) dan yang paling rendah yaitu primigravida tua 7 orang (1,79%).

**Gambar 5.4**  
**Distribusi indikasi berdasarkan Gangguan kemajuan persalinan**  
**di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar**  
**Tahun 2009-2011**




Gambar 5.4, tampak ibu bersalin dengan SC di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011. Indikasi berdasarkan gangguan kemajuan persalinan yang paling tinggi yaitu kala II lama sebanyak 32 orang (8,21%), dan gagal induksi sebanyak 6 orang (1,54%).

**Gambar 5.5**  
**Distribusi indikasi SC berdasarkan Preeklamsi dan eklampsia**  
**di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar**  
**Tahun 2009-2011**




Gambar 5.5, tampak ibu bersalin dengan SC di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011. Berdasarkan Indikasi preeklamsi dan eklampsia yang paling tinggi yaitu preeklamsi sebanyak 24 orang (6,15%), hipertensi sebanyak 5 orang (1,28%) dan yang paling rendah yaitu eklampsia 1 orang (0,26%).

**Gambar 5.6**  
**Distribusi berdasarkan indikasi Masalah usia kehamilan**  
**di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar**  
**Tahun 2009-2011**




Gambar 5.6, tampak ibu bersalin dengan SC di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011. Berdasarkan Indikasi masalah usia kehamilan yang paling tinggi yaitu gamelli sebanyak 15 orang (3,85%), serotinus sebanyak 6 orang (1,54%).

**Gambar 5.7**  
**Distribusi indikasi SC berdasarkan Indikasi Sosial**  
**di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar**  
**Tahun 2009-2011**



Gambar 5.7, tampak ibu bersalin dengan SC di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011. Berdasarkan Indikasi sosial yang paling tinggi yaitu APS sebanyak 8 orang (2,05%), anak mahal sebanyak 7 orang (1,79%).


**Gambar 5.8**  
**Distribusi indikasi berdasarkan Kelainan Serviks**  
**di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar**  
**Tahun 2009-2011**



Gambar 5.8, tampak ibu bersalin dengan SC di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011. Berdasarkan Indikasi kelainan serviks yang paling tinggi yaitu edema portio sebanyak 5 orang (1,28%), dan paling rendah adalah distosia serviks 1 orang (0,26%).

**Tabel 5.2**  
**Distribusi Mortalitas terhadap kejadian SC di RSKD**  
**Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar**  
**Tahun 2009-2011**

Mortalitas	N	f(%)
Tidak meninggal	389	99,74%
Meninggal	1	0,29%
<b>jumlah</b>	<b>390</b>	<b>100%</b>



Sumber : *Rekam medic RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011.*

Gambar 5.9, Tampak ibu bersalin dengan SC di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011 yang meninggal 1 orang (0,26%), terjadi pada Indikasi SC plasenta akreta sehingga menyebabkan perdarahan.

## B. Pembahasan

Setelah melakukan penelitian mengenai gambaran mortalitas ibu hamil berdasarkan indikasi SC di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011, maka hasilnya dapat dibahas berdasarkan variabel yang diteliti.

### 1. Indikasi

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 390 orang SC, yang paling banyak terjadi adalah riwayat SC sebelumnya yaitu sebanyak 15,64 % dan disusul kelainan letak sebanyak 14,62%.

Ibu yang menjalani tiga atau lebih SC sebelumnya hanya mengalami peningkatan risiko pemisahan asimtomatik jaringan parut uterus. Ibu yang

pernah menjalani SC, yang berikutnya memilih kelahiran pervaginam, memiliki kemungkinan 0,09% sampai 0,8% mengalami ruptur jaringan parut. Tetapi faktanya, ada beberapa kontraindikasi untuk mencoba persalinan, faktor-faktor yang tampaknya membawa risiko ruptur bermakna seperti insisi tidak diketahui, klasik atau vertikal rendah atau ibu sebelumnya menjalani histerektomi, atau dipakainya teknik penutupan jahitan tunggal. (Chapman, 2006: 146-147)

Menurut Wikjonosastro (2000) bahwa indikasi dari janin dilakukannya SC diantaranya adalah gawat janin, kelainan letak, kelainan tali pusat, mengingat risiko kematian janin yang ditimbulkan dari kasus tersebut. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Roeshadi RH tahun 2000 di RSIA Rosiva Medan bahwa proporsi ibu yang mengalami persalinan dengan SC tertinggi 21,7 % berdasarkan faktor janin adalah letak sungsang.

Disproporsi sefalopelvik merupakan keadaan yang menggambarkan ketidaksesuaian antara kepala janin dan panggul ibu sehingga janin tidak dapat keluar melalui vagina. Disproporsi sefalopelvik disebabkan oleh panggul sempit, janin yang besar ataupun kombinasi keduanya. (bidanthina, 2012).

Proses kehamilan dan melahirkan bagi seorang wanita adalah suatu yang unik sekaligus sakral. Sehingga setiap tahapan sebisa mungkin ingin dirasakan dan dilewati si ibu secara alami terutama pada saat persalinan.

Hanya saja pada kondisi tertentu seperti panggul ibu yang sempit, demi kebaikan ibu dan janin, jalan operasi SC memang jalan yang bijaksana.

Plasenta previa menyebabkan bagian terdepan janin sering sekali sulit untuk memasuki pintu atas panggul, oleh karena itu dilakukan seksio sesarea. Seksio sesarea pada plasenta previa selain untuk mengurangi kematian bayi, juga terutama dilakukan untuk kepentingan ibu, maka SC juga dilakukan pada plasenta previa walaupun anak sudah mati.

Pelepasan plasenta biasanya ditandai dengan perdarahan yang bisa keluar dari vagina, tetapi bisa juga tersembunyi dalam rahim, yang dapat membahayakan ibu dan janinnya. Persalinan dengan SC biasanya dilakukan untuk menolong agar janin segera lahir sebelum mengalami kekurangan oksigen atau keracunan air ketuban dan menghentikan perdarahan yang mengancam nyawa ibu (Sinaga, 2009).

Plasenta akreta bila implantasi menembus desidua basalis, faktor predisposisi terjadinya plasenta akreta adalah plasenta previa, bekas SC, pernah kuret berulang dan multiparitas (Sarwono, 2009).

Ibu yang terlalu muda, perkembangan alat-alat reproduksinya belum optimal. Sebaliknya pada ibu yang terlalu tua, fungsi alat reproduksinya telah mengalami kemunduran. Selain itu, pada usia tua komplikasi semakin besar. Hal inilah yang menjadi indikasi medis untuk dilakukannya SC.

Ketuban pecah dini (KPD) merupakan pecahnya selaput janin sebelum proses persalinan dimulai. Hal ini menyebabkan meningkatnya insiden SC.

Faktor-faktor yang menambah risiko mencakup partus lama dan KPD. Komplikasi KPD yang dapat dijadikan indikasi terminasi kehamilan yaitu prolaps tali pusat, infeksi intrauterin, dan solusio plasenta. SC adalah suatu tindakan untuk melahirkan bayi dengan berat di atas 500 gram, melalui sayatan pada dinding uterus yang masih.

Oligohidramnion adalah keadaan jika air ketuban kurang dari 500cc. Oligohidramnion adalah suatu keadaan dimana air ketuban sangat sedikit yakni kurang dari normal, yaitu kurang dari 500cc. Penyebab rendahnya cairan ketuban sehingga perlu dilakukan tindakan SC (Apriani, 2012).

Kala II persalinan ketika pembukaan serviks sudah lengkap 10 cm dan berakhir dengan lahirnya bayi. Kala II juga dikenal juga sebagai kala pengeluaran. Kala II lama dikatakan jika pembukaan sudah lengkap dan berlangsung lebih dari 2 jam lebih bayi belum lahir atau dilatasi serviks dikanan garis waspada pada persalinan fase aktif. Disebabkan oleh his tidak efisien, faktor janin (mal presentasi, malposisi, janin besar), faktor jalan lahir (panggul sempit, kelainan serviks, vagina, tumor), sehingga perlu dilakukan tindakan SC.

Gagal induksi apabila sudah di induksi dengan Infus Drip 3x tapi tetap tidak ada kemajuan. Dan bila kegagalan persalinan dikarenakan rahim yang tak mau berkontraksi (POWER), penanganan selanjutnya dapat dilakukan dengan cara SC. Indikasi induksi antara lain: hamil post term (lebih

dari 42 minggu), ketuban pecah dini, janin mati dalam kandungan, preeklamsi berat yang tidak membaik. (Anonim, 2009).

Diagnosa gawat janin berdasarkan pada keadaan kekurangan oksigen (*hipoksia*) yang diketahui dari denyut jantung janin yang abnormal, dan adanya mekonium dalam air ketuban. Normalnya, air ketuban pada bayi cukup bulan berwarna putih agak keruh, seperti air cucian beras. Jika tindakan SC tidak dilakukan, dikhawatirkan akan terjadi kerusakan neurologis akibat keadaan asidosis yang progresif, dan bila juga ibu menderita tekanan darah tinggi atau kejang pada rahim, mengakibatkan gangguan pada plasenta dan tali pusat sehingga aliran oksigen kepada bayi menjadi berkurang. Kondisi ini bisa menyebabkan janin mengalami kerusakan otak, bahkan tidak jarang meninggal dalam rahim.

Pre-eklampsia adalah suatu sindrom yang dijumpai pada ibu hamil di atas 20 minggu ditandai dengan hipertensi dan proteinuria dengan atau tanpa edema. Eklampsia adalah pre-eklampsia disertai dengan gejala kejang umum yang terjadi pada waktu hamil, waktu partus atau dalam 7 hari post partum bukan karena epilepsi (Sinaga, 2009).

Serotinus adalah suatu keadaan dimana plasenta tidak sanggup memberikan nutrisi dan pertukaran CO<sub>2</sub>/O<sub>2</sub> sehingga janin mempunyai risiko asfiksia dan bahkan kematian dalam rahim. Berkurangnya nutrisi dan oksigen ke janin yang menyebabkan asfiksia dan kematian dalam

rahim, Kematian janin pada kehamilan serotinus dapat terjadi sekitar 25-35% dalam rahim dan menyebabkan persalinan dengan tindakan operasi SC persalinan.

Kehamilan kembar adalah kehamilan dengan 2 janin atau lebih. Kehamilan kembar dapat memberi risiko yang lebih tinggi terhadap ibu dan bayi. Oleh karena itu dalam menghadapi kehamilan kembar harus dilakukan pengawasan hamil yang lebih intensif. Namun jika ibu mengandung 3 janin atau lebih maka sebaiknya menjalani SC. Hal ini akan menjamin bayi-bayi tersebut dilahirkan dalam kondisi sebaik mungkin dengan trauma minimum. (Sinaga, 2009).

Bila dijumpai edema yang hebat pada serviks dan disertai hematoma serta nekrosis, maka ini merupakan tanda adanya obstruksi. Bila syarat-syarat untuk ekstraksi vakum atau forsep tidak dipenuhi, lakukan SC. (Biomartinda, 2012).

Distosia serviks adalah terhalangnya kemajuan persalinan karena kelainan pada serviks uteri. Walaupun his normal dan baik, kadang-kadang pembukaan serviks macet karena ada kelainan yang menyebabkan serviks tidak mau membuka sehingga perlu dilakukan tindakan SC. (Luciana, 2012).

Selain indikasi medis terdapat indikasi sosial untuk melakukan SC. Menurut penelitian yang dilakukan sebuah badan di Washington DC, Amerik Serikat, pada tahun 1994 menunjukkan bahwa setengah dari jumlah persalinan

SC secara medis sebenarnya tidak diperlukan. Artinya tidak ada kedaruratan persalinan untuk menyelamatkan ibu dan janin yang dikandungnya. Indikasi sosial timbul oleh karena permintaan pasien walaupun tidak ada masalah atau kesulitan dalam persalinan normal. Hal ini didukung oleh adanya mitos-mitos yang berkembang di masyarakat.

Persalinan yang dilakukan dengan SC sering dikaitkan dengan masalah kepercayaan yang masih berkembang di Indonesia. Masih banyak penduduk di kota-kota besar mengaitkan waktu kelahiran dengan peruntungan nasib anak dilihat dari faktor ekonomi. Tentunya tindakan SC dilakukan dengan harapan apabila anak dilahirkan pada tanggal dan jam sekian, maka akan memperoleh rezeki dan kehidupan yang baik. Persalinan dengan SC dipilih oleh ibu bersalin karena tidak mau mengalami rasa sakit dalam waktu yang lama. Hal ini terjadi karena kekhawatiran atau kecemasan menghadapi rasa sakit pada persalinan normal (Sinaga, 2009).

## 2. Mortalitas

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 390 orang SC, terdapat 1 orang ibu yang meninggal, Terjadi pada Indikasi SC plasenta akreta sehingga menyebabkan perdarahan.

Pendarahan menempati persentase tertinggi penyebab kematian ibu ( 28 persen), anemia dan paling sedikit seperempat dari seluruh kematian ibu disebabkan oleh pendarahan; proporsinya berkisar antara kurang dari 10

persen sampai hampir 60 persen. (WHO). Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan Daulat Hasiholan Sibuea tahun 2007 di RSHAM dan RSPM Sumatra Utara bahwa proporsi ibu yang meninggal karena persalinan SC emergency 15,6% yang paling sering disebabkan oleh preeklamsia berat/eklamsia, disusul oleh sepsis dan perdarahan..

Jika dilihat dari penelitian ini berdasarkan angka kematian ibu akibat SC sangat rendah, sehingga hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para ibu bila memiliki indikasi untuk menjalani SC hendaknya tidak perlu khawatir karena setiap tindakan dilakukan dengan indikasi yang jelas.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil penelitian mengenai gambaran mortalitas ibu hamil berdasarkan indikasi sektio caesarea, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ibu bersalin dengan SC di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011 berdasarkan indikasinya yang terbanyak adalah riwayat SC sebanyak 61 orang (15,64%), dan paling sedikit pada kelainan serviks sebanyak 6 orang (1,54%).
2. Ibu bersalin dengan SC di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Tahun 2009-2011 berdasarkan mortalitasnya pada tahun 2010 yaitu 1 orang (0.26%) dengan indikasi plasenta akreta.

#### **B. SARAN**

1. Mengingat kecenderungan tingginya angka SC di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar, maka perlu kiranya memberikan penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan ANC pada ibu-ibu hamil terutama bagi ibu hamil dengan SC sebelumnya demi kesehatan ibu dan bayi serta mencegah terjadinya komplikasi baik saat kehamilan maupun persalinan.

2. Diharapkan kepada pihak rumah sakit mempertimbangkan indikasi seksio caesarea agar dapat dihindarkan persalinan seksio caesarea yang tanpa indikasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2005. *Departemen Agama RI. Bandung*: PT Syamil Cipta Media
- Alauddine. 2009. *Risiko Bayi Dilahirkan*. <http://hazzanstudio-blogspot.com>. Diakses tanggal 13 Desember 2011.
- Anonim, 2009. *Kumpulan materi kuliah induksi persalinan* <http://tutorialkuliah.wordpress.com/2009/01/14/induksi-persalinan/>. Diakses tanggal 02 September 2012.
- , 2010. *Partus Lama* . <http://wikimedyablogspot.com/2010/01/partus-lama.html>. Diakses Tanggal 20 Juli 2012.
- Apriani, G, 2012. Oligohidramnion. <http://niepizand.blogspot.Com/2012/03/oligohidramnion.html>. Diakses Tanggal 20 Juli 2012.
- Bidanthina. 2012. *Cephalopelvic disproportion*. <http://bidanthina.blogspot.Com/2012/03/cephalopelvic-disproportion-cpd.html>. Diakses Tanggal 20 Juli 2012.
- Biomartinda, 2012. *Distosia Karena Kelainan Jalan Lahir Lunak*. <http://biomartinda.wordpress.com/>. Diakses Tanggal 20 Juli 2012.
- Cunningham, F. G, er al. 2005. *Obstetri Williams*, Ed. 21, Vol. 1; Jakarta: EGC.
- Farrer, Helen. 2001. *Perawatan Maternitas*. Jakarta: EGC.
- Luciana, Povi, 2012. *Dystocia dan Shock*. [http://povineviluciana.blogspot.com/2012\\_01\\_01\\_archive.html](http://povineviluciana.blogspot.com/2012_01_01_archive.html). Diakses Tanggal 20 Juli 2012.
- M. Ridwan. Sadiman. 2008. *Faktor-faktor yang berhubungan dengan persalinan section caesarea*. <http://jurnal.pdii.lipi.go.id>. Diakses tanggal 15-10-2011.
- Natoatmojo, Soekidjo. 2005. *Metode Penelitian Kesehatan, Cetakan 3*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ningri. 2009. *Askeb Sectio Caesarea*. <http://himapid.blogspot.com>. Diakses tanggal 15-12-2011.
- Nunung. 2009. *Seputar Seksio Cesarea*. <http://himapid.blogspot.com>. Diakses Tanggal 13 Desember 2011.

- Oxorn, Harry. 2010. *Ilmu Kebidanan Patologi dan Fisiologi Persalinan*. Yogyakarta: CV Andi Offset pada Yayasan Essentia Medical.
- Prawirohardjo, S. 2008. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta : PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta : PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Rabe, Thomas. 2002. *Buku Saku Ilmu Kebidanan*. Cet. I; Jakarta: EGC.
- Rasjidi, Imam. 2009. *Manual Seksio Sesarea dan Laparatomi Kelainan Adneksa*. Jakarta: Sagung Seto.
- Rusda. 2004. *Anestesi inflistrasi pada persalinan*. <http://www.Ellimufwordpress.com>. Diakses 13 Desember 2011.
- Said, Muh. 2005. *Hukum Islam vol. 12 No.10*. <http://www.uinsuska.info.co.id>. Diakses tanggal 18 Februari 2012.
- Saifuddin, Abdul Bari. 2002. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Sibuea, Hasiholan, Daulat. 2007. *Manajemen Seksio Sesarea Emergensi Masalah Dan Tantangan*. <Http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/756/1/08E00135.pdf>. Diakses Tanggal 25 September 2012
- Sinaga, Marisid Ezra. 2009. *Karakteristik Ibu yang Mengalami Persalinan Seksio Sesarea yang Dirawat Inap Diruamah Sakit Umum Daerah Sidikalang Tahun 2007*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/14620/1/09E00837.pdf>. Diakses Tanggal 25 Juli 2012.
- Sudarianto. 2010. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009*. <http://datinkessulsel.wordpress.com>. Diakses 18 maret 2012.
- Sumarah. 2008. *Perawatan Ibu Bersalin*. Yogyakarta: Fitramaya.
- Varney, Helen. 2007. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan*. Cet. I; Jakarta: EGC.

—————. 2008. *Buku Saku Bidan*. Jakarta : EGC.

Walley, Janet. 2008. *Panduan Praktis Bagi Calon Ibu Kehamilan dan Persalinan*. Cet, II; Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. HSal: 188.

Widjanarko, B. 2009. *Pendidikan Klinik Obstetri Ginekologi*.  
<http://www.gyneкологи.co.id>. Diakses 15-12-2011.

Wikipedia. 2012. *Bedah Sesar*. [http://id.wikipedia.org/wiki/Bedah\\_sesar.com](http://id.wikipedia.org/wiki/Bedah_sesar.com)  
Diakses tanggal 18 Februari 2012.

Wiknjosastro, H. dkk.2002. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prowirohardjo

—————. 2005. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prowirohardjo

—————. 2007. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prowirohardjo.

Ashabul, 2011. *Hadist Pahala Bagi Wanita Yang Hamil, Menyusui Dan Mengasuh Anak*. <http://www.ashabul-muslim.com/2011/11/hadist-pahala-bagi-wanita-yang-hamil.html#?max-results=5>. Diakses tanggal 01 Oktober 2012.