

**UJI AKTIVITAS ANTIINFLAMASI EKSTRAK METANOL DAUN
PACAR AIR (*Impatiens balsamina. L*) PADA MENCIT (*Mus musculus*)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh

ARIADI SYAMSUL
70100107088

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2012**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, tiada kata yang lebih patut diucapkan oleh seorang hamba selain mengucapkan puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan segala pemilik ilmu karena atas berkat hidayah-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan kepada kita, menjadi pembaharu dan menjadi cahaya hingga saat ini.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis dengan judul “Uji Aktivitas Antiinflamsi Ekstrak Metanol Daun Pacar Air (*Impatiens balsamina*.L) Pada Mencit (*Mus musculus*)”, untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga penulis hanturkan kepada Ayahanda Syamsul Bahri Aliyah dan Ibunda Hj. Siti Fatimah yang tercinta, yang dengan penuh kesabaran dan tidak henti-hentinya memberikan segala doa restu, kasih sayang, nasehat dan bantuan moril maupun materi selama menempuh pendidikan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H.A. Qadir Gassing, HT,M.S selaku Rektor UIN alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah menjadikan UIN sebagai kampus

yang telah banyak mencetak sarjana-sarjana yang berkualitas, berdaya guna serta memiliki kompetensi di masyarakat.

2. Bapak Dr.dr.H.Rasyidin Abdullah.,M.PH.,MH.Kes selaku Dekan beserta para Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci., M.Si., Apt. sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan sekaligus sebagai penguji kompetensi yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
5. Ibu Isriany Ismail.,S.Si.,M.Si.Apt sebagai pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Syamsul Bahri.,M.Si. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.

7. Bapak, Ibu Dosen, serta Seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi, melaksanakan pendidikan hingga selesainya skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
9. Para Laboran Farmasi yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian dan seluruh rekan-rekan seperjuangan angkatan 2007 tanpa terkecuali khususnya rekan-rekan dari Farmasi C serta adik-adik jurusan farmasi angkatan 2008, 2009, 2010, 2011 dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, olehnya itu penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALA UDDIN
M A K A S S A R
Makassar, 14 Mei 2012
Wassalam

Ariadi Syamsul

ABSTRAK

Nama Penyusun : Ariadi Syamsul
Nim : 70100107088
Judul Skripsi : Uji Aktivitas Antiinflamasi Ekstrak Metanol Daun Pacar air (*Impatiens balsamina. L*) Pada Mencit (*Mus musculus*)

Telah dilakukan penelitian uji aktivitas antiinflamasi ekstrak metanol daun pacar air (*Impatiens balsamina. L*) terhadap penurunan udem pada mencit. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan konsentrasi optimum ekstrak antiinflamasi pada mencit (*Mus musculus*).

Perlakuan terhadap hewan uji (mencit) dibagi atas lima kelompok yaitu kelompok dengan pemberian peroral Na. CMC kontrol negatif ekstrak konsentrasi 2%, 4%, 16% masing- masing 1 ml serta kelompok kontrol positif dengan pemberian ketoprofen 0,195 mg/ 28 gr BB mencit. Induksi udem menggunakan albumin (putih telur) 1%. Analisis perbedaan pemberian ekstrak terhadap kelompok kontrol negatif dan kontrol positif dilakukan dengan Metode Statistik Rancangan Acak Lengkap.

Ekstrak metanol daun pacar air (*Impatiens balsamina. L*) berefek antiinflamasi pada pemberian peroral konsentrasi 2% yang dosis 1 ml setara dengan efek antiinflamasi ketoprofen 0,195 mg/ 28 BB mencit.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Ariadi Syamsul
Nim : 70100107088
Title of Script : An- assay for antiinflammation effect of methanol ekstract of “pacar air” (*Impatiens balsamina. L*) to the mice (*Mus musculus*)

Preparations have been conducted testing anti-inflammatory activity of methanol extract of henna leaf water (*Impatiens balsamina. L*) to decrease edema in mice. This study aims to obtain the optimum concentration of anti-inflammatory extracts in mice (*Mus musculus*).

The treatment of test animals (mice) are divided into five groups: the group by giving with Na. CMC negative control) extract concentration of 2%, 4%, 16% each 1 ml as well as the positive control group with the provision of ketoprofen 0,195mg / 28 gr of BB rats. Induced edema using albumin (egg whites) 1%. Analysis of group differences extract of negative control and positive control performed with Statistical Methods Completely Randomized Design.

Methanol extract of leaves of henna water (*Impatiens balsamina. L*) anti-inflammatory effect at a concentration of 2% by giving a dose of 1 ml mice were equivalent to anti-inflammatory effects of ketoprofen 0,195 mg / 28 gr BB rats.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	2
C. <i>Tujuan Penelitian</i>	2
D. <i>Manfaat Penelitian</i>	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
A. <i>Uraian Tumbuhan Pacar air</i>	4
1. <i>Klasifikasi</i>	4
2. <i>Nama Daerah</i>	5
3. <i>Morfologi</i>	5
4. <i>Kandungan Kimia</i>	6
5. <i>Kegunaan</i>	6
B. <i>Uraian Hewan Uji</i>	7
1. <i>Taksonomi Hewan Uji</i>	7
2. <i>Karakteristik Hewan Uji</i>	8
C. <i>Ekstraksi Bahan Alam</i>	9
1. <i>Definisi Ekstrak</i>	9
2. <i>Mekanisme Ekstraksi</i>	9
3. <i>Jenis – jenis Ekstraksi</i>	9
D. <i>Inflamasi</i>	11
1. <i>Tanda- tanda Pokok Peradangan</i>	11

2. Fenomena Pada Peradangan.....	14
E. <i>Pengobatan Antiinflamasi</i>	16
F. <i>Ketoprofen</i>	18
G. <i>Tinjauan Islam Mengenai Penggunaan Tumbuhan Sebagai Obat</i>	19
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. <i>Alat dan Bahan</i>	28
B. <i>Prosedur Kerja</i>	28
1. Pengambilan Sampel.....	28
2. Pengolahan Sampel.....	29
C. <i>Pembuatan sampel</i>	29
1. Pembuatan ekstrak metanol daun pacar air.....	29
2. Pembuatan suspensi Albumin	29
3. Pembuatan larutan Koloidal Na. CMC	29
4. Pembuatan Suspensi Ketoprofen	29
5. Pemilihan dan penyiapan Hewan Uji	30
D. <i>Perlakuan Hewan Uji</i>	30
E. <i>Analisis Hasil</i>	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. <i>Hasil</i>	32
B. <i>Pembahasan</i>	32
BAB V PENUTUP	37
A. <i>Kesimpulan</i>	37
B. <i>Saran</i>	37
DAFTAR PUSTAKA	37
LAMPIRAN	38
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	49

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Nilai Fisilogis Mencit (<i>Mus musculus</i>)	8
2. Hasil penurunan volume edema telapak kaki mencit, pemberian ekstrak metanol daun pacar air	33
3. Data hasil pengamatan volume edema setelah Perlakuan	42
4. Jumlah dan rata- rata penurunan volume edema telapak Kaki mencit.....	43
5. Analisis sidik ragam	43
6. Hasil Uji BJND penurunan volume telapak kaki mencit Menurut RAL dalam bagan angka.....	45

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Tanaman Pacar air	47
2. Daun Pacar air	47
3. Perlakuan Intraplantar	48
4. Platysmometer yang di Modifikasi	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema Kerja	40
2. Perhitungan dosis pemberian ketoprofen	41
3. Data Pengamatan	42
4. Analisis statistik penurunan volume edema telapak kaki mencit menggunakan rancangan acak lengkap dan uji Duncan	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Inflamasi merupakan suatu respon protektif normal terhadap luka jaringan yang disebabkan oleh trauma fisik, zat kimia perusak, atau zat- zat mikrobiologik. Inflamasi adalah suatu usaha tubuh untuk menginaktivasi atau merusak organisme yang menyerang, menghilangkan zat iritan, dan mengatur derajat perbaikan jaringan. Jika terjadi proses penyembuhan, biasanya peradangan akan mereda (Mycek, 2001).

Pengobatan inflamasi mempunyai dua tujuan yang utama. Pertama, meringankan rasa nyeri yang sering merupakan gejala awal yang tak terlihat: dan kedua memperlambat atau membatasi proses perusakan jaringan, obat- obat antiinflamasi nonsteroid (AINS) dan kortikosteroid sama- sama memiliki kemampuan untuk menekan tanda- tanda dan gejala- gejala inflamasi namun sayangnya kedua golongan obat ini yang biasa digunakan dalam pengobatan inflamasi sering kali menimbulkan efek yang merugikan dan berbahaya seperti kerusakan gastrointestinal nefrotoksik dan hepatotoksik (Katzung, 2002).

Dalam kehidupan sehari-hari banyak masyarakat menggunakan beberapa tanaman sebagai obat antiinflamasi contohnya tumbuhan pacar air (*Impatiens balsamina* L). Salah satu tumbuhan obat yang telah dikenal adalah pacar air (*Impatiens balsamina* L). Menurut Arisandi dan Andrian (2006 : 311) bagian tumbuhan pacar air yang bisa dimanfaatkan sebagai obat adalah

akar, daun, bunga, dan biji. Efek farmakologis tumbuhan pacar air adalah melancarkan peredaran darah dan melunakkan massa atau benjolan keras. Bunga (*Impatiens balsamina.L*) bermanfaat untuk mengobati pembengkakan, bisul, rematik, dan radang kulit. Daun (*Impatiens balsamina.L*) bermanfaat untuk antiinflamasi dan fracture.

Tumbuhan pacar air mempunyai beberapa warna bunga yaitu merah, putih, kuning, jingga dan ungu. Kandungan kimia yang terkandung dari bunga diantaranya antosianin (sianidin, delpinidin, pelargonidin, malpidin), kamperol, monoglikosida, biji mengandung saponin dan fixel oil, akar sianidin, monoglikosida. (Arisandi dan Andriani, 2006 : 311).

Berdasarkan uraian diatas maka melakukan penelitian uji aktivitas antiinflamasi ekstrak metanol daun pacar air (*Impatiens balsamina.L*) terhadap perlakuan hewan coba mencit (*Mus musculus*).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ekstrak metanol daun pacar air (*Impatiens balsamina. L*) dapat berefek sebagai antiinflamasi pada mencit (*Mus musculus*) ?
2. Bagaimana pandangan Islam tentang pemakaian daun pacar air (*Impatiens balsamina.L*) sebagai obat alternatif untuk pengobatan inflamasi ?

C. Tujuan

1. Mendapatkan konsentrasi optimum ekstrak metanol daun pacar air (*Impatiens balsamina.L*) yang berefek sebagai antiinflamasi pada mencit (*Mus musculus*).

- 2 Memahami pandangan islam Islam tentang pemakaian daun pacar air (*Impatiens balsamina.L*) sebagai obat alternatif untuk pengobatan inflamasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Diperoleh ekstrak metanol daun pacar air (*Impatiens balsamina. L*) yang berkhasiat sebagai antiinflamasi yang diharapkan dapat menjadi alternatif obat inflamasi.
2. Pengembangan obat tradisional yang digunakan secara empiris menjadi suatu sediaan fitofarmaka dengan aktivitas antiinflamasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Uraian Tumbuhan*

Tanaman ini berasal dari Asia Selatan (India) dan Asia Tenggara. Diperkenalkan di Amerika sekitar abad 19. Di Indonesia, tanaman ini tersebar merata dan dipakai sebagai tanaman hias (Arisandi dan Andriani, 2006).

Tumbuhan pacar air mempunyai beberapa warna bunga yaitu merah, putih, kuning, jingga dan ungu. Tumbuhan pacar air dapat mengobati keputihan, nyeri haid, radang usus buntu, kronis, inflamasi, patah tulang atau retak, mengurangi rasa nyeri, bisul, radang kulit, radang kuku, meluruhkan haid, mempermudah persalinan dan mengobati kanker saluran pencernaan (Arief, 2005).

1. **Klasifikasi** (Anonim 2005)

Regnum	: Plantae
Division	: Spermatophyta
Sub division	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledoneae
Sub Kelas	: Dialypetalae
Ordo	: Sapindales
Family	: Balsaminaceae
Genus	: <i>Impatiens</i>
Spesies	: <i>Impatiens balsamina</i> L.

2. Nama Daerah

Nama daerah dari tumbuhan pacar air adalah Lahine (Nias), paruinai (Jawa) atau pacar banyu, kimbong (Jakarta), bunga taho (Sulawesi Utara), pacci (Sulawesi Selatan), inai anyar (Maluku), pacar foya (Nusa Tenggara) (Arief, 2005).

3. Morfologi Tumbuhan

Pacar air merupakan tanaman terna berakar serabut, berbatang basah, lunak, bulat, bercabang, warna hijau kekuningan. Pacar air biasanya ditanam sebagai tanaman hias dengan tinggi 30-80 cm. arah tumbuhnya tegak dan percabangannya monopodial. Pacar air mempunyai daun tunggal, tersebar, berhadapan atau dalam karangan. Bentuk daun lanset memanjang, pinggirnya bergerigi, ujung meruncing, tulang daun menyirip. Warna daun hijau muda tanpa daun penumpu, jika ada daun penumpu bentuknya kelenjar. Bagian bawah membentuk roset akar. Tulang daun menyirip. Luas daunnya sekitar 2 sampai 4 inchi. Pangkal daun bergerigi tajam, ujung daun runcing. Buah pada tumbuhan pacar air terdiri dari bakal buah menumpang, beruang 4-5. Dalam satu ruangan tersebut terdapat dua atau lebih bakal biji. Buah membuka kenyal dan termasuk buah batu dengan 5 inti. Bentuk buah elliptis, pecah menurut ruang secara kenyal. Benihnya endospermik. embrio akan mengalami diferensiasi. Tumbuhan ini juga memiliki aneka macam warna bunga, ada yang putih, merah, ungu, kuning, jingga. Jika pacar air yang berbeda warna disilangkan, maka akan terbentuk keturunan yang beraneka ragam,

berkelamin 2, di ketiak. Daun kelopak 3 atau 5, lepas atau sebagian melekat, bertaji. Daun kelopak samping berbentuk corong miring, berwarna dan terdapat noda kuning di dalamnya, sedikit di atas pangkal daun mahkota memanjang menjadi taji dengan panjang 0,2-2 cm. Daun mahkota 5, lepas. Daun mahkota samping berbentuk jantung terbalik dengan panjang 2-2,5 cm, yang 2 bersatu dengan kuku, yang lain lepas tidak berkuku dan lebih pendek. Ada 5 benangsari dengan tangkai sari yang pendek, lepas, agak bersatu. Kepala sarinya bersatu membentuk tudung putih. Bunga terkumpul 1-3. Setiap tangkai hanya berbunga 1 dan tangkainya tidak beruas, memiliki 5 kepala putik (Anonim,2009).

4. Kandungan Kimia

Pada bunga mengandung antosianin (sianidin, delphinidin, pelargonidin, malpidin), kamferol, biji mengandung saponin, fixel oil, kuersetin, daun pacar air mengandung kumarin, flavonoid, kuinon, saponin, steroid, dan akar mengandung sianidin monoglikosida (Yuniarti, 2001).

5. Khasiat Tumbuhan

Tumbuhan ini memiliki banyak khasiat obat, diantaranya bagian yang digunakan adalah biji, daun, bunga dan akarnya. Biji digunakan untuk mengatasi terlambat haid, sulit melahirkan, rasa tersumbat ditenggorokan, bengkak akibat terbentur (memar), tumor perut, dan kanker saluran cerna dibagian atas. Bunga digunakan untuk mengatasi terlambat haid, dan bengkak karena gumpalan bekuan darah. Daun digunakan untuk

mengatasi Daun: Keputihan (Leucorrhoea), tulang patah/retak (Fracture), mengurangi rasa nyeri (analgetik), Peluruh haid, anti-inflamasi (antiflogistik = anti radang),

Akar digunakan untuk mengatasi rematik, leher kaku, sakit pinggan, terlambat haid. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat menggunakan tumbuhan ini dengan melumatkan daun pacar air segar, lalu ditempelkan pada bagian tubuh yang luka, cara lain dengan merebus daun pacar air segar secukupnya lalu digunakan air rebusan untuk mencuci luka (Anonim 2009).

B. Uraian Hewan Uji

1. Taksonomi Hewan Uji (Arrington 1972, 7)

Dunia : Animalia
Filum : Chordata
Sub Filum : Vertebrata
Kelas : Mammalia
Subkelas : Theria
Ordo : Rodentia
Famili : Muridae
Genus : Mus
Spesies : *Mus musculus*. Lin

2. Karakteristik

Mencit (*Mus musculus*) adalah hewan pengerat (Rodentia) yang cepat berbiak, mudah dipelihara dalam jumlah banyak, variasi genetiknya cukup besar serta sifat anatomis dan fisiologisnya terkarakterisasi dengan baik. (Malole 1989, 94).

Tabel 1: Nilai Fisiologis mencit

Kriteria	Nilai
Berat badan : - Jantan	20 – 40 g
Luas Permukaan tubuh	20 g: 36 cm ²
Temperatur tubuh	36,5 – 38,0 ⁰ C
Harapan hidup	1,5 – 3,0 tahun
Konsumsi makanan	15 g/100 g/hari
Konsumsi air minum	15 ml/100 g/hari
Jumlah pernapasan	94 – 163/menit
Detak jantung	325-780/menit
Volume darah	76 – 80 mg/kg
Tekanan darah	113 – 147/81 – 106 mm Hg
Glukose dalam darah	62 – 175 mg/dl
Cholestrol	26 – 82 mg/dl
Kalsium dalam serum	3,2 – 9,2 mg/dl
Phosphat dalam serum	2,3 – 9,2 mg/dl

C. Ekstraksi Bahan Alam

1. Defenisi Ekstrak (FI : Edisi IV ,7)

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan.

2. Mekanisme Ekstraksi (Harbone,J.B.1987)

Umumnya zat aktif yang terkandung dalam tanaman maupun hewan lebih larut dalam pelarut organik. Proses terekstraksinya zat aktif dalam tanaman adalah sebagai berikut, pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk kedalam rongga sel tanaman atau hewan yang mengandung zat-zat aktif. Zat-zat aktif tersebut akan terlarut sehingga akan terjadi perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan pelarut organik diluar sel. Maka larutan terpekat akan terdifusi keluar sel, dan proses ini akan berulang terus sampai terjadi kesetimbangan antara konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel.

3. Jenis – Jenis Ekstraksi

Cara penyarian atau ekstraksi dibedakan menjadi infundasi, maserasi, perkolasi, dan penyarian berkesinambungan. Dari keempat cara tersebut sering dilakukan modifikasi untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

a. Ekstraksi Secara Perkolasi (Ditjen POM 1986, 16)

Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Prinsip perkolasi adalah sebagai berikut : serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang bagian awalnya diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut, cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh.

b. Ekstraksi Secara Maserasi (Ditjen POM 1986, 10)

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan akan masuk kedalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi kesetimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel.

c. Ekstraksi Secara Refluks (Ditjen POM 1986,25)

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingi balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna.

d. Ekstraksi Secara Digesti (Ditjen POM 1986,12)

Digesti adalah Maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinyu) pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar), yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40-50° C.

e. Ekstraksi Secara Soxhletasi (Ditjen POM 1986,26)

Soxhletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinyu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan pendingin balik.

f. Ekstraksi Secara Infus (Ditjen POM 1986,8)

Infus adalah sediaan cair yang dibuat dengan penyari simplisia pada temperatur penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih), temperatur terukur 96-98° C. Selama waktu tertentu 15-20 menit.

D. Inflamasi

Inflamasi merupakan suatu respon protektif normal terhadap luka jaringan yang disebabkan oleh trauma fisik, zat kimia yang merusak, atau zat-zat mikrobiologik. Inflamasi adalah usaha tubuh untuk menginaktivasi atau merusak merusak organisme yang menyerang, menghilangkan zat iritan, dan mengetur derajat perbaikan derajat. (Mycek, 2001)

1. Tanda- Tanda Pokok Peradangan

Gambaran makroskopik peradangan dikenal sebagai tanda- tanda pokok peradangan yang mencangkup kemerahan (*rubor*), panas (*kalor*),

nyeri (*dolor*), pembengkakan (*tumor*), dan perubahan fungsi (*funcio laesa*). (Mycek, 2001)

a. Rubor (*Kemerahan*)

Rubor atau kemerahan biasanya merupakan hal pertama yang terlihat didaerah yang mengalami peradangan. Waktu reaksi peradangan mulai timbul, maka arteriol yang mensuplai daerah tersebut melebar, dengan demikian lebih banyak darah yang mengalir kedalam mikrosirkulasi lokal. Kapiler- kapiler yang sebelumnya kosong atau sebagian saja yang meregang dengan cepat terisis penuh dengan darah. Keadaan ini, yang dinamakan *Hiperemia* atau *Kongesti*, menyebabkan warna merah lokal karena peradangan akut. (Katzung, 2001).

b. Kolor (*Panas*)

Kolor atau panas, terjadi bersamaan dengan kemerahan dari reaksi peradangan akut. Sebenarnya, panas merupakan sifat reaksi peradangan yang hanya terjadi pada permukaan tubuh, yang dalam keadaan normal lebih dingin dari 37⁰ C, yaitu suhu di dalam tubuh. Daerah peradangan pada kulit menjadi lebih panas dari sekelilingnya, sebab darah yang disalurkan tubuh ke permukaan daerah yang terkena lebih banyak daripada yang disalurkan ke daerah normal (Heinz Lullmann, 2000).

c. Dolor (*Sakit*)

Dolor atau rasa *sakit*, dari reaksi peradangan dapat dihasilkan dengan berbagai cara. Perubahan pH lokal atau konsentrasi lokal atau ion- ion tertentu dapat merangsang ujung- ujung saraf. Hal yang sama,

pengeluaran zat kimia tertentu sampai histamin atau zat kimia bioaktif lainnya dapat merangsang saraf. Selain itu, pembengkakan jaringan yang meradang mengakibatkan peningkatan tekanan lokal yang tanpa diragukan lagi dapat menimbulkan rasa sakit (Katzung, 2001).

d. Tumor (*pembengkakan*)

Segi paling menyolok dari peradangan akut adalah pembengkakan lokal (*tumor*). Pembengkakan ditimbulkan oleh pengiriman cairan dan sel-sel dari sirkulasi darah ke jaringan-jaringan interstisial. Campuran dari cairan dan sel yang tertimbun di daerah peradangan eksudat. Pada keadaan ini reaksi reaksi peradangan sebagian besar eksudat adalah cair, seperti yang terjadi pada lepuhan yang disebabkan oleh luka bakar ringan. Kemudian sel-sel darah putih, atau leukosit meninggalkan darah dan tertimbun sebagai bagian dari eksudat (Heinz Lullmann, 2000).

e. *Functio laesa* (perubahan fungsi)

Functio laesa atau perubahan fungsi adalah reaksi peradangan yang telah dikenal. Sepintas lalu, mudah dimengerti mengapa bagian yang bengkak, nyeri disertai sirkulasi abnormal dan lingkungan kimiawi lokal yang abnormal, berfungsi secara abnormal. Namun, sebetulnya kita tidak mengetahui secara mendalam dengan cara apa fungsi jaringan yang meradang tersebut terganggu (Katzung, 2001).

2. Fenomena pada Peradangan

Biasanya dinding saluran pembuluh darah yang terkecil (mis, kapiler dan venul) memungkinkan molekul- molekul kecil lewat, tetapi menahan molekul besar seperti protein plasma tetap didalam lumen pembuluh darah. Sifat pembuluh darah yang semipermeabel ini menimbulkan tekanan osmotik yang cenderung menahan cairan didalam pembuluh darah. Eksudat peradangan mengandung protein plasma dalam jumlah yang sangat signifikan. Jadi fenomena penting pada peradangan akut adalah perubahan permeabilitas pembuluh- pembuluh yang sangat kecil didaerah peradangan tersebut yang mengakibatkan kebocoran protein. Proses ini kemudian diikuti oleh penggeseran keseimbangan osmotik, dan air keluar bersama protein menimbulkan pembengkakan jaringan. Dilatasi arteriol juga menimbulkan hyperemia local dan kemerahan sehingga menimbulkan peningkatan tekanan intravascular local karena pembuluh darah membengkak aksi ini juga meningkatkan pergeseran cairan (Price dan Lorraine M, Wilson, 2006, 58-59).

Inflamasi dicetuskan oleh pelepasan mediator kimiawi dari jaringan yang rusak dan migrasi sel. Mediator kimiawi spesifik bervariasi dengan tipe proses peradangan dan meliputi amin, seperti histamin dan 5-hidroksitriptamin; lipid, seperti prostaglandin ; peptida kecil, seperti bradikinin; dan peptida besar, seperti interleukin- 1 (Mycek, 2001).

Apapun penyebab radang (inflamasi) selalu menimbulkan perubahan jaringan yang sama sehingga dianggap perubahan ini timbul

melalui proses yang sama yaitu melalui zat- zat perantara yang dilepaskan yang dinamakan mediator.

a. Histamin

Histamin mempunyai peran modulasi dalam berbagai inflamasi dan respon imun. Histamin juga memainkan sebagai peran pada respon inflamasi akut. Pada jaringan, rilis histamin menyebabkan vasodilatasi lokal dan kebocoran plasma yang mengandung mediator inflamasi akut (komplemen, protein C reaktif), antibodi, dan sel- sel inflamasi (neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit) (Katzung, 2001).

b. Serotonin

Serotonin (5- hidroksitriptamin) disintesis dari L- triptofan dalam sel *enterochromaffin* pada mukosa saluran cerna. Serotonin secara menyebabkan kontraksi otot polos, terutama melalui reseptor 5-HT₂. Pada manusia, serotonin merupakan vasokonstriktor yang kuat kecuali pada otot rangka dan jantung, karena pada daerah tersebut serotonin melebarkan pembuluh darah. Pada inflamasi, serotonin dapat meningkatkan permeabilitas vaskular namun tidak sekuat histamin (Heinz Lullmann, 2000).

c. Bradikinin

Bradikinin memainkan peranan penting dalam proses peradangan. Bradikinin dapat menyebabkan kemerahan, panas setempat, bengkak, dan nyeri. Bradikinin menyebabkan vasodilatasi yang hebat di dalam beberapa rangkaian vaskular, termasuk jantung,

ginjal, otot rangka, usus, dan hepar. Dalam hal ini, bradikinin 10 kali lebih kuat dari pada histamin (Katzung, 2001).

d. Prostaglandin

Prostaglandin merupakan senyawa *eicosanoid* yang disintesis dari asam arakhidonat oleh enzim *cyclooxygenase* II yang aktif selama peradangan. Prostaglandin meningkatkan sensitivitas sensor saraf terhadap rangsangan nyeri, juga meningkatkan permeabilitas vaskular dan bertindak sebagai vasodilator (Heinz Lullmann, 2000).

e. Leukotrien

Leukotrien disintesis sebagai respon terhadap antigen dan tidak disimpan secara intraselular. Leukotrien merupakan produk dari metabolisme asam arakhidonat melalui jalur *lipooxygenase*. Salah satu efek sistemik dari leukotrien inflamasi kulit dan kemotaksis. Leukotrien juga meningkatkan permeabilitas vaskular (Jense B. Hall, 2005).

E. Antiinflamasi

Obat- obat inflamasi adalah golongan obat yang memiliki mekanisme kerja umum berupa penghambatan sintesis prostaglandin via penghambatan enzim siklooksigenase. Siklooksigenase bertanggung jawab atas biosintesis prostaglandin. Berdasarkan mekanisme kerjanya, obat- obat *antiinflamasi golongan steroid* yang terutama bekerja dengan cara menghambat pelepasan prostaglandin dari sel- sel sumbernya, dan obat *antiinflamasi golongan non steroid* atau *Non Steroidal Antiinflammatory Drugs (NSAID' s)* yang bekerja

melalui mekanisme yang lain seperti inhibisi siklooksigenase yang berperan pada biosintesis prostaglandin. Obat- obat *antiinflamasi golongan non steroid* atau *Non Steroidal Antiinflammatory Drugs* (NSAID' s) efektif untuk peradangan akibat benturan, memar, pembengkakan dan juga setelah pembedahan. *Non Steroidal Antiinflammatory Drugs* (NSAID' s) juga berguna untuk mengurangi nyeri kanker, dan yang banyak digunakan untuk kasus ini adalah ibu profen, naproksen dan diklofenak karena efek samping yang relatif sedikit. Penggolongan *Non Steroidal Antiinflammatory Drugs* (NSAID' s) secara kimiawi dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu :

- a. Salisilat, contoh ; asetosal, benorilat, dan diflusinal
- b. Asetat, contoh ; diklofenak, indometasin, alklofenak, sulindak dan fentiazak
- c. Propinoat, contoh ; ibuprofen, ketoprofen, flurbiprofen, naproksen, dan fenoprofen.
- d. Oksikam, contoh : piroksikam, tenoksikam, dan meloksikam
- e. Antranilat, contoh ; asam mefenamat dan nifluminat
- f. Pirazolon, contoh; fenilbutazon dan azapropazon
- g. Golongan lain, contoh: nabumeton, benzydamin krim 3%

Sejumlah *Non Steroidal Antiinflammatory Drugs* (NSAID' s) digunakan topikal dalam krim, salep dan gel, misalnya piroksikam 0,5%, diklofenak (dietil amonium) 1% dan benzydamin 5% (Tjay, 2002).

Mekanisme obat antiinflamasi nonsteroid pada umumnya menghambat biosintesa prostaglandin terutama pada perubahan asam arakidonat menjadi


PGG₂, kebanyakan obat- obat antiinflamasi nonsteroid juga mempunyai aktifitas analgetik, antipiretik dan hamper semua menyebabkan efek samping gangguan saluran cerna berupa tukak lambung (Ganiswara, 1995: 207).

F. Ketoprofen

Nama Kimia : Asam 2- (3- benzoilfenil)propinoat (22071)-5 (-4)

Rumus Molekul : C₁₆H₁₄O₃

Rumus Bangun :



Berat Molekul : 254,3

Pemeriaan : Serbuk Hablur, putih atau hampir putih, tidak atau hampir tidak berbau.

Kelarutan : Mudah larut dalam etanol, dalam kloroform, dan dalam eter, praktis tidak larut dalam air
(The United States Pharmacopoeia, 2003)

Ketoprofen adalah derivat asam propinoat yang menghambat *siklooksigenase* dan *lipooksigenase*. Obat ini cepat diserap, dan waktu paruh eliminasinya adalah 1- 3jam. Ketoprofen dimetabolisme secara lengkap di hati, terutam menjadi glukoronide, yang biasa mengalami penaktifan.

Efektifitas ketoprofen pada dosis 100- 300mg /hari ekuivalen dengan AINS lain dalam pengobatan artritis reumatoid, oestoartritis, pirai, dismenor, dan keadaan nyeri lainnya. Sekalipun berefek ganda pada prostaglandin dan leukotrien, ketoprofen tidaklah lebih baik dari AINS yang lain (Tjay, 2002).

Efek samping sama dengan AINS lain terutama menyebabkan gangguan saluran cerna, dan reaksi hipersensitifitas. Dosis 2 kali 100 mg sehari, tetapi sebaiknya ditemukan secara individual.

Penggunaan dalam terapi berupa sediaan oral tablet salut awal sehari 2 x 75 mg atau sehari 4 x 50 mg, maksimal ; 300mg sehari. Sedangkan injeksi intramuskular 50- 100 mg tiap 4 jam maksimal 200mg sehari dan tidak boleh > 3 hari. Ampul 50mg/ ml x 2 ml (ISO, 2008). Efek antiinflamasi dapat terlihat dengan dosis 1200- 2400mg sehari. (Katsung, 2002).

G. Tinjauan Islam Mengenai Penggunaan Tumbuhan Sebagai Obat

Pengobatan inflamasi merupakan respon protektif normal maupun peradangan yang ditimbulkan mesti adanya solusi penyembuhannya. Karena akan menimbulkan rasa yang tidak nyaman (sakit) jika berkelanjutan. Untuk itu diperlukan obat yang tepat untuk penanganan inflamasi ini.

Keanekaragaman tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan pengobatan, segala sesuatu yang diciptakan Allah

swt memiliki fungsi sehingga di hamparkan di bumi. Salah satu fungsinya adalah bahan pengobatan. Hanya saja untuk mengetahui fungsi dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut. Sebagaimana pada

QS.An-Nahl (16): 11

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

aynhamejreT:

Dia menumbuhkan tanaman-tanaman untukmu, seperti zaitun, korma, anggur dan buah-buahan lain selengkapny, sesungguhnya pada hal-hal yang demikian terdapat tanda-tanda Kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau memikirkan.

Berdasarkan ayat diatas diketahui bahwa Allah swt menciptakan aneka macam tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia. Salah satunya sebagai sampel yang dapat digunakan untuk bahan penelitian sehingga dapat diketahui manfaat dari tumbuhan sabagai bahan pengobatan

Adapun bahan dasar yang dianjurkan untuk obat-obatan yaitu bahan aktif yang disarikan dari tumbuhan obat di samping bahan kimiawi yang diproduksi manusia. Allah menghendaki penempatan zat-zat aktif itu pada sejumlah tumbuh-tumbuhan biasa yang mudah didapat, sehingga memungkinkan bagi tubuh berinteraksi dengannya secara perlahan dan alami. Tumbuhan dipandang sebagai pelindung paling selektif dari hal yang membahayakan. Setiap rerumputan atau tumbuhan pada dasarnya merupakan

apotek lengkap yang menyediakan zat- zat penting dengan banyak spesies yang telah diciptakan oleh Allah berdasarkan pada hikmah dan ketetapanNya. Dan bukankah ini membuka mata dan pikiran kita atas ciptaan Allah swt yang memiliki banyak manfaat dan tidak tercipta sia-sia. Sebagaimana firmanNya dalam Q.S. Ali-Imran (3) : 191 yang berbunyi :

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya :

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.”

Demikian arahan berfikir akan ciptaan Allah yang berguna bagi manusia, tumbuhan setidaknya memiliki fungsi sebagai obat yang dengan khasiat yang berbeda dan beraneka macam mulai dari akar, batang, daun, buah, biji dan bunga, secara keseluruhan terdapat dalam tanaman namun memiliki khasiat dan kandungan zat aktif yang berbeda- beda.

Dalam komentarnya tentang ayat ini, kitab *al-Muntakhab fi al-Tafsir* yang ditulis oleh sejumlah pakar mengemukakan bahwa : ayat tentang tumbuh- tumbuhan ini menerangkan proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase hingga sampai pada fase kematangan .Pada saat mencapai fase kematangan itu, suatu jenis buah mengandung komposisi zat gula, minyak, protein, berbagai zat karbohidrat, dan zat tepung.

Semua itu terbentuk atas bantuan cahaya matahari yang masuk melalui klorofil yang pada umumnya terdapat pada bagian pohon yang berwarna hijau terutama pada daun. Daun itu ibarat pabrik yang mengolah komposisi zat-zat tadi untuk didistribusikan kebagian-bagian pohon yang lain, termasuk biji dan buah (Shihab, 2002).

Hal ini juga mengajak kita berfikir bahwa penyakit akan sembuh dengan izin Allah SWT dalam firman Allah SWT dalam surah QS. Asy Syu'araa, (26): 80, yang berbunyi :

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Terjemahnya :

“ dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku “

Kutipan ayat diatas memberikan penegasan bahwa penyakit yang diderita akan sembuh dengan izin Alla SWT, namun prosesnya tidak langsung terjadi karena Allah sebab Allah tidak menyuruh hambanya utuk pasrah (sebelum berusaha)akan penyakit yang dideritanya. Dibutuhkan kerja keras atau ikhtiar dan ketekunan untuk mempelajari pengobatan terhadap penyakit yang ada dan mengembangkan hal baru dalam dunia pengobatan itu sendiri walaupun telah ditemukan obat- obatan dan penanganan terhadap penyakit itu sebelumnya. Hal ini semakin diperjelas dengan adanya hubungan sebab akibat dimana ada penyakit maka ada obatnya, tidak ada satu halpun yang memiliki kontradiksi. Namun takaran dalam mengkonsumsi obat harus diperhatikan. Sesungguhnya segala sesuatu selain Dia (ALLAH) mempunyai kontradiksi dan pencegahanya (Al- Jauziah 2007, 16).

Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخارى)

Artinya :

Dari Abu Hurairah Ra. Dari Nabi Saw. Bersabda: Allah tidak menurunkan penyakit, kecuali Dia juga yang menurunkan obatnya.”(HR. Bukhari, VII, 12).

Hadist ini mengandung penegasan dan perintah bagi yang sakit untuk berobat serta penjelasan bahwa pengobatan adalah sebab kesembuhan. Bahwa obat tidak lain hanyalah sebab yang diciptakan Allah SWT sebagai sarana untuk mendapatkan kesembuhan dan sebagai media ikhtiar demi mematuhi sunnatullah atau hukum alam yang berlaku.

Kebutuhan akan obat-obatan di era modern seperti sekarang ini sangat besar seiring dengan munculnya berbagai macam penyakit di kalangan masyarakat (Ali Al-Ju'aisin 2001, 59).

Setiap apa yang diciptakan oleh-Nya diperuntukkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Ini bukan berarti bahwa manusia boleh dengan seenaknya atau semaunya menggunakan apa yang telah diciptakan-Nya itu melainkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Pengobatan dengan mencari saripati tumbuh-umbuhan yang ada sebagai bentuk upaya pencarian fungsi dan pendayagunaan dari tumbuhan-tumbuhan yang diciptakan Allah swt. Hingga saat ini banyak pengobatan

herbal dan mencari tumbuh tumbuhan sebagai bahan utama pembuatan obat-obatan.

Disinilah Allah swt memperlihatkan kekuasaannya sebagai pencipta Alam dan seluruh isinya sehingga bagaimanapun kecerdasan manusia melakukan pengobatan dan rekayasa genetik belum mampu melewati ketentuan-ketentuan Sang Pencipta sebab Allah swt yang mengetahui manusia dan apa yang ada dilangit dan di bumi dengan sedetail-detailnya, sehingga dengan ayat ini sebagai seorang hamba yang mempelajari ilmu pengobatan agar senantiasa bersyukur dan tidak mengkufurinya serta mengharap ridho-Nya semoga apa yang telah di usahakan oleh manusia mampu menjadi obat yang dapat menyembuhkan manusia dengan izin dan kekuasaan Sang Pencipta sebab segala sesuatunya apa yang ada akan kembali kepada-Nya. Seperti dalam firman Allah dalam surah Q.S Al. Baqarah (2) : 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ مَعْدُوبِينَ

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Allah swt memerintahkan untuk memanfaatkan apa yang ada di bumi yang baik, dan tidak berefek negatif bagi kehidupan manusia. Dalam pemanfaatannya manusia jangan sampai mengikuti langkah syaitan yang sering memutar balik pemanfaatan apa yang diciptakan oleh Allah swt.

Setiap apa yang diciptakan oleh-Nya kemudian diperuntukkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Ini bukan berarti bahwa manusia boleh dengan seenaknya atau semaunya menggunakan apa yang telah diciptakan-Nya itu melainkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Selain itu, terdapat pula hadis yang diriwayatkan pula oleh Muslim dari Jabir ra. bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَئَ إِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

Artinya :

Dari Jabir dari Rasulullah Saw. bersabda: Setiap penyakit ada obatnya, maka apabila didapati obat yang cocok untuk menyembuhkan sesuatu penyakit itu akan hilang dengan seizin Allah ‘Azza wajallah. (H.R. Muslim)

Hadits-hadits nabi tentang pengobatan dipakai sebagai dasar pijakan untuk melakukan berbagai macam pengobatan penyakit dan pentingnya penemuan obat-obat yang belum ditemukan serta perintah untuk memikirkan tubuh manusia (dr. Sunardi, 2008).

Dalam pandangan Islam dijelaskan bahwa segala ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia termasuk tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam yang memerlukan penelitian.

Allah berfirman dalam QS. Thaha (16) : 53 :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ

Terjemahnya :

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan menjadikan bagimu di bumi itu jalan – jalan, dan yang menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis – jenis dari tumbuh – tumbuhan yang bermacam-macam.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa banyak jenis tumbuhan yang yang mampu tumbuh di bumi ini dengan adanya air hujan, banyak jenis tumbuh yang dikemukakan sebelumnya, ada tumbuhan yang tergolong kedalam tumbuha tingkat rendah yaitu tumbuhan yang tidak jelas bagian akar, batang dan daunnya. Golongan selanjutnya lebih mengalami perkembangan adalah tumbuhan tingkat tinggi yaitu tumbuhan yang bisa dibedakan secara jelas

bagian daun, batang dan akarnya. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah bagian daun, batang, akar, rimpang, buah dan bijinya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Luqman (21):10 :

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ
بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ
زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

Terjemahnya :

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di Permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala yang diciptakan di bumi ini termasuk tumbuh – tumbuhan ada manfaatnya, tugas manusia mencari dan meneliti manfaat dari tumbuhan tersebut. Dari ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun mineral. Dimana ketiganya telah dijelaskan didalam Al-Qur'an mengandung suatu zat/obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan manusia dari penyakit. Meskipun tidak semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah SWT di bumi dapat menyembuhkan penyakit tertentu (Savitri, 2008).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Alat dan bahan

1. Alat yang digunakan

Alat– alat yang digunakan adalah Platysmometer yang di modifikasi, cawan porselin, gelas ukur (Iwaki pyrex), gelas kimia, gelas Erlenmeyer (Iwaki pyrex), jarum oral, kanula, timbangan hewan (Precisa) dan timbangan analitik (Adam AFA-210 LC)

2. Bahan yang digunakan

Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, daun pacar air (*Impatiens balsamina.L*), air suling, aluminium foil, kapas, Tablet ketoprofen, Na CMC dan albumin putih telur.

B. Posedur Kerja

1. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel daun pacar air (*Impatiens balsamina. L*) diperoleh di Kecamatan Pattalassang, Desa Sunggumanai, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari sekitar jam 09.00 sampai 11:00 dengan cara mengambil atau mencabut lalu memilih daun pacar air (*Impatiens balsamina L*) yang sehat untuk dijadikan sampel.

2. Pengolahan sampel

Sampel daun pacar air (*Impatiens balsamina.L*) yang telah diambil dicuci bersih dengan air mengalir lalu ditiriskan. Daun pacar air

(*Impatiens balsamina*. L) yang sudah bersih di sortasi basah, selanjutnya dikeringkan dengan diangin-anginkan. Simplisia yang telah kering diblender menjadi serbuk dengan derajat kehalusan setara dengan derajat halus 4/ 18 lalu disimpan didalam wadah plastik tertutup.

C. Pembuatan Sampel Penelitian

1. Pembuatan Ekstrak Metanol

Sampel daun pacar air (*Impatiens balsamina*. L) ditimbang sebanyak 200 g dimasukkan kedalam wadah maserasi, kemudian ditambahkan metanol sebanyak 800 ml (tiga kali bobot sampel), direndam selama 1 x 24 jam disimpan pada tempat yang terlindung dari cahaya. Selanjutnya disaring dan dipisahkan ampas dan filtrat. Perlakuan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Filtrat yang diperoleh didiamkan kemudian diuapkan hingga diperoleh ekstrak metanol kental.

2. Pembuatan Suspensi Albumin 1%

Suspensi albumin 1% dibuat dengan melarutkan 1 ml albumin (putih telur) hingga volume akhir 100,0 ml air.

3. Pembuatan Larutan Koloidal Na CMC

Larutan koloidal Na CMC 1% dibuat dengan menimbang 1 gr Na CMC, dilarutkan dalam air hingga volume 100,0 ml.

4. Pembuatan Suspensi Ketoprofen

Suspensi ketoprofen dibuat dengan menimbang tablet Ketoprofen yang setara dengan 19,5 mg ketoprofen kemudian disuspensikan dalam 100 ml Na CMC 1% b/v.

5. Penyiapan Hewan Uji

Hewan uji yang digunakan adalah mencit jantan (*Mus musculus*) sebanyak 15 ekor. Merupakan mencit dewasa dan sehat dengan berat badan rata-rata 20-28 gr yang dibagi menjadi 5 kelompok dan tiap kelompok terdiri dari 3 ekor.

D. Perlakuan Hewan Uji

Mencit dipuasakan 8 jam sebelum pelaksanaan percobaan dimulai. Sebelum pengujian mencit ditimbang terlebih dahulu kemudian masing-masing diinduksi albumin 1% 0, 1 ml secara intraplantar lalu diukur volume awal kaki mencit. Diukur volume edema telapak kaki mencit 30 menit setelah penyuntikan albumin 1% 0, 1 ml dengan cara mencelupkan ke dalam alat pengukur volume bengkak yang dimodifikasikan. Kemudian sediaan diberikan peroral sesuai dengan kelompok perlakuan sebagai berikut :

- a. Kelompok I : Kontrol positif dengan perlakuan pemberian peroral ketoprofen dengan dosis 0, 195 mg/ 28 gr BB mencit.
- b. Kelompok II : Kontrol negatif dengan perlakuan pemberian peroral suspensi Na CMC 1 % dengan dosis 1 ml.
- c. Kelompok III : Diberi perlakuan ekstrak metanol pacar air peroral konsentrasi 2 % dengan dosis 1 ml.
- d. Kelompok IV : Diberi perlakuan ekstrak metanol pacar air peroral konsentrasi 4 % dengan dosis 1 ml.
- e. Kelompok V : Diberi perlakuan ekstrak metanol pacar air peroral konsentrasi 16 % dengan dosis 1 ml.

Diukur volume edema telapak kaki mencit setelah perlakuan setiap selang waktu 15 menit selama 45 menit. Volume edema ditentukan berdasarkan kenaikan volume air pada alat pengukur.

E. Analisis Hasil

Hasil pengujian efek antiinflamasi dibandingkan dengan kontrol negatif dan kontrol positif. Efek antiinflamasi sampel dihitung dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dan dilanjutkan dengan uji Duncan .



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Mencit (*Mus musculus*) yang diberikan perlakuan dengan pemberian sediaan uji ekstrak metanol daun pacar air (*Impatiens balsamina. L*) secara oral menunjukkan penurunan volume telapak kaki yang berbeda- beda dan dibandingkan dengan perlakuan kontrol negatif dan kontrol positif. Hasil pengukuran rata- rata penurunan volume telapak kaki mencit (*Mus musculus*) yang diberi perlakuan tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Penurunan Volume Telapak Kaki Mencit (*Mus musculus*) Yang Diberi Perlakuan Dengan Pemberian Secara Peroral Sediaan Uji Dibandingkan Dengan Sediaan Kontrol.

Perlakuan	Penurunan Udema rata- rata (ml)
Kontrol negatif (Na. CMC)	0
Ekstrak daun pacar air (<i>Impatiens balsamina.L</i>) 2%	0,1
Ekstrak daun pacar air (<i>Impatiens balsamina.L</i>) 4%	0,1
Ekstrak daun pacar air (<i>Impatiens balsamina.L</i>) 16%	0,12
Kontrol positif (Ketopropen 0,195 mg/ 28 gr BB)	0,13

B. Pembahasan

Udema adalah salah satu gejala adanya inflamasi (radang). Inflamasi adalah usaha tubuh untuk inaktivasi atau merusak organisme yang menyerang, menghilangkan zat iritan, dan mengatur derajat perbaikan jaringan. Jika penyembuhan lengkap, proses peradangan akan reda. Pada kasus ini reaksi

peradangan disebabkan oleh zat protein yang diinjeksi pada telapak kaki mencit (*Mus musculus*).

Bila membran sel mengalami kerusakan oleh suatu rangsangan kimiawi enzim fosfolipase diaktifkan untuk mengubah fosfolipida yang terdapat didalamnya menjadi asam arakidonat, asam lemak poli tak jenuh ini kemudian sebagian diubah oleh enzim siklooksigenase menjadi asam endoperoksida dan menjadi zat-zat prostaglandin .Bagian lain diubah oleh enzim lipoksigenase menjadi zat-zat leukotrien .Baik prostaglandin maupun leukotrien bertanggung jawab terhadap gejala peradangan .Siklooksigenase terdiri dari 2 iso-enzim, yakni siklooksigenase 1 (Cox-1) dan siklooksigenase 2 (Cox-2) dengan berat molekul dan daya enzimatis yang sama .Cox-1 dihasilkan sebagian besar jaringan dan dianggap melindungi mukosa lambung ,Cox-2 dihasilkan didalam otak dan ginjal dalam keadaan normal tidak terdapat dalam jaringan ,tetapi dibentuk selama proses peradangan oleh sel-sel radang dan kadarnya dalam sel meningkat sampai 80 kali .Menurut perkiraan penghambatan Cox-2-lah yang memberikan efek antiradang (Tan dan Rahardja, 2002: 295).

Ketoprofen adalah derivat asam propinoat yang menghambat sintesa prostaglandin dengan cara menghambat kerja enzim *siklooksigenase* (*cyclooxygenase*) Cox (Cox-2) dan *lipooksigenase* pada *jalur arachidonat* tidak melalui *jalur opiat*. Obat ini cepat diserap, dan waktu paruh eliminasinya adalah 1- 3 jam, pKa dari ketoprofen 5,9 dalam larutan metanol dan air 3:1. Ketoprofen dimetabolisme secara lengkap di hati, terutama menjadi

glukoronide, yang biasa mengalami penaktifan (AHFS Drug Information, 2002-2007: 2005)

Efektifitas ketoprofen pada dosis 100- 300mg /hari ekuivalen dengan AINS lain dalam pengobatan artritis reumatoid, oosteoartritis, pirai, dismenor, dan keadaan nyeri lainnya. Sekalipun berefek ganda pada prostaglandin dan leukotrien, ketoprofen tidaklah lebih baik dari AINS yang lain (Tjay, 2002).

Untuk pengujian antiradang pada penelitian ini dipilih metode yang menggunakan mencit sebagai hewan uji dan albumin sebagai zat kimiawi penyebab udem. Sebelum perlakuan mencit (*Mus musculus*) dipuasakan selama kurang lebih 8 jam, hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya pengaruh makanan terhadap kandungan bahan yang berkhasiat daun pacar air (*Impatiens balsamina* L), yang dapat mempengaruhi efek antiinflamasi yang ditimbulkan.

Berdasarkan hasil penelitian Adfa pada tahun 2007, metabolit sekundernya daun pacar air (*Impatiens balsamina*.L) mengandung kumarin, flavonoid, kuinon, saponin dan steroid. Dimana flavanoid merupakan salah satu golongan fenol alam yang tersebar luas pada tumbuhan hijau. Flavonoida berkhasiat sebagai antioksidan, antibakteri dan antiinflamasi (Harborne, 1987).

Berdasarkan hasil penelitian yang digunakan terlihat bahwa pemberian larutan koloidal Na- CMC tidak mempengaruhi penurunan edema. Sedangkan pada pemberian ekstrak metanol daun pacar air (*Impatiens balsamina*.L) 2%, 4%, dan 16% b/v. terjadi penurunan udem telapak kaki mencit (*Mus musculus*)

pada menit 15, 30, dan 45. Dari data ini dapat dilihat bahwa potensi ekstrak metanol daun pacar air (*Impatiens balsamina* L) untuk menurunkan edema telapak kaki mencit (*Mus musculus*) akan meningkat sesuai dengan peningkatan konsentrasi. Jadi pembandingan kontrol negatif memberikan hasil tidak signifikan atau berbeda nyata dengan kontrol positif, sedangkan dilihat pada tabel B C D E memberikan hasil sangat signifikan atau berbeda tidak nyata dengan kontrol positif.

Hasil analisa statistik dengan menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) menunjukkan bahwa pemberian beberapa konsentrasi ekstrak metanol daun pacar air (*Impatiens balsamina* L) memberikan efek antiinflamasi yang tidak berbeda ($F_{hitung} > F_{tabel}$) dengan efek antiinflamasi ketoprofen sehingga yang efektifitasnya dipengaruhi mulai dosis terkecil yaitu 2%.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak metanol daun pacar air (*Impatiens balsamina*. L) pada konsentrasi 2% memberikan efek antiinflamasi pada mencit.
2. Agama Islam membuktikan bahwa tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan yang diciptakan oleh ALLAH SWT terdapat kebaikan, salah satunya daun pacar air yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat antiinflamasi.

B. Saran


1. Perlu dilakukan penelitian mengenai efek antiinflamasi daun pacar air (*Impatiens balsamina* L) dengan menggunakan pelarut yang berbeda dan konsentrasi yang berbeda guna untuk dibandingkan hasil yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurán dan Terjemahan,2005.Departemen Agama RI, Bandung: CV.Penerbit J-ART,.
- Anonim. (2009). Pacar air (*Impatiens balsamina* L.) Online. [http // www. Asiamaya. Com](http://www.Asiamaya.Com).
- Arief, Hariana, 2005. *Tumbuhan Obat dan Khasiatnya*. Jakarta: Niaga Swadaya.
- Ar-Rumaikhon, Ali bin Sulaiman, 2008, *Fiqih Pengobatan Islam*. Kajian Komprehensif Seputar Berbagai Aspek Pengobatan Dalam Prespektif Islam, Penerjemah, Tim Al-Qowam; Editor, Amir Ghozali, Lc & Effendy Abu Ahmad, Al-Qowam, solo.
- Chattopadhyay, Ishita, Kaushik Biswas, Uday B, and Ranajit K. B. (2004). *Turmeric And Curcumin : Biological Actions And Medical Applications*. Current Science. Volume 87. India : Central Drug Research Institute. Page 44.
- Dalimartha S, 2007. *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia*, Jilid 3. Jakarta : Puspa Swara.
- Depkes RI. (1995). *Farmakope Indonesia*. Edisi IV. Jakarta : Departemen Kesehatan RI.
- Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. (1986). *Sediaan Galenik*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Hall, J. B., Gregory A. S., and Lawrence D. H. W. (2005). *Principles Of Critical Care*. Third Edition. New York : Mc Graw Hill. Page. 1617
- Harbone, J.B, (1987). *Metode Fitokimia Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*. Bandung : ITB 1987
- Juhaeni, F. W., Mariana Y., dan Rusmawan I. (1990). *Efek Antiinflamasi Jahe (Zingiber officinale. Rosc) Terhadap Radang Buatan Pada Tikus Putih*. Majalah Farmakologi dan Terapi Indonesia. Hal. 9- 13
- Katzung, B. G. (2001). *Farmakologi Dasar dan Klinik*. Buku I. Jakarta : Penerbit Salemba Medika. Hal 469, 526.
- Katzung, B. G. (2002). *Farmakologi Dasar dan Klinik*. Buku II. Edisi 8. Jakarta : penerbit salemba medika. Hal 499- 454, 462.

- Kohli, K., Ali J., Ansari M. J., and Raheman Z. (2005). *Curcumin : A Natural Antiinflammatory Agent, in Indian Journal Of Farmacology*. New Delhi : Jarnia Hamdard University. Pages. 141- 142
- Lulmann, H., Klaus M ., Albercht Z., and Detlef B. (2000). *Color Atlas of Pharmacology*. Second Edition. New York : Thieme. Pages. 116, 196-198.
- Mycek, Mary J., Harvey R.A., dan Champe P. C.(2001) *Farmakologi Ulasan Bergambar* ,Ed. 2. Jakarta: Widya Medika. Hal. 404
- Sylvia, P. A., dan Lorraine M. W. (1994). *Fisiologi Proses- proses Penyakit*. Penerjemah : Peter Anugrah. Edisi 4. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC. Hal. 37
- The United States Pharmacopoeia, The National Formulary. (2003). USP 26, NF 21. Volume I. Canada : U. S. Pharmacopoeial Convention Inc. Page. 595
- Tjay, T. H., dan Kirana Raharja. (2002). *Obat- obat Penting Khasiat, Penggunaan, dan Efek- Efek Sampingnya*. Edisi Kelima. Jakarta : Penerbit PT Elex Media Komputindo Gramedia. Hal. 29, 308.
- Tjitrosoepomo, Gembong. (1991). *Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)*. Cetakan Ketiga. UGM Press. Yogyakarta. Hal 443.
- Trihendradi, C. (2005). *Step By Step SPSS 13 Analisis Data Statistik*. Yogyakarta : Penerbit Andi. Hal. 155- 158
- WHO. (1999). *Monograph on Selected Medical Plants*. Volume 1. Genewa : WHO Library Cataloguing in Publication Data. Page 118
- Winarto, W. P. (2004). *Khasiat dan manfaat dari tanaman pacar air (Impatiens balsamina L.)*. Agromedia Pustaka. Jakarta.
- Widiyastuti Siswanto, 2004. *Penanganan Hasil Panen Tanaman Obat Komersial*. Jakarta: Penebar Swadaya.

LAMPIRAN 1. Skema Kerja



LAMPIRAN 2. Perhitungan

❖ Perhitungan Dosis Pemberian Ketoprofen

Dosis Lazim Manusia = 50 mg - 100 mg sekali

Dosis Mencit = 0,195 mg/28 gr BB mencit Setara dengan dosis
lazim manusia 53,46 mg



LAMPIRAN 3. Data Pengamatan

Tabel 3. Data Hasil Pengamatan Volume Udema Setelah Perlakuan

Sampel	Replikasi	Pra perlakuan (ml)	Setelah perlakuan (ml)			Penurunan udem (ml)
			15 menit	30 menit	45 menit	
Na. CMC	I	0,2	0,2	0,2	0,2	0
	II	0,2	0,2	0,2	0,2	0
	III	0,25	0,25	0,25	0,25	0
Rata- rata		0,21	0,21	0,21	0,21	0
Ekstrak metanol 2%	I	0,3	0,3	0,25	0,2	0,1
	II	0,2	0,2	0,15	0,1	0,1
	III	0,25	0,25	0,2	0,2	0,1
Rata- rata		0,25	0,25	0,18	0,16	0,1
Ekstrak metanol 4%	I	0,2	0,15	0,1	0,1	0,1
	II	0,2	0,15	0,1	0,1	0,1
	III	0,3	0,25	0,2	0,2	0,1
Rata- rata		0,23	0,18	0,13	0,13	0,1
Ekstrak metanol 16%	I	0,3	0,25	0,2	0,2	0,15
	II	0,2	0,15	0,1	0,1	0,1
	III	0,3	0,25	0,2	0,2	0,1
Rata- rata		0,26	0,21	0,16	0,16	0,12
Ketoprofen	I	0,3	0,2	0,2	0,15	0,15
	II	0,35	0,25	0,25	0,2	0,15
	III	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Rata- rata		0,28	0,18	0,18	0,15	0,13

LAMPIRAN 4. Analisis Statistik Perhitungan Penurunan Volume Udema Telapak Kaki Mencit Menggunakan Rancangan Acak Lengkap Dan Uji Duncan.

Tabel 4. Data Rata- rata Penurunan Volume Udem Telapak Kaki Mencit

Perlakuan	Ulangan			Jumlah	Rata- rata
	1	2	3		
Kontrol (-) Na. CMC	0	0	0	0	0
Ekstrak metanol 2%	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1
Ekstrak metanol 4%	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1
Ekstrak metanol 16%	0,15	0,1	0,1	0,35	0,12
Kontrol (+) Ketoprofen	0,15	0,15	0,1	0,4	0,13
Jumlah	0,5	0,45	0,4	1,35	0,45

Keterangan :

Kontrol (-) = Kontrol negatif Na. CMC

Kontrol (+) = Kontrol positif Ketoprofen (0,195%)

Ekstrak metanol 2%, 4%, 16% = konsentrasi ekstrak metanol daun pacar air (*Impatiens balsamina. L*)

Tabel 5. Analisis Sidik Ragam

Sumber Keragaman	DB	JK	KT	Fh	F tabel	
					5%	1%
Perlakuan	4	0,0326	0,008	23,52**	3,48	5,98
Galat	10	0,0034	0,00034			
Total	14	0,036				

Keterangan :

Karena $F_{hitung} = 23,52 > F_{tabel}$ pada taraf (α) 5% = 3,48 dan taraf (α) 1% = 5,98 maka hasil sangat signifikan artinya lebih dari satu antar perlakuan yang memiliki efek yang berbeda terhadap penurunan volume udema telapak kaki mencit.

- Koefisien keragaman (KK) dengan rumus :

$$KK = \sqrt{\frac{KT \text{ Galat}}{\gamma}} \times 100\%$$

$$KK = \left[\frac{\sqrt{0,00034}}{0,45} \right] \times 100\%$$

$$KK = 3,35 \%$$

A. Derajat Bebas

$$\begin{aligned} 1. \text{ DB Total} &= (t \times r) - 1 \\ &= (3 \times 5) - 1 \\ &= 14 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \text{ DB Perlakuan} &= t - 1 \\ &= 5 - 1 \\ &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \text{ DB Galat} &= \text{DB Total} - \text{DB Perlakuan} \\ &= 14 - 4 \\ &= 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \text{ Faktor Koreksi} \\ \text{FK} &= \frac{(\text{jumlah total})^2}{r \times t} = \frac{1,35^2}{3 \times 5} = 0,1215 \end{aligned}$$

B. Jumlah Kuadrat (JK)

1. Jumlah Kuadrat Total

$$\begin{aligned} \text{JKT} &= \sum (\text{data})^2 - \text{faktor koreksi} \\ &= \left\{ (0)^2 + (0,15)^2 + \dots + (0,1)^2 \right\} - 0,1215 \\ &= 0,1575 - 0,1215 \\ &= 0,036 \end{aligned}$$

2. Jumlah Kuadrat Perlakuan

$$\begin{aligned} \text{JKP} &= \sum \frac{(\text{data replikasi})^2}{\text{banyak replikasi}} - \text{FK} \\ &= \left\{ \frac{(0)^2 + (0,3)^2 + \dots + (0,4)^2}{3} \right\} - 0,1215 \\ &= \left\{ \frac{0,4625}{3} \right\} - 0,1215 \\ &= 0,1541 - 0,1215 \\ &= 0,0326 \end{aligned}$$

3. Jumlah Kuadrat Galat

$$\begin{aligned} JKG &= JK_{\text{Total}} - JK_{\text{Perlakuan}} \\ &= 0,036 - 0,0326 \\ &= 0,0034 \end{aligned}$$

C. Kuadrat Tengah

$$\begin{aligned} 1. \text{KT}_{\text{Perlakuan}} &= \frac{Jk_{\text{Perlakuan}}}{DB_{\text{perlakuan}}} \\ &= \frac{0,0326}{4} \\ &= 0,008 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \text{KT}_{\text{galat}} &= \frac{JK_{\text{galat}}}{DB_{\text{galat}}} \\ &= \frac{0,0034}{10} \\ &= 0,00034 \end{aligned}$$

D. Perhitungan Distribusi

$$\begin{aligned} F_{\text{hitung}} &= \frac{KT_{\text{perlakuan}}}{KT_{\text{galat}}} \\ &= \frac{0,008}{0,00034} \\ &= 23,52 \end{aligned}$$

Tabel 6. Hasil Uji BJND menurut RAL dalam bagan angka dan huruf

Perlakuan	Rata-rata (ml)	Selisih pada jarak P				BJND	
		2	3	4	5	5%	1%
A (K -)	0					A	A
B (2%)	0,1	0,1**				Ab	AB
C (4%)	0,1	0 ^{ns}	0,1**			B	BC
D (16%)	0,12	0,02 ^{ns}	0,02 ^{ns}	0,12**		C	CD
E (K +)	0,13	0,01 ^{ns}	0,02 ^{ns}	0,03 ^{ns}	0,13**	C	ED
P 0,05 (p,10)		3,15	3,30	3,37	3,43		
P 0,01 (p,10)		4,48	4,73	4,88	4,96		
BJND 0,05 (p,10)		0,0192	0,0201	0,0205	0,0209		
BJND 0,01 (p,10)		0,0273	0,0288	0,0297	0,0302		

Keterangan :

BD^{ns}
BC^{ns}
EB^{ns}
EC^{ns}
ED^{ns}

Angka – angka yang diikuti oleh huruf dan pada kolom yang sama berarti berbeda tidak nyata. Efek ekstrak metanol daun pacar air (*Impatiens balsamina*. L) 2%, 4% dan 16% dengan kontrol positif tidak berbeda nyata berarti ekstrak 2% - 16% memiliki efek antiinflamasi yang tidak berbeda nyata dengan ketoprofen.

 Signifikan
 Non Signifikan

- Untuk Mendapatkan Nilai BJND Dapat Digunakan Rumus Dibawah Ini :

$$\begin{aligned} Sy^- &= \frac{\sqrt{Kt\ galat}}{r} \\ &= \frac{\sqrt{0,00034}}{3} = 0,0061 \end{aligned}$$

$$BJND = P \times Sy^-$$

$$Sy^- = \text{Galat Baku Rerata Umum}$$

$$KT\ galat = \text{Kuadrat Tengah Galat}$$

$$r = \text{Jumlah Ulangan}$$

$$P_{0,05} \text{ dan } P_{0,01} = \text{Nilai Baku Signifikan Studentized Rangers}$$


$$BJND = \text{Beda Jarak Nyata Duncan}$$

Gambar Penelitian



Gambar 1. Tanaman Pacar Air (*Impatiens balsamina* L.)


Daun (a), Bunga (b), Batang (c)



Gambar 2. Daun Pacar air (*Impatiens balsamina*. L)



Gambar 3. Perlakuan Intraplantar



Gambar 4 Platysmometer yang di modifikasi