

**STUDI TENTANG STATUS KESEHATAN SOPIR TERKAIT PAPARAN
TIMBAL DI UDARA PADA JALUR UTAMA ANGKUTAN UMUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**



OLEH :

GLADIS SANTI DEWI

70200108035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASRAKAT FAKULTAS ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**

MAKASSAR

2012

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Desember 2012
Penyusun

Gladis Santi Dewi
70200108035

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ *Studi Tentang Status Kesehatan Sopir Terkait Paparan Timbal Di Udara Pada Jalur Utama Angkutan Umum UIN Alauddin Makassar*” yang disusun oleh **Gladis Santi Dewi** NIM : **70200108035** mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 20 Desember 2012** dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

DEWAN PENGUJI

- Ketua** : **DR. H. Rasjidin Abdullah, MPH., MH. Kes**(.....)
- Sekretaris** : **Drs. Wahyuddin G., M. Ag** (.....)
- Pembimbing I**: **Nurdianah, S. SKM, M. PH.** (.....)
- Pembimbing II**: **Andi Susilawaty, S.Si., M. kes.** (.....)
- Penguji I** : **M. Fadil Hayat, SKM., M. Kes.** (.....)
- Penguji II** : **Dr. Hasaruddin, M. Ag.** (.....)

Samata Gowa, 17 Januari 2013

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH., MH. Kes.
NIP. 19530119 198110 1 001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Studi Tentang Status Kesehatan Sopir Terkait Paparan Timbal di Udara Pada Jalur Utama Angkutan Umum UIN Alauddin Makassar”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi S1 Jurusan Kesehatan Masyarakat, peminatan Kesehatan Lingkungan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Berbagai hambatan dan kesulitan penulis hadapi selama penyusunan skripsi ini, mulai dari persiapan sampai penyelesaian penulisan namun dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak, serta tidak lepas dari pertolongan Yang Maha Rahman dan Rahim. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati secara khusus, penulis menghanturkan penghargaan dan rasa terima kasih yang luar biasa kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda **M. Bactiar** dan Ibunda **Ratna Nengsi** atas jasa, pengorbanan, dukungan baik moril dan materiel serta doa yang tiada hentinya sampai berhasil menyelesaikan studi di jenjang Universitas, juga untuk adik-adikku, **Desi Bactiar**, **Indah Bactiar**, **M. Irfan** dan **M. Ikbal** yang telah memberikan warna dalam kehidupanku.

Tidak lupa pula, penulis menghanturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT. MS.**, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.


2. Bapak **Dr. dr. H. Rasyidin Abdullah, MPH., MH. Kes.**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Para Pembantu Dekan, Staf Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah banyak memberikan bantuan selama menempuh perkuliahan.
4. Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat, Ibu **Andi Susilawati, S.Si, M.Kes.**, yang telah banyak memberikan bantuan selama penyelesaian skripsi.
5. Ibu **Nurdiana SKM, MPH.**, selaku pembimbing I dan dosen perkuliahan yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan dalam penyusunan skripsi serta memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
6. Ibu **Andi Susilawati, S.Si, M.Kes.**, selaku pembimbing II dan dosen perkuliahan yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan dalam penyusunan skripsi serta memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
7. Bapak **M. Fadli Hayat, SKM, Mkes.** selaku penguji I yang telah banyak memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi hingga selesai.
8. Bapak **Dr. Hasaruddin, M.Ag.** selaku penguji II yang telah banyak memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi hingga selesai.
9. **Triana, Yuyun Subair, dan Aspar Ahmad** yang telah menjadi sahabat serta saudara yang selalu memberikan semangat, motivasi dan bantuannya selama awal perkuliahan hingga terselesainya skripsi ini.

10. Seluruh keluarga besarku yang tidak dapat dituliskan namanya satu persatu atas dukungan dan doa demi kelancaran penyelesaian perkuliahanku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik selalu penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Semoga amal baik dari semua pihak mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt dan semoga skripsi dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Makassar, Desember 2012

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Pencemaran Udara	7
B. Pencemaran Udara Dalam Pandangan Islam	15
C. Tinjauan Umum Tentang Logam Berat.....	17
D. Pengaruh Timbal (Pb) Terhadap Kesehatan	23
E. Tinjauann umum tentang umur	28
F. Tinjauan Umum Tentang Kebiasaan Merokok.....	29
G. Tinjauan umum tentang masa kerja.....	29
H. Tinjauan Umum Tentang Lama Paparan.....	31
I. Tinjauan Umum Tentang Status Kesehatan.....	33
J. Tinjauan Umum tentang Kadar Hemoglobin.....	34

BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti.....	38
B. Pola Pikir Variabel yang Diteliti	39
C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif	40

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Populasi dan Sampel.....	42
D. Tehnik Pengambilan Responden.....	43
E. Prosedur Kerja.....	43
F. Cara Pengumpulan Data	45
G. Pengolahan dan Penyajian Data	45
H. Analisis Data	46

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan.....	56

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA.....	72
---------------------	----

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Standar Kadar Hemoglobin	35
5.1 Karakteristik responden berdasarkan kelompok umur	47
5.2 Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan sebelum menjadi supir	48
5.3 Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan lain	49
5.4 Kadar Pb di Udara	49
5.6 Karakteristik responden berdasarkan lama terpapar	50
5.7 Karakteristik responden berdasarkan masa kerja	51
5.8 Karakteristik responden berdasarkan kebiasaan Merokok	51
5.9 Karakteristik responden berdasarkan keluhan kesehatan	52
5.10 Karakteristik responden berdasarkan Kadar Hb	53
5.11 Kadar Hb menurut umur	54
5.12 Kadar Hb menurut lama terpapar	54
5.13 Kadar Hb menurut masa kerja	55
5.14 Kadar Hb menurut Kebiasaan Merokok	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2. 1	Faktor Yang Mempengaruhi Status Kesehatan	33
3. 1	Pola Pikir pemikira Variabel yang Diteliti	39



ABSTRAK

Nama : Gladis Santi Dewi
NIM : 70200108035
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Judul : Studi Tentang Status Kesehatan Supir Terkait Paparan
Timbal di Udara Pada Jalur Utama Angkutan Umum
UIN Alauddin Makassar

Timbal merupakan logam yang amat beracun pada dasarnya tidak dapat dimusnakan serta tidak terurai menjadi zat lain. Sumber timbal terdapat pada gas buangan kendaraan bermotor yang dapat mencemari udara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar timbal di udara dan status kesehatan supir angkutan umum kampus UIN Alauddin Makassar. Jenis penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan deskriptif, wawancara dan uji laboratorium. Sampel dalam penelitian ini adalah udara terpilih pada jalur angkutan umum UIN Alauddin Makassar, sedangkan responden dalam penelitian ini adalah semua supir angkutan umum UIN Alauddin Makassar berjumlah 42 orang dengan metode *purposive sampling* hingga didapatkan responden berjumlah 20 orang.

Hasil penelitian menunjukkan kadar timbal pada jalan Sultan Alauddin Makassar yaitu $0,97 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, pertigaan Tamalate yaitu $0,75 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, perempatan Hertasning dan Toddopuli $0,71 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ serta perempatan Hertasning Baru, dan Samata yaitu $1,88 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ semua titik pengukuran memenuhi syarat baku mutu $2 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Kadar Hb, dari 20 responden diperoleh sebanyak 7 (35%) responden yang memiliki kadar Hb yang normal, sedangkan responden yang memiliki kadar Hb tidak normal adalah 13 (65%) responden. Kadar Hb menurut umur, dari 20 responden diperoleh kelompok umur 40-49 tahun sebanyak 5 responden (83%), dan kelompok umur 50-59 sebanyak 4 responden (100,0%) merupakan persentase tertinggi yang kadar Hb tidak normal. Kadar Hb menurut lama terpapar, dari 20 responden kelompok yang lama terpapar selama >8 Jam memiliki kadar Hb tidak normal tertinggi persentasenya sebanyak 12 responden (70,6). Kadar Hb menurut masa kerja, dari 20 responden diperoleh kelompok masa kerja 16-20 tahun memiliki kadar Hb yang tidak normal tertinggi yaitu sebanyak 4 responden (80%). Kadar Hb menurut kebiasaan merokok dari 20 responden diperoleh kelompok suka merokok memiliki kadar Hb yang tidak normal tertinggi yaitu sebanyak 13 orang (68,4%).

Diharapkan pada sopir angkutan umum Universitas Islam Negeri Makassar menggunakan masker pada saat bekerja agar mengurangi dampak dari efek timbal.

Kata Kunci : Kadar timbal di udara, kadar Hb, umur, lama paparan, masa kerja, status merokok
Daftar pustaka : 42 (1982-2012)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sarana penting penunjang keberhasilan pembangunan suatu negara adalah adanya ketersediaan sarana transportasi untuk menjangkau berbagai tempat atau wilayah. Ketersediaan transportasi sangat membantu kelancaran aktifitas perekonomian masyarakat. Ini berarti bahwa ketersediaan sarana transportasi akan menjamin kelancaran perputaran roda ekonomi pembangunan. Salah satu alat transportasi yang paling banyak adalah jenis kendaraan umum (angkot) dan kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan umum dan kendaraan bermotor setiap tahunnya semakin meningkat. Hal ini dapat kita lihat dan rasakan semakin banyaknya kendaraan umum dan kendaraan bermotor beroperasi di jalan raya terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan tak terkecuali Makassar yang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia.

Udara merupakan faktor yang penting dalam kehidupan, namun dengan meningkatnya pembangunan fisik kota dan berdirinya pusat-pusat industri disertai dengan melonjaknya kendaraan bermotor, mengakibatkan peningkatan kepadatan lalu lintas dari hasil produksi sampingan, yang merupakan salah satu sumber pencemaran udara (Soedomo, 1987).

Menurut Pemantauan Pusat Lingkungan Hidup Regional III Makassar, terhadap udara ambien kota Makassar untuk parameter timbal di tujuh titik lokasi pemantauan (Lapangan Karebosi, Depan Stadion Mattoangin,

Pemukiman Panakkukang, Jl. Urip Sumoharjo KM. 4, Pasar Pannampu, KIMA dan Depan PT. Berdikari), maka diperoleh data bahwa lokasi yang tertinggi adalah Pasar Pannampu dengan kadar timbal udara ambien 2,20 ug/m³, kemudian Jl. Urip Sumoharjo KM. 4 sebesar 2,15 ug/m³. Parameter ini pada dua lokasi tersebut telah melampaui baku mutu, yaitu 2,0 ug/m³, sesuai PP No. 41 tahun 1999. Partikel-partikel timbal yang keluar bersama-sama dengan emisi gas buang lainnya akan tetap berada di udara sebelum akhirnya mengendap. Partikel halus timbal dapat langsung dihirup ke bagian paling dalam paru-paru dan diserap ke dalam darah dengan efisiensi hampir 100% . (Baits, 2009).

Timbal kini dianggap sebagai ancaman serius karena diketahui menebarkan racun di udara, dan menyusup ke paru-paru, beredar dalam darah warga kota dan menyebabkan efek buruk jangka panjang. Logam pencemar dari kendaraan dengan bahan bakar bensin bertimbal itu bisa terakumulasi dalam tubuh, menyerang organ-organ penting, bahkan merusak kualitas keturunan. Keracunan timbal yang berasal dari udara bebas terdapat pada penduduk yang mendapat paparan dalam jumlah besar dan waktu lama. Efek paparan ini terhadap kesehatan dapat terjadi akut maupun kronik (Palar, 2004).

Timbal yang terhirup dan masuk sistem pernapasan akan ikut beredar ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Lebih dari 90% logam timbal yang diserap oleh darah berikatan dengan sel darah merah dan mengakibatkan gangguan pada proses hemoglobin. Di pihak lain kadar hemoglobin juga

dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu umur, jenis kelamin, kehamilan, menstruasi, asupan makanan, kebiasaan minum alkohol, penyakit infeksi dan sebab-sebab lainnya. Timbal dalam akan menyebabkan toksik dan bersifat akumulatif. Meskipun jumlah timbal yang diserap tubuh sangat sedikit namun dampaknya sangat berbahaya (Suciani, 2007).

Timbal yang terhirup dan masuk ke dalam sistem pernapasan akan ikut beredar ke seluruh jaringan, terakumulasi dalam tubuh dan sisanya akan dikeluarkan dalam urin yaitu sebanyak 75-80%, melalui feces 15% dan lainnya melalui empedu, keringat, rambut, dan kuku. Pada umumnya ekskresi timbal berjalan sangat lambat. Timbal di dalam darah memerlukan waktu kurang lebih 25 hari, pada jaringan lunak (sumsum tulang, sistem saraf, ginjal dan hati) 40 hari sedangkan pada tulang 25 tahun. Ekskresi yang lambat ini menyebabkan timbal mudah terakumulasi dalam tubuh (Palar, 2004).

Setiap peningkatan konsentrasi timbal (Pb) di udara sebesar $1 \mu\text{g}/\text{m}^2$ menyebabkan hipertensi pada 70 ribu dari 1 juta pria berusia 20-70 tahun. Di Boston terhadap anak-anak umur >10 tahun, setiap peningkatan $10 \mu\text{g}/\text{dL}$ dapat menurunkan 5,8 poin tingkat kecerdasan. Di Australia anak-anak yang belajar pada 4 tahun pertama, peningkatan kadar timbal di udara ambient mempengaruhi uji mental, menurunkan kemampuan membaca, berbicara dan tingkat kecerdasan. Selain itu wanita hamil yang telah terpajan timbal akan mengenai anak yang disusui yaitu melalui jalur akumulasi timbal di tulang ke plasenta yang kemudian ke air susu ibu (ASI) (Nukman, 2000).

Saat ini penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di negara kita masih didominasi oleh bensin bertimbal sehingga semakin besar konsumsi energy BBM dari bensin bertimbal maka semakin besar pula pencemaran timbal di udara. Hal ini sebabkan 10% timbal yang ada dalam bahan bakar bensin diemisikan dalam udara bersama-sama gas buangan lainnya yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor.

Semua model transportasi darat yang mengitari kota Makassar tentunya membutuhkan tempat berhenti atau parkir, dan bagi angkutan umum tempat persinggahan untuk menurunkan penumpang yang berpeluang menjadi tempat berudara tercemar oleh timbal, timbal dalam udara merupakan neurotoksin yang bersifat akumulatif. Biasanya berkonsentrasi di jalan-jalan raya (Baidts, 2009).

Salah satu alat angkutan umum yang digunakan oleh mahasiswa Universitas Negeri Islam (UIN) untuk alat transportasi adalah angkutan umum kampus Universitas Negeri Islam (UIN) dimana alat transportasi tersebut meliwati jalan yang udaranya kemungkinan tercemar oleh timbal akibat gas buangan kendaraan bermotor atau roda empat yang dapat mencemari udara dan mempengaruhi kesehatan penumpang maupun sopir angkutan umum. Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian “Studi Tentang Status Kesehatan Sopir Terkait Paparan Timbal Di Udara Pada Jalur Utama Angkutan Umum UIN Alauddin Makassar”

B. Rumusan Masalah

Masalah yang ingin diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa besar kadar timbal (Pb) di udara?
2. Bagaimana status kesehatan Sopir Angkutan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui kadar kadar (Pb) di udara dan status kesehatan Sopir Angkutan Umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mendapatkan gambaran kadar timbal dalam udara pada beberapa titik di jalan utama kendaraan umum UIN Negeri Alauddin Makassar.
- b. Untuk mengetahui status kesehatan supir angkutan umum UIN Alauddin Makassar berdasarkan umur.
- c. Untuk mengetahui status kesehatan supir angkutan umum UIN Alauddin Makassar berdasarkan masa kerja.
- d. Untuk mengetahui status kesehatan supir angkutan umum UIN Alauddin Makassar berdasarkan lama paparan.
- e. Untuk mengetahui status kesehatan supir angkutan umum UIN Alauddin Makassar berdasarkan kebiasaan merokok.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan mampu memperkaya ilmu pengetahuan mengenai pencemaran udara.

2. Manfaat Bagi Institusi

a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat dan pemerintah.

b. Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan merupakan salah satu bahan acuan dan perbandingan untuk peneliti selanjutnya.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman yang berharga dan dapat wawasan keilmuan bagi peneliti selama kuliah di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pencemaran Udara

1. Pengertian Pencemaran Udara

Pencemaran udara telah didefinisikan oleh beberapa ahli lingkungan hidup. Pengertian pencemaran udara seperti yang dikemukakan oleh Wardhana, 2001 diartikan adanya bahan-bahan atau zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya.

Menurut Henry C. Perkins (1974), dalam buku *Air Pollution*, pencemaran udara dinyatakan sebagai berikut : pencemaran udara berarti hadirnya satu atau beberapa kontaminan di dalam udara atmosfer diluar, seperti antara lain oleh debu, busa, kabut, bau-bauan, asap atau uap dalam kualitas yang banyak dengan berbagai sifat maupun lama berlangsungnya diudara tersebut, hingga dapat menimbulkan gangguan-gangguan terhadap kehidupan manusia, tumbuh-tumbuhan atau hewan maupun benda, atau tanpa alasan dapat mempengaruhi kelestarian kehidupan organisme maupun benda.

Menurut peraturan pemerintah No. 41 tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang dimaksudkan dengan pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain kedalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Menurut Slamet Ryadi (1982), memberikan defenisi pencemaran udara sebagai berikut:

Pencemaran udara adalah keadaan dimana kedalam atmosfer oleh suatu sumber melalui aktivitas manusia maupun secara alamiah dibebaskan satu atau beberapa bahan atau zat-zat dalam kualitas maupun batas waktu tertentu secara karakteristik dapat atau memiliki kecenderungan untuk menimbulkan ketimpangan susunan udara atmosfer secara ekologis sehingga mampu menimbulkan gangguan-gangguan bagi kehidupan satu maupun kelompok organisme maupun benda-benda. (Ryadi, 1982).

Menurut keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. 02/MEN/KLH/1998, yang dimaksud pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain kedalam udara dan atau berubahnya tatanan (komposisi) udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (Suciani, 2007).

Udara merupakan campuran beberapa macam gas yang perbandingannya tidak tepat, tergantung pada keadaan suhu udara dan lingkungan sekitarnya. Polusi udara merupakan gabungan antara asap kotor dan bau tidak sedap dan banyak diantaranya merupakan sumbangan dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Emisi merupakan pencemaran atau pelepasangas yang berasal dari pembakaran pada kendaraan bermotor

yang menggunakan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi (bensin dan solar (wardhana, 1995).

Peraturan pemerintah RI No. 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara disebutkan bahwa pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat energi atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

Pencemaran udara ialah jika udara di atmosfer dicampuri dengan zat atau radiasi yang berpengaruh jelek terhadap organisme hidup. Jumlah pengotoran ini cukup banyak sehingga tidak dapat diabsorpsi atau dihilangkan (Sastrawijaya, 2000).

Pencemaran udara adalah bertambahnya bahan atau substrat fisik atau kimia ke dalam lingkungan udara normal yang mencapai sejumlah tertentu, sehingga dapat dideteksi oleh manusia (atau yang dapat dihitung dan diukur) serta dapat memberikan efek pada manusia, binatang, vegetasi dan material (Mukono, 2003).

Pencemaran udara adalah terdapatnya bahan polutan di atmosfer yang dalam konsentrasi tertentu akan mengganggu keseimbangan dinamik atmosfer dan mempunyai efek pada manusia dan lingkungannya (Dewi, 2009)

Udara merupakan campuran beberapa macam gas yang perbandingannya tidak tepat, tergantung pada keadaan suhu udara dan lingkungan sekitarnya. Polusi udara merupakan gabungan antara asap

kotor dan bau yang tidak sedap dan banyak diantaranya merupakan sumbangan dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Emisi merupakan pemancaran atau pelepasan gas yang berasal dari pembakaran pada kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi (bensin dan solar) (Wardhana, 2004)

Udara yang bersih yang kita hirup merupakan gas yang tidak tampak, tidak berbau, tidak berwarna maupun berasa. Akan tetapi udara yang benar-benar bersih sudah sulit diperoleh terutama di kota-kota besar yang banyak industrinya dan padat lalulintasnya. Berdasarkan *KEP-2/MENKLH/I/1988* menetapkan bahwa baku mutu kualitas udara sebagai berikut :

2. Klasifikasi Bahan Pencemar Udara

a. Polutan Primer

Polutan primer adalah polutan yang dikeluarkan langsung ke udara sebagai hasil dari suatu proses. Jenis polutan ini berada di udara dalam bentuk yang tetap sama dengan bentuk pada saat dikeluarkan.

Polutan primer berupa polutan gas yang terdiri dari senyawa karbon, sulfur, nitrogen dan senyawa halogen seperti flour, klorin, hidrogen khlorida dan bromin.

b. Polutan Sekunder

Polutan sekunder adalah polutan yang terbentuk dari hasil interaksi kimia antara polutan dan unsur udara normal di atmosfer.

Menurut Prabu (2008) sumber bahan pencemar primer dapat dibagi lagi menjadi dua golongan besar:

a. Sumber alamiah

Beberapa kegiatan alam yang bisa menyebabkan pencemaran udara adalah kegiatan gunung berapi, kebakaran hutan, kegiatan mikroorganisme dan lain-lain. Bahan pencemar yang dihasilkan umumnya adalah asap, gas-gas dan debu.

b. Sumber buatan manusia

Kegiatan manusia yang menghasilkan bahan-bahan pencemar bermacam-macam antara lain kegiatan-kegiatan berikut:

- 1) Pembakaran, pembakaran sampah, pembakaran pada kegiatan rumah tangga, industri, kendaraan bermotor dan lain-lain. Bahan-bahan pencemar yang dihasilkan antara lain asap, debu, grit (pasir halus), dan gas (CO dan NO).
- 2) Proses peleburan, seperti proses peleburan baja, pembuatan soda, semen, keramik, aspal. Sedangkan bahan pencemar yang dihasilkan antara lain adalah debu, uap dan gas-gas.
- 3) Pertambangan dan penggalian, seperti tambang mineral dan logam. Bahan pencemar yang dihasilkan terutama adalah debu.
- 4) Proses pengolahan dan pemanasan seperti pada proses pengolahan makanan, daging, ikan, dan penyamakan. Bahan pencemar yang dihasilkan terutama asap, debu, dan bau.

- 5) Pembuangan limbah, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga. Pencemarannya terutama adalah dari instalasi pengolahan air buangnya. Sedangkan bahan pencemarnya adalah gas H_2S yang menimbulkan bau busuk.
- 6) Proses kimia, seperti pada proses fertilisasi, proses pemurnian minyak bumi, proses pengolahan mineral. Pembuatan keris dan lain-lain. Bahan-bahan pencemar yang dihasilkan antara lain adalah debu, uap dan gas-gas.
- 7) Proses pembangunan seperti pembangunan gedung-gedung, jalan dan kegiatan yang semacamnya. Bahan pencemarnya yang terutama adalah asap dan debu.
- 8) Proses percobaan atom atau nuklir. Bahan pencemarnya yang terutama adalah gas-gas dan debu radioaktif.

Jenis bahan pencemar udara menurut Prabu (2008) yang sering ditemukan di kota-kota berupa

- a. Partikel (debu, aerosol, timbale (Pb)).
 - b. Gas (CO , SO_x , NO_x , H_2S).
 - c. Energi (suhu dan kebisingan).
3. Proses Terjadinya Pencemaran Udara

Menurut Sastrawijaya, 2000 proses terjadinya pencemaran udara dapat dibagi dalam tiga proses yaitu:

a. *Atrition* (gesekan)

Terjadi pada setiap aspek kehidupan mulai dari yang sederhana seperti gesekan sepatu dan lantai, gesekan ban mobil dan jalan raya, sampai ke proses yang lebih kompleks seperti penyebaran partikel-partikel ke udara melalui proses sanding (pemecahan) batuan, grinding (pemotongan), drilling (pengeboran) dan spraying (penyemprotan).

b. *Vaporazation* (penguapan)

Adalah suatu bentuk perubahan fase cairan menjadi gas. Perubahan bentuk tersebut dapat disebabkan oleh pengaruh tekanan dan pemanasan.

c. *Combustion* (pembakaran)

Pencemaran udara dapat bersumber dari pembakaran. Pembakaran bensin dalam kendaraan bermotor merupakan separuh penyebab polusi udara. Pembakaran tersebut dapat berlangsung sempurna maupun yang tidak sempurna yang dapat menimbulkan terjadinya pencemaran.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Pencemaran Udara

Banyak faktor yang mempengaruhi pencemaran udara di atmosfer misalnya:

a) Kelembaban

Kelembaban udara relative yang rendah (lebih kecil dari 60%) di daerah tercemar SO₂ akan mengurangi efek korosif dari bahan

kimia tersebut. Pada kelembaban relative lebih atau sama dengan 80% di daerah tercemar SO₂ akan terjadi peningkatan efek korosif SO₂ tersebut.

b) Suhu

Suhu yang menurun pada permukaan bumi dapat menyebabkan peningkatan kelembaban udara relative sehingga akan meningkatkan efek korosif bahan pencemar di daerah yang udaranya tercemar. Pada suhu yang meningkat akan meningkat pula kecepatan reaksi suatu bahan kimia.

c) Sinar Matahari

Sinar matahari dapat mempengaruhi bahan oksidan terutama O₃ di atmosfer. Keadaan tersebut dapat menyebabkan kerusakan bahan atau alat bangunan yang terbuat dari karet. Jadi dapat dikatakan bahwa sinar matahari dapat meningkatkan rangsangan untuk merusak bahan.

d) Pergerakan Udara

Pergerakan udara yang cepat meningkatkan abrasi bahan bangunan (Uphan dan Yocon, Davis dan cornwell, sumber : Mukuno, 2003).

e) Kecepatan Angin

Kecepatan angin rata-rata di daerah industri sekitar 5 knot dan kecepatan maksimum sekitar 15 knot. Pergerakan udara dengan kecepatan tinggi di daerah tercemar, akan meningkatkan daya rusak secara abrasi.

f) Arah angin

Pada arah angin dominan, titik pemantauan kualitas udara ambien minimum ditetapkan 2 titik dengan mengutamakan pada daerah pemukiman atau tempat-tempat sensitif.

B. Pencemaran Udara Dalam Pandangan Islam

Melalui kitab suci Al quran, Allah telah memberikan informasi spritual kepada manusia bersikap ramah terhadap lingkungan. Informasi tersebut memberikan sinyal bahwa manusia harus selalu menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak menjadi rusak, tercemar bahkan menjadi punah, sebab apa yang Allah berikan kepada manusia semata-mata merupakan suatu amanah.

Melalui kitab suci Al quran, membuktikan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kepada ummatnya untuk bersikap ramah lingkungan. Firman Allah swt di dalam Al quran sangat jelas berbicara tentang hal tersebut. Sikap ramah lingkungan yang diajarkan oleh agama Islam kepada manusia dapat dirinci sebagai berikut :

1. Agar manusia menjadi pelaku aktif dalam mengolah lingkungan serta melestarikannya.
2. Agar manusia tidak berbuat kerusakan terhadap lingkungan, dalam surat ar-Ruum ayat 41 Allah swt memperingatkan bahwa terjadinya kerusakan di darat dan laut akibat ulah manusia:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya: *Telah tampak kerusakan di darat dan laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).*

Firman Allah swt dalam surat ar-Ruum ayat 41 menekankan agar manusia berlaku ramah terhadap lingkungan (*environmental friendly*) dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Mempersekutukan Allah dan mengabaikan tuntunan-tuntunan agama berdampak buruk terhadap diri mereka, masyarakat, dan lingkungan. Ini dijelaskan oleh ayat diatas dengan menyatakan : telah tampak kerusakan didarat seperti kekeringan, kehilangan rasa tidak aman dan dilaut seperti ketertenggelaman, kekurangan hasil laut dan disungai, disebabkan tangan manusia durhaka sehingga Allah mencicipkan yakni merasakan sedikit kepada mereka akibat perbuatan dosa dan pelanggaran mereka agar mereka kembali kejalan yang benar (Shihab, 2002).

3. Agar manusia selalu membiasakan diri bersikap ramah terhadap lingkungan. Dalam surat Huud ayat 117 Allah swt berfirman :

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا
مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾

Terjemahnya: *Dan Tuhanmu tidak sekali-kali akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.*

Siksa Allah tidak akan jatuh terhadap mereka selama mereka masih melakukan perbaikan dalam kehidupan bermasyarakat mereka dan Allah tidak menzalimi diri mereka tapi mereka sendiri yang menzalimi dirinya. Dimana perbaikan yang mereka lakukan, bila merupakan hasil kepatuhan terhadap sistem yang ditetapkan Allah swt. Ketika itu terjadi keseimbangan antara gerak manusia dan gerak alam, dan tidak terjadi pembenturan antara berbagai gerak, yang terjadi justru sebaliknya yakni, gerak-gerak tersebut saling mendukung dan menguatkan sehingga lahir masyarakat yang didambakan. Dan bila perbaikan itu dilakukan oleh mereka yang petuh kepada Allah dan sistem yang ditetapkan-Nya, tetapi mereka menemukan suatu cara kerja yang menyenangkan dan sesuai bagi mereka, ketika itu pun Allah tidak menjatuhkan siksa-Nya karena Allah swt tidak menghalangi akal manusia melakukan cara menyenangkan kehidupan mereka (Shihab, 2002).

C. Tinjauan Umum Tentang Logam Berat

Logam berat masih termasuk golongan logam dengan kriteria - kriteria yang sama dengan logam-logam yang lain. Perbedaan terletak pada dari pengaruh yang dihasilkan bila logam berat ini masuk atau diberikan ke dalam tubuh organisme hidup (Palar, 2008).

Istilah logam berat sebetulnya sudah dipergunakan secara luas, terutama dalam perpustakaan ilmiah, sebagai unsur yang menggambarkan bentuk dari logam tertentu. Karakteristik dari kelompok logam berat adalah sebagai berikut:

1. Memiliki spesifikasi gravitasi yang sangat besar (lebih dari 4).
2. Mempunyai nomor atom 22-23 dan 40-50 serta unsur lantanida dan aktinida.
3. Mempunyai respon biokimia yang khas (spesifik) pada organisme hidup (Palar, 2008).

Semua logam berat dapat dikatakan sebagai bahan beracun yang akan meracuni makhluk hidup. Sebagai contoh logam berat air raksa (Hg), kadmium (Cd), timbal (Pb), dan krom (Cr). Namun demikian, meskipun semua logam berat dapat mengakibatkan makhluk hidup. Kebutuhan tersebut dalam jumlah yang sangat kecil/sedikit. Tetapi apabila kebutuhan yang sangat kecil tersebut tidak terpenuhi dapat berakibat fatal terhadap kelangsungan makhluk hidup. Karena tingkat kebutuhan yang sangat dipentingkan maka logam - logam tersebut juga dinamakan sebagai logam - logam esensial tubuh. Bila logam - logam esensial yang masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang berlebihan, maka berubah fungsi menjadi racun (Fardiaz, 1994).

Timbal atau dalam keseharian lebih dikenal dengan nama timah hitam, dalam bahasa ilmiahnya dinamakan *plumbum*, dan logam ini disimbolkan dengan *Pb*. Logam ini termasuk kedalam kelompok logam-logam golongan IV-A pada tabel periodik unsur kimia. Mempunyai nomor atom (NA) 82 dengan bobot atau berat atom (BA) 207,2 (Palar, 2004).

Logam timbal (Pb) mempunyai sifat-sifat yang khusus seperti berikut :

- a. Merupakan logam yang lunak sehingga dapat dipotong dengan menggunakan pisau atau dengan tangan dan dapat dibentuk dengan mudah.
- b. Merupakan logam yang tahan terhadap peristiwa korosi atau karat, sehingga logam timbal, sering digunakan sebagai bahan *coating*.
- c. Mempunyai titik lebur rendah, hanya 327,5 °C.
- d. Mempunyai kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan logam-logam biasa, kecuali emas dan merkuri.
- e. Merupakan penghantar listrik yang tidak baik (Palar, 2008).

Di atmosfer di kota-kota aerosol timbal merupakan pencemar yang telah dikenal. Timbal memang terdapat dimana-mana. Di air, tanah, tanaman, hewan, dan udara. Abu silikat yang berterbangan terjadi erosi. Tetapi paling besar adalah ulah manusia. Misalnya karena pembakaran batu bara di pabrik-pabrik, penyemprotan pestisida, pembakaran sampah, dan di kota-kota karena pembakaran bensin di kendaraan. Untuk memperoleh bensin dengan bilangan oktan tinggi, maka bensin diberi senyawa timbal tetra etil dan timbal tetra metil (Sastrawijaya, 2009)

1. Kegunaan Timbal

Penggunaan lainnya dari timbal adalah untuk produk-produk logam seperti amunisi, pelapis kabel, pipa dan soldier, bahan kimia, pewarna, dan lain-lainnya. Beberapa produk logam dibuat dari timbal murni yang diubah menjadi berbagai bentuk, dan sebagian besar terbuat dari alloy timbal. Solder mengandung 50-95% timbal, sedangkan sisanya adalah timah.

Gas timbal terutama berasal dari pembakaran bahan aditif bensin dari kendaraan bermotor yang terdiri dari tetra etil Pb dan tetrametil Pb. Bahkan emisi gas buangan kendaraan bermotor hampir 90% dari total emisi timbal di atmosfer. Bahan aditif yang biasa dimasukkan ke dalam bahan bakar kendaraan bermotor pada umumnya terdiri dari 62% timbal tetraetil dan bahan *scavenger* yaitu 18% etilenkhlorida ($C_2H_4Cl_2$), 18 % etilenbromida ($C_2H_4Br_2$) dan sekitar 2% campuran bahan tambahan dari bahan-bahan lain. Senyawa *scavenger* dapat mengikat residu timbal yang dihasilkan setelah pembakaran, sehingga di dalam gas buangan terdapat senyawa timbal dengan halogen. Jumlah senyawa timbal yang jauh lebih besar dibandingkan dengan senyawa-senyawa lain dan tidak terbakar musnahnya timbal dalam peristiwa pembakaran pada mesin menyebabkan jumlah timbal yang dibuang ke udara melalui asap buangan kendaraan menjadi sangat tinggi.

2. Mekanisme Toksisitas Pb

Keracunan yang ditimbulkan oleh persenyawaan logam Pb dapat terjadi karena masuknya persenyawaan logam tersebut dalam tubuh, proses masuknya Pb ke dalam tubuh dapat melalui beberapa jalur, yaitu melalui makanan dan minuman, udara dan perembesan atau penetrasi pada selaput atau lapisan kuli.

Bentuk-bentuk kimia dari senyawa Pb, merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkah laku Pb dalam tubuh manusia. Senyawa-senyawa Pb organik relatif lebih mudah untuk diserap tubuh melalui selaput lendir atau melalui pelapisan kulit, bila dibandingkan dengan senyawa-

senyawa Pb-anorganik. Namun hal itu bukan berarti semua senyawa Pb dapat diserap oleh tubuh, melainkan hanya sekitar 5-10% dari jumlah Pb yang masuk melalui makanan dan atau sebesar 30% dari jumlah Pb yang terhirup yang akan diserap itu, hanya 15% yang akan mengendap jaringan tubuh, dan sisanya akan turut terbuang bersama bahan sisa metabolisme seperti urine dan feces.

Sebagian besar dari Pb yang terhirup pada saat benafas akan masuk ke dalam pembuluh darah paru-paru. Tingkat penyerapan itu sangat dipengaruhi oleh ukuran partikel dari senyawa Pb yang ada dan volume udara yang mampu dihirup pada saat peristiwa bernapas berlangsung. Makin kecil ukuran partikel debu, serta makin besarnya volume udara yang mampu terhirup, maka akan semakin besar pula konsentrasi Pb yang diserap oleh tubuh. Logam Pb yang masuk ke paru-paru melalui peristiwa pernafasan akan terserap dan berikatan dengan darah paru-paru untuk kemudian diedarkan ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Lebih dari 90% logam Pb yang terserap oleh darah berikatan dengan sel darah merah (*erythrocyt*).

Senyawa Pb yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman akan diikutkan dalam proses metabolisme tubuh. Namun demikian jumlah Pb yang masuk bersama makanan dan atau minuman ini masih mungkin ditolerir oleh lambung disebabkan asam lambung (HCl) mempunyai kemampuan untuk menyerap logam Pb. Tetapi walaupun asam lambung mempunyai kemampuan untuk menyerap keberadaan logam Pb ini, pada kenyataanya Pb lebih banyak dikeluarkan oleh tinja.

Pada jaringan dan/atau organ tubuh, logam Pb akan terakumulasi pada tulang, karena logam ini dalam bentuk ion (Pb^{2+}) mampu menggantikan keberadaan ion Ca^{2+} (kalsium) yang terdapat dalam jaringan tulang. Di samping itu, pada wanita hamil logam Pb dapat melewati plasenta dan kemudian akan ikut masuk dalam system peredaran darah janin dan selanjutnya setelah bayi lahir, Pb akan dikeluarkan bersama air susu.

Senyawa Pb organik umumnya masuk ke dalam tubuh melalui jalur pernafasan saluran nafas (85%), saluran cerna (14%) dan kulit (1%). Absorpsi timbal melalui saluran nafas dipengaruhi oleh deposisi, pembersihan mukosiliar, dan pembersihan alveolar. Deposisi tergantung pada ukuran partikel timbal, volume nafas dan daya larut. Partikel yang berukuran besar banyak dideposit pada saluran nafas bagian atas dibandingkan partikel yang lebih kecil. Sebanyak 30-40% timbal yang diabsorpsi melalui saluran nafas akan masuk ke dalam aliran darah, tergantung ukuran, daya larut, volume nafas dan variasi faal antar individu (Darmono, 1995).

Penyerapan lewat kulit ini dapat terjadi disebabkan karena senyawa ini dapat larut dalam minyak dan lemak. Senyawa seperti tetraetil-Pb menyebabkan keracunan akut pada sistem syaraf pusat, meskipun proses keracunan tersebut terjadi dalam waktu yang cukup panjang dengan kecepatan penyerapan yang kecil (Palar, 2008).

Keracunan yang disebabkan oleh keberadaan logam Pb dalam tubuh mempengaruhi banyak jaringan dan organ tubuh. Organ-organ tubuh yang banyak menjadi sasaran dari peristiwa keracunan logam Pb adalah

system saraf, system ginjal, system reproduksi, system endokrin, dan jantung. Setiap bagian yang diserang oleh racun Pb akan memperlihatkan efek yang berbeda-beda (Palar, 2008).

D. Pengaruh Timbal (Pb) Terhadap Kesehatan

Manusia sebagai makhluk hidup memerlukan beberapa logam Ma, Fe, Cu, dan Zn dalam jumlah yang sangat kecil, logam-logam ini merupakan mikronutrien esensial. Akan tetapi ada beberapa logam lain seperti Hg, Pb, Cd dan Ni sangat tidak diharapkan keberadaannya dalam tubuh makhluk hidup meskipun dalam jumlah yang sangat kecil, logam ini bersifat sangat toksik atau beracun, logam berat dapat masuk ke dalam tubuh manusia baik melalui rantai makanan, pernafasan, maupun melalui penetrasi kulit. Kemudian logam ini terakumulasi di dalam tubuh dan meracuni manusia. Timbal merupakan salah satu jenis logam berat yang diketahui beracun bagi makhluk hidup termasuk manusia, dalam keseharian disebut timah hitam, termasuk kelompok logam golongan IV A pada tabel periodik unsur kimia dengan nomor atom 82 dan berat atom 207,2 (Palar, 2008)

Senyawa timbal (Pb) yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan/minuman akan diikuti dalam proses metabolisme tubuh. Pb yang masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan dan pernapasan. Kadar Pb normal yang masuk ke dalam tubuh manusia kira-kira 0,3 mg. Bagi orang normal dengan masukan Pb 0,6 mg Pb/hari dalam jangka waktu yang lama dapat menderita keracunan. Masukan Pb dengan kadar lebih besar dari 0,6 mg/hari mempercepat akumulasi dan timbulnya keracunan. Misalnya dengan

masukannya 2,5 mg Pb/hari keracunan terjadi setelah empat tahun, sedangkan 3,2 mg Pb/hari hanya memerlukan beberapa bulan (Cahyadi, 2002).

Meskipun jumlah timbal yang diserap tubuh hanya sedikit, logam ini ternyata menjadi sangat berbahaya. Hal ini disebabkan senyawa-senyawa timbal dapat memberikan efek racun terhadap banyak fungsi organ yang terdapat dalam tubuh (Palar, 2004).

1. Efek Timbal (Pb) pada Sistem Syaraf

Diantara semua sistem organ pada tubuh, sistem saraf merupakan sistem yang paling sensitif terhadap racun yang dibawa oleh logam timbal. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan otak sebagai akibat dari keracunan timbal adalah epilepsi, halusinasi, kerusakan pada otak besar.

Kelainan otak jarang sekali terjadi pada orang dewasa tetapi sering terjadi pada anak-anak. Kelainan bervariasi dari penurunan intelektual, gangguan kejiwaan yang ringan sampai pada pembengkakan otak yang berat, yang dapat berkembang dengan amat cepat walaupun akumulasi timbal berlangsung lambat. Kejang, koma dan kematian dapat segera terjadi bila fungsi otak terganggu.

2. Efek Timbal pada Sistem Urinaria

Pajanan lama timbal dapat menyebabkan nefropati yang ditandai dengan gangguan ginjal progresif dan sering ditandai dengan hipertensi.

Senyawa-senyawa timbal yang terlarut dalam darah akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh dan akan masuk ke dalam glomerulus. Disini terjadi pemisahan akhir semua bahan yang dibawa darah, apakah masih

berguna bagi tubuh atau harus dibuang karena sudah tidak diperlukan lagi. Ikut sertanya timbal yang larut dalam darah ke sistem urinaria (ginjal) mengakibatkan terjadinya kerusakan pada saluran ginjal. Kerusakan yang terjadi tersebut disebabkan terbentuknya *intranuclear inclusion bodies* yang disertai dengan terbentuknya *aminociduria*, yaitu terjadinya kelebihan asam amino. Aminociduria dapat kembali normal setelah selang waktu beberapa minggu, tetapi intranuclear inclusion bodies membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kembali normal.

3. Efek Timbal pada Sistem Reproduksi

Logam berat timbal dapat menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi berupa keguguran, kesakitan, dan kematian janin. Logam berat timbal mempunyai efek racun terhadap gamet dan dapat menyebabkan cacat kromosom.

Pada wanita dengan paparan timbal yang tinggi, timbal akan disimpan dalam tulang. Pada wanita hamil, timbal diserap dan ditimbun dalam tulang dan masuk ke dalam peredaran darah, melalui plasenta dan kemudian akan ikut masuk dalam sistem peredaran darah janin dan menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah, menghambat perkembangan otak dan intelegensia janin. Selanjutnya setelah bayi lahir, timbal akan dikeluarkan bersama air susu.

Efek toksik timbal pada fungsi reproduksi laki-laki yaitu mempengaruhi proses spermatogenesis sehingga terjadi penurunan kualitas semen dalam jumlah, morfologi, motilitas, dan bentuk abnormal spermatozoa.

Keracunan timbal akan menimbulkan gejala rasa logam di mulut, garis hitam pada gusi, gangguan pencernaan, anorexia, muntah-muntah, perubahan kepribadian, kelumpuhan dan kebutaan. Keracunan yang terjadi bisa bersifat kronik dan akut. Pada keracunan kronik, mula-mula logam berat tidak menyebabkan gangguan kesehatan tampak, tetapi makin lama efek toksik makin menumpuk hingga akhirnya terjadi gangguan keracunan. Keracunan timbal kronik ditandai dengan depresi, sakit kepala, sulit berkonsentrasi, daya ingat terganggu, sulit tidur, dan mual. Timbal juga dapat meningkatkan tekanan darah. (Palar, 2008).

4. Pada sistem saluran cerna

Pada sistem saluran serna Kolik usus (spasme usus halus) merupakan gejala klinis tersering dari gejala keracunan timbal lanjut, yang biasanya didahului dan hampir selalu disertai kontipasi berat. Nyeri terlokalisasi disekitar dan di bawah umbilicus. Tanda paparan timbal (tidak terkait dengan kolik) adalah pigmentasi kelabu pada gusi (Joko S, 1995).

5. Efek Pb dan sintesa haemoglobin

Sel-sel darah merah merupakan suatu bentuk kompleks khelat yang dibentuk oleh logam Fe dengan gugus *haeme* dan *globin* sintesa dari kompleks tersebut melibatkan 2 macam enzim, yaitu enzim *ALAD* (Asam Amino Levulinic Dehidrase) dan enzim *ferrokhelatase*. Enzim *ALAD* adalah enzim jenis sitoplasma . Enzim ini akan bereaksi secara aktif pada tahap awal sintesa dan selama sirkulasi sel merah berlangsung. Adapun enzim *ferrokhelatas* termasuk pada golongan enzim mitokondria. Enzim

ferrokhelatase ini akan berfungsi aktif pada akhir proses sintesa, yaitu mengkatalisasi pembentukan kompleks khetat haemoglobin.

Sintesa haemoglobin dapat diawali dari peristiwa beraksinya succinyl co-A dengan glycin yang akan membentuk senyawa ALA atau asam amino levulinat yang dikatalisasi oleh ALA-sintese. Selanjutnya ALA mengalami dehidrasi menjadi porphobilinogen oleh enzim ALAD (ALA dehidratase). Setelah melewati dari beberapa tahapan reaksi, senyawa porphobilinogen tersebut mengalami perubahan bentuk lagi menjadi protoporphyrin-IX, yang selanjutnya diubah menjadi haeme

Haeme akan bereaksi dengan Globin dan ion logam Fe^{2+} dan dengan bantuan enzim ferrokhelatase akan membentuk khelat haemoglobin. Senyawa Pb yang terdapat dalam tubuh akan mengikat gugus aktif dari enzim ALAD tersebut akan mengakibatkan pembentukan intermediet porphobilinogen dan kelanjutannya dari proses reaksi ini tidak dapat berlangsung. Keracunan yang terjadi sebagai akibat kontaminasi dari logam Pb dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kadar ALA dalam darah dan urin.
- 2) Meningkatkan kadar protoporphyrin dalam sel darah merah.
- 3) Memepersingkat umur sel darah merah.
- 4) Menurunkan jumlah sel darah merah.
- 5) Menurunkan kadar *retikolosit* (sel-sel darah merah yang masih mudah).
- 6) Meningkatkan kandungan logam Fe dalam plasma darah.

E. Tinjauan Umum Tentang Umur

Umur adalah satuan waktu yang mengukur keberadaan suatu benda/makhluk baik yang hidup maupun yang mati. Umur merupakan salah satu sifat karakteristik tentang orang yang sangat diutamakan. Umur mempunyai hubungan yang erat dengan keterpaparan, umur juga mempunyai hubungan dengan besarnya risiko terhadap penyakit tertentu seperti sifat resistensi pada berbagai kelompok umur tertentu (Noor, 2007). Pada penelitian Framingham study menunjukkan bahwa pada individu berusia lebih dari 55 tahun, memiliki kemungkinan sebesar 90% untuk menjadi hipertensi.

Pada usia tua kepekaannya lebih tinggi dari rata-rata orang dewasa, biasanya karena aktivitas *enzim biotransformase* berkurang dengan bertambahnya umur dan daya tahan organ tertentu berkurang terhadap efek timbal. Semakin tua umur seseorang, akan semakin tinggi pula konsentrasi timbal yang terakumulasi pada jaringan tubuh yaitu dengan meningkatkan kadar *protoporphyrin* dalam sel darah merah dan meningkatkan ALA (*Amino Levulinic Acid*) dalam urin, (Suciani, 2007).

F. Tinjauan Umum Tentang Kebiasaan Merokok

Rokok adalah golongan tembakau yang berbentuk batangan dengan ukuran tertentu dengan bahan pembungkus yang terbuat dari kertas tipis yang dapat memberikan kenikmatan bagi seseorang yang menyukainya. Akibat pertama yang ditimbulkan rokok adalah pengapuran atau yang dikenal dengan atherosclerosis (pengerasan dinding pembuluh darah) dan mempercepat terjadinya plaque, lapisan endotel pembuluh darah akan rusak dan kemudian

memudahkan terjadinya ruptur/pecahnya plaque tadi yang kemudian terbentuklah trombus. (*Jurnalnet. com, 2007*).

Rokok yang dihubungkan dengan hipertensi walaupun mekanisme secara pasti belum diketahui, tetapi Mc. Mahan dalam Laode, 2003 mengemukakan : pendapat Frestone dan Ramsay bahwa 2 batang rokok sigaret akan meningkatkan tekanan darah 8-10 mmHg selama 15 menit dan kebiasaan merokok 1-2 bungkus per hari akan meningkatkan tekanan darah 7-10 jam sehari.

Gas yang terkandung dalam rokok sangat mempengaruhi sistem paru-paru, CO yang terkandung dalam rokok mempunyai kemampuan mengikat hemoglobin (Hb) yang terdapat dalam sel darah merah (eritrosit) lebih kuat dibanding oksigen, sehingga setiap ada asap rokok disamping kadar oksigen udara yang sudah berkurang, ditambah lagi sel darah merah akan semakin kekurangan oksigen, oleh karena yang diangkut adalah CO dan bukan O₂ (oksigen). Penyempitan pembuluh darah akan terjadi dimana-mana. Di otak, jantung, paru-paru, ginjal, kaki, saluran peranakan, dan ari-ari pada wanita hamil. Kebiasaan merokok merupakan salah satu fakto-faktor dari berapa factor yang mempengaruhi kadar Hb dalam darah (*Jurnalnet. com, 2007*).

G. Tinjauan Umum Tentang Masa Kerja

Masa kerja adalah rentan waktu yang telah dilalui oleh seorang tenaga kerja untuk kerja pada perusahaan atau industri tertentu yang digolongkan kurang dari 3 tahun dan lebih dari 3 tahun. Bagi tenaga kerja yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun itu dianggap pengalaman kerjanya masih sangat

terbatas karena masih merupakan tenaga kerja dengan masa kerja yang baru sementara jika masa kerjanya lebih dari 3 tahun itu sudah termasuk ke dalam masa kerja lama maka dianggap pengalaman kerjanya sudah banyak dan mereka sudah mengerti akan seluk beluk pekerjaan di perusahaan atau industri tempat mereka bekerja (Fitriyah, 2011).

Penggolongan masa kerja

1. Menurut Tulus, 1992
 - a. Masa kerja baru : < 6 tahun
 - b. Masa kerja sedang : 6-10 tahun
 - c. Masa kerja lama : > 10 tahun
2. Menurut Hatija (2008) seorang tenaga kerja apabila bekerja lebih dari 5 tahun maka dapat di kategorikan sebagai tenaga kerja dengan masa kerja yang relatif lama, sementara dikatakan sebagai tenaga kerja baru jika masa kerjanya dibawah atau sama dengan 5 tahun.
3. Menurut Retno (2003) masa kerja dikatakan baru jika tenaga kerja bekerja kurang dari 3 tahun dan dikatakan lama jika tenaga kerja bekerja sudah lebih dari 3 tahun.

Tubuh sebenarnya mampu mengeluarkan timbal. Diperlukan waktu 35 hari untuk mengeluarkannya. Akan tetapi bila setiap hari tubuh terpapar timbal dengan masa kerja yang cukup lama, tidak ada waktu untuk mengeluarkannya. Akibatnya, timbal akan menumpuk di dalam tubuh. Karena sumber utama timbal yang masuk ke tubuh kita melalui pernafasan

maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menghapuskan zat aditif TEL yang mengandung timbal pada bahan bakar bensin (Ariesthya, 2006).

Pemaparan tinggi terhadap senyawa timbal anorganik dapat merusak ginjal, yaitu terjadinya kerusakan pada tubulus proksimal ginjal, sedang pengaruh selanjutnya pada pemaparan kadar tinggi dan waktu yang lama adalah terjadinya interstitial fibrosis, sclerosis dari pembuluh dan atrofi glomerulus (Sutomo, 2000).

H. Tinjauan Umum Tentang Lama Paparan

Lama paparan yaitu waktu dimana seseorang terpapar dengan logam berat yang dapat menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan tergantung pada toksisitas logam berat tersebut dan besarnya paparan. Seorang supir angkutan umum memiliki tingkat keterpaparan yang cukup tinggi. Paparan tergantung bagaimana paparan itu digunakan. Misalnya apakah bahan dipanaskan, disemprotkan atau dilepaskan ke lingkungan (Ariesthy, 2006).

Senyawa timbal (Pb) merupakan suatu logam berat berwarna kelabu kebiruan dan lunak. Walaupun bersifat lunak dan lentur, timbal sangat rapuh dan mengkerut pada pendinginan, sulit larut dalam air dingin, air panas dan air asam, timah hitam dapat larut dalam asam nitrit, asam asetat dan asam sulfat pekat (Palar, 2008).

Jumlah timbal di udara mengalami peningkatan yang sangat drastis sejak dimulainya revolusi industri di Benua Eropa, asap yang berasal dari cerobong asap pabrik hingga knalpot kendaraan telah melepaskan timbal ke udara, hal ini berlangsung terus menerus sepanjang hari, sehingga kandungan

timbal di udara naik secara mencolok sekali, hal ini dibuktikan dengan satu hasil penelitian terhadap kandungan timbal yang terdapat pada lapisan es di Greenland pada tahun 1969. Emisi timbal ke dalam atmosfer dapat berbentuk gas partikulat emisi timbal yang masuk dalam bentuk gas, terutama sekali berasal dari buangan gas kendaraan bermotor. Emisi tersebut merupakan hasil samping pembakaran yang terjadi dalam mesin-mesin kendaraan (Palar, 2008).

Timbal yang terhirup oleh manusia setiap hari akan diserap, disimpan dan kemudian ditampung dalam darah. Bentuk kimia timbal merupakan faktor penting yang mempengaruhi sifat-sifat timbal di dalam tubuh. Selama 8 jam, seorang bisa menyerap hingga 400 μg , hal ini dikarenakan yang terserap adalah partikel yang cukup besar dengan tambahan 20-30 $\mu\text{g}/\text{hari}$ dari makanan, minuman dan udara. Udara merupakan salah satu jalur yang paling besar peranannya dalam distribusi timbal di lingkungan. Hampir semua timbal di udara merupakan partikel dengan diameter kurang dari 1 μm . Ukuran partikel-partikel ini bervariasi tergantung sumber dan usia partikel sejak diemisikan. Kebanyakan merupakan timbal inorganik, dan sumber utamanya adalah dari pembakaran *tetraetil* dan *tetrametil* yang digunakan sebagai zat tambahan bahan bakar (Mukono, 2008).


Semakin tinggi konsentrasi partikel timbal dalam udara dan semakin lama paparan berlangsung, jumlah partikel yang mengendap di tubuh juga semakin banyak. Berat ringan efek timbal tergantung pada proses paparan timbal yaitu paparan secara terus menerus (*kontinue*) atau terputus-putus

(*intermittent*). Pemaparan terus menerus akan memberikan efek yang lebih berat dibandingkan pemaparan secara terputus-putus. Timbal akan memberikan efek yang berbahaya terhadap kesehatan bila masuk melalui jalur yang tepat. Orang-orang dengan sumbatan hidung mungkin juga berisiko lebih tinggi, karena pernapasan lewat mulut mempermudah inhalasi partikel debu yang lebih besar (Suciani, 2007).

I. Tinjauan Umum Tentang Status Kesehatan

Definisi WHO (1947) sehat itu sendiri dapat diartikan bahwa suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. UU No. 32 Tahun 1992 tentang kesehatan bahwa: kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Status kesehatan adalah suatu keadaan, kedudukan orang dalam tingkatan sehat atau sakit (Purnawan, 2011).

Dalam pengertian yang paling luas sehat merupakan suatu keadaan yang dinamis dimana individu menyesuaikan diri dengan perubahan – perubahan lingkungan internal dan eksternal dalam mempertahankan kesehatannya.



Menurut H. L. Blum dalam Nasution (2004) ada empat faktor yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat atau perorangan. Faktor-faktor tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Hidup sehat memerlukan situasi, kondisi, dan lingkungan yang sehat karena itu, kondisi lingkungan perlu benar-benar diperhatikan agar tidak merusak kesehatan. Dalam memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan ada tiga faktor yang harus pertama-tama diperhatikan yaitu: tersedianya air bersih, pembuangan sampah dan air limbah, dan menjaga kebersihan dan kesehatan kamar mandi atau WC. Selain faktor tersebut, kualitas udara perlu mendapat perhatian. Karena kualitas udara dalam suatu ruangan merupakan ukuran dan keaman setiap orang bekerja baik dalam ruangan maupun luar ruangan (Nasution, 2004).

J. Tinjauan Umum tentang Kadar Hemoglobin

Terdapat sekitar 280 juta molekul hemoglobin di dalam setiap sel darah merah (Tortora dan Derickson, 2006). Hemoglobin adalah sejenis protein dengan berat molekul 64.500 dalton, terdiri daripada 4 rantai polipeptida. Setiap satunya mengandung satu pigmen non-protein berbentuk seperti cincin yang disebut sebagai kelompok heme aktif (Hillman, Ault dan Rinder, 2005).

Menurut Made (2008) kadar hemoglobin adalah kadar molekul protein pada sel darah merah yang berfungsi sebagai media transport oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan membawa karbondioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru.

Tabel 2.1.
Standar Kadar Hemoglobin Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Standar Kadar Hemoglobin (gram/dl)
- Bayi baru lahir	17 – 22
- Umur 1 minggu	15 – 20
- Umur 1 bulan	11 – 15
- Anak-anak	11 – 13
- Laki-laki remaja dan dewasa	13 – 18
- Perempuan remaja dan dewasa	12 – 16
- Lelaki tua	12,4 – 14,9
- Perempuan tua	11,7 – 13,8

Sumber : Made, 2008


Proses sintesis hemoglobin yang normal memerlukan cadangan zat besi yang mencukupi dan produksi *protoporphyrin* dan globin yang normal. Proses sintesis *protoporphyrin* dimulai di dalam mitokondria dengan pembentukan *delta aminolevulinic acid* (dALA) daripada *glycine* dan *succinyl-CoA* yang berasal dari siklus asam sitrat. Seterusnya, proses dilanjutkan dengan pembentukan *porphobilinogen*, *uroporphyrin* dan *coproporphyrin* yang terjadi di sitoplasma sel. Dua molekul darah bergabung membentuk *porphobilinogen* yang mengandung satu rantai *pyrrole*. Melalui proses deaminasi, empat *porphobilinogen* digabungkan menjadi *hydroxymethyl bilane*, yang kemudiannya dihidrolisis menjadi *uroporphyrin*. *Uroporphyrin* kemudian mengalami dekarboksilasi menjadi *coporphyrin*. Enzim *coporphyrin oxidase* mengoksidasi *coporphyrin* kepada *protoporphyrinogen*. *Protoporphyrinogen*

seterusnya dioksidasikan membentuk *protoporphyrin*. Proses terakhir adalah penggabungan rantai *protoporphyrin* dengan ion ferrous, Fe^{2+} lalu membentuk molekul Heme. Proses ini berlaku di dalam mitokondria (Hillman, Ault dan Rinder, 2005).

Rantai globin pula digabungkan oleh ribosom sitoplasmik yang dikawal oleh dua kluster *gene* pada kromosom 11 dan 16. Hasil akhirnya adalah molekul globin yang tetramer yaitu dua rantai α -globin dan dua rantai non- α -globin. Penggabungan molekul hemoglobin ini berlaku di sitoplasma sel. Terdapat sebilangan kecil zat besi, *protoporphyrin* dan rantai globin bebas yang tersisa selepas proses sintesis hemoglobin selesai. Zat besi tersebut disimpan sebagai *ferritin* dan *porphyrin* pula diubah menjadi *zinc* (Hillman, Ault dan Rinder, 2005)

Seiring reaksi kompleks ini dipicu oleh hormon *erythropoietin*. Tingkat sintesis hemoglobin (*rate of hemoglobin synthesis*) ditentukan oleh ketersediaan *transferrin iron* dan kadar heme di intrasellular. Proses sintesis hemoglobin berlaku secara maksimal di sumsum tulang yang lebih matang. Penghentian sintesis heme ditandai dengan penurunan ekspresi dari reseptor *transferrin* pada membran, diikuti dengan penurunan regulasi (*downregulation*) sintesis heme dan globin (Hillman, Ault dan Rinder, 2005). dr. Made (2008) mengemukakan bahwa kadar hemoglobin dalam darah yang rendah dikenal dengan istilah anemia. Ada banyak penyebab anemia diantaranya yang paling sering adalah pendarahan, kurang gizi, gangguan sumsum tulang, pengobatan kemoterapi dan abnormalitas hemoglobin bawaan. Adapun kadar hemoglobin

yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya mata merah, konjungtiva, kuku berbintik-bintik merah dan nyang lebih fatal adalah penyakit *Polisitemia Vera*. *Polisitemia Vera* merupakan suatu kelainan dari sel precursor darah, yang menyebabkan sel darah merah terdapat dalam jumlah yang berlebihan. Sel darah merah yang berlebihan akan menambah volume darah dan menyebabkan darah menjadi lebih kental sehingga lebih sulit mengalir melalui pembuluh darah yang kecil.



BAB III

KERANGKA KONSEP


A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti

Udara merupakan faktor yang penting dalam kehidupan, namun dengan meningkatnya pembangunan fisik kota dan berdirinya pusat-pusat industri disertai dengan melonjaknya kendaraan bermotor, mengakibatkan peningkatan kepadatan lalu lintas dari hasil produksi sampingan, yang merupakan salah satu sumber pencemaran udara salah satu pencemar udara adalah timbal

Timbal adalah logam lunak kebiruan atau kelabu keperakan. Timbal merupakan logam yang amat beracun yang pada dasarnya tidak dapat dimusnahkan serta tidak terurai menjadi zat lain. Efek dari paparan timbal di dalam tubuh dapat merusak berbagai organ didalam tubuh dan dapat mengakibatkan kematian.

Orang-orang yang bekerja sebagai sopir yang menyambung hidupnya di jalan, yang sepanjang jalur transportasi dapat terpapar logam berat terutama timbal tanpa memakai alat pelindung diri seperti masker, mereka yang terpapar partikel timbal yang keluar dari pembuangan gas kendaraan secara langsung dapat berdampak bagi kesehatannya dikemudian hari. Berdasarkan kerangka berpikir seperti yang dikemukakan di atas, maka dapat digambarkan bagan kerangka konsep sebagai berikut.

B. Pola Pikir Variabel yang Diteliti



Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian

Keterangan:

 : Variabel Independen yang diteliti

 : Variabel Independen yang tidak diteliti

C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Kadar Timbal (Pb)

Kadar Timbal (Pb) di udara adalah kandungan timbal (Pb) yang ada di dalam udara ambien pada beberap titik di jalur trasportasi angkutan umum Universitas Islam Negari Makassar.

Kriteria Objektif

- a. Memenuhi syarat : jika tidak melebihi nilai ambang batas (NAB) yaitu $2,0 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$
 - b. Tidak memenuhi syarat : jika melebihi nilai ambang batas (NAB) yaitu $2,0 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$
2. Umur yaitu usia supir angkutan umum yang berada di UIN Alauddin Makassar pada saat lahir hingga ulang tahun terakhir yang dilalui.
 3. Masa kerja yaitu masa atau waktu dimulainya responden bekerja sebagai supir angkutan umum di UIN Alauddin Makassar sampai saat dilakukannya penelitian.
 4. Lama paparan yaitu lamanya responden bekerja dalam satu hari, dalam hal ini adalah supir angkutan umum yang beroperasi di Kampus UIN Alauddin Makassar.
 5. Status Kesehatan
 Status kesehatan adalah keadaan yang menggambarkan keadaan kesehatan sopir angkutan umum Universitas Islam Negeri Makassar dilihat dari kadar Hb.

Kriteria Objektif

- a. Normal : jika kadar Hb 13-18 gr/dL
- b. Tidak normal : jika kadar Hb dibawah 13 gr/dL dan diatas 18 gr/dL



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional dengan pendekatan deskriptif dengan teknik wawancara dan uji laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan sopir angkot Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar terkait paparan timbal diudara.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Universitas Islam Negeri Makassar Makassar. Untuk pengukuran kadar timbal di udara dilakukan pada beberapa titik sepanjang jalur utama angkutan umum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pengambilan sampel yang akan diamati ada empat titik pengambilan sampel kualitas udara. Untuk pengambilan sampel untuk titik 1 yaitu kampus 1 Universitas Islam Negeri Makassar jalan Sultan Alauddin Makassar, titik 2 pertigaan depan puskesmas Kassi-kassi, titik 3 perempatan Hertasning, dan titik 4 perempatan Areopala. Sedangkan untuk pemeriksaan kadar Hb dilakukan pada sopir UIN Alauddin Makassar yang bersedia untuk dilakukan pemeriksaan kadar Hb sekaligus sebagai responden dalam penelitian.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi dalam penelitian ini adalah lingkungan udara pada seluruh jalur utama angkutan umum Universitas Islam Negeri Makassar beserta seluruh

sopir angkutan umum Universitas Islam Negeri Makassar yang berjumlah 42 orang.

2. Sampel dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel udara yang terpilih untuk titik pengukuran titik 1 yaitu kampus 1 Universitas Islam Negeri Makassar jalan Sultan Alauddin Makassar, titik 2 pertigaan depan puskesmas Kassi-kassi, titik 3 perempata Hertasning, titik 4 perempatan Areopala dan titik 5 Kampus 2 Universitas Islam Negeri Samata makassar, sedangkan sampel orang yaitu semua sopir angkutan umum Universitas Islam Negeri Makassar berjumlah 20 orang dengan metode *purposive sampling*.
3. Responden adalah semua sopir angkutan umum Universitas Islam Negeri Makassar berjumlah 20 orang dengan *purposive sampling*.

D. Teknik Pengambilan Responden

Teknik pengambilan responden pada penelitian ini yaitu menggunakan *purposive sampling* dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.
2. Usia dewasa hingga tua dan berpotensi terpapar langsung oleh timbal.
3. Memiliki masa kerja > 3 tahun.
4. Lama paparan oleh timbal yaitu < 8 jam per hari atau di > 8 jam per hari

E. Prosedur Kerja

a. Pengukuran Kadar Timbal (Pb) di Udara

1. Bahan yang diperlukan

Filter fiber glass dengan pori-pori kurang dari 10 mikro.

2. Cara kerja

- a) Dua filter fiber glass, masukkan ke dalam desikator selama 24 jam.
- b) Timbang filter tersebut sampai bobot tetap.
- c) Simpan dalam kaset penyimpan filter.
- d) Pasang filter uji pada high volume air sampler (HVS).
- e) Atur laju air udara sesuai dengan high volume air sampler (HVS) yang diperlukan.
- f) Hisap udara selama 60 menit.
- g) Setelah selesai ambil filter dengan pinset, masukkan ke dalam kaset penyimpan filter.
- h) Masukkan ke dalam desikator selama 24 jam
- i) Ukur atau periksa dengan menggunakan AAS.

b. Pengukuran Kadar Hb Dalam Darah

1. Bahan yang diperlukan

- a. Alat hemoglobinometer EasyTouch® GCHb Model ET-321(Ref No. 3212C003758)
- b. Test card EasyTouch® Blood Hemoglobin Test Strips (Ref No. HBS11C07A1V)
- c. Lancet
- d. Softlick
- e. Alkohol
- f. Kapas steril
- g. Baterai

- a. Cara Kerja Bersihkan jari yang akan diambil darahnya terlebih dahulu dengan kapas yang mengandung alcohol.
- b. Gunakan lancet yang telah diisi dengan softlick untuk mengambil darah pada jari yang telah diolesi alcohol.
- c. Buang darah pertama yang menetes, selanjutnya tetesan darah kedua dimasukkan ke dalam test card EasyTouch® Blood Hemoglobin Test Strips yang telah terpasang pada alat hemoglobinometer EasyTouch® GCHb Model ET-321.
- d. Bacalah hasil pemeriksaan yang tertera pada layar hemoglobinometer EasyTouch® GCHb Model ET-321.

F. Cara Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh berdasarkan wawancara langsung dengan responden dan hasil pemeriksaan laboratorium

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai buku-buku literatur, jurnal penelitian, skripsi dan website internet serta bacaan lain yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

G. Pengolahan dan Penyajian Data

Setelah data dikumpul, selanjutnya diolah secara elektronik dengan menggunakan komputer program SPSS versi 16.0 for windows untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan naskah.

H. Analisis Data

Data yang terdapat di dalam tabel dianalisa secara deskriptif dan dibandingkan dengan standar kualitas kandungan timbal (Pb) di udara yang telah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 14 tahun 2010 Tentang Baku Mutu Udara Ambien di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu $2 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dengan pengukuran 24 jam, data primer diolah secara elektronik dengan menggunakan sistem SPSS di komputer kemudian di sajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Selanjutnya ditarik kesimpulan dan saran-saran.



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada bulan Oktober 2012 pada rute angkutan dan supir angkutan umum UIN Alauddin Makassar. Hasil pengukuran di lapangan pada udara ambien selanjutnya diperiksa di Laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Penanggulangan Penyakit Kelas I Makassar. Secara rinci hasil pemeriksaan dan observasi dapat disajikan sebagai berikut :

a. Karakteristik Responden

1). Karakteristik responden berdasarkan kelompok umur

Tabel 5.1
Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur
Pada Supir Angkutan Umum UIN Alauddin Makassar
Tahun 2012

Kelompok Umur (Tahun)	Frekuensi (f)	Persentase (%)
20-29 Tahun	6	30.0
30-49 Tahun	4	20.0
40-49 Tahun	6	30.0
50-59 Tahun	4	20.0
Jumlah (n)	20	100

Sumber: Data primer 2012

Berdasarkan pada tabel 5.1 di atas dapat diketahui dari 20 responden, responden usia 20-29 tahun sebanyak 6 responden (30,0%), responden usia 30-39 sebanyak 4 responden (20,0%), responden usia 40-49 sebanyak 6 responden (30,0%), dan 50-59 tahun sebanyak 4 responden (20,0) responden.

- 2). Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan sebelum menjadi supir

Tabel 5.2
Distribusi Responden Berdasarkan pekerjaan sebelum menjadi
Supir Angkutan Umum UIN Alauddin Makassar
Tahun 2012

Pekerjaan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Tukang Kayu	3	15.0
Petani	4	20.0
Tukang Batu	5	25.0
Pegawai Toko	3	15.0
Tidak Ada	5	25.0
Total	20	100.0

Sumber: Data primer 2012

Berdasarkan tabel 5.2 dapat diketahui pekerjaan responden sebelum menjadi sopir angkutan umum, 3 responden pekerjaan sebagai tukang kayu (15%), 4 responden (20%) sebagai petani, 5 responden (24%) sebagai tukang batu, 3 responden (15%) sebagai pegawai toko, dan 5 responden lainnya tidak memiliki pekerjaan sebelum menjadi sopir angkutan umum.

3). Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan lain

Tabel 5.3
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan lain
Pada Supir Angkutan Umum UIN Alauddin Makassar
Tahun 2012

Ada Pekerjaan Lain	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Tidak Ada	18	90.0
Ada	2	10.0
Total	20	100.0

Sumber: Data primer 2012

Pada tabel 5.3 diatas dari 20 responden terdapat 18 responden (90%) tidak memiliki pekerjaan lain selain supir dan hanya 2 responden (10%) orang yang memiliki pekerjaan lain selain supir.

4). Kadar Pb di Udara

Tabel 5.4
Distribusi Hasil Pengukuran Kadar Timbal di Udara Pada Jalur
Kendaraan Supir Angkutan Umum UIN Alauddin Makassar
Tahun 2012

No	Titik Pengambilan Sampel	Hasil pengukuran	Keterangan
1	Jln. Sultan Alauddin Makassar	0,97 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	Memenuhi Syarat
2	Pertigaan Tamalate	0,75 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	Memenuhi Syarat
3	Perempatan Hertasning dan Toddopuli	0,71 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	Memenuhi Syarat
4	Perempatan Hertasning Lama	1,88 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	Memenuhi Syarat

Sumber: Data primer 2012

Pada tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari 4 tempat pengukuran diperoleh kadar Pb di udara semuanya memenuhi syarat yaitu sebanyak 4 tempat pengukuran (100%).

5. Karakteristik responden berdasarkan lama terpapar

Tabel 5.6
Distribusi Responden Berdasarkan Lama Terpapar Tahun
Tahun 2012

Lama Terpapar/Hari	Frekuensi (f)	Persentase (%)
< 8 Jam	3	15.0
> 8 jam	17	85.0
Total	20	100.0

Sumber : Data Primer 2012

Pada tabel 5.6 diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden, responden yang terpapar \leq 8 Jam sebanyak 3 responden (15,0%), dan responden yang terpapar $>$ 8 jam sebanyak 17 responden (85,0 %).

6. Karakteristik responden berdasarkan masa kerja

Berdasarkan tabel 5.7 dibawah dapat diketahui dari 20 responden diperoleh sebanyak 5 responden (20%) yang berumur 6-10 Tahun, sebanyak 5 responden (25%) yang berumur 11-15 Tahun, sebanyak 5 responden (25%) yang berumur 16-20 Tahun, sebanyak 1 responden (5%) yang berumur 21-25 Tahun, sebanyak 2 responden (10%) yang berumur 26-30 Tahun, sebanyak 1 responden (5%) yang berumur 31-35 Tahun, dan sebanyak 2 responden (10%) yang berumur 36-40 Tahun.

Tabel 5.7
Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja
Tahun 2012

Masa Kerja	Frekuensi (f)	Persentase (%)
6-10 Tahun	4	20.0
11-15 Tahun	5	25.0
16-20 Tahun	5	25.0
21-25 Tahun	1	5.0
26-30 Tahun	2	10.0
31-35 Tahun	1	5.0
36-40 Tahun	2	10.0
Total	20	100.0

Sumber: Data primer 2012

7. Karakteristik responden berdasarkan kebiasaan Merokok

Tabel 5.8
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kebiasaan Merokok
Tahun 2012

Kebiasaan Merokok	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Ya	19	95.0
Tidak	1	5.0
Total	20	100.0

Sumber: Data primer 2012

Berdasarkan tabel 5.8 di atas dapat diketahui dari 20 responden, sebanyak 19 responden (95%) yang memiliki kebiasaan merokok, dan 1 responden (5,0%) yang tidak memiliki kebiasaan merokok.

8. Karakteristik responden berdasarkan keluhan kesehatan

Tabel 5.9
Distribusi Responden Berdasarkan Keluhan Kesehatan
Pada Supir Angkutan Umum UIN Alauddin Makassar
Tahun 2012

Keluhan kesehatan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sakit Kepala	13	65.0
Sesak dan Batuk	1	5.0
Pusing, Lemas, dan Lesu	4	20.0
Pegal-pegal	1	5.0
Tidak Ada Keluhan	1	5.0
Total	20	100.0

Sumber: Data primer 2012

Berdasarkan tabel 5.9 diatas dapat diketahui dari 20 responden, sebanyak 13 responden (65%) yang memiliki keluhan sakit kepala, sebanyak 1 responden (5%) yang memiliki penyakit sesak dan batuk, sebanyak 4 responden (20%) yang memiliki penyakit Pusing, Lemas dan lesu, sebanyak 1 responden (5%) yang memiliki penyakit pegal-pegal dan sebanyak 1 responden (5%) yang tidak memiliki keluhan.

9. Karakteristik responden berdasarkan Kadar Hb

Tabel 5.10
Distribusi Responden Menurut Kadar Hb Dalam
Darah Pada Supir Angkutan Umum UIN Alauddin Makassar
Tahun 2012

Kadar Hb	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Normal	7	35.0
Tidak Normal	13	65.0
Total	20	100.0

Sumber: Data primer 2012

Berdasarkan tabel 5.10 diatas dapat diketahui bahwa dari 20 responden diperoleh sebanyak 7 responden (35%) yang memiliki kadar Hb yang normal, dan responden yang memiliki kadar Hb tidak normal adalah 13 responden (65%).

b. Analisis Bivariat

1. Kadar Hb menurut umur

Berdasarkan tabel 5.11 dibawah dapat diketahui kadar Hb responden menurut umur dari 20 responden, 6 responden (100,0%) yang memiliki kelompok umur 20-29 tahun, 4 responden berkadar Hb normal sedangkan 2 responden berkadar Hb tidak normal, 6 responden (100,0%) yang memiliki kelompok umur 30-39 tahun, 2 responden (50%) responden berkadar hb normal dan 2 responden (50%) tidak normal, 6 responden (100,0%) yang memiliki kelompok umur 40-49 tahun, 1 (16,7%) berkadar Hb normal dan 5 responden (83%) berkadar hb tidak normal dan 4 responden (100,0%) yang memiliki kelompok umur 50-59

(60,0%) responden (0%) yang berkadar Hb normal dan 4 (100,0%) berkadar Hb tidak normal.

Tabel 5.11
Distribusi Kadar Hb Menurut Umur
Pada Supir Angkutan Umum UIN Alauddin Makassar
Tahun 2012

Umur	Kadar Hb				Jumlah	
	Normal		Tidak Normal		n	%
	n	%	n	%		
20-29 Tahun	4	66,7	2	33,3	6	100,0
30-29 Tahun	2	50,0	2	50,0	4	100,0
40-50 Tahun	1	16,7	5	83,3	6	100,0
50-59 Tahun	0	0	4	100	4	100,0
Total	7	35	13	65	20	100,0

Sumber: Data primer 2012

2. Kadar Hb menurut lama terpapar

Tabel 5.12
Distribusi Kadar Hb Menurut Lama Terpapar
Pada Supir Angkutan Umum UIN Alauddin Makassar Tahun
2012

Lama Terpapar	Kadar Hb				Jumlah	
	Normal		Tidak Normal		n	%
	n	%	n	%		
≤8 Jam	2	66,7	1	33,3	3	100
>8 Jam	5	29,4	12	70,6	17	100
Total	7	35	13	65	20	100

Sumber: Data primer 2012

Berdasarkan tabel 5.12 diatas dapat diketahui kadar Hb menurut lama terpapar dari 20 responden, 3 (100%) yang terpapar Selama ≤ 8 Jam 2 (66,7%) diantaranya berkadar Hb normal sedangkan 1 (33,3%) responden berkadar Hb tidak normal. Dan dari jumlah 17 (100%) yang terpapar selama > 8 Jam 5 (29,4%) diantaranya berkadar Hb normal dan 12 (70,6) responden berkadar Hb tidak normal.

3. Kadar Hb menurut masa kerja

Berdasarkan tabel 5.13 dibawah dapat diketahui bahwa bahwa dari 20 responden diperoleh kelompok lama terpapar 16-20 tahun memiliki kadar Hb yang tidak normal tertinggi yaitu sebanyak 4 responden (80%) dan yang memiliki kadar Hb yang tidak normal terendah adalah kelompok lama terpapar 6-10 tahun yaitu 0 responden (0%).

Tabel 5.13

**Distribusi Kadar Hb Menurut Masa Kerja
Pada Supir Angkutan Umum UIN Alauddin Makassar Tahun
2012**

Masa Kerja	Kadar Hb				Jumlah	
	Normal		Tidak Normal		n	%
	n	%	n	%		
6-10 Tahun	4	100	0	0	4	100
11-15 Tahun	2	40	3	60	5	100
16-20 Tahun	1	20	4	80	5	100
21-25 Tahun	0	0	1	100	1	100
26-30 Tahun	0	0	2	100	2	100
31-35 Tahun	0	0	1	100	1	100
36-40 Tahun	0	0	2	100	2	100
Total	7	35	13	65	20	100

Sumber: Data primer 2012

4. Kadar Hb menurut Kebiasaan Merokok

Tabel 5.14
Distribusi Kadar Hb Menurut Kebiasaan Merokok
Pada Supir Angkutan Umum UIN Alauddin Makassar Tahun
2012

Kebiasaan Merokok	Kadar Hb				Jumlah	
	Normal		Tidak Normal			
	n	%	n	%	n	%
Ya	6	31,6	13	68,4	19	100
Tidak	1	100	0	0	1	100
Total	7	35	13	65	20	100

Sumber: Data primer 2012

Berdasarkan tabel 5.14 diatas dapat diketahui kadar Hb responden menurut kebiasaan merokok. Dari 20 responden terdapat 19 (100%) responden yang memiliki kebiasaan merokok, 6 (31,6%) diantaranya berkadar Hb norma sedangkan 13 (68,4%) responden lainnya memiliki kadar Hb yang tidak normal. Dan 1 (100%) responden tidak memiliki kebiasaan merokok yang berkadar Hb normal.

B. Pembahasan

1. Kadar Pb di Udara

Dari 4 titik pengukuran diperoleh gambaran rute angkutan umum UIN kadar Pb di udara semuanya memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Sul-Sel No 69 Tahun 2010 dibawah baku mutu 2 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ dengan pengukuran 24 jam. Dari setiap titik penelitian terdapat kadar timbal yang berbeda-beda kadarnya yaitu pada jalan Sultan

Alauddi makasar $0,97 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, pertigaan Tamalate yaitu $0,75 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, perempatan Hertasning dan Toddopuli $0,71 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ serta perempatan Hertasning Baru, dan Samata yaitu $1,88 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$. Kadar yang tertinggi pada sampel yang di peroleh dari sampel perempatan Hertasning baru yang hampir melewati baku mutu $2 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$.

Timbal merupakan bahan toksik yang tidak terurai dan mudah berakumulasi dalam organ manusia dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia berupa anemia, gangguan syaraf, gangguan ginjal, dan gangguan jantung. Sumber timbal bukan saja berasal dari udara tapi dapat juga bersumber pada makanan dan minuman, dan komsumsi obat-obatan tertentu. Walaupun kadar timbal di udara masih memenuhi syarat tapi terbukti bahwa dalam penelitian pada udara ambien pada rute angkutan kampus UIN masih terdapat timbal yang setiap sumber sampel memiliki kadar yang berbeda-beda, yang biasa saja dalam jangka waktu lama dapat bertumpuk di dalam tubuh dan timbal yang terdapat di dalam tubuh tidak dibutuhkan oleh sistem apapun dalam tubuh. Timbal memiliki kemampuan berakumulasi pada sistem tubuh dan memberi dampak bagi kesehatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Widianti (1992) memperlihatkan adanya pengaruh gas buangan kendaraan bermotor terhadap konsentrasi timbal dalam darah yang berlokasi di Yogyakarta dengan 3 titik pengambilan sampel, konsentasi Pb dilokasi 1 menunjukkan $0,486 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ kadar Pb darah pedagang sebesar $49,59 \mu\text{g}/100 \text{ ml}$. Pada lokasi 2

konsentrasi Pb adalah $33,63 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ serta Pb pada darah pedagang $24,17 \mu\text{g}/100 \text{ ml}$. Pada lokasi 3 konsentrasi Pb $0,45 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$, serta Pb dalam darah pedagang adalah $33,53 \mu\text{g}/100 \text{ ml}$.

Senyawa timbal (Pb) yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan/minuman dan saluran pernafasan akan diikuti dalam proses metabolisme tubuh. Kadar Pb normal yang masuk ke dalam tubuh manusia kira-kira $0,3 \text{ mg}$. Bagi orang normal dengan masukan Pb $0,6 \text{ mg}$ Pb/hari dalam jangka waktu yang lama dapat menderita keracunan. Masukan Pb dengan kadar lebih besar dari $0,6 \text{ mg}/\text{hari}$ mempercepat akumulasi dan timbulnya keracunan. Misalnya dengan masukan $2,5 \text{ mg}$ Pb/hari keracunan terjadi setelah empat tahun, sedangkan $3,2 \text{ mg}$ Pb/hari hanya memerlukan beberapa bulan (Cahyadi, 2002).

Berbagai studi menunjukkan bahwa kadar timbal pada masyarakat yang berpotensi langsung terpapar timbal (polisi lalu lintas, pegawai SPBU, supir angkutan umum, mekanik bengkel dan penjaga pintu tol) lebih tinggi dari penduduk pedesaan yang jauh dari kemacetan lalu lintas. Data tahun 2005 menunjukkan bahwa kadar timbal pada polisi lalu lintas $32,32 \mu\text{g}/\text{dl}$, pegawai SPBU $25,59 \mu\text{g}/\text{dl}$, mekanik bengkel $21,28 \mu\text{g}/\text{dl}$ dan penjaga pintu tol $20,99 \mu\text{g}/\text{dl}$ di bandingkan $6,5 \mu\text{g}/\text{dl}$ pada masyarakat pedesaan (Mukono, 2008). Menurut Teori semakin tinggi timbal dalam darah maka semakin rendah kadar Hb dalam darah (Mukuno, 2008).

Senyawa timbal yang kandungannya sangat kecil tapi pemaparannya jangka panjang, apabila masuk didalam tubuh akan mempengaruhi banyak sistem dalam tubuh terutama sistem pernafasan, sistem haemoglobin, sistem syaraf dan sistem pencernaan.

Senyawa timbal dalam tubuh dipengaruhi oleh lama paparan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinta pada sopir angkutan umum UIN (2012) bahwa lama paparan berbanding lurus dengan kenaikan kadar timbal dalam urin seseorang. Ini berarti bahwa semakin lama paparan berarti kadar timbal semakin tinggi atau melebihi batas nilai normal. Hal tersebut disebabkan karena semakin lama seseorang terpapar atau menghirup udara yang terkontaminasi dengan timbal walaupun dengan kadar yang rendah, maka kadar timbal dalam tubuhnya pun akan semakin meningkat.

Namun dengan lamanya seseorang bekerja >8 jam/hari secara terus menerus akan mengurangi jam istirahat yang mengakibatkan tubuh akan terus terpapar oleh timbal dan mengakibatkan kondisi tubuh dan sistem imunitas akan semakin turun. Normalnya jam kerja seseorang bekerja dalam satu hari yaitu ± 8 jam karena tubuh akan membutuhkan istirahat yang optimal untuk memulihkan seluruh organ yang telah digunakan pada saat bekerja.

Dengan pemaparan timbal secara terus-menerus, dengan sistem imun yang menurun dan didukung oleh makanan yang tidak bergizi dapat mempengaruhi status kesehatan seseorang dalam hal ini kadar Hb.

2. Kadar Hb dalam Darah Supir Angkutan Umum

Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa dari 20 responden diperoleh sebanyak 7 (35%) responden yang memiliki kadar Hb yang normal, sedangkan responden yang memiliki kadar Hb tidak normal adalah 13 (65%) responden. Apabila dilihat dari status kesehatan sebagian besar sopir mobil mengalami anemia yang dapat dilihat dari kadar Hbnya yang tidak normal. Salah satu penyebab anemia adalah kontaminasi timbal dalam darah akibat proses pernapasan dimana pada penelitian udara ambien pada mobil angkutan umum UIN masi ditemukan kadar timbal pada udara.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sinta (2012) pada sopir angkutan umum UIN, dari 15 responden yang diteliti, diperoleh hasil bahwa semua responden sebesar 100% mempunyai kadar timbal tidak normal atau di atas standar normal dalam urin yang telah ditetapkan WHO. Bila penelitian sebelumnya dikaitkan dengan penelitian sekarang kemungkinan Hb yang rendah (anemia) yang dialami oleh para sopir akibat dari efek dari timbal, walaupun kadar timbal di udara rendah tapi apabila terpapar dalam jangka waktu lama maka timbal biasa bertumpuk di dalam tubuh apa lagi sumber dari pemaparan timbal bukan hanya pada udara tapi bisa juga pada makanan, minuman, dan sumber timbal lainnya. Jika kadar timbal tinggi dalam urin tinggi berarti dalam darah pun akan lebih tinggi karena 95% timbal yang diabsorpsi oleh tubuh berada dalam

peredaran darah, terikat oleh eritrosit dan kira-kira 5-10% dari jumlah tertelan akan diabsorpsi melalui saluran pencernaan yaitu urin.

Sel-sel darah merah merupakan suatu bentuk kompleks khelat yang dibentuk oleh logam Fe dengan gugus *haeme* dan *globin* sintesa dari kompleks tersebut melibatkan 2 macam enzim, yaitu enzim *ALAD* (Asam Amino Levulinic Dehidrase) dan enzim *ferrokhelatase*. Enzim *ALAD* adalah enzim jenis sitoplasma. Enzim ini akan bereaksi secara aktif pada tahap awal sintesa dan selama sirkulasi sel merah berlangsung. Adapun enzim *ferrokhelatase* termasuk pada golongan enzim mitokondria. Enzim *ferrokhelatase* ini akan berfungsi aktif pada akhir proses sintesa, yaitu mengkatalisasi pembentukan kompleks khelat haemoglobin.

Sintesa haemoglobin dapat diawali dari peristiwa beraksinya succinyl co-A dengan glycin yang akan membentuk senyawa ALA atau asam amino levulinat yang dikatalisasi oleh ALA-sintase. Selanjutnya ALA mengalami dehidrasi menjadi porphobilinogen oleh enzim *ALAD* (ALA dehidratase). Setelah melewati dari beberapa tahapan reaksi, senyawa porphobilinogen tersebut mengalami perubahan bentuk lagi menjadi protophorpyrin-1X, yang selanjutnya diubah menjadi haeme

Haeme akan bereaksi dengan Globin dan ion logam Fe^{2+} dan dengan bantuan enzim *ferrokhelatase* akan membentuk khelat haemoglobin. Senyawa Pb yang terdapat dalam tubuh akan mengikat gugus aktif dari enzim *ALAD* tersebut akan mengakibatkan pembentukan intermediet porphobilinogen dan kelanjutannya dari

proses reaksi ini tidak dapat berlangsung. Keracunan yang terjadi sebagai akibat kontaminasi dari logam Pb dapat menimbulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kadar ALA dalam darah dan urin.
- 2) Meningkatkan kadar protoporphyrin dalam sel darah merah.
- 3) Memperpendek umur sel darah merah.
- 4) Menurunkan jumlah sel darah merah.
- 5) Menurunkan kadar *retikosit* (sel-sel darah merah yang masih mudah).
- 6) Meningkatkan kandungan logam Fe dalam plasma darah.

Dengan pemaparan timbal secara terus-menerus, sistem imun yang menurun dan didukung oleh makanan yang tidak bergizi dapat memengaruhi status kesehatan seseorang dalam hal ini kadar Hb walaupun timbal merupakan salah satu faktor dari beberapa faktor yang memengaruhi kadar Hb dalam darah, yaitu umur, jenis kelamin, kehamilan, menstruasi asupan makanan, kebiasaan minum teh atau kopi(dapat menurunkan penyerapan besi) kebiasaan merokok dan penyakit infeksi. Tapi menurut teori timbal yang ada dalam darah dapat memengaruhi sistem haemoglobin dalam darah apa lagi asupan Fe yang kurang.

3. Kadar Hb menurut Umur

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 20 responden diperoleh kelompok yang tertinggi yaitu kelompok umur 40-49 tahun 5

(83%) responden berkadar Hb tidak normal, dan kelompok umur 50-59 sekitar 4 (100,0%) responden berkadar Hb tidak normal. Dari penelitian ini diketahui semakin bertambahnya umur semakin rendah kadar Hb pada sopir. Dan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sinta pada sopir UIN (2012) menyatakan bahwa risiko mengalami kenaikan kadar timbal dalam urin semakin meningkat dengan bertambahnya usia. Ini mungkin dikarenakan semakin tingginya kadar timbal dalam tubuh dikutinya bertambahnya umur dan sistem imun yang semakin berkurang sehingga mempengaruhi status kesehatan dalam hal ini kadar Hb yang rendah (anemia).

Menurut Notoadmodjo (2003) usia merupakan salah satu karakteristik tentang orang dalam studi epidemiologi menjadi variabel yang cukup penting karena sejumlah penyakit yang ditemukan dengan berbagai variasi frekuensi disebabkan oleh umur. Alasan lain karena semakin meningkatnya usia, kemampuan untuk menetralkan zat racun dalam tubuh semakin menurun termasuk terhadap timbal. Dari hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Sinta terlihat bahwa dari 15 responden yang diteliti terdapat 6 (40,0%) responden yang memiliki kelompok umur tertinggi yaitu umur 36-40 yang kadar timbal dalam urinnnya tidak normal atau tidak sesuai dengan standar normal. Jika kadar timbal tinggi dalam urin berarti dalam darah pun akan lebih tinggi karena 95% timbal yang diabsorpsi oleh tubuh berada dalam peredaran darah, terikat oleh eritrosit dan kira-kira 5-10% dari jumlah tertelan akan

diabsorpsi melalui saluran pencernaan yaitu urin dan tidak menutup kemungkinan timbal juga mempengaruhi sistem haemoglobin dalam darah karena salah satu dampak kesehatan dari kontaminasi timbal adalah mempengaruhi sistem haemoglobin dalam darah.

Di samping itu dengan berkurangnya daya tahan tubuh karena peningkatan usia, maka racun yang masuk ke dalam tubuh baik melalui pernafasan maupun melalui makanan tidak dapat dinetralisir dengan baik. Dengan demikian faktor umur memberikan pengaruh terhadap peningkatan kadar timbal dalam tubuh walaupun hanya dengan konsentrasi sedikit karena diketahui masing-masing orang mempunyai daya tahan tubuh yang berbeda-beda berdasarkan lingkungan dimana dia berada dan status gizi seseorang ikut memengaruhinya.

4. Kadar Pb menurut Masa Kerja

Masa kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masa atau waktu dimulainya responden bekerja sebagai supir angkutan umum sampai saat dilakukannya penelitian. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap 20 responden diperoleh kelompok masa kerja 16-20 tahun memiliki kadar Hb yang tidak normal tertinggi yaitu sebanyak 4 orang (80%) dan yang memiliki kadar Hb yang tidak normal terendah adalah kelompok lama terpapar 6-10 tahun yaitu 0 orang (0%).

Dari data diatas dapat diketahui bahwa masa kerja yang semakin lama memiliki potensi untuk meningkatkan kadar timbal dalam darah dan mempengaruhi kadar Hb dalam darah karena salah satu efek dari timbal

adalah memengaruhi sistem haemoglobin dalam darah. penelitian ini juga didukung oleh penelitian Nurjazuli dkk (2003) pada operator SPBU di Samarinda yang membuktikan bahwa lama kerja merupakan faktor yang dominan terhadap tingginya kadar timbal dalam darah. Hal ini disebabkan karena timbal mempunyai sifat akumulatif sehingga bila seseorang berada pada kondisi udara yang tercemar oleh timbal maka tubuh akan mengandung timbal yang terhirup sebagai aktivitas pernafasan. Dengan kata lain semakin lama masa kerja supir angkutan umum maka akan semakin tinggi resiko terjadinya peningkatan kadar timbal dan memengaruhi status kesehatan terutama pada Hb yang rendah karena salah satu dampak dari timbal memengaruhi kadar Hb dalam darah.

Hampir serupa dengan hasil penelitian Sinta (2012) tentang masa kerja bahwa masa kerja yang lama akan meningkatkan kadar timbal dalam tubuh dengan hasil responden terbanyak mengandung timbal dalam urinnya adalah yang memiliki masa kerja 6- 15 tahun dan 16-25 tahun sebanyak 6 orang (40,0%).

Bayak sistem didalam tubuh, sehingga dapat menurunkan status kesehatan seseorang karena efek dari timbal atau keracunan akibat timbal dapat dirasakan pada saat penurunan sistem sistem imun dan pemaparan terus-menerus.

5. Kadar Hb menurut Lama Terpapar

Dari hasil penelitian diperoleh gambaran Pada tabel 5.12 menunjukkan bahwa dari 20 responden dari jumlah 17 (100%) yang mempunyai lama terpapar selam >8 memiliki kadar hb tidak normal tertinggi yaitu sekitar 12 (70,6) . Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sinta (2012) Dari 15 reponden yang diteliti, lama paparan >8 jam/hari memiliki persentase tertinggi yaitu 60% yang tidak normal kadar timbal dalam urinnya. Apabila timbal dalam tubuh terus meningkat dan darah terkontaminasi oleh timbal maka timbal akan mengganggu sistem haemoglobin singga sel darah merah mudah rusak dan mengakibatkan anemia.

Dengan lamanya seseorang bekerja >8 jam/hari secara terus menerus akan mengurangi jam istirahat yang mengakibatkan tubuh akan terus terpapar oleh timbal dan mengakibatkan kondisi tubuh dan sistem imunitas akan semakin turun. Normalnya jam kerja seseorang bekerja dalam satu hari yaitu ± 8 jam karena tubuh akan membutuhkan istirahat yang optimal untuk memulihkan seluruh organ yang telah digunakan pada saat bekerja. Tubuh manusia telah diatur sedemikian rupa dimana setiap organnya memiliki waktu untuk beristirahat dan pemulihan.

Pada saat tidur, semua otot beristirahat dan sistem saraf kita dibebaskan dari segala ketegangan, kekerasan yang sering terjadi tiap-tiap hari. Inilah saatnya dimana tubuh memperbaiki dirinya.

Sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al Furqaan (25) : 47 dan surah Al Naba ayat 10 dan 11 sebagai berikut :

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ سَأَلْتَهُ الظَّنَّ فَذَرْهُ لَا يَنْفَعُكَ مِنَ الظَّنِّ شَيْءٌ﴾
 ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ سَأَلْتَهُ الظَّنَّ فَذَرْهُ لَا يَنْفَعُكَ مِنَ الظَّنِّ شَيْءٌ﴾
 ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ سَأَلْتَهُ الظَّنَّ فَذَرْهُ لَا يَنْفَعُكَ مِنَ الظَّنِّ شَيْءٌ﴾

Terjemahnya : *Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.*

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَأْتِي وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾
 ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَأْتِي وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾
 ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَأْتِي وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ﴾

Terjemahnya : *Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.*

Alangkah halus ibarat yang dinyatakan Tuhan pada ayat diatas.

Apabila segala tenaga dan energi kita telah kita tumpahkan bagi kepentingan hidup kita di siang hari, bertani, berniaga, berusaha, berkantor, dan belajar. Dan malam hari kita dapat beristirahat dengan beristirahat dapat membawa pemulihan dan penambahan kekuatan setelah digunakan, tidur merupakan faktor yang penting dalam beristirahat, dimanana keadaan saat otak, pikiran dan tubuh diberi kesempatan untuk beristirahat. Makna “beristirahat” dalam hal ini berbeda dengan “berhenti atau tidak sadar”, tetapi cenderung memiliki arti “sadar, tetapi tidak diaktifkan”. malam sebagai pakaian karena malam itu gelap menutupi jagat sebagai pakaian menutupi manusia dan pada pagi hari kembali bekerja untuk mencari rezeki dan melakukan aktivitas.


6. Kadar Hb menurut Kebiasaan Merokok

Dari hasil penelitian menggambarkan Pada tabel 1.14 menunjukkan bahwa dari 20 responden diperoleh kelompok suka merokok memiliki kadar Hb yang tidak normal tertinggi yaitu sebanyak 13 orang (68,4%). Hal ini dikarenakan semua responden berjenis kelamin laki-laki yang melakukan kebiasaan merokok dan menurut teori salah satu pemicu dari Hb yang rendah dari banyak faktor yang mempengaruhi kadar Hb salah satunya adalah kebiasaan merokok, dimana rokok banyak mengandung senyawa toksik yang dapat memengaruhi sistem paru-paru, penurunan sistem kerja organ mempermudah timbal yang masuk kedalam sistem saluran pernafasan kemudian akan masuk ke jaringan paru-paru selanjutnya masuk kedalam pembuluh darah. Darah yang terkontaminasi oleh timbal akan memperpendek sel darah merah dan menurunkan kadar *ritikolosit* sehingga seseorang dapat mengalami anemia.

Semakin lama seseorang terpapar oleh timbal dan melakukan kebiasaan merokok maka memungkinkan akumulasi timbal didalam organ tubuh semakin meningkat dan mempengaruhi sistem kinerja organ.

Penelitian dari Hense Hw (1992) menyimpulkan bahwa kebiasaan merokok mempunyai hubungan kuat dengan peningkatan kadar timbal dalam darah dan selanjutnya menambah risiko kesehatan. Pada penelitian Einbenstener L (2005) juga menyimpulkan ada hubungan antara kadar

timbal dengan kebiasaan merokok karena kebiasaan merokok juga membantu absorpsi timbal melalui saluran pernapasan. Ada lebih dari 2000 substansi yang terdeteksi pada rokok termasuk nikotin dan CO. Substansi-substansi ini menyebabkan kelainan pada silia saluran pernafasan dan terjadi iritasi pada saluran pernafasan sehingga fungsi paru-paru akan terganggu terutama pada perokok berat sehingga absorpsi timbal yang masuk melalui saluran pernapasan akan lebih mudah .



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada supir angkutan umum di UIN Alauddin Makassar maka kesimpulannya yaitu sebagai berikut :

1. Dari 4 tempat titik pengukuran pada rute angkutan umum UIN diperoleh kadar Pb di udara semuanya memenuhi syarat baku mutu $2\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ yang ditetapkan oleh peraturan gubernur Sulawesi Selatan No 69 Tahun 2010.
2. Dari 20 responden diperoleh kelompok umur 41-50 tahun, sebanyak 5 responden (83%), dan kelompok umur 51-60 sebanyak 4 responden (100,0%) merupakan persentase tertinggi yang kadar Hb tidak normal.
3. Dari 20 responden, kelompok yang lama terpapar selama >8 Jam memiliki kadar Hb tidak normal persentasenya sebanyak 12 responden (70,6).
4. Dari 20 responden diperoleh kelompok lama terpapar 16-20 tahun memiliki kadar Hb yang tidak normal yaitu sebanyak 4 responden (80%).
5. Dari 20 responden diperoleh kelompok suka merokok memiliki kadar Hb yang tidak normal tertinggi yaitu sebanyak 13 orang (68,4%).

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian yang dilakukan pada supir angkutan umum di UIN Alauddin Makassar yaitu sebagai berikut :

1. Supir angkutan umum sebaiknya menggunakan alat pelindung diri (APD) berupa masker pada saat bekerja .
2. Bagi Dinas Kesehatan Kota Makassar agar memberikan penyuluhan tentang pengaruh timbal terhadap kesehatan dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur pada supir angkutan umum yang berada di kota Makassar untuk memantau kadar timbal dalam tubuhnya sebagai resiko atas pekerjaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al quran dan Terjemahannya. 1990. Depertemen Agama Republik Indonesia.PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Arby. 2011. *Efek Toksik Timbal Merkuri dan Cadmium*
<http://arbybrilliant.blogspot.com/2011/01/efek-toksik-timbal-merkuri-dan-cadmium.html>. (Online) Di akses tanggal 5 Juli 2012.
- Ariesthya, Dian. 2006. *Studib Kadar Timbal Dalam Darah Tukang Ojek di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai Makassar : Makassar*.
- Baits, Muzakkir. 2009. *Uji Kadar Timbal (Pb) Dalam Darah Anak Jalanan Kota Makassar Akibat Terpapar Emisi Kendaraan Bermotor*. isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/131092530.pdf. Diakses tanggal 5 Juli 2012.
- Cahyadi, Wisnu. 2002. *Mekanisme Keracunan Timbal* (Online). (<http://www.cakrawala.com>). Diakses tanggal 12 Juni 2012.
- Darmono. 1995. *Logam Dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup*. UI-Press: Jakarta.
- Darmono, 2001. *Lingkungan Hidup dan Pencemaran Hubungannya dengan Toksikologi Senyawa Logam*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Dewi, Ratna Sari. 2009. *Analisis kadar timbal udara, darah dan dampaknya terhadap kadar haemoglobin pedagang pasar ambon*. <http://sjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/3109410.pdf> diakses tanggal 5 juli 2012.
- Eibensteiner L, Sanz ADC, Frumkin H.2005. *Lead exposure and semen quality among trafjfic police in Arequipa Peru*. *Internasional journal of Occupational and Environmental Healt*. 11,2. P. 161-353.
- Fardiaz, S. ; 1994. *Polusi Air dan Udara*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Fitriah, Wahyuni Wulan. 2011. *Faktor yang Berhubungan dengan Resiko Kecelakaan Kerja di Depertemen Produksi PT. Maruki Internasional Indonesia di Makassar : Makassar*.
- Gassing, A. Qadir. 2008. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Alauddin Press: Makassar.
- Ghazali, Muhammad. "Al Qur'an dan Lingkungan". 29 Mei 2008.
- Hatijah. 2008. *Faktor Resiko Kejadian Kecelakaan Kerja pada Perusahaan PT. Sermani Steel di Makassar Tahun 2006-2007 : Makassar*.

- Hense Hw, Filipiak B, Novak L, Stopler M. 1992. *Monoccupational determinants of blood lead concentracion in a general population*. International Journal of Epidemiologi.
- Hayati, Ummi. 2005. *Studi Kadar Timbal Dalam Darah Pedagang Kaki Lima di Terminal Tamalate. Kota Makassar Tahun 2005*. Skripsi sarjana tidak diterbitkan, FKM Universitas Hasanuddin.
- Hillman, R.S., Ault, K.A., and Rinder, H.H.M., 2005. *Normal Erythropoiesis*. In: *Hematology in Clinical Practice*. 4th ed. McGraw-Hill Companies, Inc: 1-11.
- Joko Suyono. 1995. *Deteksi dini penyakit akibat kerja (World Health Organization)*. Editor : Caroline Wijaya. EGC Penerbit Buku Kedokteran. Jakarta.
- Jurnalnet.com, 2007, *Hipertensi Sebagai "The Silent Killer"*.
- Mukono, H.J. 2003. *prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Made, Dr. 2008. *Anemia, Suplementasi, Iron Zinc dan Antisipasi Anemia*. Didownload dari situs <http://www.blogdokter.net> pada tanggal 13 Mei 2012.
- Mukono, H.J. 2008. *prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Nasution, Siti Khadijah. 2004. *Meningkatkan Status Kesehatan Melalui Pendidikan Kesehatan Dan Penerapan Pola Hidup Sehat*. library.usu.ac.id/download/fkm/fkm-siti%20khadijah.pdf. Diakses tanggal 10 Juli 2012.
- Noor Nasry Noer, 1997, *Dasar Epidemiologi*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Nukman, A. 2000. *Dampak Kesehatan Lingkungan Akibat Pencemaran Timbal* Jakarta.
- Nurjasuli dkk. 2003. *Hubungan Lama Kerja Dengan Kadar Timah Hitam Dalam Darah Operator SPBU di Samarindah Kalimantan Timur*. Media kesehatan masyarakat Indonesia.
- Palar. H. 2008. *Pencemaran dan toksikologi logam berat*. Rineka cipta. Jakarta.
- Prabu, Putra. 2008. *Pencemaran Udara*. <http://putraprabu.wordpress.com/2008/12/12/pencemaran-udara/>. Diakses tanggal 5 Juli 2012.

- Retno, Novita. 2003. *Studi Tentang Kecelakaan kerja pada Karyawan PT. Dwimanunggal Raksa Tahun 2003 Kotamadya Balikpapan : Makassar.*
- Ryadi,S., 1982, *Pencemaran Udara, Penerbit Usaha Nasional.*
- Sastrawijaya, A Tresna. 2000. *Pencemaran Lingkungan. Rineka Cipta: Jakarta.*
- Shihab. M Quraish. 2009. *Tafsir Al-MISBAH Vol. 5 : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Edisi baru Cet. I. Lentera Hati: Jakarta.*
- Shihab. M Quraish. 2009. *Tafsir Al-MISBAH Vol. 10 : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Edisi baru Cet. I. Lentera Hati: Jakarta.*
- Sinta. 2012. *kadar Timbal (Pb) Dalam Urin Supir Angkutan Umum UIN Alauddin Makassar.* Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Makassar: Makassar.
- Soedomo,M, 2001,*Pencemaran Udara, Penerbit ITB, Bandung*
- Suciani, Sri. 2007. *Kadar Timbal Dalam Darah Polisi Lalu Lintas Dan Hubungannya Dengan Kadar Hemoglobin.* eprints.undip.ac.id/15877/C/Sri_Suciani.pdf. Diakses tanggal 5 Juli 2012.
- Sumantri, Arif. 2010. *Kesehatan Lingkungan dan Perspektif Islam.* Kencana: Jakarta.
- Sutomo. 2000. *Tingkat Keracunan Pb pada Balita di Daerah DIY Yogyakarta :* Universitas Gadjah Madha.
- Wardhana, Wisnu Arya. 1995. *Dampak Pencemaran Lingkungan.* Jogjakarta: Andi Offset
- Wardana, *Dampak Pencemaran Lingkungan, Andi Offset, Yogyakarta;2004*
- Widianti, Wiwi. 1994. *Pengaruh Gas Buangan Kendaraan Bermotor Terhadap kadar Timbal Dalam Darah Pedagang Kaki lima di Yogyakarta.* Yogyakarta. Tesis Progam Pascasarjana UGM.
- World Health Organization (WHO). *Environmental Health.* Disitasi dari :<http://www.WHO.int>. Last Update : 12 Juni 2012

RIWAYAT HIDUP PRNULIS



GLADIS SANTI DEWI, lahir di ujung pandang, 5 Agustus 1990, yang merupakan anak pertama dari lima bersaudara. Penulis mengawali pendidikan formalnya di :

1. SD Negeri 34 Impres Tumalia dari tahun 1995- 2002
2. SMP Negeri 1 Mandai tahun 2002-2005
3. SMA Negeri 15 Makassar tahun 2005-2008

Selanjutnya penulis meneruskan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sebagai angkatan keempat pada Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Lingkungan Tahun 2008 sampai sekarang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR