

**KARAKTERISTIK DAN PEMERIKSAAN ANTENATAL PADA
IBU MELAHIRKAN DENGAN KOMPLIKASI PERSALINAN
DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
MAKASSAR PERIODE JANUARI – JULI 2011**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

ALAUDDIN
M A K A S S A R


Oleh :

H U S N I A H
NIM.70300107058

**PRODI KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 19 Agustus 2011

Penyusun

HUSNIAH
NIM . 70300107058

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Karakteristik dan Pemeriksaan Antenatal pada Ibu Melahirkan dengan Komplikasi Persalinan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar periode Januari-Juli 2011**” yang disusun oleh **HUSNIAH, NIM : 70300107058**, Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari **Jum’at 19 Agustus 2011 M**, bertepatan dengan **19 Ramadhan 1432 H** dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana keperawatan, (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 19 Agustus 2011

19 Ramadhan 1432 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Hj. Hariani, S.Kp, M.Kes (.....)
Sekretaris : Risnah, SKM, S. Kep, Ns, M. Kes (.....)
Penguji I : Hj. Andi Asriany, SKM, M. Kes (.....)
Penguji II : Misbahuddin, S. Ag, M. Ag (.....)

Diketahui Oleh:
Plt. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Ahmad Sewang, MA
NIP. 19520811 198203 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufiq hidayah dan Inayah-Nya sehingga skripsi dengan judul:

“Karakteristik dan Pemeriksaan Antenatal pada Ibu Melahirkan dengan Komplikasi Persalinan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar periode Januari-Juli 2011” dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh ujian akhir pada pendidikan Strata satu (SI), Jurusan ilmu keperawatan Fakultas kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Melalui penulisan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus, teristimewa untuk kedua orang tua tercinta ayahanda **H. Nasruddin** dan ibunda **Hj. Sugi** yang tak habis-habisnya dengan penuh cinta dan kasih sayang memberikan dukungan, motivasinya dalam berbagai bentuk serta doa restu yang terus mengiringi perjalanan kehidupan Peneliti. Saudaraku **Hj. Suarni**, Almarhum **Ismail, Nurlaelah, Nurliah**, serta keluarga besarku yang juga memberi dukungan serta doa restu. Terkhusus buat **uDhIku** yang selalu menjadi sumber inspirasi dan selalu menemani penulis selama penyusunan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, melalui kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT, MS** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Prof. Drs. H. Ahmad, M Sewang, M. A** selaku PLT Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. **Nur Hidayah S. Kep, Ns, M. Kes** selaku ketua prodi, Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan serta sebagai Ibu yang selalu memberikan motivasi dan pengetahuan yang luas kepada kami anak didiknya.
4. **Hj. Hariani, S. Kp, M. Kes** dan **Risnah, SKM, S. Kep, Ns, M. Kes** masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang dengan teliti memberikan bimbingannya dalam penyusunan proposal ini.
5. **Hj. Andi Asriany, SKM, M. Kes** dan **Misbahuddin, S. Ag, M. Ag** selaku Penguji I dan II yang telah memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan Skripsi ini.
6. Kepada pengelola dan staf Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar yang telah membantu peneliti dalam pengambilan data demi penyempurnaan tulisan.
7. Kepada responden, karena data yang diperoleh mengenai responden telah membantu banyak penulis dalam penelitian yang dilakukan.
8. Sahabat-sahabatku, **k'Dila, k'Milda, Cany, dha, Seria, Iphonk**. Miss All Forever.
9. Teman-temanku selama empat tahun terakhir menjalani pendidikan di UIN, **k'Chia, Badariah, Novy, Nenny, Uly, Anhy, Mas Santoso, Abang Fikar, Eka Ondeng**, kita bersama berbagi ilmu dan pengalaman, suka duka dan

keceriaan. Serta semua teman-teman Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang tak bisa Penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari masih sangat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam Skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran untuk kesempurnaan Skripsi ini sangat diharapkan.

Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, baik itu bagi Penulis pribadi, Dunia Keperawatan, Dunia Pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Amiin...

Wabillahitaufiq walhidayah wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 19 Agustus 2011



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Penulis
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Persalinan	8
B. Tinjauan Umum Tentang Komplikasi Persalinan	10
C. Tinjauan Umum Tentang Karakteristik Ibu	15
D. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Antenatal	21
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti	33
B. Kerangka Konseptual	33
C. Kerangka Kerja	34

D. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif	35
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	39
B. Populasi dan Sampel	39
C. Pengumpulan Data	40
D. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
E. Pengolahan Data	41
F. Analisis Data	41
G. Etika Penelitian	42
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan	48
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kerangka Konsep	33
Gambar 3.2	Kerangka Kerja	34



DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan	44
Tabel 5.2	Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan	44
Tabel 5.3	Distribusi Responden Berdasarkan Agama	45
Tabel 5.4	Distribusi Responden Berdasarkan Usia Ibu	45
Tabel 5.5	Distribusi Responden Berdasarkan Paritas	46
Tabel 5.6	Distribusi Responden Berdasarkan Jarak Kehamilan	47
Tabel 5.7	Distribusi Responden Berdasarkan Pemeriksaan Antenatal	47
Tabel 5.8	Distribusi Responden Berdasarkan Komplikasi Persalinan	48



ABSTRAK

Nama : Husniah
Nim : 70300107058
Judul : Karakteristik dan Pemeriksaan Antenatal pada Ibu Melahirkan dengan Komplikasi Persalinan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar periode Januari-Juli 2011

Skripsi ini mengangkat pokok masalah tentang bagaimana karakteristik dan pemeriksaan antenatal pada ibu melahirkan dengan komplikasi persalinan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar periode Januari-Juli 2011. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dan pemeriksaan antenatal pada ibu melahirkan dengan komplikasi persalinan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar periode Januari-Juli 2011. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *survey deskriptif* dengan jenis penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampel secara *total sampling*. Jumlah populasi sebanyak 104 orang dengan sampel sebanyak 52 orang dengan melihat status rekam medik responden. Analisis data yang digunakan yaitu analisis univariat dengan menggunakan program SPSS.

Berdasarkan hasil analisis univariat, diperoleh gambaran mengenai karakteristik dan pemeriksaan antenatal pada ibu melahirkan dengan komplikasi persalinan yang menunjukkan karakteristik usia risiko tinggi sebanyak 36 orang (69,2%), paritas risiko rendah sebanyak 31 orang (59,6%), dan jarak kehamilan risiko tinggi sebanyak 42 orang (80,8%) serta pemeriksaan antenatal yang tidak lengkap sebanyak 33 orang (63,5%).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator yang mencerminkan status kesehatan ibu. Diperkirakan setiap tahunnya berkisar 600.000 ibu di dunia meninggal ketika melahirkan, ini berarti seorang ibu meninggal hampir setiap menit karena komplikasi dalam kehamilan maupun persalinannya (Harjono, 2011).

Menurut data *World Health Organization* (WHO) tercatat AKI di Afrika sebanyak 900 per 100.000 kelahiran hidup (KH), Amerika sebanyak 99 per 100.000 KH, Asia sebanyak 450 per 100.000 KH, Eropa sebanyak 27 per 100.000 KH, Pasifik Barat sebanyak 82 per 100.000 KH, dan Australia sebanyak 420 per 100.000 KH. AKI tertinggi kedua adalah Asia (WHO, 2008).

Menurut WHO pada tahun 2008 sebanyak 536.000 ibu hamil meninggal pada saat persalinan, sedangkan pada tahun 2009 berkisar 585.000 ibu meninggal akibat masalah kehamilan dan persalinan, bahkan separuh jumlah seluruh kematian terjadi dalam 24 jam setelah melahirkan yang disebabkan karena perdarahan (50%), infeksi (30%), dan eklampsia (20%) (Anonim, 2009).

Indonesia sebagai negara berkembang masih memiliki AKI cukup tinggi. “Tahun 2008 kematian ibu melahirkan mencapai 307 per 100.000 KH. Angka ini 65 kali lipat kematian ibu di Singapura, 9,5 kali lipat dari Malaysia, bahkan

2,5 kali lipat dari Filipina,” kata Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof.Dr. Dewi Fortuna Anwar (Webmaster, 2009).

Hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2008 menunjukkan bahwa AKI di Indonesia sebesar 307 orang per 100.000 KH, menurun menjadi 248 orang per 100.000 KH pada tahun 2009. Pada tahun 2010 meurun menjadi 226 orang per 100.000 KH. Hal ini menunjukkan AKI cenderung terus menurun. Tetapi bila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai secara nasional pada tahun 2015, yaitu sebesar 102 per 100.000 KH, maka apabila penurunannya masih seperti tahun-tahun sebelumnya, diperkirakan target tersebut di masa mendatang sulit tercapai. Mortalitas dan morbiditas pada wanita hamil dan bersalin merupakan masalah besar negara miskin dan berkembang, seperti Indonesia.

Pada tahun 2008, terdapat 307 ibu per 100.000 KH yang meninggal di Indonesia yang diakibatkan masalah seputar kehamilan, nifas, dan persalinan. Adapun penyebab langsung dari kematian ibu adalah perdarahan 55%, eklampsia 24%, infeksi 11%, partus lama 5%, dan abortus 5%.

Faktor predisposisi ibu turut menambah besar risiko kematian maternal. Jumlah paritas satu dan paritas di atas tiga telah terbukti meningkatkan angka kematian maternal dibanding paritas 2-3, selain itu faktor umur ibu melahirkan juga menjadi faktor kematian ibu, di mana usia muda yaitu \square 20 tahun dan usia \square 30 tahun pada saat melahirkan menjadi faktor risiko kematian maternal,

sedangkan jarak antara tiap kehamilan yang dianggap cukup aman adalah 3-4 tahun (BKKBN, 2010).

Komplikasi persalinan, kehamilan, dan nifas merupakan penyebab terbesar kematian ibu di Indonesia. Melalui upaya *safe motherhood* diharapkan dapat menyelamatkan wanita agar kehamilan dan persalinan dapat dilalui dengan sehat dan aman tanpa disertai dengan komplikasi. Pelayanan antenatal merupakan salah satu upaya untuk mengurangi kejadian komplikasi persalinan yang diharapkan dapat menurunkan AKI menjadi 102 per 100.000 KH pada tahun 2015.

Jumlah AKI yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 sebanyak 116 orang per 100.000 KH, sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 114 kematian per 100.000 KH. Untuk tahun 2010 jumlah AKI mengalami penurunan menjadi 121 orang per 100.000 KH.

Pada tahun 2008, AKI tertinggi di tiga kabupaten di Sulawesi Selatan yaitu Selayar sebanyak 12 orang, penyebabnya karena perdarahan (7 kasus), eklampsia (3 kasus), dan infeksi (2 kasus). Gowa sebanyak 11 orang disebabkan karena perdarahan (8 kasus), eklampsia (1 kasus), dan infeksi (2 kasus). Bulukumba sebanyak 10 orang yang disebabkan oleh perdarahan (5 kasus), eklampsia (3 kasus), dan penyebab lain (2 kasus). Sedangkan di Makassar sendiri sebanyak 2 kasus, disebabkan karena perdarahan (1 kasus) dan penyebab lain (1 kasus).

Pada tahun 2009, diperoleh data AKI yaitu Maros sebanyak 19 orang yang disebabkan oleh perdarahan (13 kasus), eklampsia (4 kasus), dan

penyebab lain (2 kasus). Pinrang 11 orang disebabkan karena perdarahan (6 kasus), eklampsia (4 kasus), dan penyebab lain (1 kasus). Bulukumba sebanyak 8 orang, penyebabnya perdarahan (2 kasus), eklampsia (5 kasus), dan infeksi (1 kasus). Sedangkan di Makassar sendiri sebanyak 4 orang disebabkan karena perdarahan (2 kasus), dan infeksi (2 kasus).

Pada tahun 2010, AKI tertinggi di Gowa sebanyak 12 orang disebabkan karena perdarahan (6 kasus), eklampsia (4 kasus), dan penyebab lain (2 kasus). Bantaeng sebanyak 11 orang yang disebabkan karena perdarahan (7 kasus), eklampsia (2 kasus), partus lama (1 kasus), dan penyebab lain (1 kasus). Bulukumba sebanyak 9 orang dengan penyebab perdarahan (3 kasus), eklampsia (3 kasus), dan penyebab lain (3 kasus). Sedangkan di Makassar sendiri sebanyak 3 orang disebabkan karena perdarahan (1 kasus), dan penyebab lain (2 kasus) (Profil Dinkes Sulsel, 2011).

Dalam upaya pencegahan terjadinya komplikasi persalinan perlu lebih ditingkatkan kualitas pelayanan antenatal pada ibu hamil, sehingga deteksi dini terhadap ibu hamil yang mempunyai faktor risiko tinggi dapat dilakukan dengan baik serta melakukan penanganan secepat mungkin.

Diperoleh data dari Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan tentang jumlah kunjungan pemeriksaan ANC pada tahun 2008 sebanyak 336.384 ibu dari jumlah penduduk sebanyak 7.565.620 jiwa. Di Makassar sebanyak 55.059 ibu yang melakukan pemeriksaan ANC dari jumlah penduduk 1.193.434 jiwa.

Pada tahun 2009, dari jumlah penduduk sebanyak 7.795.711 jiwa terdapat sebanyak 328.434 ibu yang memeriksakan kehamilannya. Di

Makassar sebanyak 56.306 ibu yang memeriksakan kehamilannya dari jumlah penduduk sebanyak 1.253.656 jiwa.

Pada tahun 2010, dengan jumlah penduduk sebanyak 8.032.551 jiwa terdapat sebanyak 333.711 ibu yang melakukan pemeriksaan ANC. Di Makassar sebanyak 57.702 ibu yang melakukan pemeriksaan ANC dari jumlah penduduk sebanyak 1.339.374 jiwa (Profil Dinkes Sulsel, 2011).

Melalui survey data awal di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar 2010, sekitar 3357 ibu yang melahirkan, terdapat 132 (3,93%) yang mengalami komplikasi pada saat persalinan. Sedangkan pada tahun 2011 periode Januari-Juli, sekitar 2593 ibu yang melahirkan terdapat 104 (4,01%) yang mengalami komplikasi persalinan. Sebanyak 54 (51,9%) kasus partus lama, 39 (37,5%) kasus eklampsia, dan 11 (10,6%) kasus perdarahan post partum.

Berdasarkan uraian masalah di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana karakteristik dan pemeriksaan antenatal pada ibu melahirkan dengan komplikasi persalinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Karakteristik dan Pemeriksaan Antenatal pada Ibu Melahirkan dengan Komplikasi Persalinan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar Periode Januari-Juli 2011 ?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Diketuinya karakteristik dan pemeriksaan antenatal pada ibu melahirkan dengan komplikasi persalinan di rumah sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar periode Januari-Juli 2011.

2. Tujuan khusus

- a. Diketuinya karakteristik usia pada ibu melahirkan dengan komplikasi persalinan di rumah sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar periode Januari-Juli 2011.
- b. Diketuinya karakteristik paritas pada ibu melahirkan dengan komplikasi persalinan di rumah sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar periode Januari-Juli 2011.
- c. Diketuinya karakteristik jarak kehamilan pada ibu melahirkan dengan komplikasi persalinan di rumah sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar periode Januari-Juli 2011.
- d. Diketuinya pemeriksaan antenatal pada ibu melahirkan dengan komplikasi persalinan di rumah sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar periode Januari-Juli 2011.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan yang telah ada tentang karakteristik dan

pemeriksaan antenatal pada ibu yang melahirkan disertai dengan komplikasi persalinan serta dapat dijadikan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan penelitian serta sebagai media untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama kuliah khususnya metodologi penelitian.

b. Bagi Institusi (universitas)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam pengajaran mata kuliah maternitas mengenai karakteristik ibu hamil yang berisiko mengalami komplikasi persalinan dan penanganan komplikasi persalinan.

c. Bagi Instansi (rumah sakit)

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dalam kebijakan pengembangan pelayanan kebidanan yang lebih baik sehingga deteksi dini terhadap risiko-risiko bahaya kehamilan bisa cepat ditangani.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Persalinan

Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 24 jam pada primigravida dan 18 jam pada multigravida (Winkjosastro, 2006 hal.23).

Persalinan adalah proses membuka dan menipisnya serviks, dan janin turun ke dalam jalan lahir atau proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala (Saifuddin, 2006 hal.100).

1. Persalinan menurut cara persalinan

- a. Partus biasa (normal/spontan) adalah proses lahirnya bayi pada presentase belakang kepala dengan tenaga ibu sendiri, tanpa bantuan alat-alat serta tidak melukai ibu dan bayi yang umumnya berlangsung kurang dari 24 jam.
- b. Persalinan buatan atau persalinan abnormal atau distosia, bila persalinan berlangsung dengan bantuan dari luar sehingga bayi dapat melahirkan pervaginam (ekstraksi forceps/cunam, ekstraksi vakum dan Sectio cecarea.

- c. Persalinan anjuran atau induksi persalinan bila persalinan mulai tidak dengan sendirinya tetapi berlangsung setelah pemberian oksitosin atau prostaglandin atau setelah pecah ketuban (Saifuddin, 2006 hal.102).

2. Tahapan persalinan normal, dibagi dalam 4 kala yaitu:

a. Kala I (kala pembukaan serviks)

Kala ini dimulai sejak timbulnya his dan mengeluarkan lendir yang bercampur darah ini berasal dari lendir kanalis servikalis karena serviks mulai membuka atau mendatar. Sedangkan darahnya berasal dari pembuluh-pembuluh kapiler yang berada di sekitar kanalis servikalis itu pecah karena pergeseran-pergeseran ketika serviks membuka.

Proses ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu:

- 1) Fase laten; berlangsung selama 8 jam, dimulai dari pembukaan nol sampai 3 cm dan his masih lemah dengan frekuensi his jarang.
- 2) Fase aktif; pembukaan mulai dari 4-10 cm dengan kecepatan pembukaan setiap 1 cm atau lebih (berlangsung 7 jam).

b. Kala II (kala pengeluaran)

Dimulai dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir dengan adanya dilatasi penuh serviks dan sempurna. Pada kala ini his menjadi lebih kuat dan lebih cepat, kira-kira 2 sampai 3 menit.

Tanda dan gejala kala II:

- 1) Ibu merasakan ingin mengedan bersamaan dengan terjadinya kontraksi.

- 2) Ibu merasakan meningkatnya tekanan pada rektum atau vagina dan hendak buang air besar.
- 3) Perineum terlihat menonjol.
- 4) Vulva dan anus terlihat membuka.
- 5) Peningkatan pengeluaran lendir dan darah.
- 6) Kepala telah turun di dasar panggul.
- 7) Berlangsung kira-kira 2 jam pada primigravida dan 1 jam pada multigravida.

c. Kala III (kala pengeluaran plasenta)

Dimulai sejak lahirnya bayi sampai lahirnya plasenta berlangsung selama 30 menit setelah janin keluar dan disertai dengan pengeluaran darah.

d. Kala IV (kala pengawasan/masa nifas)

Dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam post partum (Arif, 1999 hal 291).

B. Tinjauan Umum Tentang Komplikasi Persalinan

Sebagian besar kehamilan dan persalinan akan mempunyai hasil yang menggembirakan yaitu ibu dan bayi lahir sehat. Namun sebagian ibu hamil akan menghadapi kegawatan dengan derajat ringan sampai berat yang dapat memberikan bahaya terjadinya ketidaknyamanan, ketidakpuasan, kesakitan, kecacatan bahkan kematian bagi ibu dan atau bayinya, terutama pada kelompok ibu hamil risiko tinggi maupun ibu hamil risiko rendah yang mengalami komplikasi pada persalinan.

Besarnya kemungkinan terjadinya komplikasi persalinan pada setiap ibu tidak sama, tergantung keadaan selama kehamilan apakah ibu hamil tersebut tanpa masalah termasuk kelompok kehamilan risiko rendah, atau ibu hamil dengan masalah/faktor risiko, yaitu kehamilan risiko tinggi dan kehamilan risiko sangat tinggi.

Komplikasi persalinan adalah semua masalah yang membahayakan ibu yang terjadi selama persalinan sampai dengan masa nifas. Sebagian komplikasi persalinan, kejadiannya tidak dapat diduga sebelumnya ataupun tidak dapat dihindari. Komplikasi persalinan yang sering terjadi adalah perdarahan pasca persalinan, persalinan macet/persalinan lama, serta infeksi (Rochjati, 2003 hal.124).

1. Jenis komplikasi persalinan:

a. Partus Lama/Persalinan Lama

Persalinan dikatakan lama jika berlangsung lebih dari 24 jam untuk primigravida dan atau 18 jam bagi multigravida.

Persalinan yang lama disebabkan oleh:

- 1) Kontraksi (*power*) abnormal.
- 2) Defisiensi/keterlambatan dilatasi serviks.
- 3) Abnormalitas penurunan bagian presentasi janin (Liu, 2007 hal,132).

b. Eklampsia

Eklampsia adalah infeksi dan perdarahan. Eklampsia merupakan kelainan akut pada wanita hamil dalam persalinan atau masa nifas yang ditandai dengan timbulnya kejang (bukan timbul akibat kelainan

neurologik) dan/atau koma dimana sebelumnya sudah menunjukkan gejala-gejala pre eklampsia.

Gejala-gejala pada eklampsia:

Tekanan darah $\geq 160/110$ mmHg (Tjandra, 2008 hal.285)

c. Perdarahan Post Partum

Menurut WHO (2002) Perdarahan postpartum adalah kehilangan darah sebanyak 500 ml atau lebih dari traktus genitalia setelah melahirkan. Kehilangan darah setelah bedah sesar rata-rata 1000 mL (Errol, 2007 hal.135). Perdarahan postpartum adalah perdarahan setelah bayi lahir, sedangkan tentang jumlah perdarahan, disebutkan sebagai perdarahan yang lebih dari normal dimana telah menyebabkan perubahan tanda vital (pasien mengeluh lemah, berkeringat dingin, menggigil, tekanan darah sistolik <90 mmHg, nadi >100 x/menit, kadar Hb <8 gr%) (Prawirohardjo, 2008 hal.523).

Ada dua jenis perdarahan post partum yaitu: perdarahan post partum primer (*early postpartum hemorrhage*) yang terjadi pada 24 jam pertama dan perdarahan postpartum sekunder (*late postpartum hemorrhage*) yang terjadi setelah 24 jam.

Penyebab Perdarahan PP:

1) Atonia uteri.

Atonia uteri adalah ketidakmampuan otot rahim untuk berkontraksi sehingga tidak mampu untuk menutup pembuluh darah yang terdapat pada tempat implantasi plasenta (Manuaba, 2003

hal.108). Atonia uterus adalah keadaan lemahnya tonus/kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. Faktor predisposisi terjadinya atonia uteri adalah sebagai berikut:

- (a) Regangan rahim berlebihan karena kehamilan gameli, polihidroamnion, atau anak terlalu besar.
- (b) Kelelahan karena persalinan lama.
- (c) Kehamilan grande-multipara.
- (d) Ibu dengan keadaan umum yang jelek, anemis, atau menderita penyakit menahun.
- (e) Mioma uteri yang mengganggu kontraksi rahim.
- (f) Infeksi intrauterin (korioamnionitis).
- (g) Ada riwayat pernah atonia uteri sebelumnya (Prawirohardjo, 2008 hal.524-525).

Faktor risiko atonia uteri mencakup overdistensi uterus (akibat kehamilan kembar, makrosomia janin), paritas tinggi, persalinan cepat atau memanjang, infeksi, atonia uterus sebelumnya, dan pemakaian obat perelaksasi uterus (Errol, 2007 hal.135).

2) Robekan uteri

Ruptur uteri adalah uterus yang ruptur dapat langsung terhubung dengan rongga peritoneum (komplet) atau mungkin dipisahkan darinya oleh peritoneum viseralis yang menutupi uterus atau oleh ligamentum latum (inkomplit) (Cunningham, 2005 hal.716).

Faktor risiko mencakup pembedahan uterus sebelumnya, persalinan terhambat, pemakaian oksitosin “berlebihan”, posisi janin abnormal, multiparitas grande dan manipulasi uterus dalam persalinan (persalinan dengan forsep, ekstraksi sungsang, dan insersi kateter tekanan intrauterin) (Errol, 2007 hal.135).

3) Retensio plasenta

Retensio plasenta adalah plasenta yang belum lepas setelah bayi lahir melebihi waktu setengah jam. Mungkin diakibatkan oleh tertinggalnya kotiledon atau lobus sekenturiat (terlihat pada 30 persen plasenta). Pemeriksaan plasenta dapat mengidentifikasi kelainan yang menunjukkan kemungkinan adanya potongan yang tertinggal. Faktor risiko mencakup pembedahan uterus sebelumnya, plasenta previa, kebiasaan merokok, dan multiparitas (Manuaba, 2003 hal.111).

2. Penanganan komplikasi

Bila ditemukan komplikasi segera lakukan tindakan rujukan dengan mengarah pada prosedur tetap rujukan dengan bidan mempersiapkan BAKSOKU, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. B (bidang): pastikan ibu/bayi/klien didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegawatdaruratan.
- b. A (alat): bawa perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan, seperti spuit, infus set, tensimeter, dan stetoskop.

- c. K (keluarga): beritahu keluarga tentang kondisi terakhir ibu (klien) dan alasan mengapa ia dirujuk. Suami dan anggota keluarga yang lain harus menerima Ibu (klien) ke tempat rujukan.
- d. S (surat): beri surat ke tempat rujukan yang berisi identifikasi ibu (klien), alasan rujukan, uraian hasil rujukan, asuhan, atau obat-obat yang telah diterima ibu (klien).
- e. O (obat): bawa obat-obat esensial diperlukan selama perjalanan merujuk
- f. K (kendaraan): siapkan kendaraan yang cukup baik untuk memungkinkan ibu (klien) dalam kondisi yang nyaman dan dapat mencapai tempat rujukan dalam waktu cepat.
- g. U (uang): ingatkan keluarga untuk membawa uang dalam jumlah yang cukup untuk membeli obat dan bahan kesehatan yang diperlukan di tempat rujukan (Harjono, 2011).

C. Tinjauan Umum Tentang Karakteristik Ibu

1. Usia ibu

Usia ibu sangat berpengaruh dalam suatu kehamilan dan persalinan. Dalam kurun reproduksi sehat dianjurkan agar usia ibu hamil antara 20-30 tahun karena dianggap paling ideal untuk menjalani kehamilan, persalinan dan nifas. Direntang usia ini kondisi wanita dalam keadaan prima dan optimal sehingga ibu dan bayinya berada dalam keadaan sehat. Disamping itu, rahim sudah mampu memberi perlindungan yang maksimal untuk kehamilan. Umumnya secara mentalpun siap yang berdampak pada perilaku merawat dan menjaga kehamilannya secara hati-hati (Haryono, 2004.).

Usia ibu \leq 20 tahun belum cukup matang dalam menghadapi kehidupan sehingga belum siap secara fisik dan mental dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. Pada umur tersebut rahim dan panggul ibu belum berkembang dengan baik hingga perlu diwaspadai kemungkinan mengalami persalinan yang sulit dan keracunan kehamilan atau gangguan lain karena ketidaksiapan ibu untuk menerima tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua.

Pengawasan pada ibu hamil dengan usia dibawah 18 tahun perlu diperhatikan karena sering terjadi anemia, hipertensi menuju preeklamsia/eklamsia, persalinan dengan berat badan lahir rendah, kehamilan disertai infeksi dan penyulit proses persalinan yang diakhiri dengan tindakan operasi (Kurniawati, 2009).

Sedangkan usia tua atau lebih dari 30 tahun sebagaimana wanita digolongkan pada kehamilan resiko tinggi dikurung usia ini, angka kematian ibu melahirkan dan bayi meningkat. Meskipun ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa usia 35 tahun masih dianggap cukup aman untuk hamil dan melahirkan karena merupakan masa transisi.

Dokter. Deliuazar, dokter ahli patologi mengungkapkan bahwa proses melahirkan pada perempuan berusia diatas 30 tahun beresiko menyebabkan terjadinya perdarahan. Biasanya, kondisi ini rentang terjadi pada ibu-ibu yang melahirkan anak pertama atau bagi ibu yang melahirkan anak ketiga atau keempat. Pada usia tersebut rahim sudah mulai kaku. Sederhananya peregangan rahim sudah tak fleksibel lagi, sehingga dapat menyebabkan

perdarahan. Namun tak semua perempuan yang memahami hal tersebut, sehingga banyak kasus perempuan hamil di usia di atas 30 tahun tak begitu peduli dengan kehamilannya. Padahal sebaliknya, kehamilan direntang usia tersebut memerlukan pengontrolan yang tepat ke dokter-dokter kandungan selama masa kehamilannya. WHO memberikan rekomendasi, bahwa usia yang dianggap paling aman menjalani kehamilan dan persalinan adalah 20 hingga 30 tahun.

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati pada tahun 2003 yang mengatakan bahwa usia ibu yang kurang dari 20 tahun atau lebih dari 30 tahun dikenal sebagai ibu dengan resiko tinggi sebagai salah satu batasan kelompok risiko ibu. Ibu yang berumur kurang dari 20 tahun dianggap berisiko karena organ reproduksinya dianggap belum begitu sempurna atau siap untuk menerima kehamilan, disamping secara kewajiban ibu muda relatif belum siap untuk hamil. Sedangkan ibu yang berumur di atas 30 tahun dianggap sudah terlalu tua, sehingga secara fisik sudah lemah untuk menanggung beban kehamilan, ditambah apabila ibu dengan paritas banyak, maka secara mental penghargaan terhadap kehadiran anak agak berkurang.

Semakin bertambah usia, semakin sulit hamil karena sel telur yang siap dibuahi semakin sedikit. Selain itu, kualitas sel telur juga semakin menurun. Itu sebabnya pada kehamilan pertama di usia lanjut, risiko perkembangan janin tidak normal dan timbulnya penyakit kelainan bawaan juga.

Meningkatnya usia juga membuat kondisi dan fungsi rahim menurun. Salah satu akibatnya adalah jaringan rahim tak lagi subur. Padahal, dinding rahim tempat menempelnya plasenta. Kondisi ini memunculkan kecenderungan terjadinya plasenta previa atau plasenta tidak menempel di tempat semestinya. Selain itu, jaringan rongga panggul dan otot-ototnya pun melemah sejalan pertambahan usia. Hal ini membuat rongga panggul tidak muda lagi menghadapi dan mengatasi komplikasi yang berat, seperti perdarahan. Pada keadaan tertentu, kondisi hormonalnya tidak seoptimal usia sebelumnya. Itu sebabnya risiko keguguran, kematian janin, dan komplikasi lainnya juga meningkat (Haryono, 2004).

2. Paritas anak

Paritas secara luas mencakup gravida/jumlah kehamilan, prematur/jumlah kelahiran, dan abortus/jumlah keguguran. Sedang dalam arti khusus yaitu jumlah atau banyaknya anak yang dilahirkan. Paritas dikatakan tinggi bila seorang ibu melahirkan anak keempat atau lebih. Seorang wanita yang sudah mempunyai tiga anak dan terjadi kehamilan lagi, keadaan kesehatannya akan menurun, sering mengalami kurang darah atau anemia, terjadi perdarahan lewat jalan lahir dan letak bayi sungsang ataupun melintang (Setianingrum, 2005).

Paritas dibedakan atas tiga yaitu:

- a. Nulipara adalah seorang wanita yang belum pernah menjalani kehamilan sampai janin mencapai viabilitas.

- b. Primipara adalah seorang wanita yang sudah menjalani kehamilan sampai janin mencapai tahap viabilitas.
- c. Multipara adalah seorang wanita yang sudah menjalani dua atau lebih kehamilan dan menghasilkan janin sampai tahap viabilitas.
- d. Grandemultipara adalah golongan ibu dengan paritas lebih dari 4 (Bobak, 2004 hal.213).

Grandemultipara kemunduran daya lentur (elastisitas) jaringan yang sudah berulang kali diregangkan oleh kehamilan membatasi kemampuan berkerut untuk menghentikan perdarahan sesudah persalinan. Disamping itu, banyak pula dijumpai tidak cukupnya tenaga untuk mengeluarkan janin yang disebut dengan merits uteri. Keadaan ini akan lebih buruk lagi pada kasus dengan jarak kehamilan yang singkat.

Banyak anak mempengaruhi kesehatan ibu dan anak. Paritas yang tinggi merupakan salah satu faktor risiko pada ibu hamil. Kematian neonatal pada persalinan pertama cukup tinggi, yang kedua paling rendah dan yang ketiga sedikit di bawah yang pertama, persalinan selanjutnya akan lebih tinggi. Hal ini dapat dijelaskan bahwa setiap kehamilan akan menyebabkan kelainan-kelainan pada uterus dalam hal ini kehamilan yang berulang-ulang menyebabkan rahim ibu tidak lagi sehat untuk kehamilan berikutnya. Hal ini dapat karena pada waktu melahirkan tidak dapat dihindari adanya kerusakan pada pembuluh darah dinding rahim sehingga menimbulkan kerusakan pada pembuluh darah dinding uterus yang mempengaruhi sirkulasi nutrisi kejanin dimana jumlah nutrisi akan berkurang dibanding pada kehamilan

sebelumnya keadaan ini dapat menyebabkan kematian pada bayi (Winkjosastro, 2007 hal.256).

Paritas satu dan paritas tinggi (lebih dari tiga) mempunyai angka kejadian perdarahan pasca persalinan lebih tinggi. Pada paritas anak yang rendah (paritas satu), ketidaksiapan ibu dalam menghadapi persalinan yang pertama merupakan faktor penyebab ketidakmampuan ibu hamil dalam menangani komplikasi yang terjadi selama kehamilan, persalinan dan nifas (Armawan, 2009).

3. Jarak kehamilan

Menurut anjuran yang dikeluarkan oleh badan koordinasi keluarga berencana (BKKBN) jarak kehamilan yang ideal adalah 2 tahun atau lebih, karena jarak kehamilan yang pendek akan menyebabkan seorang ibu belum cukup untuk memulihkan kondisi tubuhnya setelah melahirkan sebelumnya. Ini merupakan salah satu faktor penyebab kelemahan dan kematian ibu serta bayi yang dilahirkan. Menurut Sitorus (1999:16) bahwa risiko proses reproduksi dapat ditekan apabila jarak kehamilan minimal antara kelahiran 2 tahun (Setianingrum, 2005).

Kalau seorang wanita memberikan ASI secara sempurna hingga 2 tahun artinya dia tidak hamil selama dalam proses tersebut. Kehamilan itu sendiri membutuhkan perjuangan yang akan merepotkan seorang ibu dalam menyapih bayinya. Setelah 2 tahun barulah seorang ibu boleh hamil kembali dan proses kehamilan itu sendiri membutuhkan waktu hingga 9 bulan,

berarti jarak yang ideal bagi seorang ibu untuk mempunyai anak (melahirkan) adalah 2 tahun 9 bulan (Armawan, 2009).

Risiko terhadap kematian ibu dan anak meningkat jika jarak antara dua kehamilan \leq 2 tahun dan \leq 4 tahun. Jarak kehamilan yang aman adalah 2-4 tahun. Jarak antara dua kehamilan yang \leq 2 tahun berarti tubuh ibu belum kembali ke keadaan normal akibat kehamilan sebelumnya sehingga tubuh ibu akan memikul beban yang lebih berat. Jarak kehamilan dari kelahiran sebelumnya \leq 2 tahun, rahim dan kesehatan ibu belum pulih dengan baik, kehamilan dalam keadaan ini perlu diwaspadai karena adanya kemungkinan pertumbuhan janin yang kurang baik, mengalami persalinan yang lama dan perdarahan post partum. Sebaliknya jika jarak kehamilan antara dua kehamilan \leq 4 tahun, di samping usia yang sudah bertambah juga mengakibatkan persalinan berlangsung seperti kehamilan dan persalinan pertama (Haryono, 2004).

D. Tinjauan Umum tentang Antenatal Care

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin, dimana lamanya hamil normal adalah 280 hari atau 40 minggu atau 9 bulan 7 hari dihitung dari hari pertama haid terakhir.

Ditinjau dari usia kehamilan, maka kehamilan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Kehamilan trimester I, dimana usia kehamilan sekitar 0-12 minggu.
- b. Kehamilan trimester II, dimana usia kehamilan sekitar 12-28 minggu.
- c. Kehamilan trimester III, dimana usia kehamilan sekitar 28-40 minggu.

Proses kehamilan sampai kelahiran merupakan mata rantai satu kesatuan dari konsepsi, nidasi, pengenalan adaptasi ibu terhadap nidasi, pemeliharaan kehamilan, dimana kehamilan yang sehat dan kondisi fisik yang aman dan keadaan emosi yang memuaskan baik bagi ibu maupun janin adalah hasil akhir yang diharapkan dari perawatan maternitas supervisi dan pengawasan kesehatan yang konsisten sangat penting. Banyak adaptasi maternal yang tidak diketahui ibu hamil dan keluarganya. Seorang wanita baru dapat dikatakan hamil jika telah terlihat tanda pasti kehamilan. Pada wanita hamil terdapat tanda atau gejala, antara lain:

a. Tanda presumtif (dugaan hamil):

- 1) Amenorea.
- 2) Mual dan muntah.
- 3) Payudara membesar.
- 4) Sering miksi.
- 5) Pigmentasi kulit.

b. Tanda-tanda kemungkinan hamil:

- 1) Perut membesar.
- 2) Uterus membesar: terjadi perubahan dalam bentuk, besar, dan konsistensi dari rahim.
- 3) Uterus membesar ke salah satu jaringan sehingga menonjol jelas ke jurusan pembedahan tersebut yang dikenal dengan tanda Piskacek.
- 4) Serviks menjadi lembut dari keadaan keras seperti cuping hidung. Pada wanita hamil menjadi lebih lembut seperti bibir (tanda Hegar).

5) Ismus uteri menjadi lembut (softening) dan lebih padat (compressibility).

c. Tanda pasti hamil:

- 1) Gerakan janin dapat dilihat, dirasa, atau diraba, begitupun bagian-bagian janin.
- 2) Terdengarnya Denyut Jantung Janin (DJJ).
- 3) Pada pemeriksaan dengan foto Rontgen tampak kerangka janin (Saifuddin, 2008 hal.110-111) .

Sebagaimana dalam Q.S Ali Imran [3]: 41

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۖ قَالَ ءَايَتُكَ إِلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا زَمْرًا وَّادُّرُّكَ رَبَّنَا كَثِيرًا
وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ ﴿٤١﴾

Terjemahannya:

Berkata Zakariya: "Berilah aku suatu tanda (bahwa isteriku telah mengandung)." Allah berfirman: "Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah (nama) Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari" (Shihab, 2002 hal.105).

Ayat di atas menjelaskan ketika Allah menjawab permintaan hambanya, yang firmanNya memberikan penjelasan mengenai tanda pasti seorang wanita telah mengandung "bahwa engkau tidak bisa berkata apapun kecuali dengan isyarat, dan diperintahkan untuk senantiasa bertasbih di waktu petang dan pagi hari.

Kekuasaan Allah tidak hanya ditunjukkan dengan menciptakan bumi dan langit ini atau menjelaskan tentang tanda seorang wanita telah mengandung seperti yang dijelaskan pada ayat di atas. Ilmu yang dimiliki

oleh manusia yang bisa menciptakan berbagai macam teknologi dan menemukan berbagai macam teori dalam hal apapun yang juga merupakan bukti kekuasaan Allah. Salah satunya pengetahuan di bidang kesehatan yaitu bagaimana manusia bisa mengetahui tanda-tanda pasti yang bisa menguatkan bahwa seorang wanita telah mengandung (hamil) dengan melalui pemeriksaan kehamilan (*antenatal care*).

a. Pengertian *antenatal care*

- 1) Pemeriksaan atau pengawasan antenatal adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, sehingga mampu menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan memberikan ASI dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar.
- 2) Pelayanan antenatal adalah merupakan pelayanan kesehatan tenaga profesional untuk ibu selama masa kehamilannya, yang dilakukan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan.
- 3) Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilannya sesuai dengan standar pelayanan antenatal.

b. Tujuan pelayanan antenatal

Tujuan dari pelayanan antenatal menurut:

- 1) Mempromosikan dan menjaga kesehatan fisik dan mental ibu dan bayi dengan memberikan pendidikan gizi, kebersihan diri dan proses kelahiran bayi.

- 2) Mendeteksi dan menatalaksanakan komplikasi medis, bedah ataupun obstetrik selama kehamilan.
- 3) Mengembangkan persiapan persalinan serta rencana kesiagaan menghadapi komplikasi.
- 4) Membantu menyiapkan ibu untuk menyusui dengan sukses, menjalankan purperium normal, dan merawat anak secara fisik, psikologis dan social (Mufdlilah, 2009 hal.214).

Tujuan asuhan antenatal:

- 1) Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi.
- 2) Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu dan bayi.
- 3) Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan dan pembedahan.
- 4) Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat, ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin.
- 5) Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara optimal (Saifuddin, 2006 hal.120).

Dan dijelaskan pula dalam Q.S Al-A'raf [7]: 189

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا
حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَلَاحًا

لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Terjemahannya:

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur" (Shihab, 2002 hal.411).

Ayat di atas menjelaskan tentang kondisi yang dialami seorang ibu hamil mulai dari kondisi yang ringan sampai berat selama dia mengandung. Dan ketika dia merasa berat, keduanya memohon kepada Allah agar diberikan anak yang shaleh.

Pemeriksaan antenatal merupakan salah satu upaya kesehatan yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini komplikasi pada kehamilan atau risiko-risiko yang bisa membahayakan kehamilan sehingga bisa mencegah terjadinya komplikasi pada saat persalinan dengan melakukan pengawasan ibu hamil untuk menyiapkan fisik dan mental serta menyelamatkan ibu dan anak dalam kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Dengan begitu harapan untuk memperoleh anak yang shaleh bisa terwujud. Bahkan bukan hanya itu, bayi yang sehat serta keselamatan ibunya sendiri insya Allah mudah diperoleh.

Jadwal kunjungan ulang:

1) Kujungan I (16 minggu) dilakukan untuk:

- (a) Anamnesis lengkap, termasuk mengenai riwayat obstetrik dan ginekologi terdahulu.

- (b) Pemeriksaan fisik: tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu, bunyi jantung, bunyi pernapasan, edema dan lain-lain.
 - (c) Pemeriksaan obstetrik: usia kehamilan, besar uterus, bunyi jantung janin, pengukuran panggul luar.
 - (d) Pemeriksaan laboratorium: urin lengkap dan darah (Hb, leukosit, Gol.darah dan gula darah).
 - (e) Penilaian status gizi: dilihat dari keseimbangan berat badan dan tinggi badan atau lingkaran lengan atas (LILA).
 - (f) Nasehat ibu hamil: senam hamil, perawatan payudara, dan gizi ibu hamil.
 - (g) Perencanaan persalinan.
 - (h) Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya.
- 2) Kunjungan II (24-28 minggu) dan kunjungan III (32 minggu), dilakukan untuk:
- (a) Anamnesis: keluhan dan perkembangan yang dirasa oleh ibu.
 - (b) Pemeriksaan fisik dan obstetrik.
 - (c) Pemeriksaan USG: besar dan usia kehamilan, aktivitas janin, kelainan atau cacat bawaan, cairan ketuban dan letak plasenta serta keadaan plasenta.
 - (d) Penilaian risiko kehamilan.
 - (e) Pemberian imunisasi TT I, TT II dan pemberian tablet tambah darah (Fe).
 - (f) Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya.

(g) Mengulang perencanaan persalinan (MAP).

3) Kunjungan IV (36 minggu sampai lahir) dilakukan untuk:

- (a) Sama seperti kegiatan kunjungan II dan III.
- (b) Mengenali adanya kelainan letak dan presentasi.
- (c) Memantapkan rencana persalinan.
- (d) Mengenali tanda-tanda persalinan.

c. Jenis pelayanan

Pelayanan/asuhan standar minimal “ 7 T ” :

- 1) (Timbang) berat badan.
- 2) Ukur (Tekanan) darah.
- 3) Ukur (Tinggi) fundus uteri.
- 4) Pemberian imunisasi (Tetanus Toksoid) TT lengkap.
- 5) Pemberian Tablet zat besi, minimum 90 tablet selama kehamilan.
- 6) Tes terhadap Penyakit Menular Seksual.
- 7) Temu wicara dalam rangka persiapan rujukan (Saifuddin, 2006 ha.125-126).

Menurut Departemen Kesehatan RI, standar pelayanan antenatal ada 6:

1) Identifikasi ibu hamil

Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan motivasi ibu, suami, dan anggota keluarga agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini secara teratur.

Hasil yang diharapkan:

- (a) Ibu yang memahami tanda dan gejala kehamilan.
- (b) Ibu, suami dan masyarakat menyadari manfaat pelayanan kehamilan secara dini dan teratur, serta mengetahui tempat pelayanan.
- (c) Meningkatkan ibu hamil yang memeriksakan diri sebelum kehamilan 12 minggu.

2) Pemantauan dan pelayanan antenatal

Bidan memberikan sedikitnya 4 kali pelayanan antenatal.

Hasil yang diharapkan:

- (a) Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali selama kehamilan.
- (b) Meningkatnya pemantauan jasa bidan oleh masyarakat.
- (c) Deteksi dini dan penanganan komplikasi kehamilan.
- (d) Ibu hamil, suami, keluarga dan masyarakat mengetahui tanda bahaya kehamilan dan tahu apa yang harus dilakukan.
- (e) Mengurus transportasi rujukan jika sewaktu-waktu terjadi komplikasi.

3) Palpasi abdominal

Bidan melakukan pemeriksaan abdominal secara seksama dan melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan, bila umur kehamilan bertambah, memeriksa posisi, bagian terendah, masuknya kepala janin kedalam rongga panggul, untuk mencari kelainan serta melakukan rujukan tepat waktu.

Hasil yang diharapkan adalah:

- (a) Perkiraan usia kehamilan yang lebih baik.
- (b) Diagnosis dini kelainan letak dan merujuknya sesuai dengan kebutuhan.
- (c) Diagnosis dini kehamilan ganda dan kelainan lain, serta merujuknya sesuai dengan kebutuhan.

4) Pengelolaan anemia pada kehamilan

Bidan melakukan tindakan pencegahan, penemuan, penanganan atau rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan berlaku.

Hasil yang diharapkan:

- (a) Ibu dengan anemia berat segera dirujuk.
- (b) Penurunan jumlah ibu melahirkan dengan anemia.
- (c) Penurunan jumlah bayi baru lahir dengan anemia.

5) Pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan

Bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenali tanda serta gejala preeklampsia serta mengambil tindakan yang tepat untuk merujuk.

Hasil yang diharapkan adalah:

- (a) Ibu hamil dengan tanda preeklampsia mendapat perawatan yang memadai dan tepat waktu.
- (b) Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat eklampsia.

6) Persiapan persalinan

Bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami serta keluarganya pada trimester III, untuk memastikan bahwa persiapan persalinan yang bersih dan aman serta suasana yang menyenangkan akan direncanakan dengan baik, disamping persiapan transportasi dan biaya untuk merujuk bila terjadi keadaan gawat darurat.

Hasil yang diharapkan adalah:

- (a) Ibu hamil dan masyarakat tergerak untuk merencanakan persalinan yang bersih dan aman.
- (b) Persalinan direncanakan di tempat yang aman dan memadai.
- (c) Adanya persiapan sarana transportasi untuk merujuk ibu bersalin jika perlu.
- (d) Rujukan tepat waktu telah dipersiapkan bila diperlukan (Depkes RI, 2003).


d. Pengaruh ANC terhadap komplikasi persalinan

Pengaruh antenatal care terhadap komplikasi persalinan berhubungan langsung dengan kegiatan antenatal yang dilakukan secara rutin dan memenuhi standar pelayanan antenatal, jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar, deteksi dini risiko terjadinya komplikasi dapat dilakukan penanganan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan.

Melalui konsep *Safe Motherhood* yang merupakan upaya untuk menyelamatkan wanita agar kehamilan dan persalinannya sehat dan aman, serta kelahiran bayi yang sehat. Tujuan upaya *Safe Motherhood* untuk

menurunkan angka kematian ibu hamil, bersalin, nifas dan menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi baru lahir.

WHO mengembangkan konsep *Four Pillars Of Safe Motherhood* untuk menggambarkan ruang lingkup upaya penyelamatan ibu dan bayi. Empat pilar tersebut adalah keluarga berencana, asuhan antenatal, persalinan bersih dan aman, dan pelayanan obstetric esensial (WHO, 2008).



BAB III


KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti

Salah satu indikator keberhasilan suatu bangsa dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya kebidanan adalah menurunnya angka kematian ibu pada saat persalinan. Peranan penting dalam upaya pencegahan untuk mendeteksi secara dini kelainan atau penyakit pada ibu hamil ataupun janinnya, faktor-faktor risiko tinggi bahaya kehamilan sehingga bisa meminimalkan terjadinya komplikasi persalinan yang bertujuan sebagai salah satu cara untuk menurunkan angka kematian ibu.


Hal-hal di atas yang menjadi pertimbangan penulis dalam menyusun penelitian dengan titik perhatian pada karakteristik dan pemeriksaan antenatal pada ibu melahirkan dengan komplikasi persalinan.

A. Kerangka Konseptual



Gambar 3.1 Kerangka Konseep

B. Kerangka Kerja



Gambar 3.2 Kerangka Kerja

C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Karakteristik ibu

a. Usia Ibu

1) Definisi operasional

Yang dimaksud dengan usia ibu dalam penelitian ini adalah usia terakhir ibu terhitung mulai saat dilahirkan hingga saat penelitian dilakukan yang dinyatakan dalam satuan tahun.

2) Kriteria objektif

Risiko rendah : Jika umur pada waktu hamil dan melahirkan, 20-30 tahun.

Risiko tinggi : Jika umur pada waktu hamil dan melahirkan, 20 dan 30 tahun.

b. Paritas Anak

1) Definisi operasional

Yang dimaksud dengan paritas anak adalah jumlah persalinan, baik lahir hidup maupun lahir mati.

2) Kriteria objektif

Risiko rendah : Jika jumlah anak 2 dan 3.

Risiko tinggi : Jika jumlah anak 3 anak.

c. Jarak Kehamilan

1) Definisi operasional

Yang dimaksud dengan jarak kehamilan dalam penelitian ini adalah interval kehamilan sebelumnya dengan kehamilan terakhir.

2) Kriteria objektif

Risiko rendah : Jika jarak kehamilan 2-4 tahun.

Risiko tinggi : Jika jarak kehamilan \leq 2 tahun atau \geq 4 tahun.

2. Pemeriksaan Antenatal

a. Definisi operasional

Yang dimaksud dengan pemeriksaan antenatal adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh ibu hamil yaitu satu kali pada trimester I, satu kali pada trimester II, dan dua kali pada trimester III.

b. Kriteria objektif

Lengkap : Jika ibu melakukan pemeriksaan ANC \geq 4 kali selama masa kehamilannya, satu kali pada trimester I, satu kali pada trimester II, dan dua kali pada trimester III

Tidak lengkap : Jika ibu melakukan pemeriksaan ANC \leq 4 kali selama masa kehamilannya.

3. Komplikasi persalinan

a. Partus Lama

1) Definisi operasional

Partus lama atau persalinan lama adalah persalinan yang berlangsung lebih dari 18 jam bagi multigravida dan grandemultigravida.

2) Kriteria objektif

Partus lama : Jika persalinan berlangsung $>$ 18 jam bagi multigravida dan grandemultigravida.

Bukan partus lama : Jika persalinan berlangsung \leq 18 jam bagi multigravida dan grandemultigravida.

b. Eklampsia

1) Definisi operasional

Eklampsia merupakan kelainan akut pada wanita hamil dalam persalinan atau masa nifas yang ditandai dengan timbulnya kejang (bukan timbul akibat kelainan neurologik). Gejalanya tekanan darah \geq 160/110 mmHg.

2) Kriteria objektif

Eklampsia : Jika pada persalinan tekanan darah \geq 160/110 mmHg, disertai dengan kejang.

Bukan eklampsia : Jika pada persalinan tekanan darah $<$ 160/110 mmHg, disertai dengan kejang.

c. Perdarahan Post Partum

1) Definisi operasional

Yang dimaksud dengan perdarahan post partum dalam penelitian ini adalah kehilangan darah sebanyak 500 ml atau lebih dari 500 ml setelah bayi dilahirkan, baik perdarahan primer yang terjadi pada 24 jam pertama maupun perdarahan sekunder yang terjadi setelah 24 jam sampai hari ke 28 post partum, sebanyak 1000 ml atau lebih dari 1000 ml pada bedah sesar.

2) Kriteria objektif

Perdarahan post partum : Jika responden mengalami perdarahan \geq 500 ml pada saat persalinan normal dan \geq 1.000 ml pada bedah sesar.

Bukan perdarahan post partum : Jika responden mengalami perdarahan \leq 500 ml pada saat persalinan normal dan \leq 1.000 ml pada bedah sesar.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain yang digunakan adalah metode penelitian survey deskriptif dan jenis penelitian kuantitatif. Untuk mengetahui gambaran karakteristik dan pemeriksaan antenatal pada ibu melahirkan dengan komplikasi persalinan di rumah sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar periode Januari-Juli 2011.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari suatu variabel yang menyangkut masalah yang diteliti (Nursalam, Pariani, 2002). Populasi pada penelitian ini adalah semua ibu yang melahirkan disertai dengan komplikasi persalinan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar yang tercatat dalam rekam medik periode Januari-Juli 2011. Populasi pada penelitian ini sebanyak 104 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Nursalam, Pariani, 2002). Pada penelitian ini digunakan kriteria inklusi dan eksklusi. Setelah dieksklusikan jumlah sampel menjadi 52 orang.

3. Teknik *sampling*

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *total sampling* dimana untuk menjadi sampel adalah semua ibu yang melahirkan disertai dengan komplikasi persalinan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar yang tercatat dalam rekam medik periode Januari-Juli 2011 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi

a. Kriteria Inklusi:

- 1) Rekam Medik yang menyajikan data tentang komplikasi persalinan periode Januari-Juli 2011.
- 2) Ibu Multipara dan grandemultipara.

b. Kriteria Eksklusi:

Ibu Primipara.

C. Pengumpulan Data

Data sekunder

Data yang diperoleh dari pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar (rekam medik pasien) periode Januari-Juli 2011.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar pada bulan Agustus 2011.

E. Pengolahan Data

Pengolahan dan analisa data yaitu dengan menggunakan komputer dengan program SPSS, sebelum semua data dianalisa maka terlebih dahulu melakukan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Editing

Dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul. Yakni upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan.

2. Koding

Dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan data. *Coding* merupakan kegiatan pemberian kode numeric (angka) terhadap data yang terdiri atas beberapa kategori. Pemberian kode ini sangat penting, biasanya dibuat juga daftar kode untuk memudahkan kembali melihat lokasi dalam arti suatu kode dari suatu variabel.

3. Tabulasi data

Setelah selesai pembuatan kode selanjutnya dengan pengolahan data ke dalam satu tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki.

F. Analisis Data

Data hasil penelitian yang telah diolah kemudian dianalisis sebagai berikut:

Analisis univariat

Analisis univariat dilakukan terhadap setiap variabel dari hasil penelitian. Analisis ini akan menghasilkan distribusi dan presentase tiap-tiap variabel yaitu karakteristik ibu, pemeriksaan antenatal dan komplikasi persalinan.

G. Etika Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengajukan permohonan izin kepada pengurus Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar untuk persetujuan. Dengan menekankan pada masalah etik yang meliputi:

1. Lembar persetujuan dari instansi untuk melakukan penelitian (*Informed consent*)

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh instansi terlebih dahulu mendapat penjelasan tentang maksud dan tujuan serta dampak yang diteliti selama pengumpulan data, setelah instansi bersedia atau memberikan izin maka harus menandatangani lembar persetujuan penelitian.

2. Tanpa nama (*Anonimity*)

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak akan mencantumkan nama pada lembar observasi. Lembar tersebut hanya diiberi kode tertentu.

3. Confidentiality

Kerahasiaan data yang diperoleh mengenai responden dijamin oleh peneliti.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengantar

Penelitian ini dilaksanakan di ruang rekam medik RSIA Siti Fatimah Makassar dan pengambilan datanya dilakukan pada tanggal 08 sampai 14 Agustus 2011. Desain penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian survey deskriptif untuk mengetahui gambaran karakteristik dan pemeriksaan antenatal pada ibu melahirkan dengan komplikasi persalinan. Populasi pada penelitian ini sebanyak 104 orang. Setelah dieksklusikan diperoleh sampel sebanyak 52 orang karena terdapat 52 orang responden yang primipara.

Data hasil penelitian yang dikumpulkan dari rekam medik RSIA Siti Fatimah Makassar periode Januari-Juli 2011 dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut ini dipaparkan hasil analisis sesuai dengan variabel yang diteliti.

2. Analisis univariat

a. Karakteristik Responden

1) Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 5.1
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan di RSIA Siti
Fatimah
Makassar Periode Januari-Juli 2011

Pendidikan	N	%
SD	19	36,5%
SMP	6	11,5%
SMA	25	48,1%
S1	2	3,8%
Total	52	100%

Sumber: Data Sekunder Periode Januari-Juli 2011

Dari tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari 52 responden, mayoritas pendidikan responden adalah SMA yaitu sebanyak 25 orang (48,1%).

2) Distribusi responden berdasarkan pekerjaan

Tabel 5.2
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan di RSIA Siti
Fatimah
Makassar Periode Januari-Juli 2011

Pekerjaan	N	%
IRT	44	84,6%
Wiraswasta	6	11,5%
PNS	2	3,8%
Total	52	100%

Sumber: Data Sekunder Periode Januari-Juli 2011

Dari tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 52 responden, mayoritas pekerjaan responden adalah IRT yaitu sebanyak 44 orang (84,6%).

3) Distribusi responden berdasarkan agama

Tabel 5.3
Distribusi Responden Berdasarkan Agama di RSIA Siti Fatimah
Makassar Periode Januari-Juli 2011

Agama	N	%
Islam	46	88,5%
Kristen	6	11,5%
Total	52	100%

Sumber: Data Sekunder Periode Januari-Juli 2011

Dari tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 52 responden, mayoritas responden beragama Islam, yaitu sebanyak 46 orang (88,5%).

b. Variabel yang diteliti

1) Distribusi responden berdasarkan usia

Tabel 5.4
Distribusi Responden Berdasarkan Usia di RSIA Siti Fatimah
Makassar Periode Januari-Juli 2011

Usia	N	%
Risiko rendah (20-30 tahun)	16	30,8%
Risiko tinggi (≤ 20 & ≥ 30 tahun)	36	69,2%
Total	52	100%

Sumber: Data Sekunder Periode Januari-Juli 2011

Dari tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari 52 responden yang mengalami komplikasi persalinan terlihat bahwa usia ibu untuk kelompok risiko rendah (20-30 tahun) sebanyak 16 orang (30,8%) dan kelompok risiko tinggi (\leq 20 tahun dan \geq 30 tahun) sebanyak 36 orang (69,2%). Jadi, data yang terbanyak adalah kelompok usia risiko tinggi sebanyak 36 orang (69,2%).

2) Distribusi responden berdasarkan paritas

Tabel 5.5
Distribusi Responden Berdasarkan Paritas di RSIA Siti Fatimah
Makassar Periode Januari-Juli 2011

Paritas	N	%
Risiko rendah (2-3 anak)	31	59,6%
Risiko tinggi (\leq 3 anak)	21	40,4%
Total	52	100%

Sumber: Data Sekunder Periode Januari-Juli 2011

Dari tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari 52 responden yang mengalami komplikasi persalinan terlihat bahwa paritas ibu untuk kelompok risiko rendah (2-3 anak) sebanyak 31 orang (59,6%) dan kelompok risiko tinggi (\leq 3 anak) sebanyak 21 orang (40,4%). Jadi, data yang terbanyak adalah kelompok paritas risiko rendah sebanyak 31 orang (59,6%).

3) Distribusi responden berdasarkan jarak kehamilan

Tabel 5.6
Distribusi Responden Berdasarkan Jarak Kehamilan di RSIA
Siti Fatimah Makassar Periode Januari-Juli 2011

Jarak Kehamilan	N	%
Risiko rendah (2-4 tahun)	10	19,2%
Risiko tinggi (\leq 2 & \leq 4 tahun)	42	80,8%
Total	52	100%

Sumber: Data Sekunder Periode Januari-Juli 2011

Dari tabel 5.6 menunjukkan bahwa dari 52 responden yang mengalami komplikasi persalinan terlihat bahwa jarak kehamilan ibu untuk kelompok risiko rendah (2-4 tahun) sebanyak 10 orang (19,2%) dan kelompok risiko tinggi (\leq 2 dan \leq 4 tahun) sebanyak 42 orang (80,8%). Jadi, data yang terbanyak adalah kelompok jarak kehamilan risiko tinggi (\leq 2 tahun dan \leq 4 tahun) sebanyak 42 orang (80,8%).

4) Distribusi responden berdasarkan pemeriksaan antenatal

Tabel 5.7
Distribusi Responden Berdasarkan Pemeriksaan ANC di RSIA
Siti Fatimah Makassar Periode Januari-Juli 2011

Pemeriksaan ANC	N	%
Lengkap	19	36,5%
Tidak lengkap	33	63,5%
Total	52	100%

Sumber: Data Sekunder Periode Januari-Juli 2011

Dari tabel 5.7 menunjukkan bahwa dari 52 responden yang mengalami komplikasi persalinan terlihat bahwa pemeriksaan antenatal ibu yang tidak lengkap sebanyak 33 orang (63,5%) dan pemeriksaan antenatal ibu yang lengkap sebanyak 19 orang (36,5%). Jadi, data yang terbanyak adalah pemeriksaan antenatal ibu yang tidak lengkap sebanyak 33 orang (63,5%).

5) Komplikasi persalinan

Tabel 5.8
Distribusi Responden Berdasarkan Komplikasi Persalinan di RSIA Siti Fatimah Makassar Periode Januari-Juli 2011

Komplikasi Persalinan	N	%
Partus lama	19	36,5%
Eklampsia	25	48,1%
Perdarahan Post Partum	8	15,4%
Total	52	100%

Sumber: Data Sekunder Periode Januari-Juli 2011

Dari tabel 5.8 menunjukkan bahwa dari 52 responden yang mengalami komplikasi persalinan terlihat bahwa mayoritas responden mengalami kasus eklampsia, yaitu sebanyak 25 orang (48,1%).

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai karakteristik dan pemeriksaan antenatal pada ibu melahirkan dengan komplikasi persalinan di rumah sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar periode Januari-Juli 2011 dengan menggunakan data sekunder dari rekam medik didapatkan jumlah populasi ibu

yang mengalami komplikasi persalinan sebanyak 52 kasus dengan total sampling. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dan disesuaikan dengan tujuan penelitian, maka pembahasan hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Usia Ibu

Berdasarkan tabel 5.4, diperoleh hasil penelitian bahwa dari 52 kejadian komplikasi persalinan mayoritas pada usia risiko tinggi (\square 20 tahun dan \square 30 tahun) yaitu sebanyak 36 orang (69,2%), dan minoritas pada usia risiko rendah (20-30 tahun) yaitu sebanyak 16 orang (30,8%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komplikasi persalinan lebih banyak terjadi pada ibu dengan usia risiko tinggi.

Menurut teori Winkjosastro (2007) yang menyatakan bahwa dalam kurun reproduksi sehat dikenal bahwa usia aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20 sampai dengan 30 tahun. Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia di bawah 20 tahun ternyata dua sampai dengan lima kali lebih tinggi dari pada kematian maternal yang terjadi pada usia 20 sampai dengan 30 tahun. Kematian maternal meningkat kembali sesudah usia 30 tahun. Wanita yang melahirkan anak pada usia \square 20 tahun atau \square 30 tahun merupakan faktor risiko terjadinya komplikasi persalinan yang dapat mengakibatkan kematian maternal.

Sesuai dengan penelitian Isanurung pada tahun 2006 dampak kehamilan pada wanita usia muda di Thailand, menyebutkan ibu yang

berusia \leq 20 tahun dan \leq 30 tahun memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami komplikasi persalinan.

Hal tersebut serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilowati pada tahun 2004 yang menyatakan bahwa umur yang \leq 20 tahun dan \leq 30 tahun dikenal sebagai ibu dengan risiko tinggi sebagai salah satu batasan kelompok risiko ibu. Ibu yang berumur \leq 20 tahun dianggap berisiko karena organ reproduksinya dianggap belum begitu sempurna/siap untuk menerima kehamilan, di samping secara kejiwaan ibu muda relatif belum siap untuk hamil. Sedangkan ibu yang berusia di atas 30 tahun dianggap sudah tua, sehingga secara fisik sudah lemah untuk menanggung beban kehamilan. Ditambah apabila ibu dengan paritas banyak, maka secara mental penghargaan terhadap kehadiran anak agak berkurang.

Menurut asumsi penulis, usia ibu sangat berpengaruh dalam suatu kehamilan dan persalinan. Dalam kurun reproduksi sehat dianjurkan agar usia ibu hamil antara 20-30 tahun karena dianggap paling ideal untuk menjalani kehamilan, persalinan dan nifas. Di rentang usia ini kondisi fisik wanita dalam keadaan prima dan optimal sehingga ibu dan bayinya berada dalam keadaan sehat. Di samping itu, rahim sudah mampu memberi perlindungan yang maksimal untuk kehamilan. Umumnya secara mental pun siap, yang berdampak pada perilaku merawat dan menjaga kehamilannya secara hati-hati. Sedangkan pada usia \leq 20 tahun fungsi reproduksi seorang wanita belum berkembang dengan sempurna, tubuh belum berkembang secara maksimal dan sedang dalam proses pertumbuhan

dan perkembangan. Ini erat kaitannya dengan belum sempurnanya perkembangan dinding uterus. Pada usia \leq 30 tahun fungsi reproduksi seorang wanita sudah mengalami penurunan dibandingkan fungsi reproduksi normal sehingga kemungkinan untuk terjadinya komplikasi pascapersalinan terutama akan lebih besar.

2. Paritas

Berdasarkan tabel 5.5, diperoleh hasil penelitian bahwa dari 52 kejadian komplikasi persalinan, mayoritas responden dengan paritas risiko rendah (2-3 anak) yaitu sebanyak 31 orang (59,6%), dan minoritas pada risiko tinggi (\leq 3 anak) yaitu sebanyak 21 orang (40,4%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komplikasi persalinan lebih banyak terjadi pada ibu yang mempunyai paritas risiko rendah.

Ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Winkjosastro (2007) yang menyatakan bahwa kehamilan yang berulang-berulang (\leq 3 anak) dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dinding uterus sehingga mempengaruhi sirkulasi ke janin, dimana jumlah nutrisi berkurang dibanding kehamilan sebelumnya. Hal ini dapat memicu terjadinya komplikasi.

Namun, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Susilowati (2004) yang menyatakan bahwa tingkat paritas ibu yang tinggi membuat ibu merasa sudah berpengalaman dan menganggap bahwa untuk mendeteksi komplikasi pada saat kehamilan yang bisa menyebabkan berlanjut pada komplikasi pada saat persalinan harus memeriksakan diri ke tempat

pelayanan kesehatan (memeriksa kehamilan secara teratur dan lengkap) sehingga bisa mencegah terjadinya komplikasi pada saat persalinan.

Menurut asumsi penulis, hasil penelitian yang diperoleh tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Winkjosastro yang menyatakan bahwa ibu dengan paritas tinggi akan mempunyai peluang lebih besar terjadinya komplikasi pada saat persalinan karena walaupun ibu yang mempunyai paritas tinggi namun pada masa kehamilannya tetap mendapatkan pelayanan yang lengkap sehingga dapat mendeteksi secara dini risiko-risiko pada kehamilan yang bisa meminimalkan terjadinya komplikasi pada saat persalinan. Begitu pun dengan sebaliknya, walupun ibu dengan paritas risiko rendah namun tidak mendapat pelayanan yang lengkap pada masa kehamilannya maka peluang terjadi komplikasi pada saat persalinan menjadi lebih besar dari pada ibu dengan paritas risiko tinggi. Alasan hasil penelitian ini terdapat perbedaan dengan teori yang ada karena pada penelitian ini, rata-rata ibu yang paritas risiko rendah mempunyai jarak kehamilan dan usia risiko tinggi. Dimana jarak kehamilan dan usia dengan risiko tinggi sudah membuktikan pada penelitian ini dan sesuai dengan teori bahwa keduanya merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan terjadinya komplikasi.

3. Jarak Kehamilan

Berdasarkan tabel 5.6, diperoleh hasil penelitian bahwa dari 52 kejadian komplikasi persalinan, mayoritas responden dengan jarak kehamilan pada risiko tinggi (\square 2 tahun dan \square 4 tahun) yaitu sebanyak 42 orang (80,8%), dan minoritas pada risiko rendah (2-4 tahun) yaitu sebanyak

10 orang (19,2%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komplikasi persalinan lebih banyak terjadi pada ibu dengan jarak kehamilan risiko tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Manuaba (2003) bahwa ibu yang mempunyai jarak kehamilan \leq 2 tahun, setelah melahirkan harus membagi perhatiannya kepada dua anak pada waktu yang sama. Lebih dari itu, ia harus menyapih anak yang besar dan untuk menyusui anak yang baru lahir. Oleh karena itu diperkirakan mempunyai risiko komplikasi yang tinggi. Secara psikologis, seorang wanita membutuhkan waktu selama 2 sampai 3 tahun agar dapat pulih dari suatu kehamilan dan mempersiapkan diri untuk hamil kembali. Selain itu, jarak kehamilan yang terlalu dekat dapat menyebabkan ketidaksuburan lapisan endometrium sehingga dapat mengganggu perkembangan janin yang dapat menyebabkan keguguran.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuningsih (2002) bahwa jarak kehamilan yang paling aman terhadap kejadian komplikasi persalinan ialah antara 2-4 tahun, sedangkan jarak kehamilan \leq 2 dan \leq 4 tahun tergolong berisiko tinggi untuk mengalami komplikasi persalinan yang dapat berdampak buruk terhadap ibu maupun pada bayinya. Hal ini disebabkan karena jarak antara dua kehamilan \leq 2 tahun tubuh ibu belum kembali ke keadaan normal akibat kehamilan sebelumnya sehingga tubuh ibu akan memikul beban yang lebih berat. Sebaliknya, jika jarak kehamilan antara dua kehamilan \leq 4 tahun,

disamping usia ibu yang sudah bertambah juga mengakibatkan persalinan berlangsung seperti kehamilan dan persalinan pertama.

Menurut asumsi penulis, jarak kehamilan yang pendek akan mempengaruhi status kesehatan ibu maupun anak pada kedua ujung interval. Seorang wanita yang melahirkan berturut-turut dalam jangka waktu yang pendek tidak sempat memulihkan kesehatannya, sehingga lebih berisiko mengalami komplikasi. Ibu yang mempunyai jarak kehamilan \square 2 tahun, setelah melahirkan harus membagi perhatiannya.

Dan dijelaskan juga dalam Q.S Al-Baqarah [2]: 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Terjemahannya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (Shihab, 2002) .

Ayat di atas menjelaskan mengenai perintah Allah SWT yang memerintahkan kepada setiap ibu untuk menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. Dua tahun adalah batas maksimal dalam penyempurnaan penyusuan. Jika seorang ibu harus memberikan ASI secara sempurna hingga dua tahun artinya dia tidak hamil selama dalam proses tersebut. Kehamilan itu sendiri membutuhkan sebuah perjuangan yang akan merepotkan seorang ibu dalam menyapih bayinya.

Pada ayat di atas juga dijelaskan bahwa seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, dan janganlah seorang ibu dan ayah menderita kesengsaraan karena anaknya. Makna dari ayat di atas sudah begitu jelas untuk bisa kita dipahami bahwa Allah tidak menginginkan hambanya (ibu dan ayah) sengsara walaupun karena anaknya sendiri. Jangan karena kehamilan yang diinginkan sehingga seorang ibu harus menderita. Dalam artian kehamilan yang diinginkan harus membawa kebahagiaan bagi keluarga dan keselamatan bagi ibu dan bayi itu sendiri. Salah satunya seperti yang dijelaskan pada ayat di atas dan juga pada teori mengenai jarak kehamilan yang paling aman yaitu 2-3 tahun yang mana jika jarak kehamilan \square 2 tahun atau \square 4 tahun bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya komplikasi pada saat persalinan sehingga kesakitan dan kematian pada ibu bersalin akan meningkat.

4. Pemeriksaan Antenatal

Berdasarkan tabel 5.7, diperoleh hasil penelitian bahwa dari 52 kejadian komplikasi persalinan, mayoritas responden dengan pemeriksaan antenatal tidak lengkap yaitu sebanyak 33 orang (63,5%), dan minoritas dengan pemeriksaan antenatal lengkap yaitu sebanyak 19 orang (36,5%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komplikasi persalinan lebih banyak terjadi pada ibu dengan pemeriksaan antenatal yang tidak lengkap.

Menurut teori Dhaneswari (2007) yang menyatakan bahwa salah satu penyebab komplikasi persalinan adalah pemeriksaan antenatal yang tidak teratur dan tidak lengkap yang dapat mempengaruhi keterlambatan deteksi dini terhadap risiko kemamilan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Susilowati (2004) pada sekelompok ibu hamil di Surabaya yang menyatakan bahwa ada hubungan antara pemanfaatan pelayanan antenatal dengan komplikasi persalinan, dimana ibu yang tidak lengkap pemanfaatan pelayanan antenatal selama kehamilan cenderung mengalami komplikasi.

Hasil serupa juga dikemukakan pada penelitian Haryono (2004) yang dilakukan pada ibu hamil di Jawa Tengah mengatakan bahwa pada ibu hamil dan bersalin yang tidak memeriksakan kehamilannya pada tenaga kesehatan akan mengalami risiko kematian 3-7 kali dibandingkan dengan ibu yang memeriksakan kehamilannya. Sedangkan menurut Hanafiah (2005) pada penelitiannya di RS. Dr. Pirngani, Medan ditemukan kematian maternal pada 93,9% pada ibu yang memeriksakan dirinya kurang dari 4

kali selama masa kehamilannya akibat kurangnya pemeriksaan antenatal yang dilakukan oleh tenaga medis terlatih dan banyaknya kasus penyulit kehamilan tidak terdeteksi. Sehingga pada akhirnya akan mengakibatkan morbiditas dan mortalitas yang lebih besar pada ibu dan janin.

Menurut asumsi peneliti, pemeriksaan kehamilan sebagai faktor penting dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak karena mempunyai peranan dalam upaya pencegahan komplikasi persalinan dan pengobatan sedini mungkin. Kunjungan antenatal untuk pemanatauan dan pengawasan kesejahteraan ibu dan anak minimal empat kali selama masa kehamilan. Pada antenatalcare yang lengkap, ibu akan mendapatkan pelayanan kesehatan kehamilan melalui standar minimal “7T” yaitu Timbang berat badan, mengukur Tekanan darah, mengukur Tinggi fundus uteri, pemberian imunisasi Tetanus Toksoid, pemberian Tablet besi, Tes penyakit menular seksual, dan Temu wicara. Sehingga ANC yang lengkap sesuai dengan pemeriksaan standar minimal “7T” ibu dapat mendeteksi kelainan-kelainan dalam kehamilan dan mengantisipasi masalah yang timbul dalam kehamilan dan persalinan.

Pemeriksaan antenatal yang tidak lengkap memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan pemeriksaan antenatal lengkap, hal ini karena pemeriksaan antenatal lengkap adalah cara penting untuk memonitoring dan mendukung kesehatan ibu hamil normal dan mendeteksi ibu dengan kehamilan abnormal. Selain itu tanda-tanda dini komplikasi persalinan dapat dideteksi

dan ditanggulangi dengan cepat. Selama pemeriksaan antenatal, ibu akan mendapatkan konsultasi kesehatan untuk keselamatan ibu dan janin.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “karakteristik dan pemeriksaan antenatal pada ibu melahirkan dengan komplikasi persalinan di rumah sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar periode Januari-Juli 2011” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karakteristik usia ibu yang mengalami komplikasi persalinan yaitu pada usia risiko tinggi (\square 20 dan \square 30 tahun) sebanyak 36 orang (69,2%).
2. Karakteristik paritas ibu yang mengalami komplikasi persalinan yaitu pada paritas risiko rendah (2-30 anak) sebanyak 31 orang (59,6%).
3. Karakteristik jarak kehamilan ibu yang mengalami komplikasi persalinan yaitu pada jarak kehamilan risiko tinggi (\square 2 dan \square 4 tahun) sebanyak 42 orang (80,8%).
4. Pemeriksaan antenatal ibu yang mengalami komplikasi persalinan yaitu pemeriksaan antenatal yang tidak lengkap sebanyak 33 orang (63,5%).

B. Saran

1. Agar dapat menjadi acuan bagi tenaga kesehatan untuk lebih cepat dan tanggap dalam menangani masalah komplikasi persalinan sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu akibat komplikasi persalinan dan kelainan-kelainan yang mengarah kepada terjadinya komplikasi persalinan dapat dideteksi sedini mungkin.

2. Agar dapat menjadi bahan referensi sebagai informasi yang bermanfaat untuk perkembangan pengetahuan tentang kejadian komplikasi persalinan.
3. Penyuluhan petugas kesehatan kepada ibu hamil tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan untuk kesehatan ibu dan janin.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Anonim.2009.*PerdarahanPascaPersalinan*.www.google.beritalengkap.php.html
Diakses pada tanggal 12 Juli 2011.

Armawan. 2009. *Gambaran Jenis Persalinan dan Hasil Luaran Bayi Pada Grand Multipara di RSUD Swadana Daerah Sumedang Tahun 2008*. Universitas Padjajaran Sumedang.<http://www.scribd.com>. Diakses pada tanggal 03 Agustus 2011

BKKBN, 2010. *Capaian MDGS, Terkendala Kasus Kematian*.
<http://www.metronews.com>. Diakses tanggal 12 Juli 2011

Bobak, I. 2004. *Buku Ajar Keperawatan Maternitas Edisi keempat*. Jakarta: EGC

Cunningham FG, Leveno KJ, Bloom SL, Hauth JC, Gilstrap III LC, Wenstrom KD, 1997. *Uterine Leiomyomas*, in: *Williams Obstetrics*, 22nd edition. New York: Mc Graw-Hill

Departemen Kesehatan RI. 2003. *Standar Pelayanan kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika

Harjono, Yulvianus. 2011. *Tiap Tahun 600.000 Ibu Melahirkan Meninggal*.
<http://health.kompas.com/read/2011/07/08/11494060/Tiap.Tahun.600.000.Ibu.Melahirkan.Meninggal>. Diakses pada tanggal 09 Juli 2011

Haryono, Roeshadi. 2004. *Gangguan dan Penyulit Pada Masa Kehamilan*.
<http://www.Repository.usu.id/betstream/19/14696/1/09E029.pdf>. Diakses pada tanggal 03 Agustus 2011

Kurniawati, Artikasari. 2009. *Hubungan antara Primigravida dengan Angka Kejadian Preeklampsia/Eklampsia di RSUD Dr. Moewardi Surakarta Periode 1 Januari-31 Desember 2008*. Universitas Muhammadiyah Padjajaran Sumedang. <http://www.pdf-searc-engine.com>. Diakses pada tanggal 03 Agustus 2011

Liu, D.T.Y. 2007. *Persalinan abnormal, Manual persalinan*. Jogjakarta: EGC

Manuaba, IBG. 2003. *Penuntun Kepaniteraan Klinik Obstetri dan Ginekologi*. Jakarta: EGC

Masjoer, Arif. 1999. *Kapita Selekta Kedokteran*. Jakarta: Media Aesculapius

Mochtar, Rustam. 1998. *Sinopsis Obstetri*. Edisi 2. Jakarta: EGC

- Mufdlilah. 2009. *Asuhan Kebidanan Ibu Hamil*. Cetakan I. Yogyakarta: Mitra Cendikia, Offset
- Norwitz, Errol R. 2007. *At a Glance Obstetri dan Ginekologi*. Jakarta: Erlangga
- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika
- , 2002. *Pedoman Praktis Metodologi Riset Keperawatan*. Jakarta: Sagung Seto.
- Prawirohardjo, Sarwono. 2005. *Perdarahan Setelah Bayi Lahir, Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka
- Profil Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan. 2011
- Rochjati, Poedji. 2003. *Bab I Pendahuluan, Skrining Antenatal Pada Ibu Hamil*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Saifuddin AB dkk, 2008. *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo
- , 2006. *Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo
- Setianingrum, Susiana Iud Winanti. 2005. *Hubungan antara Kenaikan Berat Badan, Lingkar Lengan Atas dan Kadar Hb Ibu hamil Trimester III dengan Berat Badan Bayi Lahir*. <http://digilib.unnes.ac.id>. Diakses pada tanggal 03 Agustus 2011
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan, Keresasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati
- Sri Wahyuningsih. 2002. *Hubungan Antara Perdarahan postpartum dengan Jarak Kehamilan di RSUD Sukoharjo*. Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2011
- Susilowati. 2004. *Beberapa Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Komplikasi Persalinan di RS Kasih Ibu dan RS Permata Kabupaten Purworejo*. Tesis Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2011
- Tjandra. 2008. *PreEklampsi dan Eklampsi*. <http://kuliahibidan.wordpress.com/2008/07/27/pre-eklampsia-eklampsia/>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2011
- Webmaster. 2009. *Angka Kematian Ibu di Indonesia Tertinggi di Asia*. http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=145%3Aangka-kematian-ibu-di-indonesia-tertinggi-di-asia. Diakses pada tanggal 06 Juli 2011

Winkjosastro, Hanifa. 2007. *Kematian Maternal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo

_____, Hanifa, 2006. *Ilmu Kebidanan*. Edisi 3. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo

WHO. 2008. *World Health Statistic*. www.who.int. Diakses pada tanggal 24 Juni 2011

