

**UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN UBI JALAR
(*Ipomoea batatas* L.), CULTIVAR UMBI PUTIH TERHADAP BAKTERI
Staphylococcus aureus dan *Pseudomonas aeruginosa***



Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih

Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi

Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh

NURHAYATI

NIM : 70100107062

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh, karenanya batal demi hukum.

Makassar, 27 September 2011

Penulis,

Nurhayati

70 100 107 062


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Ubi Jalar (*Ipomoea batatas*. L), Cultivar Umbi Putih Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*” yang disusun oleh Nurhayati, NIM : 70100107062, Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang di selenggarakan pada hari Selasa 27 September 2011M, bertepatan 29 Syawal 1432 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar, 27 September 2011 M
29 Syawal 1432 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Gemy Nastity Handayani, S.Si, M.Si, Apt. 


Sekretaris : Abdul Rahim. S.Si.,M.Si., Apt. 

Penguji Kompetensi : Isriany Ismail, S.Si, M.Si, Apt . 

Penguji Agama : Drs. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag 

Diketahui:

 Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar


/ Dr. dr. Rasvidin Abdullah, MpdH., MH. Kes.
NIP. 19530119 198110 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Dia menciptakan kita sebaik-baik makhluk yang dilengkapi akal dan hawa nafsu. Dia memberi hidayah berupa ilmu dan mengistimewakan orang yang berilmu dengan menganugrahkan kedudukan yang tinggi di sisi-Nya dan di sisi manusia. Maka dari itu tidaklah pantas bagi diri kita yang hanya seorang hamba dan memiliki sedikit ilmu dari ilmu Allah berjalan di muka bumi ini dengan suatu kesombongan. Semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada kita, melimpahkan rahmat dan berkah-Nya, melindungi kita dari gangguan syaitan yang terkutuk, dan menetapkan kasih sayang -Nya kepada kita.

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, para Anbiya, keluarga, dan sahabatnya sekalian. Amin.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Orang tua tercinta, Ayahanda Syarifuddin dan Ibunda Jumasih yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta dukungan penuh baik berupa materi, nasehat, dan do’a yang tulus sehingga memperlancar penyelesaian skripsi ini. Kepada kanda Burhan Rahman dan Indra sebagai motivator penulis serta Saudaraku Sirajuddin, Fahri, Hasyim, Alfrida, Fahrul, Nurdiana dan seluruh keluarga yang terus memberikan dukungan dan do’a yang tiada ternilai harganya.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr. H.A. Qadir Gassing, HT, M.S. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Dekan dan Para Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta para staf pada fakultas kesehatan.
3. Ketua Jurusan farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Ibu Gemy Nastity Handayany, M.Si, Apt. Sekaligus selaku pembimbing pertama dan Bapak Abdul Rahim, S.Si, M.Si., Apt. selaku pembimbing kedua yang di tengah kesibukannya telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Isriany Ismail, S,Si.,M.Si., Apt. Selaku penguji kompetensi dan Bapak Drs. Muh. Saleh Ridwan M.Ag. selaku penguji agama yang telah memberikan saran dan arahnya dalam penyempurnaan skripsi penulis.
5. Ibu Dra Hj. Faridha Yenny Nonci, Apt. selaku penasehat akademik dan kepala Laboratorium terpadu UIN Alauddin Makassar yang memberikan perhatian dan bimbingannya selama penulis mengikuti pendidikan di farmasi .
6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri alauddin Makassar.
7. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya Untuk para laboran A. Armisman Edy Paturusi, S.Farm., dan Muh. Rusydi, S.Farm., Apt., terima kasih

atas bimbingannya. Teman-teman Anastesi '07: Adriani Aras, Rina Yulianti, A.Nurul Purnamasari, Ammar Mubarak, Rahmat, Nuriffawati, D ewi Amriani dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat serta bantuan baik berupa materi maupun dukungan mental selama penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan penulis menyadari i bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Kiranya tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan tidak menutup adanya saran dan kritikan demi penyempurnaan.

Makassar,27 September 2011

Nurhayati

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|-----------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| ABSTRACT | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1-5 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 6-29 |
| A. Uraian Tanaman Ubi Jalar | 6 |
| 1. Klasifikasi..... | 6 |
| 2. Nama Daerah | 6 |
| 3. Morfologi | 7 |
| 4. Kandungan Kimia..... | 7 |
| 5. Kegunaan..... | 8 |

| | |
|--|--------------|
| B. Metode Ekstraksi Bahan Alam | 8 |
| 1. Tujuan Ekstraksi | 8 |
| 2. Jenis-jenis Ekstraksi | 8 |
| a. Infundasi | 9 |
| b. Maserasi | 9 |
| c. Perkolasi | 10 |
| 3. Mekanisme Ekstraksi | 11 |
| 4. Ekstraksi Secara Maserasi | 11 |
| C. Antimikroba | 13 |
| 1. Pengertian Antimikroba | 13 |
| 2. Mekanisme Antimikroba | 14 |
| D. Uraian Mikroba Uji | 17 |
| 1. <i>Pseudomonasa eruginosa</i> | 17 |
| a. Klasifikasi | 17 |
| b. Sifat dan Morfologi | 17 |
| 2. <i>Staphylococcus aureus</i> | 18 |
| a. Klasifikasi | 18 |
| b. Sifat dan Morfologi | 18 |
| E. Metode Pengujian Antimikroba | 20 |
| 1. Metode difusi | 20 |
| 2. Metode tabung | 22 |
| F. Tinjauan Islam Tentang Tanaman Obat | 23-29 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 31-34 |
| A. Alat dan Bahan | 31 |
| B. Metode Kerja | 31 |
| a. Penyiapan Sampel | 31 |
| 1. Pengambilan Sampel | 31 |
| 2. Pengolahan Sampel | 31 |
| 3. Ekstraksi Sampel | 31 |
| 4. Pembuatan sampel | 31 |
| 5. Sterilisasi alat | 32 |
| 6. Pembuatan Medium | 32 |
| b. Penyiapan Bakteri Uji | 33 |
| c. Peremajaan Bakteri Uji | 33 |
| d. Pengujian Daya Hambat | 33 |
| BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN | 35-41 |
| A. Hasil Penelitian | 35 |
| B. Pembahasan | 36 |

| | | |
|----------------|-------------------------|-------|
| BAB V | PENUTUP | 42 |
| A. | <i>Kesimpulan</i> | 42 |
| B. | <i>Saran</i> | 42 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 43-44 |
| LAMPIRAN | | 45-57 |




DAFTAR TABEL

| Tabel | | Halaman |
|--------------|---|----------------|
| 1 | Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ubi jalar (<i>Ipomoea batatas</i> L.), cultivar umbi putih terhadap bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 34 |
| 2 | Analisis statistik uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ubi jalar (<i>Ipomoea batatas</i> L.), cultivar umbi putih terhadap bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> secara acak lengkap (RAL) | 48 |
| 3 | Hasil analisis varians uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ubi jalar (<i>Ipomoea batatas</i> L.), cultivar umbi putih terhadap bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> | 50 |
| 4 | Beda Jarak Nyata Duncan (BJND) aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ubi jalar (<i>Ipomoea batatas</i> L.), cultivar umbi putih terhadap bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> | 51 |
| 5 | Beda Jarak Nyata Duncan (BJND) aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ubi jalar (<i>Ipomoea batatas</i> L.), cultivar umbi putih terhadap bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> | 51 |
| 6 | Beda Jarak Nyata Duncan (BJND) aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ubi jalar (<i>Ipomoea batatas</i> L.), cultivar umbi putih terhadap bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> | 51 |
| 7 | Analisis statistik uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ubi jalar (<i>Ipomoea batatas</i> L.), cultivar umbi putih terhadap bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> secara acak lengkap (RAL) | 52 |
| 8 | Hasil analisis varians uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ubi jalar (<i>Ipomoea batatas</i> L.), c.v.umbi putih terhadap bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 53 |
| 9 | Beda Jarak Nyata Duncan (BJND) aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ubi jalar (<i>Ipomoea batatas</i> L.), cultivar umbi putih terhadap bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 53 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | | Halaman |
|--------|--|---------|
| 1 | Foto Tanaman Ubi Jalar (<i>Ipomoea batatas</i> L.), cultivar umbi putih | 48 |
| 2 | Foto Pengujian Daya Hambat Ekstrak Etanol Daun Ubi Jalar Putih (<i>Ipomoea batatas</i> L.), cultivar Umbi Putih Terhadap bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> | 49 |
| 3 | Foto Pengujian Daya Hambat Ekstrak Etanol Daun Ubi Jalar Putih (<i>Ipomoea batatas</i> L.), ciltivar Umbi Putih Terhadap bakterii <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 50 |



DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | | Halaman |
|----------|--|---------|
| 1 | a Pembuatan medium Nutrien Agar (NA) | 43 |
| | b Ekstraksi sampel dan pengujian daya hambat | 44 |
| 2 | Foto tanaman Ubi jalar (<i>Ipomoea batatas</i> L.), cultivar umbi putih | 45 |
| | Foto pengujian daya hambat ekstrak etanol daun ubi jalar a (<i>Ipomoea batatas</i> L.), cultivar umbi putih terhadap bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> | 46 |
| 3 | b Foto pengujian daya hambat ekstrak etanol daun ubi jalar (<i>Ipomoea batatas</i> L.), cultivar umbi putih terhadap bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 47 |
| 4 | Hasil analisis statistik uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ubi jalar (<i>Ipomoea batatas</i> L.), cultivar umbi putih terhadap bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> secara acak lengkap (RAL) | 48 |
| 5 | Hasil analisis varians uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ubi jalar (<i>Ipomoea batatas</i> L.), cultivar umbi putih terhadap bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> | 50 |
| 6 | Beda Jarak Nyata Duncan (BJND) aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ubi jalar (<i>Ipomoea batatas</i> L.), cultivar umbi putih terhadap bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> | 51 |
| 7 | Analisis statistik uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ubi jalar (<i>Ipomoea batatas</i> L.), cultivar umbi putih terhadap bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> secara acak lengkap (RAL) | 52 |
| 8 | Hasil analisis varians uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ubi jalar (<i>Ipomoea batatas</i> L.), cultivar umbi putih terhadap bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 54 |
| 9 | Beda Jarak Nyata Duncan (BJND) aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ubi jalar (<i>Ipomoea batatas</i> L.), cultivar umbi putih terhadap bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | 55 |

ABSTRAK

Nama Penyusun : Nurhayati
NIM : 70100107062
Judul Skripsi : Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Ubi Jalar Putih (*Ipomoea batatas* L.) cultivar umbi putih terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*

Telah dilakukan penelitian tentang Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.) cultivar umbi putih terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas ekstrak etanol daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.) cultivar umbi putih dan pada konsentrasi berapa ekstrak etanol daun ubi jalar putih memberikan aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*. Penelitian ini dilakukan dengan mengekstraksi daun ubi jalar putih menggunakan etanol 70% dengan metode maserasi, kemudian ekstrak yang diperoleh dibuat beberapa konsentrasi yaitu 0,1%, 1%, dan 2% dengan kontrol Ampisilin 0,7% dan dilakukan pengujian aktivitas antibakteri dengan metode difusi agar.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun ubi jalar putih memiliki aktivitas antibakteri terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa* yang ditandai dengan adanya zona hambat. Pada bakteri *Staphylococcus aureus* memberikan zona hambat tertinggi pada konsentrasi 2% dengan diameter zona hambat 11,30 mm, sedangkan pada kontrol Ampisilin 0,7% sebesar 20,31 mm. Untuk bakteri *Pseudomonas aeruginosa* memberikan zona hambat tertinggi pada konsentrasi 2% yaitu 11,62 mm, sedangkan pada kontrol Ampisilin sebesar 21,85 mm.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun ubi jalar putih (*Ipomoea batatas* L.) cultivar umbi putih memiliki aktivitas antibakteri karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*.

ABSTRACT

Name : **Nurhayati**
Nim : 70100107062
Title of Script : Antibactery activity of ethanol extract in Sweet pototoe (*Ipomoea batatas* L) cultivar white tuber for *Staphylococcus aureus* and *Pseudomonas aeruginosa* bacteriy

The conducted research was about experiment of Antibactery activity of etanol extract in Sweet potatoe (*Ipomoea batatas* L) cultivar white tuber for *Staphylococcus aureus* and *Pesudomonas aeruginosa* bacteriy. This research was aimed to know the ethanol extract activity on Sweet potatoe (*Ipomoea batatas* L) cultivar white tuber for *Staphylococcus aureus* and *Pesudomonas aeruginosa* bacteriy and how much consenstration etanol extract in white sweet potatoe leaf to give activity *Staphylococcus aureus* and *Pesudomonas aeruginosa* bacteriy. This research was conducted through extracting the white sweet potat oe leaf in etanol 70%, Then it was made into some extract consenstration such as 0,1%;1% and 2%,whithin Ampisilin controlled 0,7% and conducted the experiment of antibactery activity in gelatin difussion..

The result of research showed ethanol extract in white sweet potatoe leaf has antibactery activity to *Staphylococcus aureus* and *Pesudomonas aeruginosa* bacteriy which were signed by transparancy zone. In bacteriy of to *Staphylococcus aureus* gave the optimum blocked zone in 2% consenstration with 11,30 mm diameter, to bacteriy *Pseudomonas aeruginosa* gave the optimom blocked zone in 2% consenstration was 11,62 mm. within Ampisilin controlled gave blocked zone in 0,7% was 21,85 mm.

It can be concluded that ethanol extract in sweet potatoe leaf culttivar white tuber has antibactery activity because it can block the *Staphylococcus aureus* and *Pseudomonas aeruginosa* bacteriy growth it is sugested to the further research in order to antibactery element.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini penelitian dan pengembangan tumbuhan obat berkembang pesat. Jauh sebelum penjajahan Belanda, Bangsa Indonesia telah mengenal ilmu pengetahuan secara tradisional, misalnya dengan tumbuhan, binatang, mineral, doa dan pijit. Tapi cara-cara tersebut tidak dicatat dengan baik karena teknik pengobatannya diajarkan secara lisan. Dalam perkembangan penelitian banyak teknik pengobatan kuno yang hilang atau terlupakan. Oleh karena itu, jenis tumbuhan obat dan penggunaannya harus dilestarikan oleh generasi penerus (Hariana, 2004).

Penyakit infeksi juga merupakan salah satu masalah dalam bidang kedokteran yang dari waktu ke waktu terus berkembang. Infeksi merupakan penyakit yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain atau dari hewan ke manusia. Infeksi dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, dan protozoa. Organisme-organisme tersebut dapat menyerang seluruh tubuh atau sebagian dari padanya (Gibson, 1996).

Staphylococcus aureus merupakan mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi pada luka. Mikroorganisme tersebut terdapat pada folikel rambut dan kelenjar keringat yang akan membentuk koloni-koloni pada luka bakar yang belum memperoleh pengobatan awal dengan antibiotika topikal (Moenadjat, 2009). Infeksi pada luka merupakan suatu gangguan kronis pada

kulit yang dapat disebabkan oleh mikroorganisme yaitu *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa* (Rostinawati, 2009).

Belakangan ini banyak ditemukan kasus bahwa beberapa bakteri telah resisten terhadap beberapa antibiotik. Untuk mengatasi infeksi bakteri tersebut maka perlu dilakukan pencarian senyawa alternatif yang berasal dari bahan alam yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri tersebut. Salah satunya adalah dengan menggunakan daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih.

Ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih termasuk salah satu tanaman palawija penting di Indonesia karena mempunyai potensi untuk terus dikembangkan baik sebagai bahan pangan, pakan, maupun bahan industri. Ubi jalar atau ketela rambat atau “sweet potato” diduga berasal dari benua Amerika. Para ahli botani dan pertanian memperkirakan daerah asal tanaman ubi jalar adalah Selandia Baru, Polinesia dan Amerika bagian tengah. Ubi jalar mulai menyebar ke seluruh dunia, terutama Negara-negara beriklim tropika pada abad ke-16. Orang-orang Spanyol menyebarkan ubi jalar ke kawasan Asia, terutama Filipina, Jepang dan Indonesia (Apraidji, 2006).

Secara tradisional tanaman ini sudah lama dipercayai sebagai obat penyembuh luka, obat bisul, penurun panas dan diare. Untuk obat luka bakar caranya diambil sepertiga genggam daun ubi jalar, kemudian dicuci dan digiling sampai halus, Setelah itu ditempelkan pada luka dan dibalut. Aktivitas antibakteri pada daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih disebabkan adanya

kandungan senyawa organik (saponin, flavonoid, dan polifenol) yang bersifat sebagai antibakteri (Mursito, 2009).

Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan uji efektivitas daun ubi jalar merah (*Ipomoea batatas* L.) sebagai antibakteri yang diekstrak menggunakan metanol dan n-heksan dengan konsentrasi 2%; 3,5%; 5%; 6,5% dan 8% terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* penyebab bisul pada manusia. Pada ekstrak metanol didapatkan zona bening berturut-turut 12,3 mm; 7,7 mm; 7 mm; 6 mm; 12,3 mm. Ubi jalar yang diekstraksi dengan n-heksan didapatkan zona bening 6,4 mm; 9,9 mm; 3,5 mm; 3,3 mm dan 7,5 mm (Melati, 2009)

Pengujian secara ilmiah mengenai khasiat daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih yang diekstraksi dengan menggunakan etanol sebagai antibakteri sejauh ini belum pernah dilaporkan. Untuk membuktikan secara ilmiah maka di lakukan pengujian antibakteri pada bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang timbul yaitu:

1. Apakah ekstrak etanol daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*?
2. Pada konsentrasi berapa ekstrak etanol daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih memberikan aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*?


C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui aktivitas ekstrak etanol daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*.
2. Mengetahui pada konsentrasi berapa ekstrak etanol daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih memberikan aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi ilmiah mengenai aktivitas antibakteri dari daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), c.v umbi putih terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa* sehingga penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar penelitian ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih sebagai obat alternatif untuk menangani penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tanaman

1. Klasifikasi Tumbuhan (Gembong: 1994)

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Kerajaan | : Plantae |
| Divisi | : Spermatophyta |
| Anak divisi | : Angiospermae |
| Kelas | : Dicotyledonae |
| Anak kelas | : Asteridae |
| Bangsa | : Convolvulales |
| Suku | : Convolvulaceae |
| Marga | : Ipomoea |
| Jenis | : <i>Ipomoea batatas</i> L. |

2. Nama Daerah

Ubi jalar merupakan tanaman yang mempunyai banyak nama yang berbeda-beda sesuai dengan daerah tanaman tersebut dihasilkan. Di antaranya yaitu Sumatera (Eba), Melayu (ubi jalar), Makassar (lame kamumu, lame kadsora), Bugis (lame kandora) (Gembong: 1994).

a. Morfologi Tanaman

Jenis ubi jalar adalah tanaman yang bercabang. Batang gundul atau berambut, kadang-kadang membelit, bergetah, sering keunguan, panjang sampai 5 m. Tangkai daun 4-20 cm, helaian daun lebar. Bentuk

telur sampai membulat dengan pangkal yang berbentuk jantung atau terpancung, rata sampai berlekuk, kadang-kadang berbagi menjari 3-5. Karangannya bunga diketiak, bentuk payung berbunga banyak. Daun kelopak memanjang bulat telur, runcing, panjang lekukan 1 cm, yang terluar paling kecil. Mahkota bentuk lonceng sampai bentuk terompet, ungu muda, panjang 3-4,5 cm. Benang sari tertanam dan tidak sama panjangnya (Sukarsono, 2008). Tanaman ubi jalar dapat dipanen bila ubi-ubinya sudah tua (matang fisiologis). Ciri fisik ubi jalar matang, antara lain: bila kandungan tepungnya sudah maksimum, ditandai dengan kadar serat yang rendah dan bila direbus (dikukus) rasanya enak serta tidak berair. Penentuan waktu panen ubi jalar didasarkan atas umur tanaman, yaitu 3-4 bulan. Memanen ubi jalar jangan sampai terlalu muda atau terlalu tua, apabila terlalu tua, umbi akan pecah kulitnya (Siswadi, 2006).

b. Kandungan Kimia Ubi Jalar (*Ipomoea batatas* L.), Cultivar Umbi Putih

Daun dan umbi mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol. Umbinya mengandung karbohidrat dan mengandung beberapa vitamin. (Mursito, 2009).

c. Kegunaan Ubi Jalar (*Ipomoea batatas* L.), Cultivar Ubi Putih

Bagian yang bisa dimanfaatkan adalah umbi dan daun. Daun Ubi jalar digunakan sebagai obat bisul, penurunan panas, diare dan obat luka bakar. Umbinya digunakan sebagai sumber kalori juga dimanfaatkan untuk memperbaiki tulang yang keropos (Mursito, 2009).

B. Metode Ekstraksi Bahan Alam

1. Tujuan Ekstraksi

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan dan biota laut dengan pelarut organik tertentu. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dalam pelarut organik dan karena adanya perbedaan antara konsentrasi di dalam dan konsentrasi diluar sel, mengakibatkan terjadinya difusi pelarut organik yang mengandung zat aktif keluar sel. Proses ini berlangsung terus menerus sampai terjadi keseimbangan konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel (Dirjen, 1986).

2. Jenis-jenis Ekstraksi

Proses ekstraksi dapat dilakukan secara panas dan secara dingin. Ekstraksi secara panas yaitu dengan metode refluks dan destilasi uap air, sedangkan ekstraksi dingin yaitu dengan maserasi, perkolasi dan soxhletasi (Sudjadi, 1988)

Cara penyarian dapat dibedakan menjadi infundasi, maserasi, perk olasi, dan penyarian berkesinambungan. Dari keempat cara tersebut sering dilakukan modifikasi untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

a) Infundasi

Infundasi adalah proses penyarian yang umumnya digunakan untuk menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. Penyarian dengan cara ini menghasilkan sari yang tidak stabil dan mudah tercemar oleh kuman dan kapang. Oleh sebab itu sari yang diperoleh dengan cara ini tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam.

Infus dibuat dengan cara: membasahi bahan bakunya, biasanya dengan air 2 kali bobot bahan, untuk bunga 4 kali bobot bahan dan untuk karagen 10 kali bobot bahan. Bahan baku ditambah dengan air dan dipanaskan selama 15 menit pada suhu 90° - 98° C. Umumnya untuk bagian sari diperlukan 10 bagian bahan. Pada simplisia tertentu tidak diambil 10 bagian, karena kandungan simplisia kelarutannya terbatas, disesuaikan dengan cara penggunaannya dalam pengobatan, berlendir, daya kerjanya keras. Untuk memindahkan penyarian kadang-kadang perlu ditambah bahan kimia. Penyarian dilakukan pada saat cairan masih panas, kecuali bahan yang mengandung bahan yang mudah menguap (Depkes RI, 1986).

b) Maserasi

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi digunakan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari.

Cairan penyari akan menembus dinding sel dan akan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel.

Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara: 10 bagian simplisia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana, kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya, sambil berulang-ulang diaduk. Setelah 5 hari sari diserakai, ampas diperas, ampas ditambah cairan penyari secukupnya, diaduk dan diserakai hingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana ditutup, dibiarkan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya selama 2 hari. Kemudian endapan dipisahkan (Depkes RI, 1986).

c) Perkolasi

Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi.

Prinsip perkolasi adalah sebagai berikut: serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut, cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Gerak ke bawah disebabkan oleh

kekuatan gaya beratnya sendiri dan cairan di atasnya, dikurangi dengan daya kapiler yang cenderung untuk menahan. Kekuatan yang berperan pada perkolasi antara lain: gaya berat, kekentalan, daya larut, tegangan permukaan, difusi, osmosa, adhesi, daya kapiler, dan daya geseran (Depkes RI, 1986).

3. Mekanisme Ekstraksi

Umumnya zat aktif yang terkandung dalam tanaman maupun hewan lebih larut dalam pelarut organik. Proses terekstraksinya zat aktif dalam tanaman adalah sebagai berikut, pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk kedalam rongga sel tanaman atau hewan yang mengandung zat-zat aktif. Zat-zat aktif tersebut akan terlarut sehingga akan terjadi perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan pelarut organik diluar sel. Maka larutan terpekat akan berdifusi keluar sel, dan proses ini berulang terus sampai terjadi kesetimbangan antara konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel (Dirjen, 1986).

4. Ekstraksi Secara Maserasi

Umumnya zat aktif yang terkandung dalam tanaman maupun hewan lebih larut dalam pelarut organik. Proses terekstraksinya zat aktif dalam tanaman adalah sebagai berikut, pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk kedalam rongga sel tanaman atau hewan yang mengandung zat-zat aktif. Zat-zat aktif tersebut akan terlarut sehingga akan terjadi perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan pelarut organik

diluar sel. Maka larutan terpekat akan berdifusi keluar sel, dan proses ini berulang terus sampai terjadi kesetimbangan antara konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel (Dirjen, 1986).

Maserasi merupakan jenis ekstraksi yang sangat sederhana yang dilakukan dengan cara merendam bahan simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan terlarut dan adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan di luar sel, maka zat aktif (zat terlarut) ditarik keluar. Peristiwa tersebut terjadi berulang kali hingga terjadi kesetimbangan konsentrasi antara larutan diluar dan di dalam sel (Dirjen, 1986).

Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Kerugian cara maserasi adalah pengerjaannya lama dan penyariannya kurang sempurna (Anonim, 1989).

Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara: 10 bagian simplisia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana, kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya, sambil berulang-ulang diaduk. Setelah 5 hari sari diserkai, ampas diperas, ampas ditambah cairan penyari secukupnya, diaduk dan diserkai hingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana

ditutup, dibiarkan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya selama 2 hari.

Kemudian endapan dipisahkan (Dirjen, 1986).

C. Antimikroba

1. Definisi Antimikroba

Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obat yang digunakan untuk memberantas infeksi mikroba pada manusia. Obat-obat yang digunakan untuk membasmi mikroorganisme yang menyebabkan infeksi pada manusia, hewan ataupun tumbuhan harus bersifat toksisitas selektif artinya obat atau zat tersebut harus bersifat sangat toksis terhadap mikroorganisme penyebab penyakit tetapi relatif tidak toksis terhadap jasad inang atau hospes (Djide, 2008).

Antimikroba dapat bersifat:

- a. Bakteriostatika, yaitu zat atau bahan yang dapat menghambat atau menghentikan pertumbuhan bakteri tetapi tidak menyebabkan kematian seluruh bakteri.
- b. Bakteriosida, yaitu zat atau bahan yang dapat membunuh mikroorganisme (bakteri) tetapi tidak menyebabkan lisis atau pecahnya sel bakteri (Djide, 2008).

Suatu zat antimikroba yang ideal memiliki toksisitas selektif. Istilah ini berarti bahwa suatu obat berbahaya bagi parasit tetapi tidak membahayakan inang. Seringkali, toksisitas selektif lebih bersifat relatif dan bukan absolut; ini berarti bahwa suatu obat yang pada konsentrasi tertentu

dapat ditoleransi oleh inang, dapat merusak parasit. Antibiotika yang ideal sebagai obat harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Mempunyai kemampuan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang luas (*broad spectrum antibiotic*)
2. Tidak menimbulkan terjadinya resistensi dari mikroorganisme patogen
3. Tidak menimbulkan pengaruh samping (*side effect*) yang buruk pada host, seperti reaksi alergi, kerusakan syaraf, iritasi lambung, dan sebagainya
4. Tidak mengganggu keseimbangan flora yang normal dari host seperti flora usus atau flora kulit.

2. Mekanisme Kerja Antimikroba

Antimikroba mempunyai mekanisme kerja antara lain sebagai berikut:

a. Denaturasi protein

Turunan alkohol, halogen dan halogenator, senyawa merkuri, peroksida, turunan fenol dan senyawa amonium kuartener bekerja sebagai antiseptika dan desinfektan dengan cara denaturasi dan konjugasi protein sel bakteri (Djide, 2008).

b. Mengubah permeabilitas membran sitoplasma bakteri

Mengubah permeabilitas membran sitoplasma bakteri yang sifatnya semipermeabel dan mengendalikan transport berbagai metabolit ke dalam dan ke luar sel. Adanya gangguan atau kerusakan struktur pada membran plasma dapat menghambat atau merusak kemampuan membran plasma sebagai penghalang (*barrier*) osmosis dan mengganggu sejumlah

proses biosintesis yang diperlukan dalam membran yang menyebabkan bocornya konstituen sel yang esensial, sehingga bakteri mengalami kematian.

Sitoplasma semua sel hidup dibatasi oleh selaput sitoplasma yang bekerja sebagai penghalang dengan permeabilitas selektif, melakukan fungsi pengangkutan aktif sehingga dapat mengendalikan susunan sel. Bila integritas fungsi selaput sitoplasma terganggu misalnya oleh zat bersifat surfaktan sehingga permeabilitas dinding sel berubah atau bahkan menjadi rusak, maka komponen penting, seperti protein, asam nukleat, nukleotida, dan lain-lain keluar dari sel dan sel berangsur-angsur mati. Amfoterisin B, kolistin, polimiksin, imidazol, dan polien menunjukkan mekanisme kerja tersebut (Djide, 2008).

c. Penghambatan terhadap sintesis dinding sel

Antimikroba golongan ini dapat menghambat sintesis atau menghambat aktivitas enzim yang dapat merusak dinding sel mikroorganisme. Yang termasuk golongan ini antara lain: Penisilin, Sefalosporin, Vankomisin, Sikloserin, Basitrasin (Djide, 2008).

Mekanisme kerjanya adalah dapat mencegah ikatan silang peptidoglikan pada tahap akhir sintesis dinding sel, yaitu dengan cara menghambat protein pengikat penisilin. Protein ini merupakan enzim dalam membran plasma sel bakteri yang secara normal terlibat dalam penambahan asam amino yang berikatan silang dengan peptidoglikan

dinding sel bakteri dan memblokir aktivasi enzim transpeptidase yang membungkus ikatan silang polimer-polimer gula panjang yang membentuk dinding sel bakteri sehingga dinding sel menjadi rapuh dan mudah lisis (Pratiwi, 2008).

d. Penghambatan sintesis protein

Antimikroba mempengaruhi fungsi ribosom pada mikroorganisme yang menyebabkan sintesis protein terhambat. Dalam hal ini antimikroba dapat:

- a. Berinteraksi dengan ribosom 30S, termasuk kelompok ini adalah Aminoglikosida, Tetrasiklin dan lain-lain. Aminoglikosida menyebabkan akumulasi sintesis protein awal yang kompleks. Salah dalam menterjemahkan tanda mRNA dan menghasilkan polipeptida yang abnormal. Tetrasiklin bekerja menghambat ikatan aminoasil-tRNA dengan ribosom mRNA kompleks.
- b. Berinteraksi dengan ribosom 50S, misalnya pada kloramfenikol, linkomisin, klindamisin, eritromisin (Djide, 2008).

e. Penghambatan sintesis asam nukleat

DNA dan RNA sangat penting dalam proses kehidupan normal sel. Gangguan apapun yang terjadi pada pembentukan fungsi zat-zat tersebut dapat mengakibatkan kerusakan total pada sel. Dalam hal ini mempengaruhi metabolisme asam nukleat, Rifampisin mengikat dan menghambat enzim DNA-dependent RNA polymerase bakteri,

memblokir helix DNA. Contohnya kuinolon, rifampisin, sulfonamide, trimethoprim, dan trimetrexat (Gunawan, 2007).

3. Uraian Bakteri Uji

a. *Pseudomonas aeruginosa*

1) Klasifikasi (Garrity 2004).

Kerajaan : Bacteria

Filum : Proteobacteria

Kelas : Gammaproteobacteria

Bangsa : Pseudomonadales

Suku : Pseudomonadaceae

Marga : Pseudomonas

Jenis : *Pseudomonas aeruginosa*

2) Sifat dan Morfologi

Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri gram negatif dalam bentuk sel tunggal, batang lurus atau melengkung, namun tidak berbentuk heliks. Pada umumnya berukuran 0,5-1,0 μm . Motil dan flagelum polar, monotrikus atau multitrikus. Tidak menghasilkan selongsong prosteka. Tidak dikenal adanya stadium istirahat. Metabolisme dengan respirasi, tidak pernah fermentative. Beberapa merupakan kemolitotroffakultatif, dapat menggunakan H_2 atau CO_2 sebagai sumber energi. Oksigen molekuler merupakan penerimaan

elektron universal, beberapa dapat melakukan denitrifikasi dengan menggunakan nitrat sebagai penerima pilihan (Pelezar, 2008)

Pseudomonas aeruginosa merupakan suatu bakteri yang bersifat oportunistik, yaitu memanfaatkan kerusakan pada mekanisme pertahanan inang untuk memulai suatu infeksi. Apabila mikroorganisme berada di dalam inang yang sistem kekebalannya telah terganggu, mikroorganisme dapat melintasi penghalang anatomi setelah luka bakar, pembedahan, dan mikroorganisme terbawa masuk melalui kateter, alat penyuntik, dan respirator yang terkontaminasi (Rostinawati, 2009)

b. *Staphylococcus aureus*

1. Klasifikasi (Garrity 2004)

Kerajaan : Bacteria

Pilum : Firmicutes

Kelas : Bacilli

Bangsa : Bacillales

Suku : Staphylococcaceae

Marga : Staphylococcus

Jenis : *Staphylococcus aureus*

2. Sifat dan Morfologi (Pelezar, 2008)

Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif. Sel-sel berbentuk bola, berdiameter 0,5-1,5 μm , terdapat dalam tunggal dan berpasangan dan secara khas membelah diri lebih dari satu bidang

sehingga membentuk gerombolan yang tak teratur, non metil, tidak diketahui adanya stadium istirahat. Dinding sel mengandung dua komponen utama yaitu peptidoglikan dan asam teikoat yang berkaitan dengannya. Metabolisme dengan respirasi dan fermentatif. Anaerob fakultatif, tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dalam keadaan aerobik. Suhu optimum 35-42°C. berasosiasi dengan kulit, dan selaput lendir hewan berdarah panas. Kisaran inangnya luas dan banyak galur merupakan patogen potensial.

Berbagai infeksi yang disebabkan oleh *Staphylococcus aureus* dimediasi oleh faktor virulen dan respon imun sel inang. Secara umum bakteri menempel ke jaringan sel inang kemudian berkoloni dan menginfeksi. Selanjutnya bertahan, tumbuh, dan mengembangkan infeksi berdasarkan kemampuan bakteri untuk melawan pertahanan tubuh sel inang. Respon sel inang dimediasi oleh leukosit yang diperoleh dari ekspresi molekul adhesi pada sel endotel. Komponen dinding sel *Staphylococcus aureus* yaitu peptidoglikan dan asam teikoat, memacu pelepasan sitokin. Leukosit dan faktor sel inang lainnya dapat dirusak secara lokal oleh toksin yang dihasilkan oleh bakteri tersebut. Selain itu adanya protein adheren ekstraseluler mengakibatkan respon anti inflamasi. Protein ini juga menghambat sekresi leukosit sel inang dengan cara berinteraksi langsung dengan protein adhesif sel inang, dan

fibrinogen. Apabila tubuh tidak cukup berhasil mengatasi infeksi tersebut maka akan terjadi inflamasi lokal (Rostinawati, 2009).

E. Metode Pengujian Antimikroba

Terdapat dua cara yang umum di gunakan dalam uji potensi secara mikrobiologik yaitu:

1. Metode difusi (Djide, 2005)

Difusi adalah proses perpindahan molekul secara acak dari satu posisi ke posisi lain. Ada beberapa metode difusi yang digunakan dalam penetapan potensi, antara lain:

a. Metode lempeng bujur sangkar

Dalam metode ini digunakan lempeng yang terbuka dengan pemasangan penyaring udara (Laminar Air Flow) yang berfungsi untuk menghindari kontaminasi dari bakteri di sekitarnya terhadap inokulum dalam lempeng. Udara disterilkan dan dialirkan secara horizontal atau vertikal. Pada lempeng bujur sangkar, ketebalan medium lebih homogen dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme yang digunakan pada penetapan potensi akan sama, sehingga efek yang diamati hanya semata-mata yang disebabkan oleh jumlah dosis antibiotika yang diuji.

Kerugian dari metode ini yaitu: dengan menggunakan lempeng yang besar, maka kemungkinan kontaminasi terhadap inokulum oleh bakteri di sekitarnya lebih besar.

b. Metode lempeng pada cawan petri

Keuntungan dari metode ini adalah dengan menggunakan beberapa cawan petri untuk menempatkan inokulum, maka kemungkinan kontaminasi akan lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan lempeng bujur sangkar.

Di samping itu juga ada kerugian yaitu dengan adanya variasi inokulum dalam beberapa cawan petri, maka kondisi tiap cawan petri akan berlainan. Kondisi tersebut akan mempengaruhi difusi antibiotika yang diuji dari pencadang ke medium agar sekitarnya.

c. Pencadang atau reservoir

Sebagai pencadang pada lempeng digunakan silinder dari kaca, logam tahan karat, silinder kapiler, marjan tulang ikan, cetak lubang (*punche hole*), cakram kertas (*paper disc*), yang masing-masing mempunyai keuntungan dan kerugian. Pencadang tersebut mempunyai ukuran diameter luar 8 mm, diameter dalam 6 mm dan tinggi 10 mm.

Penggunaan silinder gelas dan logam tahan karat sebagai pencadang mempunyai keuntungan yaitu jumlah larutan uji di dalam silinder dapat diperbanyak untuk menjamin ketersediaannya. Jumlah larutan antibiotika yang digunakan biasanya diatur sesuai kapasitas.

2. Metode Tabung (Turbidimetri) (Djide, 2005)

Pada metode ini media yang digunakan adalah media cair yang diinokulasikan dengan mikroorganisme uji yang sensitive dalam tabung

reaksi steril. Selanjutnya dipipet senyawa antibiotik yang diuji dan kemudian diinkubasikan. Pertumbuhan mikroorganisme di tandai dengan terjadinya kekeruhan dalam tabung sesuai dengan tingkat pengenceran dari senyawa yang di uji dan antibiotik baku.

Prinsip pengujian potensi antibiotika dengan metode ini adalah membandingkan derajat hambatan pertumbuhan mikroorganisme uji oleh dosis antibiotika yang diuji terhadap hambatan yang sama oleh dosis antibiotika baku pembanding dalam media cair.

Dalam metode ini, koefisien difusi antibiotika tidak lagi berperan dalam hambatan pertumbuhan mikroorganisme uji yang digunakan. Yang mempengaruhi keberhasilan uji potensi dengan metode ini adalah lama waktu inkubasi dan keseragaman suhu selama waktu inkubasi.

Metode dilusi dibedakan menjadi dua yaitu dilusi cair (broth dilution) dan dilusi padat (solid dilution).

1. Metode dilusi cair / broth dilution test (serial dilution)

Metode ini mengukur MIC (minimum inhibitory concentration atau kadar hambat minimum, KHM) dan MBC (minimum bactericidal concentration atau kadar bunuh minimum, KBM). Cara yang dilakukan adalah dengan membuat seri pengenceran agen antimikroba pada medium cair yang ditambahkan dengan mikroba uji. Larutan uji agen antimikroba pada kadar terkecil

yang terlihat jernih tanpa adanya pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang ditetapkan sebagai KHM tersebut selanjutnya dikultur ulang pada media cair tanpa penambahan mikroba uji ataupun agen antimikroba, dan diinkubasi selama 18 -24 jam. Media cair yang tetap terlihat jernih setelah inkubasi ditetapkan sebagai KBM.

2. Metode dilusi padat / solid dilution test

Metode ini serupa dengan metode dilusi cair namun menggunakan media padat (solid). Keuntungan metode ini adalah satu konsentrasi agen antimikroba yang diuji dapat digunakan untuk menguji beberapa mikroba uji. (Pratiwi, 2008).

G. Tinjauan Islam Mengenai Penelitian Tanaman Obat

a. Pentingnya Menjaga Kesehatan dalam Islam

Kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia" demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Karena kesehatan merupakan hak asasi manusia, sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, maka Islam menegaskan perlunya istiqomah memantapkan dirinya dengan menegakkan agama Islam. Satu-satunya jalan dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya.

Diantara perhatian Islam terhadap kesehatan adalah perintah dan anjuran menjaga kebersihan. Jika pembahasan ulama fikih dalam khazanah intelektual mereka, selalu diawali dengan Thaharah. Bahasan

mengenai kebersihan dan kesucian, bersih dari hadast besar dengan mandi junub, atau hadast kecil dengan berwudhu, bersih dari najis dan kotoran. Demikian juga selain wudhu, syarat sah shalat adalah bersih pakaian, tempat dari segala najis dan kotoranyang menodai.

Salah satu sifat manusia yang secara tegas dicintai Allah adalah orang yang menjaga kebersihan. Kebersihan digndengkan dengan taubat dalam Surat Al- Baqarah (2):222

Terjemahan:

“...Sesungguhnya Allah senang kepada orang ang bertaubat, dan senang terhadap orang yang membersihkan diri” (Q.S. Al- baqarah(2):222).

Dua anugerah yang membuat orang banyak merugi, yaitu kesehatan dan kesempatan (HR al-Bukhari). Gunakan dengan baik lima hal sebelum lima yang lain: Masa muda sebelum engkau tua, Sehat sebelum engkau sakit, kaya sebelum engkau jatuh miskin, masa senggangmu sebelum engkau sibuk, hidup sebelum engkau mati (Al- Juaisin, 2001).

Allah berfirman:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ ۗ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٢٢٢﴾

Terjemahnya:

“..,Makan dan minumlah kalian dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (Q.s Al- a'raf: 31).

Ayat tersebut mencakup perintah menjalani pola hidup sehat dalam bentuk melakukan dan menghindari, yakni mengkonsumsi makanan yang bermanfaat untuk tubuh serta meninggalkan pola makanan yang membahayakan. Makan dan minum sangat diperlukan untuk kesehatan, sedangkan berlebih-lebihan harus ditinggalkan untuk menjaga kesehatan.

Pada dasarnya agama sangat menganjurkan kesehatan, sebab apa yang bisa dilakukan orang dalam keadaan sehat lebih banyak daripada dalam keadaan sakit. Manusia bisa beribadah, berjihad, berdakwah dan membangun peradaban dengan baik jika faktor fisik berada dalam kondisi yang kondusif.

b. Tinjauan Islam Tentang Penyakit dan Pengobatan

Penyakit apa saja yang menimpa manusia pasti ada obatnya. Istilah yang populer tentang obat dalam berbagai teks-teks keagamaan ialah dawa' (bentuk tunggal) atau adwiyah (bentuk jamak) yang berarti obat.

Dari Jabir bahwa Rasulullah saw., bersabda :

(لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى)

Artinya:

“Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila didapatkan obat yang cocok untuk menyembuhkan suatu penyakit, maka penyakit itu akan hilang seizin Allah Ta’alaa (HR. Muslim).

Kebutuhan akan obat-obatan di era modern seperti sekarang ini sangat besar seiring dengan munculnya berbagai macam penyakit di kalangan masyarakat, Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda :

()

Artinya:

Allah yang menurunkan penyakit, dan Dia juga yang menurunkan obatnya.” (HR. Bukhari).

Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita, memang Allah yang menyembuhkan, akan tetapi obat penyembuhnya dari orang yang terpelajar dan ahli dalam bidang pengobatan tersebut. Allah adalah Maha Penyembuh, melalui sarana pengobatan dari orang yang mah ir. Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari oleh ilmu pengetahuan, penelitian, dan eksperimen ilmiah. Oleh karena itu setiap pengobatan hendaklah ditangani oleh para ahlinya .

c. Tumbuhan sebagai Obat

Segala sesuatu yang kita saksikan, padang yang terhampar begitu luas, lautan yang begitu dalam dan gunung-gunug yang menjulang tinggi bukanlah sesuatu yang tercipta secara kebetulan saja sebagaimana yang

diyakini beberapa golongan namun semuanya secara nalar dan logika tentulah ada yang menciptakan, ialah Allah yang menciptakan itu semua Allah adalah Tuhan semesta alam, yang menciptakan alam semesta dan semua makhluk di dalamnya, diciptakan alam semesta untuk tujuan-tujuan yang sangat penting. Dan tentunya disetiap tujuan penciptaan itu pastilah memiliki hikmah dibalik penciptaannya, Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan tidak sia-sia.

Sebagaimana *Al Qur'an* menginformasikan hal ini sebagai berikut:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبَادٍ

Terjemahnya:

“Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main.” (Al-Anbiyaa’:16)

Ketika Allah berkehendak berlaku lembut kepada hamba-Nya dengan menciptakan penyakit dan obat, pada saat yang sama. Allah menciptakan tumbuhan dan rumput-rumputan yang mengandung keistimewaan yang dapat berfungsi sebagai pencegahan dan penyembuhan penyakit manusia. Artinya Allah tidak menciptakan sesuatu tanpa makna dan arti. Akan tetapi Allah menciptakan setiap sesuatu dengan hikmah-hikmah tertentu (Mahmud, 2007).

Obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan dapat berasal dari bahan sintetik maupun dari bahan alam. Dewasa ini bahan alam khususnya tumbuhan telah banyak diteliti oleh para ahli untuk dikembangkan menjadi suatu bahan obat, mengingat bahwa negara kita kaya akan berbagai jenis tumbuhan yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, salah satu diantaranya adalah dalam pengobatan yang biasa dikenal dengan obat tradisional (Ab dushshamad, 2002).

Demikian pula diantara ciptaan itu Allah telah menciptakan hewan dan tumbuh-tumbuhan yang masing-masing memiliki tujuan, hewan bisa saja menjadi makanan untuk hamba-Nya demikian pula tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bukan hanya bisa menjadi makanan bagi manusia namun ia bisa memiliki fungsi ganda selain sebagai makanan manusia ia juga bisa digunakan dalam dunia pengobatan karena dalam intisari tanaman ter simpan banyak sel-sel yang bisa mengobati berbagai macam penyakit. Salah satu bagian tumbuhan yang memiliki unsur hara adalah daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang penting dan pada umumnya mempunyai sejumlah besar zat hara. Daun biasanya melebar, kaya akan suatu zat hijau yang dinamakan klorofil.

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

"Dia menumbuhkan tanaman-tanaman untukmu, seperti zaitun, korma, anggur dan buah-buahan lain selengkapnya. Sesungguhnya pada hal-hal yang demikian terdapat tanda-tanda Kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau memikirkan (An-Nahl : 11)

Semua ayat diatas menegaskan tentang fungsi ganda tumbuh-tumbuhan sebagai obat atas segala penyakit. Tumbuhan menjadi rezeki bagi makhluk hidup karena merupakan bahan pangan, bahan sandang, papan dan bahan obat-obatan (Savitri, 2008).

Dengan mengolah tumbuh-tumbuhan itu manusia bisa menciptakan berbagai macam resep yang bisa mengobati manusia dan berbagai macam jenis penyakit, karena tak ada penyakit yang diturunkan oleh Allah kecuali memiliki obat. Manusia saja yang mengolah dari semua sumber-sumber daya alam yang diciptakan-Nya termasuk didalamnya tumbuh-tumbuhan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Alat dan Bahan yang Digunakan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah autoklaf (Smich model YX-280 B), cawan petri diameter 10 cm, Erlenmeyer 100 ml dan 250 ml (Pirex), gelas piala 100 ml (Pirex), inkubator (Mettler), jangka sorong, ose bulat, spuit 10 ml, spuit 5 ml, spuit 1 ml, tabung reaksi (Pirex), timbangan analitik.

2. Bahan

Bahan yang digunakan adalah air suling, aluminium foil, daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih, etanol 70%, kultur murni bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*, Medium Nutrien Agar (NA).

B. Metode Kerja

A. Penyiapan Sampel Penelitian

1. Pengambilan Sampel

Sampel daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih diperoleh di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel ini dilakukan pada pagi hari. Sampel diambil saat tumbuhan sudah berbunga. Daun yang diambil adalah daun yang sudah tua, tidak berwarna kuning dan tidak ditumbuhi jamur.

2. Pengolahan Sampel

Sampel daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih yang telah diambil, dicuci hingga bersih dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan tanpa sinar matahari langsung kemudian diserbukkan dan selanjutnya sampel siap di ekstraksi.

3. Ekstrasi Sampel

Sampel daun Ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih yang telah kering ditimbang sebanyak 300 g dimasukkan ke dalam wadah maserasi, kemudian dibasahkan 2x bobot sampel (600 ml) dengan pelarut etanol selama 2 jam. Selanjutnya dicukupkan dengan 1 liter pelarut etanol 70%. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 24 jam di tempat yang tanpa pemaparan sinar matahari sambil sesekali diaduk, selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtrat. Ampas diekstraksi kembali dengan pelarut etanol. Hal ini dilakukan selama 3 x 24 jam. Filtrat yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diuapkan hingga diperoleh ekstrak etanol kental.

4. Pembuatan Sampel Penelitian

Ekstrak etanol yang diperoleh kemudian dibuat dalam konsentrasi 0,1%; 1% dan 2% b/v. Untuk konsentrasi 0,1% ditimbang sebanyak 0,01 gr ekstrak etanol daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.) cultivar umbi putih kemudian dilarutkan dalam 10 ml pelarut (etanol 70%), konsentrasi 1% ditimbang 0,1 gr ekstrak dan dilarutkan dalam 10 ml pelarut. Untuk konsentrasi 2% ditimbang 0,2 gr ekstrak dan dilarutkan dalam 10 ml pelarut.

5. Sterilisasi Alat

Sterilisasi alat dilakukan dengan cara mencuci alat-alat yang di perlukan dengan menggunakan detergen selama 15-30 menit. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik diudara terbuka. Setelah kering dibungkus dengan kertas perkamen. Tabung reaksi dan gelas erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dari kaca disterilkan di oven pada suhu 180°C selama 2 jam. Jarum ose disterilkan dengan pemanasan hingga memijar.

6. Pembuatan Medium

a. Medium Nutrien Agar (NA) dengan komposisi) :

| | | |
|--------------|----|---|
| Ekstrak Beef | 3 | g |
| Pepton | 5 | g |
| Agar | 15 | g |

Air suling sampai 1000 ml

pH 7,0

Cara pembuatan :

Bahan-bahan di atas dimasukkan ke dalam erlenmeyer, kemudian dilarutkan dalam air suling sampai 800 ml, dipanaskan sampai larut, dicukupkan sampai 1000 ml air suling kemudian diatur pH 7,0. Selanjutnya disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121 °C dengan tekanan 2 atm selama 15 menit.

B. Penyiapan Bakteri Uji

1. Peremajaan Biakan Murni Bakteri Uji

Bakteri uji berupa *Pseudomonas aeruginosa* dan *Staphylococcus aureus* yang berasal dari biakan murni, masing-masing diambil satu ose kemudian diinokulasikan dengan cara digoreskan pada medium nutrisi agar (NA) miring, selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 °C selama 24 jam.

C. Pengujian Daya Hambat

Pengujian daya hambat ekstrak etanol daun ubi jalar (*Ipomoea batatas*. L) dilakukan dengan menggunakan metode difusi menggunakan kertas cakram.

Disiapkan medium nutrisi agar (NA) steril dengan suhu 45 -50°C sebanyak 15 ml kemudian dicampur dengan 0,2 ml suspensi bakteri yang telah disiapkan sebelumnya, selanjutnya dituang secara aseptik ke dalam cawan petri steril dan dibiarkan hingga membeku. Selanjutnya ke atas kertas cakram yang telah ditetesi sebanyak 20µl dengan masing-masing konsentrasi sampel yaitu konsentrasi 0,1%; 1% dan 0,2% b/v dibiarkan hingga kering dan dibebaskan dengan mengetahui hilangnya bau etanol pada pipir disk serta pada kontrol positif diletakkan di atas permukaan medium secara aseptik dengan jarak titik tengah kertas cakram dengan yang lain lebih kurang 3 cm dan jarak dari pinggir cawan petri 2 cm. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 °C selama 24 jam.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan simplisia daun ubi jalar (*Ipomoea batatas L.*), cultivar umbi putih sebanyak 300 g yang di maserasi dengan 3 liter etanol 70% sehingga diperoleh ekstrak etanol kental sebanyak 37,12 g.

Hasil pengujian aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ubi jalar (*Ipomoea batatas L.*), cultivar umbi putih terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ubi jalar (*Ipomoea batatas L.*), cultivar umbi putih terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*

| Konsentrasi sampel | Diameter Zona Hambat (mm) | |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | <i>Staphylococcus aureus</i> | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> |
| 0,1 % | 9,06 | 7,07 |
| 1 % | 9,29 | 7,41 |
| 2 % | 11,30 | 11,62 |
| Ampisilin 0,7% | 20,31 | 21,85 |

B. Pembahasan

Ubi jalar (*Ipomoea batatas L.*), cultivar umbi putih termasuk salah satu tanaman palawija penting di Indonesia karena mempunyai potensi untuk terus dikembangkan baik sebagai bahan pangan, pakan, maupun bahan industri Secara

tradisional tanaman ini sudah lama dipercayai sebagai obat penyembuh luka bakar, obat bisul, penurun panas dan diare. Aktivitas antibakteri pada daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih disebabkan adanya kandungan senyawa organik (saponin, flavonoid, dan polifenol) yang bersifat sebagai antibakteri (Mursito, 2009).

Metode yang digunakan untuk ekstraksi adalah dengan cara maserasi karena maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi digunakan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan akan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel (Depkes RI, 1986).

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan simplisia daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih sebanyak 300 g yang di maserasi dengan 3 liter etanol 70% sehingga diperoleh ekstrak etanol kental sebanyak 37,12 g.

Metode yang digunakan untuk menghambat aktivitas antibakteri adalah difusi agar menggunakan piper disk dengan medium Nutrien Agar (NA). Metode ini dilakukan untuk mengetahui besarnya diameter hamba tan yang terbentuk pada bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*, setelah masa

inkubasi 24 jam, larutan ekstrak etanol daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih akan berdifusi keluar untuk menghambat pertumbuhan mikroba pada medium, yang ditandai adanya zona hambat bening yang terdapat di sekeliling piper disk. Zona hambat yang terbentuk inilah yang kemudian diukur diameternya.

Medium Nutrient agar (NA) merupakan medium yang baik sebagai tempat tumbuhnya beberapa bakteri gram positif dan gram negatif yang dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi bagi pertumbuhan bakteri yang disterilkan dengan suhu 45-50⁰C sebanyak 15 ml kemudian dicampur dengan 0,2 ml suspensi bakteri yang telah disiapkan sebelumnya, selanjutnya dituang secara aseptik kedalam cawan petri steril agar tidak terkontaminasi dengan jamur atau bakteri lain, dibiarkan hingga membeku. Masing-masing konsentrasi sampel diambil menggunakan mikropipet sebanyak 20 μ l dimana daya tampung untuk tiap piper disk maksimal 20 μ l.

Infeksi merupakan penyakit yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain atau dari hewan ke manusia. Infeksi dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, dan protozoa. Organisme-organisme tersebut dapat menyerang seluruh tubuh atau sebagian dari padanya (Gibson, 1996). *Staphylococcus aureus* merupakan mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi pada luka. Mikroorganisme tersebut terdapat pada folikel rambut dan kelenjar keringat yang akan membentuk koloni-koloni pada luka bakar yang belum memperoleh pengobatan awal dengan antibiotika topical.

Infeksi pada luka merupakan suatu gangguan kronis pada kulit yang dapat disebabkan oleh mikroorganisme yaitu *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa* (Moenadjat, 2009).

Penelitian ini memperlihatkan hasil bahwa ekstrak etanol daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih dengan beberapa konsentrasi yaitu 0,1 %; 1% dan 2% mampu menghambat pertumbuhan bakteri uji. Hal ini disebabkan adanya senyawa kimia tertentu yang diduga terkandung dalam sampel daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih yang merupakan salah satu komponen kimia yang terkandung dalam daun ubi (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih yang bersifat sebagai antibakteri (Mursito, 2009).

Berdasarkan hasil dari pengukuran diameter hambatan dari sampel terlihat jelas bahwa setiap konsentrasi sampel memberikan ukuran diameter hambatan yang berbeda-beda. Aktivitas antibakteri daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih yang diukur dengan diameter zona bening berkisar antara 7,07-11,62 mm. Pada perlakuan konsentrasi 0,1 % dengan masa inkubasi 24 jam, Zona penghambatan pada bakteri uji *Staphylococcus aureus* berdiameter 9,06 mm, *Pseudomonas aeruginosa* berdiameter 7,07 mm. Pada perlakuan konsentrasi 1 % dengan masa inkubasi 24 jam zona penghambatan pada bakteri uji *Staphylococcus aureus* berdiameter 9,29 mm, *Pseudomonas aeruginosa* berdiameter 7,41 mm. Pada perlakuan konsentrasi 2 % dengan masa inkubasi 24 jam zona penghambatan pada bakteri uji *Staphylococcus aureus* 11,30 mm dan *Pseudomonas aeruginosa* berdiameter 11,62 mm.

Untuk membandingkan aktivitas antibakteri daun ubi jalar putih (*Ipomoea batatas* L.), c.v ubi putih dengan antibakteri sebagai pengobatan maka digunakan antibiotik yaitu Ampisilin 500 mg dengan konsentrasi 0,7 % yang diuji aktivitas antibakterinya sebagai uji kontrol. Pada bakteri *Staphylococcus aureus* memiliki zona hambat 20,31 mm dan *Pseudomonas aeruginosa* 21,85 mm.

Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri dalam ekstrak etanol daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar ubi putih mampu menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa*.

Pengujian aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar ubi putih yang dibuat dengan beberapa konsentrasi yaitu: 0,1 %; 1% dan 2%. Semakin tinggi konsentrasi yang diberikan maka semakin tinggi pula zona bening atau daya hambatnya.

Adanya perbedaan diameter dapat dipengaruhi oleh jenis bakteri uji yang digunakan. Setiap bakteri memiliki kepekaan yang berbeda-beda terhadap sampel dalam hal ini senyawa antibakteri dimana suatu bakteri akan membentuk resistensi dalam dirinya yang merupakan mekanisme alamiah dalam mempertahankan hidupnya (Mutscler, 1991). Selain pengaruh dari jenis bakteri, Perbedaan diameter hambatan juga disebabkan konsentrasi sampel dalam hal ini kemampuan dari zat yang diduga terkandung dalam sampel dalam menghambat pertumbuhan bakteri uji.

Selanjutnya dilakukan analisis statistik menggunakan uji Anova aktivitas antibakteri pada kelompok uji (ekstrak sampel) dan Ampisilin sebagai pembanding menggunakan rancangan acak lengkap dan diperoleh hasil bahwa perbedaan konsentrasi berpengaruh pada penghambatan aktivitas bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dan *Staphylococcus aureus* kemudian dilanjutkan dengan Uji Beda Jarak Nyata Duncan (BJND) dan dapat dilihat bahwa ekstrak etanol daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih dengan konsentrasi 0,1%; 1% dan 2% serta Ampisilin menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan.

Ekstrak dengan konsentrasi 0,1% dan 1% menunjukkan perbedaan efek yang signifikan demikian pula ekstrak 2% dan Ampisilin menunjukkan perbedaan efek yang sangat signifikan. Dari hasil ini maka dapat dikatakan bahwa semua konsentrasi ekstrak etanol daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih memiliki efek yang berbeda nyata dengan kontrol Ampisilin dalam menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa* dalam hal ini Amphyccillin memiliki efek yang lebih besar.

Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L), cultivar umbi putih dengan konsentrasi 0,1%: 1% dan 2% dapat menghambat pertumbuhan kedua bakteri tersebut dan memberikan efek yang berbeda nyata dengan Ampisilin sebagai pembanding.

Konsentrasi tertinggi yang mampu menghambat pertumbuhan kedua bakteri tersebut adalah 2% dengan rata-rata diameter zona hambat 11,30 mm untuk bakteri *Staphylococcus aureus* dan 11,62 mm untuk bakteri *Pseudomonas aeruginosa* dan semua konsentrasi memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri tersebut berada dibawah kontrol Ampisilin sebagai ai pembanding dengan rata-rata diameter zona hambat 20,31 mm untuk *Staphylococcus aureus* dan 21,85 mm untuk bakteri *Pseudomonas aeruginosa*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak etanol daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa* pada konsentrasi 0,1%; 1% dan 2%.
2. Aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Pseudomonas aeruginosa* memberikan zona hambat tertinggi pada konsentrasi 2% dengan diameter zona hambat 11,30 mm dan 11,62 mm.

B. Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan atau mengidentifikasi senyawa kimia yang terkandung dalam daun ubi jalar dengan beberapa bakteri lain.


DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI, Bandung : CV. Penerbit J - ART, 2005
- Afriastini, j.j. *Daftar Tanaman-tanaman*. PT. Penebar swadaya: Jakarta, 1992. Hal 144.
- Anonim, *Material Medika Indonesia*, jilid 5. Dirjen POM. Departemen Kesehatan RI: Jakarta, 1989.
- Apraidji, Wied Harry. *Khasiat ubi jalar*. <http://www.pitoyo.com/mod.php?> 2006. (diakses 24 Juni 2011).
- Depkes RI. *Farmakope Indonesia* Edisi III. Dirjen POM, Jakarta, 1979.
- Depkes RI. *Sediaan Galenik*. Jakarta, 1986. hal 7- 23
- Djide, Natsir. *Analisis Mikrobiologi Farmasi*. Makassar : Laboratorium Mikrobiologi Farmasi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, 2006.hal 140-142
- Djide, Natsir. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Farmasi*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2008. hal 340-342
- Garitty. G. M., Bell. J. A. and Lilburn. T. G, *Taxonomic Outline of The Prokaryotes Bergey's Mannual of Systematic Bacteriologi, 2th Edition* . United State of America, Springer, New York Berlin Hendelberg. 2004 . Hal 24-187.
- Gibson, J. M. *Mikrobiologi dan Patologi Modern Untuk Perawat* , 1.6.EGC; Jakarta, 1996.
- Gunawan, Sulistia Gan. *Farmakologi dan Terapi, Edisi V*. Gaya Baru: Jakarta. 2007. Hal 585-588.
- Hariana, Arief, Drs. *Tumbuhan Obat Dan Khasiatnya*. Niaga Swadaya: Jakarta, 2004.
- Kuntaman. *Penyakit Infeksi di Indonesia* . Di edit oleh : Nasronudin dkk, Airlangga University Press , Surabaya, 2007.Hal . 177 -178.
- Mahmud, Hasan, Mahir. *Mukjizat Kedokteran Nabi* . Qultum Media: Jakarta, 2007. Hal 75.
- Mansjoer, Arief. *Kapita Selekta Kedokteran* . Jakarta: Media Aesculapius. 2000.


- Moenadjat. Y. *Luka Bakar Masalah dan Tatalaksana*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia: Jakarta, 2009
- Mursito, Bambang. *Sehat Di usia Lanjut dengan Tradisional*. Penebar swadaya: Jakarta, 2009. Hal 103
- Pelczar, Michael J. and Chan. E. C. S. *Dasar-Dasar Mikrobiologi, Terjemahan Oleh Hadioetomo, Ratna sari dkk*, Jakarta : Universitas Indonesia. 2008. Hal 954-955.
- Pratiwi, Sylvia T. *Mikrobiologi Farmasi*. Jakarta : Erlangga, 2008.hal 188-191
- Melati,Putja. [http: library.unib.ac.id/koleksi/ FMIPA -Bio.pdf](http://library.unib.ac.id/koleksi/FMIPA-Bio.pdf). 2009. (diakses 24 Juni 2011).
- Qardhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2002.
- Siswadi, ir, M.P. *Budidaya Tanaman Palawija*. PT. Citra Aji Parama: Yogyakarta, 2006. Hal 41.
- Sudjana. *Metode Statistik edisi 6*, Tarsito: Bandung.
- Sudjadi. *Metode Pemisahan Edisi I*. Yogyakarta: Kanisius, 1988. Hal 60.
- Sukarsono. *Tumbuhan Untuk Pengobatan*. PT. Grasindo: Jakarta, 2008. Hal 24.
- Tina Rostinawati, M.Si, Apt.. *Aktivitas antibakteri madu amber dan madu putih terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa multiresisten dan Staphylococcus aureus resisten metisilin*. Penelitian Mandiri. Universitas Padjajaran,FakultasFarmasi.Jatinagor. 2009.
- Tjitrosoepomo, Gembong. *Taksonomi Tumbuhan Obat-obatan*. Universitas Gajah Mada: Yogyakarta, 1994.

Lampiran 1


1. Pembuatan Medium Nutrien Agar (NA)



2. Ekstraksi Sampel dan Pengujian Daya Hambat



Lampiran 2




Gambar 1. Foto Tanaman Ubi Jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih

Keterangan :

- a : Daun
- b : Tangkai
- c : Bunga
- d : Tulang daun
- e : Tepi daun



Lampiran 3



Gambar 2. Foto Pengujian Daya Hambat Ekstrak Etanol Daun Ubi Jalar Putih (*Ipomoea batatas. L*) Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus*

Keterangan:

A : Pengukuran 1

B : Pengukuran 2


C : Pengukuran 3

a : Konsentrasi 0,1%

b : Konsentrasi 1%


c : Konsentrasi 2%

d : Kontrol



A

B



C

Gambar 3. Foto Pengujian Daya Hambat Ekstrak Etanol Daun Ubi Jalar Putih (*Ipomoea batatas*. L) Terhadap Bakteri *Pseudomonas aeruginosa*

Keterangan:

A : Pengukuran 1

B : Pengukuran 2

C : Pengukuran 3

a : Konsentrasi 0,1%

b : Konsentrasi 1%

c : Konsentrasi 2%

d : Kontrol

Lampiran 4

Tabel.2 Analisis statistik uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* secara acak lengkap (RAL)

| Perlakuan | Pengukuran diameter zona hambat bakteri uji (mm) | | | Jumlah | Rata-rata |
|---------------|--|-------|------|---------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | | |
| 0,1% | 11,39 | 7,04 | 8,75 | 27,18 | 9,06 |
| 1% | 11,39 | 8,1 | 8,39 | 27,88 | 9,29 |
| 2% | 11,08 | 14,12 | 8,72 | 33,92 | 11,30 |
| Kontrol | 22,45 | 18,08 | 20,4 | 60,95 | 20,31 |
| Jumlah | | | | 151,95 | 49,96 |

A. Derajat Bebas

$$\begin{aligned}
 1. \text{ DB Total} &= (P.R) - 1 \\
 &= (4.3) - 1 \\
 &= 11
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \text{ DB Perlakuan} &= P - 1 \\
 &= 4 - 1 \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \text{ DB Galat} &= \text{DB Total} - \text{DB Perlakuan} \\
 &= 11 - 3 \\
 &= 8
 \end{aligned}$$

B. FK (Faktor Koreksi)

$$\begin{aligned}
 FK &= \frac{J^2}{I-1} \\
 &= \frac{(151,95)^2}{3 \times 4} \\
 &= \frac{23088,8025}{12}
 \end{aligned}$$

$$= 1924,06$$

C. Jumlah Kuadrat (JK)

$$\begin{aligned} 1. \text{ JKT} &= \left[\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}^2 \right] \\ &= [(11,39^2) + (7,04^2) + \dots + (20,42^2) - 1924,06] \\ &= [(74,6380) + (55,056) + \dots + (416,976) - 1924,06] \\ &= 2167,6332 - 1924,06 \\ &= 243,5749 \end{aligned}$$

2. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)

$$\begin{aligned} \text{JKP} &= \left\{ \frac{\sum_{i=1}^k j_i^2}{n_i} \right\} - \text{FK} \\ &= \left\{ \frac{(27,18)^2 + (27,88)^2 + (33,92)^2}{3} \right\} - 1924,06 \\ &= 2127,171767 - 1924,06 \\ &= 203,117667 \end{aligned}$$

3. Jumlah Kuadrat Galat (JKG)

$$\begin{aligned} \text{JKG} &= \text{JK Total} - \text{JK Perlakuan} \\ &= 243,5749 - 203,117667 \\ &= 40,457233 \end{aligned}$$

D. Kuadrat Tengah (KT)

$$\begin{aligned} \text{a. KT Perlakuan} &= \frac{\text{JK Perlakuan}}{\text{DB Perlakuan}} \\ &= \frac{203,117667}{3} \\ &= 67,705889 \\ \text{b. KT Galat} &= \frac{\text{JK Galat}}{\text{DB Galat}} \end{aligned}$$

$$= \frac{40457233}{8}$$

$$= 5,057154$$

E. Perhitungan Distribusi

$$F_{\text{Hitung}} = \frac{KT \text{ Perlakuan}}{KT \text{ Galat}}$$

$$= \frac{67.705889}{5.057154}$$

$$= 13,8814$$

Tabel.3 : Hasil analisis varians uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*

| Sumber variasi | DB | JK | KT | F _{hitung} | F _{tabel} | |
|----------------|-----------|-----------------|-------------|---------------------|--------------------|------|
| | | | | | 5% | 1% |
| Perlakuan | 3 | 203,117667 | 67,705889 | 13,388** | 4,07 | 7,59 |
| Galat | 8 | 40,457233 | 50,57154125 | | | |
| Total | 11 | 243,5749 | - | | | |

Keterangan : (**) Sangat signifikan karena $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$

Tabel 4. Beda Jarak Nyata Duncan (BJND) aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*

| Perlakuan | Laju Peningkatan | Beda nyata pada jarak p | | | |
|------------|------------------|-------------------------|-------|-------|------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,1% | 9,06 | | | | |
| 1% | 9,29 | 0,23 | - | - | |
| 2% | 11,30 | 2,01 | 2,24 | - | |
| Kontrol | 20,31 | 9,01 | 11,02 | 11,25 | |
| P | | | | | |
| 0,05 (p,8) | | 3,26 | 3,39 | 3,47 | 3,52 |
| 0,01 (p,8) | | 4,24 | 5,00 | 5,14 | 5,23 |
| BJND | | | | | |
| 0,05 (p,8) | | 3,46 | 3,59 | 3,68 | 3,73 |
| 0,01 (p,8) | | 4,49 | 5,30 | 5,45 | 5,78 |

Tabel.5 Analisis statistik uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa* secara acak lengkap (RAL)

| Perlakuan n | Pengukuran diameter zona hambat bakteri uji (mm) | | | Jumlah | Rata-rata |
|----------------|---|-------|-------|--------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | | |
| 0,1% | 7,08 | 7,06 | 7,08 | 7,07 | 21,22 |
| 1% | 7,42 | 7,40 | 7,43 | 7,41 | 22,52 |
| 2% | 11,74 | 11,72 | 11,42 | 11,62 | 34,88 |
| Kontrol | 22,76 | 22,75 | 20,06 | 21,85 | 65,57 |
| Jumlah | | | | 47,95 | 144,19 |

A. Derajat Bebas

$$\begin{aligned}
 1. \text{ DB Total} &= (P.R) - 1 \\
 &= (4.3) - 1 \\
 &= 11
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \text{ DB Perlakuan} &= P - 1 \\
 &= 4 - 1 \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \text{ DB Galat} &= \text{DB Total} - \text{DB Perlakuan} \\
 &= 11 - 3 \\
 &= 8
 \end{aligned}$$

B. FK (Faktor Koreksi)

$$\begin{aligned}
 FK &= \frac{J^2}{I-1} ni \\
 &= \frac{(144,19)^2}{3 \times 4} \\
 &= 12,0158
 \end{aligned}$$

C. Jumlah Kuadrat (JK)

$$\begin{aligned} 1. \text{ JKT} &= \left[\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}^2 \right] \\ &= [(7,08^2) + (7,06^2) + \dots + (20,06^2) - 12,0158] \\ &= [(50,126) + (49,83) + \dots + (517,5625) - 12,0158] \\ &= 2146,7003 \end{aligned}$$

2. Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)

$$\begin{aligned} \text{JKP} &= \left\{ \frac{\sum T_i^2}{n_i} \right\} - \text{FK} \\ &= \left\{ \frac{(21,22)^2 + (22,52)^2 + (34,88)^2}{3} \right\} - 12,0158 \\ &= 1654,399525 - 12,0158 \\ &= 1642,383725 \end{aligned}$$

3. Jumlah Kuadrat Galat (JKG)

$$\begin{aligned} \text{JKG} &= \text{JK Total} - \text{JK Perlakuan} \\ &= 2146,7003 - 1642,383725 \\ &= 504,316575 \end{aligned}$$

D. Kuadrat Tengah (KT)

$$\begin{aligned} \text{a. KT Perlakuan} &= \frac{\text{JK Perlakuan}}{\text{DB Perlakuan}} \\ &= \frac{1642,383725}{3} \\ &= 547,4612417 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. KT Galat} &= \frac{\text{JK Galat}}{\text{DB Galat}} \\ &= \frac{504,316575}{8} \\ &= 70,5395718 \end{aligned}$$

E. Perhitungan Distribusi

$$\begin{aligned}
 F_{\text{Hitung}} &= \frac{KT_{\text{Perlakuan}}}{KT_{\text{Galat}}} \\
 &= \frac{547,4612417}{70,53957188} \\
 &= 7,76105138
 \end{aligned}$$

Tabel.6 Hasil analisis varians uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa*

| Sumber variasi | DB | JK | KT | F _{hitung} | F _{tabel} | |
|----------------|-----------|-------------------|-------------|---------------------|--------------------|------|
| | | | | | 5% | 1% |
| Perlakuan | 3 | 1.642,388 | 547,4612417 | 7,76** | 4,07 | 7,59 |
| Galat | 8 | 504,3165 | 70,53957188 | | | |
| Total | 11 | 2.146,7003 | - | | | |

Keterangan : (**) Sangat signifikan karena $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$

Koefisien Keragaman

$$\begin{aligned}
 KK &= \frac{KTG}{\gamma} \times 100 \% \\
 &= \frac{70,53957188}{47,95} \times 100 \% \\
 &= 0,175157 \times 100 \% \\
 &= 17,5 \%
 \end{aligned}$$

Uji Beda Jarak Nyata Duncan

$$JNTD = P (p.v) . S \gamma$$

$$\begin{aligned}
 S \gamma &= \frac{2KTG}{\text{replikasi}} = \frac{2 \cdot 70,53957188}{3} \\
 &= \frac{11,8776}{3} \\
 &= 3,9592247
 \end{aligned}$$

Tabel 7. Beda Jarak Nyata Duncan (BJND) aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.), cultivar umbi putih terhadap bakteri *Pseudomonas aeruginosa*

| Perlakuan | Laju Peningkatan | Beda nyata pada jarak p | | | |
|------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,1% | 7,07 | | | | |
| 1% | 7,41 | 0,34 _{ss} | - | - | |
| 2% | 11,62 | 4,21 _{ss} | 4,55 _{ss} | - | |
| Kontrol | 21,85 | 10,23 _{ss} | 14,44 _{ss} | 14,78 _{ss} | |
| P | | | | | |
| 0,05 (p,8) | | 3,26 | 3,39 | 3,47 | 3,52 |
| 0,01 (p,8) | | 4,24 | 5,00 | 5,14 | 5,23 |
| BJND | | | | | |
| 0,05 (p,8) | (p.sy) | 12,9096 | 13,4244 | 13,741 | 13,9392 |
| 0,01 (p,8) | | 16,7904 | 19,80 | 2.035,44 | 60,3108 |

Keterangan :

Sangat signifikan (ss) : ada perbedaan efek pada tiap konsentrasi perlakuan

RIWAYAT HIDUP



Nurhayati, di lahirkan di Limbung, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 08 November 1989. Merupakan anak ke-5 dari 6 bersaudara dari pasangan : Ayah Syarifuddin.C dan Ibu Jumasih.R.

Memasuki jenjang pendidikan dasar pada tahun 1995 tepatnya di SDI Bontobu'ne tamat tahun 2000, Melanjutkan ke jenjang SMP Negeri 1 Bajeng tahun 2001 dan tamat tahun 2003, Kemudian melanjutkan pendidikan pada SMU Negeri 1 Bajeng tahun 2004 dan tamat tahun 2007. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Tercatat sebagai Mahasiswa Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan di Perguruan tinggi yang sama mendapat gelar Sarjana Farmasi (S. Farm) pada tahun 2011.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R