

**HUBUNGAN PEMBERIAN ASI EKSLUSIF DAN PENYAKIT INFEKSI
TERHADAP STATUS GIZI BAYI UMUR 7 BULAN DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS WAWONDULA KEC.TOWUTI
KAB. LUWU TIMUR
TAHUN 2011**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat (Gizi)
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**


UNIVERSITAS Oleh: AM NEGERI

RAHMIATI
70200107036

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, Agustus 2011
Penulis,

RAHMIATI
NIM : 70200107036

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Rahmiati
Nim : 7020107036
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Judul Penelitian : Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dan Penyakit Infeksi Terhadap Sastus Gizi Bayi Umur 7 Bulan di Wilayah Kerha Puskesmas Wawondula kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011

Masalah gizi pada hakekatnya adalah masalah kesehatan masyarakat, namun penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja. Gizi merupakan salah satu komponen dari lingkungan yang memegang peranan penting dalam kesehatan dan tumbuh kembang anak. Penyebab langsung masalah gizi yaitu asupan gizi dan penyakit infeksi dan penyebab tidak langsung adalah ketahanan pangan keluarga, perawatan kesehatan, pola asuh ibu dan praktek kebersihan dan sanitasi lingkungan

Pengumpulan data dilaksanakan di Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur mulai tanggal 18 juli – 6 Agustus tahun 2011 yang bertujuan untuk mengetahui Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dan Penyakit Infeksi Terhadap Status Gizi bayi Umur 7 Bulan, jenis penelitian ini adalah *Survei Analitik* dengan cara pengambilan sampelnya secara *Accidental Sampling*. Populasi penelitian adalah semua bayi umur 7 bulan. Sampel yang diperoleh berjumlah 47 sampel. Pengumpulan data tentang penyakit infeksi menggunakan quisioner dengan cara wawancara langsung dan data status gizi dengan cara penimbangan dengan menggunakan timbangan dacin.

Hasil penelitian di peroleh bahwa dari 47 sampel Status Gizi Baik Sebanyak 30 bayi (63,8%) dan Status Gizi kurang Sebanyak 17 bayi (36,2%). Pemberian ASI Eksklusif sebanyak 16 bayi (34 %) dan Pemberian ASI non Eksklusif sebanyak 31 bayi (66 %). Menderita Penyakit Infeksi sebanyak 32 bayi (68,1 %) dan yang tidak Menderita Penyakit Infeksi 15 (31,9 %).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi ($p=0,006$) ($p<0,05$). Terdapat hubungan antara penyakit infeksi dengan status gizi bayi ($p=0,011$) ($p < 0,05$).

Disarankan kepada ibu-ibu agar lebih memperhatikan kesehatan bayi terutama pemberian ASI eksklusif serta diharapkan kepada petugas kesehatan agar meningkatkan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat khususnya pada ibu hamil dan yang mempunyai balita mengenai pentingnya meningkatkan status gizi keluarga.

Kata Kunci : Status Gizi, ASI Eksklusif dan Penyakit Infeksi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan ketetapan serta membukakan pintu hati, melapangkan pikiran, kesempatan dan kesehatan dengan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dan Penyakit Infeksi Terhadap Status Gizi Bayi Umur 7 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011**”. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada kehidupan yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari berbagi pihak yang telah banyak membantu selama penyusunan skripsi ini, maka izinkanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orangtuaku tercinta, **Ayahanda Buhari. S** dan

Ibunda Rahmawati yang telah mencurahkan kasih sayang serta keikhlasan dalam mendidik, mengasuh, membesarkan, membiayai serta untaian doa yang tiada henti-hentinya demi kebaikan penulis, hingga kapanpun penulis takkan biasa membalasnya. Hanya doa yang dapat penulis lakukan atas pengorbanannya selama ini Ya Allah rahmati kedua orangtuaku, ampunilah dosa mereka, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, semoga mereka berbahagia didunia dan di akhirat.

Ucapan terima kasih penulis berikan kepada **Ibu Irviani A Ibrahim, SKM, M.Kes** selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan dorongan untuk penyelesaian studi pada Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Tak lupa pula penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ibu Andi Susilawati, S.Si, M.Kes** selaku pembimbing I dan **Hj.Syarfaini, SKM, M.Kes** selaku Pembimbing II, atas segala bantuan, waktu, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis berikan kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, beserta Bapak Pembantu Dekan, seluruh staf, dosen dan pegawai atas bantuannya selama penulis menjalani masa studi.

3. Ibu Andi Susilawaty, S.Si, M.Kes sebagai Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas bantuan dan arahannya selama ini.
4. Ibu Ir. Hikmawati Mas'ud, M.Kes, selaku penguji I dan Drs. Supardin, M.HI selaku penguji II yang telah banyak memberikan masukan dalam perbaikan skripsi ini.
5. Bapak drg.Makrudi Hersal selaku kepala Puskesmas Wawondula beserta stafnya yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
6. Para Kader Posyandu yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian
7. Kakakku tercinta Burhan, Nia dan Adikku Safri, Hardi, Musayyin yang telah banyak memberikan motivasi selama penulis melakukan penelitian.
8. Sepupu-Sepupuku tercinta Ummy, Novi, Heruddin dan Ahmad Ganing beserta seluruh keluarga yang banyak membantu penulis selama melakukan penelitian
9. Sahabat-sahabatku tercinta D'sUsy Eighirls (Anhy, Fatma, Cia, Nunu, Misbah, Waddah, Fajar) serta Ikal, Anton, Icha, Alm. Whaty dan semua sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam memotivasi penulis selama penyusunan skripsi, kebaikan kalian penulis belum bisa membalasnya.
10. Teman-teman PBL di Dusun Bontociniayo (Fahrul, Anton, Whywi, Atry, Hasni, Cheey' Fatma Ulfa) dan teman-teman KKN di Dusun Silanggaya Desa Kanreapia (Ipul, K'Chimz, Daya, Nisa, Ajhy, Neneng, Muthy, Fatan, Ma'ruf, Ecky, Ida, dan Rapi). Teman-teman di Silanggaya (Ilyaz, Bazry, Bang Acho', Wawan, Adhy, Rudy, Enhy) dan semua yang tidak dapat disebutkan.

11. Saudara-saudaraku di KSR-PMI Unit 107 UIN Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan semangat dan motivasinya selama ini.
12. Saudara-saudaraku di Jurusan Gizi Kesehatan Masyarakat angkatan 2007 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu atas masukan dan kritiknya beserta canda tawanya selama ini.
13. Seluruh teman-teman Kesmas angkatan 2007 yang senantiasa memberikan kebersamaan di Fakultas Kesehatan ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang berkepentingan.

Akhinya, hanya kepada Allah SWT. penulis bersimpuh dan berdoa. Semoga amal ibadah kita disertai niat yang ikhlas, terutama mereka yang telah membantu penulis mendapat balasan yang berlipat ganda dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Amin ya rabbal a'alamin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar, Agustus 2011

Penulis

RAHMIATI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Status Gizi Bayi.....	8
B. Tinjauan Umum Tentang ASI Eksklusif.....	28
C. Tinjauan Umum Pandangan Islam Tentang ASI dan Penyakit.....	35
D. Tinjauan Umum Tentang Penyakit Infeksi	39
BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti.....	49
B. Kerangka Konsep.....	51

C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif 52

D. Hipotesis Penelitian 53

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian 54

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 54

C. Populasi, Sampel dan Responden 54

D. Variabel Penelitian 55

E. Pengumpulan Data 55

F. Instrumen Penelitian 55

G. Pengolahan dan Penyajian Data 56

H. Analisis Data 56

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 58

B. Pembahasan 65

BAB VI KESIMPULAN

A. Kesimpulan 75

B. Saran-saran 76

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL


Tabel		Halaman
Tabel 1	Interpertasi Status Gizi Berdasarkan Indeks Antropometri	23
Tabel 2	Analisis Statistik	57
Tabel 3	Distribusi Responden Menurut Umur di Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011	58
Tabel 4	Distribusi Responden Menurut Jumlah Anggota dalam keluarga di Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011	59
Tabel 5	Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan di Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun n2011	59
Tabel 6	Distribusi Responden Menurut Pekerjaan di Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011	60
Tabel 1.7	Distribusi Responden Menurut pekerjaan Kepala Keluarga di Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011	60
Tabel 1.8	Distribusi Sampel Menurut Jenis Kelamin di Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011	61
Tabel 1.9	Distribusi Sampel Menurut Pemberian ASI Eksklusif di Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011	62
Tabel 1.10	Distribusi Status Gizi Bayi Menurut Z-Score BB/U di Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011	62

- Tabel 1.11** Distribusi Sampel Menurut Kejadian Penyakit Infeksi dalam Satu Bulan Terakhir di Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 **63**
- Tabel 1.12** Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Status Gizi Bayi di Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 **63**
- Tabel 1.13** Hubungan Penyakit Infeksi dengan Status Gizi Bayi di Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 **64**



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1	Faktor Penyebab Gizi Kurang	27
Gambar 2	Kerangka Konsep Penelitian	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian

Lampiran 2. Master Tabel

Lampiran 3. Output SPSS

Lampiran 4. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Kesehatan

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur

Lampiran 6. Surat Keterangan dari Puskesmas Wawondula

Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah gizi pada hakekatnya adalah masalah kesehatan masyarakat, namun penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja. Penyebab timbulnya masalah gizi adalah multifaktor, oleh karena itu pendekatan penanggulangannya harus melibatkan berbagai sektor yang terkait. Masalah gizi di Indonesia dan di negara berkembang pada umumnya didominasi oleh masalah Kurang Energi Protein (KEP), masalah Anemia Besi, masalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), masalah Kurang Vitamin A (KVA), dan masalah obesitas terutama di kota – kota besar. (Supariasa, 2001)

Berdasarkan data 'The State of The World Children, dalam Depkes RI, 2008 proporsi anak balita kurang gizi pada tahun 2000-2006 di negara sedang berkembang adalah 28% dan untuk tingkat dunia 26%. Sedangkan di negara industri tidak ada lagi anak balita kurang gizi, sementara proporsi balita kurang gizi di negara berkembang adalah 35%. Indonesia masih menghadapi masalah rawan gizi serius yang terlihat pada tahun 2005 sekitar 5 juta balita (27,5%) kekurangan gizi, sebanyak 3,6 juta anak balita (19,2%) dalam tingkat gizi kurang dan 1,5 juta (8,3%) gizi buruk (Depkes RI, 2008)

Data Sulsel tentang gizi anak balita memperlihatkan bahwa umumnya anak Sulsel mempunyai peringkat menengah dibanding propinsi lainnya di Indonesia. Hampir semua indikator status gizi menyerupai data rata-rata nasional. Untuk anak gizi kurang sebesar 12,0% dan gizi buruk 5,1% (rata-rata nasional masing-masing 13,0% dan 5,4%) (Hadju, 2010).

Secara umum prevalensi gizi buruk di Sulawesi Selatan menurut hasil Riskesdas adalah 5,1% dan gizi buruk 12,5% dari 23 kab./kota terdapat delapan kab./kota yang diatas angka provinsi dan Sulawesi Selatan sudah mencapai target pencapaian program perbaikan gizi pada RPJM 2015 sebesar 20% Pada kasus gizi buruk di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 dengan adanya gejala klinis terbagi atas 3 jenis, yaitu marasmus, kwashiorkor, dan gabungan marasmik-kwashiorkor (Dinkes, 2008)

Jumlah kasus gizi buruk berdasarkan ke tiga jenis tersebut di Sulsel pada tahun 2008 sebanyak 95 kasus. CFR gizi buruk di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 sebesar 1,1%, artinya setiap 100 kasus gizi buruk meninggal 1 orang. Situasi gizi buruk di Sulsel pada tahun 2009 berdasarkan profil kesehatan Kab./Kota tercatat sebanyak 2.825 orang (Dinkes, 2009)

Sementara kasus diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Wawondula juga cukup tinggi yaitu sebanyak 808 kasus pada tahun 2010. Sedangkan ISPA yang merupakan penyebab utama kesakitan pada anak balita di wilayah kerja puskesmas wawondula menunjukkan data sebesar 1501 kasus pada tahun 2010. Sedangkan cakupan pemberian ASI eksklusif untuk wilayah kerja Puskesmas

Wawondula pada tahun 2010 hanya 14%. Dan berdasarkan hasil pemantauan status gizi pada tahun 2010 di dapatkan bahwa balita yang mengalami gizi kurang sebanyak 9% di wilayah kerja Puskesmas Wawondula (Puskesmas Wawondula, 2010)

Pemenuhan kebutuhan gizi bayi 0-6 bulan mutlak diperoleh melalui Air Susu Ibu (ASI) bagi bayi dengan ASI eksklusif (Butte *et al*, 2002; Kramer dan Kakuma, 2002; WHO, 2002). Berdasarkan hal ini maka upaya perbaikan gizi bayi 0-6 bulan dilakukan melalui perbaikan gizi ibu sebelum dan pada masa pemberian ASI eksklusif. Selain itu Bank Dunia (World Bank, 2006) mengemukakan bahwa upaya perbaikan gizi bayi 0-6 bulan didasarkan bahwa gizi kurang pada usia kurang dari 2 tahun akan berdampak terhadap penurunan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kecerdasan, dan produktivitas; dimana dampak ini sebagian besar tidak dapat diperbaiki (*irreversible*). Di Indonesia hanya 14% bayi mendapat ASI eksklusif sampai usia 5 bulan dan hanya 8% bayi mendapat ASI eksklusif sampai usia 6 bulan (Depkes, 2004)

Status gizi buruk pada bayi dan balita yang dapat disebabkan oleh penyakit infeksi. Berbagai penyakit infeksi yang merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian di Indonesia antara lain ISPA, Diare dll, sebesar 28%. Kematian akibat pneumonia mencapai 10% - 20% pertahun. Kematian balita karena pneumonia diperkirakan 6 per 1000 balita per tahun atau sekitar 150.000 balita pertahun.

Sedangkan pada balita, setiap balita rata-rata menderita diare satu sampai dua kali dalam satu tahun. Angka kematian akibat diare 23 per 100 ribu penduduk dan pada balita 75 per 100 ribu balita, (SKRT 2004).

Atas dasar itulah maka penting untuk dilakukan penelitian tentang hubungan pemberian ASI eksklusif dan penyakit infeksi terhadap status gizi balita umur 7 bulan.

B. Rumusan Masalah

Penyebab langsung masalah gizi yaitu asupan gizi dan penyakit infeksi. Terjadinya masalah gizi kurang tidak hanya karena asupan gizi yang kurang, tetapi juga di pengaruhi oleh penyakit infeksi. Anak yang mendapat makanan cukup, tetapi sering di serang diare atau ISPA dan demam, akhirnya dapat menderita kurang gizi. Pada anak yang makanannya tidak cukup, maka daya tahan tubuhnya melemah. Dalam keadaan demikian mudah diserang penyakit infeksi yang dapat mengurangi nafsu makan dan akhirnya dapat menderita kurang gizi.

Sedangkan secara tidak langsung dipengaruhi oleh jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, pola asuh yang kurang memadai, kurang baiknya kondisi sanitasi lingkungan serta rendahnya ketahanan pangan ditingkat rumah tangga. Dan sebagai pokok masalah dimasyarakat adalah rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan serta tingkat pendapatan masyarakat (Azwar, 2004)

Dengan melihat data yang ada di Puskesmas Wawondula, dimana cakupan pemberian ASI eksklusif yang masih kurang serta jumlah penderita penyakit ISPA dan Diare yang cukup tinggi, dan permasalahan status gizi pada bayi dan balita. Maka peneliti terdorong untuk mengetahui secara detail hubungan pemberian ASI eksklusif dan kejadian penyakit infeksi terhadap status gizi balita.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana status gizi bayi berdasarkan indeks antropometrik BB/U Z-score NCHS di wilayah kerja Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur tahun 2011 ?
2. Bagaimana hubungan pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi di wilayah kerja Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur tahun 2011 ?
3. Bagaimana hubungan penyakit infeksi dengan status gizi bayi di wilayah kerja puskesmas wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur tahun 2011 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Bagaimana hubungan pemberian ASI eksklusif dan penyakit infeksi terhadap Status gizi bayi umur 7 bulan di wilayah kerja Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi di wilayah kerja Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur 2011.
- b. Untuk mengetahui hubungan penyakit Infeksi dengan status gizi bayi di wilayah kerja Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur tahun 2011

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi instansi/institusi

Hasil penelitian ini merupakan salah satu sumber informasi bagi puskesmas terkait dalam upaya peningkatan sosialisasi pemberian ASI eksklusif (0-6 bulan)

2. Manfaat bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya.

3. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga bagi peneliti dalam rangka memperluas wawasan pengetahuan tentang status gizi, penyakit infeksi dan ASI eksklusif.

BAB II

TUNJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Status Gizi Bayi

1. Pengertian Status Gizi

Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal. Kata “gizi” berasal dari bahasa arab *Ghidza*, yang berarti “makanan”. Disatu sisi ilmu gizi berkaitan dengan makanan dan di sisi lain dengan tubuh manusia. (Almatsier 2009)

Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang di konsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta menghasilkan energi.

Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau perwujudan dari nutriture dalam bentuk variabel tertentu (Supariasa, dkk,18:2002)

Status gizi merupakan salah satu faktor yang menentukan sumber daya manusia dan kualitas hidup. Untuk itu, program perbaikan gizi konsumsi pangan, agar terjadi perbaikan status gizi masyarakat (Muchtadi 2002)

2. Asupan Zat Gizi yang Diperlukan Balita

a. Karbohidrat

Karbohidrat sebagai zat gizi merupakan nama kelompok zat-zat organik yang mempunyai struktur molekul yang berbeda-beda, meski terdapat persamaan-persamaan dari sudut kimia dan fungsinya. Karbohidrat dalam makanan pada umumnya hanya ada tiga jenis yaitu monosakarida, disakarida dan polisakarida. (Sediaoetama 2008)

Karbohidrat terdapat dalam makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hanya sedikit yang berasal dari hewani. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat termasuk di dalamnya adalah biji-bijian dan padi-padian (serelia), misalnya padi, jagung, dan gandum. Disamping itu juga termasuk umbi-umbian yaitu singkong, ubi jalar, kentang, talas dan beberapa jenis lagi seperti gembili, ganyong dan sejenisnya. Bahan makanan karbohidrat yang berasal dari batang adalah sagu dan tebu. (Tirtawinata 2006)

Al-Qur'an mengungkapkan tentang bahan makanan padi-padian itu dalam QS. Ya sin (36):33

وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya :

“Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan”

Dari ayat tersebut di atas, para penafsir mengisyaratkan bahwa Allah SWT. Menurunkan hujan dan mengubah tanah yang tandus menjadi tanah

subur, yang memberikan hasil bumi yang berlimpah berupa bahan makanan padi-padian, kacang-kacangan dan biji-bijian untuk kebutuhan manusia dan ternaknya.

Fungsi Karbohidrat

1. sebagai sumber energi
2. memberi volume pada isi usus dan melancarkan gerak peristaltic usus sehingga memudahkan pembuangan feces
3. simpanan energi dalam hati dan otot dalam bentuk glikogen yang mudah di mobilisasi.
4. Penghemat protein dan pengatur metabolisme lemak.
5. Memberi rasa manis pada makanan
6. Memberi aroma serta bentuk khas makanan.

Kebutuhan karbohidrat sehari menurut anjuran WHO (1990) adalah 55-75% dari total konsumsi energi diutamakan berasal dari karbohidrat kompleks dan 10% berasal dari gula sederhana.

b. Protein

Protein merupakan zat gizi yang sangat penting, karena yang paling erat hubungannya dengan proses-proses kehidupan. Semua hayat hidup sel berhubungan dengan zat gizi protein. Nama protein berasal dari kata Yunani protebos, yang artinya “ yang pertama” yang terpenting”. (Sediaoetama 2008:53)

Dalam kualifikasi protein berdasarkan sumbernya, telah di ketahui protein Khewani dan Nabati. Sumber protein khewani dapat berbentuk daging dan alat-alat dalam seperti hati, pancreas, ginjal, paru, jantung dan jeroan. Susu dan telur termasuk pula sumber protein khewani berkualitas tinggi. Ikan kerang-kerangan dan jenis udang merupakan kelompok sumber protein yang baik, karena mengandung sedikit lemak. Ayam dan jenis burung lain serta telurnya, juga merupakan sumber protein khewani berkualitas baik. (Sediaoetama 2008:61)

Mengenai bahan makanan hewani baik darat maupun air disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu:

QS. Ghafir (40): 79

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٩﴾

Terjemahnya :

“Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah membuktikan kuasa-Nya melakukan pembelaan terhadap Nabi sambil mengingatkan semua pihak tentang nikmat-Nya guna mengundang kepatuhan mereka sambil menunjukkan keesaan-Nya. Allah-lah yang menjadikan dan menundukkan buat kamu, wahai umat manusia, binatang ternak, yaitu unta, sapi, domba dan kambing, sebagiannya untuk kamu kendarai, yaitu unta, dan sebagiannya yakni selain yang dapat kamu kendarai, kesemuanya pun dapat kamu manfaatkan untuk kamu makan (Shihab, 2002).

QS. Al-Maidah (5):96

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ^ط

Terjemahnya :

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut, sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan

Ayat di atas menjelaskan bahwa di halalkan bagi kamu berburu binatang buruan laut juga sungai dan danau atau tambak, dan makanannya yang berasal dari laut seperti ikan, udang, atau apa pun yang hidup disana dan tidak dapat hidup di darat walau telah mati dan mengapung, adalah makanan lezat bagi kamu, baik bagi yang bertempat tinggal tetap di satu tempat tertentu, dan juga bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Sementara ulama memahami kata-kata binatang buruan laut dalam arti apa yang diperbolehkan dengan upaya dan yang dimaksud dengan makanannya adalah apa yang mengapung atau yang terdampar. Karena yang mengapung dan terdampar tidak lagi diperoleh dengan memburunya. Ada juga yang memahami kata makanannya dalam arti yang diasinkan dan dikeringkan (Shihab, 2002)

Sedangkan yang termasuk sumber protein nabati yaitu semua jenis kacang-kacangan , yaitu: kacang kedele, kacang tanah, kacang ijo, kacang merah, kacang koro, kacang mente, wijen, kemiri, dan kelapa serta semua hasil olahannya.

Fungsi Protein

1. Sebagai zat pembangun.
2. Sumber utama energi
3. Pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan
4. Menggantikan sel-sel yang mati dan aus terpakai
5. Sebagai zat pengatur metabolisme dalam bentuk enzim dan hormon

Kebutuhan protein dan Asam amino

Kebutuhan protein menurut FAO/WHO/UNU (1985) adalah konsumsi yang diperlukan untuk mencegah kehilangan protein tubuh dan memungkinkan produksi protein yang diperlukan dalam masa pertumbuhan, kehamilan atau menyusui. Angka Kecukupan Protein untuk Bayi membutuhkan 1 gram protein perkilogram berat badan (BB). Sedangkan untuk umur 0,5 – 2 tahun adalah 1,39 gram atau 80% dari ASI.

c. Lemak

Lemak adalah sekelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur-unsur carbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O), yang mempunyai sifat dapat larut dalam zat-zat pelarut tertentu (zat pelarut lemak), seperti petroleum benzene, ethrt. Lemak yang mempunyai titik lebur tinggi bersifat padat pada suhu kamar, sedangkan yang mempunyai titik lebur rendah, bersifat cair. (Sediaoetama 2008:91)

Dalam pola makanan Indonesia dikenal dua macam lemak yaitu lemak yang kelihatan atau yang tampak dan lemak yang tidak tampak. Lemak yang

kelihatan adalah misalnya lemak hewan ternak, yaitu jaringan lemak yang berwarna putih yang biasanya merupakan lapisan dibawah kulit dan di dalam rongga perut. Lemak yang kelihatan dapat pula berupa minyak, mentega, dan margarin. Sedangkan lemak yang tidak tampak merupakan lemak yang tercampur dengan bagian lain misalnya dalam daging, dalam susu, santan, kacang mente dan lain-lain. Bahan makanan yang lemaknya tidak Nampak biasanya mengandung pula nutrient lainnya misalnya susu, selain mengandung lemak juga mengandung protein, karbohidrat, berbagai mineral dan vitamin. (Tirtawinara 2006:209)

Bahan makanan sumber lemak dan minyak disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu :

QS. Al-Mu'minun (23):20

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذُّهْنِ وَصَبْغٍ لِلْأَكْلِينَ

Terjemahnya :

“Dan pohon kayu keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa pohon zaitun termasuk salah satu karunia Allah yang sangat besar karena ia merupakan jenis pohon kayu yang berumur ratusan tahun. Manusia dapat memetik buahnya untuk masa yang sangat panjang. Selain itu, penelitian mutakhir membuktikan bahwa zaitun merupakan bahan makanan yang mengandung kadar protein tinggi. Zaitun juga mangandung zat garam, zat besi, dan fosfor yang merupakan bahan

makanan terpenting bagi manusia. Lebih dari itu, zaitun mengandung vitamin A dan B. dari buah zaitun dapat dihasilkan minyak yang pada umumnya juga digunakan sebagai bahan makanan.

Sumber lemak dibagi menjadi lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati berasal dari bahan makanan tumbuh-tumbuhan, sedangkan lemak hewani berasal dari binatang termasuk ikan, telur dan susu. Kedua jenis lemak ini berbeda dalam jenis asam lemak yang menyusunnya.

Fungsi Lemak dalam Makanan

1. Memberi rasa gurih
2. Memberikan kualitas renyah terutama pada makan yang di goreng
3. Memberi kandungan kalori tinggi
4. Memberikan sifat empuk (lunak) pada kue yang di bakar

Fungsi Lemak dalam Tubuh

1. Sebagai cadangan enersi
2. Sebagai bantalan organ-organ tertentu
3. Jaringan dibawah kulit melindungi kulit dari hawa dingin
4. Sebagai pelarut vitamin-vitamin yang larut lemak.

Kebutuhan Tubuh akan Lemak yaitu 15-20 persen dari kalori total.

d. Vitamin

Istilah vitamin pertama kali di gunakan Cashimir Funk (polandia) tahun 1912. Penemuan zat dalam dedak beras dapat menyembuhkan beri-beri. Zat tersebut di butuhkan oleh tubuh untuk hidup “vita” dan

mengandung unsur N (Amine), sehingga diberi istilah Vitamin. Pemberian nama vitamin dilakukan menurut abjad yaitu A,B,C,D,E dan K. Vitamin merupakan zat organik yang umumnya tidak dapat dibentuk dalam tubuh. Vitamin berfungsi sebagai katalisator organik mengatur proses metabolisme dan fungsi normal tubuh. Masing-masing vitamin mempunyai peranan khusus yang tidak dapat digantikan oleh vitamin atau zat gizi lain. Oleh karena itu, meskipun dibutuhkan dalam jumlah sedikit dalam satuan milligram atau mikrogram, jumlah kecil itu sangat penting. Sampai saat ini kurang lebih terdapat 13 macam vitamin yang dibutuhkan tubuh agar hidup sehat (Gizi dan Kesehatan Masyarakat 2008:88).

Vitamin yang Larut Lemak

a. Vitamin A

Vitamin A pertama kali ditemukan sebagai vitamin larut lemak dan digunakan nama generic untuk retinol dan semua pro-vitamin. Vitamin A banyak digunakan sebagai fortifikan dan suplemen. Schimdt 1991 melakukan berbagai penelitian untuk melihat adanya kemungkinan vitamin A dan betakaroten digunakan dalam pencegahan penyakit jantung koroner dan kanker karena sebagai antioksidan.

Fungsi vitamin A

1. Fungsi dalam proses penglihatan
2. Berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan
3. Deferensi sel

4. Berfungsi dalam sistem reproduksi
5. Berfungsi dalam sistem kekebalan.

Sumber vitamin A dapat berasal dari bahan pangan hewani, seperti hati, kuning telur, susu dan mentega. Karoten dapat di temui pada bahan pangan nabati seperti sayuran daun berwarna hijau, buah warna kuning, misalnya papaya, tomat, labu, ubi jalar kuning, nanas dan mentega. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan buta senja, perubahan pada kulit, perubahan pada mata, gangguan pertumbuhan, infeksi dan karatinisasi sel rasa pada lidah. (Gizi dan Kesehatan Masyarakat 2008:92)

b. Vitamin D

Vitamin D mulai dikenal dan dibedakan dari vitamin A didalam minyak ikan, yang sanggup menghindarkan penyakit rickets dan mendorong pertumbuhan. Vitamin D berbentuk kristal putih yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam minyak dan zat-zat pelarut lemak. Vitamin ini tahan terhadap panas dan oksidasi. Penyinaran ultraviolet mula-mula menimbulkan aktifitas vitamin D, tetapi bila terlalu kuat dan terlalu lama terjadi pengrusakan dari zat-zat yang aktif tersebut.(Sediaoetama 2008:120-121)

Fungsi Vitamin D

1. Meningkatkan absorpsi Ca dan Phosphat di dalam usus.
2. Mendorong pembentukan garam-garam Ca didalam jaringan yang memerlukannya.

3. Berpengaruh meningkatkan resorpsi phosphate di dalam tubuli ginjal, sehingga meningkatkan kondisi konsentrasi Ca dan phosphate di dalam jaringan untuk sintesa garam Ca phosphate.

Vitamin D diperoleh tubuh melalui sinar matahari dan makanan. Kekurangan vitamin D kemungkinan banyak terjadi di daerah yang tidak selalu mendapat sinar matahari. Sumber vitamin D dapat di peroleh melalui makanan terutama makanan hewani telur, krim, mentega, minyak ikan, dan hati. Fortifikasi vitamin D banyak di gunakan pada susu, makanan bayi, dan mentega dalam bentuk vitamin D₂. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan ricketsa pada anak dan osteomalacia pada orang dewasa. Selain itu, kekurangan vitamin D juga dapat menyebabkan osteoporosis. (Gisi dan Kesehatan Masyarakat 2008:93)

c. Vitamin E

Ditemukannya vitamin E mula-mula berkaitan dengan kegagalan kehamilan binatang percobaan tikus yang dalam makanannya defisien vitamin ini. Semua bentuk vitamin E berupa minyak dan tidak dapat dikristalkan. Minyak ini mempunyai viskositas tinggi, larut dalam minyak dan zat pelarut lemak. Vitamin E stabil terhadap suhu, alkali dan asam. (Sediaoetama 2008:123)

Fungsi Vitamin E

1. Sebagai antioksidan
2. Sintesis DNA

3. Merangsang reaksi kekebalan
4. Mencegah penyakit jantung koroner
5. Mencegah keguguran dan sterilisasi
6. Mencegah gangguan menstruasi
7. Peranan biologic memutuskan rantai proses peroksidasi lipida dengan menyumbang 1 atom H dari gugus OH ke radikal bebas sehingga terbentuk radikal vitamin E yang stabil dan tidak mudah rusak.

Minyak tumbuhan, kacang-kacangan dapat digunakan sebagai sumber vitamin E yang berasal dari bahan nabati. Sementara itu, pangan hewani yang berupa daging, ikan dan unggas juga dapat digunakan sebagai sumber vitamin E. (Gizi dan Kesehatan Masyarakat 2008:95)

d. Vitamin K

kata sinonim untuk vitamin K adalah menadion atau vitamin anti hemoragik (hemoragi=perdarahan). Bahan makanan sumber vitamin K dapat berasal dari bahan nabati maupun hewani seperti hati, biji-bijian, dan sayur mayur daun-daunan, buncis, kacang polong, brokoli dan kol, semakin hijau warna sayur daun-daunan, semakin tinggi kadar vitamin K-nya. Bahan makanan lain pun umumnya mengandung vitamin K walaupun dalam jumlah sedikit. AKG yang dianjurkan per hari untuk orang dewasa: laki-laki: 80 mg, wanita: 65 mg. wanita yang hamil atau yang menyusui sama saja angka kecukupan gizi yang dianjurkan dengan wanita dewasa yaitu 65 mg (Tirtawinata, 2006)

Fungsi vitamin K

1. Mengangkut kalsium untuk pertumbuhan dan pembentukan tulang yang baik.
2. Proses pembentukan protrombin dan komponen lain dalam pembekuan darah.

Kekurangan vitamin K menyebabkan darah tidak menggumpal sehingga bila luka dapat menyebabkan pendarahan. Kekurangan vitamin tersebut dapat terjadi pada seseorang yang mengalami gangguan absorpsi lemak dan mengonsumsi antibiotik. Konsumsi aspirin berlebihan dapat mencegah pembekuan darah. Kelebihan vitamin K dapat terjadi bila diberikan dalam bentuk sintetik menadion. Gejala kelebihan vitamin tersebut antara lain terjadi hemolisis darah merah, sakit kuning, dan kerusakan pada otak (Gizi dan Kesehatan Masyarakat, 2008)

Vitamin larut dalam Air

Vitamin yang masuk dalam kelompok ini adalah vitamin B dan C. Karena vitamin ini bersifat larut dalam air, bila masukan dari makanan sehari-hari melebihi kebutuhan, maka kelebihannya akan langsung dikeluarkan lewat urin, sehingga tidak ada cadangan dalam tubuh. Dengan perkataan lain, tubuh tidak biasa menyimpan vitamin yang larut dalam air. Oleh karena makanan sehari-hari harus selalu mengandung vitamin larut air dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan tubuh.

a. Vitamin B

Vitamin B merupakan satu kelompok yang terdiri atas beberapa anggota, sehingga keseluruhannya disebut vitamin B complex. Biasanya semua atau sebagian besar anggota vitamin B complex ini terdapat dalam bahan makanan yang sama, walaupun kuantitasnya berbeda-beda. Nama anggota vitamin B complex adalah :

1. Thiamin (B1)
2. Riboflavin (B2)
3. Niacin. Asam Nicotinat
4. Pyridoxin
5. Biotin
6. Asam Pantothenat (B5)
7. Asam Folat

b. Vitamin C. Asam Askorbat

Vitamin C mulai dikenal setelah dipisahkan dari air jeruk pada tahun 1928. Penyakit yang disebabkan oleh defisiensi Vitamin C ialah scorbut, telah merenggut sejumlah besar jiwa diantara para pelaut yang melakukan pelayaran jarak jauh dan waktu yang lama tidak menyinggahi sesuatu pelabuhan untuk mendapatkan bahan makanan segar. Vitamin C berbentuk Kristal putih, merupakan suatu asam organik dan terasa asam, tapi tidak berbau. Dalam larutan, Vitamin C mudah rusak karena oksidasi oleh oksigen dari udara, tetapi lebih stabil bila terdapat dalam bentuk Kristal kering.

Fungsi Vitamin C

Fungsi Vitamin C dalam tubuh bersangkutan dengan sifat alamiahnya sebagai antioksidans. Meskipun mekanismenya yang tepat belum diketahui, tetapi tampaknya Vitamin C berperan serta di dalam banyak proses metabolisme yang berlangsung di dalam jaringan tubuh.

Akhir-akhir ini dianjurkan untuk memberikan Vitamin C dalam megadosis, untuk meningkatkan daya tahan umum tubuh terhadap berbagai penyakit, khususnya terhadap influenza. Dikemukakan bahwa megadosis demikian tidak memberikan efek samping yang merugikan. Namun demikian, sebaiknya tetap harus berhati-hati dan tidak terlalu cepat memberikan megadosis bila tidak diperlukan.

3. Penilaian Status Gizi

Menurut Supariasa, dkk, (2002) penilaian status gizi dapat di lakukan secara langsung dan tidak langsung, yaitu :

1. Penilaian status gizi secara langsung

Penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi menjadi empat penilaian, yaitu :

a. Antropometri

Secara umum antropometri artinya ukuran tubuh manusia. Ditinjau dari sudut pandang gizi, maka antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi (Supariasa, dkk, 2002)

Salah satu standar pengukuran yang digunakan Indonesia untuk mengetahui status gizi adalah buku rujukan NCHS-WHO (National Center For Health Statistic-World Health Organization) dengan menggunakan indeks BB/U, TB/U, BB/TB berdasarkan Z-Score sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1
Interpretasi Status Gizi Berdasarkan Indeks Antropometrik

Indeks Antropometrik	Range Nilai	Status Gizi
BB/U	> = 2 SD - 2 SD sampai +2 SD < - 2 SD sampai -3 SD < - 3 SD	Gizi Lebih Gizi Baik Gizi Kurang Gizi Buruk
TB/U	< -3 SD - 3 s/d <-2 SD -2 SD sampai +2 SD > +2 SD	Sangat pendek Pendek Normal Tinggi
BB/TB	> = 2 SD - 2 SD sampai +2 SD < - 2 SD sampai -3 SD < - 3 SD	Gemuk Normal Kurus (Wasted) Sangat Kurus

Sumber : Depkes RI 2004

b. Klinis

Pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Hal ini dapat dilihat pada jaringan epitel (*supervicial epithelial tissues*) seperti kulit, mata, rambut dan mukosa oral atau organ-organ yang dekat dengan

permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Penggunaan metode ini umumnya untuk survei klinis secara cepat (*rapid clinical surveys*). Survei ini dirancang untuk mendeteksi secara cepat tanda-tanda klinis umum dari kekurangan salah satu atau lebih zat gizi. Disamping itu digunakan untuk mengetahui tingkat status gizi seseorang dengan melakukan pemeriksaan fisik yaitu tanda (*sign*) dan gejala (*symptom*) atau riwayat penyakit (Supariasa, dkk, 2002)

c. Biokimia

Penilaian status gizi dengan biokimia adalah pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratories yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang digunakan antara lain: darah, urin, tinja dan juga beberapa jaringan tubuh seperti hati dan otot. Metode ini digunakan untuk peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi keadaan malnutrisi yang lebih parah lagi. Banyak gejala klinis yang kurang spesifik, maka penentuan kimia faali dapat lebih banyak menolong untuk menentukan kekurangan gizi yang spesifik. (Supariasa, dkk, 2002)

d. Biofisik

Penentuan status gizi secara biofisik adalah metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi (khususnya jaringan) dan melihat perubahan struktur dari jaringan. Umumnya dapat digunakan dalam situasi tertentu seperti kejadian buta senja epidemic (*epidemic of night blindness*). Cara yang digunakan adalah tes adaptasi gelap. (Supariasa, dkk, 2002)

2. Penilaian status gizi secara tidak langsung

Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat di bagi tiga, yaitu:

a. Survei konsumsi makanan

Survei konsumsi makanan adalah metode penentuan status gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Pengumpulan data konsumsi makanan dapat memberikan gambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga dan individu. Survei ini dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi.

b. Statistik vital

Pengukuran status gizi dengan statistik vital adalah dengan menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi. Penggunaannya dipertimbangkan sebagai bagian dari indikator tidak langsung pengukuran status gizi masyarakat.

c. Faktor ekologi


Malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi beberapa faktor fisik, biologis dan lingkungan budaya. Jumlah makanan yang tersedia sangat tergantung dari keadaan ekologi seperti iklim, tanah, irigasi dan lain-lain. Pengukuran faktor ekologi dipandang sangat penting untuk mengetahui penyebab malnutrisi disuatu masyarakat sebagai dasar untuk melakukan program intervensi gizi (Supriasa, dkk, 2002)

4. Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi

Masalah gizi utama di Indonesia masih didominasi oleh masalah Gizi Kurang Energi Protein (KEP), masalah Anemia Besi, masalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) dan masalah Vitamin A (KVA). Disamping itu diduga ada masalah gizi makro lainnya seperti defisiensi zink yang sampai saat ini belum terungkap karena adanya keterbatasan Iptek Gizi.

Persatuan Ahli Gizi (Persagi) pada tahun 1999, telah merumuskan faktor yang menyebabkan gizi kurang seperti tergambar pada bagan berikut:





Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa masalah gizi pada hakekatnya adalah masalah kesehatan masyarakat, dan penyebabnya di pengaruhi oleh berbagai faktor yang terkait satu dengan yang lainnya. Pada

krisis moneter, masalah gizi, khususnya gizi kurang muncul karena masalah pokok yaitu kemiskinan, kurang pendidikan dan kurang keterampilan dari masyarakat. Akar permasalahannya adalah krisis moneter yang berkepanjangan (Supariasa Dkk, 2001)

Ditinjau dari sudut pandang epidemiologi masalah gizi sangat dipengaruhi oleh faktor penjamu, agen dan lingkungan. Faktor penjamu meliputi fisiologi, metabolisme, dan kebutuhan zat gizi. Faktor agen meliputi zat gizi yaitu zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak serta zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Faktor lingkungan (makanan) meliputi bahan makanan, pengolahan, penyimpanan, penghidangan dan higienis, serta sanitasi makanan (Supariasa Dkk, 2001)

B. Tinjauan Umum Tentang ASI Eksklusif

1. Pengertian ASI

ASI (Air Susu Ibu) adalah makanan dan minuman paling baik untuk bayi. Allah telah menyiapkan makanan dan minuman bagi bayi sebelum manusia bertingkah membuat susu formula. ASI adalah hak dari semua bayi yang di lahirkan. Seorang ibu harus memberikan ASI kepada bayinya (Boediman, 2009)

Mengenai ASI disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah (2):233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ﴾

Terjemahnya :

”Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma’ruf

Semua ibu dianjurkan untuk menyusui bayi mereka sampai umur dua tahun agar pertumbuhan badan, perkembangan mental dan kesehatan bayi mereka itu terjamin. Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun di perintahkan, bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan *bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut, tidak mengapa. Tetapi, hendaknya jangan berlebih dari dua tahun karena dua tahun telah dinilai sempurna oleh Allah. Kemudian dalam ayat di sebutkan bahwa kewajiban ayah memberi makan dan pakaian dengan cara ma’ruf karena ibu yang menyusukan tentu saja memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu dan air susunya selalu tersedia. Selain itu menjadi kewajiban ayah karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak, yakni di nisbahkan kepada ayahnya. Dengan tuntutan ini, anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik (Shihab, 2002)

Dari sudut ilmiah pun dapat dibuktikan bahwa ASI merupakan makanan yang terbaik dan yang paling ideal untuk bayi. Disebut makanan yang terbaik untuk bayi karena ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan dalam jumlah dan perimbangan yang tepat. Disamping itu ASI mengandung zat

kekebalan atau antibody yang berfungsi melindungi bayi dari berbagai kuman penyakit. Disebut makanan yang paling ideal, karena dengan menyusui bayinya, selain memberikan makanan yang terbaik, secara psikologis akan mempererat hubungan batin antara ibu dan anak yang baru dilahirkan, yang sangat penting artinya untuk perkembangan psikis dan emosi anak untuk selanjutnya (Tirtawinata, 2006)

2. Zat Gizi yang Terkandung dalam ASI

Tak ada susu apapun di dunia ini yang kandungannya bisa menyamai Air Susu Ibu (ASI). Kelengkapan gizi dan nutrisi yang dimilikinya memungkinkan si bayi bisa bertahan hidup, tanpa harus mengasup makanan pendamping lainnya. Air Susu Ibu (ASI) kaya akan berbagai nutrisi penting juga faktor-faktor yang memperkuat imun tubuh yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh dan berkembang.

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif yang diberikan enam bulan pertama menyusui akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan optimal bayi dimasa berikutnya.

Selain memberikan perlindungan terhadap infeksi dan alergi, ASI juga akan merangsang pertumbuhan sistem kekebalan tubuh bayi, mengandung anti infalamsi dan antioksidan. Karena itu, dengan memberikan ASI, ibu memberikan yang terbaik untuk kekebalan dan kesehatan si kecil.

Salah satu kandungan penting dalam ASI lainnya adalah *kolostrum*. Zat ini berfungsi melindungi bayi dari berbagai penyakit. Dalam *kolostrum* terdapat

protein, vitamin A, karbohidrat dan lemak rendah yang berguna bagi bayi dihari-hari pertamanya.

Selain *kolostrum* ASI juga mengandung *taurin*, *decosahexanoik acid* (DHA), dan *Arachidonic acid* (AA). Ketiga kandungan tersebut sangat diperlukan untuk pembentukan sel-sel otak bayi.

Kelebihan utama ASI lainnya yang tidak dimiliki oleh susu lainnya adalah zat imunologik. ASI mengandung zat anti infeksi yang bersih dan bebas kontaminasi. Zat imun itu ada pada *immunoglobulin*, *sekreteri*, dan *laktoferin*. Zat *immunoglobulin* yang terdapat dalam *kolostrum* berfungsi mencegah terjangkitnya penyakit pada bayi. Lalu, zat *sekreteri* yang dapat melumpuhkan bakteri patogen *e-coli* serta berbagai virus pada saluran pencernaan. Sementara laktoferin, sejenis protein, merupakan komponen zat kekebalan yang berfungsi mengikat zat besi di saluran pencernaan.

Bayi yang mengonsumsi Air Susu Ibu (ASI) mendapat kandungan “*Gangliosida* (GA)” lebih banyak dibandingkan bayi yang mengonsumsi susu biasa. Nutrisi terbaik untuk bayi adalah ASI karena ASI terdapat banyak zat gizi yang diperlukan untuk perkembangan otak yang sehat, salah satunya adalah GA. GA dalam ASI berperan untuk pembentukan memori dan fungsi umum otak besar serta sebagai alat konektivitas sel otak bayi.

3. Komposisi ASI

Kadar protein dalam ASI adalah 1,2-5,6 gram protein. Casein merupakan protein penjernih dan merupakan protein ASI. Selain Casein, terdapat

laktalbumin dan laktoglobulin. Kadar lemak dan laktosa yang tinggi dengan casein dan mineral yang rendah dalam ASI memudahkan digesti nutrisi ini oleh bayi dan menyebabkan perkembangan flora bakteri non patogen dan usus yang diperlukan oleh tubuh seperti misalnya untuk pembuatan vitamin K.

Jumlah mineral dalam ASI adalah relative rendah, kira-kira 0,2 gram persen dari ASI. ASI relative lengkap mengandung vitamin baik dalam jumlah besar atau kecil. Sebagian besar ASI sangat bervariasi 500-850 ml ASI per 24 jam. Kalori ASI adalah /100 ML, asi 90% berasal dari karbohidrat dan lemak, sedangkan 10% sisanya berasal dari protein.

4. Manfaat ASI

Menurut Boediman (2009) manfaat ASI buat bayi yaitu:

- a. Bayi akan mendapat semua zat gizi/zat makanan yang diperlukan untuk bertumbuh dan berkembang bayi termasuk tumbuh kembang otaknya.
- b. Selalu bersih, tidak dapat cemaran (kontaminasi) dari luar
- c. Mencegah mencret, karena bayi mendapat kolostrum yang akan mencegah mencret.
- d. Semua zat gizi yang diperlukan untuk tumbuh kembang otaknya semuanya ada di dalam ASI
- e. Bayi merasakan tenang dalam kehangatan dekapan ibunya.

Sedangkan manfaat ASI buat ibu yaitu:

- a. Praktis, ibu bisa memberikan ASI kapan saja (sewaktu-waktu) dan dimana saja tidak perlu repot membersihkan / menyiapkan alat-alat dan membuat

“ramuan” susu botol, tidak perlu masak air, tidak perlu pergi ketoko untuk membeli susu kaleng/susu formula.

- b. Ekonomis. Ibu tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli susu formula yang harganya makin melambung.
- c. Menjadikan si ibu makin sayang pada bayinya.
- d. Menyusukan bayi segera setelah lahir akan mencegah perdarahan, karena pada saat ibu menyusukan bayinya perut si ibu akan merasa mulas, suatu pertanda baik karena terjadi pengkerutan rahim yang sedang menjepit pembuluh darah yang putus akibat lepasnya plasenta dan akan menghentikan perdarahan.
- e. Ibu yang mampu memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan akan mencegah terjadinya kehamilan selama 6 bulan meskipun tanpa alat kontrasepsi asalkan bayi sering disusukan.

Manfaat lain ASI adalah menangkal aleregi susu. Alergi tidak mengenal Usia, termasuk pada balita. Justru merekalah yang paling rentan mengalami alergi, baik terhadap lingkungan yang tidak sehat maupun dari makanan yang dikonsumsi. Kematangan atau maturasi saluran cerna pun sangat penting. Bayi semakin rentan karena maturasinya belum sempurna. Itulah sebabnya ASI Eksklusif 6 bulan pertama dapat mengurangi kemungkinan terjadinya alergi. Meskipun pemberian ASI sangat menguntungkan bagi bayi dan keluarga, namun pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Selain

kesadaran ibu dan keluarganya masih kurang, mitos yang berkembang di masyarakat pun turut berpengaruh dalam pemberian ASI (Nurheti, 2010)

5. ASI Eksklusif

ASI eksklusif adalah perilaku dimana hanya memberikan Air Susu Ibu (ASI) saja kepada bayi sampai umur 6 (enam) bulan tanpa makanan dan ataupun minuman lain kecuali sirup obat. “ASI eksklusif adalah nutrisi terbaik dalam kualitas dan kuantitas pada masa lompatan pertumbuhan otak yang terjadi dari 0 sampai 6 bulan”, (Urani Roesli dalam Medicastore 2006)

ASI mengandung nutrisi yang mempunyai fungsi spesifik untuk pertumbuhan otak antara lain *cahain polyunsaturated acid* (DHA) dan (AA) untuk pertumbuhan otak dan retina, kolesterol untuk *myelinisasi* jaringan saraf, *taurin* untuk *neurontransmitter inhibitor* dan *stabilisator* membrane, laktosa untuk pembentukan otak, kolin yang mungkin meningkatkan memori.

Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan selain bagus untuk perkembangan otak juga bagus untuk mempersiapkan sistem bayi karena pada saat lahir, enzim pencernaan bayi masih belum lengkap dan hanya bisa digunakan untuk mencerna ASI. Perlu diketahui bahwa ASI mengandung lebih dari 100 macam enzim yang membantu penyerapan zat gizi yang terkandung di dalam ASI. Proses menyusui ASI tidak hanya memberi makan tetapi juga mendidik dan memberikan kebutuhan psicososial. Proses menyusui ini merupakan stimulasi bagi pendidikan anak karena ada kontak mata, diajak bicara, dipeluk dan dielus-elus oleh sang ibu (Taddega, 2009)

C. Tinjauan Umum Pandangan Islam Tentang ASI dan Penyakit

Allah SWT. Telah memelihara dan memberi makan buah hati ibu selama 9 bulan di dalam rahim. Setelah itu, Allah merancang menyusui untuk memelihara bayi di tahun-tahun pertama kehidupan dengan sesuatu yang bernama ASI. Air Susu Ibu memberi perlindungan kepada bayi melalui beberapa mekanisme, antara lain memperbaiki pertumbuhan mikroorganisme non patogen (tidak berbahaya), mengurangi pertumbuhan mikroorganisme patogen saluran cerna, merangsang perkembangan barrier (pembatas) mukosa saluran cerna, dan saluran nafas, faktor spesifik (IgA sektori, zat kekebalan), mengurangi reaksi inflamasi (peradangan) dan sebagai immunomodulator (perangsang kekebalan). Itulah sebabnya bayi yang diberi ASI manusia lebih tahan penyakit dari bayi yang diberi ASI hawan.

Air Susu Ibu adalah sebuah cairan tanpa tandingan ciptaan Allah untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. Keseimbangan zat-zat gizi dalam air susu ibu berada pada tingkat terbaik dan air susunya memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang masih muda. Pada saat yang sama, ASI juga sangat kaya akan sari-sari makanana yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf. Makanan-makanan tiruan untuk bayi yang diramu menggunakan tekhnologi masa kini tidak mampu menandingi makanan ajaib ini.

Daftar manfaat ASI bagi bayi selalu bertambah setiap hari. Penelitian menunjukkan, bayi yang diberikan ASI secara khusus terlindungi dari serangan penyakit sistem pernapasan dan pencernaan. Hal itu disebabkan zat-zat kekebalan

tubuh didalam ASI memberikan perlindungan langsung melawan serangan penyakit. Sifat lain dari ASI yang juga memberikan perlindungan terhadap penyakit adalah penyediaan lingkungan yang ramah bagi bakteri menguntungkan yang disebut flora normal. Keberadaan bakteri ini menghambat perkembangan bakteri, virus dan parasit berbahaya. Tambahan lagi, telah dibuktikan pula bahwa terdapat unsur-unsur di dalam ASI yang dapat membentuk sistem kekebalan melawan penyakit-penyakit menular dan membantunya agar bekerja dengan benar.

Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa perkembangan kemampuan otak pada bayi yang diberi ASI lebih baik daripada bayi lain. Penelitian perbandingan terhadap bayi yang diberi ASI dengan yang diberi susu buatan pabrik oleh James W. Anderson seorang ahli dari Universitas Kentucky membuktikan bahwa IQ (tingkat kecerdasan) bayi yang diberi ASI lebih tinggi 5 angka daripada bayi lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini ditetapkan bahwa ASI yang diberikan hingga 6 bulan bermanfaat bagi kecerdasan bayi, dan anak yang disusui kurang dari 8 minggu tidak memberikan manfaat pada IQ.

Berdasarkan hasil seluruh penelitian yang telah dilakukan, terbukti bahwa ASI, yang dibahas dalam ratusan tulisan yang telah terbit, melindungi bayi terhadap kanker. Hal ini telah diketahui, walau pun secara fakta mekanismenya belum sepenuhnya dipahami. Ketika sebuah protein ASI membunuh sel-sel tumor yang telah ditumbuhkan di dalam laboratorium tanpa merusak sel yang sehat mana pun, para peneliti menyatakan bahwa sebuah potensi besar telah muncul. Catharina Svanborg, Profesor imunologi klinis di Universitas Lund, Swedia, memimpin

kelompok penelitian yang menemukan rahasia mengagumkan ASI ini. Kelompok yang terpusat di Universitas Lund ini menjelaskan kemampuan ASI dalam memberikan perlindungan melawan beragam jenis kanker sebagai penemuan ajaib.

Sang ibu bukanlah yang memutuskan untuk membuat ASI, sumber zat makanan terbaik bagi bayi yang lemah yang memerlukan makanan di dalam tubuhnya. Sang ibu bukan pula yang menentukan beragam kadar gizi yang dikandung ASI. Allah Yang Mahakuasa-lah, yang mengetahui kebutuhan setiap makhluk hidup dan memperlihatkan kasih sayang kepadanya, Yang menciptakan ASI untuk bayi di dalam tubuh sang ibu. Sumber <http://www.harunyahya.com>

1. Pendapat Para Ulama Tentang ASI

Dalam tinjauan agama terdapat perbedaan pendapat antara para ulama' dalam menentukan hukum menyusui. Ayat dalam surat Al-Baqarah secara kebahasaan menggunakan gaya bahasa afirmatif (*khobar*). Dalam balaghah definisi *kalam khobar* (kalimat afirmatif) adalah kalimat yang bisa mengandung beberapa kemungkinan kebenaran maupun kebohongan. Artinya ia tidak menjelaskan makna tegas yang dikehendaki oleh author (pengarang). Ini berbeda dengan kalam insya' yang bisa langsung menyiratkan makna yang tegas yang dikehendaki oleh author, seperti perintah, larangan, atau mencari informasi (*istifham*).

Dalam konteks ayat di atas, beberapa ulama, termasuk Imam Malik menyatakan bahwa ayat 233 Al-Baqarah di atas mengandung makna insya' atau lebih khususnya *amar* (perintah) meskipun secara redaksional ia menggunakan

kalam khabar. Amar dalam kaedah ushul fiqh bermakna wajib. Dengan demikian menyusui bagi seorang ibu adalah wajib selama ia masih menjadi istri dari ayah anak tersebut atau jika bayinya menolak untuk menyusu selain kepada ibunya. Sementara mayoritas ulama' menyatakan bahwa menyusui bagi seorang ibu bukanlah wajib tapi sekadar sunnah selama masih dalam tali perkawinan dengan ayah sang bayi. Kecuali apabila si bayi tidak mau menyusu kecuali kepada ibunya. Meski sunnah, ibu berhak atas nafkah menyusui yang harus dipenuhi oleh ayah. Apabila ibu sudah bercerai dengan ayah sang bayi, maka ia sama sekali tidak mempunyai tanggung jawab untuk menyusui anaknya. Apabila ia berkenan menyusui, maka ayah bayi tersebut harus menanggung semua nafkah dan kebutuhan menyusui. Ibu pun diijinkan untuk menuntut upah.

Pandangan terakhir lebih selaras apabila disambungkan dengan lanjutannya yang menyatakan bahwa ayah mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan material ibu yang sedang menyusui, dari mulai makan dan sandangnya, di luar nafkah sehari-hari. Bahkan apabila seorang ibu yang menyusui menuntut upah pun, suami harus mengabulkannya. Karena yang bertanggung jawab terhadap anak serta istri adalah suami. Untuk itu, aktifitas menyusui merupakan hak bagi seorang ibu dan bukan kewajiban. Seorang perempuan yang gagal menyusui tidak seharusnya merasa bersalah atau dipersalahkan.

Dalam literature Islam tidak ditemukan adanya anjuran untuk menyusui anak manusia dengan selain ASI. Hal itu menunjukkan bahwa Islam sangat

memperhatikan akan pentingnya ASI untuk anak. Karena ASI memang telah disediakan oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi tumbuh-kembang anak manusia. *Wallahu a'lam.*

D. Tinjauan Umum Tentang Penyakit Infeksi

Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu bibit penyakit : seperti bakteri, virus, ricketsia, jamur, cacing dsb (Etjang, 2000)

Status gizi yang jelek dapat juga memicu timbulnya infeksi oleh karena daya tahan tubuh yang rendah. Immunoglobulin dapat terbentuk jika terdapat protein di dalam tubuh. Demikian pula sebaliknya, sehingga hal tersebut bagaikan lingkaran setan yang tiada akhirnya. Olehnya itu, dalam pemeliharaan kesehatan anak, pemenuhan gizi berpengaruh terhadap kesehatan dan daya tahan tubuh anak. Kalau gizi baik, resiko terkena penyakit infeksi berkurang. Dari hasil penelitian Lubis (1997) di temukan adanya hubungan yang bermakna antara penyakit infeksi dengan status gizi anak.

1. Infeksi Saluran Pernafasan Akut

Infeksi Saluran Pernafasan Akut sering disingkat dengan ISPA, istilah ini diadaptasi dari istilah dalam bahasa Inggris *Acute Respiratory Infections* (ARI). Istilah ISPA meliputi tiga unsur yakni infeksi, saluran pernafasan dan akut, dengan pengertian sebagai berikut:

- Infeksi adalah masuknya kuman atau mikroorganisme ke dalam tubuh manusia dan berkembang biak sehingga menimbulkan gejala penyakit.

- Saluran pernafasan adalah organ mulai dari hidung hingga alveoli beserta organ adneksanya seperti sinus-sinus, rongga telinga tengah dan pleura. ISPA secara anatomis mencakup saluran pernafasan bagian atas, saluran pernafasan bagian bawah (termasuk jaringan paru-paru) dan organ adneksa saluran pernafasan. Dengan batasan ini, jaringan paru termasuk dalam saluran pernafasan (*respiratory tract*).
- Infeksi akut adalah infeksi yang berlangsung sampai dengan 14 hari.

Batas 14 hari diambil untuk menunjukkan proses akut meskipun untuk beberapa penyakit yang dapat digolongkan dalam ISPA proses ini dapat berlangsung lebih dari 14 hari.

a. Gejala ISPA

Penyakit ISPA adalah penyakit yang sangat menular, hal ini timbul karena menurunnya sistem kekebalan atau daya tahan tubuh, misalnya karena kelelahan atau stres. Pada stadium awal, gejalanya berupa rasa panas, kering dan gatal dalam hidung, yang kemudian diikuti bersin terus menerus, hidung tersumbat dengan ingus encer serta demam dan nyeri kepala. Permukaan mukosa hidung tampak merah dan membengkak. Infeksi lebih lanjut membuat sekret menjadi kental dan sumbatan di hidung bertambah. Bila tidak terdapat komplikasi, gejalanya akan berkurang sesudah 3-5 hari. Komplikasi yang mungkin terjadi adalah sinusitis, faringitis, infeksi telinga tengah, infeksi saluran tuba eustachii, hingga bronkhitis dan pneumonia (radang paru).

b. Cara Penularan Penyakit ISPA

Penularan penyakit ISPA dapat terjadi melalui udara yang telah tercemar, bibit penyakit masuk kedalam tubuh melalui pernafasan, oleh karena itu maka penyakit ISPA ini termasuk golongan *Air Borne Disease*. Penularan melalui udara dimaksudkan adalah cara penularan yang terjadi tanpa kontak dengan penderita maupun dengan benda terkontaminasi. Sebagian besar penularan melalui udara dapat pula menular melalui kontak langsung, namun tidak jarang penyakit yang sebagian besar penularannya adalah karena menghisap udara yang mengandung unsur penyebab atau mikroorganisme penyebab

c. Diagnosa ISPA

Diagnosis etiologi pnemonia pada balita sulit untuk ditegakkan karena dahak biasanya sukar diperoleh. Sedangkan prosedur pemeriksaan imunologi belum memberikan hasil yang memuaskan untuk menentukan adanya bakteri sebagai penyebab pnemonia, hanya biakan spesimen fungsi atau aspirasi paru serta pemeriksaan spesimen darah yang dapat diandalkan untuk membantu menegakkan diagnosis etiologi pnemonia.

Diagnosis pnemonia pada balita didasarkan pada adanya batuk dan atau kesukaran bernafas disertai peningkatan frekuensi nafas (nafas cepat) sesuai umur. Penentuan nafas cepat dilakukan dengan cara menghitung frekuensi pernafasan dengan menggunakan *sound timer*. Batas nafas cepat adalah :

- a. Pada anak usia kurang 2 bulan frekuensi pernafasan sebanyak 60 kali permenit atau lebih.
- b. Pada anak usia 2 bulan - <1 tahun frekuensi pernafasan sebanyak 50 kali per menit atau lebih.
- c. Pada anak usia 1 tahun - <5 tahun frekuensi pernafasan sebanyak 40 kali per menit atau lebih.

Diagnosis pneumonia berat untuk kelompok umur kurang 2 bulan ditandai dengan adanya nafas cepat, yaitu frekuensi pernafasan sebanyak 60 kali per menit atau lebih, atau adanya penarikan yang kuat pada dinding dada sebelah bawah ke dalam. Rujukan penderita pneumonia berat dilakukan dengan gejala batuk atau kesukaran bernafas yang disertai adanya gejala tidak sadar dan tidak dapat minum. Pada klasifikasi bukan pneumonia maka diagnosisnya adalah batuk pilek biasa (*common cold*), pharyngitis, tonsilitis, otitis atau penyakit non-pneumonia lainnya.

- d. Macam-macam infeksi saluran pernapasan
 - a. Pneumonia
Pneumonia adalah proses infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli). Terjadinya pneumonia pada anak seringkali bersamaan dengan proses akut pada bronchitis. Gejala penyakit ini berupa panas cepat dan napas sesak, karena paru meradang secara mendadak. Serangan pneumonia sangat rentan terhadap bayi berumur dibawah 2 bulan, berjenis kelamin laki-laki, gizi kurang, berat badan lahir rendah, tidak mendapat ASI

memadai, polusi udara, kepadatan tempat tinggal, imunisasi yang tidak memadai dan defisiensi Vit. A.

b. Bronkhitis

Bronkhitis adalah suatu radang jaringan paru-paru yang biasanya didahului oleh pilek yang kurang mendapat perawatan semestinya. Jalannya penyakit ini biasanya ringan. Gejalanya seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk-batuk, mengigil dan napas bunyi. Bronchitis ringan biasanya tidak panas hanya tidak ada nafsu makan dan sedikit batuk-batuk.

c. Asma (Bengek)

Asma adalah suatu penyakit sesak napas yang timbul secara tiba-tiba. Anak yang sering terkena asma umumnya pada umur 2-3 tahun dan kebanyakan anak yang menderita akan sembuh dengan sendirinya bila telah akil baliq, tetapi ada pula yang tidak sembuh pada dewasa bahkan seumur hidup.

2. Diare

a. Pengertian

Diare adalah buang air besar dengan frekuensi yang tidak normal (meningkat) dan konsistensi tinja yang lembek atau cair. Diare akut adalah buang air besar dengan frekuensi tinja yang lebih lembek atau cair dan bersifat mendadak datangnya dan berlangsung dalam waktu kurang dari dua minggu (Suharyono 1986)

Walker Smith (1978) mendefinisikan diare kronik sebagai diare yang berlangsung selama 2 minggu atau lebih; untuk diare akut adalah diare yang timbul secara mendadak dan berhenti cepat atau maksimal berlangsung sampai 2 minggu.

Di samping itu, walker smith (1978) menyebut sebagai salah satu penyebab penting diare akut pada bayi dan anak (yang bukan disebabkan oleh infeksi) adalah anteropati karena sensitive terhadap protein susu sapi atau Cow's milk protein sensi. Sedangkan penyebab diare kronik lainnya adalah sindrom stasis yang terdapat pada obstruksi usus besar atau lainnya seperti pada penyakit Hirsch-sparung, polip usus besar. Oleh gracey (1979) disebutkan bahwa diare akut yang terdapat pada sindrom stasis disebabkan oleh adanya kontaminasi bakteri di usus halus.

Beberapa klasifikasi Diare antara lain:

1. Rendle short (1961) membuat klasifikasi berdasarkan pada ada atau tidak adanya infeksi; gastroenteritis (diare dan muntah) diklasifikasikan menurut 2 golongan :
 - a. Diare infeksi spesifik : tifus abdomen dan paratipus, disenteri basil (shigella) enterokolitis stafilokok.
 - b. Diare non-spesifik : diare dietetik

Disamping itu klasifikasi lain diadakan berdasarkan organ yang terkena infeksi:

- a. diare infeksi enternal atau diare karena infeksi di usus (bakteri, Virus, parasit).
 - b. Diare infeksi farenteral atau diare karena infeksi di luar usus (otitis media, infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran urin dan lainnya)
2. Ellis dan Mitchell (1973) membagi diare pada bayi dan anak secara luas berdasarkan lamanya diare diatas ;
- a. Diare akut atau diare karena infeksi usus yang bersifat mendadak. Diare karena infeksi usus dapat terjadi pada setiap umur dan bila menyerang bayi umumnya disebut gastroenteritis infantile.
 - b. Diare kronik yang umumnya bersifat menahun; diantara diare akut dan kronik disebut subakut.
3. Suharyono dan kawan-kawan (1976) mengajukan klasifikasi diare akut menurut masalah klinis yang ditemukan pada penatalaksanaannya. (Suharyono, 1986)

Pada diare akut dehidrasi merupakan gejala yang segera terjadi akibat pengeluaran cairan tinja yang berulang-ulang. Dehidrasi terjadi akibat kehilangan air dan elektrolit yang melebihi pemasukannya.

b. Penatalaksanaan dan pencegahan Diare

Sebagai akibat diare akut, anak akan kehilangan cairan (dehidrasi) dan elektrolit. Tergantung pada banyaknya kehilangan cairan dan elkatrolit atau dengan kata lain tergantung pada berapa banyak terjadinya penurunan berat badan akan terjadi dehidrasi ringan, sedang dan berat. Mengingat bahwa diare

akut bila tidak segera diobati akan menyebabkan kematian, maka pengobatan diare akut yang paling tepat ialah dengan rehidrasi artinya mengganti cairan yang hilang akibat diare.

- Prinsip pengobatan diare yang utama ialah rehidrasi dini dan pemberian makanan dini (early rehydration + early feeding), yang berupa:

- a. Memberikan secepatnya cairan yang mengandung garam (elektrolit) dan gula selama anak menderita diare sebanyak yang hilang melalui tinja dan atau melalui muntah.
- b. Air susu ibu dan makanan lain harus terus diberikan (begitu anak mau makan) dan jangan dihentikan.

- Dehidrasi sedang dan ringan

Pada dehidrasi sedang dan ringan (kehilangan cairan sebanyak kurang dari 10% berat badan) tidak diperlukan pemberian cairan intravena, cukup peroral dengan cairan oralit secara ad libitum atau sebanyak anak mau minum.

- Dehidrasi Berat

Pengolahan diare akut dengan dehidrasi berat mempunyai 3 tujuan dasar (Suharyono 1976, Nichols dan Soriano 1977, Sperotto 1977) yaitu :

- a. Mengobati renjatan bila ada
- b. Mengganti kehilangan air dan elektrolit yang melanjut
- c. Memenuhi kebutuhan pemeliharaan air dan elektrolit.

- Pencegahan diare

Hal yang penting dalam mengurangi dan menekan kesakitan dan kematian akibat diare adalah pencegahan dengan cara :

a. Penggunaan Air bersih

Air sangat penting dalam mendukung kehidupan manusia, air juga mempunyai potensi yang sangat besar jika tercemar dalam menularkan atau menstransmisikan berbagai penyakit. Di negara dengan penyediaan air bersih dan pengelolaan limbah yang efisien sangat jarang terjadi penyakit yang berhubungan dengan air. Tetapi Negara dimana masyarakat masih mengkonsumsi air yang tidak bersih dan tidak sehat 4 detik satu orang terkena diare atau setiap menit 15 orang terkena diare (U. Fahmi dalam armiami 2005)

b. Penggunaan jamban

Diare ditularkan melalui jalur fekal-oral. Pembuangan tinja secara benar di jamban akan mengurangi resiko penularan penyakit diare. Penggunaan jamban yang benar dapat mengurangi resiko diare lebih baik daripada perbaikan sumber air, walaupun dampak yang paling tinggi dapat diharapkan dari gabungan penggunaan jamban dan perbaikan sumber air.

c. Pembuangan tinja anak secara benar

Walaupun tinja anak kecil tetap merupakan penyebab diare infeksius bagi orang lain. Pembuangan tinja semua anak secara benar dan bersih penting dalam pencegahan diare

d. Mencuci tangan

Hal yang sangat penting dan merupakan perilaku dalam pencegahan diare adalah merubah kebiasaan untuk meningkatkan kebersihan dengan selalu mencuci tangan setiap kali habis buang air besar, setiap selesai membersihkan berak maupun kotoran anak yang diare. Mencuci tangan sebelum mengelolah bahan maupun mengolah makanan serta sebelum mencicipi makanan.

e. Menutup makanan

Salah satu binatang penyebab kuman diare adalah lalat dan yang dapat menularkan penyakit dari sumber penularan ke makanan yang tidak tertutup, oleh karena dimana perlu di galakkan menutup makanan di tempat-tempat umum, pasar, kios, sekolah maupun di rumah tangga.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti

1. ASI Eksklusif

ASI (Air Susu Ibu) adalah makanan terbaik bagi bayi sampai ia berumur sekitar 6 bulan dan setelah itu makanan lain bisa secara bertahap dipkenalkan kepadanya sehingga pada akhir tahun pertama, bayi sudah harus makan makanan yang dimasak bagi seluruh keluarga. ASI mengandung protein, lemak, vitamin, mineral, air dan enzim yang dibutuhkan oleh bayi. Karenanya ASI mengurangi resiko berbagai jenis kekurangan nutrisi (Ramaiah, 2006)

Gizi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keadaan kesehatan, oleh karena itu keadaan gizi masyarakat merupakan salah satu indikator derajat kesehatan.

Masalah gizi pada anak balita, khususnya anak dibawah 2 tahun sangat erat kaitannya dengan pemberian ASI dan pemberian makanan tambahan. Golongan ini merupakan golongan paling rawan terhadap kekurangan gizi, dimana anak ini sedang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental yang sangat pesat (Nasution, T dan Nasution N, 1998).


2. Penyakit Infeksi

Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh suatu bibit penyakit seperti : bakteri, virus, rickettsia, jamur, cacing dsb. Penyakit infeksi mempunyai efek terhadap status gizi untuk semua umur, tetapi lebih nyata pada kelompok anak, infeksi juga mempunyai kontribusi terhadap desinfektan kalori, protein dan zat lainnya. Kebutuhan energi pada saat infeksi biasa mencapai dua kali kebutuhan normal karena meningkatnya metabolisme dalam tubuh.



B. Kerangka Konsep

Berdasarkan dasar pemikiran yang di kemukakan di atas, maka disusunlah model hubungan variable yang di teliti :



Keterangan :



: Variabel Dependent



: Variabel Independent



: Variabel yang diteliti



: Variabel yang tidak diteliti

C. Defenisi Operasional dan Kriteria Obyektif

1. Status Gizi Balita

Status gizi adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan kebutuhan gizi balita yang dinilai melalui pengukuran antropometrik berat badan menurut umur (BB/U) berdasarka Z-score NCHS-WHO.

Kriteria obyektif :

Indeks BB/U

Gizi baik : Jika hasil analisis pengukuran diperoleh angka -2 SD sampai $+2$ SD

Gizi Kurang : Jika hasil analisis pengukuran diperoleh angka <-2 SD sampai -3 SD

2. Pemberian ASI eksklusif

ASI eksklusif atau pemberian ASI secara eksklusif pada penelitian ini adalah bayi yang hanya mendapat ASI langsung dari ibunya atau mendapat ASI perahan dan tidak memperoleh makanan cair atau padat lainnya sampai bayi berumur 6 bulan.

Kriteri Obyektif :

Ya : Apabila bayi diberi ASI saja tanpa makanan cair atau padat lainnya sampai bayi berumur 6 bulan.

Tidak : Apabila tidak memenuhi kriteria diatas.

3. Kejadian Penyakit Infeksi

Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, rickettsia, jamur, cacing dsb. seperti penyakit ISPA dan diare berdasarkan hasil diagnosa dokter, perawat atau bidan dalam satu bulan terakhir.

Kriteria Obyektif :

Ya : Apabila bayi menderita salah satu atau kedua dari penyakit tersebut

Tidak : Apabila tidak sesuai dengan kriteria diatas

D. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Nol (H_0)

- a. Tidak ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi di wilayah kerja Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur tahun 2011.
- b. Tidak ada hubungan antara penyakit infeksi dengan status gizi bayi di wilayah kerja Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur tahun 2011.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

- a. Ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi di wilayah kerja Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur tahun 2011.
- b. Ada hubungan antara penyakit infeksi dengan status gizi bayi di wilayah kerja Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur tahun 2011.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah survei analitik dengan pendekatan “*cross sectional Study*” yaitu akan melihat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dan penyakit infeksi terhadap status gizi bayi di wilayah kerja Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di lakukan di wilayah kerja Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 18 juli – 6 agustus 2011

C. Populasi, Sampel dan Responden

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua bayi umur 7 bulan yang ada di wilayah kerja Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, sebanyak 52 orang. (Data Puskesmas Wawondula juni 2011)

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian bayi umur 7 bulan yang berada di wilayah kerja Puskesmas Wawondula dengan cara pengambilan sampel aksidental (*accidental sampling*) yaitu pengambilan sampel yang ada pada saat penelitian dilakukan.

Responden

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah semua ibu yang mempunyai bayi umur 7 bulan.

D. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini variable yang di teliti terdiri dari:

1. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah status gizi balita
2. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pemberian ASI eksklusif dan penyakit infeksi (ISPA dan Diare)

E. Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer di peroleh melalui wawancara langsung pada responden dengan menggunakan kuesioner dan melakukan pengukuran antropometri yaitu penimbangan berat badan untuk melihat status gizi balita

2. Data Sekunder

Data sekunder di peroleh dari instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian yaitu posyandu dan puskesmas.

F. Instrumen Penelitian

1. Kuesioner untuk mengetahui identitas bayi
2. Timbangan seca atau dacin untuk mengukur berat badan bayi

G. Pengolahan dan Penyajian Data

Pengolahan data dilakukan secara elektronik dengan menggunakan analisis komputer, yaitu program SPSS dan untuk menghitung nilai Z-score indicator BB/U (Status Gizi), digunakan rumus perhitungan Z-Score adalah :

$$Z - \text{Score} = \frac{\text{Nilai} - \text{Rata-rata}}{\text{Standar Deviasi}}$$

Sedangkan penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan tabel analisis hubungan disertai penjelasan.

H. Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan program SPSS. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode :

a. Analisis Univariat

Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variable penelitian. Pada umumnya dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan presentase dari tiap variable (Soekidjo Notoatmodjo, 2010)

Analisis Univariat bermanfaat untuk melihat apakah data sudah layak untuk dilakukan analisis, melihat gambaran data yang dikumpulkan dan apakah data optimal untuk analisis lebih lanjut.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan digunakan uji *Chi-Square* (χ^2) untuk tabel 2x2.

Tabel 2
Analisis Statistik

Variabel Independen	Variabel Dependen		Jumlah
	Kategori I	Kategori II	
Kategori I	a	b	a+b
Kategori II	b	d	c+d
Total	a+c	b+d	a+b+c+d

Dengan rumus sebagai berikut :

$$X = \sum \left(\frac{\quad}{\quad} \right)$$

Dimana :

Σ = sigma (jumlah)

O_i = Nilai yang diamati (*Oberved*)

E_i = Nilai yang diharapkan (*Expected*)

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18 juli sampai 6 agustus 2011 terhadap 52 bayi usia 7 bulan di Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011. Adapun hasil dari penelitian sebagai berikut :

1. Analisis Univariat

a. Kelompok Umur Responden

Tabel 3
Distribusi Responden Menurut Umur di Puskesmas Wawondula
Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2011

Umur Responden	Jumlah	
	Frekuensi (n)	Persentase (%)
< 20	10	21,3
20 – 35	34	72,3
>35	3	6,4
Jumlah	47	100

Sumber : Data Primer 2011

Dari tabel 3 diatas menunjukkan bahwa umur responden yang paling banyak adalah 20 – 35 yaitu sebanyak 34 (72,3 %), sedangkan yang paling rendah adalah umur >35 yaitu sebanyak 3 orang (6,4 %).

b. Jumlah Anggota Keluarga Responden

Tabel 4
Distribusi Responden Menurut Jumlah Anggota dalam Keluarga
di Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2011

Jumlah Anggota Keluarga	Jumlah	
	Frekuensi (n)	Persentase (%)
< 5	29	61,7
≥ 5	18	38,3
Jumlah	47	100

Sumber : Data Primer 2011

Dari tabel 4 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai < 5 anggota keluarga yaitu sebanyak 29 orang (61,7 %). Sedangkan yang mempunyai anggota keluarga ≥ 5 sebanyak 18 orang (38,3 %).

c. Tingkat Pendidikan Responden

Tabel 5
Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan di Puskesmas
Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2011

Tingkat Pendidikan	Jumlah	
	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Tamat SD	1	2,1
Tamat SMP/Sederajat	11	23,4
Tamat SMA/Sederajat	25	53,2
Diploma/SI	10	21,3
Jumlah	47	100

Sumber : Data Primer 2011

Dari tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden yang paling banyak adalah tamat SMA/Sederajat yaitu sebanyak 25 orang (53,2 %), sedangkan yang paling rendah adalah Tamat SD yaitu 1 orang (2,1 %).

d. Jenis Pekerjaan Responden

Tabel 6
Distribusi Responden Menurut Jenis Pekerjaan di Puskesmas
Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2011

Jenis Pekerjaan	Jumlah	
	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Ibu Rumah Tangga	39	83
PNS	8	17
Jumlah	47	100

Sumber : Data Primer 2011

Dari table 6 menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah ibu rumah tangga yaitu sebanyak 39 orang (83 %), dan hanya 8 orang (17 %) yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

e. Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga

Tabel 7
Distribusi Responden Menurut Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga di
Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2011

Jenis Pekerjaan	Jumlah	
	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Petani	16	34
Pedagang	6	12,8
PNS	2	4,3
Wiraswasta	18	38,3
Tukang Ojek	5	10,6
Jumlah	47	100

Sumber : Data Primer 2011

Dari tabel 7 diatas menunjukkan bahwa pekerjaan kepala keluarga yang paling banyak adalah wiraswasta yaitu sebanyak 18 orang (38,3 %), sedangkan yang paling sedikit adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu sebanyak 2 orang (4,3 %).

2. Karakteristik Sampel

a. Jenis kelamin

Tabel 8
Distribusi Sampel Menurut Jenis Kelamin di Puskesmas
Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2011

Jenis Kelamin	Jumlah	
	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Laki-Laki	21	44,7
Perempuan	26	55,3
Jumlah	47	100

Sumber : Data Primer 2011

Dari tabel 8 diatas menunjukkan bahwa jenis kelamin bayi yang paling banyak adalah perempuan yaitu sebanyak 26 orang (55,3 %), dan terendah adalah laki-laki yaitu sebanyak 21 (44,7 %).

3. Distribusi Frekuensi

a. Pemberian ASI Eksklusif (0-6)

Tabel 9
Distribusi Sampel Menurut Pemberian ASI Eksklusif di Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011

ASI Eksklusif	Jumlah	
	Frekuensi (n)	Persentase (%)
ASI Eksklusif	16	34
ASI non Eksklusif	31	66
Jumlah	47	100

Sumber : Data Primer 2011

Dari tabel 9 diatas menunjukkan bahwa bayi yang mendapat ASI Eksklusif (0-6) bulan sebanyak 16 orang (34 %), sedangkan yang tidak mendapat ASI Eksklusif sebanyak 31 orang (66 %).

b. Status Gizi Bayi Menurut Z-Score BB/U

Tabel 10
Distribusi Status Gizi Bayi Menurut Z-Score BB/U di Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011

Status Gizi Z-Score BB/U	Jumlah	
	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Baik	30	63,8
Kurang	17	36,2
Jumlah	47	100

Sumber : Data Primer 2011

Dari tabel 10 diatas menunjukkan bahwa status gizi bayi berdasarkan Z-Score BB/U sebagian besar bayi berstatus gizi baik yaitu sebanyak 30 bayi (63,8 %), sedangkan bayi yang berstatus gizi kurang sebanyak 17 bayi (36,2 %).

c. Kejadian Penyakit Infeksi pada Bayi dalam Satu Bulan Terakhir.

Tabel 11
Distribusi Sampel Menurut Kejadian Penyakit Infeksi dalam
Satu Bulan Terakhir di Puskesmas Wawondula
Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2011

Kejadian Penyakit Infeksi	Jumlah	
	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Ya	32	68,1
Tidak	15	31,9
Jumlah	47	100

Sumber : Data Primer 2011

Dari tabel 11 diatas menunjukkan bahwa kejadian penyakit infeksi berdasarkan keseluruhan sampel adalah 32 orang (68,1 %), dan yang tidak menderita penyakit infeksi adalah 15 orang (31,9 %).

1. Analisis Bivariat

a. Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Status gizi Bayi

Tabel 12
Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Status Gizi Bayi
di Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2011

Status Pemberian ASI	Status Gizi Z-Score BB/U				Total		p
	Gizi Baik		Gizi Kurang		n	%	
	n	%	n	%			
ASI Eksklusif	15	93,8	1	6,2	16	100	0,006
ASI non Eksklusif	15	48,4	16	51,6	31	100	
Total	30	63,8	17	36,2	47	100	

Sumber : Data Primer 2011

Dari tabel 12 diatas menunjukkan bahwa dari 16 bayi dengan pemberian ASI eksklusif terdapat 1 bayi (6,2 %) status gizi kurang dan 15

bayi (93,8 %) status gizi baik. Sedangkan bayi dengan pemberian ASI non eksklusif sebanyak 32 bayi yaitu 16 bayi (51,6 %) status gizi kurang, dan 15 bayi (48,4 %) berstatus gizi baik.

Berdasarkan hasil uji statistic dengan menggunakan uji Chi-Square pada tingkat kemaknaan 0,05 (95 %), di peroleh $p=0,006$ ($p<0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan status gizi.

Interpretasi : Ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi di wilayah kerja Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur tahun 2011

b. Hubungan Penyakit Infeksi dengan satus Gizi Bayi

Tabel 13
Hubungan Penyakit Infeksi dengan Status Gizi Bayi
di Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti
Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2011

Penyakit Infeksi	Status Gizi Z-Score BB/U				Total		P
	Gizi Baik		Gizi Kurang		n	%	
	N	%	n	%			
Ya	16	50	16	50	32	100	0,011
Tidak	14	93,3	1	6,7	15	100	
Total	30	63,8	17	36,2	47	100	

Sumber : Data Primer 2011

Dari tabel 13 menunjukkan bahwa dari 32 sampel yang terkena penyakit infeksi 16 bayi (50 %) status gizi baik dan 16 bayi (50 %)

bestatus gizi kurang. Sedangkan yang tidak terkena penyakit infeksi sebanyak 15 bayi yaitu 14 bayi (93,3 %) status gizi baik dan 1 bayi (6,7 %) berstatus gizi kurang.

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan uji Chi-Square pada tingkat kemaknaan 0,05 (95%) diperoleh $p=0,011$ ($p < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penyakit infeksi dengan status gizi.

Interpretasi : Ada hubungan antara penyakit infeksi dengan status gizi bayi di wilayah kerja Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur tahun 2011.

B. Pembahasan

1. Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan di Puskesmas Wawondula pada bayi umur 7 bulan sebagai sampel dan ibu bayi sebagai responden, (tabel 3) didapatkan bahwa kelompok umur yang paling banyak adalah umur 20-35 tahun yaitu 34 orang (72,3 %) dan yang paling sedikit yaitu pada umur >5 tahun sebanyak 3 orang (6,4 %). Sedangkan berdasarkan jumlah anggota keluarga (tabel 4) menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai <5 orang anggota keluarga yakni sebanyak 29 orang (61,7 %) dan untuk jumlah anggota keluarga ≥ 5 orang sebanyak 18 orang (38,3 %).

Tingkat pendidikan responden (tabel 5) menunjukkan bahwa umumnya responden memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, yakni

sebanyak 25 orang (53,2 %) tamat SMA/ sederajat dan 10 orang (21,3 %) lulusan diploma/S1.

Tabel 6 terlihat bahwa jenis pekerjaan responden sebagian besar adalah Ibu Rumah Tangga yaitu sebanyak 39 Orang (83 %), dan 8 orang (17 %) bekerja sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS). Sedangkan jenis pekerjaan kepala keluarga (tabel 7) bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 18 orang (38,3 %), bekerja sebagai petani sebanyak 16 orang (34 %), bekerja sebagai pedagang 6 orang (12,8 %), bekerja sebagai tukang ojek sebanyak 5 orang (10,6 %) dan yang bekerja sebagai PNS sebanyak 2 orang (4,3 %).

2. Pemberian ASI Eksklusif

ASI merupakan makanan yang terbaik dan yang paling ideal untuk bayi. Disebut makanan yang terbaik untuk bayi, karena ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan dalam jumlah dan perimbangan yang tepat. Disamping itu ASI mengandung zat kekebalan atau antibodi yang berfungsi melindungi bayi dari berbagai kuman penyakit. ASI dalam jumlah yang cukup merupakan makanan terbaik dan dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi selama 6 bulan pertama. Disebut makanan yang paling ideal karena dengan menyusui bayinya, selain memberikan makanan terbaik, secara psikologis akan mempererat hubungan batin antara ibu dan anak yang baru dilahirkan, yang sangat penting artinya untuk perkembangan psikis dan emosi anak untuk selanjutnya. (Tirtawinata, 2006)

Masa penyusuan tidak harus selalu 24 bulan, seperti firman Allah SWT.

Dalam QS. Al-ahqaaf (46):15

وَحَمْلُهُ ثَلَاثُونَ وَفِصْلُهُ شَهْرًا^ط

Terjemahnya :

Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Ini berarti jika janin dikandung selama Sembilan bulan maka penyusuannya selama dua puluh satu bulan, sedangkan jika dikandung hanya enam bulan, maka ketika itu masa penyusuannya adalah 24 bulan. Betapa pun ayat diatas menjelaskan betapa pentingnya ibu menyusukan anak dengan ASI dan betapa pentingnya ibu memberi perhatian yang cukup terhadap anak-anaknya, khususnya pada masa-masa pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Sikap kejiwaan seorang dewasa banyak sekali ditentukan oleh perlakuan yang dialaminya pada saat kanak-kanak karena itu tidaklah tetap memberikan mereka hidup terlepas dari ibu bapak kandungnya (Shihab, 2002).

Berdasarkan hasil penelitian diwilayah Kerja Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur tahun 2011. Tentang pemberian ASI eksklusif dari 47 sampel, terdapat 16 bayi (34 %) yang mendapat ASI Eksklusif dan 31 bayi (66 %) yang mendapat ASI non Eksklusif. Rendahnya cakupan pemberian ASI non Eksklusif ini karena pengetahuan responden yang kurang tentang pemberian ASI Eksklusif yaitu dari 47 responden, yang tahu tentang ASI

eksklusif sebanyak 19 orang (40,4 %) sedangkan yang tidak tahu tentang ASI eksklusif sebanyak 28 orang (59,6 %), selain itu perubahan ketentuan batas umur pemberian ASI eksklusif, yang sebelumnya pada umur 4 bulan menjadi batas minimal 6 bulan.

Berdasarkan hasil penelitian hubungan pemberian ASI eksklusif dengan status gizi menunjukkan bahwa dari 16 bayi yang diberi ASI eksklusif terdapat 15 bayi (93,8 %) yang berstatus gizi baik. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian ASI eksklusif pada awal kehidupan bayi sangat penting karena mampu memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit, dan 1 bayi (6,2 %) yang status gizinya kurang. Ini disebabkan karena ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gizi kurang seperti penyakit infeksi, dampak dari penyakit infeksi terhadap pertumbuhan seperti menurunnya berat badan dan hilangnya nafsu makan sehingga intake energi dan zat gizi, kurang memenuhi kebutuhan zat gizi. Dari hasil wawancara diperoleh bahwa anak yang berstatus gizi kurang menderita penyakit infeksi dalam satu bulan terakhir ini.

Sedangkan bayi dengan pemberian ASI non eksklusif menunjukkan bahwa dari 31 bayi terdapat 15 bayi (48,4 %) berstatus gizi baik. Ini karena pola asupan makanan yang diperoleh bayi dari praktek pemberian ASI dan makanan pendamping ASI telah mampu memenuhi kebutuhan gizinya, dan 16 bayi (51,6 %) yang berstatus gizi kurang, ini terjadi karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi status gizi bayi seperti penyakit infeksi, asupan gizi dan pola

asuh ibu dalam hal ini pengetahuan ibu tentang gizi. Pengetahuan orangtua terutama ibu, tentang gizi sangat berpengaruh terhadap tingkat kecukupan gizi yang diperoleh oleh bayi. Pengetahuan tentang gizi yang penting diketahui oleh ibu adalah berkaitan dengan kandungan makanan, cara pengolahan makanan, kebersihan makanan dan lain-lain. Dari hasil penelitian di temukan 31 (66%) responden yang memberikan makanan pralakteal pada bayinya, dari 31 responden yang memberikan pralakteal, ada (42,6 %) yang memilih susu formula, (12,8 %) air the/kopi, (6,4 %) memilih madu dan (4,3 %) yang memilih air gula. Pemberian makanan dan minuman pralakteal berbahaya bagi bayi karena Saluran pencernaan bayi belum cukup kuat untuk mencerna makanan atau minuman selain ASI. Selain itu Makanan atau minuman lain sering mengandung kuman yang bisa membuat bayi sakit.

Bila dibandingkan dengan pemberian ASI eksklusif persentase gizi kurang pada bayi yang ASI non eksklusif lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa pemberian ASI non eksklusif dapat menimbulkan terjadinya malnutrisi atau gangguan gizi pada bayi.

Berdasarkan hasil uji statistik di peroleh nilai $p=0,006$ ($p<0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang di lakukan oleh Ferdian (2009) yang mengatakan bahwa ada hubungan antara Pemberian ASI Eksklusif

Terhadap Status Gizi pada Bayi Usia 6-12 Bulan di Kecamatan Mampang Prapatan.

3. Penyakit Infeksi pada Bayi

Penyakit infeksi merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian yang terjadi pada bayi dan anak terutama sering terjadi pada Negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan dalam keadaan kekurangan gizi seseorang akan lebih rentan terhadap infeksi.

Anak pada usia 6-24 bulan perlu mendapat perhatian khusus karena kelompok umur ini sangat rentan terhadap penyakit kekurangan gizi. Penyebab utama kematian anak saat ini adalah penyakit infeksi yang sebagian dapat dicegah dengan pemberian imunisasi dan pemberian ASI eksklusif. Penyakit infeksi yang paling tinggi morbiditas dan mortalitas saat ini pada anak usia dibawah lima tahun adalah diare dan ISPA.

Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur tahun 2011 menunjukkan bahwa dari 47 sampel, 15 bayi (31,9 %) tidak mengalami penyakit infeksi, dan 32 bayi (68,1 %) mengalami penyakit infeksi. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemberian ASI eksklusif pada bayi dan sanitasi lingkungan yang kurang. Selain itu dalam penelitian ini juga masih ditemukan responden yang tidak memberikan kolostrum pada bayinya, dimana pemberian kolostrum ini dianggap mampu memberikan perlindungan bagi bayi sampai umur 6 bulan. Zat gizi yang terkandung di dalam kolostrum mampu menghindarkan bayi dari berbagai

penyakit infeksi seperti ISPA dan Diare, dari 47 sampel terdapat 19 orang (40,4 %) responden yang tidak memberikan kolostrum, alasan yang paling utama mereka tidak memberikan kolostrum pada bayinya karena mereka tidak tahu manfaatnya (23,4 %) dan (17 %) dengan alasan ASI basi.

Pada sebagian besar bayi terjadi diare terutama sewaktu masa pemberian cairan ataupun makanan sebagai penambah atau pengganti ASI. Bayi yang tidak mendapat ASI mempunyai resiko yang sangat besar untuk menderita diare disbanding dengan bayi yang mendapat ASI.

Diare biasanya bersamaan dengan peradangan usus. Diare tidak boleh dianggap sepele, karena keadaan ini harus ditangani dengan serius, mengingat cairan banyak keluar dari tubuh, yang dapat menyebabkan anak jatuh pada keadaan malnutrisi.

Selain itu Infeksi saluran pernapasan akut juga merupakan penyebab utama dari kematian anak-anak di seluruh dunia. Di Negara-negara berkembang frekuensi infeksi lebih tinggi pada anak kecil. Keadaan ini mungkin ada hubungannya dengan bahaya besar dari penyakit itu karena radang yang ditimbulkan menyebabkan sumbatan pada saluran napas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 32 bayi yang menderita penyakit infeksi terdapat 15 bayi (31,9 %) yang menderita ISPA dan 10 bayi (21,3 %) yang menderita diare, sedangkan bayi yang terkena ISPA+Diare sebanyak 7 bayi (14,9 %).

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah kerja puskesmas wawondula kecamatan towuti kabupaten luwu timur tahun 2011, tentang hubungan penyakit infeksi dengan status gizi pada bayi dari 32 yang menderita penyakit infeksi 16 bayi (50 %) berstatus gizi kurang. Hal ini disebabkan karena penyakit Infeksi akut dapat menyebabkan penurunan asupan makanan. Seberapa besar penurunan asupan makanan tergantung pada seberapa parah infeksi yang diderita. Anak dengan penyakit ISPA atau diare, mengonsumsi kurang lebih 8-18 % lebih sedikit dari total kalori perhari dibandingkan saat mereka tidak sakit, dan 16 bayi (50 %) berstatus gizi baik. Ini karena pemberian MP-ASI dalam hal ini pemberian susu formula yang berkualitas jenis dan mutunya yang mampu dibeli pada tingkat ekonomi keluarga yang baik dimana mampu memenuhi status gizi anak tersebut dan juga umumnya anak yang berstatus gizi baik ini pada saat sakit mengalami penurunan berat badan akan tetapi penurunannya masih dalam status normal. Selain itu pola asuh yang baik meliputi perawatan anak dalam keadaan sakit juga menjadi alasan mengapa anak yang terkena penyakit infeksi ini status gizinya baik dari hasil wawancara diperoleh bahwa perhatian ibu pada saat sakit sangat besar dimana ibu langsung membawa anak ke tempat pelayanan kesehatan untuk segera mendapatkan pengobatan.

Sedangkan bayi yang tidak menderita penyakit infeksi dari 15 bayi, 14 bayi (93,3 %) berstatus gizi baik dan 1 bayi (6,7 %) berstatus gizi kurang. Dari hasil penelitian terlihat bahwa bayi yang menderita penyakit infeksi persentase gizi kurang (50 %) lebih tinggi dari anak yang tidak menderita penyakit infeksi

gizi kurang (6,7 %). Hal ini menunjukkan bahwa gizi kurang pada bayi terjadi karena beberapa faktor antara lain karena ketidak seimbangan asupan zat-zat gizi, dan adanya penyakit infeksi yang diderita anak. Dimana faktor asupan makanan dan penyakit infeksi inilah yang dapat secara langsung menyebabkan gizi kurang.

Berdasarkan uji statistik di peroleh nilai $p=0,011$ ($p<0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara penyakit infeksi dengan status gizi bayi. Hal ini disebabkan karena timbulnya penyakit infeksi seperti ISPA dan diare dapat menjadi penyebab terjadinya gangguan metabolisme tubuh sehingga anak mudah jatuh pada keadaan malnutrisi.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Triani (2003) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna antara kejadian penyakit infeksi dengan status gizi.

Sejalan dengan hal ini islam sangat menganjurkan kepada para ibu agar memperhatikan kebutuhan anak, terutama gizi anak dengan cara memberikan makanan yang terbaik. Dalam Al-Qur'an Allah SWT. Berfirman dalam Surah An-Nahl (16):114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ

إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Terjemahnya :

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah.

Ayat di atas menganjurkan agar makan makanan yang halal lagi baik, dalam artian makanan yang bergizi. Karena manusia membutuhkan sejumlah zat-zat di dalam tubuhnya seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin-vitamin dan mineral. Makanan yang memberikan energi berasal dari karbohidrat seperti beras, gandum dan sejenisnya, sedangkan protein diperoleh dari daging, ikan dan sejenisnya. Kemudian ayat di atas diikuti dengan anjuran bersyukur kepada Allah. Memang bersyukur atas nikmat Allah merupakan salah satu bentuk ibadah seorang hamba kepada tuhanNya (Ahsin W. Al-Hadidz. 2007)

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Air Susu Ibu adalah sebuah cairan tanpa tandingan ciptaan Allah untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. Semua ibu dianjurkan untuk menyusui bayinya seperti tercantum dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233. Dalam ayat ini semua ibu dianjurkan untuk menyusui bayi mereka sampai umur dua tahun agar pertumbuhan badan, perkembangan mental dan kesehatan bayi mereka itu terjamin.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang hubungan pemberian ASI eksklusif dan penyakit infeksi terhadap status gizi bayi umur 7 bulan di wilayah kerja Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji statistik di peroleh nilai $p=0.006$ ($p<0.05$) berarti ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi di wilayah kerja Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011.
2. Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai $p=0,011$ ($p<0.05$) berarti ada hubungan antara penyakit infeksi dengan status gizi bayi di wilayah kerja Puskesmas Wawondula Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011.

B. Saran

1. Melihat masih terdapatnya gizi kurang pada bayi dan rendahnya pemberian ASI eksklusif sampai umur 6 bulan, maka perlu dilakukan pemasyarakatan melalui upaya peningkatan penyuluhan tentang manfaat pemberian ASI eksklusif bagi kesehatan bayi.
2. Disarankan bagi para petugas kesehatan untuk meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat khususnya ibu hamil dan yang mempunyai anak balita mengenai pentingnya meningkatkan status gizi keluarga.
3. Untuk ibu-ibu yang ingin menyusui anaknya sebaiknya memulai dengan membaca do'a minimal "Bismillahirrohmanirrohiim".
4. Untuk para peneliti selanjutnya, agar dapat melakukan penelitian mengenai faktor lain yang berhubungan dengan status gizi selain pemberian ASI eksklusif dan penyakit infeksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama, 1999. *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*. PT. Karya Toha Putra, Semarang
- Al-Hafidz Ahsin, 2007. *Fikih Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Armiati. "*Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian diare di puskesmas bara-baraya Kecamatan Makassar tahun 2010*". Skripsi. Makassar: FKM UIT, 2010
- Depkes, RI, 2004, *Analisis Situasi Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, Jakarta (Online) <http://zaifbio.wordpress.com/2009/02/02/standart-kecukupan-gizi-dan-perencanaan-pemenuhannya/>, Diakses tanggal 22 mei 2011
- Depkes, RI, 2006, *Pedoman Umum Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) Lokal*, Jakarta (Online) <http://gizi.depkes.go.id/asi/Pedoman%20MP-ASI%20Lokal.pdf> , diakses tanggal 10 agustus 2011
- Edjang, intan, 2000. *Ilmu kesehatan masyarakat* , PT Citra aditya bakti, bandung
- Ferdian, dkk. 2009. *Pengaruh Pemberian ASI Eksklusif Terhadap Status Gizi pada Bayi Usia 6-12 Bulan di Kecamatan Mampang Prapatan* skripsi , Trisakti.Jakarta. (Online) diakses tanggal 10 agustus 2011 <http://www.scribd.com/doc/18238338/Pengaruh-Pemberian-Asi-Eksklusif-Terhadap-Status-Gizi-Pada-Bayi>
- Gibney,Michael J, dkk. 2005. *Gizi Kesehatan Masyarakat*. EGC. Jakarta
- Hasan, Purwakania Aliah B. 2008. *Pengantar Psikologi Kesehatan Islam*. PT.garfindo Persada. Jakarta
- Indiarti, 2009. *ASI susus formul & makanan bayi*.elmatre publishing. Yogyakarta
- Iman, dr. 2009 (Online) *kandungan Gizi dalam Air Susu Ibu*. <http://dokter-medis.blogspot.com/2009/11/kandungan-gizi-dalam-air-susu-ibu.html> di akses tanggal 6 Juli 2011
- Jurniati, 2010. *Hubungan pemberian ASI eksklusif dengan ketahanan tubuh pada bayi 6-7 bulan di wilayah kerja puskesmas somba opu*

- Juwitasari, Erni. 2007. *Pola Penyakit Infeksi Pada Anak Balita di bangsal rawat inap RSUD Kanjuruhan Kepanjen Periode Januari Desember 2007*. Skripsi.(Online)
http://eprints.umm.ac.id/6274/1/Pola_Penyakit_Infeksi_Pada_Anak_Balita_di_bangsal_rawat_inap_RSU_Kanjuruhan_Kepanjen_Periode_Januari.pdf
 Di akses tanggal 9 agustus 2011
- Suharyono . 2008. *“Diare akut”* .PT. Rineke Cipta. Jakarta
- Kasjono, Heru Subaris, Yasril, 2009. *Tekhnik Sampling Untuk Penelitian Kesehatan*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Nasution, T dan Nasution, M. 1998. *Anak balita dalam keluarga, pengantar pertumbuhan dan perkembangan yang optimal*, Jakarta: PT. EPK gunung mulia
- Notoadmodjo, Soekidjo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Priyatno, duwi. 2010. *Paham Analsis Statistik Data dengan SPSS*. Mediakom. Yogyakarta
- Ramaiah Safitri, Dr. 2006. *ASI dan Menyusui*. PT. Bhuana Ilmu Popular. Jakarta
- Riskesdas . 2007 (Online) <http://www.scribd.com/doc/14348015/statgiziriskesdas2007>
 Diakses Tanggal 27 juni 2011
- Shihab M. Quraish, 2002. *Tafsir Al-Misbah jilid 1* . Jakarta: Lentera Hati
- _____, 2002. *Tafsir Al-Misbah jilid 8* . Jakarta : Lentera Hati
- Stang Drs., M.Kes. 2005. *Biostatistik Inferensial*. Jurusan Biostatistik/KKB FKM UH.
- Supariasa, I Dewa Nyoman. 2001. *Penilaian Status Gizi*. Penerbit Kedokteran EGC.
 Jakarta
- Sulastri, Eni. 2010. *Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang ASI dengan Pemberian Kolostrum pada Ibu Menyusui di Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar*. Skripsi. Surakarta (Online)
<http://digilib.uns.ac.id/upload/dokumen/144451308201010001.pdf> diakses tanggal 10 agustus 2011

- Sumartik. 2010. *Gambaran Pengetahuan Ibu Post Partum tentang Pemberian Kolostrum pada Bayi Baru Lahir di Klinik Dermawati Tembung Deli Serdang Tahun 2010*. Skripsi (Online)
<http://akbid.info/library/gdl.php?mod=browse&op=read&id=suptakbpp-gdl-sumartik-13> diakses tanggal 10 agustus 2011
- Soetjningsih. 1997. *ASI petunjuk untuk tenaga kesehatan*. EGC .jakarta
- Taddaga, Kasse. 2009. *Ilmu Gizi dalam Daur Kehidupa*. Pustaka As-salam. Takalar
- Tirtawinata, Tien Ch. 2006. *Makanan dalam Perspektif Al-Quran dan Ilmu Gizi*. FKUI. Jakarta
- Triani, Ida rahardjo. 2003. *Hubungan Status Gizi Dengan Penyakit Infeksi (Diare, ISPA) pada Anak Balita di Puskesmas Sruweng Kabupaten Kebumen*. Skripsi. (Online) <http://www.fkm.undip.ac.id/data/index.php?action=4&idx=112>
 Di akses tanggal 11 agustus 2011
- Trisno, iwan. 2009. *Pengaruh Pemberian Asi Eksklusif terhadap kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Bayi Usia 6-12 Bulan di Puskesmas Wedarijaksa II Kabupaten Pati* skripsi (Online)
http://litbang.patikab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=119:pengaruh-pemberian-asi-eksklusif-terhadap-kejadian-infeksi-saluran-pernafasan-akut-ispa-pada-bayi-usia-6-12-bulan-di-puskesmas-wedarijaksa-ii-kabupaten-pati&
 Diakses tanggal 11 1gustus 2011.
- Yuliarti, Nurheti. 2010. *Keajaiban ASI Makanan Terbaik Untuk Kesehatan, Kecerdasan, dan Kelincahan Si Kecil*. CV. Andi Offset. Yogyakarta
- Yahya, Harun. 2007 (Online). *Cairan Ajaib: Air Susu Ibu*
http://us1.harunyahya.com/Detail/T/EDCRFV/productId/4480/CAIRAN_AJAI_B: AIR_SUSU_IBU di akses tanggal 6 juli 2011

http://www.rahima.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=625:islam-mendukung-asi-eksklusif--al-arham-edisi-33-a-&catid=19:al-arham&Itemid=328



RIWAYAT HIDUP PENULIS



RAHMIATI, Lahir di Desa Loeha Kec. Towuti Kab. Luwu Timur pada tanggal 31 juli 1988. Anak ketiga dari enam bersaudara, yang merupakan anak dari pasangan Buhari. S dan Rahmawati.

Pendidikan formal yang telah dilalui adalah menamatkan SDN 293 Lambatu pada tahun 2001. Selanjutnya pada tahun 2004 penulis menamatkan jenjang pendidikan pada MTS Darunnajah Timampu Kab. Luwu Timur Kemudian melanjutkan pendidikan di MA Darunnajah Timampu Kec. Towuti Kab. Luwu Timur dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun 2007 penulis di terima sebagai Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur SPMB Lokal. Dan memilih program studi Gizi.

Sebagai seorang mahasiswa penulis juga aktif dalam mengikuti berbagai jenis kegiatan organisasi dalam lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adapun pengalaman organisasi yang pernah diikuti penulis antara lain : Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan periode 2008-2009 . Pengurus Himpunan KSR – PMI Unit 107 UIN Alauddin Makassar 2010-Sampai sekarang.