

**ANALISIS KADAR GLUKOSA DAN FRUKTOSA PADA BEBERAPA
MADU MURNI YANG BEREDAR DI PASARAN DENGAN
MENGUNAKAN METODE SPEKTROFOTOMETRI VISIBEL**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
pada Fakultas Ilmu Kesehatan**

UIN Alauddin Makassar

Oleh

SARTIKA

NIM : 70100107076

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, Desember 2011
Penyusun,

SARTIKA

NIM: 70100107076

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah swt. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi junjungan kita Muhammad SAW, para sahabat, serta keluarganya.

Skripsi yang disusun dengan judul “Analisis Kadar Glukosa dan Fruktosa Pada Beberapa Madu Murni yang Beredar Di Pasaran Dengan Menggunakan Metode Spektrofotometri Visibel” ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi Program Studi Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Berkat kesabaran dan kemauan yang keras dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Subehan, S.Si., M. Pharm., Sc., Ph.D., Apt selaku pembimbing utama dan Ibu Haeria S.Si., M.Si., selaku pembimbing kedua, yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya skripsi ini.

Terkhusus ungkapan terima kasih dan bakti sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Azis dan Ibunda Hj.Naima, serta Saudara-saudaraku

tersayang, Rahmawati, Zainal, Zaidah, Achmad, dan saudara sepupu Herman dan Amir serta segenap keluarga yang penuh kasih sayang memberikan dukungan moral maupun materil kepada Penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :


1. Prof. Dr. H. A. Qadir gassing HT, MS selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan dukungan demi selesainya skripsi ini.
2. Gemy Nastity Handayani S.Si M.Si., Apt selaku ketua Prodi farmasi dan sebagai penguji akademik.
3. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, Apt selaku kepala laboratorium Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Drs. H. Supardin M.Hi penguji agama atas saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini
5. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen serta staf dalam lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas jerih payah selama mendidik di bangku kuliah
6. Terima kasih atas saran, bantuan dan ilmunya untuk sahabat-sahabatku dan laboran, terimah kasih telah memberikan masukan dan bantuannya dalam melaksanakan penelitian. Kakak-kakak Farmasi 05, 06, teman-teman 07, adik-adik 08, 09, dan 10 atas bantuan dan kerjasamanya selama penulis melaksanakan pendidikan

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk kesempurnaan skripsi ini, namun “tak ada gading yang tak retak”, Penulis menyadari bahwa skripsi ini

masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Akhirnya, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahuwata'ala.

Makassar, Desember 2011

Sartika



DAFTAR ISI


| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| ABSTRAK | xii |
| ABSTRACT | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. <i>Latar Belakang</i> | 1 |
| B. <i>Rumusan Masalah</i> | 4 |
| C. <i>Maksud dan Tujuan Penelitian</i> | 4 |
| D. <i>Kegunaan Penelitian</i> | 5 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 6 |
| A. <i>Klasifikasi Lebah</i> | 6 |
| B. <i>Morfologi dan Anatomi Lebah Madu</i> | 6 |
| a. <i>Morfologi (Struktur Eksternal)</i> | 6 |
| b. <i>Anatomi (Struktur Internal)</i> | 7 |
| c. <i>Habitat Lebah Madu</i> | 7 |
| C. <i>Hasil Lebah</i> | 8 |
| D. <i>Jenis Madu</i> | 8 |

| | |
|--|----|
| E. <i>Komposisi dan Kandungan Madu</i> | 10 |
| F. <i>Manfaat Madu</i> | 11 |
| G. <i>Kualitas Madu</i> | 12 |
| H. <i>Penetapan Gula</i> | 16 |
| Metode Anthrone..... | 17 |
| Spektrofotometer..... | 17 |
| Instrumentasi Spektrofotometer UV-VIS..... | 18 |
| 1. Sumber Radiasi..... | 19 |
| 2. Monokromator..... | 20 |
| 3. Sel/kuvet..... | 21 |
| 4. Detektor..... | 22 |
| 5. Amplifier..... | 22 |
| Aspek Kualitatif dan Kuantitatif Spektrofotometri UV-VIS..... | 22 |
| 1. Aspek Kualitatif..... | 22 |
| 2. Aspek Kuantitatif..... | 23 |
| a. Analisis Komponen Tunggal..... | 24 |
| b. Analisis 2 Campuran Secara Bersama-sama..... | 24 |
| Hal-hal yang Harus diperhatikan Dala Analisis Spektrofotometri UV-VIS..... | 25 |
| I. <i>Tinjauan Agama Tentang Madu</i> | 27 |
| BAB III METODE | 34 |
| A. <i>Alat dan Bahan</i> | 34 |
| B. <i>Prosedur Kerja</i> | 34 |
| 1. Persiapan Sampel..... | 34 |
| 2. Pereaksi..... | 35 |
| 3. Larutan Standar..... | 35 |
| Cara Kerja..... | 35 |
| 1. Pembuatan Kurva Baku..... | 35 |
| 2. Penetapan Sampel..... | 35 |

| | |
|----------------------------------|----|
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 37 |
| A. Hasil Penelitian..... | 37 |
| B. Pembahasan..... | 38 |
| | |
| BAB V PENUTUP..... | 44 |
| A. Kesimpulan..... | 44 |
| B. Saran..... | 44 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| Tabel | | Halaman |
|---------|---|---------|
| Tabel 1 | Komposisi Kimia Madu Per 100 gram..... | 11 |
| Tabel 2 | Syarat Mutu Madu Nasional..... | 14 |
| Tabel 3 | Hasil Penelitian Gula Pereduksi..... | 37 |
| Tabel 4 | Hasil Perhitungan Persamaan Garis Regresi Linier dari Fruktosa..... | 48 |
| Tabel 5 | Hasil Perhitungan Persamaan Garis Regresi Linier dari Glukosa..... | 52 |



DAFTAR GAMBAR

| No | Halaman |
|--|---------|
| 1. Rumus Struktur Anthrone..... | 17 |
| 2. Skema Kerja Spektrofotometer UV-VIS..... | 19 |
| 3. Perbandingan Konsentrasi dan Absorben Fruktosa..... | 37 |
| 4. Perbandingan Konsentrasi dan Absorben Glukosa..... | 38 |



DAFTAR LAMPIRAN

| No | | Halaman |
|-----|--|---------|
| 1. | Skema Kerja Persiapan Sampel..... | 46 |
| 2. | Skema Kerja Penetapan Sampel..... | 47 |
| 3. | Perhitungan..... | 48 |
| 4. | Gambar Hasil Spektrofotometer panjang Gelombang Glukosa... | 56 |
| 5. | Gambar Hasil Spektrofotometer Panjang Gelombang Fruktosa. | 57 |
| 6. | Gambar Pemanasan Sampel..... | 57 |
| 7. | Gambar Penyaringan Pb-asetat..... | 58 |
| 8. | Gambar Ditambah Na. Oksalat..... | 59 |
| 9. | Gambar Larutan Glukosa san Fruktosa..... | 59 |
| 10. | Gambar Penetapan Sampel..... | 60 |
| 11. | Gambar Spektrofotometer UV-VIS..... | 60 |
| 12. | Gambar Komputer..... | 61 |

ABSTRAK

Nama penyusun : Sartika
NIM : 70100107076
Judul Skripsi : “ Analisis Kadar Glukosa dan Fruktosa Pada Beberapa Madu Murni yang Beredar Di Pasaran Dengan Menggunakan Metode Spektrofotometri Visibel”.

Kadar gula penyusun madu menurut SII selama ini ditentukan berdasarkan total gula pereduksi sehingga belum bisa diketahui kadar masing – masing Gula penyusun madu tersebut. Madu mengandung berbagai jenis Gula pereduksi yaitu Glukosa, Fruktosa, dan Maltosa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar Glukosa, dan Fruktosa dengan menggunakan metode Spektrofotometri visibel terhadap dua jenis madu dari jenis bunga yang berbeda.

Untuk menganalisis metode Anthrone diambil sebagai metode yang cocok untuk menentukan gula. Dengan penambahan pereaksi anthrone dalam sampel terjadi reaksi antara larutan glukosa dengan anthrone – asam sulfat yang berwarna hijau agak kekuningan, namun setelah dipanaskan berwarna hijau, setelah bereaksi dapat dilihat absorbansnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar glukosa pada madu A adalah 14,46, maka B adalah 15,16, dan madu C adalah 10,86. Kadar Fruktosa pada madu A adalah 13,3%, maka B adalah 5,4%, dan C adalah 6,5%. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing sampel yang diteliti tidak memiliki kadar Glukosa dan Fruktosa yang sesuai dengan syarat mutu madu Nasional dimana kandungan gula pereduksi (Glukosa dan Fruktosa) total adalah minimal 60% kadar gula pereduksi total pada madu A adalah 27,7%, madu B adalah 20,5%, dan madu C adalah 17,3%.

Kata Kunci : Glukosa, Fruktosa, Anthrone, Spektrofotometri, Madu

ABSTRACT

Writer : Sartika
Student Number : 70100107076
Title : Analysis of Glucose and Fructose Concentration From
Several Honey in Market by Using Visible
Spektrophotometry Method.

The concentration of sugar honey guarding to SII is determined as total reducing sugars, so the concentration of sugars which compose the honey is unknown, honey is composed of reducing sugar is i.e. glucose, fructose, and maltose. This research aim to know the concentration of glucose and fructose by using visible spectrophotometry method to two kind of honey which is from different flower.

For the analysis, it is used anthrone method as a suitable method for determining the concentration of glucose, addition of anthrone makes reaction between glucose and sulfad acid that colored green to yellow, then after heating become green and it can measured its absorban.

The result showed that concentration of honey A is 14,46 %, for honey B is 15,16 % and honey C 10,86 %. Concentration of fructose of honey A is 13,3 %, B is 5,4 % and C is 6,5 %, This showed that for each sample has not suitable concentration of glucose and fructose with Indonesian Standard, which is said that minimal concentration of reducing sugar in sample is 60 %.

Keywords : Glucose, Fructose, Anthrone, Spektrophotometry, Honey

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Sejak ribuan tahun yang lalu sampai sekarang ini, madu telah dikenal sebagai salah satu bahan makanan atau minuman alami yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan dan kesehatan. Madu merupakan produk alam yang dihasilkan oleh lebah untuk dikonsumsi, karena mengandung bahan gizi yang sangat esensial (Purbaya, 2002).

Madu bukan hanya merupakan bahan pemanis, atau penyedap makanan, tetapi sering pula digunakan untuk obat-obatan. Madu dapat digunakan untuk menghilangkan rasa lelah dan letih, dan dapat pula digunakan untuk menghaluskan kulit, serta pertumbuhan rambut (Murtidjo, 1991)

Madu dihasilkan oleh lebah dengan memanfaatkan bunga tanaman. Madu memiliki warna aroma dan rasa yang berbeda-beda, tergantung pada jenis tanaman yang banyak tumbuh disekitar peternakan lebah madu (Sarwono, 2001). Sebagai contoh madu mangga (rasa yang agak asam), madu bunga timun (rasanya sangat manis), madu kapuk atau randu (rasanya manis, lebih legit dan agak gurih), madu lengkung (rasa manis, lebih legit dan aromanya lebih tajam). Selain itu dikenal pula madu buah rambutan, madu kaliandra dan madu karet (Suranto, 2004).

Penggunaan madu telah dimulai sejak zaman purba. Pada saat itu, madu merupakan satu-satunya jenis gula atau bahan pemanis yang telah diketahui,

di samping berfungsi sebagai obat. Pada zaman firau, madu telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Mesir Kuno sebagai minuman yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit seperti sesak napas dan demam. Pada saat itu madu telah diketahui memiliki kekuatan dalam melawan kuman. Karena itu, bangsa Mesir Kuno menggunakan madu sebagai bahan pengawet mayat atau mumi. Sebagai obat luar, bangsa Mesir Kuno menjadikan madu sebagai ramuan bagi orang yang terkena *cramp* (kejang). Madu dicampur dengan lilin lebah, biji-bijian, dan garam laut kemudian dioleskan di bagian tubuh yang kejang (Suranto, 2004)

Penemuan-penemuan baru atau lanjutan dari yang terdahulu, tentang manfaat serta khasiatnya itu, ternyata semakin banyak saja seakan memang tidak akan ada habis-habisnya untuk terus digali, diungkap, dan dibicarakan. Terbukti, sejak mulai dikenal madu alami telah banyak menarik perhatian para pengamat, untuk terus meneliti, mencari-cari apa manfaatnya yang masih tersembunyi. Madu alami merupakan satu-satunya bahan pemanis dan pengawet dari alam yang langsung dikonsumsi, dimakan atau digunakan dengan begitu saja tanpa harus diolah terlebih dahulu (Purbaya, 2002)

Madu yang baik harus dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Standar Industri Indonesia (SII) tahun 1977 dan 1985 (Suranto, 2004). Kadar yang sesuai dengan standar SII hanya mungkin terdapat pada madu murni, yaitu madu yang belum diberi campuran dengan bahan-bahan lain. Dipasaran dalam negeri, jaminan akan keaslian dan mutu madu masih belum ada, oleh

karenanya kecurigaan akan kepalsuan madu akan selalu ada (Sujatmaka, 1988).

Standar mutu madu salah satunya didasarkan pada kandungan gula pereduksi (glukosa dan fruktosa) total yaitu minimal 60 %. Sedangkan, jenis gula pereduksi yang terdapat pada madu tidak hanya glukosa dan fruktosa, tetapi juga terdapat maltosa dan dekstrin (Purbaya, 2002). Sementara itu proses produksi madu oleh lebah itu sendiri merupakan proses yang kompleks, sehingga kemungkinan besar terjadi perbedaan kadar dan komposisi gula pereduksi di antara berbagai jenis madu yang beredar dimasyarakat. Komposisi gula pereduksi tiap-tiap madu kemungkinan dapat mempengaruhi khasiat madu terutama dalam proses pengobatan (Jarvis, 1995).

Glukosa yang terdapat dalam madu berguna untuk memperlancar kerja jantung dan dapat meringankan gangguan penyakit hati (lever). Glukosa dapat diubah menjadi glikogen yang sangat berguna untuk membantu kerja hati dalam menyaring racun-racun dari zat yang sering merugikan tubuh (Purbaya, 2002). Selain itu, glukosa merupakan sumber energi untuk seluruh sistem jaringan otot. Sedangkan, fruktosa disimpan sebagai cadangan dalam hati untuk digunakan bila tubuh membutuhkan dan juga untuk mengurangi kerusakan hati (Sarwono, 2001). Fruktosa dapat dikonsumsi oleh para penderita diabetes karena transportasi fruktosa ke sel-sel tubuh tidak membutuhkan insulin, sehingga tidak mempengaruhi keluarnya insulin

(Winarno, 1982). Di samping itu, kelebihan fruktosa adalah memiliki kemanisan 2,5 kali dari glukosa (Lehninger, 1990).

Penentuan gula pereduksi selama ini dilakukan dengan metode pengukuran konvensional seperti metode osmometri, polarimetri, dan refraktometri maupun berdasarkan reaksi gugus fungsional dari senyawa sakarida tersebut (seperti metode Luff-schorl, Seliwanoff, Nelson-somogyi dan lain-lain). Hasil analisisnya adalah kadar gula pereduksi total dan tidak dapat menentukan gula pereduksi secara individual. Untuk menganalisis kadar masing-masing dari gula pereduksi penyusun madu dapat dilakukan dengan menggunakan metode Spektrofotometer UV-VIS.

Penentuan kadar glukosa dan fruktosa dengan Spektrofotometer ini juga harus mempertimbangkan panjang gelombang yang akan digunakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian kadar glukosa dan fruktosa dalam madu yang ada beredar dipasaran dengan menggunakan metode Spektrofotometri Visibel. Sehingga kadar glukosa dan fruktosa dari madu yang beredar dipasaran dapat dibandingkan.

B. Rumusan Masalah

Apakah kadar glukosa dan fruktosa pada madu yang beredar telah memenuhi ketentuan SII?

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis kadar glukosa dan fruktosa pada madu yang beredar dipasaran dengan menggunakan metode spektrofotometri Visibel.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat tentang madu yang telah beredar yang sesuai dengan Standar Industri Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Klasifikasi Lebah*

Lebah madu merupakan serangga yang berperan dalam menghasilkan madu. Serangga ini mengubah nektar yang dihasilkan tanaman menjadi madu. Selanjutnya madu akan disimpan dalam sarang lebah.

Klasifikasi lebah madu adalah sebagai berikut; (Suranto, 2004)

Kingdom : Animalia
Phylum : Arthropoda
Class : Insecta
Ordo : Hymenoptera
Family : Apidae
Genus : Apis
Species : *Apis indica*

Lebah madu adalah serangga sosial yang hidup bergerombol membentuk koloni. Dari 20.000 spesies lebah yang dikenali hanya lebah madu yang menghasilkan madu (Rusfidra, 2006). Famili Apidae merupakan jenis lebah penghasil madu sejati. Yang paling penting sebagai penghasil madu dan lilin adalah lebah madu dari genus Apis (Sarwono, 2001).

B. *Morfologi dan Anatomi Lebah Madu*

a. *Morfologi (Struktur Eksternal)*

Tubuh lebah madu terdiri dari tiga bagian utama, yaitu kepala (caput), dada (thorax) dan perut (abdomen). Seperti halnya insekta lebah

tidak mempunyai kerangka internal tempat otot bertaut, tetapi sebagai penggantinya adalah penutup tubuh eksternal yang mengandung Chitin dan menutupi organ dalam (Suranto, 2004).

b. Anatomi (Struktur Internal)

Anatomi lebah madu dalam hal ini meliputi sistem pencernaan, sistem penginderaan, dan sistem reproduksi. Sistem pencernaan pada lebah madu berturut-turut adalah: mulut, oesofagus, kantong madu, proventriculus, ventriculus, usus halus, usus besar, colon dan rectum. Sistem penginderaan pada lebah madu meliputi indera penglihat, indera pencium, dan indera peraba. Dalam hal sistem reproduksi, organ reproduksi yang berkembang sempurna pada lebah hanya pada lebah jantan dan ratu. Seekor lebah ratu dewasa yang produktif dapat menelurkan 1000-2000 sel telur per hari (Suranto, 2004).

c. Habitat Lebah Madu

Salah satu syarat hidup lebah adalah adanya tanaman. Secara umum lebah bisa hidup di seluruh belahan bumi, kecuali di daerah kutub. Hal ini disebabkan di daerah kutub tidak ada tanaman yang menjadi sumber pakan lebah. Di daerah tropis lebah dapat berkembang biak dengan baik dan produktif sepanjang tahun karena tumbuhan sebagai sumber pakan tersedia terus. Di daerah sub tropis lebah tidak produktif pada musim dingin (Suranto, 2004).

Di alam bebas lebah tinggal di guwa-guwa dalam hutan termasuk ditebing-tebingnya. Di hutan, koloni lebah juga tinggal dipohon-pohon

yang berlubang. Sementara itu, dipeternakan, lebah tinggal didalam kotak (*stup*) yang terbuat dari kayu dan suasananya nyaman untuk ditempati lebah. Lokasi peternakan lebah harus dekat dengan tanaman sumber pakan seperti perkebunan atau hutan. Tujuannya agar produktifits lebih tinggi karena terpenuhinya kebutuhan pakan. Para peternak lebah sering berpindah tempat mengikuti musim berbunga tanaman. Setelah masa berbunga tanaman disuatu daerah selesai, peternak akan pindah kedaerah lain yang tanamannya sedang berbunga (Suranto, 2004).

C. Hasil Lebah

Banyak manfaat yang bisa diambil dari lebah. Selain madu, lebah juga menghasilkan beberapa produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Produk lebah tersebut diantaranya madu, royal jelly, tepung sari (polen), lem lebah (propolis), malam lebah (beeswax), dan racun lebah (beevenom). Disamping itu, lebah juga sangat berguna dalam proses polinasi (penyerbukan) berbagai jenis tanaman. Bahkan, banyak tanaman yang tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri dapat dibantu oleh lebah, sehingga fungsi lebah sangat penting sebagai pelestari tanaman (Suranto, 2004).

D. Jenis madu

Madu dinamai sesuai dengan sumber utama pakan lebahnya. Contohnya, lebah yang hidup di perkebunan kapuk akan menghasilkan madu yang dinamai madu kapuk. Madu yang digembalakan di perkebunan apel akan menghasilkan madu apel. Dengan demikian, beragam nama madu akan banyak dijumpai di pasaran seperti madu rambutan, madu lengkung, madu

mahoni, madu mangga, madu mentimun, dan madu stroberi. Jangan heran jika dikenal juga madu sengon, madu beringin, dan madu meranti (Suranto, 2004).

Madu bisa juga digolongkan menurut jenis tanaman yang menjadi sumber nektarnya. Jika madu dihasilkan oleh lebah yang mengambil makanannya dari beragam sumber dan tidak ada tanaman yang dominan dinamakan multiflora atau poliflora. Contohnya, madu hutan (di Indonesia hutan umumnya bersifat heterogen). Sedangkan, madu yang berasal dari salah satu tanaman dominan disebut dengan madu monoflora. Di beberapa daerah juga terdapat madu biflora yang sumber nektar dominannya berasal dari dua jenis pohon. Lebah memiliki kecenderungan hanya mengambil nektar dari satu jenis tanaman tertentu. Lebah tersebut baru akan mengambil nektar dari tanaman lain jika nektar dari tanaman tertentu tersebut tidak mencukupi (Suranto, 2004).

Selain itu, madu dapat dibedakan menjadi madu flora, madu ekstra flora, dan madu embun (honey dew). Madu flora adalah madu yang bersumber dari nektar yang terdapat dalam bunga. Madu ekstraflora dihasilkan dari sumber tanaman yang tidak memiliki bunga. Madu ekstra flora ini berasal dari cairan yang terdapat dalam daun, cabang atau batang pohon. Madu embun adalah madu yang dibuat dari cairan yang dihasilkan oleh serangga yang terdapat dipohon-pohon (Suranto, 2004).

E. Komposisi dan kandungan madu

Madu mengandung banyak mineral seperti natrium, kalsium, magnesium, aluminium, besi, fosfor, dan kalium. Vitamin-vitamin yang terdapat dalam madu adalah thiamin (B1), riboflavin (B2), asam askorbat (C), piridoksin (B6), niasin, asam pantotenat, biotin, asam folat, dan vitamin K (Suranto, 2004).

Sedangkan enzim yang penting dalam madu adalah enzim diastase, invertase, glukosa oksidase, peroksidase, dan lipase. Enzim diastase adalah enzim yang mengubah karbohidrat kompleks (polisakarida) menjadi karbohidrat yang sederhana (monosakarida). Enzim invertase adalah enzim yang memecah molekul sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Sedangkan enzim oksidase adalah enzim yang membantu oksidasi glukosa menjadi asam peroksida. Enzim peroksidase melakukan proses oksidasi metabolisme. Semua zat tersebut berguna untuk proses metabolisme tubuh (Suranto, 2004).

Nilai kalori madu sangat besar 3.280 kal/kg, nilai kalori 1 kg madu setara dengan 50 butir telur ayam, 5,7 liter susu, 25 buah pisang, 40 buah jeruk, 4 kg kentang, dan 1,68 kg daging. Madu memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi dan rendah lemak. Kandungan gula dalam madu mencapai 80% dan dari gula tersebut 85% berupa fruktosa dan glukosa (Suranto, 2004).

Asam utama yang terdapat dalam madu adalah asam glutamat. Sementara itu, asam organik yang terdapat dalam madu adalah asam asetat, asam butirat, format, suksinat, glikolat, malat, proglutamat, sitrat, dan

piruvat. Dalam madu juga terdapat hormon gonodotropin yang merangsang alat reproduksi lebah ratu dan membantu dalam proses pematangan telur. Komposisi kimia madu dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 1. Komposisi kimia madu per 100 gram (Suranto, 2004)

| No. | Komposisi | Jumlah |
|-----|---------------------|---------------|
| 1. | Kalori | 328 kal |
| 2. | Kadar air | 17,2 g |
| 3. | Protein | 0,5 g |
| 4. | Karbohidrat | 82,4 g |
| 5. | Abu | 0,2 g |
| 6. | Tembaga | 4,4 – 9,2 mg |
| 7. | Fosfor | 1,9 – 6,3 mg |
| 8. | Besi | 0,06 – 1,5 mg |
| 9. | Mangan | 0,02 – 0,4 mg |
| 10. | Magnesium | 1,2 – 3,5 mg |
| 11. | Thiamin | 0,1 mg |
| 12. | Riboflavin | 0,02mg |
| 13. | Niasin | 0,20 mg |
| 14. | Lemak | 0,1 g |
| 15. | pH | 3,9 |
| 16. | Asam total (mek/kg) | 43,1 mg |

F. Manfaat madu

Secara umum madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Banyak penyakit yang dapat disembuhkan dengan madu diantaranya penyakit lambung, radang usus, jantung, dan hipertensi. Selain itu, dalam madu terdapat zat asetil kolin yang dapat melancarkan metabolisme seperti memperlancar peredaran darah dan menurunkan tekanan darah (Suranto, 2004).

Walaupun memiliki pH yang rendah, ternyata madu bisa meningkatkan pH lambung. Hal ini disebabkan madu mengandung mineral yang bersifat alkali dan berfungsi sebagai *buffer*. Semakin gelap warna madu, kandungan mineralnya semakin tinggi sehingga semakin tinggi pula alkalinitasnya (Suranto, 2004).

Madu yang dihasilkan oleh lebah Trigona sangat baik untuk mengobati penyakit asam urat, jantung, asma, dan kadar kolestrol yang tinggi. Madu manuka dari Selandia Baru sangat baik untuk mengobati radang tenggorokan, flu, penyakit infeksi lain, dan demam tinggi. Madu-madu dari Selandia Baru juga sering digunakan bersama sarangnya untuk mengobati asma, obat penyakit pada paru, dan rematik (Suranto, 2004).

Penyakit lain yang dapat diobati dengan madu diantaranya penyakit paru (tuberkulosis), sakit mata, penyakit saraf, tekanan darah rendah, penyakit lever, sakit kepala, impotensi, dan penyakit infeksi saluran kemih. Penyakit luar yang dapat diobati dengan madu adalah luka bakar, bibir pecah-pecah, sariawan, dan penyakit kulit lainnya. Madu juga baik dikonsumsi ibu hamil di antaranya mencegah keracunan kehamilan, menambah daya tahan tubuh, dan baik bagi pertumbuhan anak (Suranto, 2004).

G. Kualitas Madu

Kualitas madu ditentukan oleh cara pemanenan madu, warna madu, cita rasa madu, jenis madu, komposisi madu, dan kadar air. Baik di alam maupun dipternak lebah, waktu pemanenan madu harus diperhatikan (Suranto, 2004).

Cita rasa madu ditentukan oleh zat yang terdapat dalam madu di antaranya glukosa, alkaloid, gula, asam glukonat, dan prolin. Rasa dan aroma madu yang paling enak adalah ketika madu baru dipanen dari sarangnya. Sesudah itu, senyawa-senyawa yang terdapat dalam madu sedikit demi sedikit akan menguap. Hal ini disebabkan senyawa yang terdapat dalam madu bersifat volatil (mudah menguap). Karena itu, untuk menjaga kualitas madu, cara memanen menyimpan madu haruslah diperhatikan (Suranto, 2004).

Warna merupakan salah satu kriteria mutu madu. Warna madu bervariasi dari hitam, coklat gelap hingga putih (transparan). Warna madu dipengaruhi oleh kandungan mineral, jenis tanaman asal, cara pengolahan madu seperti ekstraksi madu dan pemanasan. Warna madu yang putih paling banyak disukai. Karena itu umumnya madu yang berwarna putih harganya jauh lebih mahal dibandingkan dengan madu yang berwarna coklat gelap. Selain itu, semakin gelap warna madu, biasanya aromanya semakin tajam dan keras (Suranto, 2004).

Keasaman madu sangat penting dalam menentukan kualitas madu. Total asam yang terdapat dalam madu dapat memengaruhi kestabilan madu terhadap mikroorganisme. Asam ini juga memengaruhi cita rasa dan aroma madu (Suranto, 2004).

Faktor lain yang menentukan kualitas madu adalah jenis lebah, jenis bunga, iklim, dan musim. Kualitas menentukan harga madu. Madu yang berkualitas tinggi harganya mahal. Harga perkilogramnya bisa mencapai ratusan ribu rupiah, bahkan jutaan rupiah. Selain kualitas, harga madu juga

ditentukan oleh sumber nektarnya. Biasanya, madu yang bersal dari sumber nektar yang sulit dijumpai harganya tinggi. Berikut ini mutu madu yang memenuhi syarat nasional indonesia (Suranto, 2004).

Tabel 2. Syarat mutu madu nasional (Suranto, 2004).

| Komponen | Batas |
|------------------------------|-----------------|
| Kadar air | Maksimum 22 % |
| Abu | Maksimum 0,25 % |
| Kadar dekstrin | Maksimum 0,5 % |
| Keasaman | Maksimum 40 % |
| HMF | Maksimum 40 % |
| Padatan yang tidak larut air | Maksimum 0,5 % |
| Fruktosa dan glukosa | Minimum 60 % |
| Sukrosa | Maksimum 8 % |
| Cita rasa dan aroma | Normal |
| Logam-logam berbahaya | Negatif |

Mengkonsumsi madu alami, apalagi bila madu itu benar-benar murni, alami, memang tidak saja akan memberikan kesegaran dan kesehatan bagi tubuh kita, tetapi juga berkhasiat menjaga kelembaban kulit tubuh. Masih banyak lagi manfaat lain bagi kesehatan, atau yang akan dapat anda peroleh dari madu alami, yang jelas semakin anda mengkonsumsinya, maka anda

semakin sehat. Terlebih juga karena didalam cairan madu alami, tidak ada bakteri yang akan sanggup hidup, apalagi berkembang biak.

Perlu pula diketahui bahwa hemoglobin, adalah terdiri dari zat putih telur, yang mengandung zat besi (ferum) sehingga jika misalnya darah kita kekurangan hemoglobin atau kadar hemoglobin kita menurun, maka kita akan mengalami kekurangan darah. Juga, apabila darah kita mengandung terlalu banyak oksigen maka warna darah kita akan menjadi merah muda sedangkan darah yang sehat, adalah yang mengandung sedikit oksigen, dimana tandatanya darah kita akan menjadi warna tua (sebab, oksigennya telah diikat oleh hemoglobin)

Begitu juga dalam penelitian para ahli, ternyata karbohidrat dalam bentuk gula yang terdapat dalam madu alami, sangat berfungsi sebagaimana umumnya glukosa dimana energi dari glukosanya itu, tidak hanya berguna sekali untuk membantu memperlancar jantung, atau mampu memperbaiki gangguan jantung, tetapi juga dapat meringankan gangguan penyakit hati (lever). Karena glukosa yang terdapat didalam madu alami, ternyata dapat pula menjadi glukosa, yakni gula darah yang sangat berguna untuk membantu kerja hati didalam menyaring racun-racun dari zat yang sering merugikan tubuh.

Zat gula yang terdapat didalam madu alami, yakni levulosa atau fruktosa dan glukosa itu, adalah jelas tidak sama dengan nilai gizi yang terdapat pada gula putih (gula pasir) yang kandungan gulanya adalah disebut

sukrosa. Dimana zat gula frukosa dan glukosa dapat diserap langsung oleh darah, sedangkan zat gula sukrosa harus dicernakan terlebih dahulu, baru dapat diserap oleh darah. Sehingga tak berlebihanlah apabila madu alami sering dianggap sebagai obat kuat, karena disamping kandungan kalornya begitu tinggi, minimumnya langsung dapat memberi / meningkatkan energi. Apabila selain mengandung zat gula dan air, madu alami juga mengandung komponen enzim pencernaan serta tepung sari (pollen).

Enzim pencernaan yang terkandung di dalamnya, jelas sangat penting/bermanfaat, untuk membantu pengelolaan / penguraian zat-zat makanan yang ada di dalam tubuh, terutama agar mudah terserap ke dalam darah.

Adapun unsur-unsur yang membedakan madu alami dengan bahan pemanis lainnya, selain kandungan karbohidrat, juga mineral, asam, protein, vitamin, dan aromanya. Berbagai mineral yang terkandung di dalam madu alami, seperti yang telah disebutkan ialah kalium (potasium), kalsium, ferum (zat besi), garam yodium, natrium, sulfur (belerang), chlorine (klorin), fosfor (phospor), mangan, magnesium dan lain sebagainya.

H. Penetapan gula


Mula-mula sampel dalam bentuk cair dibuat basa dengan penambahan kalsium karbonat (CaCO_3) agar asam-asam yang terdapat dalam sampel tidak menghidrolisa gula yang ada selama pemanasan. Pemanasan sampel diperlukan untuk menginaktivasi enzim-enzim penghidrolisa gula.

Untuk menghilangkan pigmen, senyawa berwarna dan senyawa koloid maka kedalam sampel ditambahkan Pb-asetat basa. Kelebihan Pb-asetat dihilangkan dengan penambahan Na/K-Oksalat.

Jika sampel berbentuk padat maka perlu dilakukan ekstraksi dengan menggunakan alkohol 80% untuk mengekstrak gula yang ada dalam sampel. kebanyakan gula sensitif terhadap alkohol dengan konsentrasi tinggi, oleh karena itu alkohol perlu dihilangkan dengan pemanasan rendah.

Metode Anthrone

Metode ini dapat digunakan untuk semua jenis bahan makanan. Anthrone (9,10-dihydro-9oxsanthracene) merupakan hasil reduksi anthraquinone. Anthrone bereaksi secara spesifik dengan karbohidrat dalam asam sulfat pekat menghasilkan warna biru kehijauan yang khas.



Gambar 1. Rumus struktur Anthrone (9,10-dihydro-9-oxanthracene) (Anton, 2002).

Spektrofotometer


Spektrofotometri merupakan suatu metode analisa kimia yang didasarkan pada pengukuran serapan relatif sinar monokromatis oleh suatu lajur larutan dengan menggunakan prisma atau kisi difraksi sebagai monokromator dan detector fotosel. Dalam spektrofotometri, intensitas sinar

datang yang dipantulkan atau diteruskan oleh medium merupakan fungsi eksponensial dari konsentrasi dan tebal laju larutan yang dilalui sinar. Pernyataan ini dikenal dengan Hukum Lambert Beer. $A = a \cdot b \cdot c$ Dimana $A =$ Absorban $a =$ absorbisity molar $b =$ Tebal laju larutan $c =$ Konsentrasi Spektrofotometri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur % T atau absorban (A) suatu cuplikan sebagai fungsi panjang gelombang. $T = P / P_0$ $A = \log 1 / T$ Pada metode spektrofotometri, sample menyerap radiasi elektromaagnetis yang pada panjang gelombang tertentu dapat terlihat. Dengan metode ini sample dengan konsentrasi yang sudah diketahui di ukur absorbansinya sehingga diperoleh kurva standar padatan versusu absorbansi. Kurva ini digunakan untuk mencari konsentrasi sample yang belum diketahui (Gholib, 2007).

Instrumentasi Spektrofotometer UV-VIS

Spektrofotometer yang sesuai untuk pengukuran di daerah spektrum ultraviolet dan sinar tampak terdiri atas suatu sistem optik dengan kemampuan menghasilkan sinar monokromatis dalam jangkaun panjang gelombang 200-800 nm (Gholib, 2007).

Suatu diagram sederhana spektrofotometer UV-Vis ditunjukkan pada gambar dengan komponen-komponennya meliputi sumber-sumber sinar, monokromator, dan sistem optik.



Gambar 2. Skema kerja Spektrofotometer UV-VIS (Mulja, 1995)

Kerja alat ini adalah sebagai berikut: suatu radiasi dikenakan secara bergantian atau simultan melalui sampel dan blangko yang dapat berupa pelarut atau udara. Sinar yang ditransmisikan oleh sampel dan blangko kemudian diteruskan ke detektor, sehingga perbedaan intensitas ini diantara kedua berkas sinar ini dapat memberikan gambaran tentang fraksi radiasi yang diserap oleh sampel. Detektor alat ini mampu untuk mengubah informasi radiasi ini menjadi sinyal listrik yang jika diampifikasi akan dapat menggerakkan pena pencatat diatas kertas grafik khusus alat ini.

1. Sumber radiasi

Beberapa sumber radiasi yang dipakai pada spektrofotometer adalah lampu deuterium, lampu tungsten, dan lampu merkuri. Sumber-sumber radiasi ultra lembayung yang kebanyakan dipakai adalah

lampu hydrogen dan lampu deuterium (D_2). Disamping itu sebagai sumber radiasi ultra lembayung yang lain adalah lampu xenon. Kejelekannya lampu xenon tidak memberikan radiasi yang stabil seperti lampu deuterium. Lampu deuterium dapat dipakai pada panjang gelombang 180 nm sampai 370 nm (daerah ultra lembayung dekat).

Lampu tungstein merupakan campuran dari filament tungstein gas iodine (halogen), oleh sebab itu sebagai lampu tungstein-iodin pada panjang spektrofotometer sebagai sumber radiasi pada daerah pengukuran sinar tampak dengan rentangan panjang gelombang 380-900 nm.

Lampu merkuri adalah suatu lampu yang mengandung uap merkuri tekanan rendah dan biasanya dipakai untuk mengecek, mengkalibrasi panjang gelombang pada spektrofotometer pada daerah ultra lembayung khususnya daerah disekitar panjang gelombang 365 nm dan sekaligus mengecek resolusi monokromator.

2. Monokromator

Monokromator berfungsi untuk mendapatkan radiasi monokromatis dari sumber radiasi yang memancarkan radiasi polikromatis. Monokromator pada spektrofotometer biasanya terdiri dari susunan meliputi celah (slit) masuk-filter-prisma-kisi(grating)-celah keluar.

a. Celah (slit)

Celah monokromator adalah bagian yang pertama dan terakhir dari suatu sistem optik monokromator pada spektrofotometer. Celah

monokromator berperan penting dalam hal terbentuknya radiasi monokromatis dan resolusi panjang gelombang.

b. Filter optik

Cahaya tampak yang merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 380-780 nm merupakan cahaya putih yang merupakan campuran cahaya dengan berbagai macam panjang gelombang. Filter optik berfungsi untuk menyerap warna komplementer sehingga cahaya tampak yang diteruskan merupakan cahaya yang berwarna sesuai dengan warna filter optik yang dipakai.

Filter optik yang sederhana dan banyak dipakai terdiri dari kaca yang berwarna. Dengan adanya filter optik sebagai bagian monokromator akan dihasilkan pita cahaya yang sangat sempit sehingga kepekaan analisisnya lebih tinggi. Dan lebih dari itu akan didapatkan cahaya hampir monokromatis sehingga akan mengikuti hukum Lambert-Beer pada analisis kuantitatif.

c. Prisma dan Kisi (grating)

Prisma dan kisi merupakan bagian monokromator yang terpenting. Prisma dan kisi pada prinsipnya mendispersi radiasi elektromagnetik sebesar mungkin supaya didapatkan resolusi yang baik dari radiasi polikromatis.

3. Sel / Kuvet

Kuvet atau sel merupakan wadah sampel yang dianalisis. Kuvet ini bentuk biasanya terbuat dari quartz atau leburan silika dan ada yang dari

glas dengan bentuk tabung empat persegi panjang 1x1 cm, dengan tinggi kurang lebih 5 cm. Pada pengukuran di daerah ultra lembayung dipakai quartz atau leburan silika, sedang kuvet dari gelas tidak dipakai, sebab gelas mengabsorpsi sinar ultra lembayung.

4. Detektor

Detektor merupakan salah satu bagian dari spektrofotometer yang penting oleh sebab itu detektor akan menentukan kualitas dari spektrofotometer adalah merubah signal elektronik.

5. Amplifier

Amplifier dibutuhkan pada saat sinyal listrik elektronik yang dilahirkan setelah melewati detektor untuk menguatkan karena penguat dengan resistensi masukan yang tinggi sehingga rangkaian detektor tidak terserap habis yang menyebabkan keluaran yang cukup besar untuk dapat dideteksi oleh suatu alat pengukur (Mulja, 1995).

Aspek kualitatif dan kuantitatif Spektrofotometri UV-Vis

Spektra UV-Vis dapat digunakan untuk informasi kualitatif dan sekaligus dapat digunakan untuk analisis kuantitatif.

1. Aspek kualitatif

Data spektra UV-Vis secara tersendiri tidak dapat digunakan untuk identifikasi kualitatif obat atau metabolitnya. Akan tetapi jika digabung dengan cara lain seperti spektroskopi infra merah, resonansi magnetik, dan spektroskopi massa, maka dapat digunakan untuk maksud identifikasi/analisis kualitatif suatu senyawa tersebut. Data yang diperoleh

dari spektroskopi UV dan Vis adalah panjang gelombang maksimal, intensitas, efek pH, dan pelarut yang kesemuanya itu dapat diperbandingkan dengan data yang sudah dipublikasikan (*publised data*).

2. Aspek kuantitatif

Dalam aspek kuantitatif, suatu berkas radiasi dikenakan pada cuplikan (larutan sampel) dan intensitas sinar radiasi yang diteruskan diukur besarnya. Radiasi yang diserap oleh cuplikan ditentukan dengan membandingkan intensitas sinar yang diteruskan dengan intensitas sinar yang diserap jika tidak ada spesies penyerap lainnya. Intensitas atau kekuatan radiasi cahaya sebanding dengan jumlah foton yang melalui satu satuan luas penampang perdetik. Serapan dapat terjadi jika foton/radiasi yang mengenai cuplikan memiliki energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk menyebabkan terjadinya perubahan tenaga. Kekuatan radiasi juga mengalami penurunan dengan adanya penghamburan dan pemantulan cahaya, akan tetapi penurunan karena hal ini sangat kecil dibandingkan dengan proses penyerapan.

Analisis kuantitatif dengan metode spektrofotometri UV-Vis dapat digolongkan atas tiga macam pelaksanaan pekerjaan, yaitu : (1) analisis zat tunggal atau analisis satu komponen, (2) analisis kuantitatif campuran dua macam zat atau analisis dua komponen; dan (3) analisis kuantitatif campuran tiga macam zat atau lebih (analisis multi komponen).

a. Analisis Komponen Tunggal

Jika absorbansi suatu seri konsentrasi larutan diukur pada panjang gelombang, suhu, kondisi pelarut yang sama, dan absorbansi masing-masing larutan diplotkan terhadap konsentrasinya maka suatu garis lurus akan teramati sesuai dengan persamaan $A = abc$. Grafik ini disebut dengan plot hukum Lambert-Beer dan jika garis yang dihasilkan merupakan suatu garis lurus maka dapat dikatakan bahwa hukum Lambert-Beer dipenuhi pada kisaran konsentrasi yang diamati.

Cara lain untuk menetapkan kadar sampel adalah dengan menggunakan perbandingan absorbansi sampel dengan absorbansi baku, atau dengan menggunakan persamaan regresi linier yang menyatakan hubungan antara konsentrasi baku dengan absorbansinya. Persamaan kurva baku selanjutnya digunakan untuk menghitung kadar dalam sampel.

b. Analisis 2 campuran secara bersama-sama

Bila diinginkan pengukuran 2 buah senyawa secara bersama-sama secara spektrofotometri, maka dapat dilakukan pada 2 panjang gelombang yang mana masing-masing komponen tidak saling mengganggu atau gangguan dari komponen yang lain paling kecil. Dua buah kromofor yang berbeda akan mempunyai kekuatan absorpsi cahaya yang berbeda pula pada satu daerah panjang gelombang. Pengukuran dilakukan pada masing-masing larutan pada 2 panjang gelombang,

sehingga diperoleh dua persamaan hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi pada dua panjang gelombang, akibatnya konsentrasi masing-masing komponen dapat dihitung (Gholib, 2007).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis spektrofotometri UV-Vis

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam analisis dengan spektrofotometri UV-Vis terutama untuk senyawa yang semula tidak berwarna yang akan dianalisis dengan spektrofotometri visibel karena senyawa tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi senyawa yang berwarna. Berikut adalah tahapan-tahapan yang harus diperhatikan:

1. Pembentukan molekul yang dapat menyerap sinar UV-Vis

Hal ini perlu dilakukan jika senyawa yang dianalisis tidak menyerap pada daerah tersebut. Cara yang digunakan adalah dengan merubah menjadi senyawa lain atau direaksikan dengan pereaksi tertentu. Pereaksi yang digunakan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu;

- a. Reaksinya selektif dan sensitif
- b. Reaksinya cepat, kuantitatif, dan reproduibel
- c. Hasil reaksi stabil dalam jangka waktu yang lam

Keselektifan dapat dinaikkan dengan mengatur pH, pemakain *masking agent*, atau penggunaan teknik ekstraksi.

2. Waktu operasional (*operating time*)

Cara ini biasa digunakan untuk pengukuran hasil reaksi atau pembentukan warna. Tujuannya adalah untuk mengetahui waktu pengukuran yang stabil. Waktu operasional ditentukan dengan mengukur hubungan antara waktu pengukuran dengan absorbansi larutan.

3. Pemilihan panjang gelombang

panjang gelombang yang digunakan untuk analisis kuantitatif adalah panjang gelombang yang mempunyai absorbansi maksimal. Untuk memilih panjang gelombang maksimal, dilakukan dengan membuat kurva hubungan antara absorbansi dengan panjang gelombang dari suatu larutan baku pada konsentrasi tersebut.

Ada beberapa alasan mengapa harus menggunakan panjang gelombang maksimal, yaitu:

- a. Pada panjang gelombang maksimal, kepekaanya juga maksimal karena pada panjang gelombang maksimal tersebut, perubahan absorbansi untuk setiap satuan konsentrasi adalah yang paling besar
- b. Disekitar panjang gelombang maksimal, bentuk kurva absorbansi datar dan pada kondisi tersebut hukum Lambert-Beer akan terpenuhi
- c. Jika dilakukan pengukuran ulang maka kesalahan yang disebabkan oleh pemasangan ulang panjang gelombang akan kecil sekali, ketika digunakan panjang gelombang maksimal.

4. Pembuatan kurva baku

Dibuat seri larutan baku dari zat yang akan dianalisis dengan berbagai konsentrasi. Masing-masing absorbansi larutan dengan berbagai konsentrasi diukur, kemudian dibuat kurva yang merupakan hubungan antara absorbansi (y) dengan konsentrasi (x). Bila hukum Lambert-Beer terpenuhi, maka kurva baku berupa garis lurus. Kemiringan atau *slope* adalah *a* (absorptivitas). Kurva baku sebaiknya sering diperiksa ulang.

5. Pembacaan absorbansi sampel atau cuplikan

Absorban yang terbaca pada spektrofotometer hendaknya antara 0,2 sampai 0,8 atau 15 % sampai 70 % jika dibaca sebagai transmitans (Gholib, 2007).

I. Tinjauan Agama tentang Madu

Segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT pasti tak ada yang sia-sia. Di antara ciptaan Sang Khalik yang istimewa adalah lebah. Serangga yang satu ini menempati posisi penting dibanding serangga lainnya. Tak heran jika lebah dijadikan salah satu nama surat dalam Alquran.

Allah berfirman dalam Q.S. al-Nahl/ 16: 68-69 :

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾
ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا ۗ تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ
أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Terjemahnya:

”Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia",kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkannya”.

Allah memerintahkan kepada lebah untuk menemani madu dari sarang-sarangnya pada buhis, pohon, buah, manuasia, dll.

Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam juga ada berpesan agar seseorang itu berobat dengan madu dan al-Qur'an, Baginda bersabda: Maksudnya: "Ambillah / pergunakanlah olehmu sekalian akan dua obat penyembuh yaitu madu dan al-Qur'an." (Hadis riwayat Ibnu Majah)

Didalam hadits tersebut ternyata madu mempunyai keistimewaan yang tersendiri dengan nilai-nilai utama dalam ilmu kesehatan, yang mempunyai zat-zat besi dan vitamin yang kuat. Di samping itu madu juga dianggap penting karena memenuhi keperluan tubuh dan cepat memberi tenaga.

Mereka yang mengetahui akan khasiat madu akan menggunakannya secara rutin, hal ini bukan hanya teori tetapi telah dibuktikan dalam beberapa kajian yang telah dilakukan di mana jika diamalkan setiap hari akan mencegah berbagai macam penyakit dan memberi tenaga yang cukup.

Di samping itu madu juga seringkali digunakan untuk sampingan sarapan pagi agar tenaga segera siap digunakan dalam menjalankan kerja harian. Madu juga memiliki aroma enak yang meningkatkan selera, seperti Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam juga mengamalkannya. Diperkuat dengan hadits baginda yang berbunyi: Maksudnya: "Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Barang siapa yang menjilat madu sebanyak tiga kali pagi pada setiap bulan, maka dia tidak akan terkena cubaan yang besar."

Di samping itu dengan memakan madu juga dapat menyembuhkan batuk-batuk yang mengganggu dan dapat mencegah kekejangan pada otot tubuh khususnya pada bagian kaki. Dalam pengobatan tradisional, madu telah dimanfaatkan untuk menyembuhkan luka-luka terbakar pada kulit. Jika diusapkan madu akan dapat mengurangi rasa sakit yang menyengat dan mencegah pembentukan lepuh (mengelupas) dan cepat sekali menyembuhkan daerah yang terbakar. Di samping itu banyak lagi penyakit yang dapat disembukan misalnya hidung tersumbat, anak yang suka kencing malam (ngompol) dan cocok untuk bayi yang baru lahir.

Dalam al-Qur'an, hadits-hadits yang disebutkan dan amalan pengobatan tradisional, madu mempunyai keistimewaannya tersendiri. Adalah menjadi suatu amalan yang baik menjadikan madu sebagai obat dan mencegah berbagai penyakit serta menjaga kesehatan.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Sa'id bin Zubair dari Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الشِّقَاءُ فِي ثَلَاثِ شُرْبَةِ عَسَلٍ أَوْ شُرْطَةِ مَحْجَمٍ أَوْ كَيْةِ نَارٍ وَ أَنَا أَنهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيْ

Artinya :

"Penyembuhan terjadi dengan tiga cara, yaitu minum madu, berbekam, dan terapi besi panas. Aku melarang ummatku menggunakan besi panas."(Qayyim, 2010)

Rasulullah lebih menyukai madu daripada laksatif dan berbekam daripada penusukan urat darah (akupuntur). Sebagian orang mengatakan bahwa jika bekam tidak ampuh, maka jalan terakhir adalah *kayy*. Rasulullah menyebutkan *kayy* sebagai metode pengobatan ketika resistensi terhadap obat sangat kuat sehingga tidak efektif (Qayyim, 2010)

Madu berasal dari sari bunga dan menjadi obat bagi bermacam-macam penyakit manusia. Sedangkan Alquran mengandung inti sari dari kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi zaman dahulu ditambah dengan ajaran-ajaran yang diperlukan oleh semua bangsa sepanjang masa untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kemukjizatan madu sebagaimana disampaikan Alquran telah terbukti secara ilmiah. Dalam Tafsir Alquran, Sayyid Quthb mengungkapkan, madu sebagai obat penyembuh penyakit sudah dibuktikan secara ilmiah oleh para pakar kedokteran. Inilah salah satu bukti kebenaran ayat Alquran yang harus diyakni umat manusia.

Sedangkan dalam Tafsir Alquran Ibnu Katsir diterangkan bahwa madu lebah itu warnanya bermacam-macam sesuai dengan makanannya. Ada yang berwarna putih, kuning, maupun merah. Selain itu, menurut Ibnu Katsir, madu cocok bagi setiap orang, misalnya untuk mengobati dingin, karena madu itu panas.

Di dunia Islam, penggunaan madu sebagai obat sudah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, madu digunakan untuk mengobati penyakit diare. Lem lebah yang berasal dari madu juga sangat berkhasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit.

Dalam Alquran, madu pun menjadi simbol kenikmatan surga balasan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. ”(Apakah) perumpamaan (penghuni) jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring; dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka.

Madu tampaknya memiliki nilai penyembuhan bagi berbagai penyakit. Dari hasil penelitian tentang minuman alamiah ini, disimpulkan bahwa madu memiliki manfaat yang amat banyak. Madu sangat efektif dan bermanfaat bagi penyembuhan penyakit jantung; ia memiliki kadar gula yang sangat tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan mata. Jika dikonsumsi

secara teratur, orang-orang yang masih mudah dapat terhindar dari penggunaan kacamata dalam beberapa tahun saja. Sari pati dan zat gula yang terkandung di dalam madu mengandung zat penyembuh bagi berbagai macam penyakit. Selain itu, karena tidak akan basi atau busuk jika disimpan dalam waktu lama, madu juga digunakan untuk mempersiapkan dan mengawetkan obat-obatan lainnya. Ia juga berfungsi sebagai zat pengawet. Inilah sebabnya mengapa madu digunakan orang selam berabad-abad lamanya sebagai zat pengganti alkohol (Rahman, 2007).

Sejalan dengan perkembangan dunia yang semakin canggih, dunia pengobatan juga semakin maju dibandingkan dengan cara pengobatan dahulu. Meskipun pengobatan modern terus tumbuh dan berkembang. Namun pengobatan yang sudah tersirat dalam al-Qur'an dan hadits masih tetap mengambil tempat di dalam kehidupan masyarakat Islam.

Menurut Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Sabda Baginda : Maksudnya : "Berobatlah, maka sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali Allah menyediakan baginya obat, kecuali satu penyakit, yaitu tua" (Hadis riwayat Abu Daud)

Beberapa penelitian telah dilakukan terutama kepada bahan dasar alami dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Begitu juga dengan madu lebah karena dalam al-Quran sendiri telah menggariskan berbagai pengajaran dan maklumat penjagaan diri terhadap berbagai macam

penyakit, maupun kesehatan jasad atau rohani agar kita dapat mengerjakan segala perintah Allah dengan teratur.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:153

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman mohonlah pertolongan dengan sabar dan shalat sesungguhnya Allah adalah beserta orang-orang yang sabar”.

Kita sering kali mencari pertolongan ke sana ke mari saat kita ditimpa masalah, namun kita (mungkin hanya saya), malah sering lupa untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT melalui shalat dan sabar. Shalat adalah bukti ketundukan kita kepada Allah SWT, shalat adalah do'a, shalat adalah ibadah yang bukan hanya memuji Allah SWT tetapi juga berisi permintaan-permintaan kita kepada Allah SWT.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Alat dan bahan yang digunakan

1. Alat-alat yang digunakan

Corong kecil, gelas kimia, gelas ukur, labu ukur 25 ml, pipet volume, penangas air, kertas whatman n0. 2, kuvet, spektrofotometer UV-Vis (Shimadzu UV 1601), tabung reaksi (pyrex), timbangan analitik (AND).

2. Bahan-bahan yang digunakan

Anthrone, Asam sulfat, Aquades, natrium oksalat, CaCO_3 , fruktosa, glukosa, Pb-asetat dan sampel madu.

B. Prosedur Kerja

1. Persiapan sampel untuk penetapan gula

Ditimbang sampel madu dengan tepat yang jika dilarutkan dalam air akan memberikan gula pereduksi, digunakan sebanyak 14,5 g sampel dalam 250 ml. Dipindahkan sampel kedalam gelas piala 300 ml, ditambahkan 100-200 ml air dan 1 g CaCO_3 , didihkan selama 30 menit. Selama pendidihan ditambahkan air secukupnya agar volumenya tetap. Di dinginkan larutan kemudian ditambahkan pelan-pelan larutan Pb-asetat jenuh sampai larutan jernih (umumnya dibutuhkan 3-5 ml Pb-asetat). Dinginkan larutan tersebut, kemudian ditambahkan volume larutan sampai tanda tera dengan air, dicampur sampai merata dan disaring melalui kertas saring whatman n0. 2. Kemudian ditambahkan Natrium Oksalat kering

secukupnya (kira-kira 1 g) untuk mengendapkan semua Pb, dicampur sampai merata dan disaring kembali.

2. Pereaksi

Pereaksi Anthrone 0,1 % yang dibuat dengan melarutkan 1 g Anthrone dalam H₂SO₄ pekat hingga volumenya mencapai 50 ml. Dibuat hanya pada waktu hari akan digunakan, tidak stabil, hanya tahan 1 hari.

3. Larutan standar

Untuk larutan Glukosa standar dan fruktosa standar dimana larutan 200 mg glukosa dalam 100 ml aquades diambil 10 ml kemudian diencerkan menjadi 100 ml.

Cara kerja

1. Pembuatan Kurva Standar

Pembuatan kurva standar dilakukan dengan cara dipipet kedalam tabung reaksi 0.0 (blanko), 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 ml larutan glukosa standar. Tambahkan air sampai total volume masing-masing tabung reaksi 1,0 ml. Masing-masing larutan tersebut kemudian ditambah dengan 5 mL pereaksi Anthrone, kemudian ditutup dan dicampur secara merata. Setelah ditempatkan dalam penangas air (*water bath*) 100°C selama 12 menit, dan didinginkan dengan air mengalir, kemudian dilakukan pembacaan absorbansinya pada panjang gelombang maksimum dan dibuat hubungan antara absorbansi dengan mg glukosa.

2. Penetapan Sampel

Penetapan konsentrasi gula total yang terkandung dalam sampel dilakukan pada 1 mL sampel yang telah diencerkan dalam tabung reaksi dengan cara yang sama seperti pada pembuatan kurva standar (Apriantono *et al.*,1989).



BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


Tabel 3. Hasil Penelitian Gula Pereduksi

| No | Madu tak Bermerk | Gula Pereduksi | | Total Gula Pereduksi (%) |
|----|------------------|----------------|--------------|--------------------------|
| | | Glukosa (%) | Fruktosa (%) | |
| 1. | A | 14,4 | 13,3 | 27,7 |
| 2. | B | 15,1 | 5,4 | 20,5 |
| 3. | C | 10,8 | 6,5 | 17,3 |

Absorban



Gambar 3. Gambar perbandingan konsentrasi fruktosa dan absorbans pada panjang gelombang 618 nm



Gambar 4. Gambar perbandingan konsentasi glukosa dan absorbans pada panjang gelombang 628 nm.

B. Pembahasan

Madu merupakan salah satu bahan makanan yang istimewa. Madu tidak sekedar untuk pemanis makanan dan minuman, tetapi lebih dari itu madu dapat digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Bahan makanan yang bersumber dari alam telah lama digunakan oleh masyarakat diseluruh dunia.

Madu umumnya memiliki rasa manis, nilai gizinya tinggi, dan sangat berkhasiat untuk mengobati berbagai penyakit. Setiap orang dapat mengkonsumsi madu, baik ana-anak orang dewasa, dan orang manula. Karena khasiatnya tinggi, banyak bahan makanan atau minuman lain yang

dicampur dengan madu untuk meningkatkan khasiat makanan atau minuman tersebut. Penggunaan madu juga tidak terbatas sebagai bahan pangan, tetapi dapat digunakan untuk tujuan lainnya dan madu juga dapat digunakan sebagai obat tradisional, perawatan tubuh dan kecantikan.

Khasiat dan manfaat madu alami memang begitu banyak di dalam kitab-kitab rahasia pengobatan dari timur, juga banyak sekali menyebutkan tentang fungsi segala kemujarabannya.

Dari hasil-hasil penelitian juga telah banyak menunjukkan bahwa kemampuan madu alami didalam mengatasi anemia, karena selain mengandung asam folat yang diperlukan untuk membentuk kadar eritrosit (sel darah merah) dan hemoglobin, terutama adalah karena benar-benar mampu meningkatkan kadar hemoglobinnya yaitu zat yang berwarna merah yang terdapat didalam sel darah, yang mampu pula mengikat oksigen yang didalam darah yang berlebihan pada dirinya.

Madu merupakan sumber Karbohidrat, dimana kandungan utamanya mencapai 80% gula. Menurut Purbaya (2002) bila kandungan gulanya kurang dari jumlah tersebut, menunjukkan kekurangan mutu atau gizinya.


Telah dilakukan penelitian madu untuk mengetahui kadar glukosa dan fruktosa. Madu yang diteliti yaitu madu yang beredar dipasaran dimana tempat dan merek yang diambil berbeda. Metode anthrone diambil sebagai metode yang cocok untuk menentukan gula. Metode ini dapat digunakan untuk semua jenis bahan makanan, begitupun madu yang akan diteliti.

Menurut Mc. Clement (2003) metode anthrone merupakan salah satu contoh dari metode kolorimetri pada penentuan konsentrasi gula dalam sampel. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan gula pereduksi dan non-reduksi karena kehadiran H_2SO_4 sebagai pengoksidasi yang kuat.

Mula-mula sampel dalam bentuk cair dibuat basa dengan penambahan kalsium karbonat ($CaCO_3$) agar asam-asam yang terdapat dalam sampel tidak menghidrolisa gula yang ada selama pemanasan. Pemanasan sampel diperlukan untuk menginaktivasi enzim-enzim penghidrolisa gula.

Untuk menghilangkan pigmen, senyawa berwarna dan senyawa koloid maka kedalam sampel ditambahkan Pb-asetat basa. Kelebihan Pb-asetat dihilangkan dengan penambahan Na/K-Oksalat.

Reaksi antara glukosa dengan anthrone-asam sulfat merupakan reaksi eksotermis membentuk senyawa berwarna yang akan terjadi dengan baik melalui pemanasan selama 12 menit pada suhu $100^\circ C$. Mekanisme reaksi pembentukan senyawa hydroxy furfural-Anthrone adalah



Gambar 5. Mekanisme Reaksi Anthrone dengan Glukosa

larutan glukosa dengan anthrone-asam sulfat berwarna hijau agak kekuningan, namun setelah dipanaskan berwarna hijau. Hal ini menunjukkan bahwa glukosa telah bereaksi dengan anthrone sehingga dapat dianalisis menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 628 nm dan panjang gelombang 618 nm pada fruktosa. Konsentrasi glukosa dalam sampel memiliki hubungan yang linier dengan absorbansi sampel, begitupun dengan konsentrasi fruktosa pada sampel memiliki hubungan yang linier. Karena itu, kadar glukosa dan fruktosa dalam sampel ditentukan dari kurva kalibrasi.

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh kadar glukosa pada madu A sebesar 14,4%, madu B sebesar 15,1%, dan madu C sebesar 10,8%. Kadar fruktosa pada madu A sebesar 13,3%, madu B sebesar 5,4%, dan pada madu C 6,5%. Syarat mutu madu nasional dimana kandungan gula pereduksi (glukosa dan fruktosa) total adalah minimal 60%. Kadar gula pereduksi total pada madu A adalah sebesar 27,7% pada madu B sebesar 20,5% dan pada madu C sebesar 17,3%.

Hal ini menunjukkan bahwa madu yang diteliti tidak memenuhi syarat standar nasional dimana kandungan gula pereduksi (glukosa dan fruktosa) total adalah minimal 60%. Salah satu alasan madu tidak memenuhi syarat standar industri Indonesia adalah kadar air yang melebihi 25%, kadar HMF (*Hidroxy methyl furfural*) maksimum 4 mg per kg madu, dan tingkat keasaman (pH)-nya maksimal 4,0. Bila kurang atau tidak memenuhi Standar Industri Indonesia tersebut di atas, maka patut diragukan keasliannya. Faktor

lain yang menentukan kualitas madu adalah jenis lebah, jenis bunga, iklim dan musim. Kualitas menentukan harga madu. Madu yang berkualitas tinggi harganya mahal. Selain kualitas, harga madu juga ditentukan oleh sumber nektarnya. Biasanya, madu yang berasal dari sumber nektar yang sulit dijumpai harganya tinggi.

Beberapa kajian telah diusahakan yang tertumpu kepada bahan-bahan daripada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Begitu juga dengan madu lebah karena dalam al-Quran sendiri telah menggariskan berbagai pengajaran dan maklumat penjagaan diri daripada berbagai penyakit, maupun kesehatan jasad atau rohani agar kita dapat mengerjakan segala perintah Allah dengan teratur.

Firman Allah dalam surah an-Nahl: "Kemudian makanlah daripada setiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Daripada perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang memikirkan.

Rasulullah SAW, bersabda:

"Ambillah / pergunakanlah olehmu sekalian akan dua obat penyembuh yaitu madu dan al-Qur'an." (Hadis riwayat Ibnu Majah). Dari hadis tersebut ternyata madu mempunyai keistimewaan yang tersendiri dengan nilai-nilai utama dalam ilmu kesehatan, yang mempunyai zat-zat besi

dan vitamin yang kuat. Di samping itu madu juga dianggap penting kerana memenuhi keperluan tubuh dan cepat memberi tenaga.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kadar glukosa pada madu A sebesar 14,4% pada madu B sebesar 15,1% dan pada madu C sebesar 10,8%. Kadar fruktosa pada madu A sebesar 13,3% pada madu B sebesar 5,4% dan pada madu C 6,5%. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing sampel yang diteliti tidak memiliki kadar Glukosa dan Fruktosa yang sesuai dengan syarat Mutu Madu Nasional dimana kandungan gula pereduksi (glukosa dan fruktosa) total adalah minimal 60%. Kadar gula pereduksi total pada madu A adalah sebesar 27,7% pada madu B sebesar 20,5% dan pada madu C sebesar 17,3%.
2. Madu memiliki manfaat yang amat banyak. Madu sangat efektif untuk menyembuhkan berbagai penyakit salah satunya yaitu penyakit jantung. Seperti dalam hadist disebutkan bahwa penyembuhan penyakit dapat dilakukan dengan tiga cara, salah satunya dengan meminum madu.

B. Saran

1. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan agar bisa melanjutkan penelitian lebih lanjut dengan mengetahui kadar keseluruhan madu.
2. Masyarakat sebaiknya mengkaji lebih lanjut tentang pentingnya mengkonsumsi madu untuk mengatasi berbagai penyakit. Seperti yang dilakukan Rasulullah dahulu.

DAFTAR PUSTAKA


Al-Qur'an

- Apriyantono, A. 1989. *Analisis Pangan*. Bogor. Departemen Pendidikan Tinggi Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi IPB.
- Day, R. A. dan A. L. Underwood, 1993, *Quantitative Analysis*, Sixth Edition, Prantice-Hall of India Private Limited, New Delhi.
- Gholib, Ibnu, 2007, *Pengantar Kimia Farmasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jarvis M. D. D. C., 1995, *Pengobatan Tradisional Dengan Madu dan Apel / Folk Medicine*, Pionir Jaya, Bandung.
- Lehninger, A. L., 1990, *Dasar-dasar Biokimia*, Jilid I, a.b. M. T. Awidjaja, Erlangga, Jakarta.
- Mc. Clement, D.J. 2003. *Analysis of Food Product*. Cambridge: Woodhead Publishing.
- Mulja, M, 1995, *Aplikasi Analisis Spektrofotometri Ultraviolet-Visibel*, Penerbit Mechipso grafika. Surabaya.
- Murtidjo, B. A. , 1991, *Memelihara Lebah Madu*, Kanisius, Yogyakarta.
- Purbaya, J. R. ,2002, *Mengenal dan Memanfaatkan Khasiat Madu Alami*, Pionir Jaya, Bandung.
- Pranggono, bambang, Dini Handayan. 2008. *Percikan Sains dalam alquran: Menggali Inspirasi ilmiah*. Niaga Swadaya. Bandung.
- Qayyim, Ibnu, 2010, *Praktek Kedokteran Nabi*, Hikam Pustaka, Yogyakarta.
- Rahman , Afzal, 2007, *Ensiklopedia ilmu dalam Al-Quran: rujukan terlengkap isyarat-isyarat ilmiah dalam alquran*, Mizan Pustaka. Bandung.
- Sarwono, B. , 2001, *Kiat Mengatasi Permasalahan Praktis Lebah Madu*, Agromedia Pustaka, Tangerang.
- Sujatmaka, 1988, *Menghasilkan Madu Berkualitas Tinggi*, Trubus. Jakarta.
- Suranto, A. , 2004, *Khasiat dan Manfaat Madu Herbal*, Agromedia Pustaka, Tangerang.
- Winarno, F. G. , 1982, *Madu Teknologi, Khasiat dan Analisa*, Ghalia Indonesia, Bogor

LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja

1. Persiapan Sampel



Lampiran 2

2. Penetapan Sampel



Lampiran 3

Perhitungan

Tabel 6. Hasil Perhitungan Persamaan Garis Regresi Linear dari Fruktosa.

| X | Y | XY | X ² | Y ² |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 20 | 0,2145 | 4,29 | 400 | 0,0460 |
| 40 | 0,3917 | 15,668 | 1600 | 0,1534 |
| 60 | 0,4797 | 28,782 | 3600 | 0,2301 |
| 80 | 0,5933 | 47,464 | 6400 | 0,3520 |
| 100 | 0,7000 | 70 | 10000 | 0,49 |
| $\Sigma X = 300$ $(\Sigma X)^2 =$ 90.000 | $\Sigma Y =$ 2,3792 | $\Sigma XY =$ 166,204 | $\Sigma X^2 =$ 22.000 | $\Sigma Y^2 = 1,2715$ |

Persamaan garis regresi adalah $Y = a + bX$

Dimana Y = Serapan, X = Konsentrasi (ppm)

Berdasarkan rumus :

Persamaan garis regresi adalah $Y = a + bX$

Dimana Y = Serapan, X = Konsentrasi (ppm)

Berdasarkan rumus :

$$a = \frac{(\Sigma Y)(\Sigma X^2) - (\Sigma X)(\Sigma XY)}{(n)(\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2}$$
$$= \frac{(2,3792)(22.000) - (300)(166,204)}{(5)(22.000) - (90.000)}$$

$$= \frac{52342,4 - 49861,2}{110.000 - 90.000}$$

$$= \frac{2481,2}{20.000}$$

$$= 0,1241$$

$$b = \frac{(n)(\Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{(n)(\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2}$$

$$= \frac{(5)(166,204) - (300)(2,3792)}{(5)(22.000) - (90.000)}$$

$$= \frac{831,02 - 713,76}{20.000}$$

$$= 0,0059$$

Perhitungan Koefisien Korelasi (R)

Rumus :

$$R = \frac{(n)(\Sigma XY) - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{[(n)(\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2][(n)(\Sigma Y^2) - (\Sigma Y)^2]}}$$

$$R = \frac{(5)(166,204) - (300)(2,3792)}{\sqrt{[(5)(22.000) - (90.000)][(5)(1,2715) - (2,3792)^2]}}$$

$$R = \frac{831,02 - 713,76}{\sqrt{13940}}$$

$$= \frac{117,26}{118,07}$$

$$= 0,9931$$

Maka diperoleh :

$$a = 0,1241$$

$$b = 0,0059$$

Sehingga persamaan regresinya adalah $Y = 0,1241 + 0,0059 X$

Untuk Sampel A = 14,6202 g

$$Y = 0,4301$$

Volume sampel = 250 ml

F.P = 150 kali

$$\text{Maka} = \frac{y - 0,1241}{0,0059}$$

$$= \frac{0,4301 - 0,1241}{0,0059}$$

$$= \frac{0,306}{0,0059}$$

$$= 51,864 \text{ ppm}$$

$$= 51,864 \text{ mg/L}$$

$$= 51,864 \text{ mg}/1000 \text{ ml}$$

$$= 51,864 \times 10^{-3} \text{ mg/ml}$$

Sehingga

$$\text{kadar} = \frac{\text{konsentrasi} \left(\frac{\text{ml}}{\text{ml}}\right) \times \text{vol. sampel} \times F_p}{\text{Berat sampel}}$$

$$= \frac{51,864 \times 10^{-3} \text{ mg/ml} \times 250 \text{ ml} \times 150}{14,6202 \text{ g}}$$

$$= \frac{1944,9 \text{ mg}}{14,6202 \text{ g}}$$

$$= 133,028 \frac{\text{mg}}{\text{ml}}$$

$$= 13,30\%$$

Untuk sampel b = 14,9926

$$Y = 0,2526$$

Vol. Sampel = 250 ml

F.p = 150 kali

$$\begin{aligned}
\text{maka } X &= \frac{y - 0,1241}{0,0059} \\
&= \frac{0,2526 - 0,1241}{0,0059} \\
&= \frac{0,1285}{0,0059} \\
&= 21,779 \text{ ppm} \\
&= 21,779 \text{ mg/L} \\
&= 21,779 \text{ mg/100ml} \\
&= 21,779 \times 10^{-3} \text{ mg/ml}
\end{aligned}$$

Sehingga

$$\begin{aligned}
\text{kadar} &= \frac{21,779 \times 10^{-3} \text{ mg/ml} \times 250 \text{ ml} \times 150}{14,9926} \\
&= \frac{816,7125 \text{ mg}}{14,9926 \text{ g}} \\
&= 54,474 \text{ mg/ml} \\
&= 54474 \text{ mg/ml} \\
&= 5,4474 \%
\end{aligned}$$

Untuk sampel C

Berat sampel = 14,7010

$$Y = 0,2729$$

Vol sampel = 250 ml

F.p = 150 kali

$$\begin{aligned}
\text{maka} &= \frac{y - 0,1241}{0,0059} \\
&= \frac{0,2729 - 0,1241}{0,0059}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{0,1506}{0,0059} \\
 &= 25,525 \text{ ppm} \\
 &= 25,525 \times 10^{-3} \text{ mg/ml}
 \end{aligned}$$

sehingga

$$\begin{aligned}
 \text{kadar} &= \frac{25,525 \times 10^{-3} \text{ mg/ml} \times 250 \text{ ml} \times 150}{14,7010 \text{ g}} \\
 &= \frac{95,1875 \text{ mg}}{14,7010} \\
 &= 65,110 \text{ mg/ml} \\
 &= 65,110 \text{ mg/g} \\
 &= 6,511 \%
 \end{aligned}$$

Tabel 7. Hasil Perhitungan Persamaan Garis Regresi Linear dari Glukosa.

| X | Y | XY | X ² | Y ² |
|--|-----------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| 20 | 0,2355 | 4,71 | 400 | 0,0554 |
| 40 | 0,3739 | 14,956 | 1600 | 0,13980 |
| 60 | 0,5131 | 230,786 | 3600 | 0,26327 |
| 80 | 0,7244 | 57,952 | 6400 | 0,52475 |
| 100 | 0,8131 | 81,31 | 10000 | 0,66113 |
| ΣX = 300 (ΣX) ² = 90.000 | ΣY = 2,66 | ΣXY = 189,714 | ΣX ² = 22.000 | ΣY ² = 1,64435 |

Persamaan garis regresi adalah $Y = a + bX$

Dimana Y = Serapan, X = Konsentrasi (ppm)

Berdasarkan rumus :

Persamaan garis regresi adalah $Y = a + bX$

Dimana Y = Serapan, X = Konsentrasi (ppm)

Berdasarkan rumus :

$$\begin{aligned} a &= \frac{(\Sigma Y)(\Sigma X^2) - (\Sigma X)(\Sigma XY)}{(n)(\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2} \\ &= \frac{(2,66)(22.000) - (300)(189,714)}{(5)(22.000) - (90.000)} \\ &= \frac{58520 - 56914,2}{110.000 - 90.000} \\ &= \frac{1605,8}{20.000} \\ &= 0,08029 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b &= \frac{(5)(189,714) - (300)(2,66)}{(5)(22.000) - (90.000)} \\ &= \frac{948,57 - 798}{20.000} \\ &= \frac{150,57}{20.000} \\ &= 0,00752 \end{aligned}$$

Perhitungan koefisien korelasi (R)

Rumus

$$\begin{aligned} R &= \frac{(n)(\Sigma xy) - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{[(n)(\Sigma x^2) - (\Sigma x)^2][(n)(\Sigma y^2) - (\Sigma y)^2]}} \\ R &= \frac{(5)(189,714) - (300)(2,66)}{\sqrt{[(5)(22.000) - (90.000)][(5)(1,64435) - (2,66)^2]}} \\ R &= \frac{948,57 - 798}{\sqrt{22923}} \\ &= \frac{150,57}{\sqrt{22923}} \end{aligned}$$

$$= \frac{150,57}{151,403}$$

$$= 0,994$$

Untuk Sampel A = 14,6202 g
Y = 0,5022

Volume sampel = 250 ml

F.P = 150 kali

$$\text{Maka} = \frac{y - 0,08029}{0,00752}$$

$$= \frac{0,5022 - 0,08029}{0,00752}$$

$$= \frac{0,42191}{0,00752}$$

$$= 56,105 \text{ ppm}$$

$$= 56,105 \text{ mg/L}$$

$$= 56,105 \text{ mg/1000 ml}$$

$$= 56,105 \times 10^{-3} \text{ mg/ml}$$

Sehingga

$$\text{kadar} = \frac{\text{konsentrasi} \left(\frac{\text{ml}}{\text{ml}} \right) \times \text{vol. sampel} \times \text{Fp}}{\text{Berat sampel}}$$

$$= \frac{56,105 \times 10^{-3} \text{ mg/ml} \times 250 \text{ ml} \times 150}{14,6202 \text{ g}}$$

$$= \frac{2103,93 \text{ mg}}{14,6202 \text{ g}}$$

$$= 143,906 \frac{\text{mg}}{\text{ml}}$$

$$= 14,390\%$$

Untuk sampel b = 14,9926

Y = 0,5338

Vol. sampel = 250 ml

F.p = 150 kali

$$\begin{aligned}
\text{maka } X &= \frac{y - 0,1241}{0,0059} \\
&= \frac{0,5338 - 0,08029}{0,00752} \\
&= \frac{0,45351}{0,00752} \\
&= 60,307 \text{ ppm} \\
&= 60,307 \text{ mg/L} \\
&= 60,307 \text{ mg/100ml} \\
&= 60,307 \times 10^{-3} \text{ mg/ml}
\end{aligned}$$

Sehingga

$$\begin{aligned}
\text{kadar} &= \frac{60,307 \times 10^{-3} \text{ mg/ml} \times 250 \text{ ml} \times 150}{14,9926} \\
&= \frac{2261,51 \text{ mg}}{14,9926 \text{ g}} \\
&= 150,84 \text{ mg/ml} \\
&= 150,84 \text{ mg/ml} \\
&= 150,84 \%
\end{aligned}$$

Untuk sampel C

Berat sampel = 14,7010

$$Y = 0,3106$$

Vol sampel = 250 ml

$$F.p = 150 \text{ kali}$$

Maka

$$x = \frac{y - 0,08029}{0,00752}$$

$$= \frac{0,3106 - 0,08029}{0,00752}$$

$$= \frac{0,23031}{0,00752}$$

$$= 30,626 \text{ ppm}$$

$$= 30,626 \times 10^{-3} \text{ mg/ml}$$

sehingga


$$\text{kadar} = \frac{30,626 \times 10^{-3} \text{ mg/ml} \times 250 \text{ ml} \times 150}{14,7010 \text{ g}}$$

$$= \frac{1148,47 \text{ mg}}{14,7010 \text{ g}}$$


$$= 107,32 \text{ mg/ml}$$

$$= 10,732 \%$$

Lampiran 5



Gambar 6. Gambar hasil Spektrofotometer panjang gelombang Glukosa



Gambar 7. Gambar hasil Spektrofotometer panjang gelombang Fruktosa

Lampiran 6



Gambar 8. Pemanasan sampel



Gambar 9. Penyaringan Pb-asetat

Lampiran 8





Gambar 10. Ditambah Na. Oksalat

Lampiran 9



Gambar 11. Larutan glukosa dan fruktosa + pereaksi Anthrone




Gambar 12. Penetapan sampel

Lampiran 10



Gambar 13. Spektro UV-Vis



Gambar 14. komputer

DAFTAR RIWAYAT PENULIS



Sartika dilahirkan di Sidera, Kabupaten Donggala, Kota Palu pada tanggal 22 Agustus 1989, merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Anak dari pasangan suami istri Aziz dan Hj. Naima.

Pendidikan formal yang telah dilalui penulis yakni Sekolah Dasar di SD Inpres Sidera Palu pada tahun 1994-2001. Dan setelah lulus dari pendidikan dasar penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate'ne Pangkep pada tahun 2001-2004 dan setelah 3 tahun mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertama penulis kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah Atasnya di Pesantren Modern Putri IMMIM Minasate'ne Pangkep, setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang diberi julukan "Kampus Hijau", penulis mengambil jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan.