

**Hubungan Berat Badan Lahir Bayi dengan Tingkat Ruptur
Perineum pada Ibu dengan Persalinan Normal di Rumah
Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Oleh:

MAKASSAR

N A S R I A H

70300107055

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

2011

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat dan dibantu oleh orang lain secara keseluruhan atau sebahagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal karena hukum.



Makassar, 2011

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

NASRIAH
NIM : 70300107055

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufiq hidayah dan Inayah-Nya sehingga proposal dengan judul :

“Hubungan Berat Badan Lahir Bayi Terhadap Kejadian Ruptur Perineum pada Ibu dengan Persalinan Normal di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar “ dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh ujian akhir pada pendidikan Strata satu (S1), Jurusan ilmu keperawatan Fakultas kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Melalui tulisan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus, teristimewa untuk kedua orang tua tercinta ayahanda Baharuddin dan ibunda Hj. Madiana yang dengan ketulusan hati merawat, mendidik, membesarkan dan menyekolahkan penulis sampai ke perguruan tinggi. Begitu pula kepada kakak Ardinas dan Ramdan yang selalu memotivasi dan turut membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi.

Dengan segala kerendahan hati, melalui kesempatan ini Kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Prof. DR. H. A. Qadir Gassing, HT, MS, selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Drs. H. Ahmad, M Sewang, M. A selaku PLT Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Nur Hidayah S. Kep, Ns, M. Kes, selaku ketua prodi Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan serta sebagai Ibu yang selalu memberikan motivasi dan pengetahuan yang luas kepada kami anak didiknya.
4. Risnah, SKM, S.Kep, Ns.,M.Kes dan Hj. St. Suriah Zen, S.Kep.,Ns, M.Kes, masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang dengan teliti memberikan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Samiang Katu, M. Ag dan Hj. Andi Asriany, SKM, M. Kes selaku Penguji I dan II yang telah memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Pengelola dan staf Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar yang telah membantu peneliti dalam pengambilan data dalam penelitian.
7. Spesial buat kanda Ar-Noer dan Blacky yang selalu memotivasi dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Buat sahabatku Anhy, Uly, Nenny, yang selalu memotivasi penulis, tetaplah jadi sahabat terbaikku.
9. Buat serumahku Cunny, Ipa, K' Milda, Inna yang selalu membantu dan menemani dalam suka dan duka. Aku sayang kalian.
10. Buat teman – teman keperawatan, Cia, Intan, Qiah, Badaria, Santoso, Rusdi, Zul dan lain – lainnya yang turut membantu


11. Buat teman – teman KKN Arateng Tetta Soka, Bunda Waty, Mamiku Anna, Abang Yuos, Saudaraku Nela, Amel, Bunga, Ammar, Paman Sule, Kakek Arfah

Penulis menyadari masih sangat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam Skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran untuk kesempurnaan Skripsi ini sangat diharapkan.

Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, baik itu bagi Penulis pribadi, Dunia Keperawatan, Dunia Pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Amiin...

Wabillahitaufiq walhidayah wassalamu”alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 15 Agustus 2011



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
NASRIAH

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufiq hidayah dan Inayah-Nya sehingga proposal dengan judul :

“Hubungan Berat Badan Lahir Bayi Terhadap Kejadian Ruptur Perineum pada Ibu dengan Persalinan Normal di RSIA St. Fatimah Makassar “ dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh ujian akhir pada pendidikan Strata satu (S1), Jurusan ilmu keperawatan Fakultas kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Melalui tulisan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus, teristimewa untuk kedua orang tua tercinta ayahanda Baharuddin dan ibunda Hj. Madiana yang dengan ketulusan hati merawat, mendidik, membesarkan dan menyekolahkan penulis sampai ke perguruan tinggi. Begitu pula kepada kakak Ardinas dan Ramdan yang selalu memotivasi dan turut membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi.

Dengan segala kerendahan hati, melalui kesempatan ini Kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Prof. DR. H. Qadir Gassing, MA, selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Nur Hidayah S. Kep, Ns, M. Kes, selaku ketua prodi Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan serta sebagai Ibu yang selalu memberikan motivasi dan pengetahuan yang luas kepada kami anak didiknya.
3. Risnah, SKM, S.Kep, Ns., M.Kes dan Hj. St. Suriah Zen, S.Kep., Ns, M.Kes, masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang dengan teliti memberikan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. H. Samiang Katu, M. Ag dan Hj. Andi Asriany, SKM, M.Kes selaku Penguji I dan II yang telah memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
5. Pengelola dan staf RSIA Siti Fatimah Makassar yang telah membantu peneliti dalam pengambilan data dalam penelitian.
6. Spesial buat kanda Ar-Noer dan Blacky yang selalu memotivasi dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Buat sahabatku Anhy, Uly, Nenny, yang selalu memotivasi penulis, tetaplah jadi sahabat terbaikku.
8. Buat serumahku Cunny, Ipa, K' Milda, Inna yang selalu membantu dan menemani dalam suka dan duka. Aku sayang kalian.
9. Buat teman – teman keperawatan, Cia, Intan, Qiah, Badaria, Santoso, Rusdi, Zul dan lain – lainnya yang turut membantu

10. Buat teman – teman KKN Arateng Tetta Soka, Bunda Waty, Mamiku Anna, Abang Yuos, Saudaraku Nela, Amel, Bunga, Ammar, Paman Sule, Kakek Arfah

Penulis menyadari masih sangat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam Skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran untuk kesempurnaan Skripsi ini sangat diharapkan.

Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, baik itu bagi Penulis pribadi, Dunia Keperawatan, Dunia Pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Amiin...

Wabillahitaufiq walhidayah wassalamu”alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 15 Agustus 2011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Ruptur Perineum	8
B. Tinjauan Umum Tentang Berat Badan Lahir	30
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Kerangka Konseptual Penelitian	37
B. Kerangka Kerja penelitian	38
C. Defenisi Operasional	39
D. Hipotesis Penelitian	40

BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Populasi dan Sampel	41
C. Teknik Pengambilan Sampel	42
D. Pengumpulan Data	44
E. Pengolahan dan Analisis Data	44
F. Etika Penelitian	45
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	46
B. Pembahasan	52
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian	38
Gambar 3.2 Kerangka Kerja Penelitian	39



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
5. 1 Distribusi dan Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan di RSIA Siti Fatimah Makassar	47
5. 2 Distribusi dan Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan di RSIA Siti Fatimah Makassar	47
5. 3 Distribusi dan Frekuensi Responden Berdasarkan Agama di RSIA Siti Fatimah Makassar	48
5. 4 Distribusi dan Frekuensi Responden Berdasarkan Umur di RSIA Siti Fatimah Makassar	48
5. 5 Distribusi dan Frekuensi Responden Berdasarkan Paritas di RSIA Siti Fatimah Makassar	49
5. 6 Distribusi dan Frekuensi Responden Berdasarkan Berat Badan Lahir Bayi di RSIA Siti Fatimah Makassar	50
5. 7 Distribusi dan Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Ruptur Perineum di RSIA Siti Fatimah Makassar	50
5. 8 Hubungan Berat Badan Lahir Bayi dengan Tingkat Ruptur Perineum di RSIA Siti Fatimah Makassar	52

ABSTRAK

NAMA : NASRIAH

NIM : 70300107055

JURUSAN : S1 KEPERAWATAN

JUDUL : HUBUNGAN ANTARA BERAT BADAN LAHIR BAYI TERHADAP KEJADIAN RUPTUR PERINEUM PADA IBU DENGAN PERSALINAN NORMAL DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SITI FATIMAH MAKASSAR

Berat badan lahir adalah berat badan bayi yang ditimbang 24 jam pertama setelah kelahiran. Semakin besar bayi yang dilahirkan meningkatkan resiko terjadinya ruptur perineum pada normalnya berat badan bayi sekitar 2.500-3.800 gram. Ruptur perineum adalah luka pada perineum yang diakibatkan oleh rusaknya jaringan secara alamiah karena proses desakan kepala janin atau bahu pada saat proses persalinan. Bentuk ruptur biasanya tidak teratur sehingga jaringan yang robek sulit dilakukan penjahitan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan berat badan lahir bayi terhadap tingkat ruptur perineum pada ibu dengan persalinan normal di Rumah Sakit Ibu dan Anak St. Fatimah Makassar.

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitik dengan jenis penelitian kuantitatif studi korelasional yaitu mengkaji pengaruh antara variabel secara *retrospektif* yaitu melakukan penelitian terhadap data yang terjadi pada waktu lampau. Jumlah sampel sebanyak 150 responden dengan melihat status rekam medik responden. Analisis data multivariat dengan menggunakan uji chi square dengan nilai kemaknaan 0,05.

Berdasarkan hasil uji statistik dapat diinterpretasikan bahwa 150 responden diperoleh nilai $p = 0,000$ lebih kecil dari nilai $p = 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima berarti ada hubungan antara berat badan lahir bayi terhadap kejadian ruptur perineum.

Berdasarkan hasil penelitian maka petugas kesehatan perlu meningkatkan penyuluhan terhadap ibu hamil tentang faktor-faktor yang mempengaruhi berat badan lahir bayi sehingga dapat mengurangi kejadian ruptur perineum dan tingkat ruptur perineum dapat diminimalkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia membuat rencana strategi nasional Making Pregnancy Safer (MPS) untuk tahun 2001 - 2010, dalam konteks rencana pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 adalah dengan visi 'Kehamilan dan Persalinan di Indonesia Berlangsung Aman, serta yang Dilahirkan Hidup dan Sehat,' dengan misinya adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian maternal dan neonatal melalui pemantapan sistem kesehatan. (Saifuddin, 2002).

Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang berkualitas dibutuhkan tenaga kesehatan terampil yang didukung tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Pemerintah juga telah menetapkan Asuhan Persalinan Normal (APN) pada petugas pelaksana asuhan kebidanan dan keperawatan yang dicanangkan dalam kerja kolaborasi Depkes RI, POGI, IBI, JNPKKR, atas dukungan JHPIEGO Corporation. Fokus utama APN adalah mencegah terjadinya komplikasi seperti perdarahan post partum yang disebabkan oleh ruptur perineum. (JNPKKR, 2007).

Perdarahan postpartum menjadi penyebab utama 40% kematian ibu di Indonesia. Perlukaan jalan lahir merupakan penyebab kedua terjadinya perdarahan post partum setelah atonia uteri. Ruptur perineum terjadi pada

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tinjauan Umum tentang Ruptur Perineum*

1. Definisi

Ruptur adalah robekan atau koyaknya jaringan secara paksa sedangkan perineum adalah bagian yang terletak antara vulva dan anus panjangnya rata-rata 4 cm. Jadi ruptur perineum adalah robekan pada jaringan yang terletak antara vulva dan anus yang terjadi pada saat persalinan. (Sarwono Prawirohardjo, 2007)

Ruptur perineum adalah luka pada perineum yang diakibatkan oleh rusaknya jaringan secara alamiah karena proses desakan kepala janin atau bahu pada saat proses persalinan. Bentuk ruptur biasanya tidak teratur sehingga jaringan yang robek sulit dilakukan penjahitan. (Hamilton, 2002).


Ruptur perineum adalah luka pada perineum yang terjadi karena sebab-sebab tertentu tanpa dilakukan tindakan perobekan disengaja. Luka ini terjadi pada saat kelahiran dan biasanya tidak teratur. (Sarwono Prawirohardjo, 2006)

Perlukaan pada alat genitalia dapat ditimbulkan oleh beberapa macam sebab antara lain perlukaan akibat persalinan, perlukaan akibat koitus, perlukaan akibat pembedahan ginekologik dan lain-lain. Perlukaan

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan:

□ : Variabel Independent
○ : Variabel Dependent

Gambar 3.1 Kerangka konseptual pengaruh berat badan lahir bayi terhadap kejadian ruptur perineum pada ibu dengan persalinan normal di rumah sakit ibu dan anak St. Fatimah Makassar

Dari gambar 3.1 dapat dijelaskan bahwa berat badan lahir terbagi menjadi tiga, yaitu berat badan lahir rendah, berat badan lahir normal dan berat badan lahir bayi makrosomia. Menurut teori dijelaskan bahwa kepala janin besar dan janin besar dapat menyebabkan terjadinya ruptur perineum yang lebih besar pada ibu bersalin normal. Berdasarkan konsep tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti kedua variable tersebut.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Desain yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitik dengan jenis penelitian kuantitatif studi korelasional, mengkaji pengaruh antara variabel secara *retrospektif* yaitu melakukan penelitian terhadap data yang terjadi pada waktu lampau (Nursalam, 2008).

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari suatu variabel yang menyangkut masalah yang diteliti (Nursalam, Pariani, 2002).

Dalam penelitian ini populasinya adalah semua ibu bersalin di rumah sakit ibu dan anak St. Fatimah Makassar. Jumlah populasi yang didapatkan setelah pengambilan data awal yaitu sebesar 1519 ibu bersalin yang mengalami ruptur perineum.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Nursalam, Pariani, 2002).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Ruptur Perineum	8
B. Tinjauan Umum Tentang Berat Badan Lahir	30
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Kerangka Konseptual Penelitian	37
B. Kerangka Kerja penelitian	38
C. Defenisi Operasional	39
D. Hipotesis Penelitian	40

BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Populasi dan Sampel	41
C. Teknik Pengambilan Sampel	42
D. Pengumpulan Data	44
E. Pengolahan dan Analisis Data	44
F. Etika Penelitian	45
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	46
B. Pembahasan	52
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian	38
Gambar 3.2 Kerangka Kerja Penelitian	39



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
5. 1 Distribusi dan Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan di RSIA Siti Fatimah Makassar	47
5. 2 Distribusi dan Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan di RSIA Siti Fatimah Makassar	47
5. 3 Distribusi dan Frekuensi Responden Berdasarkan Agama di RSIA Siti Fatimah Makassar	48
5. 4 Distribusi dan Frekuensi Responden Berdasarkan Umur di RSIA Siti Fatimah Makassar	48
5. 5 Distribusi dan Frekuensi Responden Berdasarkan Paritas di RSIA Siti Fatimah Makassar	49
5. 6 Distribusi dan Frekuensi Responden Berdasarkan Berat Badan Lahir Bayi di RSIA Siti Fatimah Makassar	50
5. 7 Distribusi dan Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Ruptur Perineum di RSIA Siti Fatimah Makassar	50
5. 8 Hubungan Berat Badan Lahir Bayi dengan Tingkat Ruptur Perineum di RSIA Siti Fatimah Makassar	52

ABSTRAK

NAMA : NASRIAH

NIM : 70300107055

JURUSAN : S1 KEPERAWATAN

JUDUL : HUBUNGAN BERAT BADAN LAHIR BAYI TERHADAP KEJADIAN RUPTUR PERINEUM PADA IBU DENGAN PERSALINAN NORMAL DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SITI FATIMAH MAKASSAR

Skripsi ini mengangkat pokok masalah tentang apakah ada hubungan berat badan lahir bayi dengan tingkat ruptur perineum pada ibu dengan persalinan normal di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan berat badan lahir bayi dengan tingkat ruptur perineum pada ibu dengan persalinan normal di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *deskriptif analitik* dengan jenis penelitian kuantitatif studi korelasional yaitu mengkaji hubungan antara variabel secara *retrospektif* yaitu melakukan penelitian terhadap data yang telah terjadi pada waktu lampau. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling*. Jumlah sampel yang digunakan yaitu sebanyak 150 responden dengan melihat status rekam medik responden. Analisis data yang digunakan yaitu analisis multivariat dengan menggunakan uji *chi square* dengan nilai kemaknaan 0,05.

Berdasarkan hasil uji statistik dapat diinterpretasikan bahwa 150 responden diperoleh nilai $p = 0,000$ lebih kecil dari nilai $p = 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima berarti ada hubungan antara berat badan lahir bayi terhadap kejadian ruptur perineum. Berdasarkan hasil penelitian maka petugas kesehatan perlu meningkatkan penyuluhan terhadap ibu hamil tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ruptur perineum sehingga dapat mengurangi kejadian ruptur perineum dan tingkat ruptur perineum dapat diminimalkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia membuat rencana strategi nasional *Making Pregnancy Safer* (MPS) untuk tahun 2001-2010, dalam konteks rencana pembangunan kesehatan menuju Indonesia sehat 2010 adalah dengan visi “Kehamilan dan Persalinan di Indonesia Berlangsung Aman, serta yang Dilahirkan Hidup dan Sehat” dengan misinya adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian maternal dan neonatal melalui pematapan sistem kesehatan. (Saifuddin, 2002).

Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang berkualitas dibutuhkan tenaga kesehatan terampil yang didukung tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Pemerintah juga telah menetapkan Asuhan Persalinan Normal (APN) pada petugas pelaksana asuhan kebidanan dan keperawatan yang dicanangkan dalam kerja kolaborasi Depkes RI, POGI, IBI, JNPKKR, atas dukungan JHPIEGO Corporation. Fokus utama APN adalah mencegah terjadinya komplikasi seperti perdarahan post partum yang disebabkan oleh ruptur perineum. (JNPKKR, 2007).

Perdarahan *postpartum* menjadi penyebab utama 40% kematian ibu di Indonesia. Perlukaan jalan lahir merupakan penyebab kedua terjadinya perdarahan post partum setelah atonia uteri. Ruptur perineum terjadi pada

hampir semua persalinan pertama dan tidak jarang juga pada persalinan berikutnya. Pada seorang primipara atau orang yang baru pertama kali melahirkan, ketika terjadi peristiwa 'kepala keluar pintu' maka diperkirakan sebanyak 85% akan mengalami ruptur perineum. Luka perineum biasanya ringan tetapi kadang-kadang terjadi juga luka yang luas dan berbahaya. Sebagai akibat persalinan terutama pada seorang primipara, biasa timbul luka pada vulva di sekitar introitus vagina yang biasanya tidak dalam akan tetapi kadang-kadang bisa timbul perdarahan banyak. (Prawirohardjo, 2008).

Adapun beberapa dampak dari ruptur perineum pada ibu yaitu pada 10% ibu merasa nyeri (gangguan ketidaknyamanan) selama 3-18 bulan setelah melahirkan. Sebanyak 3-10% ibu melaporkan inkontinensia usus. Sekitar 30% ibu mengalami inkontinensia flatus dan sebanyak 20% ibu mengalami inkontinensia urine. Kerusakan sfingter anal terjadi pada 36% setelah ibu dengan pelahiran pervaginam dan pada 70% (rentang 54-88%) walaupun robekan derajat tiga dan empat telah diperbaiki. (David Liu, 2007)

Pada tahun 2009, tingkat kelahiran rata-rata untuk seluruh dunia adalah 19,95 per tahun per 1000 jumlah penduduk, menurun 0,48% dari tingkat kelahiran dunia 2003 dari 20,43 per 1000 jumlah penduduk. Menurut CIA, negara dengan angka kelahiran tertinggi saat ini di Nigeria sebesar 51,26 kelahiran per 1000 orang. Negara dengan tingkat kelahiran terendah adalah Jepang pada 7,64 kelahiran per 1000 orang. Dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2008, Jumlah kelahiran di Indonesia setahun sekitar 4,6 juta. Angka kelahiran di Indonesia pada tahun 2009 masih cukup tinggi,

yaitu sebesar 228 per 100 ribu kelahiran dibanding angka kelahiran yang disyaratkan MDGs atau tujuan pembangunan milenium 125 untuk 100 ribu kelahiran. Berdasarkan data dari Rektur Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, mengungkapkan bahwa perkiraan persalinan di Indonesia bisa mencapai 5 juta pada tahun 2015-2020. (Republika, 2009)

Menurut penelitian Andrew V, dkk dari Departemen Obstetri dan Ginekologi, Croydon, Suriah (Juni 2008) menyatakan bahwa kejadian ruptur perineum di Puskesmas Mergangsan, Jawa Tengah tahun 2008 bulan Januari diperoleh data 74 persalinan, jumlah ibu bersalin dengan ruptur perineum sebanyak 67 responden (90.54%) dari seluruh persalinan. Jumlah ini menunjukkan bahwa angka kejadian ruptur perineum di Puskesmas Mergangsan mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2006 kasus persalinan dengan ruptur perineum sebesar 595 kasus (74,40%) dari total 800 persalinan. Tahun 2007 kasus persalinan dengan ruptur perineum meningkat menjadi 667 kasus (79,40%) dari total 840 persalinan. Hal ini tidak sesuai dengan JNPK-KR (2007) yang menyatakan bahwa pencegahan laserasi merupakan salah satu penatalaksanaan fisiologis kala II persalinan dimana puskesmas Mergangsan sebagai salah satu satelit pelaksana APN. Kejadian ruptur perineum terjadi pada 5 kasus (71,43%) dari 7 kasus ibu bersalin dengan umur >35 tahun. Sedangkan kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin dengan umur \leq 35 tahun yaitu sejumlah 40 kasus (59,7%) dari 67 kasus. Hal ini sesuai dengan pendapat

Manuaba (2001) yang mengemukakan bahwa ibu dengan umur >35 tahun lebih berisiko mengalami ruptur perineum. (JNPKKR, 2007).

Ibu bersalin yang mengalami ruptur perineum terbanyak terjadi pada ibu dengan paritas 2 dan 3 yaitu sejumlah 25 (73,53%) dari 34 ibu bersalin, paritas >3 (grandemultipara) sejumlah 4 (57,14%) dari 7 ibu bersalin dan paritas 1 (primipara) hanya sejumlah 16 (48,48%) dari 33 ibu bersalin. Hal ini sesuai dengan pendapat Friedman (2002) yang menyatakan bahwa grandemultipara merupakan salah satu faktor risiko ruptur perineum dan tidak sesuai dengan pendapat Mochtar (2000) yang menyatakan bahwa primipara merupakan salah satu penyebab ruptur perineum. (Wikipedia, 2003).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka kejadian ruptur perineum pada primipara persalinan normal sebesar 88,9%, sedangkan yang tidak mengalami ruptur perineum pada multipara pada persalinan normal sebesar 43,3%. Setelah dilakukan uji statistik didapatkan bahwa nilai $r\emptyset = 0,405$ dan $< 0,05$ dengan tingkat hubungan sedang, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, artinya ada hubungan antara paritas dengan kejadian ruptur perineum di BPS Hj. Hartini Widang Tuban. Sedangkan angka kejadian ruptur perineum pada keadaan perineum kaku pada persalinan normal sebesar 84,6%, dan yang tidak mengalami ruptur perineum pada keadaan perineum meregang pada persalinan normal sebesar 32,5% sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, artinya tidak terdapat hubungan antara perineum kaku dengan kejadian ruptur perineum di BPS Hj. Hartini Widang Tuban. Dari hasil analisa diatas diharapkan para penolong persalinan mampu memahami faktor-faktor

penyebab dari ruptur perineum dan bagaimana cara pencegahan ruptur perineum dan lebih memperhatikan keadaan ibu pada saat persalinan, sehingga angka kejadian ruptur perineum dapat dikurangi. (JNPK-KR, 2007).

Hasil penelitian di BPS Dwi Yuliani Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, didapat hasil bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi robekan perineum di BPS Dwi Yuliani untuk faktor elastisitas perineum adalah dengan perineum kaku (58,82%), untuk faktor posisi persalinan adalah dengan posisi berbaring/litotomi (100%), dan untuk faktor paritas adalah dengan paritas primipara (61,76%). (Wikipedia, 2003).

Berdasarkan data prasurvey di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar tentang jumlah ibu bersalin pada tahun 2010 mencapai 3038 orang selama satu tahun dan angka kejadian ruptur perineum spontan pada ibu bersalin tahun 2010 masih sangat tinggi yaitu sekitar 50%. Jadi jumlah ibu yang mengalami ruptur perineum yaitu sebanyak 1519 orang.

Berdasarkan data yang telah diperoleh, peneliti tertarik untuk meneliti tentang kejadian ruptur perineum. Setelah membaca beberapa penelitian tentang faktor yang mempengaruhi ruptur perineum dan didukung dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi berat badan lahir bayi akan meningkatkan resiko kejadian ruptur perineum, maka peneliti tertarik untuk meneliti hubungan berat badan lahir bayi dengan kejadian ruptur perineum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu Apakah Ada Hubungan Berat Badan Lahir Bayi dengan Tingkat Ruptur Perineum pada Ibu dengan Persalinan Normal di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Pada penelitian ini peneliti mempunyai tujuan untuk mengetahui hubungan berat badan lahir bayi terhadap tingkat ruptur perineum pada ibu dengan persalinan normal di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui hubungan berat badan lahir bayi rendah dengan tingkat ruptur perineum di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.
- b. Mengetahui hubungan berat badan lahir bayi normal dengan tingkat ruptur perineum pada ibu dengan persalinan normal di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.
- c. Mengetahui hubungan berat badan lahir bayi makrosomia terhadap tingkat ruptur perineum di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang peneliti harapkan setelah proses penelitian yaitu secara:

1. Teoritis

Diketuinya hubungan berat badan lahir terhadap kejadian ruptur perineum pada ibu dengan persalinan normal dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian maternitas dengan memahami teori tentang kejadian ruptur perineum

2. Praktis

a. Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan yang menolong partus tentang pengaruh berat badan lahir terhadap kejadian ruptur perineum.

b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan rumah sakit sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan mutu pelayanan terhadap ibu bersalin.

c. Sebagai bahan pertimbangan bagi penolong persalinan dan tenaga kesehatan dalam meningkatkan pelayanan yang baik terhadap ibu bersalin dengan mencegah terjadinya ruptur perineum atau meminimalkan angka kejadian ruptur perineum.

d. Hasil penelitian dapat digunakan masyarakat sebagai data dasar dalam meluaskan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh berat badan lahir terhadap kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin.

e. Merupakan pengalaman berharga dalam rangka menambah wawasan keilmuan bagi peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Ruptur Perineum

1. Definisi

Ruptur adalah robekan atau koyaknya jaringan secara paksa sedangkan perineum adalah bagian yang terletak antara vulva dan anus panjangnya rata-rata 4 cm. Jadi ruptur perineum adalah robekan pada jaringan yang terletak antara vulva dan anus yang terjadi pada saat persalinan. (Sarwono Prawirohardjo, 2007 hal. 175)

Ruptur perineum adalah luka pada perineum yang diakibatkan oleh rusaknya jaringan secara alamiah karena proses desakan kepala janin atau bahu pada saat proses persalinan. Bentuk ruptur biasanya tidak teratur sehingga jaringan yang robek sulit dilakukan penjahitan. (Hamilton, 2002).

Ruptur perineum adalah luka pada perineum yang terjadi karena sebab-sebab tertentu tanpa dilakukan tindakan perobekan disengaja. Luka ini terjadi pada saat kelahiran dan biasanya tidak teratur. (Sarwono Prawirohardjo, 2006 hal. 665)

Perlukaan pada alat genetalia dapat ditimbulkan oleh beberapa macam sebab antara lain perlukaan akibat persalinan, perlukaaan akibat koitus, perlukaan akibat pembedahan ginekologok dan lain-lain. Perlukaan jalan

lahir yang terjadi karena persalinan dapat mengenai perineum, vulva, vagina dan uterus. (Sarwono Prawirohardjo, 2008 hal 128).

Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam waktu 18-24 jam tanpa komplikasi baik kepada ibu maupun janin. (Sumarah, dkk, 2008 hal. 100).

Sebagaimana firman Allah dalam Q. S An-Nahl [16]: 78

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahan:

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada setelah proses persalinan, Allah telah menitipkan amanah untuk orang tua seorang bayi dalam keadaan yang suci, tidak mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, orang tua hendaknya memelihara dan mendidik anak yang dititipkan oleh Allah menjadi anak yang shaleh. Allah memberikan segala nikmat yang begitu indah berupa pendengaran, penglihatan dan hati. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas segala nikmat Allah dengan mengerjakan segala yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan-Nya.

Pada akhir kehamilan ibu dan janin mempersiapkan diri untuk menghadapi proses persalinan. Perawat harus menguasai faktor esensial persalinan, kemajuan persalinan yang normal dan adaptasi ibu dan janin.

Adapun faktor esensial dalam persalinan yaitu:

a. Faktor Esensial Persalinan

Ada lima faktor esensial yang mempengaruhi proses persalinan dan kelahiran yaitu:

1) *Passenger* (penumpang yaitu janin dan plasenta)

Penumpang atau janin bergerak di sepanjang jalan lahir merupakan interaksi dari beberapa faktor antara lain ukuran kepala janin, presentasi, letak, sikap dan posisi janin. Plasenta juga di anggap sebagai penumpang karena plasenta dilahirkan melalui jalan lahir yang menyertai janin. Kelima faktor yang mempengaruhi interaksi janin dan jalan lahir yaitu:

a) Ukuran kepala janin

Dalam proses persalinan setelah selaput sutura dan fontanel membuat tengkorak fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri terhadap otak bayi yang beberapa lama setelah lahir terus bertumbuh. Akan tetapi, tulang-tulang tersebut saling tumpang tindih karena belum menyatu dengan kuat. Molase dapat berlangsung berlebihan tetapi pada kebanyakan bayi, kepala akan kembali kebentuk normalnya dalam tiga hari setelah persalinan. Kemampuan tulang untuk saling menggeser sehingga memungkinkannya beradaptasi terhadap berbagai diameter panggul. Ukuran kepala janin yang terlampau besar akan meningkatkan resiko terjadinya ruptur perineum.

b) Presentasi janin

Presentasi adalah bagian janin yang pertama kali memasuki pintu atas panggul yaitu presentasi kepala, bokong dan bahu. Faktor yang menentukan bagian presentasi adalah letak janin, sikap janin dan ekstensi atau fleksi kepala janin. Presentasi bokong dan bahu akan meningkatkan resiko terjadinya ruptur perineum.

c) Letak janin

Letak adalah hubungan antara sumbu panjang (punggung) janin terhadap punggung ibu. Ada dua macam letak janin yaitu memanjang atau vertikal dimana janin paralel dengan punggung ibu dan letak janin melintang atau horizontal dimana punggung janin membentuk sudut terhadap punggung ibu. Letak memanjang dapat berupa presentasi kepala atau presentasi bokong dan letak lintang yang menjadi bagian presentasi adalah skapula bahu. Letak lintang janin akan meningkatkan resiko terjadinya ruptur perineum.

d) Sikap janin

Sikap adalah hubungan bagian tubuh janin yang satu dengan yang lain. Pada kondisi normal, punggung janin sangat fleksi, kepala fleksi ke arah dada dan paha fleksi ke arah lutut. Tangan disilangkan di depan toraks dan tali pusat terletak antara lengan dan tungkai. Sikap janin yang abnormal akan meningkatkan resiko terjadinya ruptur perineum.

e) Posisi janin

Posisi adalah hubungan antara bagian presentasi (oksiput, sacrum, metum atau dagu), sinsiput (puncak kepala yang defleksi atau menengadah) terhadap empat kuadran panggul ibu. Posisi janin yang abnormal akan meningkatkan resiko terjadinya ruptur perineum.

2) *Passageway* (Jalan lahir)

Jalan lahir terdiri dari panggul ibu yakni bagian tulang yang padat, dasar panggul, vagina dan introitus atau bagian luar vagina. Meskipun jaringan lunak khususnya lapisan otot dasar panggul ikut menunjang keluarnya bayi tetapi panggul ibu jauh lebih berperan dalam proses persalinan. Janin harus berhasil menyesuaikan diri terhadap jalan lahir yang relatif kaku. Oleh karena itu, ukuran dan bentuk panggul harus ditentukan sebelum persalinan dimulai. Ada empat jenis dasar bentuk panggul yang diperkenalkan yaitu bentuk panggul ginekoid (tipe wanita klasik), android (mirip panggul pria), anthropoid (mirip panggul kera anthropoid) dan platipeloid (panggul pipih).

3) *Power* (kekuatan)

Ibu melakukan kontraksi involunter dan volunter secara bersamaan. Kontraksi involunter atau kekuatan primer menandai dimulainya persalinan. Kekuatan primer membuat serviks primer menipis dan berdilatasi sehingga janin turun. Pada kehamilan aterm pertama, effacement atau penipisan serviks biasanya terjadi lebih dahulu

daripada dilatasi sedangkan pada multipara *effacement* dan dilatasi cenderung terjadi bersamaan. Apabila serviks berdilatasi, usaha volunter atau kekuatan sekunder untuk mendorong dan memperbesar kekuatan kontraksi primer sehingga bayi keluar dari uterus dan vagina. Apabila dalam persalinan wanita melakukan usaha volunter atau mengedan terlalu dini, dilatasi serviks akan terhambat. Mengedan akan melelahkan dan menimbulkan trauma serviks.

4) Posisi ibu

Posisi ibu mempengaruhi adaptasi anatomi dan fisiologi persalinan. Posisi tegak memberi keuntungan. Mengubah posisi membuat rasa letih hilang, member rasa nyaman dan memperbaiki sirkulasi. Posisi tegak meliputi posisi duduk, berdiri, berjalan dan jongkok. Posisi tegak memungkinkan gaya gravitasi membantu penurunan janin. Kontraksi uterus biasanya lebih kuat dan lebih efisien untuk membantu penipisan dan dilatasi serviks sehingga persalinan menjadi cepat. Posisi tegak juga mengurangi insiden penekanan tali pusat. Selain itu, posisi tegak juga menguntungkan curah jantung ibu yang dalam kondisi normal meningkat selama persalinan seiring kontraksi uterus mengembalikan darah ke anyaman pembuluh darah. (Bobak dan Lowdermilk Jensen, 2004 hal. 235-245)

5) *Psychologis Respons*

Tingkat kecemasan wanita selama bersalin akan meningkat jika ia tidak memahami apa yang terjadi kepada dirinya atau informasi yang

disampaikan membantu wanita berpartisipasi sejauh yang diinginkan dalam melahirkan, memenuhi harapan wanita akan hasil akhir persalinannya, membantu wanita menghemat tenaga, mengendalikan rasa nyeri merupakan suatu dukungan dalam mengurangi kecemasan pasien. Dengan kondisi psikologi yang positif akan mempermudah proses persalinan. (Sumarah, 2008 hal. 128)

b. Tahapan atau Proses Persalinan Normal

Ahli medis membagi proses kelahiran bayi menjadi tiga tahapan. Pertama, fase laten yang merupakan proses persiapan persalinan yang terdiri dari fase persiapan, fase aktif dan fase transisi (fase dilatasi). Kedua, tahap persalinan yang merupakan puncak kelahiran bayi atau saatnya mengejan dan melahirkan. Ketiga, tahap keluarnya plasenta atau pasca lahir. (Bonny Danuatmaja dan Mila Meiliasari, 2004 hal. 25)

Ada juga beberapa ahli yang membagi proses atau tahapan dalam persalinan menjadi 4 kala yaitu:

1) Kala I atau kala pembukaan serviks

Proses pembukaan serviks pada primigravida terdiri dari tiga fase yaitu:

a) Fase laten berlangsung selama 8 jam sampai pembukaan 3 cm. His masih lemah dengan frekuensi his jarang. (Mansjoer Arif, 2001).

Pada fase persiapan ditandai dengan terjadinya pembukaan (dilatasi) dan penipisan leher rahim dengan pembukaan leher rahim mencapai 3 cm. Selain itu, ibu mulai merasakan kontraksi yang

jelas berlangsung selama 30-50 detik dengan jarak 5-20 menit. Semakin bertambah pembukaan leher rahim, semakin sering kontraksi. Beberapa ibu, khususnya yang sensitif mulai merasa sakit. Namun beberapa ibu lainnya tidak merasa sakit sama sekali.

- b) Fase dilatasi maksimal lamanya 2 jam dengan pembukaan 4-9 cm
- c) Fase deselerasi lamanya 2 jam, pembukaan lebih dari 9 cm sampai pembukaan lengkap. His tiap 3-4 menit selama 45 detik (Mansjoer Arif, 2001 hal. 235)

2) Kala II atau kala pengeluaran

Pada kala II atau kala pengeluaran janin, saat kepala janin melewati jalan lahir maka akan ada kemungkinan ibu mengalami ruptur perineum. Pada kala II his menjadi lebih kuat dan lebih cepat, kira-kira 2 sampai 3 menit sekali karena biasanya kepala janin sudah memasuki ruang panggul sehingga pada saat his dirasakan tekanan pada otot-otot dasar panggul yang secara reflektoris menimbulkan rasa mencedan. Wanita juga merasakan tekanan pada rectum sehingga ingin buang air besar). Peningkatan his pada kala ini sesuai dengan hasil pengamatan klasik dari Friedman tentang kemajuan persalinan normal dengan studi observasional yang banyak mengenai usaha mengejan spontan dan mencatat bahwa seiring penurunan bagian terbawah janin maka akan terjadi peningkatan keinginan mengejan dan usaha mengejan semakin besar. (Penny Simkin dan Ruth Ancheta, 2005 hal. 89)

Tanda-tanda fisik dini yang biasa terjadi pada kala II atau pada saat menjelang persalinan yaitu:

- a) Ketuban pecah spontan
- b) Tekanan rectum, sensasi ingin defekasi selama kontraksi
- c) Keluar bercak atau cairan merah terang dari vagina
- d) Perlambatan denyut jantung janin (DJJ) pada puncak kontraksi
- e) Perineum mengembung, vagina melebar dan anus mendatar.

Seringkali ibu membuka anusnya saat mengejan selama kontraksi.

(Monica Ester, 2006 hal. 25)

3) Kala III atau kala uri

Kala III dimulai sejak bayi lahir sampai lahirnya plasenta atau uri. Rata-rata lamanya kala III berkisar 15-30 menit baik pada primipara maupun multipara. (Sumarah,dkk, 2008 hal. 236).

Beberapa menit setelah bayi lahir maka kontraksi timbul lagi karena janin tidak berada dalam uterus lagi sehingga retraksi segmen atas lebih besar dibanding kala I dan II. Retraksi ini sangat mengurangi daerah perlekatan plasenta sedangkan ukuran plasenta sendiri tidak berkurang. Oleh karena itu, terbentuk celah pada stratum spongiosum desidua sehingga plasenta terlepas dari dinding uterus. Selama proses pelepasan, darah menumpuk di antara plasenta dan uterus. Apabila pelepasan telah sempurna maka darah akan dilepaskan dan mengalir keluar melalui vagina. Setelah plasenta lepas, kontraksi

uterus mengeluarkan plasenta ke dalam vagina. (Harry Oxon dan William R Forte, 2010 hal 125)

Penolong partus tidak diperbolehkan mencoba melahirkan plasenta sebelum ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Tanda-tanda pelepasan plasenta yaitu:

- a) Rahim bertambah tinggi
- b) Bentuknya berubah dari lonjong menjadi bulat
- c) Tali pusat memanjang
- d) Darah keluar secara menyembur (James R Scott, 2002 hal 35)

4) Kala IV (Observasi)

Kala IV dimulai saat lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama. Ada juga teori yang menyatakan kala IV dimulai saat lahirnya plasenta sampai 1 jam pertama. Observasi yang dilakukan pada kala ini adalah:

- a) Tingkat kesadaran penderita
- b) Pemeriksaan tanda-tanda vital
- c) Kontraksi uterus
- d) Terjadi perdarahan. Perdarahan masih dianggap normal jika jumlahnya tidak melebihi 400-500 cc (Ida Bagus Gde Manuaba, 2000 hal 55)

Pembuluh darah melewati myometrium berkelok-kelok dan anguler. Serabut-serabut otot tersusun dalam jaringan yang berselang seling dilalui oleh pembuluh darah. Setelah plasenta dilepaskan,

retraksi menyebabkan pemendekan serabut otot uterus yang permanen sehingga menekan, memutar dan menutup arteriolae dan venulae seperti ikatan yang hidup. Aliran darah ke tempat plasenta dengan efektif ditutup dan perdarahan berhenti. Apabila uterus atonis dan tidak terjadi retraksi sebagaimana mestinya maka pembuluh darah tidak tertutup dan mungkin terjadi perdarahan postpartum yang banyak. (Harry Oxon dan William R Forte, 2010 hal 127)

2. Bentuk Ruptur Perineum

a. Ruptur Perineum Spontan

Ruptur perineum spontan adalah luka pada perineum yang terjadi karena sebab-sebab tertentu tanpa dilakukan tindakan perobekan atau disengaja. Luka ini terjadi pada saat persalinan dan biasanya tidak teratur.

b. Ruptur perineum yang disengaja (Episiotomi)

Ruptur perineum disengaja adalah luka perineum yang terjadi karena dilakukan pengguntingan atau perobekan pada perineum. Episiotomi adalah torehan yang dibuat pada perineum untuk memperbesar saluran keluar vagina (Sarwono Prawirohardjo, 2002 hal 367)

3. Etiologi

Ada beberapa penyebab terjadinya ruptur perineum yang dikemukakan oleh ahli yaitu:

a. Faktor ibu

1) *Partus presipitatus* adalah persalinan yang terjadi terlalu cepat yakni kurang dari tiga jam. Sehingga sering petugas belum siap untuk

menolong persalinan dan ibu mengejan kuat tidak terkontrol, kepala janin terjadi defleksi terlalu cepat. Keadaan ini akan memperbesar kemungkinan ruptur perineum.

2) Primigravida

Pada primigravida ditemukan tanda-tanda perineum utuh, vulva tertutup, himen pervoratus, vagina sempit dengan rugae. Pada persalinan akan terjadi penekanan pada jalan lahir lunak oleh kepala janin. Dengan perineum yang masih utuh pada primigravida akan mudah terjadi robekan perineum.

3) Varikosa pada pelvis maupun jaringan parut pada perineum dan vagina. Varikosa pada pelvis merupakan salah satu faktor risiko untuk trauma persalinan. Jaringan parut pada jalan lahir akan menghalangi atau menghambat kemajuan persalinan, sehingga episiotomi pada kasus ini dapat dipertimbangkan.

4) Persalinan operatif pervaginam (ekstraksi vakum, ekstraksi forsep, versi dan ekstraksi, serta embriotomi). Penyulit persalinan pervaginam (sungsang, distosia bahu, ekstraksi forceps, ekstraksi vakum) merupakan indikasi episiotomi. Kejadian laserasi derajat tiga dan empat lebih banyak pada episiotomi rutin dibandingkan tanpa episiotomi. Episiotomi juga meningkatkan jumlah darah yang hilang dan risiko hematoma. Episiotomi tidak melindungi perineum, melainkan menyebabkan inkontinensia sfingter anus dengan cara meningkatkan risiko robekan derajat tiga dan empat.

5) Umur ibu

Umur > 35 tahun akan meningkatkan resiko terjadinya ruptur perineum pada saat persalinan.

6) Grandemultipara

Ibu yang mempunyai anak lebih dari 4 akan meningkatkan resiko terjadinya ruptur perineum pada saat persalinan.

b. Faktor janin

1) Kepala janin besar dan janin besar.

Kepala janin besar dan janin besar dapat menyebabkan terjadinya ruptur perineum. Kepala janin merupakan bagian yang terpenting dalam persalinan. Kepala janin akan berpengaruh terhadap peregangan perineum pada saat kepala di dasar panggul dan membuka pintu dengan diameter 5-6 cm akan terjadi penipisan perineum, sehingga pada perineum mudah terjadi ruptur perineum.

2) Presentasi defleksi (puncak kepala, dahi, muka). Salah satu cara mencegah robekan perineum yaitu dengan mengarahkan kepala agar perineum dilalui diameter terkecil saat saat ekspulsi. Diameter kepala terkecil terdapat pada presentasi belakang kepala yaitu sirkumferensia suboksipito bregmatika (32cm). Lingkar kepala yang melalui jalan lahir pada presentasi puncak kepala adalah sirkumferensia frontooksipitalis (34cm), pada bayi yang lahir dengan presentasi muka sirkumferensia submento bregmatik (32cm), presentasi dahi sirkumferensia mentooksipitalis (35 cm).

3) Letak sungsang dan over coming head

Pada presentasi bokong atau letak sungsang kepala yang merupakan bagian terbesar bayi akan lahir terakhir. Kepala tidak mengalami mekanisme moulage karena susunan tulang kepala yang rapat dan padat sehingga hanya mempunyai waktu 8 menit setelah badan lahir. Dengan waktu yang singkat otomatis menimbulkan peregangan yang besar pada perineum sehingga mudah terjadi ruptur perineum.

4) Abnormalitas congenital

Abnormalitas kongenital seperti hidrocephalus merupakan salah satu penyebab ruptur perineum.

c. Faktor penolong persalinan

Menurut Mochtar (2000) pimpinan persalinan merupakan salah satu sebab terjadinya ruptur perineum. Menurut Buku Acuan Asuhan Persalinan Normal (2007) kerjasama dengan ibu dan penggunaan perasat manual yang tepat dapat mengatur kecepatan kelahiran bayi dan mencegah terjadinya lacerasi. Pengendalian kecepatan dan pengaturan diameter kepala saat melalui introitus dan perineum dapat mengurangi kemungkinan terjadinya robekan.

Apabila perawat menguasai pengetahuan tersebut maka perawat akan melaksanakan tindakan keperawatan dengan baik untuk ibu melahirkan dan keluarganya. Hal ini pula dijelaskan dalam Q. S Al-Qashash [28] : 77

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَانِكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَسْرِ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ



Terjemahan:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagai seorang perawat atau tenaga kesehatan kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain terutama kepada ibu yang bersalin, bekerja dengan sebaik-baiknya dapat mencegah terjadinya dampak negatif pada ibu bersalin, seperti terjadinya ruptur perineum. Memberikan pelayanan yang baik kepada pasien dan keluarganya merupakan pekerjaan yang mulia dan akan mendapat balasan dari Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Bimbing ibu untuk mengedan dan beristirahat atau bernafas dengan cepat pada waktunya. Saat kepala membuka vulva (5-6 cm), letakkan kain yang bersih dan kering yang dilipat 1/3 nya di bawah bokong ibu dan siapkan kain atau handuk bersih di atas perut ibu (untuk mengeringkan bayi segera setelah lahir). Lindungi perineum dengan satu tangan (dibawah kain bersih dan kerig), ibu jari pada salah satu sisi perineum dan 4 jari tangan pada sisi yang lain pada belakang kepala bayi. Tahan belakang kepala bayi agar posisi kepala tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap melewati

introitus dan perineum. Melindungi perineum dan mengendalikan keluarnya kepala bayi secara bertahap dan hati-hati dapat mengurangi regangan berlebihan (robekan) pada vagina dan perineum. (Bonny Danuatmaja dan Mila Meiliasari, 2001 hal. 27)

4. Klasifikasi

Tempat yang paling sering mengalami perlukaan akibat persalinan ialah perineum. Tingkat perlukaan pada perineum terbagi atas:

- a. Tingkat I adalah robekan terjadi hanya pada selaput lendir vagina dengan atau tanpa mengenai kulit perineum
- b. Tingkat II adalah robekan mengenai selaput lender vagina dan otot perinea transversalis tetapi tidak mengenai otot sfingter ani.
- c. Tingkat III adalah robekan mengenai perineum sampai dengan otot sfingter ani
- d. Tingkat IV adalah robekan mengenai perineum sampai otot sfingter ani dan mukosa rectum.

Kepala janin besar dan janin besar dapat menyebabkan terjadinya ruptur perineum yang lebih besar. (Sarwono Prawirohardjo, 2006)

5. Tanda-tanda ruptur perineum

Selama kala dua persalinan, ketika perineum mulai meregang penolong persalinan harus mengamati keadaan perineum secara hati-hati dan kontinyu. Dengan pengalaman penolong persalinan seharusnya mampu

mengenali ruptur perineum mengancam. Adapun tanda yang mengancam terjadinya robekan perineum adalah :

- a. Kulit perineum mulai meregang dan tegang.
- b. Ketika kucuran darah keluar dari liang vagina, maka hal ini sering mengindikasikan terjadinya robekan mukosa vagina.
- c. Kulit perineum nampak pucat dan mengkilap.
- d. Bila kulit perineum pada garis tengah mulai robek. Perdarahan dalam keadaan dimana plasenta telah lahir lengkap dan kontraksi rahim baik, dapat dipastikan bahwa perdarahan tersebut berasal dari perlukaan jalan lahir. (Depkes RI, 2004).

6. Diagnosis Trauma Perineal

Birmingham Perineal Research Evaluation Group (BPREG) mengembangkan Peri-Rule sebagai alat bantu dalam mendiagnosis robekan derajat dua. Penggunaan alat ini bertujuan untuk membantu bidan dalam memperkirakan grade dari robekan perineum.

Dalam membuat diagnosis klinik yang akurat adalah:

- a. Informed consent untuk pemeriksaan vagina dan rectal.
- b. Harus dapat terlihat dengan baik cedera pada perineal, jika tidak dimungkinkan, pasien harus ditempatkan dalam posisi litotomi
- c. Pencahayaan harus baik
- d. Jika pasien mengeluhkan nyeri, maka dibutuhkan anal gesi yang adekuat
- e. Pemeriksaan secara visual meliputi dinding vagina untuk menilai sobekan vagina. Jika didapatkan robekan multiple atau dalam, maka

sebaiknya diposisikan dalam litotomi. Laserasi vagina pada apeks harus diidentifikasi

- f. Pemeriksaan rectal harus dilakukan untuk menilai mukosa rectum dan anal sfingter. Dan dilakukan juga setelah dilakukan penjahitan untuk menghindari luka tersisa yang masih terbuka
- g. Untuk menegakkan trauma perineal harus juga dikonfirmasi dengan palpasi. Dengan menempatkan jari telunjuk pada lubang anal dan ibu jari pada vagina. Hal ini bertujuan untuk untuk menilai sfingter anal dengan lebih baik, lalu pasien diminta untuk mengkontraksikan otot daerah perineum, sehingga dapat dinilai fungsinya. (Monica Ester, 2006)

7. Teknik Menjahit luka perineum

- a. Pada perlukaan tingkat I, bila hanya ada luka lecet sedikit tidak diperlukan penjahitan.
- b. Pada perlukaan tingkat II, hendaknya luka dijahit kembali secara cermat. Lapisan otot dijahit simpul dengan katgut kromik no 0 atau 00 dengan mencengah terjadinya ruang mati. Adanya ruangan mati antara jahitan- jahitan memudahkan tertimbunnya darah beku dan terjadi radang. Lapisan kulit dapat dijahit dengan katgut atau sutera secara simpul. Jahitan hendaknya jangan dijahit terlalu ketat karena beberapa jam kemudian bisa terjadi edema di tempat perlukaan.
- c. Penanganan perlukaan perineum tingkat III memerlukan tekhnis penjahitan khusus. Langkah pertama yang terpenting adalah menemukan kedua ujung muskulus sfingter any eksternus yang terputus. Kedua

ujung otot dijepit dengan cunam allis kemudian dijahit dengan benang catgut kromik no 0 atau 00 sehingga kontinuitas sfingter terbentuk kembali. Simpul jahitan pada ujung otot-otot sfingter hendaknya dibenamkan ke arah mukosa rectum lalu penjahitan jaringan dilakukan seperti pada penjahitan luka perineum tingkat II. (Sarwono Prawirohardjo. 2008 hal. 187)

8. Bahaya dan komplikasi ruptur perineum

Ada beberapa bahaya dan komplikasi dari ruptur perineum yaitu:

a. Perdarahan

Perdarahan pada ruptur perineum dapat menjadi hebat khususnya pada ruptur derajat dua dan tiga atau jika ruptur meluas kesamping atau naik ke vulva mengenai klitoris

b. Infeksi

Laserasi perineum dapat dengan mudah terkontaminasi feses. Infeksi juga dapat menjadi sebab luka tidak segera menyatu sehingga timbul jaringan parut.

c. Disparenia

Jaringan parut yang terbentuk sesudah laserasi perineum dapat menyebabkan nyeri selama berhubungan seksual.

9. Perawatan Perineum

a. Tujuan perawatan luka perineum

Lingkup perawatan perineum ditujukan untuk pencegahan infeksi organ-organ reproduksi yang disebabkan oleh masuknya mikroorganisme yang

masuk melalui vulva yang terbuka atau akibat dari perkembangbiakan bakteri pada peralatan penampung *lochea* (pembalut) sedangkan ruang lingkup perawatan perineum adalah:

- 1) Mencegah kontaminasi dari rektum
- 2) Menangani dengan lembut pada jaringan yang terkena trauma
- 3) Bersihkan semua keluaran yang menjadi sumber bakteri dan bau.

b. Waktu Perawatan

1) Saat mandi

Pada saat mandi, ibu post partum pasti melepas pembalut, setelah terbuka maka ada kemungkinan terjadi kontaminasi bakteri pada cairan yang tertampung pada pembalut, untuk itu maka perlu dilakukan penggantian pembalut, demikian pula pada perineum ibu, untuk itu diperlukan pembersihan perineum.

2) Setelah buang air kecil

Pada saat buang air kecil, pada saat buang air kecil kemungkinan besar terjadi kontaminasi air seni padarektum akibatnya dapat memicu pertumbuhan bakteri pada perineum untuk itu diperlukan pembersihan perineum.

3) Setelah buang air besar.

Pada saat buang air besar, diperlukan pembersihan sisa-sisa kotoran disekitar anus, untuk mencegah terjadinya kontaminasi bakteri dari anus ke perineum yang letaknya bersebelahan maka diperlukan proses pembersihan anus dan perineum secara keseluruhan.

c. Penatalaksanaan

1) Persiapan

Perawatan perineum sebaiknya dilakukan di kamar mandi dengan posisi ibu jongkok jika ibu telah mampu atau berdiri dengan posisi kaki terbuka. Setelah dilakukan persiapan untuk ibu, maka kita menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam perawatan perineum.

2) Alat dan bahan

Alat yang digunakan adalah botol, baskom dan gayung atau shower air hangat dan handuk bersih. Sedangkan bahan yang digunakan adalah air hangat, pembalut nifas baru dan antiseptik.

3) Penatalaksanaan

Perawatan khusus perineal bagi wanita setelah melahirkan anak mengurangi rasa ketidaknyamanan, kebersihan, mencegah infeksi, dan meningkatkan penyembuhan dengan prosedur pelaksanaan menurut Hamilton (2002) adalah sebagai berikut:

- a) Mencuci tangannya
- b) Mengisi botol plastik yang dimiliki dengan air hangat
- c) Buang pembalut yang telah penuh dengan gerakan ke bawah mengarah ke rectum dan letakkan pembalut tersebut ke dalam kantung plastik.
- d) Berkemih dan buang air besar ke toilet
- e) Semprotkan ke seluruh perineum dengan air

f) Keringkan perineum dengan menggunakan tissue dari depan ke belakang.

g) Pasang pembalut dari depan ke belakang. Cuci kembali tangan

4) Evaluasi

Parameter yang digunakan dalam evaluasi hasil perawatan adalah:

a) Perineum tidak lembab

b) Posisi pembalut tepat

c) Ibu merasa nyaman (Halminton,2002)

10. Faktor yang Mempengaruhi Perawatan Perineum

a. Gizi

Faktor gizi terutama protein akan sangat mempengaruhi terhadap proses penyembuhan luka pada perineum karena penggantian jaringan sangat membutuhkan protein.

b. Obat-obatan

1) Steroid : Dapat menyamarkan adanya infeksi dengan mengganggu respon inflamasi normal.

2) Antibiotik spektrum luas / spesifik : Efektif bila diberikan segera sebelum pembedahan untuk patologi spesifik atau kontaminasi bakteri. Jika diberikan setelah luka ditutup, tidak efektif karena koagulasi intrvaskular.

c. Keturunan

Sifat genetik seseorang akan mempengaruhi kemampuan dirinya dalam penyembuhan luka. Salah satu sifat genetik yang mempengaruhi adalah

kemampuan dalam sekresi insulin dapat dihambat, sehingga menyebabkan glukosa darah meningkat. Dapat terjadi penipisan protein-kalori.

d. Sarana prasarana

Kemampuan ibu dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam perawatan perineum mempengaruhi penyembuhan. (Halminton, 2002)

B. Tinjauan Umum tentang Berat Badan Lahir

1. Definisi

Berat badan lahir adalah berat badan bayi yang ditimbang setelah bayi dilahirkan. Semakin besar bayi yang dilahirkan meningkatkan resiko terjadinya ruptur perineum pada normalnya berat badan bayi sekitar 2.500-3.800 gr. (Rini Sekartini, 2007)

2. Klasifikasi

- a. Berat badan lahir bayi rendah berat bayi baru lahir kurang dari 2500 gram.
- b. Berat badan lahir bayi normal adalah berat bayi baru lahir sekitar 2.500-3.800 gram.
- c. Berat badan lahir bayi makrosomi atau bayi besar (giant baby) adalah bayi yang begitu lahir memiliki bobot lebih dari 3.800 gram. (Rini Sekartini, 2007)

Menurut Saifuddin (2002), berat badan neonatus pada saat kelahiran diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Bayi besar adalah bayi dengan berat lahir > 4000 gram

- b. Bayi berat lahir cukup, adalah bayi dengan berat lahir lebih dari 2500 - 4000 gram
- c. Bayi berat lahir rendah (BBLR) / Low birthweight infant, adalah bayi dengan berat badan lahir 1500 - 2500 gram

3. Faktor yang Mempengaruhi Berat Badan Lahir

Salah satu cara untuk menilai kualitas bayi adalah dengan mengukur berat bayi pada saat lahir. Seorang ibu hamil akan melahirkan bayi yang sehat bila tingkat kesehatan dan gizinya berada pada kondisi yang baik. Status gizi ibu sebelum dan selama hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan janin yang sedang dikandung. Bila status gizi ibu normal pada masa sebelum dan selama hamil kemungkinan besar akan melahirkan bayi yang sehat, cukup bulan dengan berat badan normal. Dengan kata lain kualitas bayi yang dilahirkan sangat tergantung pada keadaan gizi ibu sebelum dan selama hamil.

- a. Gizi makanan ibu berpengaruh pada pertumbuhan janin. Pengaturan gizi yang baik akan berpengaruh positif, sedangkan bila kurang baik maka pengaruhnya negatif. Pengaruh ini tampak jelas pada bayi yang baru lahir dalam hal panjang dan besarnya. Panjang dan besarnya bayi dalam keadaan normal bila gizi juga baik. Gizi yang berlebihan mengakibatkan bayi terlalu panjang dan terlalu besar. Bayi yang terlalu panjang dan terlalu besar bisa menyulitkan proses kelahiran. Sedangkan ibu yang kekurangan gizi, bayinya pendek, kecil, dan kondisi kesehatannya kurang baik.

Mengonsumsi makanan yang sehat dan seimbang dan tidak berlebihan juga dijelaskan dalam Q. S Al-A'raaf [7] : 31

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِيْنَتَكَمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا

اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Terjemahan:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) mesjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebaiknya mengonsumsi makanan yang sesuai kebutuhan tubuh terutama pada ibu hamil karena sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa ibu yang mengonsumsi gizi yang berlebihan akan mengakibatkan bayinya panjang dan terlalu besar sehingga akan menyulitkan proses kelahiran dan meningkatkan resiko terjadinya ruptur perineum. Ayat tersebut berbunyi:

Pertambahan berat badan selama kehamilan rata-rata 0,3-0,5 kg/minggu. Bila dikaitkan dengan usia kehamilan, kenaikan berat badan selama hamil muda 5 kg, selanjutnya tiap trimester (II dan III) masing-masing bertambah 5 kg. Pada akhir kehamilan, pertambahan berat badan total adalah 9-12 kg. Bila terdapat kenaikan berat badan yang berlebihan, perlu dipikirkan adanya risiko bengkak, kehamilan kembar, hidroamnion, atau anak besar.

Kebutuhan energi pada trimester I meningkat secara minimal. Kemudian sepanjang trimester II dan III kebutuhan energi terus meningkat sampai akhir kehamilan. Energi tambahan selama trimester II diperlukan untuk pemekaran jaringan ibu seperti penambahan volume darah, pertumbuhan uterus, dan payudara, serta penumpukan lemak. Selama trimester III energi tambahan digunakan untuk pertumbuhan janin dan plasenta.

Karena banyaknya perbedaan kebutuhan energi selama hamil, maka WHO menganjurkan jumlah tambahan sebesar 150 Kkal sehari pada trimester I, 350 Kkal sehari pada trimester II dan III. Di Kanada, penambahan untuk trimester I sebesar 100 Kkal dan 300 Kkal untuk trimester II dan III. Sementara di Indonesia berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi VI ditentukan angka 285 Kkal perhari selama kehamilan. Angka ini tentunya tidak termasuk penambahan akibat perubahan temperatur ruangan, kegiatan fisik, dan pertumbuhan. Patokan ini berlaku bagi mereka yang tidak merubah kegiatan fisik selama hamil.

Sama halnya dengan energi, kebutuhan wanita hamil akan protein juga meningkat, bahkan mencapai 68 % dari sebelum hamil. Jumlah protein yang harus tersedia sampai akhir kehamilan diperkirakan sebanyak 925 g yang tertimbun dalam jaringan ibu, plasenta, serta janin. Di Indonesia melalui Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi VI tahun 1998 menganjurkan penambahan protein 12 g/hari selama kehamilan.

Dengan demikian dalam satu hari asupan protein dapat mencapai 75-100 g (sekitar 12 % dari jumlah total kalori); atau sekitar 1,3 g/kgBB/hari (gravida mature), 1,5 g/kg BB/hari (usia 15-18 tahun), dan 1,7 g/kg BB/hari (di bawah 15 tahun).

Bahan pangan yang dijadikan sumber protein sebaiknya (2/3 bagian) pangan yang bernilai biologi tinggi, seperti daging tak berlemak, ikan, telur, susu dan hasil olahannya. Protein yang berasal dari tumbuhan (nilai biologinya rendah) cukup 1/3 bagian.

b. Aktifitas Fisik

Pada saat hamil ibu tetap perlu melakukan aktifitas fisik, Tetapi terbatas pada aktifitas ringan. Aktifitas fisik yang berat bisa menyebabkan keguguran kandungan, apalagi bila dilakukan pada bulan-bulan awal kehamilan. Aktifitas fisik yang berat bisa mengakibatkan kelelahan. Ibu hamil yang terlalu sering mengalami kelelahan fisik, besarnya janin akan menyusut atau berkembangnya tidak baik.

c. Kondisi Emosional

Suasana hati yang kelam dan emosi yang meledak-ledak dapat mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, produksi adrenalin, aktivitas kelenjar keringat, sekresi asam lambung, dan lain-lain. Perubahan yang terjadi pada fisik mempengaruhi aspek psikologis dan sebaliknya, maka mudah bagi ibu hamil untuk mengalami trauma. Menurut Shinto, trauma ini ternyata dapat dirasakan juga oleh janin. Bahkan, janin sudah menunjukkan reaksi terhadap stimulasi yang berasal

dari luar tubuh ibunya. Sementara dalam masa perkembangan janin, ada masa-masa yang dianggap kritis yang menyangkut pembentukan organ tubuh. Oleh karena itu, mau tidak mau ibu hamil harus menjaga kondisi fisik maupun psikisnya agar bayinya dapat tumbuh sehat.


d. Penyakit yang diidap Ibu

Penyakit yang diderita ibu pada saat hamil bias berakibat negatif kepada janin yang dikandung. Bayi yang lahir dari ibu yang menderita diabetes melitus sering menunjukkan kelainan berupa makrosomia, kardiomegali dan hiperplasia adrenal. Hiperplasia pulau Langerhans akan mengakibatkan hipoglikemia. Umur rata-rata ibu yang melahirkan anak mongoloid dan kelainan lain umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan umur ibu yang melahirkan anak normal. Ini mungkin disebabkan oleh kelainan beberapa endrokin dalam tubuh ibu yang meningkat pada umur lanjut, walaupun faktor lain yang bukan endokrin juga ikut berperan.

e. Genetik

Mark McCarthy dari University of Oxford yang merupakan salah satu pemimpin penelitian, mengatakan "Ini adalah kejutan untuk melihat efek seperti genetik yang kuat untuk karakteristik, seperti berat lahir, yang tunduk pada pengaruh kuat dari faktor lingkungan begitu banyak. Penemuan ini memberikan petunjuk penting untuk mekanisme yang bertanggung jawab untuk mengontrol pertumbuhan pada awal kehidupan dan dapat membawa kita untuk pemahaman yang lebih baik tentang


bagaimana mengelola masalah pertumbuhan selama kehamilan. (Manik,
2005)



BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kerangka Konseptual Penelitian





Keterangan:

□ : Variabel Independent
○ : Variabel Dependent

Gambar 3.1 Kerangka konseptual pengaruh berat badan lahir bayi terhadap kejadian ruptur perineum pada ibu dengan persalinan normal di rumah sakit ibu dan anak St. Fatimah Makassar

B. Kerangka Kerja





Gambar 3.2 Kerangka Kerja Penelitian

C. Definisi Operasional

1. Berat Badan Lahir

a. Defenisi Operasional

Berat badan lahir adalah berat badan yang ditimbang setelah bayi dilahirkan.

b. Kriteria Objektif

1) Berat badan lahir bayi rendah

Jika berat badan lahir bayi < 2500 gram.

2) Berat badan lahir normal

Jika berat badan lahir bayi normal antara 2500 – 3800 gram.

3) Berat badan lahir bayi makrosomia

Jika berat badan lahir bayi > 3800 gram

Skala : Ordinal

2. Ruptur Perineum

a. Definisi Operasional

Ruptur perineum adalah robeknya jaringan secara alamiah yang terletak antara vulva dan anus yang disebabkan oleh desakan kepala janin saat proses persalinan.

b. Kriteria Objektif

- 1) Tingkat 1 adalah robekan terjadi hanya pada selaput lendir vagina dengan atau tanpa mengenai kulit perineum
- 2) Tingkat II adalah robekan mengenai selaput lender vagina dan otot perinea transversalis tetapi tidak mengenai otot sfingter ani.
- 3) Tingkat III adalah robekan mengenai perineum sampai dengan otot sfingter ani
- 4) Tingkat IV adalah robekan mengenai perineum sampai otot sfingter ani dan mukosa rectum (Sarwono Prawirohardjo, 2006)

D. Hipotesis Penelitian

1. Ho jika tidak ada hubungan berat badan lahir bayi terhadap kejadian ruptur perineum pada ibu dengan persalinan normal di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

2. Ha jika ada hubungan berat badan lahir bayi terhadap kejadian ruptur perineum pada ibu dengan persalinan normal di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Desain yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitik dengan jenis penelitian kuantitatif studi korelasional, mengkaji pengaruh antara variabel secara *retrospektif* yaitu melakukan penelitian terhadap data yang terjadi pada waktu lampau (Nursalam, 2008).

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari suatu variabel yang menyangkut masalah yang diteliti (Nursalam, Pariani, 2002).

Dalam penelitian ini populasinya adalah semua ibu bersalin di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar yang terletak di jalan Gunung Merapi no.17 Makassar. Jumlah populasi yang didapatkan setelah pengambilan data awal yaitu sebesar 1519 orang ibu bersalin pada tahun 2010.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Nursalam, Pariani, 2002). Pada

penelitian ini digunakan teknik *accidental sampling* dan sampel yang ditemukan dan memenuhi kriteria inklusi ada 150 responden.

C. Teknik Pengambilan Sampel

1. Teknik Sampling

Sampling adalah suatu proses dalam menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat mewakili populasi (Nursalam, 2008). Dalam penelitian ini pemilihan sampel dengan cara *Non Probability Sampling* jenis *Accidental Sampling* yaitu teknik penetapan sampel secara sembarang yang memenuhi syarat sebagai syarat sebagai sampel yang memenuhi kriteria inklusi. (Nursalam, 2008).

2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

a. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian dari populasi target dan terjangkau yang akan diteliti (Nursalam, 2008)

- 1) Responden yang mempunyai rekam medik yang lengkap. Dalam rekam medik berisi data-data responden mengenai nama, umur, pekerjaan, pendidikan, berat badan lahir bayi dan tingkat ruptur perineum.
- 2) Ibu dengan persalinan normal
- 3) Ibu primipara dan multipara

b. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan / mengeluarkan subyek yang tidak memenuhi kriteria inklusi dari studi (Nursalam, 2008).

- 1) Persalinan dengan kompilkasi
- 2) Persalinan dengan episiotomi

D. Pengumpulan data

1. Instrumen Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data sekunder dengan melihat rekam medik responden.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar pada bulan Juni - Agustus 2011.

3. Prosedur pengumpulan data

Setelah mendapatkan izin dari pimpinan pihak Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah maka akan dilakukan penelitian dengan melihat rekam medik responden.

E. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil observasi dan pengamatan yang ada maka dilakukan pengolahan data. Pengolahan data tersebut dengan tahap-tahap:

1. Editing

Proses editing dilakukan setelah data terkumpul dan dilakukan dengan memeriksa data yang ada.

2. Koding

Dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan data, semua jawaban atau data perlu disederhanakan yaitu dengan symbol-simbol tertentu, untuk setiap jawaban (pengkodean). Pengkodean dilakukan dengan memberi nomor halaman, daftar pertanyaan, nomor variabel, nama variabel dan kode.

3. Tabulasi data

Analisis Multivariat

Analisis multivariat dilakukan untuk melihat hubungan variabel independen dengan dependen. Untuk mengetahui korelasi berat badan lahir terhadap kejadian ruptur perineum dilakukan uji statistik korelasi *Chi-Square* dengan derajat kemaknaan $\alpha < 0,05$, artinya apabila $p < 0,05$ maka hipotesis diterima yang berarti ada hubungan yang bermakna antara berat badan lahir bayi dengan kejadian ruptur perineum.

G. Etika Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengajukan permohonan ijin kepada pihak rumah sakit ibu dan anak St. Fatimah untuk persetujuan dengan menekankan pada masalah etik yang meliputi ;

1. Anonimity

Untuk menjaga kerahasiaan identitas ibu bersalin, peneliti tidak akan mencantumkan nama pada catatan observasi dan pengamatan. Lembar tersebut hanya diiberi kode nomor tertentu.

2. Confidentiality

Kerahasiaan informasi yang diberikan oleh lansia dijamin oleh peneliti



BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengantar

Penelitian ini dilakukan dilaksanakan di ruang rekam medik Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar dan pengambilan datanya dilakukan mulai tanggal 29 Juni sampai 5 Agustus 2011. Desain penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian deskriptik analitik dengan pendekatan *cross sectional* untuk mengetahui hubungan berat badan lahir bayi terhadap tingkat ruptur perineum. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 150 responden yang memenuhi kriteria inklusi. Ada 180 responden yang di eksklusikan karena responden memiliki data rekam medik yang tidak lengkap dan terjadinya ruptur karena tindakan episiotomi.

2. Karakteristik Responden

a. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

Dari Tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari 150 responden yang menjadi sampel dalam penelitian pendidikan responden, ada 16 orang (10,7%) yang berpendidikan SD, 30 orang (20,0%) yang berpendidikan SMP, 90 orang (61,3%) yang berpendidikan SMA, ada 12 orang (8,0%) yang berpendidikan S1 seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Distribusi dan Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan
di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar

Pendidikan	Frekuensi	%
SD	16	10,7
SMP	30	20,0
SMA	90	61,3
S1	12	8,0
Total	150	100.0

Sumber : Data sekunder, 2010

b. Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Dari Tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 150 responden yang menjadi sampel dalam penelitian pekerjaan responden, ada 16 orang (10,7%) yang berpendidikan SD, 30 orang (20,0%) yang berpendidikan SMP, 90 orang (61,3%) yang berpendidikan SMA, ada 12 orang (8,0%) yang berpendidikan S1 seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.2
Distribusi dan Frekuensi Responden Berdasarkan Pekerjaan
di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar

Pekerjaan	Frekuensi	%
IRT	134	89,3
Wiraswasta	9	6,0
PNS	7	4,7
Total	150	100.0

Sumber : Data sekunder 2010

c. Distribusi Responden Berdasarkan Agama

Dari Tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 150 responden yang menjadi sampel dalam penelitian agama responden, ada 138 orang (92,0%) yang beragama islam, 8 orang (8,0%) yang beragama kristen, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.3
Distribusi dan Frekuensi Responden Berdasarkan Agama
di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar

Agama	Frekuensi	%
Islam	138	92,0
Kristen	12	8,0
Total	150	100.0

Sumber : Data sekunder 2010

d. Distribusi Responden Berdasarkan Umur

Dari Tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari 150 responden yang menjadi sampel dalam penelitian umur responden, ada 18 orang (12,0%) yang berumur < 20 tahun, 123 orang (82,0%) yang berumur 20 – 35 tahun, 8 orang (6,0%) yang berumur > 35 tahun, seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.4
Distribusi dan Frekuensi Responden Berdasarkan Umur
di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar

Umur (Tahun)	Frekuensi	%
< 20	18	12,0
20 – 35	123	82,0
> 35	8	6,0
Total	150	100.0

Sumber : Data sekunder 2010

e. Distribusi Responden Berdasarkan Paritas

Dari Tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari 150 responden yang menjadi sampel dalam penelitian paritas responden, ada 79 orang (52,7%) yang 1 kali melahirkan, 45 orang (30%) yang 2 kali melahirkan, 15 orang (10%) yang 3 kali melahirkan, 9 orang (6%) yang 4 kali melahirkan, 1 orang (0,7%) yang 5 kali melahirkan dan 1 orang (0,7%) yang 6 kali melahirkan seperti dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.5
Distribusi dan Frekuensi Responden Berdasarkan Umur
di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar

Paritas	Frekuensi	%
1 kali melahirkan	79	52,7
2 kali melahirkan	45	30,0
3 kali melahirkan	15	10
4 kali melahirkan	9	6,0
5 kali melahirkan	1	0,7
6 kali melahirkan	1	0,7
Total	150	100,0

Sumber : Data sekunder 2010

3. Variabel yang diteliti

a. Distribusi Responden Berdasarkan Berat Badan Lahir Bayi

Dari Tabel 5.6 menunjukkan bahwa dari 150 responden yang menjadi sampel dalam penelitian berat badan lahir bayi responden, ada 22 orang (14,7%) yang memiliki berat badan lahir rendah, 124 orang (82,2%) yang memiliki berat badan lahir normal, 4 orang (2,7%) yang

memiliki berat badan lahir makrosomia seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.6
Distribusi Responden Berdasarkan Berat Badan Lahir Bayi
di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar

Berat Badan Lahir Bayi	Frekuensi	Persentase (%)
Berat badan lahir rendah	22	14,7
Berat badan lahir normal	124	82,2
Berat badan lahir makrosomia	4	2,7
Total	150	100,0

Sumber: Data sekunder 2010

b. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Ruptur Perineum

Dari Tabel 5.7 menunjukkan bahwa dari 150 responden yang menjadi sampel dalam penelitian tingkat ruptur perineum responden, ada 46 orang (30,7%) yang mengalami ruptur perineum tingkat I, 99 orang (66,0%) yang mengalami ruptur perineum tingkat II, 3 orang (2,0%) yang mengalami ruptur perineum tingkat III, 2 orang (1,3%) yang mengalami ruptur perineum IV seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.7
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Ruptur Perineum
di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar

Tingkat Ruptur Perineum	Frekuensi	Persentase (%)
Tingkat I	46	30,7
Tingkat II	99	66,0
Tingkat III	3	2,0

Tingkat IV	2	1,3
Total	150	100,0

Sumber : Data sekunderr 2010

4. Hubungan antara Variabel yang diteliti

Setelah melakukan penelitian dapat diketahui bahwa pada bayi dengan berat badan lahir rendah di dapatkan 5 orang (22,7%) mengalami ruptur perenium tingkat I, 17 orang (77,3%) yang mengalami ruptur perenium tingkat II dan tidak ada yang mengalami ruptur perenium tingkat III dan IV. Pada berat badan lahir normal, didapatkan 41 orang (33,1%) mengalami ruptur perineum tingkat I, 82 orang (66,1%) mengalami ruptur perineum tingkat II, 1 orang (0,8%) mengalami ruptur perineum tingkat III dan tidak ada yang mengalami ruptur perineum IV. Pada berat badan lahir makrosomia didapatkan tidak yang mengalami ruptur perineum tingkat I dan II, 3 orang (2,0%) mengalami ruptur perineum tingkat III dan 1 orang (1,3%) mengalami ruptur perineum tingkat IV.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan uji statistik chi-square, dari 150 responden diperoleh nilai $p = 0,000$ lebih kecil dari nilai $p = 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima berarti ada hubungan antara berat badan lahir bayi terhadap kejadian ruptur perineum seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 5.8
Hubungan Berat Lahir Bayi dengan Tingkat Ruptur Perineum
di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar

Berat Badan Lahir	Tingkat Ruptur								Total	Chi- Square
	Tingkat I		Tingkat II		Tingkat III		Tingkat IV			
	N	%	N	%	N	%	N	%		
BBLR	5	22,7	17	77,3	0	0,0	0	0,0	22	0,000
BBLN	41	33,1	82	66,1	1	0,8	0	0,0	124	
BBLM	0	0,0	0	0,0	2	50	2	5	4	
Jumlah	46	30,7	99	66,0	3	2,0	2	1,3	150	

B. Pembahasan

Hasil penelitian yang telah dilihat bahwa dari 22 responden dengan berat badan lahir rendah, 5 orang (22,7%) yang mengalami ruptur perineum tingkat I dan 17 orang (77,3%) mengalami ruptur perineum tingkat II. Pada berat badan lahir normal dengan jumlah responden 124 orang, 41 orang (33,1%) mengalami ruptur perineum tingkat I, 82 orang (66,1%) mengalami ruptur perineum tingkat II dan 1 orang (0,8%) yang mengalami ruptur perineum tingkat III. Pada berat badan lahir makrosomia dengan jumlah responden 4 orang, 2 orang (50%) mengalami ruptur perineum tingkat III dan 2 orang (50%) mengalami ruptur peineum tingkat IV.

Berdasarkan hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa berdasarkan berat badan lahir bayi dari 150 responden diperoleh nilai $p = 0,000$ lebih kecil dari nilai $p = 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima berarti ada hubungan antara berat badan lahir bayi terhadap kejadian ruptur perineum.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kepala janin besar dan janin besar dapat menyebabkan terjadinya ruptur perineum yang lebih besar. (Sarwono Prawirohardjo, 2006)

Kepala janin merupakan bagian yang terpenting dalam persalinan. Kepala janin akan berpengaruh terhadap peregangan perineum pada saat kepala di dasar panggul dan membuka pintu dengan diameter 5-6 cm dan akan terjadi penipisan perineum, sehingga pada perineum mudah terjadi ruptur perineum yang lebih besar. (Bonny Danuatmaja dan Mila Meiliasari, 2001)

Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Andrew V, dkk dari Departemen Obstetri dan Ginekologi, Croydon, Suriah (Juni, 2008) tentang hubungan berat badan lahir bayi dengan tingkat ruptur perineum di Puskesmas Mergangsan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi pada BBLN (>2500-4000g) yaitu sejumlah 36 (80%) dari 45 kasus ruptur perineum dan pada BBLR (1500-2500g) sejumlah 9 (20%) dari 45 kasus ruptur perineum. Persalinan BBLR mayoritas mengalami ruptur perineum derajat I yaitu sejumlah 7 (77,78%) dari 9 kasus BBLR dengan ruptur perineum dan hanya 2 (22,22%) dari 9 yang mengalami ruptur perineum derajat II. Persalinan dengan BBLN terjadi ruptur perineum derajat I sejumlah 17 (47,22%), dari 36 derajat II sejumlah 14 (38,89%) dari 36 dan derajat III sejumlah 5 (13,89%) dari 36.

Setelah dilakukan analisis statistik kendall tau untuk mencari hubungan antara berat badan lahir bayi dengan derajat ruptur perineum didapatkan hasil tau hitung 0,483 atau sig 0,000<0,01 yang berarti ada hubungan antara berat badan bayi baru lahir dengan derajat ruptur perineum di Puskesmas Mergangsan tahun 2008.

Penulis mengasumsikan bahwa berat badan lahir bayi berhubungan dengan tingkat ruptur perineum karena apabila janin besar dan kepala janin

besar akan mempengaruhi peregangan perineum yang dapat meningkatkan perlukaan perineum.

Pada berat badan lahir rendah dengan jumlah responden 22 orang. Responden mayoritas mengalami ruptur perineum tingkat II daripada ruptur perineum tingkat I yaitu 17 orang (77,3%) dan 5 orang (22,7%) yang mengalami ruptur perineum tingkat I. Hal ini tidak sesuai dengan teori Sarwono Prawirohardjo yang menyatakan bahwa kepala janin besar dan janin yang besar dapat menyebabkan terjadinya ruptur perineum yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena dari 17 responden yang mengalami ruptur tingkat II, 14 orang yang ibu primipara. Pada primipara ditemukan tanda-tanda perineum utuh, vulva tertutup, himen pervoratus, vagina sempit. Pada persalinan akan terjadi penekanan pada jalan lahir lunak oleh kepala janin. Dengan perineum yang masih utuh pada primigravida akan mudah terjadi robekan perineum. Selain itu, pada primipara belum punya pengalaman melahirkan sebelumnya sehingga belum tahu cara mengedan yang baik sehingga kemungkinan untuk terjadi ruptur perineum besar dan tingkat rupturnya pun bisa lebih besar.

Selain itu, pendidikan dan umur responden juga berhubungan dengan ruptur perineum. Jika pengetahuan ibu hamil kurang tentang masalah – masalah yang bisa terjadi saat persalinan seperti ruptur perineum maka akan lebih beresiko untuk mengalami ruptur perineum. Pada umur > 35 tahun beresiko untuk mengalami ruptur perineum karena pada umur ini, fungsi alat - alat reproduksi sudah menurun. Vagina sudah berkurang keelastisannya sehingga mudah untuk terjadi ruptur perineum.

Penolong persalinan juga berperan penting dalam proses persalinan untuk mengurangi tingkat ruptur perineum dengan menahan belakang kepala bayi agar posisi kepala tetap fleksi pada saat keluar secara bertahap melewati introitus dan perineum. Melindungi perineum dan mengendalikan keluarnya kepala bayi secara bertahap dan hati-hati dapat mengurangi regangan berlebihan (robekan) pada vagina dan perineum. (Bonny Danuatmaja dan Mila Meiliasari, 2001)

Pada berat badan lahir normal dengan jumlah responden 124 orang, 41 orang (33,1%) mengalami ruptur perineum tingkat I, 82 orang (66,1%) mengalami ruptur perineum tingkat II dan 1 orang (0,8%) yang mengalami ruptur perineum tingkat III. Mayoritas responden mengalami ruptur perineum tingkat II. Hanya ada 1 responden yang mengalami ruptur perineum tingkat III, responden ini merupakan primipara sehingga tingkat rupturnya lebih tinggi.

Pada berat badan lahir makrosomia dengan jumlah responden 4 orang, 2 orang (50%) mengalami ruptur perineum tingkat III dan 2 orang (50%) mengalami ruptur perineum tingkat IV. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa kepala janin besar dan janin yang besar dapat menyebabkan ruptur perineum yang lebih besar.

Faktor yang mempengaruhi janin terlalu besar yaitu:

1. Penyakit yang diderita ibu pada saat hamil biasanya berakibat negatif kepada janin yang dikandung. Bayi yang lahir dari ibu yang menderita diabetes melitus sering menunjukkan kelainan berupa makrosomia, kardiomegali dan hiperplasia adrenal.

2. Gizi yang berlebihan mengakibatkan bayi terlalu panjang dan terlalu besar. Mengonsumsi gizi yang sehat dan seimbang dan tidak berlebihan juga dijelaskan dalam Q. S Al-A'raaf [7] : 31

يَبْنِيْءَ آدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ

لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

nahamejreT :

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) mesjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebaiknya mengonsumsi makanan sesuai kebutuhan tubuh karena makan makanan yang berlebihan juga mempunyai dampak negatif bagi tubuh terutama pada ibu hamil juga berdampak pada janinnya sehingga dapat menyebabkan komplikasi atau penyulit pada saat persalinan. Oleh karena itu, pada saat hamil ibu perlu melakukan pemeriksaan dan senantiasa mengetahui tentang gizi yang baik untuk janinnya agar senantiasa jika melahirkan bayinya sehat dan ibu melahirkan pun selamat dan bisa mengurangi tingkat kejadian ruptur perineum dan komplikasi persalinan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tidak ada hubungan antara berat badan lahir rendah dengan tingkat ruptur perineum di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.
2. Ada hubungan antara berat badan lahir normal dengan tingkat ruptur perineum di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.
3. Ada hubungan antara berat badan lahir makrosomia dengan tingkat ruptur perineum di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Perlunya petugas pelayanan kesehatan memperhatikan kerjasama dengan ibu melahirkan dan penggunaan alat manual yang tepat sehingga dapat mengatur kecepatan kelahiran bayi dan mencegah terjadinya laserasi dan mengurangi tingkat ruptur perineum yang dapat menimbulkan komplikasi persalinan seperti perdarahan post partum.
2. Perlunya meningkatkan penyuluhan terhadap ibu hamil tentang faktor-faktor yang mempengaruhi ruptur perineum sehingga pada saat persalinan kejadian ruptur perineum dapat dikurangi dan tingkat ruptur perineum dapat diminimalkan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menggunakan data primer untuk hasil yang lebih baik lagi.
4. Bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada tema yang sama dengan penelitian ini dapat diharapkan pertimbangan variabel – variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat ruptur perineum.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Anonim. 2001. Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung. Bandung : Elstar Offset

Bobalk, Lowdermilk, Jensen. 2004. *Buku Ajar Keperawatan Maternitas*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC

Danuatmaja, Bonny dan Mila Meiliasari. 2001. *Persalinan Normal tanpa Rasa Sakit*. Jakarta : Puspa Swara

Depkes. 2004. *Perawatan Luka Perineum*. <http://luka-perineum.com>. Diakses tanggal 10 Februari 2011

Ester, Monica. 2006. *Asuhan Kebidanan selama Persalinan dan Kelahiran*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC

Halminton. 2002. *Perawatan Perineum*. <http://www.perawatan-perineum.com>. Diakses tanggal 22 Desember 2010

JNPK-KR, 2007. *Prevalensi Kejadian Ruptur Perineum*. <http://prevalensi-ruptur-perineum>. Diakses tanggal 10 Februari 2011

Liu, David. 2007. *Manual Persalinan*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC

Mansjoer, Arif. 2001. *Kapita Selekta Kedokteran*. Jakarta : Media Aesculapius

Manik. 2000. *Gizi dan Berat Badan Lahir pada Ibu Post Partum*. <http://www.berat-badan-lahir.com>. Diakses tanggal 22 Desember 2010

Manuaba, Ida Bagus Gde. 2000. *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta : Pustaka Wijaya

Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.

Nursalam dan Siti Pariani. 2002. *Pedoman Praktis Metodologi Riset Keperawatan*. Jakarta: Sagung Seto.

Oxon, Harry dan William Forte. 2010. *Ilmu Kebidanan Patologi dan Fisiologi Persalinan*. Yogyakarta : Yayasan Essentia Medica

Pawirohardjo, Sarwono. 2002. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka

- _____. 2006. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta Pusat : Yayasan Bina Pustaka
- _____. 2007. *Ilmu Bedah Kebidanan*. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka
- _____. 2008. *Ilmu Kandungan*. Jakarta Pusat : Yayasan Bina Pustaka

Republika. 2009. *Perkiraan Jumlah Persalinan Di Indonesia*.

<http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/ibu-dan-anak/09/10/27/85282-perkiraanpersalinandiindonesiamencapai5juta>. Diakses tanggal 21 Februari 2011

Rini Sekartini. 2007. *Berat Badan Lahir*. <http://www.berat-badan-lahir.com>.

Diakses tanggal 22 Desember 2010.

Saifuddin. 2002. *Proses dan Prevalensi Kelahiran Hidup dan Kematian Maternal*.

<http://www.momsmiracle.com/content/view/180/85/>. Diakses tanggal 22 Desember 2010

Scott, James. 2002. *Danforth's Buku Saku Obstetri dan Ginekologi*. Jakarta : WidyaMedica

Simkin, Penny dan Ruth Ancheta. 2005. *Buku Saku Persalinan*. Jakarta : Buku Kedokteran EGC

Sumarah, Yani Widyastuti dan Nining Wiyati. 2008. *Perawatan Ibu Bersalin*. Yogyakarta : Fitramaya

Wikipedia. 2003. *Presentasi Angka Kejadian Ruptur Perineum di Indonesia* . <http://id.wikipedia.org/wiki/angka-angka-kejadian-ruptur-perineum>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2010

MASTER TABEL

NO	RESPONDEN	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	AGAMA	UMUR	PARITAS	BBL	TK. RUPTUR
1	NY. HM	4	1	1	2	2	2	2
2	NY. KT	3	1	1	2	2	2	2
3	NY. SB	3	1	1	2	2	2	1
4	NY. ST	3	1	1	2	1	2	2
5	NY. SL	3	1	2	3	4	2	1
6	NY. HD	2	1	1	1	1	2	2
7	NY. RD	2	1	1	1	1	2	2
8	NY. HD	3	1	1	2	1	2	2
9	NY. SS	3	2	1	2	3	2	1
10	NY. HJ	2	1	1	2	2	2	2
11	NY. MG	2	1	1	2	1	2	2
12	NY. RR	2	1	2	2	1	1	2
13	NY. AY	3	1	1	2	1	2	1
14	NY. KS	2	1	1	1	1	1	1
15	NY. RH	3	1	1	1	1	2	2
16	NY. AG	3	1	1	2	3	2	2
17	NY. AN	3	1	1	2	6	2	1
18	NY. ND	2	1	1	2	4	2	1
19	NY. NN	3	1	1	2	1	1	1
20	NY. IM	2	1	1	1	1	2	2
21	NY. HL	3	1	1	3	4	2	1
22	NY. SH	1	1	1	2	3	2	1
23	NY. SU	3	1	1	2	2	2	1
24	NY. SL	2	1	1	1	1	2	2
25	NY. WH	1	1	2	2	1	1	2
26	NY. RS	3	1	1	2	3	2	1
27	NY. IR	4	1	1	1	2	2	1
28	NY. TR	2	1	1	2	1	2	2
29	NY. AS	2	1	1	2	1	1	2
30	NY. SH	4	3	1	2	1	2	2
31	NY. IM	2	1	1	2	2	2	2
32	NY. BS	4	3	2	3	2	2	2
33	NY. AG	2	1	1	2	2	2	1
34	NY. WW	3	1	1	2	1	2	2
35	NY. IW	3	1	1	2	1	1	2
36	NY. ES	3	1	2	3	2	2	1
37	NY. BL	1	1	2	1	1	1	2
38	NY. KT	3	1	1	2	2	2	2
39	NY. ST	4	3	1	2	2	2	2
40	NY. DW	1	1	1	1	1	2	2
41	NY. MR	1	1	1	2	3	2	2
42	NY. EV	1`	1	1	2	2	1	2
43	NY DN	3	2	1	2	1	2	2
44	NT. TT	2	1	1	2	3	2	1
45	NY. JS	1	1	1	2	2	2	1
46	NY. HR	2	1	1	2	1	2	2
47	NY. SR	3	1	1	2	1	2	2

48	NY. HP	2	1	1	2	4	2	2
49	NY. KK	3	1	1	2	4	2	2
50	NY. SY	2	1	1	2	2	2	2
51	NY. MR	3	1	1	2	1	2	1
52	NY. SN	4	3	1	3	2	1	1
53	NY. DN	3	1	1	1	1	2	2
54	NY. AR	3	1	1	2	3	1	2
55	NY. CT	3	1	1	2	3	2	1
56	NY. GB	3	1	2	1	1	2	2
57	NY. NB	3	1	1	2	1	2	2
58	NY. WD	2	1	1	2	2	2	2
59	NY. IN	2	2	1	2	1	2	2
60	NY. MT	3	1	1	2	3	2	1
61	NY. JN	3	1	1	2	4	2	2
62	NY. EL	3	1	2	2	1	2	2
63	NY. HN	1	1	1	1	1	1	2
64	NY. NT	3	2	1	2	2	2	1
65	NY. IS	3	2	1	2	1	1	2
66	NY. DN	3	1	1	2	2	2	1
67	NY. EY	4	3	1	2	2	2	1
68	NY. ND	1	1	1	2	2	2	2
69	NY. HS	3	1	1	3	2	2	2
70	NY. SI	3	1	1	2	1	2	2
71	NY. AT	3	1	1	2	1	2	2
72	NY. HF	2	1	1	3	5	2	1
73	NY. WN	3	1	1	2	1	1	2
74	NY. HR	3	1	1	2	1	1	1
75	NY. NR	2	1	1	2	2	2	1
76	NY. AD	2	1	1	2	1	2	1
77	NY. EM	1	1	1	2	1	1	2
78	NY. RS	3	1	1	2	1	2	2
79	NY. RD	3	1	1	1	1	2	2
80	NY. MN	3	1	1	2	2	2	1
81	NY. SD	3	1	1	2	2	2	1
82	NY. EK	3	1	1	2	2	2	2
83	NY. IA	1	1	1	2	1	2	2
84	NY. ER	3	1	1	3	3	2	2
85	NY. SN	3	1	1	2	4	2	1
86	NY. MN	3	1	1	2	1	2	2
87	NY. ID	3	1	1	2	2	2	2
88	NY. NI	3	1	1	2	1	2	1
89	NY. RO	3	1	2	2	1	2	2
90	NY. MR	2	1	1	2	2	1	2
91	NY. KI	1	1	1	2	1	2	2
92	NY. IT	1	1	1	2	4	3	3
93	NY. MU	4	1	1	2	1	2	2
94	NY. JL	3	1	1	1	1	2	2
95	NY. DI	3	1	2	2	1	2	2
96	NY. NU	2	1	1	2	3	2	2
97	NY. RM	4	1	1	2	1	2	2

98	NY. SN	3	1	1	2	1	2	2
99	NY. ST	3	1	1	2	1	2	2
100	NY. AT	2	2	1	2	2	2	1
101	NY. RM	4	1	1	2	1	2	2
102	NY. NS	3	1	1	2	1	3	4
103	NY. AN	4	3	1	2	1	1	2
104	NY. SP	3	1	1	2	1	2	2
105	NY. HL	2	1	1	2	2	2	2
106	NY. AB	3	1	1	2	1	2	1
107	NY. NC	3	1	1	2	2	2	2
108	NY. CK	3	1	2	1	1	2	1
109	NY. CR	3	1	1	2	1	2	1
110	NY. WT	4	3	1	2	3	2	2
111	NY. WN	3	1	1	2	4	2	2
112	NY. SK	3	1	1	2	1	2	1
113	NY. JS	3	1	1	2	1	1	1
114	NY. JN	2	1	1	1	2	2	2
115	NY. HI	3	2	1	2	3	2	1
116	NY. TH	3	1	1	0	1	2	2
117	NY. HB	1	1	1	2	3	2	2
118	NY. AU	3	1	1	2	2	2	1
119	NY. BK	3	1	1	2	1	2	2
120	NY. BN	3	1	1	2	2	2	2
121	NY. DK	3	1	1	2	1	1	2
122	NY. DC	3	1	1	2	1	1	2
123	NY. BB	3	1	1	2	1	1	2
124	NY. LI	3	1	1	2	2	2	1
125	NY. AE	3	1	1	2	2	2	1
126	NY. RS	3	1	1	2	3	2	2
127	NY. DJ	3	1	1	2	1	2	2
128	NY. DI	3	1	1	2	2	2	1
129	NY. AM	3	1	1	2	1	2	1
130	NY. NJ	3	1	1	2	2	2	2
131	NY. AB	3	1	1	2	1	3	4
132	NY. LD	3	1	1	2	2	2	1
133	NY. RH	3	1	1	1	1	2	2
134	NY. NK	3	1	1	2	2	3	3
135	NY. BJ	3	1	1	2	1	2	2
136	NY. LM	3	1	1	2	1	2	2
137	NY. LD	1	1	1	2	2	2	2
138	NY. HJ	3	2	1	2	1	2	2
139	NY. RK	3	1	1	2	1	1	2
140	NY. SD	2	1	1	2	2	2	2
141	NY. SM	3	1	1	1	2	2	1
142	NY. DM	3	1	1	2	2	2	2
143	NY. KL	2	1	1	2	1	2	2
144	NY. KH	3	1	2	2	1	2	2
145	NY. DD	3	2	1	2	1	2	2
146	NY. JR	3	1	1	2	1	2	2
147	NY. EJ	1	1	1	2	2	2	2

148	NY. ND	3	1	1	2	1	2	3
149	NY. MI	3	1	1	2	1	2	2
150	NY. MU	2	1	1	2	1	2	2



Frequencies

Statistics

		Pendidikan	Pekerjaan	Agama	Umur	Partus	Berat Badan Lahir	Tingkat Ruptur
N	Valid	150	150	150	150	150	150	150
	Missing	0	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	16	10.7	10.7	10.7
	SMP	30	20.0	20.0	30.7
	SMA	92	61.3	61.3	92.0
	S1	12	8.0	8.0	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	IRT	134	89.3	89.3	89.3
	Wiraswasta	9	6.0	6.0	95.3
	PNS	7	4.7	4.7	100.0
	Total	150	100.0	100.0	

Agama

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Islam	138	92.0	92.0	92.0
Kristen	12	8.0	8.0	100.0
Total	150	100.0	100.0	

Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	1	.7	.7	.7
<20 tahun	18	12.0	12.0	12.7
20-35 tahun	123	82.0	82.0	94.7
>35 tahun	8	5.3	5.3	100.0
Total	150	100.0	100.0	

Paritas

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1 kali melahirkan	79	52.7	52.7	52.7
2 kali melahirkan	45	30.0	30.0	82.7
3 kali melahirkan	15	10.0	10.0	92.7
4 kali melahirkan	9	6.0	6.0	98.7
5 kali melahirkan	1	.7	.7	99.3
6 kali melahirkan	1	.7	.7	100.0
Total	150	100.0	100.0	

Berat Badan Lahir

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid BBLR	22	14.7	14.7	14.7
BBLN	124	82.7	82.7	97.3
Makrosomia	4	2.7	2.7	100.0
Total	150	100.0	100.0	

Tingkat Ruptur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tingkat 1	46	30.7	30.7	30.7
Tingkat 2	99	66.0	66.0	96.7
Tingkat 3	3	2.0	2.0	98.7
Tingkat 4	2	1.3	1.3	100.0
Total	150	100.0	100.0	

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Berat Badan Lahir * Tingkat Ruptur	150	100.0%	0	.0%	150	100.0%

Berat Badan Lahir * Tingkat Ruptur Crosstabulation

		Tingkat Ruptur				Total
		Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4	
Berat Badan Lahir BBLR	Count	5	17	0	0	22
	% within Berat Badan Lahir	22.7%	77.3%	.0%	.0%	100.0%
BBLN	Count	41	82	1	0	124
	% within Berat Badan Lahir	33.1%	66.1%	.8%	.0%	100.0%
Makrosomia	Count	0	0	2	2	4
	% within Berat Badan Lahir	.0%	.0%	50.0%	50.0%	100.0%
Total	Count	46	99	3	2	150
	% within Berat Badan Lahir	30.7%	66.0%	2.0%	1.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	125.378 ^a	6	.000
Likelihood Ratio	34.415	6	.000
Linear-by-Linear Association	5.327	1	.021
N of Valid Cases	150		

a. 8 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,05.

Risk Estimate

	Value
Odds Ratio for Berat Badan Lahir (BBLR / BBLN)	^a

a. Risk Estimate statistics cannot be computed. They are only computed for a 2*2 table without empty cells.