

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR
DENGAN ASFIKSIA BERAT
DI RSUD SYEKH YUSUF
GOWA**



KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Ahli Madya Kebidanan Jurusan Kebidanan

Pada Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Oleh

TASLIYAH NOOR NINGTIYAS

70400008054

**JURUSAN KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa KTI ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuatkan oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka KTI dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 16 Juni 2011

Tasliyah Noor Ningtiyas
Nim: 70400008054



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena atas rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah Ini, dengan judul **“Manajemen Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir Dengan Asfiksia Berat di RSUD Syekh Yusuf Gowa”** sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program DIII Kebidanan pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Tak lupa pula penulis menyampaikan salam dan shalawat semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul pilihan yang diutus untuk menyempurnakan agama terdahulu yang patut dijadikan suri tauladan dalam kehidupan.

Penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis hendak mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi tingginya dan setulus tulusnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa mengiringi langkahku dengan doa-doa dan selalu rela berkorban lahir dan batin demi terwujudnya cita-cita dan harapkanku serta kepada kakak, adik dan seluruh keluargaku yang tercinta

yang memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan Karya Tulis Ilmiah ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT. Ms, selaku rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.
3. Bapak Dr. dr. H.A. Amryn Nurdin, M.Sc., DK, selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan
4. Ibu Sitti Saleha, S. Si.T, SKM. M. Keb, selaku ketua jurusan kebidanan dan juga selaku penguji Karya Tulis Ilmiah yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar A. Md. Keb.
5. Ibu dr. Nadyah, S.Ked, selaku pembimbing Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Bapak Zulfahmi Alwi, ph.D, selaku penguji Karya Tulis Ilmiah ini yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

7. Para Dosen, Karyawan, dan Karyawati dalam lingkungan UIN Alauddin terkhusus untuk Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Program Studi Kebidanan.
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
9. Bapak dr. H. Salahuddin, M. Kes. selaku Direktur RSUD Syekh Yusuf Gowa beserta seluruh pegawai dan staf Rumah Sakit yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan
10. Semua teman-teman mahasiswi angkatan 2008 Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar serta teman teman dari AKBID lain, yang telah memberikan bantuan dan motivasinya dalam rangka penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.

Terakhir penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang ada di dalamnya, olehnya itu penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis berharap agar Karya Tulis Ilmiah ini bermanfaat buat semua pihak. Amin Ya Rabbal Alamin....

Makassar, 11 Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERYATAAN KEASLIAN KTI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Ruang lingkup pembahasan	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Manfaat Penulisan	5
E. Metode Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Bayi Baru Lahir	
1. Pengertian Bayi Baru Lahir	8
2. Perubahan Fisiologis Bayi Baru Lahir.....	9
3. Pengkajian Fisik Bayi Baru Lahir	14
4. Penilaian Umur Bayi Menurut Ballard	17
B. Tinjauan Khusus tentang Asfiksia	
1. Pengertian Asfiksia.....	21

2. Etiologi Asfiksia Bayi Baru Lahir	22
3. Klasifikasi klinis Asfiksia Bayi Baru Lahir	23
4. Tanda dan Gejala Asfiksia bayi Baru Lahir	24
5. Diagnosis Asfiksia Bayi Baru Lahir	25
6. Patofisiologi asfiksia Bayi Baru Lahir	27
7. Penatalaksanaan Asfiksia Bayi Baru Lahir	29
C. Manajemen Kebidanan	
1. Pengertian Manajemen Kebidanan	41
2. Langkah Langkah Dalam Manajemen Kebidanan	41
3. Pendokumentasian Manajemen Kebidanan	45
D. Tinjauan Islam Tentang Asfiksia dan Penanganannya	46
BAB III STUDI KASUS	
A. Langkah I. Identifikasi Data Dasar	51
B. Langkah II. Identifikasi Diagnosa / Masalah Aktual	58
C. Langkah III. Antisipasi Diagnosa / Masalah Potensial	60
D. Langkah IV. Tindakan Segera / Emergency dan Kolaborasi	61
E. Langkah V. Intervensi	63
F. Langkah VI. Implementasi	66
G. Langkah VII. Evaluasi	67
H. Pendokumentasian dalam bentuk SOAP	68
BAB IV PEMBAHASAN	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78

B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Penilaian Maturitas Fisik Menurut Ballard	17
Tabel 2.1.2 Penilaian Maturitas Neuromuskular Menurut Ballard.....	18
Tabel 2.1.3 Penilaian Maturitas	19
Tabel 2.2 Penilaian APGAR.....	24
Tabel 3.1 Penilaian APGAR Pada Bayi Ny “H”	55
Tabel 3.2.1 Penilaian Maturitas Neuromuskular Pada Bayi Ny “H” Menurut Ballard	55
Tabel 3.2.2 Penilaian Maturitas Fisik Pada Bayi Ny “H” Menurut Ballard	56

DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN

Gambar 2.1 Grafik Battalgia Dan Lubchenco.....	20
Gambar 2.2 Posisi Bayi Untuk Resusitasi.....	30
Gambar 2.3 Memeriksa Kondisi Pemasangan Sungkup.....	32
Gambar 2.4 Lokasi Kompresi Dada	35
Bagan 2.5 Bantuan Pernapasan Bayi Baru Lahir.....	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh WHO (World Health Organization) pada tahun 2008, AKN (Angka Kematian Neonatus) di dunia adalah 26 per 1.000 kelahiran hidup. Di sisi lain, kelahiran dengan asfiksia menempati urutan ke-5, yaitu sebanyak 9% sebagai penyebab kematian anak tertinggi di dunia setelah penyakit lain, pneumonia, diare, dan kelahiran prematur (WHO, 2010).

Profil kesehatan Indonesia tahun 2008 menunjukkan bahwa, pada tahun 2007 Indonesia menempati posisi ke-3 untuk AKB (Angka Kematian Bayi) tertinggi di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) yakni 34 per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan posisi pertama ditempati oleh Laos dan Myanmar dengan AKB (Angka Kematian Bayi) sebesar 70 per 1.000 kelahiran hidup dan posisi kedua ditempati oleh Kamboja dengan AKB (Angka Kematian Bayi) sebesar 67 per 1.000 kelahiran hidup.

Secara umum, AKB (Angka Kematian Bayi) di Indonesia telah mengalami penurunan. Hasil SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) dalam profil kesehatan Indonesia tahun 2008 menunjukkan AKB (Angka Kematian Bayi) pada tahun 2007 sebesar 34 per 1000 kelahiran hidup. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan hasil SDKI (Survei Demografi

dan Kesehatan Indonesia) sepanjang tahun 2002-2003 yaitu sebesar 35 per 1000 kelahiran hidup (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2009).

Dalam profil kesehatan Sulawesi Selatan tahun 2008, AKB (Angka Kematian Bayi) di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan di tahun 2007 yaitu menjadi 41 per 1.000 kelahiran hidup dibandingkan hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) selama tahun 2006 yaitu 36 per 1.000 kelahiran hidup (Dinas Kesehatan SulSel, 2009).

Dalam profil kesehatan Indonesia dijelaskan bahwa beberapa penyebab kematian bayi bermula dari masa kehamilan. Penyebab kematian bayi yang terbanyak adalah disebabkan karena pertumbuhan janin yang lambat, kekurangan gizi pada janin, kelahiran prematur dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sedangkan penyebab lainnya yang cukup banyak terjadi adalah kejadian kurangnya oksigen dalam rahim (hipoksia intrauterus) dan kegagalan nafas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir (asfiksia lahir) (Dinas Kesehatan SulSel, 2009).

Di lain pihak, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan pada tahun 2008 melaporkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2007 bahwa telah terjadi pergeseran penyebab kematian untuk semua umur yaitu dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Penyebab kematian perinatal (0-7 hari) yang terbanyak adalah gangguan pernapasan (35,9%) dan kelahiran prematur (32,3%), sedangkan untuk usia (7-28 hari) penyebab kematian yang terbanyak adalah sepsis neonatorum (20,5%) dan kelainan kongenital (18,1%) (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2008).

Dari 7,7 juta kematian bayi setiap tahun lebih dari separuh terjadi pada waktu perinatal atau usia di bawah 1 bulan. Tiga perempat dari kematian ini terjadi pada minggu pertama kehidupan. Penyebab kematian adalah asfiksia, trauma kelahiran, infeksi, prematuritas, kelainan bawaan, dan sebab sebab lain (Saifuddin, 2008).

Penelitian menunjukkan bahwa 50 % kematian bayi terjadi pada periode neonatal yaitu di bulan pertama kehidupan. Kurang baiknya penanganan bayi baru lahir yang sehat akan menyebabkan kelainan kelainan yang mengakibatkan cacat seumur hidup, bahkan kematian (Dewi, 2010).

Data yang diperoleh dari bagian rekam medik RSUD Syekh Yusuf periode Januari – November 2010 menunjukkan terdapat 1.974 kelahiran dimana 76 bayi (3,85%) mengalami asfiksia dan sisanya 1.898 bayi (96,1%) yang tidak mengalami asfiksia.

Bidan dalam pelayanan kebidanan mempunyai peranan penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak dan sebagai ujung tombak pemberi asuhan kebidanan. Oleh karena itu, bidan harus mempunyai pendekatan manajemen agar dapat mengorganisasikan semua unsur-unsur yang terlibat dalam pelayanannya dengan baik dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak .

Sebenarnya, manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan

baik dan benar. Sesuatu tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani:

إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه

“*Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)*”. (HR Thabrani)

Arah perkembangan yang jelas, landasan yang mantap dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT (Salahuddin, 2010).

Melihat data angka kematian bayi yang cukup tinggi di ASEAN serta masih tingginya kematian bayi karena asfiksia, menunjukkan bahwa masalah ini membutuhkan penanganan yang tepat karena akan mempengaruhi perkembangan dan kualitas generasi di masa yang akan datang. Mengingat pentingnya masalah ini, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian tentang kasus asfiksia bayi baru lahir di RSUD Syekh Yusuf Gowa.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Bahan studi kasus menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan bayi baru lahir dengan asfiksia berat di RSUD Syekh Yusuf Gowa

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Melaksanakan asuhan kebidanan bayi baru lahir dengan asfiksia berat berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan di RSUD Syekh Yusuf

Gowa sesuai dengan wewenang bidan.

2. Tujuan Khusus

- a. Melaksanakan pengkajian dan analisa data dasar pada bayi baru lahir dengan asfiksia berat di RSUD Syekh Yusuf Gowa
- b. Mengidentifikasi diagnosa/masalah aktual pada bayi baru lahir dengan asfiksia berat di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- c. Mengidentifikasi diagnosa/masalah potensial pada bayi baru lahir dengan dengan asfiksia berat di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- d. Melaksanakan tindakan segera dan kolaborasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia berat di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- e. Menyusun rencana tindakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan asfiksia berat di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- f. Melaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan asfiksia berat di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- g. Mengevaluasi asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan asfiksia berat di RSUD Syekh Yusuf Gowa.
- h. Mendokumentasikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan asfiksia berat di RSUD Syekh Yusuf Gowa.

D. Manfaat Penulisan

1. Instansi

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan kepada instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

2. Institusi

Sebagai bahan ilmiah atau bahan bacaan untuk penulisan berikutnya

3. Penulis

Dapat memperluas wawasan keilmuan dan menjadi sarana pengembangan diri melalui penulisan karya tulis ilmiah dan merupakan pengalaman berharga bagi penulis.

E. Metode Penulisan

Metode yang digunakan untuk penulisan karya tulis ilmiah ini adalah

1. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan membaca buku buku dan mempelajari literatur yang berhubungan dengan asfiksia.

2. Studi Kasus

Dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah dalam asuhan kebidanan yang meliputi : pengkajian dan analisa data dasar, mengidentifikasi diagnosa/masalah aktual, mengidentifikasi diagnosa/masalah potensial, melaksanakan tindakan segera dan kolaborasi, menyusun rencana tindakan asuhan kebidanan, melaksanakan tindakan asuhan kebidanan, mengevaluasi asuhan kebidanan serta mendokumentasikan asuhan kebidanan, untuk menghimpun data dan informasi dalam pengkajian dilakukan dengan menggunakan tehnik :

- a. Anamnesa

Mengadakan tanya jawab langsung dengan ibu dan petugas di ruang perinatologi yang berhubungan dengan masalah bayi.

b. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis mulai dari kepala sampai kaki meliputi pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.

c. Studi Dokumentasi

Dengan membaca dan mempelajari status serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan bayi, baik bersumber dari catatan dokter, bidan maupun sumber lain yang menunjang.

d. Diskusi

Diskusi dengan tenaga kesehatan yakni dokter, bidan maupun pembimbing karya tulis ilmiah serta sumber lain yang menunjang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Bayi Baru Lahir

1. Pengertian bayi baru lahir

- a. Bayi baru lahir adalah bayi yang baru lahir selama satu jam pertama kelahiran (Saifuddin, 2006).
- b. Bayi baru lahir disebut juga dengan neonatus merupakan individu yang sedang bertumbuh dan baru saja mengalami trauma kelahiran serta harus dapat melakukan penyesuaian diri dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin (Dewi, 2010).
- c. Bayi baru lahir (neonatus) adalah bayi usia 0 – 28 hari (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2010).
- d. Neonatus ialah bayi yang baru mengalami proses kelahiran dan harus menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstrauterin (Anonim, 2010).
- e. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat badan lahir 2.500 gram sampai 4.000 gram (Sudarti, 2010).

2. Perubahan Fisiologis Pada Bayi Baru Lahir

a. Sistem pernafasan

Selama dalam uterus, janin mendapat oksigen dari pertukaran gas melalui plasenta dan setelah bayi lahir, pertukaran gas harus melalui paru paru bayi. Dalam uterus, paru janin terisi cairan. Selama kelahiran pervagina, tekanan yang terjadi pada thoraks menyebabkan sebanyak 28 ml, atau kira kira 1/3 cairan, keluar dari percabangan pernapasan atas. Sisanya akan diabsorpsi ke dalam limfatik paru (Walsh, 2007).

Pernafasan pertama pada bayi normal terjadi pada waktu 30 detik pertama sesudah lahir. Usaha bayi pertama kali untuk mempertahankan tekanan alveoli, selain karena adanya surfaktan, juga karena adanya tarikan napas dengan merintih sehingga udara bisa tertahan di dalam. Untuk frekuensi dan dalamnya nafas belum teratur. Apabila surfaktan kurang, maka alveoli akan kolaps dan paru paru kaku, sehingga terjadi atelektatis. Dalam kondisi seperti ini (anoksia), neonatus masih dapat mempertahankan hidupnya karena adanya kelanjutan metabolisme anaerob (Dewi, 2010).

b. Sistem peredaran darah

Pada janin masih terdapat fungsi : foramen ovale, duktus arteriosus Botalli, arteria umbilikal lateral. Ketika janin dilahirkan, segera bayi menghisap udara dan menangis kuat. Dengan demikian, paru parunya akan berkembang. Tekanan dalam paru paru akan

mengecil dan seolah olah darah terisap ke dalam paru paru. Dengan demikian, duktus botalli tidak berfungsi lagi. Demikian pula, karena tekanan dalam atrium kiri meningkat, foramen ovale akan tertutup, sehingga foramen tersebut selanjutnya tidak berfungsi lagi. Akibat dipotong dan diikatnya tali pusat, arteri umbilikalis dan duktus venosus arantii akan mengalami obliterasi (Wiknjosastro, 2007).

c. Perubahan pada darah

Bayi baru lahir dilahirkan dengan nilai hematokrit/ hemoglobin yang lebih tinggi. Konsentrasi Hemoglobin normal memiliki rentang dari 13,7 sampai 20,0 gr/dL. Hemoglobin yang dominan pada periode janin, yaitu hemoglobin F, secara bertahap lenyap pada satu bulan pertama kehidupan. Hemoglobin janin memiliki afinitas yang tinggi terhadap oksigen, suatu efek yang menguntungkan bagi janin. Selama beberapa hari pertama kehidupan nilai nilai hemoglobin sedikit meningkat, sedangkan volume plasma menurun. Nilai hemoglobin rata rata untuk bayi berusia 2 bulan ialah 12,0 g/dL.

Sel darah merah bayi baru lahir memiliki umur yang singkat, yaitu rata rata 80 hari (berbeda dari umur sel darah merah orang dewasa, yaitu 120 hari). Pergantian sel yang lebih cepat ini menghasilkan lebih banyak sampah metabolit akibat penghancuran sel termasuk bilirubin, yang harus dimetabolisme. Muatan bilirubin yang

berlebihan ini menyebabkan ikterus fisiologis yang biasa terlihat pada bayi baru lahir.

Jumlah sel darah putih rata rata pada bayi baru lahir memiliki rentang dari 10.000 hingga 30.000/mm³. Peningkatan lebih lanjut dapat terjadi pada bayi baru lahir normal selama 24 jam pertama kehidupan (Varney, 2007).

d. Suhu tubuh

Bayi baru lahir terutama rentan pada kehilangan panas dan terbatas kemampuannya untuk berespons terhadap stress dingin (Walsh, 2007). Empat kemungkinan mekanisme yang dapat menyebabkan bayi kehilangan panas adalah :

1) Konduksi

Konduksi adalah kehilangan panas dari objek hangat dalam kontak langsung dengan objek yang lebih dingin (Walsh, 2007). Panas dihantarkan dari tubuh bayi ke benda di sekitarnya yang kontak langsung dengan tubuh bayi (pemindahan panas dari tubuh bayi ke objek lain melalui kontak langsung). Sebagai contoh, konduksi bisa terjadi ketika menimbang bayi tanpa alas timbangan, memegang bayi saat tangan dingin, dan menggunakan stetoskop dingin untuk pemeriksaan bayi baru lahir (Dewi, 2010).

2) Radiasi

Panas dipancarkan dari bayi baru lahir keluar dari tubuhnya ke lingkungan yang lebih dingin (pemindahan panas antara 2 objek yang mempunyai suhu berbeda). Sebagai contoh, membiarkan bayi baru lahir dalam ruangan ber AC tanpa pemanas, membiarkan bayi baru lahir dalam keadaan telanjang, atau menidurkan bayi baru lahir berdekatan dengan ruangan yang dingin (Dewi, 2010).

3) Konveksi.

Panas hilang dari tubuh bayi ke udara di sekitarnya yang sedang bergerak (jumlah panas yang hilang bergantung pada kecepatan dan suhu udara). Sebagai contoh, konveksi dapat terjadi ketika membiarkan atau menempatkan bayi baru lahir dekat jendela, atau membiarkan bayi baru lahir di ruangan yang terpasang kipas angin.

4) Evaporasi

Evaporasi ini dipengaruhi oleh jumlah panas yang dipakai, tingkat kelembapan udara, dan aliran udara yang melewati (Dewi, 2010). Bayi bersifat evaporatif. Bayi baru lahir juga mempunyai area permukaan relatif lebih lebar dalam kaitannya dengan massa tubuh, yang memberi lebih banyak pertemuan dengan lingkungan lebih dingin (Walsh, 2007).

Apabila bayi baru lahir diletakkan dalam suhu kamar 25°C, maka bayi akan kehilangan panas melalui konveksi,

radiasi, dan evaporasi yang besarnya 200 kg/BB, sedangkan yang dibentuk hanya sepersepuluhnya saja (Dewi, 2010).

e. Metabolisme

Luas permukaan tubuh neonatus relatif lebih luas dari permukaan tubuh orang dewasa, sehingga metabolisme basal per kg berat badan akan lebih besar. Oleh karena itulah, Bayi baru lahir harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru sehingga energi dapat diperoleh dari metabolisme karbohidrat dan lemak.

f. Keseimbangan air dan fungsi ginjal

Kebutuhan neonatus terhadap air sangat besar. Pada bayi cukup bulan, 78 % dari total berat badan adalah air (Walsh, 2007).

Pada waktu lahir, terjadi perubahan fisiologik yang menyebabkan berkurangnya cairan ekstraseluler. Dengan ginjal yang makin matur dan beradaptasi dengan kehidupan ektrauterin, ekskresi urin bertambah mengakibatkan berkurangnya cairan ekstraseluler (sebagai salah satu penyebab turunnya berat badan bayi baru lahir pada minggu minggu permulaan) (Saifuddin, 2006).

g. Traktus digestivus

Pada neonatus, traktus digestivus mengandung zat berwarna hitam kehijauan yang terdiri dari mukopolisakarida atau disebut juga dengan mekonium. Pengeluaran mekonium biasanya pada 10 jam pertama kehidupan dan dalam 4 hari setelah kelahiran biasanya feses sudah terbentuk dan berwarna biasa. Enzim dalam traktus

digestivus biasanya sudah terdapat pada neonatus, kecuali enzim amilase pankreas.

h. Hati

Segera setelah lahir, hati menunjukkan perubahan kimia dan morfologis yang berupa kenaikan kadar protein dan penurunan kadar lemak dan glikogen. Enzim hati belum aktif benar pada waktu bayi baru lahir, daya detoksifikasi hati pada neonatus juga belum sempurna.

i. Keseimbangan asam basa

Tingkat keasaman (PH) darah pada waktu lahir umumnya rendah karena glikolisis anaerobik. Namun, dalam waktu 24 jam, neonatus telah mengkompensasi asidosis ini (Dewi, 2010).

3. Pengkajian Fisik Bayi Baru Lahir

Pemeriksaan fisik bayi baru lahir adalah pemeriksaan awal terhadap bayi setelah berada di dunia luar yang bertujuan untuk mendeteksi adanya kelainan fisik dan ketiadaan refleks primitif.

Pengkajian fisik adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi tentang anak dan keluarganya dengan menggunakan semua pancaindera, baik subjektif maupun objektif. Pengkajian fisik bayi baru lahir dan perkembangannya dilakukan bersamaan ketika melakukan pemeriksaan secara inspeksi maupun observasi. Adapun Aspek yang dikaji yaitu :

a. Menilai keadaan umum bayi.

- 1) Menilai secara keseluruhan apakah bagian tubuh bayi proporsional atau tidak.
 - 2) Periksa bagian kepala, badan, dan ekstremitas akan adanya kelainan.
 - 3) Periksa tonus otot dan tingkat aktivitas bayi, apakah gerakan bayi aktif atau tidak?
 - 4) Periksa warna kulit dan bibir, apakah warnanya kemerahan atau kebiruan?
 - 5) Periksa tangisan bayi, apakah melengking, merintih, atau normal?
- b. Tanda tanda vital
- 1) Periksa laju napas dengan melihat tarikan napas pada dada dan gunakan petunjuk waktu. Status pernapasan yang baik adalah napas dengan laju normal 40-60 kali per menit .
 - 2) Periksa denyut jantung dengan menggunakan stetoskop dan petunjuk waktu. Denyut jantung normal adalah 120-160 kali per menit dan tidak terdengar bunyi mur mur.
 - 3) Periksa suhu dengan menggunakan termometer aksila. Suhu normal adalah 36,5-37,2 ° C.
- c. Periksa bagian kepala bayi
- 1) Ubun ubun.
 - 2) Sutura dan molase.

- 3) Penonjolan atau daerah mencekung. Periksa adanya kelainan, baik karena trauma persalinan (caput succedaneum, cephal haematoma) atau adanya cacat kongenital.
 - 4) Ukur lingkar kepala.
- d. Lakukan pemeriksaan telinga karena akan dapat memberikan gambaran letak telinga dengan mata dan kepala serta diperiksa adanya kelainan lainnya.
 - e. Periksa mata akan adanya tanda tanda infeksi.
 - f. Periksa hidung dan mulut, langit langit, bibir, dan refleks isap, serta rooting. Periksa adanya kelainan kongenital seperti labiopalatoskizis.
 - g. Periksa leher bayi, perhatikan adanya pembesaran atau benjolan.
 - h. Periksa alat kelamin. Hal yang perlu diperhatikan adalah :
 - 1) Laki laki : Testis berada pada skrotum atau penis berlubang.
 - 2) Perempuan : vagina berlubang, uretra berlubang, dan terdapat labia mayora dan minora.
 - i. Periksa tungkai dan kaki. Perhatikan gerakan dan kelengkapan alat gerak.
 - j. Periksa punggung dan anus. Perhatikan akan adanya pembengkakan atau cekungan pada punggung juga adanya lubang anus.
 - k. Periksa kulit. Perhatikan adanya verniks, pembengkakan atau bercak hitam, serta tanda lahir.
 - l. Lakukan penimbangan berat badan (Dewi, 2010).

4. Penilaian umur bayi menurut Ballard




































Sistem penilaian ini dikembangkan oleh Dr. Jeanne L Ballard, MD untuk menentukan usia gestasi bayi baru lahir melalui penilaian neuromuskular dan fisik. Penilaian neuromuskular meliputi postur, *square window*, *arm recoil*, sudut popliteal, *scarf sign* dan *heel to ear maneuver*. Penilaian fisik yang diamati adalah kulit, *lanugo*, permukaan plantar, payudara, mata/telinga, dan genitalia .

Tabel 2.1.1 Penilaian Maturitas Fisik Menurut Ballard

Nilai	-1	0	1	2	3	4	5
Kulit	Lengket, mudah terkelupas, transparan	Mirip gelatin, merah, tembus cahaya	Vena terlihat merah muda, halus	Pengelupasan superfisial dan/atau ruam, sedikit vena	Pecah-pecah daerah pucat, vena jarang	Kencang, pecah-pecah yang dalam, vena tidak terlihat	Kasar, pecah-pecah, keriput
Lanugo	Tidak ada	Jarang	Sangat banyak	Tipis	Ada daerah botak	Sebagian besar botak	
Lipatan plantar	Tumit jari-jari 40-50 mm : -1 <40 mm : -2	> 50 mm Tidak ada lipatan	Tanda merah sedikit	Hanya ada lipatan melintang anterior	Lipatan anterior 2/3	Lipatan di seluruh telapak kaki	
Payudara	Tidak terlihat	Sedikit Terlihat	Aerola datar, tak ada penonjolan	Aerola tipis, penonjolan 1-2 mm	Aerola menonjol, penonjolan 3-4 mm	Aerola penuh, penonjolan 5-10 mm	
Mata/ Telinga	Kelopak mata menutup tidak terlalu rapat : -1, rapat : -2	Kelopak mata terbuka; daun telinga datar, tetap terlipat	Daun telinga sedikit melengkung, lunak; rekoil lambat	Daun telinga melengkung sempurna, lunak, tetapi mudah rekoil	Rekoil cepat dan menetap, daun telinga sempurna dan keras	Kartilago tebal, telinga kaku	
Genitalia (pria)	Skrotum datar, licin	Skrotum kosong, rugae tipis	Testis berada di kanalis atas, rugae jarang	Testis turun, rugae agak rapat	Testis di bawah, rugae baik	Testis menggantung, lipatan rugae dalam	
Genitalia (Wanita)	Klitoris menonjol, labia datar	Klitoris menonjol, labia minora kecil	Klitoris menonjol labia minora membesar	Labia mayora dan minora sama-sama menonjol.	Labia mayora besar, labia minora kecil	Labia mayora menutupi klitoris dan labia minora	

Sumber : Varney, 2007

Tabel 2.1.2 Penilaian Maturitas Neuromuskular Menurut Ballard

	-1	0	1	2	3	4	5
Sikap							
Sudut pergelangan tangan	 >90°	 90°	 60°	 45°	 30°	 0°	
Recoil lengan		 180°	 140°-180°	 110°-140°	 90°-110°	 < 90°	
Sudut poplitea	 180°	 160°	 140°	 120°	 100°	 90°	 < 90°
Tanda scarf							
Tumit-ke-telinga							

Sumber : Varney, 2007

Cara menilai aktifitas neuromuskular :

- Sikap (*posture*) : dinilai bila dalam keadaan terlentang dan tenang
- Sudut pergelangan tangan (*square window*) : tangan bayi difleksikan di ibu jari dan telunjuk pemeriksa lalu diukur sudut antara hypothenar eminence dengan korean (tangan depan).
- Membaliknya lengan (*arm recoil*), lakukan fleksi lengan bawah selama 5 detik, kemudian lengan tersebut diekstensikan dan dilepas. Nilailah derajat kembalinya ke posisi fleksi.
- Sudut poplitea (*poplitea angle*) : bayi tidur terlentang, paha dipegang sehingga terdapat posisi lutut – dada (*knee – chest position*), setelah itu dilakukan ekstensi tungkai bawah, ukurlah sudut di bawah lutut tersebut.

- e. Tanda selempangan (*scraf sign*) : posisi terlentang, peganglah salah satu lengan bayi dan usahakan lengan bayi mencapai leher posterior dari bahu sisi lainnya. Angkat dan geserlah siku bayi di atas dadanya dan lihat sampai di mana siku tersebut dapat digeser. Makin muda bayi makin mudah bergeser sikunya melewati garis tengah ke sisi lainnya.
- f. Tumit ke telinga (*heel or ear*) : posisi terlentang, gerakkan kaki bayi ke telinga dari sisi yang sama, perhatikan jarak yang tidak mencapai telinga dan ekstensi lutut (Wiknjosastro, 2005).

Setelah didapatkan jumlah skor dari pemeriksaan neuromuskuler dan maturasi fisik, maka kedua skor itu dijumlahkan. Hasil penjumlahan tersebut dicocokkan dengan tabel nilai kematangan, sehingga didapatkan usia kehamilan dalam minggu.


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Tabel 2.1.3 Penilaian Maturitas

Nilai	Minggu
-10	20
-5	22
0	24
5	26
10	28
15	30
20	32
25	34
30	36
35	38
40	40
45	42
50	44

Sumber : Varney, 2007

Kemudian dengan menggunakan grafik dari Battalgia f dan Lubchenco dicari titik perpotongan antara umur kehamilan yang kita

dapatkan dengan berat badan lahir bayi, sehingga didapat interpretasi apakah bayi tersebut Besar Masa Kehamilan (BMK), Sesuai Masa kehamilan (SMK), atau Kecil Masa Kehamilan (KMK).



Gambar 2.1 Grafik Battaglia dan Lubchenco

Sumber : Wiknjastro, 2005

B. Tinjauan Khusus Tentang Asfiksia

1. Pengertian asfiksia

- a. Asfiksia pada bayi baru lahir (ringan atau berat) merupakan sindrom dengan gejala apnea sebagai manifestasi klinis yang utama (Oxorn, 2010).
- b. Asfiksia neonatorum merupakan suatu keadaan pada bayi baru lahir yang mengalami gagal bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir, sehingga bayi tidak dapat memasukkan oksigen dan tidak dapat mengeluarkan zat asam arang dari tubuhnya (Dewi, 2010).
- c. Asfiksia neonatorum adalah kegagalan bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir (WHO, 2008).
- d. Asfiksia neonatorum adalah kegagalan napas secara spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah saat lahir yang ditandai dengan hipoksemia, hiperkarbia dan asidosis (IDI, 2008).
- e. Asfiksia adalah keadaan dimana bayi baru lahir tidak dapat bernapas secara spontan dan teratur (JNPK-KR, 2007).
- f. Asfiksia neonatorum ialah keadaan dimana bayi tidak dapat segera bernapas secara spontan dan teratur setelah lahir (Wikjosastro, 2007).
- g. Asfiksia neonatorum merupakan kegagalan anak untuk bernapas saat lahir. Pada keadaan ini terjadi defisiensi oksigen dalam darah dan peningkatan karbondioksida dalam darah serta jaringan (Tiran, 2005).

Diantara semua defenisi mengenai asfiksia neonatorum diatas, defenisi yang paling umum digunakan mengacu pada defenisi yang dibuat oleh World Health Organisation (WHO).

2. Etiologi asfiksia bayi baru lahir.

Asfiksia bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yakni faktor ibu, plasenta, fetus, dan neonatus.

a. Ibu.

Hipoksia janin yang menyebabkan asfiksia terjadi karena gangguan pertukaran gas serta transpor O₂ dari ibu ke janin sehingga terdapat gangguan dalam persediaan O₂ dan dalam menghilangkan CO₂. Gangguan ini dapat berlangsung secara menahun akibat kondisi atau kelainan pada ibu selama kehamilan, atau secara mendadak karena hal – hal yang diderita ibu dalam persalinan (Wiknjosastro, 2007).

Preeklamsi, partus lama atau macet dan kehamilan lewat waktu termasuk beberapa faktor ibu yang dapat menjadi penyebab terjadinya asfiksia bayi baru lahir (JNPK-KR, 2007). Persalinan sungsang dapat menyebabkan asfiksia karena sering terjadi kemacetan persalinan kepala yang dapat menyebabkan aspirasi air ketuban dan lendir, perdarahan, atau edema jaringan otak sampai kerusakan persendian tulang leher.

b. Plasenta.

Pertukaran gas antara ibu dan janin dipengaruhi oleh luas dan kondisi plasenta, misalnya solusio plasenta, perdarahan plasenta, dan lain lain.

c. Fetus

Kompresi umbilikus akan dapat mengakibatkan terganggunya aliran darah dalam pembuluh darah umbilikus dan menghambat pertukaran gas antara ibu dan janin. Kompresi umbilikus ini bisa terjadi pada persalinan sungsang karena tali pusat yang terjepit antara janin dan jalan lahir.

d. Neonatus.

Depresi pusat pernapasan pada bayi baru lahir dapat terjadi karena beberapa hal berikut :

- 1) Pemakaian anastesi berlebihan pada ibu.
- 2) Trauma yang terjadi selama persalinan.
- 3) Kelainan kongenital pada bayi (Dewi, 2010).

3. Klasifikasi klinis asfiksia bayi baru lahir

Apgar score merupakan sistem penilaian yang diciptakan oleh Dr. Virginia Apgar untuk menilai keadaan bayi dalam usia beberapa menit pertama dan dengan sistem ini, asfiksia neonatorum yang berat dapat didiagnosis dan ditangani segera (Tiran, 2005).

Penilaian ini perlu untuk mengetahui apakah bayi menderita asfiksia atau tidak. Sehingga berdasarkan hasil penilaian apgar, asfiksia dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu :

- a. Asfiksia ringan (nilai apgar 7-10).
- b. Asfiksia sedang (nilai apgar 4-6).
- c. Asfiksia berat (nilai apgar 0-3) (Dewi, 2010).

Table 2.2. Penilaian APGAR

Tanda	Score		
	0	1	2
Appearance (warna kulit)	Pucat	Tubuh kemerahan, ekstremitas biru	Tubuh dan ekstremitas kemerahan
Pulse rate (Denyut nadi)	Tidak ada	≤ 100 x/i	≥ 100 x/i
Grimace (reaksi rangsangan)	Tidak ada	Sedikit gerakan mimik	Batuk, bersin
Activity (tonus otot)	Lumpuh	Ekstremitas dalam sedikit fleksi	Gerakan aktif
Respiratory (usaha pernafasan)	Tidak ada	Lemah / tidak teratur	Baik, menangis

(Sumber Wiknjosastro, 2007)

4. Tanda dan gejala asfiksia bayi baru lahir

a. Asfiksia berat (nilai APGAR 0-3)

Tanda dan gejala yang sering muncul pada Asfiksia berat yaitu :

1. Frekuensi jantung kecil, yaitu ≤ 40 kali per menit.
2. Tidak ada usaha napas.
3. Tonus otot lemah bahkan hampir tidak ada.
4. Bayi tidak dapat memberikan reaksi bila diberikan rangsangan.
5. Bayi tampak pucat bahkan sampai berwarna kelabu.

b. Asfiksia sedang (nilai APGAR 4-6)

Pada Asfiksia sedang tanda dan gejala yang sering muncul adalah sebagai berikut :

- 1) Frekuensi jantung menurun menjadi 60-80 kali permenit.
- 2) Usaha napas lambat.
- 3) Tonus otot biasanya dalam keadaan baik.
- 4) Bayi masih dapat bereaksi terhadap rangsangan yang diberikan.

5) Bayi tampak sianosis.

c. Asfiksia ringan (nilai APGAR 7-10).

Pada asfiksia ringan tanda dan gejala yang sering muncul adalah sebagai berikut :

1) Takipnea dengan napas lebih dari 60 kali permenit.

2) Bayi tampak sianosis.

3) Adanya retraksi sel iga.

4) Bayi merintih.

5) Adanya pernapasan cuping hidung.

6) Bayi kurang aktifitas (Dewi, 2010).

5. Diagnosis asfiksia bayi baru lahir

Asfiksia pada bayi biasanya merupakan kelanjutan dari anoksia/hipoksia janin. Diagnosis apoksia/hipoksia janin dapat dibuat dalam persalinan dengan ditemukannya tanda tanda gawat janin (Wiknjosastro, 2007). Diagnosis asfiksia neonatorum dapat ditegakkan berdasarkan :

a. Anamnesis

Anamnesis diarahkan untuk mencari faktor risiko terhadap terjadinya asfiksia neonatorum.

b. Pemeriksaan fisik

1) Bayi tidak bernapas atau menangis.

2) Denyut jantung kurang dari 100 x/menit.

Denyut jantung yang bervariasi mengindikasikan kemampuan janin untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi.

Peningkatan denyut jantung sementara dapat mengindikasikan asfiksia intrauterus dan menunjukkan derajat stress pada janin (Boyle, 2007).

- 3) Tonus otot menurun.
- 4) Cairan ketuban ibu bercampur mekonium, atau terdapat sisa mekonium pada tubuh bayi.

Mekonium dalam presentase sungsang tidak ada artinya, akan tetapi pada presentase kepala mungkin menunjukkan gangguan oksigenasi dan harus menimbulkan kewaspadaan. Adanya mekonium dalam air ketuban pada presentasi kepala dapat merupakan indikasi untuk mengakhiri persalinan (Wiknjosastro, 2007).

Gawat janin dan atau likuor yang terwarnai mekonium merupakan tanda peringatan dalam persalinan, yang akan mempengaruhi keputusan bidan untuk memindahkan ibu ke rumah sakit dan untuk memanggil dokter spesialis anak ketika kelahiran akan terjadi (Boyle, 2007).

- 5) BBLR.

c. Pemeriksaan penunjang

Labolatorium : hasil analisis gas darah tali pusat menunjukkan hasil asidosis pada darah tali pusat .

Adanya asidosis menyebabkan turunnya PH. Apabila PH itu turun sampai di bawah 7,2 hal itu dapat dianggap sebagai tanda bahaya oleh beberapa penulis (Wiknjosastro, 2007).

Derajat Asidosis penting saat mengkaji kesejahteraan janin dalam persalinan. Kadar yang lebih dari 7,25 adalah normal, antara 7,20 dan 7,25 dianggap pra-asidosis, dan kadar kurang dari 7,20 mengindikasikan asidosis. Derajat asidosis mengindikasikan kadar asam laktat dalam sistem janin yang meningkat akibat kekurangan oksigen dan peningkatan karbondioksida dalam aliran darah. Hal ini mengindikasikan hipoksia in utero (Boyle, 2007).

6. Patofisiologi asfiksia bayi baru lahir

Gangguan suplai darah teroksigenasi melalui vena umbilikal dapat terjadi pada saat antepartum, intrapartum, dan tentunya pasca partum saat tali pusat dipotong. Awalnya hanya ada sedikit napas. Sedikit napas ini dimaksudkan untuk mengembangkan paru, tetapi bila paru mengembang saat kepala masih di jalan lahir, atau bila paru tidak mengembang karena suatu hal, aktivitas singkat ini akan diikuti oleh henti napas komplet. Kejadian ini disebut apnea primer (Drew, 2008).

Rangsangan seperti mengeringkan atau menepuk telapak kaki akan menimbulkan pernapasan. Walaupun demikian bila kekurangan oksigen terus berlangsung, bayi akan melakukan beberapa usaha bernapas megap-megap dan kemudian terjadi apnu sekunder, rangsangan saja tidak akan menimbulkan kembali usaha pernapasan bayi baru lahir. Bantuan pernapasan harus diberikan untuk mengatasi masalah akibat kekurangan oksigen.

Frekuensi jantung mulai menurun pada saat bayi mengalami apnu primer. Tekanan darah akan tetap bertahan sampai dimulainya apnu sekunder.

Bayi dapat berada pada fase antara apnu primer dan apnu sekunder dan seringkali keadaan yang membahayakan ini dimulai sebelum atau selama persalinan. Akibatnya saat lahir, sulit untuk menilai berapa lama bayi telah berada dalam keadaan membahayakan. Pemeriksaan fisik tidak dapat membedakan antara apnu primer dan sekunder, namun respon pernapasan yang ditunjukkan akan dapat memperkirakan kapan mulai terjadi keadaan yang membahayakan itu.

Jika bayi menunjukkan tanda pernapasan segera setelah dirangsang, itu adalah apnu primer. Jika tidak menunjukkan perbaikan apa-apa, ia dalam keadaan apnu sekunder. Sebagai gambaran umum, semakin lama seorang bayi dalam keadaan apnu sekunder, semakin lama pula dia bereaksi untuk dapat memulai pernapasan (Departemen Kesehatan R.I, 2008).

Apnea sekunder cepat menyebabkan kematian jika bayi tidak benar benar didukung oleh pernapasan buatan dan bila diperlukan, kompresi jantung. Selama apnea sekunder, frekuensi jantung dan tekanan darah menurun. Warna bayi berubah dari biru ke putih karena bayi baru lahir menutup sirkulasi perifer sebagai upaya memaksimalkan aliran darah ke organ organ, seperti jantung dan ginjal (Varney, 2007).

Pada hipoksia yang berkelanjutan, kekurangan oksigen untuk menghasilkan energi bagi metabolisme tubuh menyebabkan terjadinya proses glikolisis anerobik. Produk sampingan proses tersebut (asam laktat dan piruvat) menimbulkan peningkatan asam organik tubuh yang berakibat

menurunnya PH darah sehingga terjadilah asidosis metabolik. Perubahan sirkulasi dan metabolisme ini secara bersama sama akan menyebabkan kerusakan sel baik sementara ataupun menetap (Departemen Kesehatan R.I, 2008).

7. Penatalaksanaan asfiksia bayi baru lahir

Sekalipun sebagian besar bayi akan menangis dalam waktu 2-3 detik tetapi sebagian masih memerlukan langkah untuk resusitasi (Manuaba, 2008).

Pada pemeriksaan atau penilaian awal dilakukan dengan menjawab 4 pertanyaan: apakah bayi cukup bulan?, apakah air ketuban jernih?, apakah bayi bernapas atau menangis?, apakah tonus otot bayi baik atau kuat?

Bila semua jawaban “ya” maka bayi dapat langsung dimasukkan dalam prosedur perawatan rutin dan tidak dipisahkan dari ibunya. Bila terdapat jawaban “tidak” dari salah satu pertanyaan di atas maka bayi memerlukan satu atau beberapa tindakan resusitasi berikut ini secara berurutan:

a. Langkah awal dalam stabilisasi

1) Jaga bayi tetap hangat

Letakkan bayi diatas kain yang ada di perut ibu. Selimuti bayi dengan kain tersebut, potong tali pusat. Pindahkan bayi ke atas kain tempat resusitasi.

2) Atur posisi bayi

Baringkan bayi terlentang dengan kepala di dekat penolong. Ganjal bahu agar kepala sedikit ekstensi. Agar posisi faring, laring, dan

trakea dalam satu garis lurus yang akan mempermudah masuknya udara. Posisi ini adalah posisi terbaik untuk melakukan ventilasi dengan balón dan sungkup dan/atau untuk pemasangan pipa endotrakeal (Departemen Kesehatan R.I, 2008).



Gambar 2.2 posisi bayi untuk resusitasi.

Sumber : Yulianti, 2005

3) Membersihkan jalan napas sesuai keperluan .

Cara yang tepat untuk membersihkan jalan napas adalah bergantung pada keaktifan bayi dan ada/tidaknya mekonium. Bila terdapat mekonium dalam cairan amnion dan bayi tidak bugar (bayi mengalami depresi pernapasan, tonus otot kurang dan frekuensi jantung kurang dari 100x/menit) segera dilakukan penghisapan trakea sebelum timbul pernapasan untuk mencegah sindrom aspirasi mekonium.

Penghisapan trakea meliputi langkah-langkah pemasangan laringoskop dan selang endotrakeal ke dalam trakea, kemudian dengan kateter penghisap dilakukan pembersihan daerah mulut, faring dan trakea sampai epiglotis.

Bila terdapat mekoneum dalam cairan amnion namun bayi tampak bugar, pembersihan sekret dari jalan napas dilakukan seperti pada bayi tanpa mekoneum (Departemen Kesehatan R.I, 2008).

Berikut ini cara menggunakan alat penghisap lendir delee atau bola karet.


- a) Hisap lendir dalam mulut, kemudian baru hisap lendir di hidung.
 - b) Hisap lendir sambil menarik keluar penghisap (bukan pada saat memasukkan).
 - c) Bila menggunakan penghisap lendir delee, jangan memasukkan ujung penghisap terlalu dalam (lebih dari 5 cm ke dalam mulut atau lebih dari 3 cm ke dalam hidung) karena dapat menyebabkan denyut jantung bayi melambat atau henti napas bayi (JNPK-KR, 2007).
- 4) Keringkan dan rangsang bayi.
- a) Keringkan bayi dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya dengan sedikit tekanan. Rangsangan ini dapat memulai pernapasan bayi atau bernapas lebih baik.
 - b) Lakukan rangsangan taktil dengan beberapa cara : menepuk atau menyentil telapak kaki atau menggosok punggung, perut, dada atau tungkai bayi dengan telapak tangan (JNPK-KR, 2007).
- 5) Atur kembali posisi kepala dan selimuti bayi.
- 6) Lakukan penilaian bayi.

- a) Lakukan penilaian apakah bayi bernapas normal, berikan pada ibunya :
- (1) Letakkan bayi di atas dada ibu dan selimuti keduanya untuk menjaga kehangatan tubuh bayi melalui persentuhan kulit ibu-bayi.
 - (2) Anjurkan ibu untuk menyusukan bayi sambil membelainya.
- b) Bila bayi tidak bernapas atau mengangap mengangap, segera lakukan tindakan ventilasi. (JNPK-KR, 2007)
- b. Ventilasi

Ventilasi adalah bagian dari tindakan resusitasi untuk memasukkan sejumlah udara ke dalam paru dengan tekanan positif yang memadai untuk membuka alveoli paru agar bayi bisa bernapas spontan dan teratur.

1) Pemasangan sungkup

Pasang dan pegang sungkup agar menutupi mulut dan hidung bayi.



Gambar 2.3 Memeriksa kondisi pemasangan sungkup

Sumber : Yulianti, 2005

- 2) Ventilasi percobaan (2 kali).
 - a) Lakukan tiupan udara dengan tekanan 30 cm air.

Tiupan awal ini sangat penting untuk membuka alveoli paru agar bayi mulai bisa bernapas dan sekaligus menguji apakah jalan napas terbuka atau bebas.
 - b) Lihat apakah dada bayi mengembang.
 - (1) Bila dada tidak mengembang.
 - (a) Periksa posisi kepala, pastikan posisinya benar.
 - (b) Periksa pemasangan sungkup (lihat gambar 2.3) dan pastikan tidak terjadi kebocoran.
 - (c) Periksa ulang, apakah jalan napas tersumbat cairan atau lendir (isap kembali)
 - (2) Bila dada mengembang, lakukan tahap berikutnya.
- 3) Ventilasi definitif (20 kali dalam 30 detik).
 - a) Lakukan peniupan dengan tekanan 20 cm air, 20 kali dalam 30 detik.
 - b) Pastikan udara masuk (dada mengembang) dalam 30 detik tindakan.
- 4) Lakukan penilaian.
 - a) Bila bayi sudah bernapas normal, hentikan ventilasi dan pantau bayi, bayi diberikan asuhan pasca resusitasi.
 - b) Bila bayi belum bernapas atau menggap menggap, lanjutkan ventilasi.

- (1) Lanjutkan ventilasi dengan tekanan 20 cm air, 20 kali untuk 30 detik berikutnya.
 - (2) Evaluasi hasil ventilasi tiap 30 detik.
- c) Siapkan rujukan bila bayi belum bernapas normal sesudah 2 menit diventilasi.
- d) Bila bayi tidak bisa dirujuk,
- (1) Lanjutkan ventilasi sampai 20 menit.
 - (2) Pertimbangkan untuk menghentikan tindakan resusitasi jika setelah 20 menit, upaya ventilasi tidak berhasil.

Bayi yang tidak bernapas normal setelah 20 menit diresusitasi akan mengalami kerusakan otak sehingga bayi akan menderita kecatatan yang berat atau meninggal.

c. Kompresi dada.

Kompresi dada dimulai jika frekuensi jantung kurang dari 60 kali per menit setelah dilakukan ventilasi tekanan positif selama 30 detik. Tindakan kompresi dada (*cardiac massage*) terdiri dari kompresi yang teratur pada tulang dada, yaitu menekan jantung ke arah tulang belakang, meningkatkan tekanan intratorakal, dan memperbaiki sirkulasi darah ke seluruh organ vital tubuh.

Kompresi dada hanya bermakna jika paru-paru diberi oksigen, sehingga diperlukan 2 orang untuk melakukan kompresi dada yang efektif satu orang menekan dada dan yang lainnya melanjutkan ventilasi. Orang kedua juga bisa melakukan pemantauan frekuensi jantung, dan suara


napas selama ventilasi tekanan positif. Ventilasi dan kompresi harus dilakukan secara bergantian. Prinsip dasar pada kompresi dada adalah :

1) Posisi bayi

Topangan yang keras pada bagian belakang bayi dengan leher sedikit tengadah.

2) Kompresi

- a) Lokasi ibu jari atau dua jari : pada bayi baru lahir tekanan diberikan pada 1/3 bawah tulang dada yang terletak antara *processus xiphoideus* dan garis khayal yang menghubungkan kedua puting susu.



Gambar 2.4 Lokasi kompresi dada

Sumber : Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2008

- b) Kedalaman : diberikan tekanan yang cukup untuk menekan tulang dada sedalam kurang lebih 1/3 diameter anteroposterior dada,

kemudian tekanan dilepaskan untuk memberi kesempatan jantung terisi. Satu kompresi terdiri dari satu tekanan ke bawah dan satu pelepasan. Lamanya tekanan ke bawah harus lebih singkat daripada lamanya pelepasan untuk memberi curah jantung yang maksimal. Ibu jari atau ujung-ujung jari (tergantung metode yang digunakan) harus tetap bersentuhan dengan dada selama penekanan dan pelepasan.

c) Frekuensi : kompresi dada dan ventilasi harus terkoordinasi baik, dengan aturan satu ventilasi diberikan tiap selesai tiga kompresi, dengan frekuensi 30 ventilasi dan 90 kompresi permenit. Satu siklus yang berlangsung selama 2 detik, terdiri dari satu ventilasi dan tiga kompresi.

d) Penghentian kompresi:

(1) Setelah 30 detik, untuk menilai kembali frekuensi jantung ventilasi dihentikan selama 6 detik. Penghitungan frekuensi jantung selama ventilasi dihentikan.

(2) Frekuensi jantung dihitung dalam waktu 6 detik kemudian dikalikan 10. Jika frekuensi jantung telah diatas 60 x/menit kompresi dada dihentikan, namun ventilasi diteruskan dengan kecepatan 40-60 x/menit. Jika frekuensi jantung tetap kurang dari 60 x/menit, maka pemasangan kateter umbilikal untuk memasukkan obat dan pemberian epinefrin harus dilakukan.

(3) Jika frekuensi jantung lebih dari 100 x/menit dan bayi dapat bernapas spontan, ventilasi tekanan positif dapat dihentikan, tetapi bayi masih mendapat oksigen alir bebas yang kemudian secara bertahap dihentikan. Setelah observasi beberapa lama di kamar bersalin bayi dapat dipindahkan ke ruang perawatan.

d. Pemberian epinefrin dan atau pengembang volume (Volume expander).

Obat-obatan jarang diberikan pada resusitasi bayi baru lahir.

Bradikardi pada bayi baru lahir biasanya disebabkan oleh ketidaksempurnaan pengembangan dada atau hipoksemia, dimana kedua hal tersebut harus dikoreksi dengan pemberian ventilasi yang adekuat. Namun bila bradikardi tetap terjadi setelah VTP dan kompresi dada yang adekuat, obat-obatan seperti epinefrin, atau volume ekspander dapat diberikan. Obat yang diberikan pada fase akut resusitasi adalah epinefrin.

1) Epinefrin.

Indikasi pemakaian epinefrin adalah frekuensi jantung kurang dari 60x/menit setelah dilakukan VTP dan kompresi dada secara terkoordinasi selama 30 detik. Epinefrin tidak boleh diberikan sebelum melakukan ventilasi adekuat karena epinefrin akan meningkatkan beban dan konsumsi oksigen otot jantung. Dosis yang diberikan 0,1-0,3 ml/kgBB larutan 1:10.000 (setara dengan 0,01-0,03 mg/kgBB) intravena atau melalui selang endotrakeal. Dosis dapat diulang 3-5 menit secara intravena bila frekuensi jantung tidak

meningkat. Dosis maksimal diberikan jika pemberian dilakukan melalui selang endotrakeal.

2) Volume Ekspander.

Volume ekspander diberikan dengan indikasi sebagai berikut : bayi baru lahir yang dilakukan resusitasi mengalami hipovolemia dan tidak ada respon dengan resusitasi, hipovolemia kemungkinan akibat adanya perdarahan atau syok. Gejala klinis ditandai adanya pucat, nadi kecil atau lemah, dan pada resusitasi tidak memberikan respon yang adekuat. Dosis awal 10 ml/kg BB IV pelan selama 5-10 menit. Dapat diulang sampai menunjukkan respon klinis. Jenis cairan yang diberikan dapat berupa larutan kristaloid isotonis (NaCl 0,9%, Ringer Laktat) atau tranfusi golongan darah O negatif jika diduga kehilangan darah banyak (Departemen Kesehatan R.I, 2008).


e. Asuhan pasca resusitasi

Asuhan pasca resusitasi adalah pelayanan kesehatan pasca resusitasi, yang diberikan kepada bayi baru lahir ataupun ibu dan keluarga yang diberikan berupa asuhan neonatal, pemantauan, dan konseling. Harus dicatat semua tindakan yang telah dilakukan mencakup : nama ibu, tanggal dan waktu lahir, keadaan bayi waktu lahir, waktu mulai tindakan resusitasi, langkah resusitasi yang telah dilakukan, waktu bayi bernapas spontan dan hasil resusitasi. Asuhan pasca resusitasi diberikan sesuai dengan keadaan bayi baru lahir setelah menerima tindakan resusitasi.

Asuhan pasca resusitasi dilakukan pada keadaan :

- 1) Resusitasi berhasil : Bayi menangis dan bernapas normal sesudah langkah awal atau sesudah ventilasi. Perlu pemantauan dan dukungan.
- 2) Resusitasi belum/kurang Berhasil : Bayi perlu rujukan yaitu sesudah ventilasi 2 menit belum bernapas atau bayi sudah bernapas tetapi masih megap-megap atau pada pemantauan didapatkan kondisinya memburuk.
- 3) Resusitasi tidak Berhasil : Sesudah ventilasi 20 menit, bayi tidak bernapas.





Bagan 2.5 Bantuan pernapasan bayi baru lahir

Sumber : The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, 2010

C. Manajemen Kebidanan

1. Pengertian manajemen kebidanan

Manajemen asuhan kebidanan atau yang sering disebut manajemen kebidanan adalah suatu metode berpikir dan bertindak secara sistematis dan logis dalam memberi asuhan kebidanan, agar menguntungkan kedua belah pihak baik klien maupun pemberi asuhan.

Manajemen atau asuhan segera pada bayi baru lahir normal adalah asuhan yang diberikan pada bayi pada jam pertama setelah kelahiran, dianjurkan sampai 24 jam setelah kelahiran.

Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir bertujuan untuk memberikan asuhan yang adekuat dan berstandar pada bayi baru lahir dengan memperhatikan riwayat bayi selama kehamilan, dalam persalinan dan keadaan bayi segera setelah dilahirkan.

2. Langkah langkah dalam manajemen kebidanan

a. Tahap pengumpulan data dasar (langkah 1)

Pada langkah pertama dikumpulkan semua informasi (data) yang akurat dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien. Untuk memperoleh data dilakukan dengan cara :

1) Anamnesis

Anamnesis dilakukan untuk mendapatkan biodata dan riwayat bayi.

Riwayat kesehatan bayi baru lahir yang penting dan harus dikaji adalah :

- a) Faktor genetik, meliputi kelainan atau gangguan metabolik pada keluarga dan sindrom genetik.
 - b) Faktor maternal (ibu), meliputi adanya penyakit jantung, diabetes mellitus, penyakit ginjal, penyakit hati, hipertensi, penyakit kelamin, riwayat abortus.
 - c) Faktor antenatal, meliputi pernah ANC atau tidak, adanya riwayat preeklamsi, perdarahan, infeksi, perkembangan janin terlalu besar atau terganggu, diabetes gestasional, poli atau oligohidraamnion.
 - d) Faktor perinatal, meliputi premature atau postmatur, partus lama, gawat janin dll (Sudarti, 2010).
- 2) Pemeriksaan fisik sesuai dengan kebutuhan dan pemeriksaan tanda tanda vital, meliputi :
- a) Pemeriksaan khusus (inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi).
 - b) Pemeriksaan penunjang (laboratorium dan catatan terbaru serta catatan sebelumnya).

Bila klien mengalami komplikasi yang perlu dikonsultasikan kepada dokter, bidan akan melakukan upaya konsultasi. Tahap ini merupakan langkah awal yang akan menentukan langkah berikutnya sehingga kelengkapan data sesuai dengan kasus yang dihadapi akan menentukan benar tidaknya proses interpretasi data pada tahap selanjutnya. Oleh karena itu, pendekatan ini harus komprehensif,

mencakup data subjektif, data objektif, dan hasil pemeriksaan sehingga dapat menggambarkan kondisi klien yang sebenarnya serta valid. Kaji ulang data yang sudah dikumpulkan apakah sudah tepat, lengkap dan akurat.

b. Interpretasi data dasar (langkah II)

Pada langkah kedua dilakukan identifikasi terhadap diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data data yang telah dikumpulkan. Data dasar tersebut kemudian diinterpretasikan sehingga dapat dirumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik. Baik rumusan diagnosis maupun masalah, keduanya harus ditangani.

c. Identifikasi diagnosis/masalah potensial dan antisipasi penanganannya (langkah III).

Pada langkah ketiga kita mengidentifikasi masalah potensial atau diagnosis potensial berdasarkan diagnosis/masalah yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan. Bidan diharapkan dapat waspada dan bersiap siap mencegah diagnosis/masalah potensial menjadi kenyataan. Langkah ini penting sekali dalam melakukan asuhan yang aman.

Pada langkah ini bidan dituntut untuk mampu mengantisipasi masalah potensial, tidak hanya merumuskan masalah potensial yang akan terjadi, tetapi juga merumuskan tindakan antisipasi agar

masalah atau diagnosis tersebut tidak terjadi. Langkah ini bersifat antisipasi yang rasional / logis.

d. Menetapkan perlunya konsultasi dan kolaborasi segera dengan tenaga kesehatan lain (langkah IV)

Bidan mengidentifikasi perlunya bidan atau dokter melakukan konsultasi atau penanganan segera bersama anggota tim kesehatan lain sesuai kondisi bayi.

Contohnya adalah bayi tidak bernapas spontan dalam 30 detik, segera lakukan resusitasi.

e. Menyusun rencana asuhan menyeluruh (langkah V)

Pada langkah kelima direncanakan asuhan menyeluruh yang ditentukan berdasarkan langkah langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan lanjutan manajemen untuk masalah atau diagnosis yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Pada langkah ini informasi data yang tidak lengkap dapat dilengkapi.

Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi segala hal yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien atau dari setiap masalah terkait, tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi untuk klien tersebut.

f. Pelaksanaan langsung asuhan dengan efisien dan aman (langkah VI)

Pada langkah ini, dilakukan pelaksanaan asuhan langsung secara efisien dan aman. Pada langkah ke-6 ini rencana asuhan

menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah ke-5 dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan sebagian oleh bidan atau oleh tim anggota kesehatan lainnya. Walau bidan tidak melakukan sendiri, ia tetap memikul tanggungjawab untuk mengarahkan pelaksanaannya.

g. Evaluasi (langkah VII)

Evaluasi dilakukan secara siklus dan dengan mengkaji ulang aspek asuhan yang tidak efektif untuk mengetahui aspek mana yang menguntungkan atau menghambat keberhasilan asuhan yang diberikan.

Pada langkah terakhir, dilakukan evaluasi keefektifan asuhan yang sudah diberikan. Ini meliputi evaluasi pemenuhan kebutuhan akan bantuan : apakah benar benar terpenuhi sebagaimana diidentifikasi di dalam diagnosis dan masalah. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya (Soepardan, 2007).

3. Pendokumentasian manajemen kebidanan

Asuhan yang telah dilakukan harus dicatat secara benar, jelas, singkat, logis dalam suatu metode pendokumentasian. Pendokumentasian yang benar adalah pendokumentasian yang dapat mengkomunikasikan kepada orang lain mengenai asuhan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan pada seorang klien, yang di dalamnya tersirat proses berpikir

yang sistematis seorang bidan dalam menghadapi seorang klien sesuai langkah langkah dalam proses manajemen kebidanan.

Menurut Helen Varney, alur berpikir bidan dalam menghadapi klien meliputi 7 langkah. Untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh seorang bidan melalui proses berpikir sistematis, didokumentasikan dalam bentuk SOAP, yaitu :

S (Subjektif), menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis sebagai langkah 1 Varney.

O (Objektif), menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium dan uji diagnostik lain yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung asuhan sebagai langkah 1 Varney.

A (Assesment), menggambarkan pendokumentasian hasil analisis dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi :

- a) Diagnosis/masalah.
- b) Antisipasi diagnosis/masalah potensial.
- c) Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter, konsultasi/kolaborasi dan atau rujukan sebagai langkah 2, 3, dan 4 Varney.

P (Plan), menggambarkan pendokumentasian dan tindakan (Implementasi) dan evaluasi perencanaan (E) berdasarkan assesment sebagai langkah 5, 6, dan 7 Varney (Salmah, 2006).

D. TINJAUAN ISLAM TENTANG ASFIKSIA DAN PENANGANANNYA.

Islam adalah agama yang istimewa, salah satu alasannya adalah karena Islam sangat memperhatikan siklus kehidupan umat manusia. Di dalam

Al Quran, terdapat banyak ayat yang membahas mengenai siklus kehidupan manusia mulai dari proses penciptaan manusia sampai wafat. Selama masa tersebut, manusia dapat mengalami berbagai gangguan yang dapat membahayakan bagi kehidupannya. Salah satu gangguan yang dapat terjadi pada saat bayi baru lahir adalah asfiksia.

Asfiksia neonatorum adalah kegagalan bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir (WHO, 2008). Allah SWT berfirman dalam Q.S Al Qiyamah /75: 26

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ النَّرَاقِيَ (٢٦)

Terjemahan :

“Sekali-kali jangan. Apabila nafas (seseorang) telah (mendesak) sampai ke kerongkongan”(Departemen Agama RI, 2005).

Dalam tafsir Al mitsbah dikatakan : kata at- taraqi adalah bentuk jamak dari tarquwah, yaitu lubang yang terdapat di kerongkongan untuk pernapasan dan saluran makanan (Shihab, 2002). Ayat tersebut diatas, pada dasarnya tidak berbicara tentang bayi yang sukar bernapas, tetapi ayat tersebut secara umum menjelaskan bahwa apabila seseorang susah bernapas dan telah sampai kerongkongan maka akan merasa sesak dan tidak mampu menghirup udara, bahkan dapat membuat seseorang meninggal. Hal yang sama terjadi pada bayi asfiksia yang mengalami kegagalan bernapas.

Asfiksia bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya dari pihak ibu. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al ahqaff/ 46:15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ

ثَلَاثُونَ شَهْرًا... ﴿١٥﴾

Terjemahan :

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula), mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...”(Departemen Agama RI, 2005).

Firmannya : *hamalathu ummuhu kurhan wa wadha'athu kurhan / ibunya mengandungnya dengan susah payah melahirkannya dengan susah payah* menjelaskan betapa berat kandungan dan kelahiran itu dialami oleh ibu (Shihab, 2002).

Sedangkan menurut penulis, ayat tersebut menjelaskan bahwa betapa susahnya ibu mengandung selama 9 bulan dan selama kehamilan tersebut banyak komplikasi yang dapat terjadi pada ibu. Salah satunya preeklamsia.

Pada ibu yang mengalami preeklamsia prognosis pada janin kurang baik karena menurunnya aliran darah menuju ke plasenta (Wiknjosastro, 2007). Sehingga menimbulkan gangguan pertukaran nutrisi, CO₂, dan O₂ yang dapat menyebabkan asfiksia.

Selain itu, kebiasaan merokok pada ibu hamil merupakan salah satu penyebab BBLR dan bayi yang lahir dengan asfiksia. Dalam masa kehamilan, setiap isapan rokok akan menghubungkan darah ibu dengan darah bayi. Hal

ini akan berpengaruh pada denyut jantung janin karena rokok mengandung nikotin. Nikotin menyebabkan denyut jantung ibu semakin cepat yaitu bertambah sekitar 20 denyutan dalam setiap menitnya dibandingkan ibu yang tidak merokok (Al hafidz, 2007). Hal ini akan berpengaruh terhadap kondisi janin dalam rahim karena aliran darah ibu secara langsung berhubungan dengan aliran darah janin yaitu melalui plasenta.

Dalam sudut pandang Islam, Kebiasaan merokok dimakruhkan karena membahayakan kesehatan, melenyapkan harta tanpa faedah, merokok mendorong menjadi pecandu. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al baqarah/2 : 195,

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan :

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Departemen Agama RI, 2005).

Kata at – tahlukah yakni kebinasaan adalah menyimpang atau hilangnya nilai positif yang melekat pada sesuatu, tanpa diketahui kemana perginya (Shihab, 2002).

Sehingga berdasarkan ayat tersebutlah beberapa ulama memfatwakan rokok dapat berlaku haram karena Islam mengharamkan apapun yang

membahayakan seseorang, baik membahayakan hidupnya, kesehatannya, rezeki, maupun membahayakan rezeki anak anaknya.

Dalam Q.S. Almaidah/5: 32, Allah SWT berfirman :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا... (٣٢)

Terjemahan :

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya” (Departemen Agama RI, 2005).

Ayat di atas mempersamakan antara pembunuhan terhadap seorang manusia yang tidak berdosa dan membunuh semua manusia, dan yang menyelamatkannya sama dengan menyelamatkan semua manusia.

Seorang manusia dengan manusia lain adalah perantara lahirnya manusia manusia lain bahkan seluruh manusia. Manusia diharapkan hidup untuk waktu yang ditetapkan Allah SWT, antara lain untuk melanjutkan jenis kehidupan manusia seluruhnya. Membunuh seseorang adalah bagaikan membunuh seluruh manusia, yang keberadaannya ditetapkan Allah SWT demi kelangsungan hidup jenis manusia (Shihab, 2002)

Menurut penulis, ayat di atas bermakna bahwa “Menghidupkan” di sini bukan saja berarti “memelihara kehidupan”, tetapi juga dapat mencakup upaya “memperpanjang harapan hidup” dengan cara apa pun yang tidak melanggar hukum. Hal inilah yang dilakukan oleh bidan, dokter, dan petugas kesehatan lain dalam menangani bayi asfiksia yaitu dengan memberikan resusitasi. Resusitasi bayi baru lahir..

BAB III

STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR DENGAN ASFIKZIA BERAT DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TANGGAL 26 APRIL 2011

No. Register : 241738
Tanggal MRS : 26 April 2011 Jam 18.20 WITA
Tanggal Bersalin : 26 April 2011 Jam 18.20 WITA
Tanggal Pengkajian : 26 April 2011 Jam 18.20 WITA

A. LANGKAH I. IDENTIFIKASI DATA DASAR

1. Identitas

a. Bayi

Nama : By Ny "H"

Umur : 0 hari

Tempat tanggal lahir : RSUD Syekh Yusuf Gowa, 26 April 2011

Jenis kelamin : Laki Laki

Anak ke : Kedua

b. Orangtua

Nama : Ny "H" / Tn "S"

Umur : 27 Thn / 28Thn

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

51

Pendidikan

Pekerjaan : IRT / Buruh Harian

Alamat : Jl Syekh Yusuf III No 9 RT 002 RW005.

2. Data biologis/fisiologis.

- a. Alasan masuk ruang perinatologi karena mengalami asfiksia berat, bayi tidak segera menangis dan apgar score 2/5.
- b. Bayi belum dapat bernafas spontan, gerakan tidak aktif, badan merah dan ekstremitas biru.
- c. Riwayat kehamilan/persalinan.

1) Riwayat kehamilan .

a) Riwayat kehamilan lalu.

Ibu tidak mengalami komplikasi selama masa kehamilannya yang pertama.

b) Riwayat kehamilan sekarang.

(1) Ibu mengatakan bahwa ini adalah anaknya yang kedua dan tidak pernah keguguran sebelumnya (G_{II}P₁A₀).

(2) HPHT : 17-07-2010.

(3) HTP : 24-04-2011.

(4) Masa gestasi 40 minggu 2 hari.

(5) ANC sebanyak 4 kali di RB Mattiro Baji.

(6) Imunisasi TT sebanyak 2 kali.

- (7) Ibu tidak pernah merasa nyeri perut atau kepala yang hebat selama hamil.
- (8) Ibu tidak memiliki riwayat DM, Hipertensi, Asma, Jantung dan penyakit lainnya.
- (9) Ibu tidak memiliki riwayat penyakit keturunan.
- (10) Tidak ada riwayat ke dukun, merokok, atau minum jamu.
- (11) Selama hamil ibu makan 3 kali sehari dengan nasi, sayur dan lauk pauk dan kadang kadang minum susu.

2) Riwayat Persalinan

a) Riwayat Persalinan yang lalu

Anak pertama ibu lahir tahun 2005, jenis kelamin perempuan, berat badan lahir 3000 gram, panjang badan 50 cm, jenis persalinan spontan pervaginam dengan presentase bokong, ditolong oleh dokter di RSUD Syekh Yusuf.

b) Riwayat Persalinan sekarang

- (1) Bayi lahir tanggal 26 April 2011 Jam 18.20 WITA.
- (2) Jenis persalinan adalah pervaginam dengan presentase bokong, dan ditolong oleh dokter di RSUD Syekh Yusuf.
- (3) Perlangsungan kala I : 7 jam 5 menit.
- (4) Ketuban pecah saat pembukaan lengkap pukul 18.05 WITA, warna air ketuban jernih. Rentang waktu dari pecahnya ketuban sampai lahirnya kepala \pm 15 menit.
- (5) Perlangsungan Kala II : \pm 15 menit.

(6) Bayi lahir dengan penilaian :

(a) Pernafasan : Tidak bernapas spontan.

(b) Denyut jantung : Lemah tidak teratur, frekuensi 40 x/menit.

(c) Warna Kulit : Badan merah dan ekstremitas biru.

(d) APGAR Score : 2/5.

3. Riwayat Psikologis, Sosial, dan Ekonomi

- a. Ekspresi wajah Ibu dan keluarga nampak cemas.
- b. Interaksi ibu, suami, dan keluarga baik.
- c. Ibu belum sempat berinteraksi dengan bayinya.
- d. Ibu menggunakan JAMKESMAS untuk membayar biaya perawatan.

4. Data Spiritual

Keluarga berdoa kepada Allah SWT agar bayinya selamat.

5. Pemeriksaan Fisik

- a. Keadaan umum bayi buruk, bayi belum bernapas spontan.
- b. Berat badan lahir : 3700 gram.
- c. Panjang badan lahir : 51 cm.
- d. Tanda tanda vital :
 - 1) Frekuensi jantung : 40 x/menit (Normal : 120-160 x/menit).
 - 2) Pernafasan : Belum bernapas spontan (Normal : 40-60 x/menit).
 - 3) Suhu : 35,3 °C (Normal : 36,5 - 37,2 °C).
- e. Skor apgar : 2/5, Skor ballard : 39.
 - 1) Penilaian apgar score.

Tabel 3.1 Penilaian APGAR Score pada By Ny “H”.




































Tanda	Score			Nilai	
	0	1	2	I	V
Apperance (warna kulit)	Pucat	Tubuh kemerahan, ekstremitas biru	Tubuh dan ekstremitas kemerahan	1	2
Pulse rate (Denyut nadi)	Tidak ada	≤ 100 x/i	≥ 100 x/i	1	2
Grimace (reaksi rangsangan)	Tidak ada	Sedikit gerakan mimik	Batuk, bersin	0	0
Activity (tonus otot)	Lumpuh	Ekstremitas dalam sedikit fleksi	Gerakan aktif	0	0
Respiratory (usaha pernafasan)	Tidak ada	Lemah / tidak teratur	Baik, menangis	0	1
Jumlah				2	5

Sumber : Wiknjosastro, 2005

2) Karakteristik menurut Ballard Score

Tabel 3.2.1 Penilaian Maturitas Neuromuskular Pada By Ny “H”

Menurut Ballard Score

	-1	0	1	2	3	4	5
Sikap							
Sudut pergelangan tangan	 $>90^\circ$	 90°	 60°	 45°	 30°	 0°	
Recoil lengan		 180°	 $140^\circ-180^\circ$	 $110^\circ-140^\circ$	 $90^\circ-110^\circ$	 $< 90^\circ$	
Sudut poplitea	 180°	 160°	 140°	 120°	 100°	 90°	 $< 90^\circ$
Tanda scarf							
Tumit-ke-telinga							

Sumber : Varney, 2007

- a) Sikap : 4
- b) Sudut pergelangan tangan : 3
- c) Membaliknya lengan : 3
- d) Sudut poplitea : 3
- e) Tanda scarf : 3
- f) Tumit ke telinga : 3 +
- Jumlah : 19

Tabel 3.2.2 Penilaian Maturitas Fisik Pada Ny ‘H’ Menurut Ballard Score

Nilai	-1	0	1	2	3	4	5
Kulit	Lengket, mudah terkelupas, transparan	Mirip gelatin, merah, tembus cahaya	Vena terlihat merah muda, halus	Pengelupasan superfisial dan/atau ruam, sedikit vena	Pecah-pecah daerah pucat, vena jarang	Kencang, pecah-pecah yang dalam, vena tidak terlihat	Kasar, pecah-pecah, keriput
Lanugo	Tidak ada	Jarang	Sangat banyak	Tipis	Ada daerah botak	Sebagian besar botak	
Lipatan plantar	Tumit jari-jari 40-50 mm : -1 <40 mm : -2	> 50 mm Tidak ada lipatan	Tanda merah sedikit	Hanya ada lipatan melintang anterior	Lipatan anterior 2/3	Lipatan di seluruh telapak kaki	
Payu dara	Tidak terlihat	Sedikit Terlihat	Aerola datar, tak ada penonjolan	Aerola tipis, penonjolan 1-2 mm	Aerola menonjol, penonjolan 3-4 mm	Aerola penuh, penonjolan 5-10 mm	
Mata/ Telinga	Kelopak mata menutup tidak terlalu rapat : -1, rapat : -2	Kelopak mata terbuka; daun telinga datar, tetap terlipat	Daun telinga sedikit melengkung, lunak; rekoil lambat	Daun telinga melengkung sempurna, lunak, tetapi mudah rekoil	Rekoil cepat dan menetap, daun telinga sempurna dan keras	Kartilago tebal, telinga kaku	
Genitalia (pria)	Skrotum datar, licin	Skrotum kosong, rugae tipis	Testis berada di kanalis atas, rugae jarang	Testis turun, rugae agak rapat	Testis di bawah, rugae baik	Testis menggantung, lipatan rugae dalam	

Sumber : Varney, 2007

a) Kulit	: 3
b) Lanugo	: 4
c) Lipatan plantar	: 3
d) Payudara	: 4
e) Daun telinga	: 3
f) <u>Genitalia</u>	: 3 +
Jumlah	20

Jadi, tingkat kematangan bayi: $19+20 = 39$, umur kehamilan menurut tabel kematangan (tabel 2.1.3) adalah = 38 - 40 minggu.

- f. Inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi.
- 1) Kepala : Rambut hitam, tipis, ubun-ubun belum tertutup, tidak ada benjolan.
 - 2) Mata : Simetris kanan dan kiri, sklera putih, konjungtiva merah muda, dan kelopak mata tidak oedema, tidak ada tanda tanda infeksi.
 - 3) Hidung : Gerakan cuping hidung tidak ada.
 - 4) Mulut dan bibir : Bibir kering dan pucat, banyak terdapat lendir, tidak ada kelainan pada palatum, refleks isap tidak ada.
 - 5) Telinga : Simetris kanan dan kiri, tampak bersih, tidak ada secret.
 - 6) Leher : Tidak ada pembesaran atau benjolan.
 - 7) Dada dan perut : Simetris kanan dan kiri, gerakan dada tidak ada, keadaan tali pusat tampak basah dan terbungkus dengan kain kasa.
 - 8) Punggung dan bokong : Tonjolan punggung tidak ada.
 - 9) Genitalia dan anus : Testis berada pada skrotum, penis berlubang, lubang anus ada.

10) Ekstremitas : Simetris kanan dan kiri, jari-jari lengkap, tidak ada pergerakan, warna biru dan teraba dingin.

11) Kulit : Verniks kurang, warna tubuh kemerah merahan, tidak ada tanda lahir.

g. Pemeriksaan neurologis :

1) Refleks moro : Tidak ada.

2) Refleks hisap : Tidak ada.

3) Refleks rooting : Tidak ada.

h. Pemeriksaan pengukuran :

1) Lingkar kepala : 33 cm.

2) Lingkar dada : 34 cm.

3) Lingkar perut : 32 cm.

4) Lila : 11 cm.

B. LANGKAH II. IDENTIFIKASI DIAGNOSA/ MASALAH AKTUAL

Diagnosa aktual : BCB, SMK, bayi lahir dengan asfiksia berat dan hipotermi.

1. BCB, SMK

Data dasar :

DS : a. Ibu mengatakan HPHT tanggal 17-07-2010

b. Ibu mengatakan melahirkan tanggal 26 April 2011 jam 18.20
WITA.

DO : a. HTP : tanggal 24-04-2011.

b. BBL : 3700 gram

c. PBL : 51 cm

d. Apgar score 2/5

e. Ballard score : 39.

Analisa dan interpretasi data

- Dari hasil penilaian ballard score = 39 diperkirakan bayi lahir pada usia kehamilan antara 38-40 minggu dan hasil pengkajian dari HPHT tanggal 17-07-2010 sampai bayi lahir tanggal 26-04-2011 berarti bayi lahir pada usia kehamilan = 40 minggu 2 hari sehingga bayi termasuk kategori bayi cukup bulan (BCB).
- Bayi Ny “H” lahir pada usia kehamilan 40 minggu 2 hari dengan berat badan lahir 3700 gram. Berdasarkan kurva pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin dari Battaglia dan Lubchenco, berat badan bayi Ny “H” sesuai dengan masa kehamilan (SMK).

2. Asfiksia Berat

Dasar

DS : Ibu mengatakan bayinya lahir tidak langsung menangis.

DO : a. Bayi lahir tidak segera menangis

b. Bayi lahir dengan presentase bokong dengan lama kala II ± 15 menit.

c. Frekuensi jantung saat lahir 40 kali permenit.

d. Tonus otot lemah bahkan hampir tidak ada.

e. Bayi tidak dapat memberikan reaksi bila diberikan rangsangan.

f. Apgar score 2/5.

Analisa dan interpretasi data dasar :

- Pada persalinan bokong kelahiran kepala janin yang lebih lama dari 8 menit setelah umbilikus dilahirkan, akan membahayakan kehidupan janin. Selain itu apabila janin bernapas sebelum hidung dan mulut lahir dapat membahayakan, karena mukus yang terhisap dapat menyumbat jalan napas sehingga dapat menyebabkan asfiksia.
- Pada asfiksia berat, nilai apgar 0 – 3.
Tanda dan gejala asfiksia berat antara lain : frekuensi jantung saat lahir ≤ 40 kali permenit, tonus otot lemah bahkan hampir tidak ada, bayi tidak dapat memberikan reaksi bila diberikan rangsangan.

3. Hipotermi

4. Data dasar :

DS : -

DO : a. Suhu tubuh bayi : $35,3^{\circ}\text{C}$.

b. Ekstremitas bayi berwarna biru dan teraba dingin.

Analisa dan interpretasi data dasar :

Gejala awal hipotermi apabila suhu $< 36^{\circ}\text{C}$ atau kedua kaki dan tangan teraba dingin.

C. LANGKAH III. ANTISIPASI DIAGNOSA / MASALAH POTENSIAL

Diagnosa potensial : Potensial kematian.

DS : -

DO : a. Bayi lahir tidak segera menangis.

b. Frekuensi jantung : 40 x/menit .

c. Bayi belum bernapas spontan.

d. Suhu badan 35,3 °C

e. Apgar score : 2/5

Analisa dan interpretasi data

- Pada bayi yang mengalami asfiksia jika kekurangan oksigen berlangsung terus menerus maka terjadi kegagalan fungsi miokardium dan kegagalan fungsi curah jantung, penurunan tekanan darah, yang mengakibatkan aliran darah ke seluruh tubuh berkurang. Sebagai akibat dari kekurangan perfusi dan oksigenasi jaringan, akan menimbulkan kerusakan jaringan otak yang ireversibel, kerusakan organ tubuh lain, atau kematian.
- Hipotermi menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah, yang mengakibatkan terjadinya metabolic anaerobic, meningkatkan kebutuhan oksigen, mengakibatkan hipoksemia dan berlanjut dengan kematian.

D. LANGKAH IV. TINDAKAN SEGERA / EMERGENCY DAN KOLABORASI

Tanggal 26 april 2011

Jam : 18.20 WITA.

1. Nilai usaha napas, warna kulit, dan frekuensi denyut jantung.

Rasional : Untuk mengetahui kondisi bayi dan untuk menentukan apakah tindakan resusitasi diperlukan.

2. Keringkan tubuh bayi dan hangatkan dengan menggunakan infant warmer.

Rasional : Suhu intrauterin dan ekstrauterin sangatlah berbeda dimana pada bayi baru lahir penyesuaian suhu diluar kandungan sangat memerlukan pengawasan agar tidak terjadi kehilangan panas pada bayi yang menyebabkan hipotermi .

3. Atur posisi bayi, letakkan bayi dengan kepala lebih rendah dan segera hisap saluran pernafasan bagian atas .

Rasional : Agar cairan tidak teraspirasi masuk ke dalam paru paru sehingga bayi dapat segera bernafas spontan.

4. Lakukan rangsangan taktil

Rasional : Dengan rangsangan taktil bayi dapat segera menangis karena rangsangan taktil dapat merangsang pernafasan dan meningkatkan aspirasi O₂.

5. Lakukan ventilasi dengan tekanan positif dengan menggunakan ambu bag dan diselingi dengan kompresi dada dengan perbandingan 3 kali kompresi dan satu kali ventilasi sampai bayi dapat bernafas spontan dan frekuensi jantung > 100 kali/menit.

Rasional : VTP dengan menggunakan ambu bag merupakan salah satu cara untuk merangsang pernafasan bayi apabila rangsangan taktil tidak berhasil.

6. Apabila bayi sudah bernapas spontan dan frekuensi jantung sudah normal tetapi masih biru maka dilakukan pemberian O₂ 1 liter / menit lewat nasal kanul.

Rasional : O₂ diberikan untuk memperbaiki keadaan umum bayi dan mencegah asidosis yang berkelanjutan. Hal ini dapat dihentikan setelah warna kulit kemerahan merahan.

E. LANGKAH V. INTERVENSI

Tanggal 26 April 2011

Jam 18.21 WITA.

Diagnosa aktual : BCB, SMK, bayi lahir dengan asfiksia berat dan hipotermi.

Tujuan :

1. Bayi dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dari intrauterin ke lingkungan ektrauterin.
2. Asfiksia berat teratasi.
3. Hipotermi teratasi.

Kriteria :

1. Keadaan umum bayi baik.
2. Bayi bernapas spontan, menangis segera.
3. Gerakan aktif.
4. Bayi tidak sianosis.
5. TTV dalam batas normal:
 - a. Frekuensi jantung : 120-160 x /menit.
 - b. Pernafasan : 30-60 x /menit.
 - c. Suhu : 36,5-37,5°C.
6. Bayi tidak mengalami gangguan metabolisme (BAB dan BAK lancar), urine dan mekonium keluar dalam 24 jam pertama.
7. Refleks isap dan menelan baik.

Intervensi tanggal 26 April 2011

pukul 18.21 WITA

1. Cuci tangan sebelum dan sesudah merawat bayi lalu gunakan handscun saat memegang bayi.

Rasional : Untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial.

2. Bersihkan jalan nafas dari lendir dengan menggunakan suction.

Rasional : Untuk kelancaran proses respirasi sehingga bayi dapat bernafas teratur.

3. Pakaikan bayi pakaian yang bersih dan kering.

Rasional : Untuk mencegah terjadinya kehilangan panas pada bayi.

4. Berikan rangsangan taktil.

Rasional : Untuk merangsang agar bayi dapat bernafas spontan.

5. Atur posisi bayi dengan posisi ekstensi.

Rasional : Untuk melancarkan jalan nafas dan mencegah aspirasi lendir yang terdapat pada mulut dan hidung.

6. Observasi pemberian O_2 sebanyak 1 liter/menit melalui nasal kanul.

Rasional : Pemberian O_2 yang berlebihan dapat menyebabkan kebutaan.

7. Pasang infus dekstroza 5 % .

Rasional : Memenuhi kebutuhan nutrisi bayi.

8. Pasang NGT (Naso Gastric Tube) dan hentikan intake oral berdasarkan instruksi dokter.

Rasional : Memasang NGT (Naso Gastric Tube) untuk dekompresi lambung sedangkan menghentikan intake oral untuk mencegah bayi muntah karena bayi mengalami aspirasi air ketuban.

9. Lakukan perawatan tali pusat.

Rasional : Untuk menghambat masuknya kuman patogen penyebab infeksi.

10. Injeksi vit K (Neo K).

Rasional : Untuk mencegah terjadinya perdarahan.

11. Suntikkan antibiotik sesuai instruksi dokter (cefotaxim).

Rasional : Untuk mencegah infeksi.

12. Rawat inkubator.

Rasional : Menjaga suhu tubuh bayi tetap hangat.

13. Observasi TTV tiap 15 menit.

Rasional : Mengukur TTV bayi merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keadaan umum bayi sehingga dapat dilakukan tindakan segera saat tanda tanda vital terdeteksi diluar batas normal.

Diagnosa potensial : Potensial kematian.

Tujuan : Bayi tidak meninggal.

Kriteria : Terdapat tanda tanda vital yang menandakan bayi masih hidup.

Intervensi tanggal 26 April 2011

1. Observasi TTV tiap 15 menit.

Rasional : Mengukur TTV bayi merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keadaan umum bayi sehingga dapat dilakukan tindakan segera saat tanda tanda vital terdeteksi diluar batas normal.

2. Beri O₂ selama bayi masih bernapas menggap menggap atau mengalami sianosis

Rasional : Memenuhi kebutuhan oksigen bayi.

F. LANGKAH VI IMPLEMENTASI

Tanggal 26 April 2011

Jam : 18.22 WITA.

1. Mencuci tangan sebelum dan sesudah merawat bayi dan menggunakan handscun saat memegang bayi.
2. Membersihkan jalan nafas dari lendir dengan menggunakan suction.
3. Memakaikan bayi pakaian yang bersih dan kering.
4. Memberikan rangsangan taktil.
5. Mengatur posisi bayi dengan posisi ekstensi.
6. Mengobservasi pemberian O_2 sebanyak 1 liter/menit menggunakan nasal kanul.
7. Memasang infus dekstrosa 5 %.
8. Memasang NGT (Naso Gastric Tube) dan menghentikan intake oral sesuai instruksi dokter.
9. Melakukan perawatan tali pusat.
10. Menginjeksi vit K (Neo K).
11. Memberikan suntikan antibiotik sesuai instruksi dokter (cefotaxim).
12. Merawat bayi dalam inkubator dengan suhu $34^{\circ}C$.
13. Mengobservasi TTV tiap 15 menit.

Hasil :

Jam	Frekuensi jantung	Pernapasan	Suhu
20.15	110 x / menit	Apnea	$35^{\circ}C$
20.30	111x / menit	10x / menit	$35^{\circ}C$
20.45	111x / menit	15x / menit	$35,2^{\circ}C$
21.00	100x / menit	20x / menit	$35,2^{\circ}C$
21.15	100x/ menit	20 x/ menit	$35,3^{\circ}C$

14. Mengobservasi tanda tanda infeksi tali pusat yaitu tali pusat merah, bengkak, ada pengeluaran nanah / darah.

Hasil : Tidak ada tanda tanda infesi tali pusat

G.LANGKAH VII EVALUASI

Tanggal 26 April 2011

Jam 21.15 WITA.

Diagnosa : BCB, SMK, bayi dengan asfiksia berat dan hipotermi.

Masalah Potensial : Potensial kematian.

1. Bayi belum dapat beradaptasi dengan lingkungan ekstra uterin ditandai dengan bayi masih mengalami hipotermi (suhu $35,3^{\circ}\text{C}$) dan metabolisme belum lancar (bayi belum BAB dan BAK).
2. Asfksia berat dan hipotermi belum teratasi ditandai dengan :
 - a. Bayi bernapas menggap menggap dengan frekuensi 20 x/menit.
 - b. Frekuensi jantung 100 x/menit.
 - c. Suhu $35,3^{\circ}\text{C}$.
 - d. Bayi belum memperlihatkan gerakan.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR

DENGAN ASFIKSIA BERAT PERAWATAN HARI KE I

DI RSUD SYEKH YUSUF GOWA

TANGGAL 27 APRIL 2011

DATA SUBJEKTIF

1. Ibu mengatakan melahirkan tanggal 26-04-2011 Jam 18.20 WITA.
2. Ibu mengatakan bayinya lahir tidak segera menangis dan saat ini masih dirawat di ruang bayi.

DATA OBJEKTIF

1. Bayi belum menangis sampai saat ini.
2. Bayi kejang kejang lalu apnea tanggal 27 April 2011 pukul 03.00 WITA.
3. TTV :
Frekuensi jantung : 110 x /menit.
Pernapasan : 3 x / menit (bernapas mengap mengap).
Suhu : 37,9 °C.
4. Keluar lendir dan darah dari hidung dan mulut.
5. Pupil kurang bereaksi terhadap cahaya.
6. Terpasang O₂ 1 liter / menit.
7. Terpasang infus dekstrosa 5 %.
8. Terpasang NGT (Naso Gastric Tube).

ASSASEMENT

Diagnosa aktual : BCB, SMK, bayi asfiksia berat hari ke II dengan febris.

Diagnosa potensial : Potensial infeksi tali pusat dan kematian.

PLANNING

Tanggal 27-04-2011

Jam : 03.02 WITA

1. Memberi tahu keluarga kondisi bayi saat ini dan meminta mereka berdoa.
2. Menurunkan suhu inkubator menjadi 32° C.
3. Menghisap lendir dengan suction.
4. Melakukan VTP.
5. Melakukan kompresi dada.
6. Merujuk bayi ke RS wahidin.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membandingkan tentang kesenjangan antara teori dan hasil tinjauan kasus pelaksanaan asuhan kebidanan pada bayi Ny “H” dengan asfiksia berat di RSUD Syekh Yusuf Gowa pada tanggal 26-27 April 2011.

Dalam hal ini, penulis akan membahas berdasarkan pendekatan asuhan kebidanan dengan tujuh langkah varney yaitu : pengumpulan data dasar, merumuskan diagnosis atau masalah aktual, merumuskan diagnosis atau masalah potensial, melaksanakan tindakan segera atau kolaborasi, merencanakan tindakan asuhan kebidanan, melakukan tindakan asuhan kebidanan, dan mengevaluasi asuhan kebidanan.

Langkah I :Pengkajian Dan Analisa Data

Tahap pengkajian diawali dengan pengumpulan data melalui anamnesis yang meliputi identitas bayi dan orang tua, data biologis atau fisiologis, riwayat kehamilan atau persalinan lalu dan sekarang, pemeriksaan fisik yang berpedoman pada format pengkajian yang tersedia.

Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber yaitu keluarga, bidan, dokter, catatan dokter dan bidan, serta tenaga kesehatan lainnya tanpa ada hambatan yang berarti, karena baik keluarga maupun petugas kesehatan di lahan praktek bersedia untuk memberikan informasi atau data yang berhubungan dengan penyakit dan perawatan klien sehingga memudahkan dalam pengumpulan data.

Tahap ini merupakan langkah awal yang akan menentukan langkah berikutnya sehingga kelengkapan data sesuai dengan kasus yang dihadapi akan menentukan benar tidaknya proses interpretasi data pada tahap selanjutnya.

Dari tinjauan kasus diperoleh data : Bayi lahir dengan presentase bokong dengan lama kala II \pm 15 menit, ketuban pecah saat pembukaan lengkap, bayi lahir tidak segera menangis, frekuensi jantung saat lahir 40 x kali permenit, tonus otot lemah bahkan hampir tidak ada, bayi tidak dapat memberikan reaksi bila diberikan rangsangan, warna kulit merah dengan ekstremitas biru, nilai APGAR 2/5.

Pada kasus By Ny”H” data yang diperoleh menunjukkan adanya persamaan gejala yang terdapat dalam tinjauan pustaka dengan kasus sehingga tidak ditemukan adanya kesenjangan .

Langkah II : Identifikasi Diagnosis / Masalah Aktual

Pada langkah kedua dilakukan identifikasi terhadap diagnosis atau masalah berdasarkan interpretasi yang benar atas data data yang telah dikumpulkan. Data dasar tersebut kemudian diinterpretasikan sehingga dapat dirumuskan diagnosis dan masalah yang spesifik.

Berdasarkan hasil analisa dan interpretasi data yang diperoleh dari langkah pertama, maka diagnosa atau masalah aktual pada bayi Ny “H” adalah : BCB, SMK, Bayi dengan asfiksia berat dan hipotermi.

1. Diagnosa BCB mengacu pada konsep teori bahwa bayi cukup bulan (BCB) adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 – 42 minggu maka hal ini sesuai dengan data yang ada yaitu dari hasil penilaian Ballard Score : 39 yang

berarti bayi lahir pada usia kehamilan antara 38 - 40 minggu. Selain itu bila dihitung dari tanggal HPHT : 17-07-2010 sampai bayi Ny “H” dilahirkan yaitu tanggal 26-04-2011 masa gestasinya adalah 40 minggu 2 hari dimana masa tersebut berada antara 37 minggu sampai 42 minggu yang menandakan bayi tersebut adalah bayi yang cukup bulan (BCB).

2. Bayi Ny “H” lahir pada usia kehamilan 40 minggu 2 hari dengan berat badan lahir 3700 gram. Berdasarkan kurva pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin dari Battaglia dan Lubchenco, berat badan bayi Ny “H” sesuai dengan masa kehamilan (SMK).
3. Dari tinjauan kasus diperoleh data : Bayi lahir tidak segera menangis, frekuensi jantung saat lahir 40 x kali permenit, tonus otot lemah bahkan hampir tidak ada, bayi tidak dapat memberikan reaksi bila diberikan rangsangan, warna kulit merah dengan ekstremitas biru, apgar score 2/5, hal ini sesuai dengan tinjauan pustaka yang membahas mengenai tanda dan gejala yang sering muncul pada asfiksia berat kecuali warna kulitnya.
4. Dari tinjauan kasus diperoleh data : bayi yang mengalami asfiksia berat lahir dengan presentase bokong dengan lama kala II \pm 15 menit, ketuban pecah saat pembukaan lengkap.

Dalam tinjauan pustaka dijelaskan bahwa asfiksia dapat disebabkan oleh beberapa factor diantaranya factor ibu dan fetus.

Faktor ibu misalnya pada partus lama atau macet. Pada proses persalinan bayi Ny “H” terjadi kala II yang lama sehingga menyebabkan bayi

mengalami aspirasi air ketuban dan lendir yang menyumbat saluran napas bayi sehingga bayi lahir dalam keadaan asfiksia.

Penyebab asfiksia yang lain adalah faktor fetus. Kompresi umbilikus yang mungkin terjadi dalam proses persalinan bokong di kala dua yang lama dapat mengakibatkan terganggunya aliran darah dalam pembuluh umbilikus dan menghambat pertukaran gas antara ibu dan janin, sehingga dapat menyebabkan asfiksia.

5. Dalam tinjauan kasus ditemukan suhu bayi saat lahir $35,3^{\circ}\text{C}$, sementara dalam tinjauan pustaka dikatakan bahwa suhu normal bayi adalah $36,5- 37,5^{\circ}\text{C}$. Sehingga bisa ditegakkan diagnosa aktual bahwa bayi sedang mengalami hipotermi saat ini.

Secara garis besar dapat dilihat bahwa tidak ada kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus. Bayi Ny "H" tetap digolongkan asfiksia berat meskipun warna kulitnya merah dengan ekstremitas biru bukan pucat atau kelabu seperti pada tinjauan pustaka. Penggolongan asfiksia berat lebih didasarkan atas nilai APGAR pada menit pertama yaitu ≤ 3 dibandingkan dengan tanda dan gejala yang sering ditemukan.

Langkah III : Identifikasi Diagnosis/Masalah Potensial

Pada kasus bayi Ny "H" yang dikaji segera setelah bayi lahir penulis dapat mengidentifikasi masalah potensial yang akan terjadi pada kasus ini yaitu dapat terjadi kematian.

Diagnosa potensial kematian diangkat karena bayi masih belum bernafas spontan dan frekuensi denyut jantungnya lemah yaitu 40 x/menit. Jika kekurangan

oksigen berlangsung terus menerus maka bisa terjadi kegagalan fungsi miokardium dan kegagalan fungsi curah jantung, penurunan tekanan darah, yang mengakibatkan aliran darah ke seluruh tubuh berkurang. Sebagai akibat dari kekurangan perfusi dan oksigenasi jaringan, akan menimbulkan kerusakan jaringan otak yang ireversibel, kerusakan organ tubuh lain, bahkan kematian.

Selain itu, suhu tubuh bayi Ny "H" 35,3°C, berarti ia sedang mengalami hipotermi yang dapat menyebabkan terjadinya penyempitan pembuluh darah yang mengakibatkan terjadinya metabolik anaerobik, meningkatkan kebutuhan oksigen, mengakibatkan hipoksemia dan berlanjut dengan kematian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara garis besar dapat dilihat bahwa tidak ada kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus

Langkah IV : Mengidentifikasi Perlunya Tindakan Segera / Kolaborasi

Menurut teori, tindakan segera dan kolaborasi dilakukan berdasarkan indikasi yang memerlukan penanganan cepat dan tepat sehingga memerlukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang ahli di bidangnya. Dalam kasus ini, tindakan segera yang dilakukan bidan bersama dokter adalah resusitasi bayi baru lahir mengingat bayi belum dapat bernapas spontan setelah lahir dan denyut jantung 40 x/menit.

Kerjasama untuk memulihkan kondisi bayi yang mengalami asfiksia ini sesuai dengan prinsip kerjasama dalam Islam yang memperbolehkan seseorang menjalin kerjasama dengan siapapun selama tujuannya adalah kebajikan dan takwa. Hal ini tercantum dalam firman Allah SWT dalam surah Al maidah ayat 2.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Terjemahan :

“.. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran ...”

Prosedur resusitasi yang dilakukan sesuai dengan yang dijelaskan dalam tinjauan pustaka dengan demikian tidak terdapat kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus.

Langkah V : Intervensi

Perencanaan adalah proses penyusunan suatu rencana tindakan berdasarkan identifikasi masalah saat sekarang, serta identifikasi diagnosa dan masalah lain yang mungkin terjadi. Namun terlebih dahulu harus dirumuskan tujuan yang akan dicapai serta kriteria keberhasilan.

Pada tahap perencanaan diagnosa kebidanan disusun menurut tingkat beratnya masalah dan kebutuhan pasien. Masalah asfiksia berat merupakan prioritas utama penulis sebagai masalah yang mengancam keselamatan bayi dan perlu segera diatasi, disusul masalah hipotermi. Sedang masalah potensial yang penulis angkat yaitu potensial terjadinya kematian.

Perencanaan pada tinjauan pustaka diterapkan pada perencanaan kasus, sehingga penulis tidak menemukan kesenjangan.

Langkah VI : Pelaksanaan Asuhan Kebidanan

Pada saat pelaksanaan asuhan kebidanan pada bayi Ny “H” tindakan yang telah direncanakan seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik. Dalam pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan penulis tidak menemukan hambatan

yang berarti karena seluruh tindakan yang dilakukan sudah berorientasi pada kebutuhan klien. Meskipun tujuan yang diinginkan belum dapat tercapai semuanya, dimana masalah asfiksia berat belum teratasi terlihat dari bayi masih bernapas menggap menggap dan masih tergantung dengan O₂.

Langkah VII : Evaluasi Asuhan Kebidanan.

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen kebidanan dimana pada tahap ini ditemukan kemajuan atau keberhasilan dalam mengatasi masalah yang dihadapi klien.

Pada kasus ini, setelah dilakukan perawatan dan tindakan yang intensif selama 2 hari maka bayi Ny“H” masih mengalami kesulitan bernapas ditandai dengan bayi yang bernapas menggap menggap dan tergantung O₂, serta denyut jantung yang semakin melemah menandakan masalah asfiksia berat belum teratasi dan tidak terjadi infeksi tali pusat.

Dengan demikian dapat terlihat bahwa proses manajemen kebidanan yang diterapkan pada bayi Ny“H” dengan diagnosa aktual BCB, SMK, bayi dengan asfiksia berat dan hipotermi di RSUD Syekh Yusuf Gowa belum berhasil dan kurang efektif. Oleh karena itu bayi memerlukan penanganan yang lebih baik di tingkat rujukan yang lebih tinggi yang memiliki fasilitas lebih lengkap dan tim medis yang lebih profesional. Dengan pertimbangan itulah maka bayi dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin.

Pendokumentasian Hasil Asuhan Kebidanan

Islam menekankan mengenai pentingnya sebuah pendokumentasian. Hal ini mulai terlihat pada saat Rasulullah SAW menyuruh sekretarisnya mencatat ayat-ayat Alquran dan surat-surat perjanjian. Bahkan diyakini bahwa kaum muslimin dapat berjaya dimasa lalu karena memiliki dokumentasi yang lengkap tentang catatan peradaban baik pada masa Islam maupun sebelumnya.

Adapun pendokumentasian hasil asuhan kebidanan dibuat sebagai laporan pertanggungjawaban seorang petugas kesehatan (bidan) atas segala tindakan yang dilakukan kepada klien dan dapat dijadikan bukti tertulis apabila terjadi gugatan dari klien dan keluarga. Pendokumentasian ini dibuat dalam rekam medik klien yang telah tersedia di setiap rumah sakit termasuk RSUD Syekh Yusuf Gowa.

Dalam pendokumentasian hasil asuhan kebidanan yang dibuat dalam bentuk SOAP ini secara garis besar tidak terdapat perbedaan antara praktik yang telah dilaksanakan di RSUD Syekh Yusuf dengan tinjauan pustaka yang sesuai dengan Protap RSUD Syekh Yusuf juga.

BAB V

PENUTUP

Setelah mempelajari teori dan pengalaman langsung di lahan praktek melalui studi kasus tentang asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan asfiksia berat di RSUD Syekh Yusuf Gowa, maka penulis menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut

A. KESIMPULAN

1. Bayi baru lahir dengan asfiksia berat memiliki nilai apgar pada menit pertama 0-3 dengan tanda dan gejala yaitu : frekuensi jantung kecil ≤ 40 kali per menit, tidak ada usaha napas, tonus otot lemah bahkan hampir tidak ada, bayi tidak dapat memberikan reaksi bila diberikan rangsangan
2. Bayi baru lahir dengan asfiksia berat memerlukan penanganan di rumah sakit yang memiliki ruang perinatologi atau Neonatal Intensif Care Unit (NICU) dengan tenaga kesehatan yang ahli dalam memberikan resusitasi beserta alat resusitasi yang lengkap dan siap pakai.
3. Bidan harus berkolaborasi dengan dokter anak dalam menangani bayi asfiksia berat utamanya dalam hal pemberian obat-obatan. Hal ini sesuai dengan prinsip kerjasama dalam agama Islam yaitu tolong menolong dalam hal kebajikan.
4. Penanganan yang diberikan pada bayi baru lahir dengan asfiksia berat yaitu : dikeringkan, dihangatkan dengan Infant warmer, diatur posisinya

sedikit ekstensi, lalu dihisap lendir dari hidung dan mulutnya dengan suction, diberikan VTP dan kompresi dada, kemudian setelah bayi bernapas spontan tetapi masih biru maka dilakukan pemberian O₂ 1 liter / menit lewat nasal kanul.

5. Dokumentasi sangat diperlukan pada setiap manajemen asuhan kebidanan karena merupakan salah satu bentuk laporan pertanggung jawaban bidan terhadap tindakan asuhan kebidanan yang telah diberikan kepada klien dan dapat dijadikan bukti tertulis apabila terjadi gugatan dari klien dan keluarga.

B. SARAN

1. Bagi Tenaga Kesehatan
 - a. Prognosis bayi asfiksia berat buruk dan seringkali berakhir dengan kematian. Meskipun demikian, sebagai tenaga kesehatan kita senantiasa dituntut untuk tetap berusaha menyelamatkan bayi dengan melakukan tindakan asuhan secara profesional baru menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah SWT karena hidup dan matinya seseorang hanyalah Allah SWT yang mengetahui.
 - b. Tenaga kesehatan khususnya bidan hendaknya senantiasa membina hubungan baik dengan klien dan keluarga sehingga tercapai tujuan yang diinginkan.
2. Bagi Institusi
 - a. Membekali mahasiswa dengan keterampilan laboratorium yang cukup sebelum turun di lapangan khususnya dalam hal resusitasi

karena keterampilan ini merupakan bantuan dasar kehidupan (*basic life support*) yang wajib dimiliki bagi setiap tenaga kesehatan.

- b. Menambah bahan bacaan di perpustakaan yang berhubungan dengan perkembangan terbaru ilmu kebidanan baik yang berasal dari dalam maupun di luar negeri sehingga dapat memperluas wawasan mahasiswa kebidanan UIN Alauddin.
3. Bagi RSUD Syekh Yusuf Gowa
 - a. Sebaiknya rumah sakit senantiasa memeriksa kelengkapan dan kelayakan alat agar selalu dalam kondisi siap pakai.
 - b. Seharusnya dokter anak berada di ruang perinatologi 24 jam, dan bila berhalangan hendaknya ada yang bisa menggantikan sehingga tidak mengganggu proses pelayanan.
 4. Bagi Pemerintah

Pemerintah sebagai penentu kebijakan dalam pelayanan kesehatan masyarakat diharapkan :

 - a. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
 - b. Sering mengadakan pelatihan demi meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para tenaga kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran & Terjemahannya. 2005. Jakarta: Departemen Agama RI.

Alhafidzh, Ahsin W. 2007. *Fikih Kesehatan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Anonim. *Asfiksia*. <http://puskesmasdwn1.files.wordpress.com> diakses tanggal 23 Januari 2011.

Anonim. *Asuhan pasca Resusitasi*. <http://puskesmasdwn1.files.wordpress.com> diakses tanggal 23 Januari 2011.

Arief, dan Weni Kristiyana Sari. 2010. *Neonatus dan Keperawatan Anak*. Yogyakarta : Nuha medika.

Boyle, Maureen. 2007. *Kegawatdaruratan Dalam Persalinan : Buku Saku bidan*. Jakarta : EGC.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2008. *Pencegahan dan Penatalaksanaan Asfiksia Neonatorum*. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Dewi, Vivian Nanny Lia. 2010. *Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita*. Jakarta : Salemba Medika.

Dinas kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan. *Profil Kesehatan Sulawesi Selatan 2008*, <http://dinkes-sulsel.go.id>. diakses tanggal 23 januari 2011

Dinas kesehatan RI. *Profil Dinas Kesehatan Indonesia 2008* .www.depkes.go.id diakses tanggal 21 januari 2011

Drew, David. Philip Jevon dan Margaret Raby. 2008. *Resusitasi bayi baru lahir*. Jakarta : EGC.

Hidayat, A. Aziz Alimul. 2008. *Pengantar Ilmu Kesehatan Anak Untuk Pendidikan Kebidanan*. Jakarta : Salemba Medika.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2010. *Paduan pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir berbasis perlindungan Anak*. Jakarta : Direktorat Kesehatan Anak Khusus.

Manuaba, Ida Ayu Chandranita .I.B.G.Fajar manuaba dan I.B.G. Manuaba. 2008. *Gawat Darurat Obstetri-Gynekologi & Obstetric – Gynekologi Sosial Untuk Profesi Bidan*. Jakarta : EGC.

Naim, M. Furqaan dkk. 2009. *Paduan* 81 *an Skripsi*. Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Makassar.

Oxorn, Harry dan William R.Forte. 2010. *Ilmu kebidanan: Patologi dan Fisiologi Persalinan*. Yogyakarta : Yayasan Essentia Medika.

Proverawati, Atikah. 2010. *Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)*. Jakarta : Nuha Medika.

Saifuddin, Abdul Bari. 2008. *Ilmu Kebidanan Sarwono Prawirohardjo Edisi IV*. Jakarta : PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

_____. 2006. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta : PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

Salahuddin . 2010. *Manajemen Syariah*. <http://ballecozzzz.multiply.com> diakses tanggal 1 April 2011

Salmah, dkk. 2006. *Asuhan Kebidanan Antenatal*. Jakarta : EGC.

Shihab, M.Quraish. 2002. *Tafsir Al misbah : pesan , kesan dan keserasian Al quran volume 1*. Jakarta : lentera Hati.

_____. 2002. *Tafsir Al misbah : pesan , kesan dan keserasian Al quran volume 3*. Jakarta : lentera Hati.

_____. 2002. *Tafsir Al misbah : pesan , kesan dan keserasian Al quran volume 12*. Jakarta : lentera Hati.

_____. 2002. *Tafsir Al misbah : pesan , kesan dan keserasian Al quran volume 14*. Jakarta : lentera Hati.

Soepardan, Suryani. 2007. *Konsep Kebidanan*. Jakarta : EGC.Varney

Sudarti. 2010. *Kelainan dan Penyakit Pada Bayi dan Anak*. Yogyakarta : Nuha Medika.

Tiran, Denise. 2005. *Kamus Saku Kebidanan Ed X*. Jakarta :EGC.

Varney, Helen. 2007. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Ed IV*.Jakarta : EGC.

Walsh, Linda V. 2007. *Buku Ajar Kebidanan Komunitas* .Jakarta :EGC.

WHO. *Part II Healt Indikator*. <http://www.who.int/whosis/whostat/en/>, diakses tanggal 21 januari 2011

Wiknjosastro, Hanifa.2007. *Ilmu Kebidanan Edisi III*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

Yulianti, Devi. 2005. *Buku Saku Manajemen Komplikasi Kehamilan dan Persalinan*.
Jakarta : EGC.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama : Tasliyah Noor Ningtiyas.
Nim : 70400008054.
Tempat/tanggal lahir : Aikima, 13 Desember 1989
Alamat : Dusun Bocco Boccoe Desa Paenre Lompoe
Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
No Hp : 085242602235.

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Bhayangkari Kabupaten Jayawijaya Propinsi Irian Jaya tahun 1996.
2. SDN 36 Bontosunggu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2002.
3. SMP pondok pesantren putri “Ummul Mukminin” Kabupaten Makassar Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2005.
4. MAN Bulukumba kabupaten bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2008.
5. Mengikuti pendidikan di prodi kebidanan Fakultas ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar tahun 2008-2011.