

**GAMBARAN ANGKA KEJADIAN PREEKLAMPSIA DALAM KEHAMILAN  
DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SITI FATIMAH  
PERIODE JANUARI-DESEMBER  
TAHUN 2010**



**KARYA TULIS ILMIAH**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Menyelesaikan Pendidikan D3  
Jurusan Kebidanan di Universitas Islam Negeri  
(UIN) Alauddin Makassar**

**Oleh**

**SAIDAH BAHAR**

**70400008052**

**PRODI KEBIDANAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2011**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka karya tulis ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 16 Juni 2011

Penyusun

**SAIDAH BAHAR**

**70400008052**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH**

Nama : Saidah Bahar

Nim : 70400008052

Judul : Gambaran Angka Kejadian Preeklamsia dalam Kehamilan di RSIA Siti  
Fatimah Periode Januari-Desember Tahun 2010

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam ujian akhir  
KTI dihadapan tim penguji program DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pembimbing,

Sitti Saleha, S.Si.T, SKM, M.Keb

Nip: 19760126 200604 2 001

## KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil' alamin, segala puji hanya milik Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penulis dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah ini hingga selesai. Salam dan shalawat senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu' Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya uswa dan qudwah, petunjuk jalan kebenaran dalam menjalankan aktivitas keseharian kita.

Tiada kata yang patut penulis ucapkan selain puji syukur kehadiran Allah SWT. Karena berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis merampungkan Karya Tulis Ilmiah ini, walaupun hanya dalam bentuk sederhana. Dengan segala keterbatasan penulis menyadari bahwa apa yang tertuang dalam Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan baik dalam susunan kalimatnya maupun pada bobot keilmuannya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.

Dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah ini penulis menemukan banyak hambatan-hambatan, namun berkat bimbingan dari berbagai pihak akhirnya Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Untuk itu saya merasa berhutang budi dan sepatuhnya berterimakasih, yang tak terhingga kepada ayahanda, ibunda tercinta dan saudara-saudaraku tersayang yang telah memberikan perhatian dan pengorbanan mulia serta keikhlasan do'a demi kesuksesan penulis. Selain itu penulis tak lupa pula penulis ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., M. S. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. dr. H. M. Furqaan Naiem, M.Sc., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Sitti Saleha, S.Si.T, S.KM, M.Keb selaku Ketua Program Studi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah membantu kami dalam menyelesaikan pendidikan dan sekaligus selaku pembimbing yang telah banyak membantu dan memberi arahannya selama penyusunan KTI ini.
4. dr. Nadyah, S.Ked sebagai penguji I yang telah memberikan masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
5. Drs. Supardin, M. HI sebagai penguji II yang telah memberikan masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
6. Seluruh staf dosen dan staf administrasi Jurusan Kebidanan yang telah memberikan bantuan moril bagi penulis, baik dalam proses pendidikan maupun dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
7. Seluruh staf pegawai di RSIA Siti Fatimah yang telah memberikan bantuan moril bagi penulis dalam proses penyusunan karya tulis ilmiah ini.

8. Seluruh rekan-rekan seperjuanganku di kebidanan Angkatan 08 yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan serta kebersamaannya dalam suka maupun duka selama pendidikan sampai terselesainya Karya Tulis Ilmiah ini dan pihak-pihak lain yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengharapkan Karya Tulis Ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat-Nya kepada pihak yang telah membantu penulis selama ini, Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 16 Juni 2011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Tinjauan Umum tentang kehamin .....	8
1. Definisi Kehamilan .....	8
2. Diagnosis Kehamilan .....	9
3. Perubahan Anatomi Dan Fisiologi Pada Wanita Hamil .....	13
4. Perubahan dan Adaptasi psikologis dalam Masa kehamilan ..	19

B. Tinjauan Umum tentang Preeklamsia .....	20
1. Defenisi Preeklamsia .....	20
2. Etiologi .....	22
3. Faktor Resiko .....	22
4. Klasifikasi Preeklamsia .....	23
5. Patofisiologi .....	23
6. Gejala Klinis .....	24
7. Komplikasi .....	25
8. Pemeriksaan dan Diagnosis .....	27
9. Pencegahan .....	28
10. Penatalaksanaan dan Pengobatan .....	29
C. Tinjauan Umum tentang Variabel Independen .....	34
D. Tinjauan Islam tentang Preeklamsia dalam Kehamilan .....	38
BAB III KERANGKA KONSEP .....	46
A. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian .....	46
B. Skema Kerangka Konsep Penelitian .....	48
C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif .....	49
BAB IV METODE PENELITIAN .....	51
A. Jenis Penelitian .....	51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	51
C. Populasi dan Sampel .....	52
D. Teknik Pengambilan Sampel .....	52



E. Metode Pengumpulan Data .....	53
F. Metode Pengolahan Data dan Analisis data .....	53
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
A. Hasil Penelitian .....	55
B. Pembahasan .....	57
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>65</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Distribusi Jumlah Kejadian Preeklamsia dalam Kehamilan Berdasarkan Umur Ibu Hamil di RSIA Siti Fatimah Tahun 2010 .....	55
Tabel 2	Distribusi Jumlah Kejadian Preeklamsia dalam Kehamilan Berdasarkan Graviditas Ibu Hamil di RSIA Siti Fatimah Tahun 2010.....	56
Tabel 3	Distribusi Jumlah Kejadian Preeklamsia dalam Kehamilan Berdasarkan Umur Kehamilan Ibu Hamil di RSIA Siti Fatimah Tahun 2010.....	57

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1. Leopold .....	9



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Kegiatan Konsul

Lampiran 2. Lembar Permohonan Izin Pengambilan Data Awal di RSIA Siti

Fatimah Makassar

Lampiran 3. Lembar Disposisi Permohonan Izin Pengambilan Data Awal di RSIA

Siti Fatimah Makassar

Lampiran 4. Lembar Permohonan Izin Penelitian Kepada Balitbangda Provinsi

Sulawesi Selatan

Lampiran 5. Lembar Izin/ Rekomendasi Penelitian dari Balitbangda Provinsi

Sulawesi Selatan

Lampiran 6. Lembar Disposisi Izin/ Rekomendasi Penelitian di RSIA Siti Fatimah

Makassar

Lampiran 7. Lembar Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di RSIA Siti

Fatimah Makassar

Lampiran 8. Master Tabel Gambaran Angka Kejadian Preeklamsia dalam

Kehamilan di RSIA Siti Fatimah tahun 2010

## ABSTRAK

**JURUSAN KEBIDANAN  
 UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
 KARYA TULIS ILMIAH, MEI 2011**

**SAIDAH BAHAR, 70400008052**

**Pembimbing : Sitti Saleha, S. SiT, SKM, M. Keb**

**“Gambaran Angka Kejadian Preeklamsia dalam Kehamilan di RSIA Siti Fatimah Makassar Periode Januari-Desember Tahun 2010”**

**xv + VI BAB + 64 Halaman + 1 Gambar + 3 Tabel + 8 Lampiran**

Preeklamsia adalah penyakit dengan tanda-tanda hipertensi, edema dan proteinuria yang timbul karena kehamilan. Data yang diperoleh dari pencatatan rekam medik di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2010 jumlah ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya dan dilayani di RSIA Siti Fatimah Tahun 2010 sebanyak 1987 orang dan diantaranya terdapat 153 orang yang menderita preeklamsia. Penelitian ini bertolak pada rumusan masalah yaitu : Bagaimana gambaran angka kejadian preeklamsia dalam kehamilan di RSIA Siti fatimah makassar periode januari-desember tahun 2010.

Penelitian ini dilaksanakan di RSIA Siti Fatimah Makassar yang bertujuan untuk mengetahui gambaran angka kejadian preeklamsia dalam kehamilan di RSIA Siti fatimah makassar periode januari-desember tahun 2010 berdasarkan karakteristik umur ibu, graviditas dan usia kehamilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dan cara pengambilan sampelnya secara *purposive sampling* serta untuk pengumpulan data menggunakan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kelompok umur ibu 20-35 tahun terdapat sebanyak 123 orang (80,39%) sedangkan umur ibu <20 dan >35 tahun sebanyak 30 orang (19,61%). Penderita preeklamsia lebih banyak ditemukan pada graviditas II-IV sebanyak 78 orang (50,98%) sedangkan pada graviditas I dan  $\geq$ V sebanyak 75 orang (49,03%). Dan penderita preeklamsia lebih banyak ditemukan pada umur kehamilan >20 minggu yaitu sebanyak 134 orang (87,58%) sedangkan pada umur kehamilan  $\leq$ 20 minggu sebanyak 19 orang (12,42%).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa preeklamsia lebih banyak ditemukan pada umur ibu 20-35 tahun sebanyak 123 orang (80,39%), pada graviditas lebih banyak ditemui pada ibu graviditas II-IV sebanyak 78 orang (50,98) dan pada umur kehamilan > 20 minggu sebanyak 134 orang (87,58%). Oleh sebab itu diharapkan para tenaga kesehatan memberikan penyuluhan tentang pemeriksaan antenatal secara teratur supaya dapat menemukan tanda-tanda dini preeklamsia agar kasus preeklamsia dapat tertangani dengan baik.

**Daftar Pustaka : 29 (2001-2010)**

**Kata Kunci : Preeklamsia, Kehamilan, Umur, Graviditas dan Umur Kehamilan**

## ABSTRACT

**Midwifery Departement Student  
At Allaudin Islamic State University of Makassar  
Scientific Writing, Mey 2011**

**Saidah Bahar, 70400008052**

**Advisors : Sitti Saleha, S. SIT, SKM, M. Keb**

**“Preview Figures Genesis Preeclampsia in Pregnancy in RSIA Siti Fatimah  
Makassar Period January-December 2010”**

**xv+ VI BAB + 65 pages + 1 Picture + 3 Table + 8 Appendix Table**

Preeclampsia is a disease with signs of hypertension, edema and proteinuria arising because of the pregnancy. Data obtained from the recording of medical records in RSIA Siti Fatimah Makassar in 2010 the number of pregnant women who examined her pregnancy and is served in RSIA Siti Fatimah in 2010 as many 1987 people and such there are 153 people who suffer from preeclampsia. The study was based on the formulation of the problem is : How is the picture the incidence of preeclampsia in pregnancy in RSIA Siti Fatimah makassar period january-december 2010.

The research was conducted in RSIA Siti Fatimah Makassar which aims to know the description of the incidence of preeclampsia in pregnancy in RSIA Siti Fatimah Makassar in January-December 2010 period. It based on the characteristics of maternal age, gravidities and gestational age. Kind research used descriptive research and how to capture the sample by purposive sampling and for collecting data using secondary data.

The results of this study indicate that the maternal age group 20-35 years there were as many as 123 people (80,39%) while maternal age <20 and >35 years as many as 30 people (19,61%). Patients with preeclampsia are more common in gravidities II-IV of 78 people (50,98%) while in gravidities I and  $\geq$ V 75 people (49,03%). And people with preeclampsia are more common in gestational age <20 weeks as many as 134 people (87,58%) while at  $\leq$ 20 weeks gestation were 19 people (12,42%).

From the above description, it can be concluded that preeclampsia are more common in women aged 20-35 years as many as 123 people (80,39%), at gravidities more found in the mother gravidities II-IV of 78 people (50.98) and on gestational age >20 weeks as many as 134 people (87,58%). Therefore it is expected that health workers from providing information about antenatal care on a regular basis in order to find early signs of preeclampsia for cases of preeclampsia can be handled properly.

**References : 29 (2001-2010)**

**Keywords : Preeclampsia, Pregnancy, Age, Gravidities and Age  
Pregnancy**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Angka Kematian Maternal (AKM) dan Angka Kematian Perinatal (AKP) merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan dalam menilai keberhasilan pelayanan. Keberhasilan menurunkan Angka Kematian Maternal (AKM) di negara-negara maju saat ini menganggap Angka Kematian Perinatal (AKP) merupakan parameter yang lebih baik dan lebih peka untuk menilai kualitas pelayanan kebidanan. Hal ini mengingat kesehatan dan keselamatan janin dalam rahim sangat tergantung pada keadaan serta kesempurnaan bekerjanya sistem dalam tubuh ibu, yang mempunyai fungsi untuk menumbuhkan hasil konsepsi dari mudigah menjadi janin cukup bulan. Salah satu penyebab kematian perinatal adalah preeklampsia (Bambang, 2009).

Penyakit hipertensi pada kehamilan berperan besar dalam morbiditas dan mortalitas maternal dan perinatal. Hipertensi diperkirakan menjadi komplikasi sekitar 7% sampai 10%seluruh kehamilan. Seluruh ibu yang mengalami hipertensi selama masa hamil, setengah sampai dua pertiganya didiagnosa mengalami preeklampsia (Bobak, 2004).

Preeklampsia merupakan penyakit dengan tanda-tanda hipertensi dan edema serta proteinuria yang timbul karena kehamilan yang umumnya terjadi setelah usia 20 minggu atau lebih awal yang hampir selalu terjadi pada

primigravida dimana rahim untuk pertama kalinya menerima hasil pembuahan yang dapat menimbulkan reaksi terhadap kehamilan. Seorang wanita yang menderita preeklampsia ringan lebih besar peluang untuk menderita preeklampsia yang berat pada kehamilan berikutnya yang dapat menyebabkan tingginya morbiditas dan mortalitas terhadap ibu dan janinnya (Bambang, 2009).

Etiologi preeklampsia sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Teori yang terkenal sebagai penyebab preeklampsia adalah teori iskemia plasenta. Akan tetapi, teori ini belum dapat menerangkan semua hal yang berkaitan dengan preeklampsia. Penurunan angka kesakitan dan kematian akibat preeklampsia dapat tercapai bila tindakan pencegahan dan diagnosis penyakit dilaksanakan lebih dini serta pengobatan sesegera mungkin. Usaha pencegahan dini dapat dilakukan apabila dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab utama dan faktor-faktor risiko kejadian preeklampsia. Saat ini beberapa faktor risiko telah berhasil diidentifikasi, sehingga diharapkan dapat mencegah timbulnya preeklampsia (Rahayuningsih, 2009).

Insidensi preeklampsia sering mencapai sekitar 5 % meskipun angkanya sangat bervariasi dalam berbagai laporan. Insidensi dipengaruhi oleh paritas, dengan wanita primigravida memiliki resiko lebih besar 7-10 % jika dibandingkan dengan wanita multigravida. Faktor resiko lain yang berkaitan dengan preeklampsia antara lain adalah kehamilan kembar, riwayat preeklampsia sebelumnya, usia ibu lebih dari 35 tahun dan berat ibu berlebihan (Leveno, 2009).



Menurut WHO (World Health Organisation), pada tahun 2007 berkisar 58.500 ibu meninggal akibat masalah kehamilan dan persalinan, bahkan dari separuh jumlah seluruh kematian terjadi dalam 24 jam setelah melahirkan, yang disebabkan oleh perdarahan (40-50%), infeksi (20-30%) dan preeklamsia (20-30 %) (Ali, 2009).

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa setiap wanita hamil memiliki resiko mengalami komplikasi yang dapat mengancam jiwanya. Oleh karenanya, WHO menganjurkan agar setiap ibu hamil, mendapatkan sedikitnya 4 kali kunjungan selama periode antenatal yaitu satu kali kunjungan selama trimester pertama, satu kali kunjungan selama trimester kedua dan dua kali kunjungan selama trimester ketiga (Damopolii, 2006).

Pemeriksaan antenatal yang teratur dan teliti dapat menemukan tanda-tanda dini preeklamsia dan dalam hal itu harus dilakukan penanganan semestinya. Kita perlu lebih waspada akan timbulnya preeklamsia dengan adanya faktor predisposisi. Walaupun timbulnya preeklamsia tidak dapat dicegah sepenuhnya, namun frekuensinya dapat dikurangi dengan pemberian penerangan secukupnya dan pelaksanaan pengawasan yang baik pada wanita hamil (Wiknjosastro, 2007).

Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, angka kematian maternal di Indonesia sebesar 248/100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut termasuk tinggi, dimana Departemen kesehatan menargetkan angka kematian ibu turun menjadi 125 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 (Rahayuningsih, 2009).

Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008 diperoleh data angka kematian meternal 92 orang dan diantaranya terdapat 30 orang yang meninggal disebabkan karena preeklamsia/ eklamsia. Sedangkan pada tahun 2009 diperoleh data kematian maternal 94 orang dan diantaranya terdapat 35 orang yang meninggal disebabkan karena preeklamsia/ eklamsia (Rekapitulasi Dinkes Provinsi Sul-Sel).

Data yang didapatkan dari Rekam Medik RSIA Siti Fatimah Makassar pada tahun 2007 jumlah ibu hamil sebanyak 2045 dan yang terdiagnosa preeklamsia sebanyak 145 orang, pada tahun 2008 jumlah ibu hamil sebanyak 2130 orang dan yang terdiagnosa preeklamsia sebanyak 159 orang, pada tahun 2009 jumlah ibu hamil 2360 orang dan yang terdiagnosa preeklamsia sebanyak 168 orang (Rekam Medik RSIA Siti fatimah).

Telah ditemukan di atas bahwa salah satu akibat terjadinya morbiditas dan mortalitas ibu disebabkan oleh preeklamsia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Gambaran Angka Kejadian Ibu Hamil Preeklamsia Di RSIA Siti Fatimah Tahun 2010”. Dan apabila terdapat kasus preeklamsia pada ibu hamil perlu adanya kewaspadaan untuk terjadinya eklamsia sehingga kita dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas pada ibu hamil akibat preeklamsia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas dan mengacu pada tujuan yang akan dicapai pada penelitian, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran angka kejadian preeklamsia berdasarkan umur ibu hamil di RSIA Siti Fatimah tahun 2010 ?
2. Bagaimana gambaran angka kejadian preeklamsia berdasarkan graviditas ibu hamil di RSIA Siti Fatimah tahun 2010 ?
3. Bagaimana gambaran angka kejadian preeklamsia berdasarkan usia kehamilan ibu hamil di RSIA Siti Fatimah tahun 2010 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan umum**

Diperolehnya gambaran angka kejadian ibu hamil yang mengalami preeklamsia di RSIA Siti Fatimah periode januari-desember 2010.

### **2. Tujuan khusus**

- a. Untuk mengetahui gambaran angka kejadian preeklamsia berdasarkan umur ibu hamil di RSIA Siti Fatimah tahun 2010.
- b. Untuk mengetahui gambaran angka kejadian preeklamsia berdasarkan graviditas ibu hamil di RSIA Siti Fatimah tahun 2010.

- c. Untuk mengetahui gambaran angka kejadian preeklamsia berdasarkan usia kehamilan ibu hamil di RSIA Siti Fatimah tahun 2010.

#### **D. Manfaat penelitian**

##### **1. Manfaat ilmiah**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan yang telah ada tentang preeklamsia dalam kehamilan.

##### **2. Manfaat praktis**

###### **a. Bagi peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan bagi peneliti tentang gambaran angka kejadian preeklamsia dalam kehamilan serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Kebidanan UIN Alauddin Makassar.

###### **b. Bagi institusi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan Kebidanan UIN Alauddin Makassar dan sebagai acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya

###### **c. Bagi tempat penelitian**

Diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi pihak RSIA Siti Fatimah Makassar dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program upaya pencegahan preeklamsia.

### 3. Manfaat komunitas

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pengetahuan masyarakat tentang preeklamsia.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan**

##### **1. Defenisi kehamilan**

- a. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir (Saifuddin dkk, 2007).
- b. Kehamilan dimulai sejak sperma (spermatozoa) atau benih laki-laki masuk kedalam sel telur wanita (ovum). Saat itulah terjadi pembuahan atau konsepsi (Alhafidz, 2007).
- c. Lamanya kehamilan mulai dari ovulasi sampai partus adalah kira-kira 280 hari (40 minggu), dan tidak lebih dari 300 hari (43 minggu). Kehamilan 40 minggu ini disebut kehamilan matur (cukup bulan). Bila kehamilan lebih dari 43 minggu disebut kehamilan postmatur. Kehamilan antara 28 dan 36 minggu disebut kehamilan prematur.

Ditinjau dari tuanya kehamilan di bagi dalam 3 bagian :


- 1) Kehamilan triwulan pertama (antara 0 sampai 12 minggu).
- 2) Kehamilan triwulan kedua (antara 12 sampai 28 minggu).
- 3) Kehamilan triwulan terakhir (antara 28 sampai 40 minggu)

(Wiknjosastro 2007).

## 2. Diagnosis Kehamilan

Pada wanita hamil terdapat tanda dan gejala antara lain :

- a. Tanda pasti kehamilan
  - 1) Adanya pergerakan janin secara objektif oleh petugas baik baik inspeksi maupun palpasi, dimana hal ini dapat dirasakan oleh ibu pada kehamilan 18 minggu pada primigravida dan 16 minggu pada kehamilan multigravida.
  - 2) Adanya Denyut Jantung Janin (DJJ) yang dapat diketahui dengan menggunakan fetal electro cardiograph pada usia kehamilan 12 minggu. Selain dopler, laenek juga digunakan untuk mendeteksi adanya serta menghitung frekuensi Denyut Jantung Janin (DJJ) mulai umur kehamilan 18-20 minggu.
  - 3) Jika teraba bagian-bagian janin.



- a) Leopold I : Menentukan tinggi fundus uteri dan bagian yang terletak di fundus uteri.
- b) Leopold II : Menentukan letak punggung janin.

- c) Leopold III : Menentukan bagian yang terletak di bagian bawah uterus.
  - d) Leopold IV : Menentukan apakah janin sudah masuk PAP atau berapa jauh masuknya bagian terbawah dalam PAP (Saminem, 2008).
- 4) Pemeriksaan rontgen memperlihatkan adanya kerangka janin, namun pemeriksaan ini memberi efek radiasi terhadap ibu dan janin, sehingga untuk penentuan pasti kehamilan dilakukan dengan cara lain.
- 5) USG dapat memperlihatkan adanya kantong kehamilan juga dapat menilai pertumbuhan janin (Damopolii dkk, 2006).
- b. Tanda-tanda dugaan hamil
- 1) *Amenorea (tidak dapat haid)*. Gejala ini sanga penting karena umumnya wanita hamil tidak dapat haid lagi. Penting diketahui tanggal hari pertama haid terakhir, supaya dapat ditentukan tuanya kehamilan dan bila persalinan diperkirakan akan terjadi.
  - 2) *Nausea (enek) dan emesis (muntah)*. Terjadi umumnya pada bulan-bulan pertama kehamilan, disertai kadang-kadang oleh emesis. Sering terjadi pada pagi hari, tetapi tidak selalu. Keadaan ini lazim disebut *morning sickness*. Dalam batas-batas tertentu keadaan ini masih fisiologik. Bila terlampau sering, dapat mengakibatkan gangguan kesehatan dan disebut hiperemesis gravidarum.



- 3) *Mengidam (mengingini makanan atau minuman tertentu)*.  
Mengidam sering terjadi pada bulan-bulan pertama akan tetapi menghilang dengan makin tuanya kehamilan.
- 4) *Pingsan*. Sering dijumpai bila berada pada tempat-tempat ramai.  
Dianjurkan untuk tidak pergi ke tempat-tempat ramai pada bulan-bulan pertama kehamilan. Hilang sesudah kehamilan 16 minggu.
- 5) *Mamma menjadi tegang dan membesar*. Keadaan ini disebabkan oleh pengaruh estrogen dan progesteron yang merangsang duktuli dan alveoli di mamma.
- 6) *Anoreksia (tidak ada nafsu makan)*. Pada bulan-bulan pertama terjadi anoreksia, tetapi setelah itu nafsu makan timbul lagi. Hendaknya dijaga jangan sampai salah pengertian makan untuk dua orang, sehingga kenaikan berat badan tidak sesuai dengan tuanya kehamilan.
- 7) *Sering kencing* terjadi karena kandung kencing pada bulan-bulan pertama kehamilan tertekan oleh uterus yang mulai membesar. Pada triwulan kedua umumnya keluhan ini hilang oleh karena uterus yang membesar keluar dari rongga panggul. Pada akhir triwulan gejala bisa timbul karena janin mulai masuk ke ruang panggul dan menekan kembali kandung kencing.
- 8) *Obstipasi* terjadi karena tonus otot menurun yang disebabkan oleh pengaruh hormone steroid.

- 9) *Pigmentasi kulit* terjadi pada kehamilan 12 minggu ke atas. Pada pipi, hidung dan kadang-kadang tampak deposit pigmen yang berlebihan, dikenal sebagai kloasma gravidarum. Areolae mammae juga menjadi lebih hitam karena didapatkan deposit pigmen yang berlebih. Daerah leher lebih hitam. Demikian pula linea alba di garis tengah abdomen menjadi lebih hitam (linea gresia). Pigmentasi ini terjadi karena pengaruh dari hormon kortiko-steroid plasenta yang merangsang kulit.
- 10) *Epulis* adalah suatu hipertrofi papilla gingivae. Sering terjadi pada triwulan pertama.
- 11) *Varises*. Sering dijumpai pada triwulan terakhir. Di dapat pada daerah genetalia eksterna, kaki dan betis. Pada multigravida kadang-kadang varises ditemukan pada kehamilan yang terdahulu, timbul kembali pada triwulan pertama. Kadang-kadang timbulnya varises merupakan gejala pertama kehamilan (Wiknjosastro, 2007).
- c. Tanda tidak pasti hamil :
- 1) Adanya pembesaran uterus.
  - 2) Serta pemeriksaan tes biologis kehamilan positif (karena sebagian kemungkinan positif palsu).
  - 3) Adanya tanda hegar.
  - 4) Tanda chadwick.
  - 5) Tanda piscaseck. Uterus membesar kesalah satu jurusan hingga menonjol jelas kejurusan pembesaran tersebut.

- 6) Tanda braxton hicks. Bila uterus dirangsang dan mudah berkontraksi.
- 7) Serta terabanya ballotemen (Damopolii, 2006).

### 3. Perubahan anatomi dan fisiologi pada wanita hamil

Beberapa perubahan anatomi dan psikologis pada ibu hamil :

#### a. Uterus

Uterus akan membesar pada bulan-bulan pertama di bawah pengaruh estrogen dan progesteron yang kadarnya meningkat. Pembesaran ini pada dasarnya disebabkan oleh hipertrofi otot polos uterus, di samping itu serabut-serabut kolagen yang ada pun menjadi higroskopik akibat meningkatnya kadar estrogen sehingga uterus dapat mengikuti pertumbuhan janin.

Berat uterus normal lebih kurang 30 gram pada akhir kehamilan (40 minggu) berat uterus ini menjadi 1000 gram, dengan panjang lebih kurang 20 cm dan dinding lebih kurang 2,5 cm. Pada bulan-bulan pertama kehamilan bentuk uterus seperti buah advokat, agak gepeng. Pada kehamilan 4 bulan uterus berbentuk bulat.

Pada kehamilan 8 minggu uterus membesar sebesar telur bebek dan pada kehamilan 12 minggu kira-kira sebesar telur angsa. Pada saat ini fundus uteri telah dapat diraba dari luar di atas simfisis. Pada kehamilan 16 minggu besar uterus kira-kira sebesar kepala bayi atau sebesar tinju orang dewasa. Dari luar fundus uteri kira-kira terletak di

antara setengah jarak pusat ke simfisis. Pada kehamilan 20 minggu, fundus uteri terletak kira-kira di pinggir bawah pusat, sedangkan pada kehamilan 24 minggu fundus uteri berada tepat di pinggir atas pusat. Pada kehamilan 28 minggu fundus uteri terletak kira-kira 3 jari di atas pusat atau sepertiga jarak antara pusat ke processus xifoideus.

Pada kehamilan 32 minggu fundus uteri terletak di antara setengah jarak pusat dan processus xifodeus. Pada kehamilan 36 minggu fundus uteri terletak kira-kira 1 jari di bawah processus xifoideus. Pada kehamilan 40 minggu fundus uteri turun kembali dan terletak kira-kira 3 jari di bawah processus xifoideus. Hal ini disebabkan karena kepala janin mulai turun dan masuk ke dalam rongga panggul.

b. Serviks uteri

Serviks uteri pada kehamilan juga mengalami perubahan karena hormon estrogen. Jika korpus uteri mengandung lebih banyak jaringan otot, maka serviks lebih banyak mengandung jaringan ikat, hanya 10 % jaringan otot. Jaringan ikat pada serviks ini banyak mengandung kolagen. Akibat kadar estrogen meningkat, dan dengan adanya hipervaskularisasi maka konsisten serviks menjadi lunak.

c. Vagina dan vulva

Vagina dan vulva akibat hormone estrogen mengalami perubahan pula. Adanya hipervaskularisasi mengakibatkan vagina dan vulva tampak lebih merah, agak kebiru-biruan (livide). Tanda ini

disebut Chadwick. Warna porsio pun tampak livide. Pembuluh-pembuluh darah alat genitalia interna akan membesar. Hal ini dapat dimengerti karena oksigenasi dan nutrisi pada alat-alat genitalia tersebut meningkat.

d. Ovarium

Pada permulaan kehamilan terdapat korpus luteum graviditatis sampai terbentuknya plasenta kira-kira kehamilan 16 minggu. Korpus luteum graviditatis berdiameter kira-kira 3 cm. kemudian, ia mengecil setelah plasenta terbentuk. Korpus luteum ini mengeluarkan hormon estrogen dan progesterone. Lambat-laun fungsi ini akan diambil alih oleh plasenta.

e. Mamma

Mamma akan membesar dan tegang akibat hormone somatomammotropin, estrogen, dan progesterone, akan tetapi belum mengeluarkan air susu. Estrogen menimbulkan hypertrofi sistem saluran, sedangkan progesteron menambah sel-sel asinus pada mamma. Somatomammotropin mempengaruhi pertumbuhan sel-sel asinus pula dan menimbulkan perubahan dalam sel-sel, sehingga terjadi pembuatan kasein, laktalbumin dan laktoglobulin. Dengan demikian, mamma dipersiapkan untuk laktasi. Disamping ini dibawah pengaruh progesteron dan somatomammotropin, terbentuk lemak disekitar kelompok-kelompok alveolus, sehingga mamma menjadi lebih besar. Papilla mamma akan membesar, lebih tegak, tampak lebih

hitam, seperti seluruh aerola mamma karena hyperpigmentasi. Glandula Montgomery tampak lebih jelas menonjol dipermukaan aerola mamma. Pada kehamilan 12 minggu keatas dari puting susu dapat keluar cairan berwarna putih agak jernih, disebut kolostrum.

Kolostrum ini berasal dari kelenjar-kelenjar asinus yang mulai bersekresi. Sesudah partus, kolostrum ini agak kental dan warnanya agak kuning. Postpartum dengan dilahirkannya plasenta pengaruh estrogen, progesteron, dan somatomammotropin terhadap hipotalamus hilang, sehingga prolaktin dapat dikeluarkan dan laktasi terjadi.

f. Sirkulasi darah

Sirkulasi darah ibu dalam kehamilan dipengaruhi oleh adanya sirkulasi ke plasenta, uterus yang membesar dengan pembuluh-pembuluh darah yang besar pula, mamma dan alat lain-lain yang memang berfungsi berlebihan dalam kehamilan. Volume darah ibu dalam kehamilan bertambah secara fisiologi dengan adanya pencairan darah yang disebut hidremia. Volume darah akan bertambah banyak kira-kira 25 %, dengan puncak kehamilan 32 minggu, diikuti dengan cardiac output yang meninggi sebanyak kira-kira 30%. Akibat hemodilusi tersebut, yang mulai jelas timbul pada kehamilan 16 minggu, ibu yang mempunyai penyakit jantung dapat jatuh dalam keadaan dekompensasi kordis.

g. Sistem respirasi

Seorang wanita hamil pada kelanjutan kehamilannya tidak jarang mengeluh tentang rasa sesak dan pendek napas. Hal ini ditemukan pada kehamilan 32 minggu ke atas oleh karena usus-usus tertekan oleh uterus yang membesar ke arah diafragma, sehingga diafragma kurang leluasa bergerak. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang meningkat kira-kira 20%, seorang wanita hamil selalu bernafas lebih dalam, dan bagian bawah toraksnya juga melebar ke sisi, yang sesudah partus kadang-kadang menetap jika tidak dirawat dengan baik.

h. Traktus digestivus

Pada bulan-bulan pertama kehamilan terdapat perasaan enek (nausea). Mungkin ini akibat kadar hormone estrogen yang meningkat. Tonus otot-otot traktus digestivus menurun, sehingga motilitas seluruh traktus digestivus juga berkurang. Makanan lebih lama berada dalam lambung dan apa yang telah dicernakan lebih lama berada dalam usus-usu. Hal ini mungkin baik untuk resopsi, akan tetapi menimbulkan pula obstipasi, yang memang merupakan salah satu keluhan utama wanita hamil. Tidak jarang dijumpai pada bulan-bulan pertama kehamilan gejala muntah (emesis). Biasanya terjadi pada pagi hari, dikenal sebagai *morning sickness*. Emesis, bila terlampau sering dan terlalu banyak dikeluarkan, disebut hiperemesis gravidarum, keadaan ini patologik.

i. Traktus urinarius

Pada bulan-bulan pertama kehamilan kandung kencing tertekan oleh uterus yang mulai membesar, sehingga timbul sering kencing. Keadaan ini hilang dengan makin tuanya kehamilan bila uterus gravidus keluar dari rongga panggul. Pada akhir kehamilan, bila kepala janin mulai turun ke bawah pintu atas pinggul, keluhan sering kencing akan timbul lagi karena kandung kencing mulai tertekan kembali.

j. Kulit

Pada kulit terdapat deposit pigmen hiperpigmentasi alat-alat tertentu. Pigmentasi ini disebabkan oleh pengaruh *melanophore stimulating hormone* (MSH) yang meningkat. MSH ini adalah salah satu hormone yang juga dikeluarkan oleh lobus anterior hipofisi. Kadang-kadang terdapat deposit pigmen pada dahi, pipi, dan hidung, dikenal sebagai kloasma gravidarum.

Di daerah leher sering terdapat hiperpigmentasi yang sama, juga di areola mamma. Linea alba pada kehamilan menjadi hitam, dikenal sebagai linea gresia. Tidak jarang dijumpai pada kulit perut seolah-olah retak, warnanya berubah agak hiperemik dan kebiru-biruan, disebut striae livide. Setelah partus, striae livide ini berubah warnanya menjadi putih dan disebut striae albikantes. Pada seorang multigravida sering tampak striae livide bersama dengan striae albikantes.



k. **Metabolisme dalam kehamilan**

Pada wanita hamil basal metabolic rate (BMR) meninggi, sistem endokrin juga meninggi dan tampak lebih jelas kelenjar gondoknya (glandula tiroidea). BMR meningkat hingga 15-20 % yang umumnya ditemukan pada triwulan terakhir. Kalori yang dibutuhkan untuk itu diperoleh terutama dari pembakaran hidrat arang, khususnya sesudah kehamilan 20 minggu ke atas. Akan tetapi bila dibutuhkan, dipakailah lemak ibu untuk mendapatkan tambahan kalori dalam pekerjaan sehari-hari. Dalam keadaan biasa wanita hamil cukup hemat dalam hal pemakaian tenaganya (Wiknjosastro, 2007).

**4. Perubahan dan adaptasi psikologis dalam masa kehamilan**

a. **Pada kehamilan trimester I**

Dengan adanya peningkatan estrogen dan progesterone dalam tubuh, akan menimbulkan mual, muntah pada pagi hari, lelah, lemah dan pembesaran payudara.

Ibu merasa tidak sehat dan sering membenci kehamilannya. Banyak ibu yang merasa kecewa, menolak, cemas dan sedih. Sering kali, biasanya pada awal kehamilannya, ibu berharap untuk tidak hamil.

Pada trimester pertama, ibu akan selalu mencari tanda untuk menyakinkan bahwa dirinya benar-benar hamil. Ada ibu yang cenderung merahasiakan, ada juga yang sengaja untuk memamerkan.

Hasrat untuk melakukan hubungan seks berbeda, beberapa wanita mengalami fairah seks yang lebih tinggi, kebanyakannya mengalami penurunan libido. Keadaan ini membutuhkan komunikasi secara terbuka dan jujur dengan suami.

b. Pada kehamilan trimester II

Ibu akan merasa lebih sehat karena sudah beradaptasi dan terbiasa dengan peningkatan hormone. Perut mulai besar, ibu sudah menerima kehamilannya, sudah dapat merasakan pergerakan janinnya, libido kembali meningkat.

c. Pada kehamilan trimester III

Sering disebut periode menunggu dan waspada sebab pada saat itu ibu merasa tidak sabar menunggu kelahiran bayinya, kadangkadangkang ibu hamil merasa khawatir bahwa bayinya akan lahir sewaktu-waktu. Hal ini menyebabkan ibu meningkatkan kewaspadaannya. Ibu mulai merasa takut akan rasa sakit dan bahaya yang akan timbul pada waktu melahirkan. Trimester III adalah saat persiapan aktif untuk kelahiran bayi menjadi orang tua (Damopolii, 2006).

## **B. Tinjauan Umum tentang Preeklamsia**

### **1. Pengertian preeklamsia**

Beberapa pengertian tentang preeklamsia sebagai berikut :

- a. Preeklamsia adalah komplikasi yang sering terjadi pada kehamilan yang biasanya terjadi pada kehamilan lebih dari 20 minggu yang

ditandai oleh adanya hipertensi, proteinuria, edema, hanya terjadi pada wanita hamil, kelainan sering terjadi pada primigravida terkait dengan geografis/ demografis/ etnis (Proverawati dan Siti, 2009).

- b. Preeklamsia adalah kumpulan gejala yang timbul pada ibu hamil, bersalin dan selama masa nifas yang terdiri dari atas trias gejala yaitu hipertensi, protenuria dan edema (Yulaikhah, 2008).
- c. Preeklamsia adalah penyakit dengan tanda-tanda hipertensi, edema dan proteinuria yang timbul karena kehamilan (Wiknjastro dkk, 2007).
- d. Preeklamsia adalah kondisi khusus dalam kehamilan, ditandai dengan peningkatan tekanan darah dan protenuria. Bisa berhubungan dengan kejang dan gagal organ ganda pada ibu, sementara komplikasi pada janin meliputi restriksi pertumbuhan dan abrupsi placenta (Chapman, 2006).
- e. Preeklamsia merupakan suatu penyakit vasospastik, yang melibatkan banyak sistem dan ditandai oleh hemokonsentrasi, hipertensi dan protenuria (Bobak dkk, 2004).
- f. Preeklamsia adalah terjadinya peningkatan tekanan darah disertai protenuria akibat kehamilan terutama pada komplikasi primigravida, terjadi setelah usia gestasi 20 sampai 40 minggu, kecuali jika terdapat penyakit trofoblastik (Varney, 2001).

## 2. Etiologi

Etiologi preeklamsia sampai sekarang belum diketahui secara pasti. Teori yang terkenal sebagai penyebab preeklamsia adalah teori iskemia plasenta. Akan tetapi, teori ini belum dapat menerangkan semua hal yang berkaitan dengan preeklamsia. Teori yang dapat diterima adalah teori yang dapat menerangkan hal-hal berikut :

- a. Mengapa frekuensi menjadi tinggi pada primigravida, kehamilan ganda, hidramnion dan molahidatidosa.
- b. Mengapa frekuensi bertambah seiring dengan tuanya kehamilan.
- c. Mengapa terjadi perbaikan keadaan penyakit, jika terjadi kematian janin dalam kandungan.
- d. Mengapa frekuensi lebih rendah pada kehamilan berikutnya.
- e. Penyebab timbulnya hipertensi, proteinuria, edema dan konvulsi sampai koma (Yulaikhah, 2008).

## 3. Faktor Resiko

Faktor resiko terjadinya preeklamsia :

- a. Primigravida.
- b. Ibu yang sangat muda atau ibu yang berusia lebih dari 35 tahun.
- c. Umur kehamilan 20 minggu atau lebih.
- d. Kehamilan kembar.
- e. Riwayat preeklamsia sebelumnya.
- f. Mola hidatidosa.
- g. Obesitas (Boyle, 2007).

#### 4. Klasifikasi Preeklamsia

##### a. Preeklamsia ringan

Preeklamsia ringan adalah suatu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan timbulnya hipertensi dengan sistol 140 mmHg sampai kurang 160 mmHg, diastol 90 mmHg sampai kurang 110 mmHg disertai proteinuria dan edema pada umur kehamilan 20 minggu atau lebih.

##### b. Preeklamsia berat

Preeklamsia berat adalah suatu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan timbulnya hipertensi 160/110 mmHg atau lebih disertai proteinuria dan edema pada kehamilan 20 minggu atau lebih (Nugroho, 2010).

#### 5. Patofisiologi

Patofisiologi preeklamsia :

- a. Pada preeklamsia, terjadi spasme pembuluh darah disertai dengan retensi garam dan air.
- b. Pada biopsi ginjal, ditemukan spasme hebat arteriola glomerulus.
- c. Pada beberapa kasus, lumen arteriola sedemikian sempitnya sehingga hanya dapat dilalui oleh satu sel darah merah. Dengan demikian, jika semua arteriola dalam tubuh mengalami spasme, tekanan darah akan naik, dalam usaha mengatasi kenaikan tekanan perifer agar oksigenasi jaringan dapat dicukupi.

- d. Kenaikan berat badan dan edema yang disebabkan oleh penimbunan air yang berlebihan dalam ruang intersisial, belum diketahui sebabnya, mungkin karena retensi air dan garam.
- e. Proteinuria dapat disebabkan oleh spasme arteriola sehingga terjadi perubahan pada glomerulus (Yulaikhah, 2008).

## 6. Gejala klinis

Biasanya tanda-tanda preeklamsia timbul mulai dalam urutan perubahan berat badan yang berlebihan, diikuti edema, hipertensi dan akhirnya proteinuria (Wiknjosastro, 2007).

### a. Gejala klinis preeklamsia ringan meliputi :

- 1) Kenaikan tekanan darah sistol 30 mmHg atau lebih, diastol 15 mmHg atau lebih dari tekanan darah sebelum hamil pada kehamilan 20 minggu atau lebih, atau sistol 140 mmHg sampai kurang 160 mmHg, diastol 90 mmHg sampai kurang 110 mmHg.
- 2) Proteinuria : secara kuantitatif lebih 0,3 gr/ liter dalam 24 jam atau secara kualitatif positif 2 (+2).
- 3) Edema pada pretibia, dinding abdomen, lumbo sakral, wajah atau tangan.
- 4) Kenaikan berat badan ibu 1 kg atau lebih per minggu selama 2 kali berturut-turut minggu.
- 5) Timbul salah satu atau lebih gejala atau tanda-tanda preeklamsi berat (Sujiyatini dkk, 2009).

b. Tanda dan gejala klinis pada preeklamsia berat yaitu :

- 1) Tekanan darah sistolik  $\geq 160$  mmHg.
- 2) Tekanan darah diastolik  $\geq 110$  mmHg.
- 3) Peningkatan kadar enzim hati atau ikterus.
- 4) Trombosit  $< 100.000/ \text{mm}^3$ .
- 5) Oliguria  $< 400$  ml/ 24 jam.
- 6) Proteinuria  $> 3$  g/ liter.
- 7) Nyeri epigastrium.
- 8) Skotoma dan gangguan visus lain atau nyeri frontal yang berat.
- 9) Perdarahan retina.
- 10) Edema pulmonum.
- 11) Koma (Wiknjosastro dkk, 2007).

## 7. Komplikasi

Komplikasi preeklamsia yang terberat adalah kematian ibu dan janin dan komplikasi lainnya yaitu :

- a. Solusio placenta yang biasanya terjadi pada ibu yang menderita hipertensi akut.
- b. Hipofibrinogenemia, sehingga dianjurkan untuk pemeriksaan kadar fibrinogen secara berkala.
- c. Hemolisis, ibu dengan preeklamsia yang sudah berat biasanya menunjukkan gejala klinik hemolisis yang dikenal dengan ikterus. Belum diketahui dengan pasti apakah ini merupakan kerusakan sel-sel

hati atau destruksi sel darah merah. Nekrosis periportal hati yang sering ditemukan pada autopsi penderita eklamsia dapat menerangkan ikterus tersebut.

d. Perdarahan otak yang menjadi penyebab utama kematian maternal penderita eklampsia.

e. Kelainan mata

Kehilangan penglihatan untuk sementara, yang berlangsung sampai seminggu dapat terjadi. Perdarahan kadang terjadi pada retina, hal ini merupakan tanda gawat akan terjadinya apopleksia serebri.

f. Edema paru-paru yang disebabkan karena payah jantung.

g. Nekrosis hati

Nekrosis periportal hati merupakan akibat vasospasmus arterioli umum. Kerusakan sel-sel hati dapat diketahui dengan pemeriksaan faal hati, terutama penentuan enzim-enzimnya.

h. Sindroma HELLP yaitu hemolisis, elevated liver enzymes dan low platelet.

i. Kelainan ginjal

Kelainan ini berupa endoteliosis glomerulus yaitu pembengkakan sitoplasma sel endothelial tubulus ginjal tanpa kelainan struktur lainnya. Kelainan lain yang dapat timbul ialah anuria sampai gagal ginjal.

j. Komplikasi lainnya yaitu lidah tergigit, trauma dan fraktura karena jatuh akibat kejang-kejang pneumonia aspirasi dan DIC (disseminated



intravaskuler coagulation), prematuritas, dismaturitas dan kematian janin intra uterin (Proverawati dan Siti Asfuah, 2009).

## 8. Pemeriksaan dan diagnosis

### a. Pemeriksaan dan diagnosis preeklamsia ringan :

- 1) Kehamilan lebih 20 minggu.
- 2) Kenaikan tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih dengan pemeriksaan 2 kali selang 6 jam dalam keadaan istirahat (untuk pemeriksaan pertama dilakukan 2 kali setelah istirahat 10 menit).
- 3) Edema tekan pada tungkai (pretibial), dinding perut, lumbosakral, wajah atau tungkai.
- 4) Proteinuria lebih 0,3 gram/ liter/ 24 jam, kualitatif (++) (Sujiyatini dkk, 2009).

### b. Pemeriksaan dan diagnosis preeklamsia berat :

- 1) Tekanan darah sistolik atau sama 160 mmHg atau diastolik lebih atau sama dengan 110 mmHg, tekanan darah ini tidak menurun meskipun ibu hamil sudah rawat baring di rumah sakit.
- 2) Proteinuria 5 gram atau lebih per 24 jam atau kualitatif (+3) atau (+4).
- 3) Oliguria yaitu produksi urine kurang dari 500 cc per 24 jam disertai dengan kenaikan kreatinin plasma.
- 4) Gangguan visus dan serebral.
- 5) Nyeri epigastrium atau nyeri kuadran kanan atas abdomen.

- 6) Edema paru.
- 7) Pertumbuhan janin intra uterine terlambat.
- 8) Adanya HELLP syndrome (Hemolisis, Elevated liver function test and Low Platelet count) (Nogroho, 2010).


## 9. Pencegahan

Pemeriksaan antenatal yang teratur dan teliti dapat menemukan tanda-tanda dini preeklamsia dan dalam hal itu harus dilakukan penanganan semestinya. Kita perlu lebih waspada akan timbulnya preeklamsia dengan adanya faktor predisposisi. Walaupun timbulnya preeklamsia tidak dapat dicegah sepenuhnya, namun frekuensinya dapat dikurangi dengan pemberian penerangan secukupnya dan pelaksanaan pengawasan yang baik pada wanita hamil.

Penerangan tentang manfaat istirahat dan diet berguna dalam pencegahan. Istirahat tidak selalu berarti berbaring di tempat tidur, namun pekerjaan sehari-hari perlu dikurangi dan dianjurkan lebih banyak duduk dan berbaring. Diet tinggi protein dan rendah lemak, karbohidrat, garam dan penambahan berat badan yang tidak berlebihan perlu dianjurkan (Wiknjosastro, 2007).

## 10. Penatalaksanaan dan pengobatan

Skema Dasar Tata Laksana Preeklamsia



Sumber : (Achadiat, 2004)

a. Penatalaksanaan rawat jalan pasien preeklamsia ringan :

- 1) Banyak istirahat (berbaring tidur/miring).
- 2) Diet : cukup protein, rendah karbohidrat, lemak dan garam.
- 3) Sedativa ringan : tablet phenobarbital 3 x 30 mg atau diazepam 3 x 2 mg per oral selama 7 hari.
- 4) Kunjungan ulang setiap 1 minggu.

5) Pemeriksaan laboratorium : hemoglobin, hematokrit, trombosit, urine lengkap, asam urat darah, fungsi hati, fungsi ginjal (Nogroho, 2010).

Perawatan obstetri pasien preeklamsia ringan :

1) Kehamilan preterm (kurang 37 minggu)

a) Bila desakan darah mencapai normotensif selama perawatan, persalinan di tunggu sampai aterm.

b) Bila desakan darah turun tetapi belum mencapai normotensif selama perawatan maka kehamilannya dapat diakhiri pada umur kehamilan 37 minggu atau lebih.

2) Kehamilan aterm (37 minggu atau lebih)

Persalinan ditunggu sampai terjadi usia persalinan atau dipertimbangkan untuk melakukan persalinan pada taksiran tanggal persalinan.

3) Cara persalinan

Persalinan dapat dilakukan secara spontan. Bila perlu memperpendek kala II (Nugroho, 2010).

b. Penatalaksanaan pada preeklamsia berat :

Ditinjau dari umur kehamilan dan perkembangan gejala-gejala preeklamsia berat selama perawatan maka perawatan dibagi menjadi :

1) Perawatan aktif yaitu kehamilan segera diakhiri atau diterminasi di tambah pengobatan medisinal.

Sedapat mungkin sebelum perawatan aktif pada setiap penderita dilakukan pemeriksaan fetal assesment (NST & USG).

Indikasi :

a) Ibu

- i. Usia kehamilan 37 minggu atau lebih.
- ii. Adanya tanda-tanda atau gejala impending eklamsia.
- iii. Kegagalan terapi konservatif yaitu setelah 6 jam pengobatan medikamentosa terjadi kenaikan tekanan darah atau setelah 24 jam terapi medikamentosa tidak ada perbaikan.

b) Janin

- i. Hasil fetal assesment jelek (NST & USG)
- ii. Adanya tanda IUGR

c) Laboratorium

Adanya “HELLP syndrome” (hemolisis dan peningkatan fungsi hepar, trombositopenia).

2) Perawatan konservatif yaitu kehamilan tetap dipertahankan ditambah pengobatan medisinal.

Indikasi : Bila kehamilan preterm kurang dari 37 minggu tanpa disertai tanda-tanda impending eklamsia dengan keadaan janin baik.

3) Terapi medikamentosa : Sama dengan terapi medikamentosa pada pengolahan aktif. Hanya loading dose MgSO<sub>4</sub> tidak diberikan intravenous, cukup intramuskuler saja dimana 4 gram pada bokong kiri dan 4 gram pada bokong kanan.

4) Pengobatan obstetri :

- a) Selama perawatan konservatif : observasi dan evaluasi sama seperti perawatan aktif hanya disini tidak dilakukan terminasi.
- b) MgSO<sub>4</sub> dihentikan bila ibu sudah mempunyai tanda-tanda preeklamsia ringan selambat-lambatnya dalam 24 jam.
- c) Bila setelah 24 jam tidak ada perbaikan maka dianggap terapi medikamentosa gagal dan harus diterminasi.
- d) Bila sebelum 24 jam hendak dilakukan tindakan maka diberi lebih dahulu MgSO<sub>4</sub> 20 % 2 gram intravenus.

5) Penderita dipulangkan bila :

- a) Penderita kembali ke gejala-gejala/ tanda-tanda preeklamsi ringan dan telah dirawat selama 3 hari.
- b) Bila selama 3 hari tetap berada dalam keadaan preeklamsi ringan, penderita dapat dipulangkan dan dirawat sebagai preeklamsi ringan (diperkirakan lama perawatan 1-2 minggu) (Nogroho, 2010).

6) Pengobatan medisinal pasien preeklamsia berat :

- a) Segera masuk rumah sakit.
- b) Tirah baring miring ke satu sisi. Tanda vital diperiksa setiap 30 menit, refleks patella setiap jam.
- c) Infus dextrose 5 % dimana setiap 1 liter diselingi dengan infus RL (60-125 cc/ jam) 500 cc.
- d) Antasida.

- e) Diet cukup protein, rendah karbohidrat, lemak dan garam.
- f) Pemberian obat anti kejang : diazepam 20 mg IV dilanjutkan dengan 40 mg dalam dextrose 10 % selama 4-6 jam atau MgSO<sub>4</sub> 40 % 5 gram IV pelan-pelan dilanjutkan 5 gram dalam RL 500 cc untuk 6 jam.
- g) Diuretik tidak diberikan kecuali bila ada tanda-tanda edema paru, payah jantung kongestif atau edema anasarka. Diberikan furosemid injeksi 40 mg/ IV.
- h) Antihipertensi diberikan bila : Tekanan darah sistolik  $\geq$  180 mmHg, diastolik  $\geq$  110 mmHg atau MAP lebih 125 mmHg. Dapat diberikan catapres  $\frac{1}{2}$  -1 ampul IM dapat diulang tiap 4 jam atau alfametildopa 3 x 250 mg dan nifedipin sublingual 5-10 mg.
- i) Kardiotonika, indikasinya bila ada tanda-tanda payah jantung, diberikan digitalisasi cepat dengan cedilanid.
- j) Lain-lain :
  - 1) Konsul bagian penyakit dalam/ jantung, mata.
  - 2) Obat-obat antipiretik diberikan bila suhu rektal lebih 38,5 °C dapat dibantu dengan pemberian kompres dingin atau alkohol atau xylamidon 2 cc IM.
  - 3) Antibiotik diberikan atas indikasi. Diberikan ampicillin 1 gr/ 6 jam/ IV/ hari.

- 4) Anti nyeri bila penderita kesakitan atau gelisah karena kontraksi uterus, dapat diberikan petidin HCL 50-75 mg sekali saja, selambat-lambatnya 2 jam sebelum janin lahir (Nugroho, 2010).

### C. Tinjauan Umum Tentang Variabel Independen

#### a. Usia ibu

Usia ibu merupakan lamanya waktu ibu hidup, dihitung saat ibu dilahirkan sampai ibu meninggal. Dalam kurun reproduksi sehat dikenal bahwa usia aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20-30 tahun (Wiknjosastro, 2007).

Distribusi kejadian Preeklampsia berdasarkan umur banyak ditemukan pada kelompok usia ibu yang ekstrim yaitu kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Pada usia kurang dari 20 tahun, keadaan alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sedangkan pada usia ibu lebih dari 35 tahun, dalam tubuh telah terjadi perubahan-perubahan akibat penuaan organ-organ. Dengan begitu, kemungkinan untuk mendapat penyakit-penyakit dalam masa kehamilan yang berhubungan dengan umur akan meningkat, seperti penyakit darah tinggi (hipertensi), keracunan kehamilan, (preeklamsia/ eklamsia), diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah. Disebut risiko tinggi karena kemungkinan terjadinya hasil kehamilan yang buruk/ komplikasi pada ibu usia ini akan meningkat (Amiruddin dkk, 2007).



b. Graviditas

Graviditas adalah jumlah kehamilan (Bobak dkk, 2004). Pada primigravida frekuensi preeklamsia lebih tinggi bila dibandingkan dengan multigravida, terutama pada primigravida muda (Winkjosastro, 2007).

Kehamilan yang paling optimal adalah kehamilan kedua sampai dengan keempat. Kehamilan pertama dan kehamilan setelah keempat mempunyai resiko yang meningkat. Wanita dengan kehamilan kelima atau lebih (*grande multi*) sering disertai penyulit-penyulit seperti kelainan letak, perdarahan antepartum, preeklamsia/ eklamsia dan lain-lain (Suhartini, 2009).

c. Umur kehamilan

Preeklamsia biasanya timbul setelah minggu ke 20 atau lebih, jadi dengan makin tuanya umur kehamilan makin beresiko untuk timbulnya preeklamsia pada ibu hamil, sehingga perlu mendapatkan pemeriksaan yang komprehensif pada semua ibu hamil trimester III (Suhartini, 2009).

d. Kehamilan Kembar

Kehamilan kembar ialah satu kehamilan dengan dua janin atau lebih (Winkjosastro, 2007). Pada kehamilan kembar terjadi hiperplantosis, sehingga akan terjadi reaksi imunologis, endokrin atau genetik yang merupakan penyebab terjadinya preeklamsia (Suhartini, 2009).

e. Riwayat preeklamsia sebelumnya

Ibu hamil yang sebelumnya mengalami preeklamsia, jika tidak mendapatkan penanganan yang baik akan menimbulkan komplikasi hipertensi yang menetap (Suhartini, 2009).

f. Mola hidatidosa

Mola hidatidosa adalah suatu kehamilan dimana setelah fertilisasi hasil konsepsi tidak berkembang menjadi embrio tetapi terjadi proliferasi dari villi korialis disertai dengan degenerasi hidrofik. Uterus melunak dan adanya janin, kavum uteri hanya terisi oleh jaringan seperti rangkaian buah anggur korialis yang seluruhnya atau sebagian berkembang tidak wajar berbentuk gelembung-gelembung seperti anggur (Pantikawati dan Saryono, 2010).

Perdarahan merupakan gejala utama mola. Biasanya keluhan perdarahan inilah yang menyebabkan mereka datang ke rumah sakit. Gejala perdarahan ini biasanya terjadi antara bulan pertama sampai ketujuh dengan rata-rata 12-14 minggu. Sifat perdarahan bisa intermite, sedikit-sedikit atau sekaligus banyak sehingga menyebabkan syok atau kematian. Seperti juga pada kehamilan biasa mola hidatidosa bisa disertai dengan preeklamsia, hanya perbedaannya ialah bahwa preeklamsia pada mola terjadinya lebih muda dari pada kehamilan biasa (Wiknjosastro, 2007).

g. **Obesitas**

Obesitas disamping menyebabkan kolesterol tinggi dalam darah juga menyebabkan kerja jantung lebih berat, oleh karena jumlah darah yang berada dalam badan sekitar 15% dari berat badan, maka makin gemuk seorang makin banyak pula jumlah darah yang terdapat di dalam tubuh yang berarti makin berat pula fungsi pemompaan jantung. Sehingga dapat menyebabkan terjadinya preeklampsia (Rozikhan, 2007).

Walaupun belum diketahui secara pasti hubungan antara hipertensi dengan kegemukan, namun terbukti bahwa daya pompa jantung dan sirkulasi volume darah penderita obesitas dengan hipertensi lebih tinggi dari pada dengan berat badan normal. Memang tidak semua penderita hipertensi berbadan gemuk, orang kurus pun tidak tertutup kemungkinan terserang hipertensi. Kenyataannya adalah obesitas peluang terkena hipertensi lebih besar (Sunanto, 2009).

**D. Tinjauan Islam tentang Preeklampsia dalam Kehamilan**

Islam adalah agama yang begitu memperhatikan kehidupan umatnya. Berbagai aspek diatur di dalamnya dimana semuanya dituangkan dalam Al-Qur'an dan dilengkapi dengan Al-Hadits. Mulai dari konsepsi sampai meninggalnya seorang insan semua telah diatur oleh Allah SWT.

Kehamilan merupakan hal yang diinginkan oleh banyak wanita yang telah berkeluarga. Karena kehamilan merupakan kabar bahwa mereka akan mendapatkan keturunan. Namun, banyak wanita tidak mengetahui tanda-

tanda awal kehamilan sehingga mereka kadang tidak mengetahui bahwa mereka telah hamil. Berkaitan dengan cara melakukan diagnosa bagi tanda-tanda kehamilan, al-Quran hanya mengemukakan beban yang ditanggung oleh ibu hamil yang setiap saat bertambah berat karena bertambah besarnya kandungan. Hal ini diisyaratkan di dalam Q.S Al-A'raf (7) : 189, sebagai berikut :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا  
 فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ<sup>ط</sup> فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ  
 رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Terjemahnya :

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur" (Depag, 2005).

Ayat ini menjelaskan bahwa tanda-tanda kehamilan adalah adanya perubahan beban yang dialami oleh seorang perempuan karena adanya kandungan janin di dalam perutnya. Kandungan yang setiap saat bertambah besar yang menyebabkan bertambahnya beban yang ditanggung oleh ibu hamil.

Ayat di atas mengandung nilai tanggung jawab yang berat bagi ibu yang hamil dan nilai kepasrahan terhadap takdir Allah Swt. Sehingga menyadarkan untuk senantiasa berdoa kepada-Nya agar kelak melahirkan anak yang sempurna (Damopolii, 2006).

Tanggung jawab yang diemban oleh ibu hamil untuk menjaga dan merawat kandungannya memang cukup berat karena dibutuhkan kesabaran untuk menunggu selama sembilan bulan. Perawatan kandungan cukup berpengaruh terhadap perkembangan janin, seorang ibu hamil tentunya harus menghindari beberapa hal diantaranya makanan dan minuman serta hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan janinnya. Selain perlunya perawatan dan penjagaan secara fisik, seorang ibu hamil juga harus memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi kestabilan mental ibu hamil, karena ibu hamil yang mengalami stres dapat berpengaruh terhadap perkembangan janin yang dikandungnya.

Adapun salah satu faktor resiko terjadinya preeklamsia yaitu kehamilan kembar, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Surah Ar Raad (13) : 8 sebagai berikut :

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ  
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾

Terjemahnya :

Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya (Depag, 2005).

Salah satu pengetahuan-Nya adalah tentang kandungan. Allah Swt sejak dahulu, sekarang dan terus menerus, mengetahui keadaan janin sejak masih berbentuk sperma, calon bapak lalu membuahi ovum yang berada dalam diri seorang calon ibu.

Tafsir ayat tersebut diatas adalah Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan/istri setelah pertemuan sperma dan ovum yang kemudian menempel pada dinding rahim. Allah mengetahui, bukan saja jenis kelaminnya, tetapi juga berat badan dan bentuknya, keindahan dan keburukannya, usia dan rezekinya, masa kini dan masa depannya dan lain-lain. Dan Allah Swt mengetahui juga apa yakni serta ovum yang berkurang dalam rahim yang dapat mengakibatkan janin lahir cacat/keguguran dan Allah Swt mengetahui juga yang bertambah yakni tumbuh/ yang dalam keadaan kembar. Dan segala sesuatu, baik menyangkut kandungan maupun selain kandungan, pada sisi-Nya dan ukuran-Nya yang sangat teliti baik dalam kualitas, kuantitas maupun kadar, waktu dan tempatnya. Allah Swt adalah yang mengetahui semua yang ghaib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi, sehingga pada akhirnya tidak ada sesuatu pun yang ghaib bagi-Nya (Shihab, 2002).

Perkembangan janin dalam rahim ibu hamil semuanya diketahui oleh Allah Swt secara detail dan tak ada satu pun yang luput dari pengetahuannya, ayat ini menyerukan kepada manusia bahwa tidak ada satu pun kekuatan yang dapat ditempati menyandarkan nasib selain kepada Allah Swt. Oleh karena itu seorang ibu hamil diharuskan untuk menjaga

dan merawat kandungannya dengan baik agar kelak bayi yang dikandungnya lahir dengan selamat dan sehat baik secara fisik maupun psikis. Ibu hamil tidak hanya diharuskan menjaga dan memelihara kandungannya akan tetapi yang terpenting, ibu hamil harus bertawakkal kepada Allah tentang nasib dirinya serta bayi yang dikandungnya. Ibu hamil tidak boleh memiliki pemikiran dan kekhawatiran yang berlebihan tentang nasib kandungannya, seorang ibu hamil tidak perlu memikirkan kecacatan dan kesempurnaan bayi yang akan dilahirkannya karena semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Swt. Bayi yang lahir dalam keadaan sehat merupakan anugrah yang patut disyukuri dan walaupun bayi lahir dalam keadaan tidak normal harus juga disyukuri karena dibalik ujian itu ada hikmah yang terkandung, apapun yang menjadi ketetapan Allah Swt atas nasib manusia harus diyakini bahwa itulah yang terbaik dengan demikian setiap manusia dapat mengambil hikmah dari setiap musibah yang menyimpannya dan mensyukuri setiap nikmat yang diperolehnya.

Salah satu upaya pencegahan preeklamsia adalah dengan diet tinggi protein dan rendah lemak, karbohidrat, garam dan penambahan berat badan yang tidak berlebihan perlu dianjurkan. Sebagaimana dalam Q.S Al A'raf (7) : 31 sebagai berikut :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Terejemahnya :

Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak senang terhadap orang yang berlebih-lebihan (Depag, 2005).

Ayat ini mengisyaratkan masalah lain, yaitu meninggalkan sikap berlebih-lebihan dalam masalah makan dan minum. Demi kebenaran, ayat ini menghimpun beberapa hal. Ia mengajak manusia mengambil kesenangan hidup, baik dari jenis makanan maupun minuman, tapi juga memerintahkan kesederhanaan dalam urusan apa pun, yang tentunya sangat dibutuhkan manusia. Jadi ayat ini merupakan salah satu dasar pendidikan yang sangat mengena untuk menjaga keselamatan manusia dan keselamatan badan, sebagaimana ia merupakan salah satu kaidah kesehatan seperti yang dianjurkan para dokter (Ash-Shabuny, 2001).

Penggalan ayat ini merupakan salah satu prinsip yang diletakkan agama menyangkut kesehatan dan diakui pula oleh para ilmuwan terlepas apa pun pandangan hidup atau agama mereka. Perintah makan dan minum, lagi tidak berlebih-lebihan, yakni tidak melampaui batas, merupakan tuntunan yang harus disesuaikan dengan kondisi setiap orang. Ini karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau belum cukup buat orang lain. Atas dasar itu, kita dapat berkata bahwa penggalan ayat tersebut mengajarkan sikap proporsional dalam makan dan minum (Shihab, 2002).



Ayat di atas menjelaskan tentang makan yang cukup (proporsional) artinya sesuai dengan kebutuhan pemakan, tidak berlebihan dan tidak berkurang (Al-Hafidz, 2007). Olehnya itu salah satu upaya untuk mencegah terjadinya preeklamsia dalam kehamilan adalah dengan melakukan diet untuk menghindari obesitas yang merupakan salah satu faktor resiko preeklamsia.

Seorang ibu hamil dianjurkan untuk mengurangi kadar tertentu yang terkandung dalam makanan yang menjadi penyebab terjadinya preeklamsia. Anjuran ini tidak berarti bahwa ibu hamil tidak boleh memakan sama sekali makanan tersebut, hanya porsi yang perlu dikurangi demi menghindari dampak yang ditimbulkan. Jadi ayat tersebut diatas sangat tepat kiranya dijadikan sebagai landasan untuk mencegah terjadinya preeklamsia yang biasa diderita oleh ibu hamil. Larangan dalam memakan dan meminum sesuatu secara berlebihan meliputi porsi dan kadar yang terkandung dalam makanan, seorang ibu hamil bukan hanya dianjurkan untuk mengurangi kadar yang terkandung dalam makanan tetapi juga harus mengatur porsi makan agar terhindar dari obesitas yang merupakan salah satu faktor resiko preeklamsia.

Selain dari pada pengobatan dan pencegahan preeklamsia untuk kesembuhan pasien, diharapkan pasien juga senantiasa memohon dan meminta kepada yang maha kuasa agar cepat sembuh dari penyakitnya karena hanya Tuhanlah yang maha mengetahui segala kejadian pada manusia, sebagaimana dalam Q.S Asy-syu'araa' (26) : 80 yang berbunyi :

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِرْتُ بِشَفِيِّهِ

Terjemahnya :

Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan Aku (Depag, 2005).

Ibrahim *'Alaihissalam*, telah memperhatikan etika di dalam berucap di mana dia menyandarkan kata sakit kepada dirinya sendiri dan kata sembuh kepada Allah, sehingga dia berkata, “apabila aku sakit,” dan tidak mengatakan, “Dia memberiku penyakit”, untuk menjaga etika, walaupun sebenarnya, sakit, kesembuhan, bahaya, dan manfaat semuanya berada di tangan Allah Swt (Ash-Shabuny, 2002).

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita harus yakin bahwa Tuhan menurunkan penyakit kepada manusia tapi dengan berkat Tuhan pulalah manusia itu akan sembuh dari penyakit yang dideritanya. Yang penting selama kita selalu berusaha untuk selalu berobat dan berdoa kepada-Nya insya Allah Tuhan akan memberikan kesembuhan pada kita. Pada sisi lain ayat ini juga berfungsi sebagai sugesti yang dapat menguatkan mental orang yang menderita penyakit sehingga proses penyembuhan dapat berjalan cepat dan lancar. Orang yang menderita penyakit harus dikuatkan mentalnya agar tidak putus asa dalam mencari obat untuk kesembuhannya, sebab kesembuhan orang yang menderita penyakit tidak bergantung sepenuhnya pada obat yang dikonsumsi akan tetapi kesembuhan suatu penyakit juga berkaitan pada kekuatan mental seseorang yang menderita

penyakit. Semakin kuat mental seseorang untuk sembuh dari penyakit dibarengi dengan obat yang sesuai dengan penyakit yang diderita maka semakin besar pula peluang kesembuhannya. Demikian pula sebaliknya walaupun berobat kalau mental orang yang sakit sudah tidak kuat, proses penyembuhan juga semakin sulit.



## **BAB III**

### **KERANGKA KONSEP**

#### **A. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian**

Preeklampsia merupakan penyakit dengan tanda-tanda hipertensi dan edema serta proteinuria yang timbul karena kehamilan yang umumnya terjadi setelah usia 20 minggu atau lebih, yang hampir selalu terjadi pada primigravida dimana rahim untuk pertama kalinya menerima hasil pembuahan yang dapat menimbulkan reaksi terhadap kehamilan. Seorang wanita yang menderita preeklampsia ringan lebih besar peluang untuk menderita preeklampsia yang berat pada kehamilan berikutnya yang dapat menyebabkan tingginya morbiditas dan mortalitas terhadap ibu dan janinnya (Bambang, 2009).

Pada penelitian ini adapun variabel yang akan diteliti yaitu :

##### a. Usia ibu

Usia ibu merupakan lamanya waktu ibu hidup, dihitung saat ibu dilahirkan sampai ibu meninggal. Dalam kurun reproduksi sehat dikenal bahwa usia aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20-30 tahun (Wiknjastro, 2007).

Distribusi kejadian Preeklampsia berdasarkan umur banyak ditemukan pada kelompok usia ibu yang ekstrim yaitu kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Pada usia kurang dari 20 tahun, keadaan alat reproduksi belum siap untuk menerima kehamilan sedangkan pada

usia Ibu lebih dari 35 tahun, dalam tubuh telah terjadi perubahan-perubahan akibat penuaan organ-organ. Dengan begitu, kemungkinan untuk mendapat penyakit-penyakit dalam masa kehamilan yang berhubungan dengan umur akan meningkat, seperti penyakit darah tinggi (hipertensi), keracunan kehamilan, (preeklamsia/ eklamsia), diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah. Disebut risiko tinggi karena kemungkinan terjadinya hasil kehamilan yang buruk/ komplikasi pada ibu usia ini akan meningkat (Amiruddin dkk, 2007).

b. Graviditas

Graviditas adalah jumlah kehamilan (Bobak dkk, 2004). Pada primigravida frekuensi preeklamsia lebih tinggi bila dibandingkan dengan multigravida, terutama pada primigravida muda (Winkjosastro, 2007).


Kehamilan yang paling optimal adalah kehamilan kedua sampai dengan keempat. Kehamilan pertama dan kehamilan setelah keempat mempunyai resiko yang meningkat. Wanita dengan kehamilan kelima atau lebih (grande multi) sering disertai penyulit-penyulit seperti kelainan letak, perdarahan antepartum, preeklamsia/ eklamsia dan lain-lain (Suhartini, 2009).

c. Umur kehamilan


Preeklamsia timbul setelah minggu ke 20 atau lebih, jadi dengan makin tuanya umur kehamilan makin beresiko untuk timbulnya

preeklamsia pada ibu hamil, sehingga perlu mendapatkan pemeriksaan yang komprehensif pada semua ibu hamil trimester III (Suhartini, 2009).

## B. Skema Kerangka Konsep Penelitian



Keterangan :



: Variabel Independen



: Variabel Dependen



: Variabel yang diteliti



: Variabel yang tidak diteliti

### C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

#### 1. Usia ibu

Usia ibu merupakan lamanya waktu ibu hidup, dihitung saat ibu dilahirkan sampai ibu meninggal. Dalam kurun reproduksi sehat dikenal bahwa usia aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20-30 tahun (Wiknjosastro, 2007).

Distribusi kejadian Preeklampsia berdasarkan umur banyak ditemukan pada kelompok usia ibu yang ekstrim yaitu kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Pada usia kurang dari 20 tahun, keadaan alat reproduksi belum siap untuk menerima kehamilan sedangkan pada usia ibu lebih dari 35 tahun, dalam tubuh telah terjadi perubahan-perubahan akibat penuaan organ-organ. Dengan begitu, kemungkinan untuk mendapat penyakit-penyakit dalam smasa kehamilan yang berhubungan dengan umur akan meningkat, seperti penyakit darah tinggi (hipertensi), keracunan kehamilan, (preeklamsia/ eklamsia), diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah. Disebut risiko tinggi karena kemungkinan terjadinya hasil kehamilan yang buruk/ komplikasi pada ibu usia ini akan meningkat (Amiruddin dkk, 2007).

Kriteria objektif :

- a. Risiko rendah : Bila ibu hamil berumur 20 – 35 tahun
- b. Risiko tinggi : Bila ibu hamil <20 tahun dan >35 tahun

## 2. Graviditas

Graviditas adalah jumlah kehamilan (Bobak dkk, 2004). Pada primigravida frekuensi preeklamsia lebih tinggi bila dibandingkan dengan multigravida, terutama pada primigravida muda (Winkjosastro, 2007).

Kehamilan yang paling optimal adalah kehamilan kedua sampai dengan keempat. Kehamilan pertama dan kehamilan setelah keempat mempunyai resiko yang meningkat. Wanita dengan kehamilan kelima atau lebih (*grande multi*) sering disertai penyulit-penyulit seperti kelainan letak, perdarahan antepartum, preeklamsia/ eklamsia dan lain-lain (Suhartini, 2009).

Kriteria objektif :

- a. Risiko rendah : Multigravida
- b. Risiko tinggi : Primigravida dan grandemultigravida

## 3. Umur kehamilan

Preeklamsia timbul setelah minggu ke 20 atau lebih, jadi dengan makin tuanya umur kehamilan makin beresiko untuk timbulnya preeklamsia pada ibu hamil, sehingga perlu mendapatkan pemeriksaan yang komprehensif pada semua ibu hamil trimester III (Suhartini, 2009).

Kriteria objektif :

- a. Risiko rendah :  $\leq 20$  Minggu
- b. Risiko tinggi :  $> 20$  Minggu



## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survei dengan pendekatan deskriptif. Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif (Notoatmodjo, 2005).

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yaitu RSIA Siti Fatimah Makassar yang terletak di Jl. Gunung Merapi No 75, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan bahwa RSIA Siti Fatimah tersebut merupakan salah satu Rumah Sakit rujukan dan pendidikan yang mudah dijangkau dan tempatnya strategis di tengah kota Makassar dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Sungai Poso.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Sungai Lohun.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Sungai Pareman.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Gunung Merapi.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Mei 2011.

### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Setiawan, 2010). Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang pernah memeriksakan kehamilannya dan dilayani di RSIA Siti Fatimah Makassar periode januari-desember 2010.

#### 2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Setiawan, 2010). Subjek penelitian adalah sebagian populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang menderita preeklamsia yang pernah dilayani di RSIA Siti Fatimah Makassar periode januari-desember 2010.

### D. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara “purposive sampling” yaitu sampel yang dipilih sesuai dengan kriteria inklusi agar relevan dengan desain penelitian sehingga memperoleh data tentang angka kejadian Preeklamsia dalam kehamilan di RSIA Siti Fatimah Makassar periode januari-desember 2010.

a. Kriteria Inklusi

- 1) Ibu hamil yang menderita preeklamsia berdasarkan diagnosis dokter di RSIA Siti Fatimah Makassar periode januari-desember 2010.
- 2) Ibu hamil yang menderita preeklamsia di Ibu hamil yang menderita preeklamsia berdasarkan diagnosis dokter di RSIA Siti Fatimah Makassar periode januari-desember 2010 yang merupakan rujukan dari puskesmas atau rumah sakit lain.
- 3) Ibu hamil yang menderita preeklamsia yang rawat jalan di Ibu hamil yang menderita preeklamsia berdasarkan diagnosis dokter di RSIA Siti Fatimah Makassar periode januari-desember 2010.

b. Kriteria Eksklusi

- 1) Ibu hamil yang tidak terdiagnosis menderita preeklamsia oleh dokter di Ibu hamil yang menderita preeklamsia berdasarkan diagnosis dokter di RSIA Siti Fatimah Makassar periode januari-desember 2010.
- 2) Ibu hamil yang menderita preeklamsia yang hilang kontrol di Ibu hamil yang menderita preeklamsia berdasarkan diagnosis dokter di RSIA Siti Fatimah Makassar periode januari-desember 2010.

## E. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan cara melihat rekam medik ibu hamil yang menderita preeklamsia di RSIA Siti Fatimah Makassar periode januari-desember 2010.

## F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang diperoleh dikumpul dan diolah secara manual dengan menggunakan kalkulator serta disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai penjelasan-penjelasan berdasarkan tujuan penelitian. Data yang telah diolah selanjutnya dianalisis secara deskriptif, dengan rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Keterangan : P : Persentase yang dicari

$f$  : Frekuensi faktor variabel

n : Jumlah sampel

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSIA Siti Fatimah Makassar pada tanggal 4 April 2011 - 20 April 2011, diperoleh data ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2010 sebanyak 1987 orang dan diantaranya yang menderita preeklamsia sebanyak 153 orang berdasarkan kriteria inklusi, yang kemudian dimasukkan dalam analisis data. Selanjutnya hasil penelitian ini akan secara lengkap disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut :

##### 1. Umur ibu

**Tabel 1**  
**Distribusi Kejadian Preeklamsia Berdasarkan Umur Ibu Hamil**  
**di RSIA Siti Fatimah Makassar Periode Januari-Desember**  
**Tahun 2010**

Umur Ibu	Frekuensi	Persentase
Resiko Tinggi (<20 dan >35 tahun)	30	19,61
Resiko Rendah (20 – 35 tahun)	123	80,39
Jumlah	153	100

*Sumber : Rekam Medik RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2010*

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 153 ibu yang menderita preeklamsia berdasarkan umur, terbanyak pada kelompok umur resiko rendah (20-35 tahun) yaitu sebanyak 123 orang (80,39%).

## 2. Graviditas

**Tabel 2**  
**Distribusi Kejadian Preeklamsia Berdasarkan Graviditas Ibu Hamil**  
**di RSIA Siti Fatimah Makassar**  
**Periode Januari-Desember**  
**Tahun 2010**

Graviditas Ibu	Frekuensi	Persentase
Resiko Tinggi (I & $\geq$ V)	75	49,02
Resiko Rendah (II-IV)	78	50,98
Jumlah	153	100

*Sumber : Rekam medik RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2010*

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 153 ibu yang menderita preeklamsia berdasarkan graviditas, terbanyak pada graviditas resiko rendah (II-IV) yaitu sebanyak 78 orang (50,98%).

## 3. Umur kehamilan

**Tabel 3**  
**Distribusi Kejadian Preeklamsia Berdasarkan Umur Kehamilan Ibu**  
**di RSIA Siti Fatimah Makassar**  
**Periode Januari-Desember**  
**Tahun 2010**

Umur Kehamilan	Frekuensi	Persentase
Risiko Tinggi (> 20 Minggu)	134	87,58
Risiko Rendah ( $\leq$ 20 Minggu)	19	12,42
Jumlah	153	100

*Sumber : Rekam medik RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2010*

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 153 ibu yang menderita preeklamsia berdasarkan umur kehamilan, terbanyak pada kelompok umur kehamilan resiko tinggi (>20 minggu) yaitu sebanyak 134 orang (87,58%).

## B. Pembahasan

Preeklamsia adalah penyakit dengan tanda-tanda hipertensi, edema dan proteinuria yang timbul karena kehamilan (Wiknjosastro dkk, 2007).

Setelah melakukan penelitian tentang gambaran angka kejadian preeklamsia dalam kehamilan di RSIA Siti Fatimah makassar periode januari-

desember tahun 2010. Maka hasil penelitian dapat diuraikan berdasarkan variabel yang diteliti :

#### 1. Umur Ibu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2010 yaitu diperoleh hasil untuk umur ibu dengan kelompok resiko rendah (20-35 tahun) yaitu sebanyak 123 orang (80,39%) sedangkan pada umur kelompok resiko tinggi (<20 tahun dan >35 tahun) sebanyak 30 orang (19,61%).

Berdasarkan teori distribusi kejadian preeklampsia berdasarkan umur banyak ditemukan pada kelompok usia ibu yang ekstrim yaitu kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Pada usia kurang dari 20 tahun, keadaan alat reproduksi belum siap untuk menerima kehamilan sedangkan pada usia ibu lebih dari 35 tahun, dalam tubuh telah terjadi perubahan-perubahan akibat penuaan organ-organ. Dengan begitu, kemungkinan untuk mendapat penyakit-penyakit dalam masa kehamilan yang berhubungan dengan umur akan meningkat, seperti penyakit darah tinggi (hipertensi), keracunan kehamilan, (preeklamsia/ eklamsia), diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah. Disebut risiko tinggi karena kemungkinan terjadinya hasil kehamilan yang buruk/ komplikasi pada ibu usia ini akan meningkat (Amiruddin dkk, 2007).

Teori dan kenyataan dalam penelitian ini terdapat suatu kesenjangan di mana hasil yang telah diperoleh yaitu umur ibu dengan kelompok resiko rendah yaitu sebanyak 123 orang (80,39%) sedangkan



pada umur kelompok resiko tinggi sebanyak 30 orang (19,61%). Kesenjangan ini kemungkinan disebabkan karena adanya keterbatasan sampel atau kurangnya sampel yang diperoleh oleh peneliti dan tidak sebanding dengan sampel yang diperoleh oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga hasil penelitian yang didapatkan berbanding terbalik dengan teori yang ada. Dan dapat pula juga disebabkan karena kemungkinan pada saat ini lebih banyak wanita yang menikah pada usia reproduksi sehat (20-35 tahun) sehingga peluang untuk hamil lebih besar pada usia tersebut. Selain itu hal ini juga dapat terjadi karena masih ada faktor lain yang menjadi faktor resiko terjadinya preeklamsia.

## 2. Graviditas

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2010 yaitu diperoleh hasil sebanyak 153 kejadian preeklamsia pada ibu hamil dan didapatkan 78 orang (50,98%) dengan graviditas resiko rendah (II-IV) sedangkan pada ibu dengan graviditas resiko tinggi (I -  $\geq$ V) sebanyak 75 orang (49,02%).

Kehamilan yang paling optimal adalah kehamilan kedua sampai dengan keempat. Kehamilan pertama dan kehamilan setelah keempat mempunyai resiko yang meningkat. Wanita dengan kehamilan kelima atau lebih (*grande multi*) sering disertai penyulit-penyulit seperti kelainan letak, perdarahan antepartum, preeklamsia/ eklamsia dan lain-lain (Suhartini, 2009).

Teori dan kenyataan dalam penelitian ini terdapat suatu kesenjangan di mana hasil yang telah diperoleh yaitu 78 orang (50,98%) dengan graviditas resiko rendah (II-IV) sedangkan pada ibu dengan graviditas resiko tinggi (I -  $\geq$ V) sebanyak 75 orang (49,02%). Kesenjangan ini kemungkinan disebabkan karena keterbatasan sampel atau kurangnya sampel yang diperoleh oleh peneliti dan tidak sebanding dengan sampel yang diperoleh oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga hasil penelitian yang didapatkan berbanding terbalik dengan teori yang ada. Selain itu hal ini juga dapat terjadi karena masih ada faktor lain yang menjadi faktor resiko terjadinya preeklamsia.

### 3. Umur kehamilan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2010 yaitu diperoleh hasil sebanyak 153 kejadian preeklamsia pada ibu hamil dan didapatkan pada umur kehamilan resiko tinggi (>20 minggu) yaitu sebanyak 134 orang (87,58%) sedangkan pada umur kehamilan resiko rendah ( $\leq$ 20 minggu) sebanyak 19 orang (12,42%).

Berdasarkan teori, preeklamsia timbul setelah minggu ke 20 atau lebih, jadi dengan makin tuanya umur kehamilan makin beresiko untuk timbulnya preeklamsia pada ibu hamil, sehingga perlu mendapatkan pemeriksaan yang komprehensif pada semua ibu hamil trimester III (Suhartini, 2009).

Dari hasil penelitian ini ternyata sesuai teori dengan kenyataan di mana hasil yang telah di peroleh yaitu lebih banyak ditemukan pada umur

kehamilan resiko tinggi ( $>20$  minggu) yaitu sebanyak 134 orang (87,58%) dibanding dengan umur kehamilan resiko rendah ( $\leq 20$  minggu) sebanyak 19 orang (12,42%).



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan umur, preeklamsia terbanyak pada umur 20-35 tahun. Hal ini dikarenakan kemungkinan pada saat ini lebih banyak wanita yang menikah pada usia reproduksi sehat (20-35 tahun) sehingga peluang untuk hamil lebih besar pada usia atau umur tersebut.
2. Berdasarkan graviditas, preeklamsia terbanyak pada graviditas II-IV. Hal ini dikarenakan karena masih ada faktor lain yang menjadi faktor risiko terjadinya preeklamsia.
3. Berdasarkan umur kehamilan, preeklamsia terbanyak pada umur kehamilan >20 minggu. Hal ini dikarenakan dengan makin tuanya umur kehamilan makin berisiko untuk timbulnya preeklamsia pada ibu hamil.

#### **B. Saran**

Setelah penelitian ini dilaksanakan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada ibu hamil agar menjaga kesehatannya secara optimal selama kehamilan dan juga rajin memeriksakan kehamilannya di puskesmas atau rumah sakit terdekat, untuk mendeteksi secara dini komplikasi pada kehamilannya.

2. Diharapkan kepada ibu hamil agar meningkatkan keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah Swt dengan senantiasa beribadah dan berdoa agar kehamilannya terhindar dari komplikasi yang dapat membahayakan ibu dan janinnya seperti penyakit preeklamsia.
3. Diharapkan kepada petugas RSIA Siti Fatimah agar lebih giat melakukan penyuluhan kesehatan sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini terjadinya preeklamsia serta komplikasi-komplikasi yang sering terjadi pada kehamilan.
4. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya serta dapat melakukan penelitian lebih lanjut tentang preeklamsia dengan variabel yang berbeda untuk membuktikan seberapa besar pengaruhnya terhadap preeklamsia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran & Terjemahannya. Departemen Agama RI. 2005. Bandung : CV Penerbit J- ART.
- Achadiat, Chrisdiono M. 2004. *Prosedur Tetap Obstetri dan Ginekologi*. Jakarta : EGC.
- Alhafidz, Ahsin W. 2007. *Fikih Kesehatan Cet. 1*. Jakarta : Amzah.
- Ali, Fitriani. 2009. *Manajemen Asuhan Kebidanan Perdarahan Post Partum Karena Atonia Uteri di RSIA Siti Fatimah*. Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
- Amiruddin, dkk. 2007. *Isu Mutakhir tentang Komplikasi Kehamilan (Preeklamsia dan Eklamsia)*. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar. <http://www.find-docs.com>. Diakses tanggal 10-02-2011.
- Ash-Shabuny, Muhammad Ali. 2001. *Cahaya Al-Qur'an Tafsir Tematik Surat Al-A'raf-Yunus*. Jakarta : Pustaka Al-kautsar.
- Ash-Shabuny, Muhammad Ali. 2002. *Cahaya Al-Qur'an Tafsir Tematik Surat An-Nur-Fathir*. Jakarta : Pustaka Al-kautsar.
- Bambang. 2009. *Preeklamsia Ibu Hamil*. <http://www.scribd.com>. Diakses tanggal 09-01-2011).
- Boyle, Maureen. 2007. *Kedaruratan dalam Persalinan*. Jakarta : EGC.
- Chapman, Vicky. 2006. *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Kelahiran*. Jakarta : EGC.
- Damopolii, Subari, dkk. 2006. *Kehamilan Askeb 1*. Makassar : Alauddin Press.
- Leveno, Kenneth J, dkk. 2009. *Obstetri Williams Panduan Ringkas Edisi 21*. Jakarta : EGC.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nugroho, Taufan. 2010. *Kasus Emergency Kebidanan Untuk Kebidanan dan Keperawatan*. Yogyakarta : Nuha Medika.

- Pantikawati, Ika dan Saryono. 2010. *Asuhan Kebidanan 1 (Kehamilan)*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Proverawati, Atikah dan Siti Asfuah. 2009. *Buku Ajar Gizi untuk kebidanan*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Rahayuningsih, Faizah Betty. 2009. *Hubungan Interval Persalinan Dengan Kejadian Pre-Eklampsia Di Rumah Sakit Islam Yayasan Kesehatan Dan Kesejahteraan Islam*. Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://www.find-docs.com>. Diakses tanggal 10-02-2011.
- Rozikhan. 2007. *Faktor-Faktor Resiko Terjadinya Preeklamsia Berat di RS Dr. H. Soewondo Kendal*. Program Magister Epidemiologi Universitas Diponegoro. <http://www.find-docs.com>. Diakses tanggal 10-02-2011.
- Saifuddin, Abdul Bari, dkk. 2006. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta : YBP-SP.
- Saminem. 2008. *Seri Asuhan Kebidanan Kehamilan Normal*. Jakarta : EGC.
- Setiawan, Ari dan Saryono. 2010. *Metode Penelitian Kebidanan D III, D IV, SI dan S2 Cetak 1*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Shihab M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an Volume 4*. Jakarta : Lentera hati.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 6*. Jakarta : Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 9*. Jakarta : Lentera Hati.
- Suhartini. 2009. *Gambaran Kejadian preeklamsia berdasarkan karakteristik Ibu di RSUD dr. Moewardi Surakarta Periode Januari-Desember 2009*. <http://www.jevuska.com> Diakses tanggal 12-01-2011.
- Sujiyatini, dkk. *Asuhan Patologi Kebidanan Plus Contoh Asuhan Kebidanan*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Sunanto, Hardi. 2009. *100 Resep Sembuhkan Hipertensi, Obesitas dan Asam Urat*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Varney, Helen, dkk. 2001. *Buku Saku Bidan*. Jakarta : EGC.
- Yulaikhah, Lily. 2008. *Seri Asuhan Kebidanan Kehamilan*. Jakarta : EGC.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS

Nama : Saidah Bahar  
 Nim : 70400008052  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Sinjai/ 02 Agustus 1990  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Jl.Sultan Alauddin, BTN Bosowa Indah Blok R  
 No. 2  
 Nomor HP : 085299442363

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat SDN 83 Aruhu Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai Tahun 2002
2. Tamat SLTP Negeri 2 Bulupoddo Kecamatan Sinjai Tahun 2005
3. Tamat SPK POLRI Bhayangkara Makassar Tahun 2008
4. Mengikuti Pendidikan Kebidanan UIN Alauddin Makassar Tahun 2008 sampai Tahun 2011