

**GAMBARAN KEJADIAN KEMATIAN PERINATAL DI RUMAH
SAKIT IBU DAN ANAK SITI FATIMAH MAKASSAR
PERIODE JANUARI-DESEMBER 2011**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Keperawatan
Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh
NUR ISMI
M A K A S S A R
NIM. 70300108058

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN
MAKASSAR
2012**

KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah SWT, kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan Ampunan-Nya serta meminta perlindungan kepada-Nya dari kejahatan jiwa dan keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah SWT maka tak seorang pun yang dapat menyesatkan-Nya, dan barangsiapa disesatkan oleh Allah SWT, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk.

Puji syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena atas rahmat-Nya dengan kenikmatan yang tidak terhingga dibalik segala ujian yang di berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana program studi S1 Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

Nurmaid S.Kep.,Ns.,M.Kep Selaku pembimbing I dan **Hj.Hastuti S.Kep.,Ns.,M.Kes** Selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, nasehat serta berbagai saran kepada penulis selama penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. DR. H.Kadir Gassing M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. DR. dr. H.Rasyidin Abdullah, M.PH, MH.Kes. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Nur Hidayah S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku Ketua Jurusan Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Risnah S.Kep.,NS, M.kes selaku penguji (I) Kompetensi
5. Prof. DR. Darussalam Syamsuddin M. Ag selaku penguji (II) Agama
6. Kepada seluruh Dosen, Pegawai dan Staf Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan kontribusi yang banyak kepada penulis selama menempuh studi di jurusan Keperawatan.
7. Terkhusus kuucapkan terima kasih yang srtulus-tulusnya kepada kedua Orangtuaku tercinta yang menjadi inspirasi hidupku serta senantiasa mengiringi langkahku dengan Do'a disetiap sujudnya.
8. Terakhir Ucapan terima kasihku kepada Nasruddin Rasyid S.Hi yang selalu menemani hari-hariku memberikan motivasi, semangat, dan bantuanya baik berupa materi, tenaga, fikiran dalam pnyusunan skripsi ini.

Terakhir penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang ada di dalamnya. Olehnya itu penulis berharap dalam ujian tutup agar mendapat arahan dalam penyempurnaan penulisan agar nantinya dapat bermanfaat dalam penelitian.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 27 Juli 2012

PENULIS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan tentang masa perinatal	7
B. Penyebab Kematian Perinatal	14
C. Faktor yang berhubungan dengan kematian perinatal	16
BAB III KERANGKA KONSEP	29
A. Kerangka konsep penelitian	29
B. Kerangka Kerja	30
C. Variabel Penelitian	31
D. Defenisi Operasional dan kriteria objektif	31
BAB IV METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Populasi dan Sampel	34
C. Instrumen Penelitian	34
D. Tempat dan Waktu Penelitian	35
E. Cara pengumpulan data	35
F. Pengolahan dan analisa data	35
G. Etika penelitian	36
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan	45
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	57

A. Kesimpulan	57
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Distribusi kejadian kematian perinatal menurut umur ibu di RSIA Siti Fatimah Makassar Periode Januari- Desember 2011	40
2. Distribusi kejadian kematian perinatal menurut paritas di RSIA Siti Fatimah Makassar Periode Januari- Desember 2011	41
3. Distribusi kejadian kematian perinatal menurut frekwensi pemeriksaan antenatal di RSIA Siti Fatimah Makassar Periode Januari- Desember 2011.....	42
4. Distribusi kejadian kematian perinatal menurut komplikasi obstetri di RSIA Siti Fatimah Makassar Periode Januari- Desember 2011.....	43
5. Distribusi kejadian kematian perinatal menurut riwayat penolong persalinan di RSIA Siti Fatimah Makassar Periode Januari- Desember 2011.....	44

ABSTRAK

Nama : NUR ISMI

Nim : 70300108058

**Judul : Gambaran Kejadian Kematian Perinatal Di RSIA Siti Fatimah
Makassar Periode Januari- Desember 2011**

Masa perinatal adalah masa sewaktu hamil, melahirkan atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan, kematian perinatal adalah kematian wanita sewaktu hamil melahirkan atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menggambarkan kejadian kematian perinatal di RSIA Siti Fatimah Makassar berhubungan dengan faktor umur, paritas, pemeriksaan antenatal, komplikasi obstetri dan penolong persalinan.

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif, dimana pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh dari rekam medik, kemudian diolah dengan menggunakan computer dan disajikan dalam bentuk tabel.

Penelitian dilakukan mulai tanggal 2-5 Juli 2012, diperoleh bahwa jumlah populasi sebesar 3.539 kasus dan sampel yang diambil sebesar 31 kasus. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh jumlah kematian perinatal menurut umur ibu lebih banyak terjadi pada umur dengan resiko rendah (20-35 tahun) sedangkan menurut paritas ibu, lebih banyak terjadi pada resiko tinggi (1 dan >4) yaitu sebesar 21 kasus. Menurut pemeriksaan antenatal, kematian perinatal lebih banyak terjadi pada ibu dengan resiko tinggi (kurang dari 4 kali) menurut komplikasi obstetri, kematian perinatal lebih banyak terjadi pada resiko rendah (tidak terjadi komplikasi). Menurut riwayat penolong persalinan, kematian perinatal lebih banyak terjadi pada resiko rendah (ditolong oleh tenaga profesional).

Kesimpulannya, kejadian kematian perinatal lebih banyak terjadi pada faktor paritas (1 dan >4) dan frekwensi pemeriksaan antenatal juga menjadi faktor kedua penyebab kematian, sedangkan faktor umur, komplikasi dan pemeriksaan antenatal tidak memberikan dampak terhadap kematian perinatal, maka dalam hal ini diharapkan ada kerja sama antara berbagai pihak, yaitu petugas kesehatan dan masyarakat untuk menekan jumlah kematian perinatal dengan melakukan berbagai upaya yang berkesinambungan.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi seorang perempuan hamil adalah sebuah anugerah yang tidak ternilai oleh apapun, harapan untuk memiliki seorang anak sangatlah besar sehingga bagi perempuan hamil dapat memberikan kebanggaan tersendiri karena kehidupannya akan terasa sempurna jika seorang perempuan tersebut dapat hamil dan melahirkan.

Kehamilan merupakan idaman bagi setiap perempuan yang sudah berkeluarga. Kehamilan bisa terjadi karena ada hubungan seks antara perempuan dewasa dengan pria dewasa, serta melalui tahapan-tahapan serta proses yang panjang sehingga kehamilan dapat terjadi.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam *Q.S Al-Mu'minun/23 : 12-13*

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِي قرارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾

Terjemahnya :

“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim).

Ayat di atas menjelaskan proses kejadian manusia bahwa yang di maksud dengan nutfah itu adalah darah yang berasal dari makanan, baik daging maupun tumbuhan. Tumbuhan berasal dari zat-zat yang terdapat

dalam tanah dan kemudian berproses melalui air mani (sperma) karena itu manusia sebenarnya berasal dari saripati tanah.

Kami menjadikan anak keturuanan Adam (manusia) dari nutfah yang ditempatkan dalam shulbi (tulang sungsum) ayah, yang kemudian dimasukkan kedalam rahim ibu, setelah bertemu dengan sel telur ibu, maka terpeliharalah dalam rahim menjadi bayi sampai kelahirannya (as- shiddieqy hasbi, 2000).

Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa selama hamil akan terjadi perubahan fisik yang tidak bisa dihindari serta resiko-resiko obtrteri bisa menyertai bahkan bisa berdampak terhadap kematian baik pada ibu maupun janin, kematian ini dikenal dengan kematian perinatal (Indah, 2010).

Kematian perinatal menurut batasan dari *The Tenth Revision of The International Classification of Diseases* (ICD) adalah kematian perempuan yang terjadi pada saat kehamilan, persalinan atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, tidak tergantung dari lama dan lokasi kehamilan, disebabkan oleh apapun yang berhubungan dengan kehamilan, atau yang diperberat oleh kehamilan tersebut, atau penanganannya, akan tetapi bukan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan

Kematian perinatal merupakan masalah kompleks yang tidak hanya memberikan pengaruh pada para wanita saja, akan tetapi juga mempengaruhi keluarga bahkan masyarakat sekitar. Kematian perinatal akan meningkatkan risiko terjadinya kematian bayi. Kematian wanita pada usia reproduktif juga akan mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan dan dapat

menyebabkan kemunduran perkembangan masyarakat, karena wanita merupakan pilar utama dalam keluarga yang berperan penting dalam mendidik anak-anak, memberikan perawatan kesehatan dalam keluarga dan membantu perekonomian keluarga (Departemen kesehatan, 2005).

Angka kematian perinatal dan angka kematian bayi merupakan ukuran bagi kemajuan kesehatan suatu negara, khususnya yang berkaitan dengan masalah kesehatan ibu dan anak. Angka kematian perinatal merupakan indikator yang mencerminkan status kesehatan ibu, terutama risiko kematian bagi ibu pada waktu hamil dan melahirkan.

Sampai saat ini Indonesia termasuk kategori Negara dengan tingkat kematian perinatal yang tinggi bahkan tertinggi diantara Negara-negara ASEAN.

Hasil survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan bahwa kematian perinatal di Indonesia tahun 2006 sebesar 55/1000 kelahiran hidup, mengalami penurunan pada tahun 2007 menjadi 46/1000 kelahiran. Tahun 2008 menurun lagi menjadi 44/1000 kelahiran hidup. Tetapi pada tahun 2009 meningkat kembali menjadi 50/1000 kelahiran hidup. Angka kematian perinatal di Indonesia selama 4 periode menduduki peringkat pertama di ASEAN. (Prawirohardjo, 2005).

Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan pada tahun 2000 tercatat angka kematian perinatal di Sul-Sel adalah 49,1 per 1000 kelahiran. Hal ini membuktikan bahwa angka kematian perinatal khususnya di Sul-sel mengalami peningkatan yang signifikan, dan hal ini merefleksikan

tingkat kesehatan ibu, tingkat kunjungan antenatal, tingkat pelayanan kesehatan, kondisi kesehatan lingkungan dan secara umum tingkat perkembangan sosial ekonomi Masyarakat (Departemen kesehatan RI 2007).

Tingginya angka kematian ibu dan kematian perinatal tidak dapat dipisahkan dari profil perempuan di Indonesia yang tergolong sangat buruk diantaranya adalah derajat kesehatan perempuan masih rendah, angka kesakitan dan kematian bersalin masih tinggi, pendidikan perempuan Indonesia masih tergolong rendah, perkawinan usia muda < 20 masih tinggi, jarak waktu hamil dan bersalin pendek, dan jumlah anak banyak masih tinggi (Manuaba, 2008)

Persalinan preterm merupakan hal yang berbahaya karena mempunyai dampak yang potensial meningkatkan kematian perinatal (Prawirohardjo, 2005).

Usia ibu <20 tahun dan >35 tahun memiliki risiko 3 kali untuk mengalami kematian perinatal dengan nilai $p = 0,02$. Usia paling aman bagi seorang wanita untuk hamil dan melahirkan adalah usia antara 20–35 tahun, karena mereka berada dalam masa reproduksi sehat (Simanjuntak, 1992)

Paritas 2–3 merupakan paritas paling aman ditinjau dari sudut kematian perinatal. Paritas pertama dan paritas lebih dari empat, meningkatkan risiko terjadinya kematian perinatal (Suwanti. 2002)

Adanya komplikasi yang timbul pada masa kehamilan, seperti preeklamsia, anemia, KEK, infeksi kehamilan dan perdarahan antepartum,

dimana keadaan tersebut merupakan faktor–faktor risiko untuk terjadinya kematian perinatal (Wahdi, 1999)

Bayi yang dilahirkan dari ibu yang menerima pelayanan antenatal tidak baik mempunyai risiko terjadinya kematian perinatal 5-6 kali di bandingkan dengan ibu yang mendapatkan kualitas pemeriksaann ANC yang baik (Prawirohardjo, 2005)

Penyebab kematian maternal perdarahan 33%, kehamilan muda 11%, partus lama 6%.Faktor yang memberi kontribusi kurang penanganan kasus rujukan gagal mengenali kasus kegawatan, keterlambatan pengambilan keputusan kurang sarana.(Walraven 2007)

Kebijakan Departemen Kesehatan RI dalam upaya mempercepat penurunan angka kematian perinatal pada dasarnya mengacu kepada intervensi strategis ‘empat pilar *safe motherhood*. Mengingat kira-kira 90% kematian perinatal terjadi di sekitar persalinan dan kira-kira 95% penyebab kematian ibu adalah komplikasi obstetri yang sering tidak dapat diperkirakan sebelumnya, maka kebijaksanaan Depkes untuk mempercepat penurunan angka kematian perinatal adalah mengupayakan agar :

- 1) setiap persalinan ditolong atau minimal didampingi oleh bidan, dan
- 2) pelayanan obstetri sedekat mungkin kepada semua ibu hamil (Departemen kesehatan RI, 2010)

RSIA Siti Fatimah Makassar adalah salah satu rumah sakit bersalin rujukan di Makassar bagi Ibu hamil untuk pemeriksaan antenatal care, persalinan, nifas, maupun Ibu yang mempunyai masalah gangguan system

reproduksi lainnya, oleh karena itu tidak sedikit Ibu yang datang dengan berbagai masalah reproduksi untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik.

Dari data awal yang diperoleh dari kunjungan pertama ke RSIA Siti Fatimah Makassar tercatat bahwa kasus perinatal tercatat 3547 kasus. dari data tersebut peneliti ingin melihat "Gambaran kejadian kematian perinatal di RSIA Siti Fatimah Makassar periode Januari-Desember 2011.

B. Rumusan Masalah

Angka kejadian kematian perinatal di Indonesia masih sangat tinggi khususnya di Sulawesi-selatan, sebagai data yang diperoleh menunjukkan bahwa angka kejadian kematian perinatal sangat tinggi. Hal ini dilihat dari adanya berbagai macam faktor penyebab kejadian kematian perinatal mulai dari masa kehamilan, persalinan, dan nifas.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian perinatal, baik ditingkat dunia maupun yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, namun angka kematian perinatal masih tinggi. Untuk itu peneliti ingin melakukan penelitian tentang bagaimana gambaran tentang kejadian kematian perinatal di RSIA Siti Fatimah Makassar Periode Januari- Desember 2011 sebagai rumah sakit bersalin rujukan di Makassar. Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana gambaran kejadian kematian perinatal di RSIA Siti Fatimah Makassar Periode Januari-Desember 2011?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh gambaran kejadian kematian perinatal di RSIA Siti Fatimah Makassar Periode Januari-Desember 2011

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Dengan mengetahui gambaran kejadian kematian perinatal di RSIA Siti Fatimah Makassar, dapat digunakan sebagai masukan dalam menentukan program pelayanan masyarakat khususnya bagi ibu hamil dan dapat memperbaiki sistem pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Ilmiah

Di harapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah yang nantinya dapat bermanfaat untuk pembaca atau peneliti lainnya.

3. Manfaat Institusi

Sebagai bahan acuan yang diharapkan dapat bermanfaat terutama dalam pengembangan institusi.

4. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini merupakan penelitian awal bagi peneliti sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan dan menambah wawasan tentang gambaran kejadian kematian perinatal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Masa Perinatal

Masa perinatal adalah masa sewaktu hamil, melahirkan atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan (Winkjosastro, 2005).

Kematian perinatal adalah kematian wanita sewaktu hamil, melahirkan atau dalam 42 hari sesudah berakhirnya kehamilan. Berdasarkan kesepakatan internasional tingkat kematian perinatal didefinisikan sebagai jumlah kematian perinatal selama satu tahun dalam 100.000 kelahiran hidup. Periode perinatal meliputi masa dalam kandungan dan di luar kandungan pada masa perinatal (Winkjosastro, 2005).

Masa perinatal adalah masa rawan. Gangguan pada masa perinatal dapat berakibat pada hambatan kualitas hidup manusia di kemudian hari. Oleh karena itu optimalisasi tumbuh kembang pada masa perinatal terutama pada fase pesat tumbuh kembang otak sangat di butuhkan untuk mencapai kualitas hidup manusia (Soetjiningsih, 1998)

Menurut laporan WHO tahun 1996, angka kematian perinatal sekitar 10.000.000 pertahun. Sekitar 98-99% kematian perinatal dan perinatal terjadi di negara berkembang. Sedangkan di negara maju hanya 1-2%. kontribusi angka kematian perinatal di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu kematian perinatal 400 per 100.000 persalinan hidup atau sekitar 200.000 orang pertahun sehingga kematian perinatal terjadi setiap 1,2-1,5 menit (WHO, 2008).

Yang mempengaruhi terjadinya kematian perinatal salah satu diantaranya adalah faktor umur ibu dan grande multipara. Dari faktor umur ibu yaitu wanita hamil yang hamil pada usia <20 dan >35 tahun beresiko untuk melahirkan sekitar 40% (Mochtar 2002), Dari faktor grande multipara, paritas dan jumlah keluarga merupakan faktor utama yang berhubungan dengan kejadian kematian perinatal (Febriana 2008)

Dalam berbagai ayat Al-Qur'an, di terangkan tentang proses penciptaan manusia dalam berbagai tahapan agar kita sebagai manusia dapat mengambil pelajaran dan senan tiasa mengesakan Allah dan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Hajj /22:5

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ
 مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ
 وَنُقَرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشِئُ مَسَعَىٰ ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ
 لَتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ
 لَكِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا
 الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

Terjemahnya :

“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian

(dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

Ayat di atas menjelaskan bahwa pada tahap mudghah seluruh sistem tubuh terbentuk menyerupai tunas-tunas. Oleh karena itu, Allah berfirman “*Kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya yang tidak sempurna*” adapun yang di maksud segumpal daging yang sempurna kejadiannya (mukhallaqah) adalah segumpal daging yang sudah terbentuk sempurna kejadiannya di dalamnya organ-organ anggota tubuh. Sedangkan aksud dari daging yang tidak sempurna kejadiannya (ghair mukhallaqah) menurut sebagian ahli tafsir dan beberapa dokter kontemporer adalah janin yang gugur (miscarried fetus) atau janin yang mengalami sedikit cacat bawaan.

Ada lagi kalangan ketiga yang menafsirkan sebagai sesuatu yang dikenal dengan sebutan “kehamilan tanpa janin”, yaitu kasus kehamilan Diana indung kehamilan jauh dari janin, sehingga gumpalan daging langsung mengerut dan menyusut hingga akhirnya mati. Kasus kehamilan seperti ini di golongankan dalam kasus-kasus keguguran atau aborsi (Zaghul, 2011)

Ayat di atas melanjutkan untuk menunjukkan lebih banyak lagi bukti-bukti kekuasaanya dengan menyatakan bahwa kami tetapkan bagi mudgha yang tidak sempurna kejadiannya itu untuk gugur dan kami tetapkan dalam rahim bagi mudgha yang sempurna kejadiannya untuk berlanjut proses

kejadiannya sesuai apa yang kami kehendaki sampai pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kelahirannya antara 6-9 bulan lebih, kemudian kami keluarkan masing-masing kamu dari perut ibu kamu masing-masing sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu kami pelihara agar kamu mencapai masa terkuat kamu, yakni puncak kedewasaan dan kekuatan fisik, mental dan pikiran, dan di antara kamu ada yang di wafatkan sebelum mencapai tahap-tahap yang di sebut itu dan ada pula yang berlanjut usianya sehingga di kembalikan pada umur yang rendah kualitasnya, yakni usia lanjut, dan menjadi pikun hingga akhirnya tidak memiliki daya dan dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pentingbagi kemaslahatan hidup yang dahulu telah diketahinya. Kami yang menciptakan kamu sekalian demikian itu tidak akan mengalami sedikit kesulitan pun untuk mengembalikan kamu dan semua manusia untuk hidup kembali setelah meninggalkan dunia yang fana ini (Shihab Quraish, 2003)

B. PENYEBAB KEMATIAN PERINATAL

Menurut WHO, kurang lebih 80% kematian perinatal merupakan akibat langsung dari komplikasi langsung selama kehamilan, persalinan dan masa nifas dan 20% kematian perinatal terjadi akibat penyebab tidak langsung. Perdarahan, terutama perdarahan post partum, dengan onset yang tiba-tiba dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, akan membahayakan nyawa ibu, terutama bila ibu tersebut menderita anemia. Pada umumnya, 25% kematian perinatal terjadi akibat perdarahan hebat, sebagian besar terjadi saat post partum. Sepsis/infeksi memberikan kontribusi 15% terhadap kematian

perinatal, yang pada umumnya merupakan akibat dari rendahnya higiene saat proses persalinan atau akibat penyakit menular seksual yang tidak diobati sebelumnya. Infeksi dapat dicegah secara efektif dengan melakukan asuhan persalinan yang bersih dan deteksi serta manajemen penyakit menular selama kehamilan (WHO, 2008)

Penyebab langsung kematian ibu di Indonesia, seperti halnya dengan negara lain adalah perdarahan, infeksi dan eklamsia. Ke dalam perdarahan dan infeksi sebagai penyebab kematian, tercakup pula kematian akibat abortus terinfeksi dan partus lama.

Depkes RI membagi faktor-faktor yang mempengaruhi kematian perinatal sebagai berikut :

1. Faktor medik

a. Faktor empat terlalu, yaitu :

- 1) Usia ibu pada waktu hamil terlalu muda (kurang dari 20 tahun)
- 2) Usia ibu pada waktu hamil terlalu tua (lebih dari 35 tahun)
- 3) Jumlah anak terlalu banyak (lebih dari 4 orang)
- 4) Jarak antar kehamilan terlalu dekat (kurang dari 2 tahun)

b. Komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas yang merupakan penyebab langsung kematian perinatal, yaitu :

- 1) Perdarahan pervaginam, khususnya pada kehamilan trimester ketiga, persalinan dan pasca persalinan.
- 2) Infeksi.
- 3) Keracunan kehamilan.

- 4) Komplikasi akibat partus lama.
 - 5) Trauma persalinan.
- c. Beberapa keadaan dan gangguan yang memperburuk derajat kesehatan ibu selama hamil, antara lain :
- 1) Kekurangan gizi dan anemia.
 - 2) Bekerja (fisik) berat selama kehamilan.

2. Faktor non medik

Faktor non medik yang berkaitan dengan ibu, dan menghambat upaya penurunan kesakitan dan kematian perinatal adalah :

- a. Kurangnya kesadaran ibu untuk mendapatkan pelayanan antenatal.
- b. Terbatasnya pengetahuan ibu tentang bahaya kehamilan risiko tinggi.
- c. Ketidak berdayaan sebagian besar ibu hamil dipedesaan dalam pengambilan keputusan untuk dirujuk.
- d. Ketidakmampuan sebagian ibu hamil untuk membayar biaya transport dan perawatan di rumah sakit. (Departemen kesehatan RI, 2002)

C. FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEMATIAN PERINATAL

1. Usia Ibu

Umur berhubungan terhadap proses reproduksi, umur ibu yang dianggap optimal untuk kehamilan adalah antara 20 sampai 30 tahun. Sedangkan dibawah atau diatas usia tersebut akan meningkatkan resiko kehamilan dan persalinan

Umur ibu <20 tahun belum cukup matang dalam menghadapi kehidupan sehingga belum siap secara fisik dan mental dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. Pada umur tersebut rahim dan panggul ibu belum berkembang dengan baik hingga perlu diwaspadai kemungkinan mengalami persalinan yang sulit dan keracunan kehamilan atau gangguan lain karena ketidaksiapan ibu untuk menerima tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Sebaliknya jika umur ibu >35 tahun cenderung mengalami perdarahan, hipertensi, obesitas, diabetes, myoma uteri, persalinan lama dan penyakit-penyakit lainnya (Neil.Ros, 2006)

Kehamilan di atas usia 35 tahun menyebabkan wanita terpapar pada komplikasi medik dan obstetrik, seperti risiko terjadinya hipertensi kehamilan, diabetes, penyakit kardiovaskuler, penyakit ginjal dan gangguan fungsi paru. Kejadian perdarahan pada usia kehamilan lanjut meningkat pada wanita yang hamil di usia >35 tahun, dengan peningkatan insidensi perdarahan akibat solusio plasenta dan plasenta previa. Persalinan dengan seksio sesaria pada kehamilan di usia lebih dari 35 tahun juga meningkat, hal ini terjadi akibat banyak faktor, seperti hipertensi kehamilan, diabetes, persalinan prematur dan penyebab kelainan pada plasenta (Neil rose, 2006)

Pertambahan umur akan diikuti oleh perubahan perkembangan dari organ-organ dalam rongga pelvis. Keadaan ini akan mempengaruhi kehidupan janin dalam rahim. Pada wanita usia muda dimana organ-organ reproduksi belum sempurna secara keseluruhan, disertai kejiwaan yang

belum bersedia menjadi seorang ibu. Usia hamil yang ideal bagi seorang wanita adalah antara umur 20-35 tahun karena pada usia tersebut rahim sudah siap menerima kehamilan, mental juga sudah matang dan sudah mampu merawat bayi dan dirinya (WHO. 1998)

2. Paritas

Paritas merupakan jumlah persalinan yang dialami oleh ibu. Paritas terdiri atas 3 kelompok yaitu: (1) Golongan primipara adalah golongan ibu dengan 0-1 paritas, (2) Golongan multipara adalah golongan ibu dengan paritas 2-6 dan (3) Golongan grande multipara adalah golongan ibu dengan paritas >6. Kehamilan yang paling optimal adalah kehamilan kedua sampai keempat. Kehamilan pertama dan setelah kehamilan keempat mempunyai risiko yang tinggi.

Grande multi para adalah istilah yang digunakan untuk wanita dengan kehamilan kelima atau lebih. Kehamilan pada kelompok ini sering disertai penyulit, seperti kelainan letak, perdarahan ante partus, perdarahan post partum dan lain-lain.

Grande multipara kemunduran daya lentur (elastisitas) jaringan yang sudah berulang kali diregangkan oleh kehamilan membatasi kemampuan berkerut untuk menghentikan perdarahan sesudah persalinan. (Wiknojosastoro, 1999)

Emiliana dan Ratna L. Budiarmo pada penelitian kematian ibu di tiga kabupaten Nusa Tenggara Timur (1989), mengemukakan kematian ibu pada kelompok ibu paritas 1 sebesar 1800 per 100.000 kelahiran hidup dan pada

paritas 4 keatas sebesar 610 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada paritas 2-3 kematian ibu 540 per 100.000 kelahiran hidup.

Pada variabel paritas, ibu dengan paritas <1 dan paritas >4 memiliki risiko 1,3 kali lebih besar untuk mengalami kematian maternal dibandingkan ibu dengan paritas 2 – 4 (OR = 1,3; 95%CI : 0,6 – 2,8), akan tetapi secara statistik menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara paritas dengan kematian maternal ($p = 0,553$) (febriana, 2008).

3. Pemeriksaan Antenatal

Pemeriksaan kehamilan memberikan dampak yang cukup berarti pada hasil akhir suatu kehamilan. Tanpa pemeriksaan kehamilan yang teratur kita tidak akan dapat mendeteksi lebih dini bila terdapat kelainan dalam kehamilan. Data yang didapatkan dari beberapa pemantauan menunjukkan bahwa pemeriksaan teratur mempunyai keuntungan yang nyata. Pemeriksaan kehamilan yang teratur memberikan kesempatan untuk dapat mendiagnosa masalah yang dapat menyulitkan kehamilan maupun persalinan, sehingga dapat dilakukan rujukan dini. Selain itu pemeriksaan kehamilan dapat juga dimanfaatkan untuk penyuluhan tentang KB, cara menyusui serta pengetahuan mengenai gizi. Pemeriksaan kehamilan adalah

Pemeriksaan antenatal adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan untuk memeriksa keadaan ibu dan janin secara berkala yang diikuti dengan upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan (Departemen kesehatan RI 2002)

Kematian perinatal yang di tentukan oleh banyak faktor, salah satu faktor yang berperan dalam mengurangi kematian perinatal adalah pemeriksaan kehamilan secara teratur. Pemeriksaan kehamilan sering dipakai sebagai ukuran pelayanan kesehatan yang memberi dampak yang cukup berarti pada hasil akhir suatu kehamilan. Selain frekuensi kunjungan, mutu pelayanan juga harus diperhatikan untuk mendapatkan pelayanan antenatal yang baik (prawirohardjo, 2005)

Kurang baiknya perawatan semasa kehamilan atau *antenatal care* (ANC). Peneliti pada Pusat Penelitian Ekologi Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan persalinan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kematian perinatal.

Data yang telah di ambil dari beberapa pemantauan bahwa pemeriksaan antenatal yang teratur mempunyai keuntungan yang nyata yaitu memberikan kesempatan untuk dapat mendiagnosa masalah yang dapat menyulitkan kehamilan maupun persalinan.

Di Indonesia pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan yng di lakukan oleh tenaga professional (Dokter spesialis kebidanan, dokter umum, bidan, perawat bidan) pada ibu hamil selama masa kehamilannya yang sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Pelayanan antenatal meliputi 7 T yaitu:

1. Timbang berat badan
2. Ukur tekanan darah
3. Ukur tinggi fundus uteri (TFU)

4. Pemberian imunisasi TT (Tetanus Toksoid) lengkap
5. Pemberian tablet Fe minimal 90 tablet selama kehamilan
6. Tes terhadap penyakit menular seksual
7. Temu wicara dalam rangka persiapan seksual

Dengan demikian secara operasional pelayanan antenatal yang tidak memenuhi 7T belum dianggap pelayanan antenatal yang menyeluruh. Ditetapkan pula frekuensi pelayanan antenatal minimal 4 kali selama kehamilan yaitu 1 kali pada trimester I dan II serta 2 kali pada trimester III (Saifuddin, 2002)

4. Komplikasi obstetri

Komplikasi kehamilan merupakan penyebab langsung kematian perinatal. Komplikasi kehamilan yang sering terjadi yaitu perdarahan, preeklamsia / eklamsia, dan infeksi (Kampikaho A,1990)

Gangguan ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor baik dari dalam maupun dari luar misalkan karena pengaruh kurang nutrisi maupun karena danya trauma dalam maupun luar rahim, baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang dapat memberi dampak yang buruk terhadap ibu dan bayinya (Indah, 2010).

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam *Q.S Ar-ra'd / 13:8*

اللَّهُ يَلْعَلُ مَا تَعْوَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامَ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ

عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾

Terjemahnya :

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh Setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengetahui apa yang dikandung oleh perempuan "sejak masih segumpal mani yang bertemu sel telur perempuan dan sperma laki-laki mengarang diri menjadi nutfah, alaqah, terus menjadi mudgah, sampai bertumbuh; apa rupanya cantik atau buruk, apa warnanya, hitam, manis, putih, atau kuning, apa akan menjadi laki-laki atau perempuan, sejak mulai dikandung bahkan sejak mulai sebelum dikandung, sudah dalam pengetahuan Allah terlebih dahulu. Dan apa yang dikurangi oleh rahim-rahim perempuan dan apa yang bertambah. Entah usia kandungan kurang dari biasanya yaitu 9 bulan 10 hari atau lebih dari itu

Allah terlebih dahulu dan setiap sesuatu disisinya ada ukuran "sama sekali telah diukur dan ditimbang beberapa takaran dan campuran, sekian banyak kalori, hormon, vitamin. Bukan saja manusia dalam kandungan, bahkan setelah manusia muncul ke dunia pun imbang hidupnya ialah karena ukuran yang telah ditentukann tuhan. Ilmu pengetahuan moderen, tentang khasiat suatu ghidza (gizi) membuktikan akan besarnya arti ayat ini. Orang menjadi sakit bila kekurangan ukuran dari salah satu yang penting.

Tentang keadaan janin atau bayi dalam kandungan hanya Allah yang mengetahuinya (Hamka, 1983).

Adapun komplikasi obstetri yang sering terjadi pada masa perinatal yang dianggap dapat mengancam jiwa Ibu dan bayinya yaitu:

a. Perdarahan

Sebab-sebab perdarahan yang berperan penting dalam menyebabkan kematian perinatal selama kehamilan adalah perdarahan, baik yang terjadi pada usia kehamilan muda / trimester pertama, yaitu perdarahan karena abortus (termasuk di dalamnya adalah abortus provokatus karena kehamilan yang tidak diinginkan) dan perdarahan karena kehamilan ektopik terganggu (KET), maupun perdarahan yang terjadi pada kehamilan lanjut akibat perdarahan antepartum. Penyebab perdarahan antepartum pada umumnya adalah plasenta previa dan solusio plasenta (UNFPA, 2004)

b. Perdarahan karena abortus

Abortus adalah keadaan dimana terjadi berakhirnya kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan, atau keluarnya janin dengan berat kurang dari 500 gram atau usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Abortus spontan diperkirakan terjadi pada 15% dari keseluruhan kehamilan, dan kasus-kasus kematian yang ada disebabkan oleh upaya-upaya mengakhiri kehamilan secara paksa. Pada Negara-negara tertentu, abortus mempunyai kontribusi sekitar

50% dari keseluruhan kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan dan dari hasil laporan WHO, angka kematian perinatal karena abortus di seluruh dunia adalah 15%.

Menurut perkiraan WHO, terdapat 20 juta kasus abortus tak aman / berisiko (*unsafe abortion*) diseluruh dunia pertahun. Setiap tahun terjadi 70.000 kematian perinatal akibat abortus berisiko, dan satu dari 8 kematian yang berkaitan dengan kehamilan, diakibatkan oleh abortus berisiko. Hampir 90% abortus berisiko terjadi di Negara berkembang. Kematian perinatal akibat abortus berisiko di negara berkembang 15 kali lebih banyak dari negara industri. Abortus berisiko sulit untuk dilacak dan data yang pasti tentang abortus ini sangat sulit diperoleh. Komplikasi dari aborsi yang tidak aman bertanggung jawab terhadap 13% proporsi kematian maternal (Saifudin AB.1997)

Komplikasi yang berbahaya pada abortus ialah perdarahan, perforasi uterus, infeksi, syok hemoragik dan syok septik. Komplikasi fatal juga dapat terjadi akibat bendungan sistem pembuluh darah oleh bekuan darah, gelembung udara atau cairan, gangguan mekanisme pembekuan darah yang berat (koagulasi intravaskuler diseminata) dan keracunan obat-obat abortif yang menimbulkan gagal ginjal. (Kusumaningrum I. 1999)

Perdarahan pada abortus dapat disebabkan oleh abortus yang tidak lengkap atau cedera pada organ panggul atau usus. Perdarahan

yang berat atau perdarahan yang bersifat persisten selama terjadinya abortus atau yang mengikuti kejadian abortus dapat mengancam jiwa ibu. Semakin bertambah usia kehamilan, semakin besar kemungkinan terjadinya kehilangan darah yang berat. Kematian perinatal akibat perdarahan karena abortus pada umumnya diakibatkan oleh tidak tersedianya darah atau fasilitas transfusi di rumah sakit (De Cheney 2003)

c. Perdarahan karena kehamilan ektopik terganggu

Kehamilan ektopik merupakan kehamilan yang terjadi dan tumbuh di luar endometrium cavum uteri. Pada kehamilan ektopik, sel telur yang telah dibuahi tertanam, tumbuh dan berkembang di luar uterus. Lebih dari 95% implantasi hasil konsepsi pada kehamilan ektopik terjadi pada tuba fallopi.

Kehamilan ektopik merupakan penyebab penting dari kesakitan dan kematian perinatal, karena tempat tumbuh janin yang abnormal ini mudah mengakibatkan gangguan berupa ruptur tuba, karena janin semakin membesar di tempat yang tidak memadai (biasanya terjadi pada kehamilan 6 – 10 minggu). Hal ini akan mengakibatkan perdarahan yang terkumpul dalam rongga perut dan menimbulkan rasa nyeri setempat atau menyeluruh yang berat, disertai pingsan dan syok. Tanpa pengobatan, kehamilan ektopik dapat menjadi fatal hanya dalam waktu beberapa jam, sehingga mengancam kehidupan ibu. Menurut CDC 1995, kehamilan ektopik terganggu

merupakan penyebab utama kematian yang berhubungan dengan kehamilan pada trimester pertama dan merupakan 9 - 10% penyebab kematian akibat komplikasi kehamilan (Royston, 1998).

d. Perdarahan antepartum

Perdarahan antepartum adalah perdarahan pervaginam yang terjadi pada kehamilan antara 28 minggu sampai sebelum bayi lahir. Perdarahan antepartum merupakan komplikasi kehamilan dengan frekuensi sekitar 5–10%. Perdarahan antepartum merupakan keadaan gawat darurat kebidanan yang dapat mengakibatkan kematian pada ibu maupun janin dalam waktu singkat.

Penyebab perdarahan antepartum yang berbahaya pada umumnya bersumber pada kelainan plasenta, yaitu plasenta previa dan solusio plasenta, sedangkan perdarahan antepartum yang tidak bersumber pada kelainan plasenta, misalnya perdarahan akibat kelainan pada serviks uteri dan vagina (trauma, erosio porsionis uteri, polipus servisis uteri, varises vulva) pada umumnya tidak seberapa berbahaya, karena kehilangan darah yang terjadi relatif sedikit dan tidak membahayakan nyawa ibu dan janin, kecuali perdarahan akibat karsinoma invasif cervisis uteri (Pratomo J. 2003)

Pada setiap perdarahan antepartum, pertama kali harus dicurigai bahwa penyebabnya adalah plasenta previa sampai kemudian ternyata dugaan itu salah. Plasenta previa adalah keadaan dimana plasenta terletak abnormal yaitu pada segmen bawah uterus, sehingga

dapat menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri internum. Keadaan ini mengakibatkan perdarahan pervaginam pada kehamilan 28 minggu atau lebih, karena segmen bawah uterus telah terbentuk, dan dengan bertambah tuanya kehamilan, segmen bawah uterus akan lebih melebar dan serviks mulai membuka. Pelebaran segmen bawah uterus dan pembukaan serviks akan menyebabkan terlepasnya sebagian plasenta dari dinding uterus, sehingga mengakibatkan perdarahan. Darah berwarna merah segar, berlainan dengan perdarahan pada solusio plasenta yang berwarna kehitaman. Makin rendah letak plasenta, makin dini perdarahan terjadi. Insidensi plasenta previa meningkat dengan semakin bertambahnya usia ibu, paritas yang tinggi, abortus yang diinduksi, dan riwayat seksio sesaria pada kehamilan sebelumnya (Departemen Kesehatan RI 2002)

Solusio plasenta merupakan keadaan terlepasnya plasenta dari tempat insersinya yang normal, diantara usia kehamilan 28 minggu sampai sebelum janin lahir. Perdarahan dapat terjadi dari pembuluh darah plasenta atau pembuluh darah uterus yang akan membentuk hematoma, sehingga plasenta terdesak dan akhirnya terlepas. Pada umumnya perdarahan akan berlangsung terus – menerus, oleh karena otot uterus yang telah meregang oleh kehamilan tidak mampu untuk lebih berkontraksi untuk menghentikan perdarahan.

Sebagian besar ibu meninggal akibat perdarahan, baik perdarahan segera atau tertunda atau akibat gagal jantung dan gagal ginjal (Pratomo J.2003)

e. Preeklamsia / eklamsia

Kehamilan dapat menyebabkan terjadinya hipertensi pada wanita yang sebelum kehamilannya memiliki tekanan darah normal (normotensi) atau dapat memperberat keadaan hipertensi yang sebelumnya telah ada. Hipertensi pada kehamilan merupakan keadaan pada masa kehamilan yang ditandai dengan terjadinya kenaikan tekanan darah lebih dari 140 / 90 mmHg atau kenaikan tekanan darah sistolik lebih dari 30 mmHg dan atau diastolik lebih dari 15 mmHg.

Hipertensi pada kehamilan yang sering dijumpai adalah preeklamsia dan eklamsia. Preeklamsia berat dan khususnya eklamsia merupakan keadaan gawat karena dapat mengakibatkan kematian ibu dan janin. Preeklamsia ringan dapat mudah berubah menjadi preeklamsia berat, dan preeklamsia berat mudah menjadi eklamsia dengan timbulnya kejang. Tanda khas preeklamsia adalah tekanan darah yang tinggi, ditemukannya protein dalam urin dan pembengkakan jaringan (edema) selama trimester kedua kehamilan.

Pada beberapa kasus, keadaan tetap ringan sepanjang kehamilan, akan tetapi pada kasus yang lain, dengan meningkatnya tekanan darah dan jumlah protein urin, keadaan dapat menjadi berat. Terjadi nyeri kepala, muntah, gangguan penglihatan, dan kemudian

anuria. Pada stadium akhir dan paling berat terjadi eklamsia, pasien akan mengalami kejang. Jika preeklamsia / eklamsia tidak ditangani secara cepat, akan terjadi kehilangan kesadaran dan kematian perinatal karena kegagalan jantung, kegagalan ginjal, kegagalan hati atau perdarahan otak. (Susarmi, 2003)

f. infeksi pada kehamilan

Infeksi pada kehamilan adalah infeksi jalan lahir pada masa kehamilan, baik pada kehamilan muda maupun tua. Infeksi dapat terjadi oleh sebab langsung yang berkaitan dengan kehamilan, atau akibat infeksi lain di sekitar jalan lahir. Infeksi pada kehamilan muda adalah infeksi jalan lahir yang terjadi pada kehamilan kurang dari 20-22 minggu.

Penyebab yang paling sering terjadi adalah abortus yang terinfeksi. Infeksi jalan lahir pada kehamilan tua adalah infeksi yang terjadi pada kehamilan trimester II dan III. Infeksi jalan lahir ini dapat terjadi akibat ketuban pecah sebelum waktunya, infeksi saluran kencing, misalnya sistitis, nefritis atau akibat penyakit sistemik, seperti malaria, demam tifoid, hepatitis, dan lain-lain. Infeksi jalan lahir dapat juga terjadi selama persalinan (intrapartum) atau sesudah persalinan (postpartum). Keadaan ini berbahaya karena dapat mengakibatkan sepsis, yang mungkin menyebabkan kematian ibu. Sepsis menyebabkan kematian perinatal sebesar 15% (Pratomo J.2003)

Pada abortus yang tidak lengkap (abortus inkomplitus), dimana sebagian hasil konsepsi masih tertinggal dalam uterus, dan pada abortus buatan yang dilakukan tanpa memperhatikan aseptis dan antisepsis, sering mengakibatkan komplikasi berupa infeksi (abortus infeksius). Jika infeksi tidak diatasi, dapat terjadi infeksi yang menyeluruh (terjadi penyebaran kuman atau toksin ke dalam peredaran darah atau peritoneum) bakteri tinggi, dan infeksi menyebar ke miometrium, tuba, parametrium, dan peritoneum. Apabila infeksi menyebar lebih jauh, dapat terjadi peritonitis umum atau sepsis, pasien dapat mengalami syok septik.

Kematian perinatal akibat abortus septik sangat tinggi di negara – negara berkembang, dimana tidak terdapat akses terhadap abortus yang diinduksi dan hal tersebut merupakan hal yang ilegal. Risiko kematian perinatal akibat abortus septik meningkat pada wanita – wanita yang tidak menikah, wanita usia muda, dan pada mereka yang melakukan prosedur aborsi yang tidak secara langsung mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam uterus (Kusumaningrum I 1999)

Infeksi pada kehamilan trimester II dan III dapat mengakibatkan korioamnionitis. Korioamnionitis merupakan komplikasi serius yang dapat mengancam jiwa ibu dan janinnya. Mikroorganisme penyebab pada umumnya adalah streptococcus B dan D dan bakteri anaerob.

Tanda dari infeksi ini adalah cairan amnion kotor dan berbau busuk, demam, leukositosis, uterus melunak, dan takikardi (Manuaba, 2008)

g. Perdarahan postpartum

Perdarahan, terutama perdarahan postpartum memberikan kontribusi 25% pada kematian maternal, khususnya bila ibu menderita anemia akibat keadaan kurang gizi atau adanya infeksi malaria. Insidensi perdarahan postpartum berkisar antara 5–8%.⁴⁶⁾ Perdarahan ini berlangsung tiba-tiba dan kehilangan darah dapat dengan cepat menjadi kematian pada keadaan dimana tidak terdapat perawatan awal untuk mengendalikan perdarahan, baik berupa obat, tindakan pemijatan uterus untuk merangsang kontraksi, dan transfusi darah bila diperlukan.

Perdarahan postpartum adalah perdarahan yang terjadi setelah anak lahir dan jumlahnya melebihi 500 ml. Perdarahan dapat terjadi sebelum, saat atau setelah plasenta keluar. Hal – hal yang menyebabkan perdarahan postpartum adalah atonia uteri, perlukaan jalan lahir, terlepasnya sebagian plasenta dari uterus, tertinggalnya sebagian dari plasenta, dan kadang-kadang perdarahan juga disebabkan oleh kelainan proses pembekuan darah akibat hipofibrinogenemia yang terjadi akibat solusio plasenta, retensi janin mati dalam uterus dan emboli air ketuban (Latuamury S.R.2002)

h. Partus Lama

Partus lama dapat membahayakan jiwa janin dan ibu. Partus lama adalah persalinan yang berlangsung lebih dari 18 jam sejak in partu. Partus lama ataupun partus macet menyebabkan 8% kematian perinatal. Keadaan ini sering disebabkan oleh disproporsi sefalopelvik (bila kepala janin tidak dapat melewati rongga pelvis) atau pada letak tak normal (bila terjadi kesalahan letak janin untuk melewati jalan lahir). Disproporsi lebih sering terjadi bila terdapat keadaan endemis kurang gizi, terutama pada populasi yang masih menganut pantangan dan tradisi yang mengatur soal makanan pada para gadis dan wanita dewasa. Keadaan ini diperburuk lagi bila gadis–gadis menikah muda dan diharapkan untuk segera memiliki anak, sedangkan pertumbuhan mereka belum optimal (Saifudin.A 2002)

Pada keadaan disproporsi sefalopelvik, persalinan yang dipaksakan dapat mengakibatkan ruptura uteri. Ruptura uteri merupakan keadaan dimana terjadi robekan pada uterus karena sebab tertentu. Ruptura uteri menyebabkan kematian perinatal sebesar 10 – 40%. Robekan uterus akan menyebabkan rasa nyeri yang hebat disertai nyeri tekan, diikuti dengan perdarahan hebat dari pembuluh darah uterus yang robek dan kematian dapat timbul dalam 24 jam sebagai akibat perdarahan dan syok, atau akibat infeksi yang timbul kemudian. (Royston E, 1998)

i. Infeksi Nifas

Infeksi nifas merupakan keadaan yang mencakup semua peradangan yang disebabkan oleh masuknya kuman - kuman ke dalam alat genital pada waktu persalinan dan nifas. Kuman penyebab infeksi dapat masuk ke dalam saluran genital dengan berbagai cara, misal melalui tangan penolong persalinan yang tidak bersih atau penggunaan instrumen yang kotor.

Mula-mula infeksi terbatas pada uterus, dimana terdapat rasa nyeri dan nyeri tekan pada perut bagian bawah, dengan cairan vagina yang berbau busuk. Demam, nyeri perut yang bertambah, muntah, nyeri kepala dan kehilangan nafsu makan menandakan terjadinya penyebaran infeksi ke tempat lain. Selanjutnya dapat terjadi abses di tuba fallopii, panggul dan diafragma bagian bawah. Pada kasus yang berat, infeksi dapat menyebar ke dalam aliran darah (septikemia), menimbulkan abses dalam otak, otot dan ginjal. Jika infeksi tidak dikendalikan, selanjutnya dapat terjadi gangguan mental dan koma. Infeksi nifas menyebabkan morbiditas dan mortalitas bagi ibu pasca persalinan (Wibowo B, 2001)

Kematian terjadi karena berbagai komplikasi, termasuk syok, gagal ginjal, gagal hati, dan anemia. Di negara – negara sedang berkembang, dengan pelayanan kebidanan yang masih jauh dari sempurna, peranan infeksi nifas masih besar. Insidensi infeksi nifas berkisar antara 2–8% dari seluruh wanita hamil dan memberikan

kontribusi sebesar 8% terhadap kejadian kematian perinatal setiap tahunnya (WHO 2003)

5. Riwayat Penolong Persalinan

Hal ini meliputi keterjangkauan lokasi tempat pelayanan kesehatan, dimana tempat pelayanan yang lokasinya tidak strategis / sulit dicapai oleh para ibu menyebabkan berkurangnya akses ibu hamil terhadap pelayanan kesehatan, jenis dan kualitas pelayanan yang tersedia dan keterjangkauan terhadap informasi. Akses terhadap tempat pelayanan kesehatan dapat dilihat dari beberapa faktor, seperti lokasi dimana ibu dapat memperoleh pelayanan kontrasepsi, pemeriksaan antenatal, pelayanan kesehatan primer atau pelayanan kesehatan rujukan yang tersedia di masyarakat (Kampikaho A, 1990)

Pada umumnya kematian perinatal di negara – negara berkembang, berkaitan dengan setidaknya satu dari tiga keterlambatan (*The Three Delay Models*). Keterlambatan yang pertama adalah keterlambatan dalam mengambil keputusan untuk mencari perawatan kesehatan apabila terjadi komplikasi obstetrik. Keadaan ini terjadi karena berbagai alasan, termasuk di dalamnya adalah keterlambatan dalam mengenali adanya masalah, ketakutan pada rumah sakit atau ketakutan terhadap biaya yang akan dibebankan di sana, atau karena tidak adanya pengambil keputusan, misalnya keputusan untuk mencari pertolongan pada tenaga kesehatan harus menunggu suami atau orang tua yang sedang tidak ada di tempat.

Keterlambatan kedua terjadi setelah keputusan untuk mencari perawatan kesehatan diambil. Keterlambatan ini terjadi akibat keterlambatan dalam mencapai fasilitas kesehatan dan pada umumnya terjadi akibat kesulitan transportasi. Beberapa desa memiliki pilihan transportasi yang sangat terbatas dan fasilitas jalan yang buruk. Kendala geografis di lapangan mengakibatkan banyak rumah sakit rujukan tidak dapat dicapai dalam waktu dua jam, yaitu merupakan waktu maksimal yang diperlukan untuk menyelamatkan ibu dengan perdarahan dari jalan lahir.

Keterlambatan ketiga yaitu keterlambatan dalam memperoleh perawatan di fasilitas kesehatan. Seringkali para ibu harus menunggu selama beberapa jam di pusat kesehatan rujukan karena manajemen staf yang buruk, kebijakan pembayaran kesehatan di muka, atau kesulitan dalam memperoleh darah untuk keperluan transfusi, kurangnya peralatan dan juga kekurangan obat – obatan yang penting, atau ruangan untuk operasi. Pelaksanaan sistem pelayanan kebidanan yang baik didasarkan pada regionalisasi pelayanan perinatal, dimana ibu hamil harus mempunyai kesempatan pelayanan operatif dalam waktu tidak lebih dari satu jam dan bayi harus dapat segera dilahirkan (Latuamury, 2001)

Ketersediaan informasi, baik penyuluhan maupun konseling penting diberikan agar ibu-ibu mengetahui bahaya yang dapat terjadi dalam kehamilan, persalinan dan masa nifas, serta upaya menghindari masalah itu. Keterlambatan dalam mengambil keputusan untuk dirujuk


pada saat terjadinya komplikasi obstetrik sering disebabkan oleh karena keterlambatan dalam mengenali risiko atau bahaya, sehingga berakibat keterlambatan dalam mencapai fasilitas kesehatan rujukan dan keterlambatan dalam memperoleh pertolongan medis di rumah sakit. Selain itu pemberdayaan sarana komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang kesehatan ibu masih sangat kurang (Suwanti,E, 2002)




BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Kerangka Konsep Penelitian



B. Kerangka Kerja

C. Variabel Penelitian

Kejadian kematian perinatal berhubungan dengan:

- a. Umur ibu
- b. Paritas
- c. Riwayat pemeriksaan antenatal
- d. Komplikasi obstetri
- e. Riwayat penolong

D. Defenisi Operasional Dan Kriteria Objektif

1. Umur Ibu

Yang dimaksud usia ibu pada penelitian ini adalah usia ibu pada waktu melahirkan sesuai yang tercantum dalam status kebidanan yang dinyatakan dalam satu tahun.

Kriteria Objektif yaitu:

- a. Risiko tinggi: usia <20 dan usia >35 tahun
- b. Risiko rendah: 20-35 tahun

2. Paritas

Yang di maksud dengan paritas adalah jumlah persalinan yang pernah di alami ibu dengan kehamilan 28 minggu atau lebih seperti yang tercantum dalam status ibu.

Kriteria objektif yaitu:

- a. Risiko tinggi : 1 dan >4
- b. Resiko rendah : 2-4

3. Riwayat Pemeriksaan Antenatal

Yang di maksud pemeriksaan antenatal adalah kunjungan antenatal yang dilakukan ibu selama kehamilannya minimal 4 kali selama hamil, yaitu masing-masing 1 kali pada trimester I dan II serta 2 kali pada trimester III.

Kriteria objektif adalah:

- a. Teratur : Jika pemeriksaan Antenatal Care dilakukan pada Trimester I= minimal 1 kali, Trimester II= minimal 1 kali, Trimester III= minimal 2 kali.
- b. Tidak teratur : jika tidak sesuai dengan yang di atas.

4. Komplikasi obstetri

Komplikasi kehamilan merupakan penyebab langsung kematian perinatal, Sebagian besar komplikasi obstetri terjadi pada saat kehamilan dan persalinan berlangsung, yaitu adanya masalah obstetri yang dapat mengancam jiwa Ibu, janin dan bayinya.

Kriteria objektif adalah:

- a. Terjadi: jika pada saat kehamilan, persalinan dan nifas terjadi komplikasi obstetri.
- b. Tidak terjadi: jika pada saat kehamilan, persalinan dan nifas tidak terjadi komplikasi obstetri.

5. Penolong Persalinan

Tenaga profesional yaitu tenaga kesehatan dan dukun terlatih merupakan penolong yang tepat yang dapat secara cepat mengenali adanya

komplikasi yang dapat mengancam jiwa ibu dan sekaligus melakukan penanganan tepat waktu untuk menyelamatkan jiwa ibu .

Kriteria objekif adalah:

- a. Profesional: jika penolong pertama persalinan adalah tenaga profesional.
- b. Tidak Profesional: jika penolong pertama persalinan adalah bukan tenaga profesional



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian secara deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui gambaran kejadian kematian perinatal di RSIA Siti Fatimah Makassar periode Januari-Desember 2011.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini meliputi semua status perinatal yang tercatat direkam medik RSIA Siti Fatimah Makassar periode Januari-Desember 2011. Status perinatal yang tercatat sebanyak 3547 kasus.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah seluruh kejadian kematian perinatal RSIA Siti Fatimah Makassar Periode Januari-Desember 2011. dengan metode total sampling yang berarti bahwa sampel yang diambil adalah semua kasus perinatal yang tercatat sesuai dengan variable yang diteliti.

C. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data pada Pada penelitian ini dengan menggunakan tabel yang merupakan lembar pencatatan sesuai data demografi sampel yaitu: Umur

ibu, Paritas, riwayat pemeriksaan antenatal, komplikasi obstetri dan riwayat penolong.

D. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Tempat penelitian di RSIA Siti Fatimah Makassar

2. Waktu

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 2-5 juli 2012

E. Cara Pengumpulan Data

Data Sekunder

Data yang di kumpukan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jumlah status perinatal yang dirawat di RSIA Siti Fatimah Makassar periode Januari-Desember 2011 yang tercatat pada bagian rekam mediksesuai dengan nomor registrasi status pada bagian kebidanan. Dan mengacu pada variable yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait dengan penelitian ini yaitu di RSIA Siti Fatimah Makassar.

F. Pengolahan dan Analisa Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan computer program Microsoft Exel yang kemudian disajikan daam bentuk tabel disertai dengan penjelasan, dan persentase.

Data dapat di analisa dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{F}{n} \times 100$$

Keterangan :

P = Persentase data yang dicari

F = Jumlah pengamatan

N = Jumlah sampel (populasi)

G. Etika Penelitian

Etika penelitian memiliki berbagai macam prinsip (Wella yurisa, 2008), yaitu:

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*).

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (*autonomy*). Beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia, adalah: peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subyek (*informed consent*) yang terdiri dari:

- a. Penjelasan manfaat penelitian.
- b. Penjelasan kemungkinan resiko dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan.
- c. Penjelasan manfaat yang akan didapatkan.
- d. Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan.
- e. Subjek berkaitan dengan prosedur penelitian.
- f. Persetujuan subjek dapat mengundurkan diri kapan saja.
- g. Jaminan anonimitas dan kerahasiaan.

Namun kadang kala, formulir persetujuan subjek tidak cukup memberikan proteksi bagi subjek itu sendiri terutama untuk penelitian-penelitian klinik karena terdapat perbedaan pengetahuan dan otoritas antara peneliti dengan subjek (Sumathipala & Siribaddana, 2004). Kelemahan tersebut dapat diantisipasi dengan adanya prosedur penelitian (Syse, 2000).

2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian (*respect for privacy and confidentiality*)

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan, tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subyek dalam kuesioner dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subjek. Peneliti dapat menggunakan koding (inisial atau identification number) sebagai pengganti identitas responden.

3. Keadilan dan inklusivitas (*respect for justice and inclusiveness*).

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berprikemanusiaan, dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan

religius subjek penelitian. Lingkungan penelitian dikondisikan agar memenuhi prinsip keterbukaan yaitu kejelasan prosedur penelitian. Keadilan memiliki bermacam-macam teori, namun yang terpenting adalah bagaimanakah keuntungan dan beban harus didistribusikan di antara anggota kelompok masyarakat. Prinsip keadilan menekankan sejauh mana kebijakan penelitian membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas masyarakat. Sebagai contoh dalam prosedur penelitian, peneliti mempertimbangkan aspek keadilan gender dan hak subjek untuk mendapatkan perlakuan yang sama baik sebelum, selama, maupun sesudah berpartisipasi dalam penelitian.

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancing harms and benefits*) (Milton, 1999; Loiselle, Profetto-McGrath, Polit & Beck, 2004).

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subjek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (*beneficence*). Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subjek (*nonmaleficence*). Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan maka subjek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, maupun kematian subjek penelitian.

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


1. Faktor Umur Ibu

Distribusi kematian perinatal menurut kelompok umur Ibu di Rumah sakit Ibu dan Anak (RSIA) Siti Fatimah Makassar periode Januari – Desember 2011 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Distribusi kejadian kematian perinatal menurut Umur Ibu di RSIA Siti Fatimah Makassar Periode Januari-Desember 2011

Umur Ibu	Jumlah (F)	Persentasi(%)
Resiko tinggi (<20 thn dan >35 thn)	8	26%
Resiko Rendah (20 thn-35 thn)	23	74%
Jumlah	31	100%

Sumber : Medical Record RSIA Siti Fatimah Makassar



Gambar 1. Diagram batang berdasarkan umur ibu

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 31 kasus kematian perinatal terdapat 18 kasus (26 %) yang mengalami kematian perinatal pada kelompok usia ibu dengan resiko tinggi (<20 thn dan >35 thn). Hal ini berarti bahwa jumlah kasus kematian perinatal lebih banyak terjadi pada kelompok usia ibu dengan resiko rendah dibandingkan dengan usia ibu dengan resiko tinggi.


2. Faktor Paritas

Distribusi kematian perinatal menurut paritas di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Siti Fatimah Makassar periode Januari- Desember 2011 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Distribusi kejadian kematian perinatal menurut Paritas Ibu di RSIA Siti Fatimah Makassar Periode Januari-Desember 2011

Paritas	Jumlah (F)	Persentasi(%)
Resiko tinggi (paritas 1 Dan >4 paritas)	21	68%
Resiko Rendah (Paritas 2-3)	10	32%
Jumlah	31	100%

Sumber : Medical Record RSIA Siti Fatimah Makassar



Gambar 2. Diagram batang berdasarkan paritas ibu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 31 kasus kematian perinatal terdapat 21 kasus (68 %) yang mengalami kematian perinatal pada paritas dengan resiko tinggi (1 dan >4). Hal ini berarti bahwa jumlah kasus kematian perinatal lebih banyak terjadi pada kelompok paritas dengan resiko tinggi dibandingkan dengan paritas ibu dengan resiko rendah


3. Faktor Pemeriksaan Antenatal

Distribusi kematian perinatal menurut riwayat pemeriksaan antenatal di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Siti Fatimah Makassar periode Januari-Desember 2011 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Distribusi kejadian kematian perinatal menurut Pemeriksaan Antenatal Ibu di RSIA Siti Fatimah Makassar Periode Januari-Desember 2011

Pem. Antenatal	Jumlah (F)	Persentasi(%)
Resiko tinggi (Pemeriksaan <4 kali/tidak teratur)	16	52%
Resiko Rendah (Pemeriksaan 4 kali/teratur)	15	48%
Jumlah	31	100%

Sumber : Medical Record RSIA Siti Fatimah Makassar



Gambar 3. Diagram batang berdasarkan pemeriksaan antenatal ibu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 31 kasus kematian perinatal terdapat 16 kasus kematian perinatal (52%) yang mengalami kematian perinatal pada ibu yang melakukan pemeriksaan antenatal secara tidak teratur (<4 kali). Hal ini berarti bahwa jumlah kasus kematian perinatal lebih banyak

terjadi pada kelompok pemeriksaan antenatal dengan resiko tinggi daripada kelompok ibu dengan resiko rendah.


4. Faktor komplikasi Kehamilan, Persainan, dan Nifas

Distribusi kematian perinatal menurut komplikasi obstetri di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Siti Fatimah Makassar periode Januari-Desember 2011 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Distribusi kejadian kematian perinatal menurut Komplikasi obstetri Ibu di RSIA Siti Fatimah Makassar Periode Januari-Desember 2011

Komplikasi	Jumlah (f)	Persentasi(%)
Resiko tinggi (Terjadi komplikasi obstetri)	11	35%
Resiko Rendah (tidak terjadi komplikasi obstetri)	20	65%
Jumlah	31	100%

Sumber : Medical Record RSIA Siti Fatimah Makassar



Gambar 4. Diagram batang berdasarkan komplikasi obstetri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 31 kasus kematian perinatal ibu dengan resiko rendah (tidak mengaami kompikasi obstetri) sebesar 20 kasus kematian perinatal (65%). Hal ini berarti bahwa jumlah kasus kematian perinatal lebih banyak terjadi pada kelompok ibu dengan resiko rendah (tidak mengalami komplikasi) daripada ibu dengan resiko tinggi (mengalami komplikasi).


5. Faktor Riwayat Penolong Persalinan

Distribusi kematian perinatal menurut riwayat penolong di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Siti Fatimah Makassar periode Januari-Desember 2011 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Distribusi kejadian kematian perinatal menurut Riwayat Penolong Ibu di RSIA Siti Fatimah Makassar Periode Januari-Desember 2011

Riwayat Penolong	Jumlah (f)	Persentasi(%)
Resiko tinggi (Bukan tenaga profesional)	4	13%
Resiko Rendah (Dengan tenaga profesional)	27	87%
Jumlah	31	100%

Sumber : Medical Record RSIA Siti Fatimah Makassar



Gambar 5 . Diagram batang berdasarkan penolong persalinan ibu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 31 kasus kematian perinatal pada kelompok ibu dengan resiko rendah (dengan tenaga profesional) sebesar 27 kasus kematian perinatal (87%). Hal ini berarti bahwa jumlah kasus kematian perinatal lebih banyak terjadi pada kelompok ibu dengan resiko rendah (dengan tenaga profesional) daripada ibu dengan resiko tinggi (bukan tenaga profesional).

B. Pembahasan

Masa perinatal adalah masa rawan, gangguan pada masa perinatal dapat berakibat pada hambatan kualitas hidup manusia di kemudian hari. Oleh karena itu optimalisasi tumbuh kembang pada masa perinatal terutama pada fase pesat tumbuh kembang otak sangat di butuhkan untuk mencapai kualitas hidup manusia (Soetjiningsih, 1998)

Tingginya angka kematian ibu dan kematian perinatal tidak dapat dipisahkan dari profil perempuan di Indonesia yang tergolong sangat buruk diantaranya adalah derajat kesehatan perempuan masih rendah, angka kesakitan dan kematian bersalin masih tinggi, pendidikan perempuan Indonesia masih tergolong rendah, perkawinan usia muda <20 masih tinggi, jarak waktu hamil dan bersalin pendek, dan jumlah anak banyak masih tinggi (Manuaba, 2008)

Allah swt berfirman dalam QS. Al-Mulk / 67: 2

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ

الْغَفُورُ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Yang menjadikan mati dan hidup , supaya dia menguji kamu , siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia maha perkasa lagi maha pengampun.

Pada ayat ini, kita mendapat bagaimana tuhan membicarakan kematian sebelum kehidupan. Dia menginformasikan kepada kita bahwa kematian juga seperti kehidupan. jadi sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini segala

sesuatu telah di tentukan sebelumnya oleh Allah swt dan sebagai manusia kita tidak pernah mengetahui kapan, di mana, dan bagaimana kematian kita kelak, sebagai makhluk ciptaan allah tugas kita sebagai hamba hanyalah berbuat amal kebaikan di muka bumi ini, agar kita senantiasa selalu dalam rahmatnya.

1. Gambaran Kematian Perinatal Berdasarkan Umur Ibu.

Umur berhubungan terhadap proses reproduksi, umur ibu yang dianggap optimal untuk kehamilan adalah antara 20 sampai 35 tahun. Sedangkan dibawah atau diatas usia tersebut akan meningkatkan resiko kehamilan dan persalinan oleh karena itu usia hamil yang ideal bagi seorang wanita adalah antara umur 20-35 tahun karena pada usia tersebut rahim sudah siap menerima kehamilan, mental juga sudah matang dan sudah mampu merawat bayi dan dirinya.

Umur ibu <20 tahun belum cukup matang dalam menghadapi kehidupan sehingga belum siap secara fisik dan mental dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. Pada umur tersebut rahim dan panggul ibu belum berkembang dengan baik hingga perlu diwaspadai kemungkinan mengalami persalinan yang sulit dan keracunan kehamilan atau gangguan lain kerana ketidaksiapan ibu untuk menerima tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Sebaliknya jika umur ibu >35 tahun cenderung mengalami perdarahan, hipertensi, obesitas, diabetes, myoma uteri, persalinan lama dan penyakit-penyakit lainnya (Neil.Ros, 2006)

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Nining W (2004) menyatakan bahwa usia ibu <20 tahun dan >35 tahun memiliki risiko 3 kali

untuk mengalami kematian perinatal dimana pertambahan umur akan diikuti oleh perubahan perkembangan dari organ-organ dalam rongga pelvis. Keadaan ini akan mempengaruhi kehidupan janin dalam rahim. Pada wanita usia muda dimana organ-organ reproduksi belum sempurna secara keseluruhan, disertai kejiwaan yang belum bersedia menjadi seorang ibu.

Hal ini sesuai dengan teori (simanjuntak, 1992) yang menyatakan bahwa usia ibu <20 tahun dan >35 tahun memiliki risiko 3 kali untuk mengalami kematian perinatal, Usia paling aman bagi seorang wanita untuk hamil dan melahirkan adalah usia antara 20–35 tahun, karena mereka berada dalam masa reproduksi sehat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa angka kematian tertinggi justru terjadi pada wanita berusia 20-35 tahun atau yang berada pada umur resiko rendah yaitu sebanyak 23 kasus (74%) kematian perinatal, dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa kematian pada usia ini tidak hanya disebabkan faktor umur saja akan tetapi karena adanya faktor yang lain misalnya seorang ibu yang paritasnya 1 dan tidak pernah melakukan pemeriksaan antenatal sehingga komplikasi yang terjadi yang akan menyebabkan kematian karena tidak terdeteksi secara dini. Jadi dapat dikatakan bahwa umur pada penelitian ini umur ibu bukanlah sepenuhnya yang menyebabkan kematian melainkan didukung oleh faktor lain yang saling berhubungan. Sedangkan pada umur resiko tinggi juga terjadi kematian akan tetapi hanya mencapai 26% saja karena hal ini memang disebabkan faktor umur ibu yang >35 thn karena pada

usia ini terjadi perubahan perkembangan dari organ-organ dalam rongga pelvis, sedangkan pada ibu yang umurnya <20 tahun mengalami kematian karena organ-organ reproduksinya belum matang dan belum siap untuk hamil dan melahirkan.

Menurut peneliti, bahwa teori yang ada berbeda dengan hasil penelitian yang didapatkan karena teori mengatakan yang beresiko mengalami kematian perinatal yaitu usia <20 dan >35 sedangkan hasil penelitian yang didapatkan ternyata yang paling banyak mengalami kematian perinatal adalah umur resiko rendah yaitu 20-35 tahun.

Hal tersebut di atas juga di pengaruhi oleh berbagai faktor seperti adanya komplikasi obstetrik serta ibu yang memiliki paritas yang lebih dari 4 dengan jarak yang dekat sehingga hal ini dapat menunjang terjadinya kejadian kematian perinatal meski usia ibu masih tergolong masa reproduksi sehat yaitu usia yang paling aman bagi seorang wanita untuk hamil dan melahirkan yaitu umur 20-35 tahun.

2. Gambaran kematian perinatal berdasarkan paritas

Paritas merupakan jumlah persalinan yang dialami oleh ibu. Paritas terdiri atas 3 kelompok yaitu: Golongan primipara adalah golongan ibu dengan 0-1 paritas, Golongan multipara adalah golongan ibu dengan paritas 2-6 dan, Golongan grande multipara adalah golongan ibu dengan paritas >6. Kehamilan

yang paling optimal adalah kehamilan kedua sampai keempat. Kehamilan pertama dan setelah kehamilan keempat mempunyai risiko yang tinggi. Sehingga seorang ibu yang sering melahirkan mempunyai risiko bagi kesehatannya dan juga pada kesehatan janinnya. Hal ini disebabkan karena pada ibu dapat timbul kerusakan-kerusakan pada pembuluh darah dinding uterus yang mempengaruhi sirkulasi nutrisi ke janin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka kematian perinatal tahun 2011 ini terjadi pada kelompok ibu dengan risiko tinggi yaitu pada paritas 1 dan >4 hal ini tidak terlepas karena adanya faktor lain yang menunjang seperti seorang ibu yang paritasnya 1 juga berumur <20 tahun sehingga mempunyai faktor risiko lain yang dapat menyebabkan kematian sedangkan pada kelompok ibu yang paritasnya tidak berisiko juga terjadi kematian hal ini disebabkan juga karena adanya faktor yang lain seperti umur, juga disertai dengan komplikasi obstetri jadi meskipun kelompok ibu ini berada pada paritas yang tidak berisiko akan tetapi tetap mengalami kematian karena adanya faktor yang lain.

Hasil penelitian ini sama dengan yang di dapatkan oleh Syamsiah (2008) di RSIA Siti Fatimah Makassar yang mendapat hubungan antara paritas dengan kematian perinatal. Karena diketahui bahwa bila seorang ibu mempunyai paritas >4 mempunyai risiko mengalami kematian karena kehamilan yang berulang-ulang menyebabkan rahim ibu tidak sehat lagi untuk kehamilan berikutnya. Hal ini berarti ibu yang melahirkan dengan paritas 1 dan >4 mempunyai peluang

yang lebih besar terjadinya kematian perinatal di banding dengan paritas resiko rendah

3. Gambaran kematian perinatal Berdasarkan Pemeriksaan antenatal

Pemeriksaan antenatal sangat berpengaruh terhadap kelangsungan kesehatan dalam masa perinatal karena dalam pemeriksaan antenatal di lakukan pemeriksaan kehamilan yang di lakukan untuk memeriksa keadaan ibu dan janin secara berkala yang di ikuti dengan upaya koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan sehingga penyimpangan- penyimpangan atau komplikasi-komplikasi yang menyertai dapat dikenali secara dini agar tidak menyebabkan penyulit persalinan.

Di Indonesia pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan yng di lakukan oleh tenaga professional (Dokter spesialis kebidanan, dokter umum, bidan, perawat bidan) pada ibu hamil selama masa kehamilannya yang sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Pelayanan antenatal meliputi 7 T yaitu:

1. Timbang berat badan
2. Ukur tekanan darah
3. Ukur tinggi fundus uteri (TFU)
4. Pemberian imunisasi TT (Tetanus Toksoid) lengkap
5. Pemberian tablet Fe minimal 90 tablet selama kehamilan

6. Tes terhadap penyakit menular seksual
7. Temu wicara dalam rangka persiapan seksual

Hal didukung oleh penelitian Indah (2010) yang mendapatkan bahwa 67 % ibu yang tidak taat melakukan pemeriksaan antenatal mengalami penyulit persalinan bahkan bayi yang di lahirkan mengalami kecatatan karena bayi. Ibu yang menerima pelayanan antenatal tidak baik mempunyai risiko terjadinya kematian perinatal 5-6 kali di bandingkan dengan ibu yang mendapatkan kualitas pemeriksaann ANC yang baik. (Prawirohardjo, 2005)

Hasil penlitian yang telah didapatkan, ternyata diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa kejadian kematian perinatal tertinggi di RSIA Siti Fatimah Makassar terjadi pada ibu yang tidak rutin memeriksakan kehamilannya tercatat sebanyak (16 kasus) kematian perinatal (52%) sedangkan ibu yang rutin memeriksakan kehamilannya tercatat sebanyak 15 kasus kematian perinatal (48%). Hal ini tentunya memperlihatkan bahwa pemeriksaan antenatal dengan kematian perinatal sangat erat kaitannya akan tetapi hasil yang didapataka bahwa tingginya kematian pada kelompok ibu yang rutin memeriksakan antenatal karena kemungkinan disebabkan oleh faktor dari luar misalnya ibu yang fisiknya bekerja keras juga bisa disebabkan karena paritas yang sudah tinggi dengan jarak yang berdekatan.

Kesesuaian yang diperoleh dari penelitian ini tentu saja di pengaruhi oleh berbagai faktor seperti halnya yang ditemukan dilapangan biasanya ibu hamil baru memeriksakan kehamilannya ketika trimester II yaitu ketika perutnya

mulai dirasakan membesar dan merasakan kelainan biasanya cenderung pada ibu- ibu yang telah beberapa kali hamil dan meahirkan karena merasa telah ada pengalaman sebelumnya sehingga baru kontak dengan petugas kesehatan menjelang kelahiran. Hal ini tentunya dapat mempertinggi kejadian kematian perinatal karena deteksi dini terhadap komplikasi dan kelainan tidak dilaksanakan sesegera mungkin.

4. Gambaran Kematian Perinatal Berdasarkan Komplikasi Obstetri

Komplikasi kehamilan merupakan penyebab langsung kematian perinatal. Komplikasi kehamilan yang sering terjadi yaitu perdarahan, preeklamsia/eklamsia, dan infeksi merupakan penyulit yang apabila tidak segera diatasi dapat berakibat resiko kematian perinatal akan semakin meningkat.

penelitian Kusmaningrum (1999) menunjukkan bahwa komplikasi persalinan yang terjadi pada kelompok kasus sebagian besar berupa perdarahan (34,6%), disusul preeklamsia (15,4%), dan eklamsia (11,5%), demikian juga pada kelompok kontrol, yaitu preeklamsia dan perdarahan (7,7%) disusul partus lama (3,9%). Adanya komplikasi persalinan, terutama perdarahan postpartum, memberikan kontribusi 25% untuk terjadinya kematian perinatal. Perdarahan ini akan mengakibatkan ibu kehilangan banyak darah, dan akan mengakibatkan kematian perinatal dalam waktu singkat. Preeklamsia ringan dapat dengan mudah berubah menjadi preeklamsia berat dan keadaan ini akan mudah menjadi eklamsia yang mengakibatkan kejang. Apabila keadaan ini terjadi pada proses

persalinan akan dapat mengakibatkan ibu kehilangan kesadaran, dan dapat mengakibatkan kematian perinatal. Partus lama atau persalinan tidak maju adalah persalinan yang berlangsung lebih dari 18 jam sejak inpartu. Partus lama dapat membahayakan jiwa ibu, karena pada partus lama risiko terjadinya perdarahan postpartum akan meningkat dan bila penyebab partus lama adalah akibat disproporsi kepala panggul, maka risiko terjadinya ruptura uteri akan meningkat, dan hal ini akan mengakibatkan kematian ibu dan juga janin dalam waktu singkat. Partus lama dapat mengakibatkan terjadinya infeksi jalan lahir. Infeksi ini dapat membahayakan nyawa ibu karena dapat mengakibatkan sepsis.

Penelitian yang dilaksanakan memperlihatkan bahwa tidak terdapat hubungan antara adanya komplikasi obstetri dengan kematian perinatal karena hanya sebagian kecil kasus kematian perinatal yang mempunyai komplikasi obstetri adapun hasil yang diperoleh adalah terdapat 11 kasus (35 %) yang mengalami kematian perinatal pada dengan resiko tinggi (mengalami komplikasi obstetri), Sedangkan pada kelompok ibu dengan resiko rendah (tidak mengalami komplikasi obstetri) sebesar 20 kasus kematian perinatal (65%). Menurut peneliti sebagian besar kelompok ibu hamil sudah dapat menjaga kesehatan sehingga hanya sebagian kecil ibu hamil yang mengalami kematian perinatal yang disebabkan oleh komplikasi obstetric. angka kematian ini tidak terlalu tinggi akan tetapi hal tersebut tidak terlepas dari adanya faktor resiko yang lain misalnya paritas tinggi atau tidak patuh dalam melakukan pemeriksaan antenatal.

Tidak adanya hubungan pada komplikasi obstetrik mungkin di sebabkan karena adanya faktor yang lain misalnya karena paritas yang tinggi serta pemeriksaan antenatal yang tidak teratur. Hasil penelitian didapatkan oleh Syamsiah (2008) di RSIA Siti Fatimah Makassar yang mendapat ada hubungan antara komplikasi obstetri dengan kematian perinatal.

5. Gambaran Kematian perinatal Berdasarkan Riwayat penolong Persalinan.

Pada umumnya kematian perinatal di negara–negara berkembang, berkaitan dengan setidaknya satu dari tiga keterlambatan (*The Three Delay Models*). Keterlambatan yang pertama adalah keterlambatan dalam mengambil keputusan untuk mencari perawatan kesehatan apabila terjadi komplikasi obstetrik. Keadaan ini terjadi karena berbagai alasan, termasuk di dalamnya adalah keterlambatan dalam mengenali adanya masalah, ketakutan pada rumah sakit atau ketakutan terhadap biaya yang akan dibebankan di sana, atau karena tidak adanya pengambil keputusan, misalnya keputusan untuk mencari pertolongan pada tenaga kesehatan harus menunggu suami atau orang tua yang sedang tidak ada di tempat.

Keterlambatan kedua terjadi setelah keputusan untuk mencari perawatan kesehatan diambil. Keterlambatan ini terjadi akibat keterlambatan dalam mencapai fasilitas kesehatan dan pada umumnya terjadi akibat kesulitan transportasi. Beberapa desa memiliki pilihan transportasi yang sangat terbatas dan fasilitas jalan yang buruk. Kendala geografis di lapangan mengakibatkan

banyak rumah sakit rujukan tidak dapat dicapai dalam waktu dua jam, yaitu merupakan waktu maksimal yang diperlukan untuk menyelamatkan ibu dengan perdarahan dari jalan lahir.

Keterlambatan ketiga yaitu keterlambatan dalam memperoleh perawatan di fasilitas kesehatan. Seringkali para ibu harus menunggu selama beberapa jam di pusat kesehatan rujukan karena manajemen staf yang buruk, kebijakan pembayaran kesehatan di muka, atau kesulitan dalam memperoleh darah untuk keperluan transfusi, kurangnya peralatan dan juga kekurangan obat-obatan yang penting, atau ruangan untuk operasi. Pelaksanaan sistem pelayanan kebidanan yang baik didasarkan pada regionalisasi pelayanan perinatal, dimana ibu hamil harus mempunyai kesempatan pelayanan operatif dalam waktu tidak lebih dari satu jam dan bayi harus dapat segera dilahirkan (Latuamury, 2001)

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Indah (2010) sebagian besar ibu meninggal di sebabkan karena keterlambatan rujukan sehingga penanganan awal yang didapatkan ibu bukanlah dari tenaga professional melainkan mendapatkan penanganan awal dari keluarga sendiri yang tidak mampu memberikan penanganan sehingga komplikasi-komplikasi persalinan tidak segera tertangani dengan baik hal inilah yang dapat menyebabkan kematian perinatal.

Sedangkan hasil yang didapatkan oleh peneliti yang dilaksanakan yaitu sebagian besar kelompok Ibu yang mengalami kematian perinatal adalah kelompok yang berada pada penolong persalinan dengan tenaga profesional hal

ini terjadi karena meskipun ibu di tolong oleh tenaga professional bila paritasnya 1 atau >4 maka juga akan beresiko untuk menagalami kematian perinatal, atau bisa juga dikatakan bahwa kematian perinatal pada penolong persalinan bukan tenaga professional memang karena mereka tidak mampu dan tidak tahu dalam penanganan persalinan sehingga pertolongan yang diberikan hanya akan menyebabkan kematian. Akan tetapi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada peneitian tidak ada hubungan antara riwayat penolong dengan kematian perinatal melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain seperti karena paritas yang terlau tinggi serta umur Ibu hamil pun sudah di atas 35 tahun.

Keadaan ini berbeda dengan teori yang ada menyatakan bahwa kematian perinatal berpengaruh besar terhadap riwayat pertolongannya, termasuk di dalamnya adalah keterlambatan dalam mengenali adanya masalah, ketakutan pada rumah sakit atau ketakutan terhadap biaya yang akan dibebankan di sana, atau karena tidak adanya pengambil keputusan, misalnya keputusan untuk mencari pertolongan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data mengenai kematian perinatal yang terjadi di RSIA Siti Fatimah Makassar pada periode Januari-Desember 2011, dapat disimpulkan bahwa paritas mempunyai frekwensi tertinggi penyebab kematian ibu pada saat hamil, melahirkan dan setelah melahirkan. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan antenatal, dimana kematian turut dipengaruhi oleh apakah pemeriksaan selama kehamilan berlangsung secara rutin dan teratur atau tidak. Sedangkan faktor usia berada pada urutan ketiga, kemudian komplikasi obstetri, dan penolong persalinan mempunyai frekwensi terendah, atau relatif tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kematian perinatal.

B. Saran

1. Untuk para tenaga profesional
 - a. Sebagai tenaga profesional khususnya petugas peayanan kesehatan terdepan, tenaga profesional diharapkan dapat meningkatkan peayanan yang terpadu kepada ibu yang dalam masa perinatal, serta diharapkan mutu pelayanan yang diberikan lebih ditingkatkan misalnya dalam poli KIA.

- b. Hendaknya memberikan health education kepada ibu- ibu yang memiliki paritas yang beresiko agar dapat mengantisipasi resiko- resiko obstetri, atau jika ibu yang paritasnya tinggi agar kehamilan dapat di rencanakan sebaik mungkin.
 - c. Hendaknya sarana dan prasarana dalam institusi tersebut lebih ditingkatkan mulai dari pelayanan antenatal, natal dan post natal.
 - d. Hendaknya kerjasama antara pihak petugas kesehatan disetiap bagian seperti dokter, bidan, perawat, dan berbagai staf lainnya perlu ditingkatkan agar setiap komplikasi yang ditemukan dapat segera ditangani sehingga kematian perinatal dapat ditekan.
2. Untuk Penentu Kebijakan

Mengingat tingginya angka kematian perinatal di profinsi Sulawesi selatan secara umum dan di RSIA Siti Fatimah Makassar pada khususnya maka pemerintah hendaknya masih perlu meningkatkan berbagai sarana peayanan kesehatan khususnya KIA meliputi pemeriksaan antenatal, natal, dan postnatal secara berkesinambungan serta pelayanan kesehatan yang lengkap dan mudah dijangkau oleh masyarakat banyak sehingga diharapkan pada tahun-tahun mendatang angka kematian perinatal dapat ditekan serendah-rendahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asma, Ummu, *“Makna Arrahim dalam Hadits”*, Edisi 10, Solo: Majalah El-Fata, 2006.
- Ash-shddieeqy , *“Tafsir al-quranul majid an-Nuur ”*, cet 2, Semarang :PT. Pustaka rizki putra, 2000.
- De Cheney AH, Nathaan L. *“Current Obstetric and Gynecologic Diagnosis and Treatment. 9th Edition.* Mc. Graw – Hill, Inc. 2003.
- Departemen Agama RI, *“Al-Quran dan Terjemahnya”* Jakarta: 2006.
- Departemen Kesehatan RI, *“Pedoman Pelayanan Antenatal di tingkat Pelayanan Dasar”* Jakarta: 1994.
- _____, *“Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal”*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwona Prawihardjo. 2002.
- _____, *“Profil Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan”* Makassar: 2007.
- _____, *“Penanganan Kegawatdaruratan Obstetri”*, Jakarta: Ditjen Binkesmas, Depkes RI.: 1996.
- Djaja S, Mulyono L, Afifah T, *“Penyebab Kematian Maternal di Indonesia, Survei Kesehatan Rumah Tangga 2001.* Majalah Kedokteran Atmajaya vol 2 No. 3, 2003.
- Febriana, Aulita ika *“Analisis faktor kematian perinatal di kabupaten Konawe”* Jakarta: Universitas Indonesia UI. 2008
- Hamka, *“Tafsir Al-Azhar”*, cet 2, Jakarta : Pustaka panjimas, 1983.
- Hidayat, Azis, *“Metode Penelitian Kebidanan”*, Jakarta: Salemba, 2007.
- Indah, Kusuma, *“Maternal Mortality Analysis”* Jakarta . Universitas Indonesia, 2010.
- Kampikaho A, Irwig LM. *“Risk Factors For Maternal Mortality In Five Kampala Hospital, 1980 – 1986”*, International Journal of Epidemiology vol 19. 1990.
- Kusumaningrum I. *“Karakteristik Kehamilan Risiko Tinggi Sebagai Penyebab Kematian Maternal di Rumah Sakit Umum Pendidikan Dr. Sardjit”*. Yogyakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, 1999.
- Latuamury S.R. *“Hubungan Antara Keterlambatan Merujuk Dengan Kematian Ibu di RSUD Tidar Kota Magelang”*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2001.

- Manuaba, Ida Ayu Candranita, “*Gawat Darurat Obgin Sosial untuk Profesi Bidan*”, Jakarta: EGC, 2008.
- Manuaba, IGB, “*Masalah Kematian Ibu dan Perinatal di Indonesia: dalam Kapita Selekta Penatalaksanaan Rutin Obstetric Ginekologi dan KB*”, Jakarta: Buku Kedokteran, EGC, 2000.
- Neil, Rose. Wendy, “*Panduan Lengkap Perawatan Kehamilan*”, Jakarta: Dian Rakyat, 2006.
- Pratomo J. “*Kematian Ibu dan Kematian Perinatal pada Kasus-Kasus Rujukan Obstetri di RSUP Dr. Kariadi Semarang*”, Semarang: Bagian Kebidanan dan Kandungan FK UNDIP / RSUP Dr. Kariadi: 2003.
- Prawirohardjo, S. “*Ilmu Kebidanan; Kematian Perinatal*”, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2005.
- Royston E, Amstrong S. “*Pencegahan Kematian Ibu Hamil*”, Alih bahasa: Maulany R.F. Jakarta: Binarupa aksara, 1998.
- Saifudin A, “*Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan neonatal*”, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2002.
- Saifudin AB, dkk. “*Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*”, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2000.
- Saifudin AB. “*Issues in Training Foressential Maternal Healthcare in Indonesia*”. Medical Journal of Indonesia Vol 6 No. 3, 1997.
- _____, “*Mortalitas dan Morbiditas Maternal, Buku Panduan Praktis Pelayanan Maternal dan Neonatal*”, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2002
- Shihab, Quraish “*Tafsir Al Misbah*”, Jakarta: Lentera Hati, 2003.
- Simanjuntak, P., “*Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ibu Journal Obstetrik dan Ginekologi*” Indonesia: 1992
- Soetjningsih, “*Tumbuh Kembang Anak*”, Jakarta Penerbit EGC 1998
- Susarmi, Asrining, dkk., “*Perawatan Bayi Resiko Tinggi*”, Jakarta: EGC., 2003.
- Suwanti E. “*Hubungan Kualitas Perawatan Kehamilan dan Kualitas Pertolongan Persalinan Dengan Kematian Maternal di Kabupaten Klaten*”, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, 2002.
- Syatirah, “*Diklat Ilmu Kesehatan Anak*”, Makassar: 2007
- Thalbah, Hishan. “*Ensiklopedia Mukjizat Al quran dan Hadist*”, Jakarta: Perpustakaan nasional RI, 2009.

- UNFPA, “*Maternal Mortality Update 2004, Delivery Into Good Hands*”, New York, UNFPA; 2004.
- Wahdi, Praptohardjo U. “*Kematian Maternal di RSUP Dr. Kariadi Semarang Tahun 1996 – 1998*”, Semarang: Bagian Kebidanan dan Kandungan FK UNDIP / RSUP Dr. Kariadi., 1999.
- Walvaren G. Telfer M., Rowley J, Ronsmans C. “*Maternal Mortality Inrural Gambia: level, Causes and Contributing Factors*. Bulletin of WHO Vol 78 No. 5. 2000 : 603-613.
- WHO, “*Maternal Mortality in 2000*”, Department of Reproductive Health and Research WHO, 2008.
- _____, “*Reduction of Maternal Mortality*”, Geneva: A Joint WHO/ UNFPA/ UNICEF/World Bank Statement., 1999.
- _____, Depkes RI, FKM UI. “*Modul Safe Motherhood*”, Kerjasama WHO-Depkes RI-FKM UI. 1998.
- Wibowo B, Rachimhadhi T. “*Preeklamsia dan eklamsia*”, Ilmu Kebidanan, edisi ketiga. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka. 1994.
- Winkjosastro, “*Pemeriksaan Kehamilan*”, Majalah Obstetri dan Ginekologi , Vol 18 No.4, Jakarta. 2005.
- Yurisa, Wella. “*Etika Penelitian Kesehatan*”,Riau:Facult Of Medicine University Of Riau. 2008.
- Zaghul An-Najjar. “*Sains Dalam Hadits*” Mengungkap Fakta Ilmiah dari Kemukjizatan Hadits Nabi. 2011.

Tabulasi data kejadian kematian perinatal di RSIA Siti Fatimah Makassar

Periode Januari-Desember 2011

No.	R.medik	Nama	Umur	Paritas	Pem.Antenatal	komplikasi	riwayat penolong
1	060617	Ny''W''	18	I	3 kali	Tidak ada	Tng. professional
2	060695	Ny''F''	21	III	2 kali	Tidak ada	Tng. professional
3	061451	Ny''H''	31	V	1 kali	Tidak ada	Tng. Professional
4	061853	Ny'' S''	32	IV	5 kali	Ada	bukan. Professional
5	061894	Ny'' K''	21	II	4 kali	Tidak ada	Tng. Professional
6	062154	Ny'' H''	36	V	5 kali	Tidak ada	Tng. Professional
7	062246	Ny'' D''	21	III	2 kali	Tidak ada	Tng. Professional
8	062348	Ny''M ''	37	VI	1 kali	Ada	Tng. Professional
9	062349	Ny'' S''	21	IV	3 kali	Tidak ada	Tng. Professional
10	062352	Ny''L ''	22	I	3 kali	Tidak ada	Tng. Professional
11	062361	Ny''S ''	20	III	4 kali	Tidak ada	Tng. Professional
12	062785	Ny''S ''	20	IV	1 kali	Ada	Tng. Professional
13	062905	Ny''M ''	21	II	2 kali	Ada	Tng. Professional
14	062959	Ny''J ''	36	I	3 kali	Tidak ada	bukan. Professional
15	063058	Ny''F ''	23	I	4 kali	Tidak ada	Tng. Professional
16	063138	Ny''K ''	27	V	5 kali	Ada	Tng. professional
17	064028	Ny''N''	21	I	3 kali	Tidak ada	Tng. Professional
18	064304	Ny'' R''	24	I	3 kali	Ada	Tng. Professional
19	064393	Ny''B ''	32	I	4 kali	Tidak ada	Tng. Professional
20	064466	Ny'' S''	33	I	Tidak perenah	Ada	Tng. Professional
21	064654	Ny''F ''	31	I	4 kali	Ada	bukan. Professional
22	064898	Ny''H ''	23	I	4 kali	Tidak ada	Tng. Professional
23	065104	Ny''S ''	35	II	Tdk pernah	Tidak ada	Tng. Professional
24	065149	Ny'' S''	19	I	5 kali	Ada	Tng. Professional
25	065260	Ny''W ''	20	II	4 kali	Tidak ada	Tng. Professional
26	065319	Ny''S ''	27	I	4 kali	Tidak ada	Tng. Professional
27	065421	Ny''W ''	20	I	3 kali	Ada	Tng. Professional
28	065781	Ny'' S''	38	V	4 kali	Tidak ada	Tng. Professional
29	066181	Ny''J ''	23	I	2kali	Tidak ada	Tng. Professional
30	066350	Ny'' N''	36	I	6 kali	Ada	bukan. Professional
31	066110	Ny''M ''	19	III	4 kali	Tidak ada	Tng. professional