

GAMBARAN ANGKA KEJADIAN ATONIA UTERI

DI RSIA SITI FATIMAH MAKASSAR

2011



KARYA TULIS ILMIAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Menyelesaikan Pendidikan

Program DIII Kebidanan UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

SITTI KHADIJAH

70400008025

PRODI KEBIDANAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2011

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka karya tulis ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Juni 2011

Penyusun

Sitti Khadijah
7040008025



HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : SITTI KHADIJAH

Nim : 70400008025

Judul : Gambaran Angka Kejadian Atonia Uteri Di RSIA Siti Fatimah
Makassar Periode Januari 2009- Desember 2010.

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan pada seminar Karya
Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar.

Pembimbing

dr . Rini Fitriani. S.Ked.

NIP. 19800701 200604 2 005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “**Gambaran Angka Kejadian Atonia Uteri Di RSIA Siti Fatimah Makassar**” yang disusun oleh **Sitti Khadijah, NIM: 70400008025**, mahasiswa Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari , jumat 17 juni 2011 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, juni 2011 M
1432 H

DEWAN PENGUJI

Pembimbing :dr.Rini Fitriani,S.Ked (.....)

Penguji I :dr. H.M. Furqaan Naiem, M. Sc., Ph. D (.....)

Penguji II : Drs. Syamsul Bahri,M.Si (.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, pencipta langit dan bumi, semoga rahmat, hidayah, tercurahkan bagi kita semua sehingga segala aktifitas bernilai ibadah disisi Allah SWT. Pada baginda Rasulullah SAW kita haturkan salam dan do'a tercurahkan yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah yang berjudul "**Gambaran Angka Kejadian Atonia Uteri Di RSIA Siti Fatimah Makassar**".

Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis sangat menyadari akan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun merupakan masukan dalam penyempurnaan selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Mengawali ucapan terima kasih ini disampaikan penghargaan yang istimewa kepada ayahanda dan ibunda tercinta Darsis Rauf dan Nursaenab atas segala perhatian, kasih sayang, doa restu serta pengorbanannya yang tak terhingga dan juga kepada adik-adikku Muh.Hasrul, Abd.Haris dan Siti Habrianti.

Begitupula kepada pihak keluarga yang senantiasa memberikan nasehat, doa serta bantuan dalam bentuk apapun semoga keikhlasannya dibalas Allah SWT.

Ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga nilainya juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. DR. Qadir Gassing, HT., M.S. selaku rektor UIN Alauddin Makassar beserta stafnya.
2. Ibu Sitti Saleha S.SiT, SKM.M.Keb. Selaku ketua Prodi yang senantiasa memberikan masukan serta bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini
3. dr. Rini Fitriani, S.Ked, selaku pembimbing KTI yang senantiasa memberikan masukan serta bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
4. Dr.H.Leo Prawirohardjo, Sp. OG(K), M.kes, M.M, PhD selaku Kepala RSIA Siti Fatimah Makassar beserta stafnya yang memberikan izin dalam penelitian hingga akhir.
5. dr. H. M. Furqaan Naiem, M.Sc. Ph.D selaku penguji yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
6. Drs.syamsul Bahri, M.Si selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan dalam mendidik penulis selama pendidikan.
8. Kepada seluruh teman-teman Prodi Kebidanan Angkatan 08 (d'midy) yang telah memberikan dukungan dan saran hingga penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi, materi maupun non materi, penulis ucapkan banyak terima kasih. Semoga mendapat limpahan rahmat dan selalu diberi perlindungan serta kesehatan oleh Allah SWT. Amin... Ya Rabbal 'Alamiin...

Samata-Gowa , Juni 2011



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KTI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Manfaat penulisan.....	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan umum tentang perdarahan post partum.....	6
1. Pengertian	6
2. Prinsip Dasar perdarahan post partum.....	6
3. Pembagian perdarahan post partum.....	7
4. Penyebab perdarahan postpartum.....	7

5. Penilaian Klinik untuk Menentukan Penyebab Perdarahan Post Partum.....	8
6. Penanganan umum perdarahan post partum.....	9
7. Pencegahan perdarahan post partum.....	10
B. Tinjauan umum tentang masa Nifas.....	10
1. Defenisi masa nifas.....	10
2. Tujuan masa Nifas.....	11
3. Peran Dan Tanggung Jawab Bidan Dalam Masa Nifas.....	12
4. Tahap Masa Nifas.....	12
5. Perubahan-perubahan fisiologi yang terjadi pada masa nifas...	13
C. Tinjauan khusus tentang Atonia Uteri.....	21
1. Pengertian Atonia Uteri.....	21
2. Etiologi Atonia Uteri.....	21
3. Tanda dan Gejala Atonia Uteri.....	22
4. Diagnosa Atonia Uteri.....	23
5. Pencegahan Atonia Uteri.....	23
6. Penatalaksanaan Atonia Uteri.....	24
7. Penanganan Atonia Uteri.....	25
D. Tinjauan umum tentang variabel Independen yang diteliti.....	28
1. Usia Ibu.....	28
2. Paritas	28
3. Jarak persalinan.....	29
4. Anemia dalam kehamilan.....	29

E. Tinjauan Islam Tentang Atonia Uteri.....	30
F. Kerangka Konsep.....	33
1. Dasar pemikiran variabel.....	33
2. Kerangka konsep penelitian.....	37
3. Identifikasi Variabel penelitian.....	38
4. Defenisi Operasional Dan Kriteria Objektif.....	38

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu penelitian.....	40
1. Lokasi penelitian.....	40
2. Waktu penelitian.....	41
C. Populasi dan Sampel.....	41
1. Populasi	41
2. Sampel	41
D. Teknik pengambilan Sampel.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Metode Pengelolahan dan analisis data.....	42

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian.....	43
B. Pembahasan	44

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan52

B. Saran52

DAFTAR PUSTAKA54

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Penilaian klinik penyebab perdarahan Postpartum.....	8
Tabel 2.2 Perubahan uterus masa nifas.....	14
Tabel 2.3 Diagnosa Atonia Uteri.....	23
Tabel 4.1 Distribusi frekuensi kejadian atonia uteri berdasarkan usia Ibu di RSIA Siti Fatimah Makassar periode Januari 2009s/d Desember 2010.....	43
Tabel 4.2 Distribusi frekuensi kejadian atonia uteri berdasarkan paritas Ibu di RSIA Siti Fatimah Makassar periode Januari 2009s/d Desember 2010.....	44
Tabel 4.3 Distribusi frekuensi kejadian atonia uteri berdasarkan jarak persalinan Ibu di RSIA Siti Fatimah Makassar periode Januari 2009s/d Desember 2010.....	44
Tabel 4.4 Distribusi frekuensi kejadian atonia uteri berdasarkan anemia dalam kehamilan Ibu di RSIA Siti Fatimah Makassar Periode Januari 2009s/d Desember 2010.....	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Penatalaksanaan Atonia Uteri.....	24
Gambar 2. Kompresi Bimanual Interna (KBI).....	26
Gambar 3. Kompresi bimanual Eksterna (KBE).....	27



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Master Tabel

Lampiran 2. Lembar Kegiatan Konsul

Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Pengambilan Data awal

Lampiran 4. Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 5. Surat telah melakukan penelitian dari RSIA Siti Fatimah Makassar.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Atonia uteri adalah kegagalan serabut-serabut otot miometrium uterus untuk berkontraksi dan memendek. Hal ini merupakan penyebab perdarahan post partum yang paling penting dan biasa terjadi segera setelah bayi lahir hingga 4 jam setelah persalinan. (Nugroho,2010)

WHO (World Health Organisation), pada tahun 2007 berkisar 58.500 ibu meninggal akibat masalah kehamilan dan persalinan, bahkan dari separuh jumlah seluruh kematian terjadi dalam 24 jam setelah melahirkan, yang disebabkan karena perdarahan (40-50%), infeksi (20-30%) dan preklampsia (20-30%). (Ali,2009)

Rawannya kesehatan ibu menurut survey demografi kesehatan Indonesia (2007) ditandai oleh tingginya angka kematian ibu di Indonesia tahun 2007 yaitu 228/100.000 kelahiran hidup . Penyebab utama kematian ibu adalah perdarahan (40-60%), infeksi atau sepsis (20-30%) dan toksemia (20-30%) sisanya sekitar 5 % disebabkan penyakit lainnya yang memburuk resiko kematian ibu seperti umur terlalu muda atau terlalu tua, jumlah anaknya lebih dari 4, jarak antara kelahiran kurang dari 2 tahun. (Depkes RI,2007)

Data untuk provinsi Sulawesi selatan, angka kematian ibu(AKI) dengan perdarahan sebanyak 60 orang (54,11%) pada tahun 2004 sebesar 110 per 100.000 kelahiran hidup. (Profil dinas kesehatan sul-sel)

Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007 jumlah kematian ibu tercatat 143 orang, untuk tahun 2008 jumlah kematian ibu maternal mengalami penurunan menjadi 121 orang dan pada tahun 2009 menurun lagi menjadi 118 orang. Kematian ibu maternal tersebut terdiri dari kematian ibu hamil (19%), kematian ibu bersalin (46%), dan kematian ibu nifas (35 %). (Depkes Sulsel, 2009)

Banyak faktor yang dapat menyebabkan atonia uteri, diantaranya umur ibu, paritas, jarak kehamilan, overdistensi uteri dan anemia dalam kehamilan. Umur yang beresiko terjadinya atonia uteri yaitu < 20 tahun dan > 35 tahun. Selain itu umumnya kejadian atonia uteri meningkat dengan meningkatnya paritas ibu. Untuk jarak kehamilan apabila terlalu pendek atau kurang dari 24 bulan akan sangat berbahaya, karena uterus terutama endometrium belum kembali ke kondisi sebelumnya sehingga pada saat persalinan dapat terjadi atonia uteri. (Wiknjastro,2007)

Rumah sakit ibu dan anak Siti Fatimah adalah rumah sakit yang melayani rawat jalan dan rawat inap. Rawat inap khususnya melayani ibu bersalin dan lain-lain. Ibu bersalin biasanya ditolong oleh dokter dan bidan dengan mengantisipasi segala komplikasi yang mungkin terjadi. Apabila terjadi komplikasi dapat ditangani sesuai dengan protap yang ada, jika

tidak dapat ditangani maka pasien dirujuk ke rumah sakit yang lebih memadai.

Data yang diperoleh di RSIA SITI FATIMAH, jumlah ibu yang bersalin pada tahun 2007 sebanyak 2.827 orang dan yang mengalami perdarahan post partum karena atonia Uteri adalah sebanyak 42 orang.

Perdarahan post partum utamanya karena atonia uteri merupakan masalah penting yang erat hubungannya dengan masalah mortalitas maternal, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Gambaran Angka Kejadian Atonia Uteri Di RSIA Siti Fatimah Makassar “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan mengacu pada tujuan yang akan dicapai pada penelitian, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambaran angka kejadian atonia uteri menurut umur ibu
2. Bagaimana Gambaran angka kejadian atonia uteri menurut paritas ibu
3. Bagaimana Gambaran angka kejadian atonia uteri menurut jarak persalinan ibu
4. Bagaimana gambaran angka kejadian atonia uteri menurut anemia dalam kehamilan ibu

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk memperoleh gambaran angka kejadian Atonia Uteri Di RSIA Siti Fatimah Makassar periode Januari 2009- Desember 2010.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk memperoleh gambaran angka kejadian atonia uteri menurut umur ibu
- b. Untuk memperoleh gambaran angka kejadian atonia uteri menurut paritas ibu
- c. Untuk memperoleh gambaran angka kejadian atonia uteri menurut jarak persalinan ibu
- d. Untuk memperoleh gambaran angka kejadian atonia uteri menurut anemia dalam kehamilan ibu.

D. Manfaat penulisan

Adapun manfaat penulisan pada kasus tersebut diatas adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, pengetahuan Ibu tentang atonia uteri bertambah khususnya di RSIA Siti Fatimah Makassar.

2. Manfaat Praktisi

Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir jenjang diploma III kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Manfaat ilmiah

Sebagai bahan acuan/pedoman bagi institusi jurusan kebidanan untuk penulisan karya tulis ilmiah selanjutnya.

4. Manfaat komunitas

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi secara umum pada masyarakat maupun tenaga kesehatan untuk mencegah terjadinya Atonia Uteri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Perdarahan Post Partum

1. Pengertian

Perdarahan post partum adalah kehilangan darah lebih dari 500 ml melalui jalan lahir yang terjadi selama atau setelah persalinan kala III. (Anggraini,2010)

Perdarahan post partum adalah perdarahan yang terjadi setelah anak lahir melebihi 500 ml. (Sarwono,2007)

Perdarahan post partum adalah perdarahan yang terjadi lebih dari 500-600 ml dalam masa 24 jam setelah anak lahir. (Ambarwati,2009)

2. Prinsip Dasar perdarahan post partum

Periode pascapersalinan, sulit untuk menentukan terminology berdasarkan batasan kala persalinan yang terdiri dari 1 hingga 4 kala. Defenisi perdarahan pasca persalinan adalah perdarahan yang melebihi 500 ml. kondisi dalam persalinan menyebabkan kesulitan untuk menentukan jumlah perdarahan yang terjadi karena tercampur dengan air ketuban dan serapan pakaian atau kain alas tidur.

Oleh sebab itu, maka batasan operasional untuk periode pasca persalinan adalah setelah bayi lahir. Sedangkan tentang jumlah perdarahan , disebutkan sebagai perdarahan yang lebih dari normal dimana telah menyebabkan perubahan tanda vital (pasien mengeluh

lemah, limbung, berkeringat dingin, menggigil, hiperpnea, sistolik < 90 mmhg, nadi > 100 x/I , kadar HB < 8 gr %). (Saifuddin,2006)

3. Pembagian perdarahan post partum

Perdarahan pasca persalinan dibagi menjadi perdarahan pasca persalinan primer dan sekunder :

- a. Perdarahan pasca persalinan primer (Early Post Partum haemorrhage, atau perdarahan pasca persalinan segera) adalah, perdarahan pasca persalinan primer terjadi dalam 24 jam pertama.
- b. Perdarahan pasca persalinan sekunder (Late Postpartum Haemorrhagea, atau perdarahan pasca persalinan lambat) adalah perdarahan pasca persalinan sekunder terjadi setelah 24 jam pertama. (Anggraini,2010)

4. Penyebab perdarahan postpartum

- a. Perdarahan postpartum primer (dini)
 - 1) Atonia uteri
 - 2) Retensio plasenta
 - 3) Plasenta rest
 - 4) Trauma persalinan : rupture uteri dan hematoma
 - 5) Gangguan pembekuan darah.

b. Perdarahan postpartum sekunder (lambat)

- 1) Plasenta rest dan tertinggalnya selaput ketuban
- 2) Trauma persalinan, bekas SC-pembuluh darah terbuka.
- 3) Infeksi. (Manuaba,2001)

5. Penilaian Klinik untuk Menentukan Penyebab Perdarahan Post Partum

Tabel 2.1
Penilaian klinik penyebab perdarahan post partum

Gejala dan Tanda yang selalu ada	Gejala dan tanda yang kadang-kadang ada	Diagnosis Kemungkinan
<ul style="list-style-type: none">• Uterus tidak berkontraksi dan lembek.• Perdarahan segera setelah anak lahir	<ul style="list-style-type: none">• Syok	Atonia uteri
<ul style="list-style-type: none">• Perdarahan segera• Darah segar mengalir segera setelah bayi lahir• Uterus berkontraksi baik• Plasenta lengkap	<ul style="list-style-type: none">• Pucat• Lemah• Menggigil	Robekan jalan lahir
<ul style="list-style-type: none">• Plasenta belum lahir setelah 30 menit• Perdarahan segera• Uterus berkontraksi baik	<ul style="list-style-type: none">• Tali pusat putus akibat traksi berlebihan• Inversio uteri akibat tarikan• Perdarahan lanjutan	Retensio plasenta

<ul style="list-style-type: none"> • Plasenta atau sebagian selaput tidak lengkap • Perdarahan segera 	<ul style="list-style-type: none"> • Uterus berkontraksi tetapi tinggi fundus tidak berkurang 	Retensi sisa plasenta
<ul style="list-style-type: none"> • Uterus tidak teraba • Lumen vagina terisi massa • Tampak tali pusat (bila plasenta belum lahir) • Perdarahan segera 	<ul style="list-style-type: none"> • Neurogenik syok • Pucat dan limbung 	Inversio uteri
<ul style="list-style-type: none"> • Sub-involusi uterus • Nyeri tekan perut bawah dan pada uterus • Perdarahan sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> • Anemia • Demam 	Endometritis atau sisa fragmen plasenta (terinfeksi atau tidak)

(Sumber :Saifuddin,2002)

6. Penanganan umum perdarahan post partum

- Mintalah bantuan secepatnya, mobilisasi seluruh tenaga yang ada dan siapkan fasilitas tindakan darurat.
- Lakukan pemeriksaan secara cepat pada keadaan umum ibu termasuk tanda vital (tekanan, nadi, suhu, dan pernapasan)
- Jika dicurigai adanya syok, segera lakukan tindakan penanganan syok

- d. Pastikan bahwa kontraksi uterus baik:
- 1) Lakukan pijatan uterus.
 - 2) Mengeluarkan bekuan darah, bekuan darah yang terperangkap di uterus akan menghalangi kontraksi uterus yang efektif.
 - 3) Berikan suntikan 10 unit oksitosin i.m
- e. Pasang infus cairan
- f. Lakukan kateterisasi dan pantau cairan keluar masuk
- g. Periksa kelengkapan plasenta
- h. Periksa kemungkinan robekan serviks, vagina dan perineum.
- i. Jika perdarahan terus berlangsung lakukan uji beku darah
- j. Setelah perdarahan teratasi (24 jam setelah perdarahan berhenti), periksa kadar Hemoglobin. (Saifuddin,2002)

7. Pencegahan perdarahan post partum

Cara yang terbaik untuk perdarahan post partum adalah memimpin kala II dan kala III persalinan secara lege artis. Apabila persalinan diawasi oleh seorang dokter spesialis obstetric-ginekologi ada yang menganjurkan untuk memberikan suntikan ergometrik secara intravena setelah anak lahir, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah perdarahan yang terjadi. (Manuaba,2003)

B. Tinjauan Umum Tentang Masa Nifas

1. Definisi masa nifas

Masa nifas (puerperim) dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung lama kira-kira 6 minggu. (Saifuddin,2002)

Masa puerperium atau masa nifas mulai setelah partus selesai dan berakhir setelah kira-kira 6 minggu. Akan tetapi, seluruh alat genitalia akan pulih kembali seperti sebelum ada kehamilan dalam waktu 3 bulan. (Winkjosastro,2007)

Masa nifas (puerperium) dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Wanita yang melalui periode puerperium disebut (puerpura) . puerperium berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari, merupakan waktu yang diperlukan untuk pulihnya kembali alat kandungan pada keadaan yang normal. (Ambarwati,2009)

2. Tujuan masa Nifas

Tujuan dari pemberian asuhan kebidanan pada masa Nifas adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik fisik maupun psikologisnya.
- b. Mendeteksi masalah, megobati, dan merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu maupun bayinya.

- c. Memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, KB, cara dan manfaat menyusui, imunisasi, serta perawatan bayi sehari-hari.
- d. Memberikan pelayanan KB. (Saleha,2009)

3. Peran Dan Tanggung Jawab Bidan Dalam Masa Nifas

- a. Mendeteksi komplikasi dan perlunya rujukan
- b. Memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara mencegah perdarahan, mengenali tanda-tanda bahaya, menjaga gizi, serta mempraktekkan kebersihan yang aman.
- c. Memfasilitasi hubungan dan ikatan batin antara ibu dan bayi.
- d. Memulai dan mendorong pemberian ASI . (Ambarwati,2009)

4. Tahap Masa Nifas

Nifas dibagi menjadi 3 tahap :

- a. Periode immediate postpartum

Masa segera setelah plasenta lahir sampai dengan 24 jam.

Pada masa ini sering terdapat banyak masalah, misalnya perdarahan karena atonia uteri. Oleh karena itu, bidan dengan teratur harus melakukan pemeriksaan kontraksi uterus, pengeluaran lochia, tekanan darah, dan suhu.

- b. Periode early postpartum (24 jam -1 minggu)

Periode fase ini bidan memastikan involusio uteri dalam keadaan normal, tidak ada perdarahan, lochia tidak berbau busuk,

tidak demam, ibu cukup mendapatkan makanan dan cairan , serta ibu dapat menyusui dengan baik.

c. Periode late postpartum(1 minggu- 5 minggu)

Pada periode ini bidan tetap melakukan perawatan dan pemeriksaan sehari-hari serta konseling KB. (Saleha,2009)

5. Perubahan-perubahan fisiologi yang terjadi pada masa nifas

a. Lochia

Lochia adalah ekskresi cairan rahim selama masa nifas

1) *Lochia rubra/mera (cruenta)*

Lochia ini muncul pada hari 1 sampai hari ke-4 masa postpartum.cairan yang keluar berwarna merah karena berisi darah segar, jaringan sisa-sisa plasenta, dinding rahim, lemak bayi, lanugo (rambut bayi) dan mekonium.

2) *Lochia sanguinolenta*

Cairan yang keluar berwarna merah kecoklatan dan berlendir. Berlangsung dari hari ke-4 sampai hari ke-7 postpartum.

3) *Lochia serosa*

Lochia ini berwarna kuning kecoklatan karena mengandung serum, leukosit dan robekan/laserasi plasenta. Muncul pada hari ke-7 sampai hari ke-14.

4) *Lochia alba/putih*

Mengandung leukosit, sel desidua, sel epitel, selaput lendir serviks dan serabut jaringan yang mati. Lokia alba bisa

berlangsung selama 2 sampai 6 minggu postpartum.

(Ambarwati,2009)

b. Involusio

Involusio atau pengerutan uterus merupakan suatu proses dimana uterus kembali ke kondisi sebelum hamil dengan berat sekitar 60 gram. Proses ini dimulai segera setelah plasenta lahir akibat kontraksi otot-otot polos uterus.

Tabel 2.2

Perubahan uterus masa nifas

Involusio Uteri	Tinggi Fundus Uteri	Berat Uterus	Diameter Uterus	Palpasi Cervik
Plasenta lahir	Setinggi pusat	1000 gr	12,5 cm	Lembut/ Lunak
7hari (minggu 1)	Pertengahan antara pusat dan symphisis	500 gr	7,5 cm	2 cm
14hari (minggu 2)	Tidak Teraba	350 gr	5 cm	1 cm
6 minggu	Normal	60 gr	2,5	Menyempit

Sumber : (Ambarwati,2009)

c. Endometrium

Perubahan pada endometrium adalah timbulnya thrombosis, degenerasi, dan nekrosis di tempat implantasi plasenta. Pada hari pertama tebal endometrium 2,5 mm, mempunyai permukaan yang kasar akibat pelepasan desidua, dan selaput janin. Setelah 3 hari mulai rata, sehingga tidak ada pembentukan jaringan parut pada bekas implantasi plasenta.

d. Serviks

Setelah berakhirnya kala IV, serviks menjadi sangat lembek, kendur, dan terkulai. Serviks tersebut bisa melepuh dan lecet, terutama di bagian anterior. Serviks akan terlihat padat yang mencerminkan vaskularitasnya yang tinggi, lubang serviks lambat laun mengecil, beberapa hari setelah persalinan dini retak karena robekan dalam persalinan. Rongga leher serviks bagian luar akan membentuk seperti keadaan sebelum hamil pada saat empat minggu postpartum.

e. Vagina

Vagina dan lubang vagina pada permulaan puerperium merupakan suatu saluran yang luas berdinding tipis. Secara berangsur-angsur luasnya berkurang, tetapi jarang sekali kembali seperti ukuran seorang nulipara. Rugae timbul kembali pada minggu ketiga. Hymen tampak sebagai tonjolan jaringan yang

kecil, yang dalam proses pembentukan berubah menjadi karunkulae mitiformis yang khas bagi wanita multipara.

f. Laktasi

Selama 9 bulan kehamilan, jaringan payudara tumbuh dan menyiapkan fungsinya untuk menyediakan makanan bagi bayi baru lahir. Setelah melahirkan, ketika hormon yang dihasilkan makanan bagi bayi baru lahir. Setelah melahirkan, ketika hormon yang dihasilkan plasenta tidak lagi ada untuk menghambatnya kelenjar yang ada di otak mengeluarkan prolaktin (hormon laktogenik) sampai hari ketiga setelah melahirkan terbukti dengan adanya efek prolaktin pada payudara pembuluh dalam payudara menjadi bengkak dan terisi darah, menyebabkan hangat, dan rasa sakit. Sel-sel yang menghasilkan ASI mulai mencapai puting melalui saluran susu, menggantikan colostrum yang telah mendahuluinya kemudian laktasi dimulai.

g. Sistem pencernaan

Seorang wanita dapat merasa lapar dan siap menyantap makanannya 2 jam setelah persalinan. Kalsium amat penting untuk gigi pada kehamilan dan masa nifas, dimana pada masa ini terjadi penurunan konsentrasi ion kalsium karena meningkatnya kebutuhan ion kalsium pada ibu, terutama pada bayi yang dikandungnya untuk proses pertumbuhan janin juga pada ibu dalam masa laktasi.

Ibu nifas terutama yang partus lama dan terlantar mudah ileus paralitikus, yaitu adanya obstruksi usus akibat tidak adanya peristaltik usus. Penyebabnya adalah penekanan buah dada dalam kehamilan dan partus lama, sehingga membatasi gerak peristaltik usus, serta bisa terjadi karena pengaruh psikis takut BAB karena ada luka jahitan perineum. (Saleha,2009)

h. Sistem perkemihan

Kandung kemih dalam *puerperium* sangat kurang sensitif dan kapasitasnya bertambah, sehingga kandung kemih penuh atau sesudah buang air kecil masih tertinggal urin residual (normal ± 150 cc). sisa urine dan trauma pada kandung kencing waktu persalinan memudahkan terjadinya infeksi. urine biasanya berlebihan (poliurea) antara hari kedua dan keliam, hal ini disebabkan karena kelebihan cairan sebagai akibat retensi air dalam kehamilan dan sekarang dikeluarkan.

i. Sistem muskuloskeletal

Ligament, fasia, dan diafragma pelvis yang meregang pada waktu persalinan, setelah lahir, secara berangsur-angsur menjadi ciut dan pulih kembali sehingga tidak jarang uterus jatuh kebelakang dan menjadi retrofleksi, karena ligament rotundum menjadi kendur. Stabilisasi secara sempurna terjadi pada 6-8 minggu setelah persalinan. Sebagai akibat putusannya serat-serat elastik kulit dan distensi yang berlangsung lama akibat besarnya

uterus pada saat hamil, dinding abdomen masih lunak dan kendur untuk sementara waktu.

j. Perubahan tanda-tanda vital

1) Suhu Badan

Suhu badan postpartum suhu badan akan naik sedikit ($37,5^{\circ}\text{C}$ - 38°C) sebagai akibat kerja keras waktu melahirkan, kehilangan cairan dan kelelahan, apabila normal suhu badan akan naik lagi karena ada pembentukan ASI, buah dada menjadi bengkak, berwarna merah karena banyaknya ASI bila tidak turun kemungkinan adanya infeksi pada endometrium, mastitis, traktus urogenitalis atau sistem lain. Kita anggap nifas terganggu kalau ada demam lebih dari 38°C pada 2 hari berturut-turut pada 10 hari yang pertama postpartum, kecuali hari pertama dan suhu harus diambil sekurang-kurangnya 4 kali sehari.

2) Nadi

Denyut nadi normal pada orang dewasa 60-80 kali permenit. Sehabis melahirkan biasanya denyut nadi itu akan lebih cepat setiap denyut nadi yang melebihi 100 adalah abnormal dan hal ini mungkin disebabkan oleh infeksi atau perdarahan postpartum yang tertunda.

3) Tekanan Darah

Biasanya tidak berubah, kemungkinan tekanan darah akan rendah setelah ibu melahirkan karena ada perdarahan. Tekanan darah tinggi pada postpartum dapat menandakan terjadinya pre-eklamsi postpartum.

4) Pernafasan

Keadaan pernafasan selalu berhubungan dengan keadaan suhu dan denyut nadi. Apabila suhu dan denyut nadi tidak normal pernafasan juga akan mengikutinya kecuali ada gangguan khusus pada saluran pernafasan. (Ambarwati,2009)

k. Sistem hematologi dan kardiovaskuler

Leukositosis adalah meningkatnya jumlah sel-sel darah putih sampai sebanyak 15.000 selama masa persalinan. Leukosit akan tetap tinggi jumlahnya selama beberapa hari pertama masa post partum. Jumlah sel-sel darah putih tersebut masih bisa naik lebih tinggi lagi hingga 25.000 – 30.000 tanpa adanya kondisi patologis jika wanita tersebut mengalami persalinan normal. Akan tetapi, berbagai jenis kemungkinan infeksi harus dikesampingkan pada penemuan semacam itu. Jumlah hemoglobin dan hematokrit serta eritrosit akan sangat bervariasi pada awal-awal masa nifas sebagai akibat dari volume darah, volume plasma, dan volume sel darah yang berubah-ubah. Sering dikatakan bahwa jika hematokrit

pada hari pertama atau kedua lebih rendah dari titik 2% atau lebih tinggi daripada saat memasuki persalinan awal, maka klien dianggap kehilangan darah yang cukup banyak. Titik 2% tersebut kurang lebih sama dengan kehilangan 500 ml. Biasanya terdapat suatu penurunan besar kurang lebih 1500 ml dalam jumlah darah keseluruhan selama kelahiran dan masa nifas. Rincian jumlah darah yang terbuang pada klien ini kira-kira 200 sampai 500 ml hilang selama masa persalinan, 500 sampai 800 ml hilang selama minggu pertama postpartum dan terakhir 500 ml selama sisa masa nifas. (Saleha,2009)

1. Adaptasi psikologis postpartum

Menurut Reva Rubin terjadi pada tiga tahap berikut ini.

a. *Taking in period*

Terjadi pada 1-2 hari setelah persalinan, ibu masih pasif dan sangat bergantung pada orang lain, fokus perhatian terhadap tubuhnya ibu lebih mengingat pengalaman melahirkan dan persalinan yang dialami, serta kebutuhan tidur dan nafsu makan meningkat.

b. *Taking hold period*

Berlangsung 3-4 hari postpartum, ibu lebih berkonsentrasi pada kemampuannya dalam menerima tanggung jawab sepenuhnya terhadap perawatan bayi. Pada masa ini ibu menjadi sangat

sensitif, sehingga membutuhkan bimbingan dan dorongan perawat untuk mengatasi kritikan yang dialami ibu.

c. *Letting go period*

Dialami setelah tiba ibu dan bayi di rumah. Ibu mulai secara penuh menerima tanggung jawab sebagai “seorang ibu” dan menyadari atau merasa kebutuhan bayi sangat bergantung pada dirinya. (Saleha,2009)

C. Tinjauan Khusus Tentang Atonia Uteri

1. Pengertian Atonia Uteri

Atonia uteri adalah kegagalan serabu-serabut otot miometrium uterus untuk berkontraksi dan memendek. Hal ini merupakan penyebab perdarahan post partum yang paling penting dan biasa terjadi setelah bayi lahir hingga 4 jam setelah persalinan. (Taufan,2010)

Atonia uteri adalah gagalnya uterus berkontraksi dengan baik setelah persalinan. (Anggraini,2010)

Atonia uteri adalah ketidakmampuan otot rahim untuk berkontraksi sehingga tidak mampu menutup pembuluh darah yang terdapat pada tempat implantasi plasenta. (Manuaba,2003)

2. Etiologi Atonia Uteri

a. Overdistention uterus seperti:

- 1) Gemelli.
- 2) Polihidramnion.
- 3) Paritas tinggi.

- b. Umur yang terlalu muda atau terlalu tua
- c. Multipara dengan jarak keahiran pendek
- d. Partus lama / partus terlantar
- e. Faktor-faktor social ekonomi dan Malnutrisi
- f. Dapat juga karena salah penanganan dalam usaha melahirkan plasenta, sedangkan sebenarnya belum terlepas dari uterus.(Hidayat,2009)

3. Tanda dan Gejala Atonia uteri

- a. Perdarahan segera setelah anak lahir

Perdarahan yang terjadi pada kasus atonia uteri sangat banyak dan darah tidak merembes. Yang sering terjadi adalah keluar disertai gumpalan, hal ini terjadi karena trombiplastin sudah tidak mampu lagi sebagai pembeku darah.

- b. Uterus tidak berkontraksi dan lembek

Gejala ini merupakan gejala terpenting atau khas pada atonia uteri dan yang membedakan atonia uteri dengan penyebab perdarahan lainnya.

- c. Terdapat tanda-tanda Syok

Tekanan darah rendah, denyut nadi cepat dan kecil, ekstremitas dingin, gelisah, mual dan lain-lain. (Anggraini,2010)

4. Diagnosa Atonia Uteri

Tabel 2.3
Diagnosa Atonia Uteri

Gejala dan tanda yang selalu ada	Gejala dan tanda yang kadang ada	Diagnosa kemungkinan
a. Uterus tidak berkontraksi dan lembek b. Perdarahan segerah setelah anak lahir	Syok	Atonia uteri


(Sumber: Saifuddin,2002)

5. Pencegahan Atonia uteri

Sebagian besar kematian ibu di Indonesia di sebabkan oleh perdarahan post partum yang timbul dari atonia uteri dan resensio plasenta. Kondisi-kondisi ini sering terdapat dicegah dengan melakukan penatalaksanaan aktif kala III. Manajemen aktif kala tiga terdiri dari tiga langkah utama.

- a. Pemberian suntikan oksitosin
- b. Melakukan peregang tali pusat terkendali
- c. Masase fundus uteri. (Ali,2009)

6. Penatalaksanaan Atonia Uteri



(Gambar 2.1. Penatalaksanaan Atonia Uteri)

(Sumber : Saifuddin,2002)

7. Penanganan Atonia uteri


Jika selama 15 menit uterus tidak berkontraksi setelah dilakukannya masase fundus uteri, maka lakukan kompresi bimanual terbagi atas tiga jenis, dimana dilakukan secara bertahap yaitu:

a. Kompresi bimanual interna (KBI)

- 1) Pakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi atau steril, dengan lembut, dan masukkan tangan secara obstetrik kedalam lumen vagina.
- 2) Periksa vagina dan serviks .jika ada selaput ketuban atau bekuan darah pada kavum uteri mungkin uterus tidak dapat berkontraksi secara penuh.
- 3) Letakkan kepalan tangan pada forniks anterior, tekan dinding anterior uterus, sedangkan telapak tangan lain letak pada abdomen, menekan kuat pada dinding belakang uterus ke arah kepalan tangan dalam.
- 4) Tekan uterus dengan kedua tangan dengan kuat. Kompresi uterus ini memberikan tekanan langsung pada pembuluh darah didalam dinding uterus dan juga merangsang miometrium untuk berkontraksi.
- 5) Evaluasi Kebersihan

Jika uterus berkontraksi dan perdarahan berkurang, teruskan melakukan KBI selama dua menit, kemudian

perlahan-lahan keluarkan tangan didalam vagina. Pantau kondisi ibu secara melekat selama kala empat.



(Gambar 2.2 Kompresi bimanual interna (KBI))

(Sumber : Anonim,2010)

b. Kompresi bimanual eksterna

- 1) Letakkan satu tangan pada abdomen didepan uterus, tepat pada atas simfisis pubis.
- 2) Letakkan tangan yang lain di dinding abdomen (belakang korpus uteri) usahakan memegang bagian belakang uterus seluas mungkin.
- 3) Lakukan gerakan saling merapatkan kedua tangan untuk malakukan kompresi pembuluh darah didinding uterus dengan cara menekan uterus diantara kedua tangan tersebut ini akan membantu uterus berkontraksi dan menekan pembuluh darah uterus.



(Gambar 2.3 Kompresi bimanual eksterna (KBE))

(Sumber : Anonim,2010)

c. Kompresi Aorta Abdominalis

Raba arteri femoralis dengan ujung jari tangan kiri, kepalkan tangan kemudian tekan pada umbilicus tegak lurus dengan sumber badan, sehingga mencapai tekanan vertebralis. arteri femoralis.

Jika perdarahan masih berlanjut:

- 1) Lakukan ligasi arteri uterine dan utero-ovarik
- 2) Jika perdarahan masih terus banyak, lakukan histerotomi supravagina. (Saifuddin,2006)

D. Tinjauan umum tentang variabel Independen yang diteliti

1. Usia ibu

Wanita yang melahirkan anak pada usia dibawah 20 tahun atau lebih dari 35 tahun merupakan faktor risiko terjadinya perdarahan

pascapersalinan yang dapat mengakibatkan kematian maternal. Hal ini dikarenakan pada usia dibawah 20 tahun fungsi reproduksi seorang wanita belum berkembang dengan sempurna, sedangkan pada usia diatas 35 tahun fungsi reproduksi seorang wanita sudah mengalami penurunan dibandingkan fungsi reproduksi normal sehingga kemungkinan untuk terjadinya komplikasi pascapersalinan terutama perdarahan akan lebih besar. Perdarahan pascapersalinan yang mengakibatkan kematian maternal pada wanita hamil yang melahirkan pada usia dibawah 20 tahun 2-5 kali lebih tinggi dari pada perdarahan pascapersalinan yang terjadi pada usia 20-29 tahun. Perdarahan pascapersalinan meningkat kembali setelah usia 30-35 tahun.

2. Paritas

Paritas 2-3 merupakan paritas paling aman ditinjau dari sudut perdarahan pascapersalinan yang dapat mengakibatkan kematian maternal. Paritas satu dan paritas tinggi (lebih dari tiga) mempunyai angka kejadian perdarahan pascapersalinan lebih tinggi. Pada paritas yang rendah (paritas satu), ketidaksiapan ibu dalam menghadapi persalinan yang pertama merupakan faktor penyebab ketidakmampuan ibu hamil dalam menangani komplikasi yang terjadi selama kehamilan, persalinan dan nifas. Sedangkan parietas yang tinggi akan menyebabkan otot-otot Uterus sudah tidak mampu untuk berkontraksi karena uterus yang sudah meregang.

(Faisal,2010)

3. Jarak persalinan

Jarak ideal persalinan sekurang-kurangnya 2 tahun. Proporsi kematian terbanyak terjadi pada ibu 1-3 anak dan jika dilihat menurut jarak kehamilannya ternyata jarak kurang dari dua tahun menunjukkan proporsi kematian maternal lebih banyak. Jarak persalinan yang terlalu dekat menyebabkan ibu mempunyai waktu singkat untuk memulihkan kondisi rahimnya agar bisa kembali ke kondisi sebelumnya. Pada ibu yang bersalin dengan jarak yang terlalu dekat beresiko terjadi perdarahan pasca persalinan seperti Atonia Uteri. (Hamidah,2009)

4. Anemia dalam kehamilan.

Kondisi ibu dengan kadar haemoglobin dibawah 12gr% pada trimester 1 dan 3 atau kadar haemoglobin kurang dari 10,5 gr% pada trimester 2. Pada saat hamil, bila terjadi anemia dan tidak tertangani hingga akhir kehamilan maka akan berpengaruh pada saat postpartum. Pada ibu dengan anemia, saat postpartum akan mengalami atonia uteri. Hal ini disebabkan karena oksigen yang dikirim ke uterus kurang. Jumlah oksigen dalam darah yang kurang menyebabkan otot-otot uterus tidak berkontraksi dengan adekuat sehingga timbul atonia uteri yang mengakibatkan perdarahan banyak.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Ibu yang anemia selama hamil, 45,5% mengalami perdarahan post partum karena atonia uteri. (Wuryanti,2010)

E. Tinjauan Islam tentang Atonia uteri

Persalinan adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi melalui jalan lahir. Pada proses ini memungkinkan terjadinya komplikasi-komplikasi yang akan membahayakan nyawa seseorang wanita yang bisa menimbulkan kematian. Allah berfirman dalam Q.S Al Faathir (35) : 11 :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah Kemudian dari air mani, Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah”.

Dari ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa apapun yang dikehendaki oleh Allah SWT pasti akan terjadi, namun dalam hal ini harus ada ikhtiar agar supaya tidak terjadi sesuatu diluar kemampuan kita diluar perintahnya dan menjauhi larangan-Nya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi ibu dalam keadaan post partum agar masa nifas berjalan dengan baik dan tidak ada komplikasi yang menyertai, dalam hal ini sebaiknya ibu memperhatikan hal-hal yang dapat mengganggu kesehatannya seperti halnya makan-makanan yang bergizi, menjaga

personal hygiene agar tidak terjadi infeksi, menyusui bayinya dengan baik.

Untuk itu ibu harus tahu larangan-larangan dalam masa nifas.

Larangan – larangan dalam masa nifas adalah :

1. Mengerjakan sholat baik fardhu maupun sunnah
2. Membaca, menyentuh, atau membawa al-Quran
3. Berdiam dalam mesjid
4. Puasa, baik yang fardhu maupun yang sunnah
5. Bercampur dengan suami

Larangan bercampur antara suami dan istri selama istri sedang dalam masa nifas . Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah Q.S AL-Baqarah (2): 222.

وَدَسَّؤُنَاكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ
حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.

Larangan sanggama atau berhubungan intim selama masa nifas karena akan menghambat proses penyembuhan jalan lahir maupun involusi rahim, yakni mengecilnya rahim kembali ke bentuk dan ukuran semula, dan akan menyebabkan infeksi atau malah perdarahan. Darah nifas adalah suatu kotoran atau darah kotor yang banyak mengandung bibit penyakit dan apabila suami istri melakukan hubungan seks darah kotor yang tadinya akan keluar akan terhambat dan akan menyebabkan penyakit.

Sakit yang menimpa seorang hamba sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Dia-lah yang mampu mengangkat penyakit itu. Semua dari Allah segala cobaan, maka hanya dari Allah jualah segala kesembuhan.

Sebagaimana firman-Nya ,yang tercantum dalam Qs. As-Syua'ra (26) : 80

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Terjemahnya :

ALAUDDIN

MAKASSAR

“Dan Apabila aku sakit, Dia-lah Yang menyembuhkan aku”

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa semua penyakit yang diberikan kepada kita datangnya dari Allah dan Allah jugalah yang akan menyembuhkannya maka dari itu Kita harus berdoa dengan merendahkan diri di hadapan-Nya semoga Dia memberi kesembuhan dan mengangkat penyakit yang kita derita.

F. Kerangka Konsep

1. Dasar Pemikiran Variabel

Atonia uteri adalah kegagalan serabu-serabut otot miometrium uterus untuk berkontraksi dan memendek. Hal ini merupakan penyebab perdarah post partum yang paling penting dan biasa terjadi setelah bayi lahir hingga 4 jam setelah persalinan. (Taufan,2010)

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya attonia uteri antara lain dari factor individu, sesuai dengan tujuan penelitian yang membatasi factor-faktornya sebagai berikut : Usia Ibu, Paritas, Jarak persalinan dan Anemia dalam kehamilan.

1. Usia

Usia adalah lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan). Wanita yang melahirkan anak pada usia dibawah 20 tahun atau lebih dari 35 tahun merupakan faktor risiko terjadinya perdarahan pascapersalinan yang dapat mengakibatkan kematian maternal. Hal ini dikarenakan pada usia dibawah 20 tahun fungsi reproduksi seorang wanita belum berkembang dengan sempurna, sedangkan pada usia diatas 35 tahun fungsi reproduksi seorang wanita sudah mengalami penurunan dibandingkan fungsi reproduksi normal sehingga kemungkinan untuk terjadinya komplikasi pascapersalinan terutama perdarahan akan lebih besar. Perdarahan pascapersalinan yang mengakibatkan kematian maternal pada wanita hamil yang melahirkan pada usia dibawah 20 tahun 2-5 kali lebih tinggi dari pada perdarahan

pascapersalinan yang terjadi pada usia 20-29 tahun. Perdarahan pascapersalinan meningkat kembali setelah usia 30-35 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian dari literatur yang ada bahwa yang mengalami atonia uteri terdapat (31.4%) yang berusia < 20 tahun dan > 35 tahun, dan (68.6%) yang berusia 20-35 tahun. (Andriani,2009)

2. Paritas

Paritas adalah banyak kelahiran yang dialami oleh seorang wanita atau banyaknya anak yang dilahirkan. Paritas 2-3 merupakan paritas paling aman ditinjau dari sudut perdarahan pascapersalinan yang dapat mengakibatkan kematian maternal. Paritas satu dan paritas tinggi (lebih dari tiga) mempunyai angka kejadian perdarahan pascapersalinan lebih tinggi. Pada paritas yang rendah (paritas satu), ketidaksiapan ibu dalam menghadapi persalinan yang pertama merupakan faktor penyebab ketidakmampuan ibu hamil dalam menangani komplikasi yang terjadi selama kehamilan, persalinan dan nifas. Sedangkan paritas yang tinggi akan menyebabkan otot-otot Uterus sudah tidak mampu untuk berkontraksi karena uterus yang sudah meregang. (Faisal,2010)

Berdasarkan hasil penelitian dari literatur yang ada bahwa yang mengalami atonia uteri terdapat (51.4%) yang paritasnya ≤ 3 dan (48.6%) yang berparitas >3 . (Andriani,2009)

3. Jarak persalinan

Jarak persalinan adalah suatu pertimbangan untuk menentukan persalinan yang pertama dengan persalinan berikutnya. Jarak ideal persalinan sekurang-kurangnya 2 tahun. Proporsi kematian terbanyak terjadi pada ibu 1-3 anak dan jika dilihat menurut jarak kehamilannya ternyata jarak kurang dari dua tahun menunjukkan proporsi kematian maternal lebih banyak. Jarak persalinan yang terlalu dekat menyebabkan ibu mempunyai waktu singkat untuk memulihkan kondisi rahimnya agar bias kembali ke kondisi sebelumnya. Pada ibu yang bersalin dengan jarak yang terlalu dekat beresiko terjadi perdarahan pasca persalinan seperti Atonia Uteri. (Hamidah,2009)

Berdasarkan hasil penelitian dari literatur yang ada bahwa dari 36 ibu yang mengalami atonia uteri terdapat 66,7% yang jarak persalinannya < 2 tahun dan 33,3% yang jarak kelahirannya > 2 tahun. (Suryani,2008)


4. Anemia dalam kehamilan

Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin (Hb) dalam darahnya < 11 gr %. Pada saat hamil, bila terjadi anemia dan tidak tertangani hingga akhir kehamilan maka akan berpengaruh pada saat postpartum. Pada ibu dengan anemia, saat postpartum akan mengalami atonia uteri. Hal ini disebabkan karena oksigen yang dikirim ke uterus kurang. Jumlah oksigen dalam darah yang kurang menyebabkan otot-otot uterus tidak berkontraksi dengan

adekuat sehingga timbul atonia uteri yang mengakibatkan perdarahan banyak.

Berdasarkan hasil penelitian dari literatur yang ada resiko untuk mengalami perdarahan pasca persalinan pada ibu yang memiliki Hb < 11gr% adalah 1,789 kali lebih besar dibandingkan dengan yang memiliki Hb > 11 gr%.

2. Kerangka Konsep Penelitian



Keterangan : ————— : Variabel yang diteliti

..... : Variabel yang tidak diteliti

□ : Variabel Independen

○ : Variabel dependen

3. Identifikasi Variabel Penelitian

Kerangka konsep penelitian diatas dapat diidentifikasi variabel yang adalah:

- a. Variabel dependen : Atonia Uteri
- b. Variabel independen : Usia ibu , parietas Ibu, jarak persalinan, anemia dalam kehamilan.

4. Defenisi Operasional Dan Kriteria Objektif

- a. Atonia uteri adalah kegagalan serabu-serabut otot miometrium uterus untuk berkontraksi dan memendek, berdasarkan diagnosa dokter yang tercatat pada status pasien yang terdapat di rekam medik.
- b. Usia Ibu adalah lamanya waktu ibu hidup, dihitung saat ibu dilahirkan sampai ibu meninggal.

Kriteria Objektif

Beresiko : Bila ibu melahirkan dibawah 20 dan diatas 35tahun.

Tidak Beresiko : Bila ibu melahirkan berumur 20 – 35 tahun.
(Faisal,2010)

- c. Paritas adalah banyak kelahiran yang dialami oleh seorang wanita atau banyaknya anak yang dilahirkan.

Kriteria Objektif

Beresiko : Bila Paritas > 3

Tidak Beresiko : Bila paritas ≤ 3 . (Faisal,2010)

- d. Jarak persalinan adalah suatu pertimbangan untuk menentukan persalinan yang pertama dengan persalinan berikutnya.

Kriteria Objektif

Beresiko : Bila jarak persalinan ibu < 2 tahun

Tidak Beresiko : Bila jarak persalinan ibu ≥ 2 tahun.

(Hamidah,2009)

- e. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar haemoglobin (Hb) dalam darahnya kurang dari 12 gr%.

Kriteri Objektif

Beresiko : Apabila Kadar HB ibu selama Hamil < 12 gr %

Tidak Beresiko : Apabila Kadar HB ibu selama Hamil ≥ 12 gr %.

(Wuryanti,2010)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survey dengan pendekatan Deskriptif yang bermaksud mendapatkan gambaran tentang angka kejadian Atonia Uteri di RSIA Siti Fatimah Makassar.

Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya

B. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih adalah RSIA Siti Fatimah Makassar jalan Gunung merapi No.75 kelurahan pisang selatan kecamatan Ujung Pandang kota Makassar Provinsi Sulawesi selatan. Dengan pertimbangan bahwa Rumah sakit tersebut rumah sakit pendidikan dengan fasilitas yang lengkap dan petugas profesional. Selain itu Rumah sakit tersebut adalah rumah sakit rujukan mulai dari kehamilan, persalinan, nifas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Jalan sungai Poso
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gunung Lokong
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Sungai Pareman

d) Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Gunung Merapi

2. Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan di RSIA Siti Fatimah Makassar pada tanggal 4 April – 15 April 2011.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah semua ibu yang mengalami atonia uteri di RSIA Siti Fatimah Makassar periode Januari 2009 - Desember 2010.

2. Sampel adalah semua ibu yang mengalami Atonia Uteri di RSIA Siti Fatimah Makassar periode Januari 2009 - Desember 2010.

a. Inklusi

1) Ibu yang mengalami Atonia Uteri Di RSIA Siti Fatimah Makassar yang mempunyai catatan medik lengkap.

b. Eksklusi

1) Ibu yang mengalami Atonia Uteri Di RSIA Siti Fatimah Makassar yang tidak memiliki catatan medik lengkap.

2) Ibu yang mengalami perdarahan postpartum selain atonia uteri.

D. Teknik pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara “Purposive Sampling” yaitu sampel yang dipilih sesuai dengan kriteria inklusi agar relevan dengan desain penelitian sehingga memperoleh data tentang angka kejadian Atonia Uteri di RSIA Siti Fatimah Makassar.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari rekam medic RSIA Siti Fatimah Makassar periode Januari 2009 - Desember 2010. Dengan menggunakan Purposive Sampling berdasarkan sejumlah variable yang diteliti.

F. Metode Pengelolaan dan analisis data

Data yang diperoleh dikumpul dan diolah secara manual dengan menggunakan kalkulator serta disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai penjelasan – penjelasan berdasarkan tujuan penelitian. Data yang telah diolah selanjutnya dianalisis secara deskriptif, dengan rumus:

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Persentase yang dicari

f : Frekuensi

n : Jumlah sampel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan Di RSIA Siti Fatimah Makassar, mengenai Gambaran Angka Kejadian Atonia Uteri diperoleh dari data sekunder dan selanjutnya hasil penelitian ini akan secara lengkap disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut :

Tabel 4.1
Distribusi frekuensi kejadian Atonia Uteri Berdasarkan Usia Ibu
Di RSIA Siti Fatimah Makassar
Januari 2009-Desember 2010

Usia Ibu	Frekuensi	Persentase (%)
Risiko Tinggi (< 20 Tahun dan > 35 Tahun)	13	28,3
Risiko Rendah (20-35 Tahun)	33	71,7
Jumlah	46	100

Sumber : Data Sekunder (Medical Record RSIA Siti Fatimah Makassar)

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 46 ibu yang mengalami Atonia Uteri didapatkan 13 ibu yang umurnya < 20 Tahun dan >35 Tahun (28,3%) dan 33 ibu yang berumur 20-35 Tahun (71,7 %).

Tabel 4.2
Distribusi frekuensi kejadian Atonia Uteri Berdasarkan Paritas Ibu
Di RSIA Siti Fatimah Makassar
Januari 2009-Desember 2010

Paritas Ibu	Frekuensi	Persentase (%)
Risiko Tinggi (> 3 anak)	14	30,4
Risiko Rendah (\leq 3 anak)	32	69,6
Jumlah	46	100

Sumber : Data Sekunder (Medical Record RSIA Siti Fatimah Makassar)

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 46 ibu yang mengalami Atonia Uteri didapatkan 14 ibu yang melahirkan lebih dari 3 kali (30,4%) dan 32 ibu Yang melahirkan tidak lebih atau sama dengan 3 kali (69,6%).

Tabel 4.3
Distribusi frekuensi kejadian Atonia Uteri Berdasarkan Jarak
persalinan Di RSIA Siti Fatimah Makassar
Januari 2009-Desember 2010

Jarak persalinan Ibu	Frekuensi	Persentase (%)
Risiko Tinggi (\leq 2 Tahun)	15	32,6
Risiko Rendah (\geq 2 Tahun)	31	67,4
Jumlah	46	100

Sumber : Data Sekunder (Medical Record RSIA Siti Fatimah Makassar)

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 46 ibu yang mengalami Atonia Uteri didapatkan 15 ibu yang jarak kehamilannya kurang dari 2 tahun (32,6%) dan 31 ibu yang jarak kehamilannya 2 tahun atau lebih (67,4%).

Tabel 4.4
Distribusi frekuensi kejadian Atonia Uteri Berdasarkan Anemia
Dalam Kehamilan Ibu Di RSIA Siti Fatimah Makassar
Januari 2009-Desember 2010

Anemia dalam kehamilan Ibu	Frekuensi	Persentase (%)
Risiko Tinggi (HB < 12 gr %)	33	71,7
Risiko Rendah (HB ≥ 12 gr%)	13	28,3
Jumlah	46	100

Sumber : Data Sekunder (Medical Record RSIA Siti Fatimah Makassar)

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 46 ibu yang mengalami Atonia Uteri didapatkan 33 ibu yang HB-nya < 12 gr % (71,7%) dan 13 ibu yang HB-nya ≥ 12gr% (28,3%).

B. Pembahasan

1. Usia Ibu

Penelitian yang telah dilakukan di RSIA Siti Fatimah Makassar diperoleh hasil untuk usia ibu dengan risiko tinggi < 20 tahun dan > 35 tahun sebanyak 13 ibu (28,3%) sedangkan yang berisiko rendah yaitu yang berusia 20-35 tahun sebanyak 33 ibu (71,7%).

Usia 20-35 tahun merupakan usia reproduksi sehat karena alat-alat reproduksi bekerja secara maksimal sehingga mengurangi risiko terjadinya perdarahan pasca persalinan. Namun pada usia tersebut masih dapat terjadi atonia uteri yang disebabkan oleh faktor lain.

Kadaan pada usia kurang dari 20 tahun berisiko tinggi mengalami atonia uteri karena belum matangnya alat reproduksi untuk hamil, dan

melahirkan sehingga dapat menyebabkan komplikasi termasuk atonia uteri. Komplikasi maternal meningkat kembali setelah umur diatas 35 tahun dan cenderung terjadi atonia uteri. Hal ini disebabkan karena alat-alat reproduksi yang berperan dalam proses kehamilan dan persalinan tidak efektif lagi. Dalam hal ini, miometrium tidak mampu berkontraksi dengan baik sehingga terjadi atonia uteri.

Kelompok umur yang mempunyai risiko tinggi terjadinya Atonia Uteri, yaitu mereka yang melahirkan pada usia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun. Perdarahan pascapersalinan yang mengakibatkan kematian maternal pada wanita hamil yang melahirkan pada usia dibawah 20 tahun 2-5 kali lebih tinggi dari pada perdarahan pascapersalinan yang terjadi pada usia 20-35 tahun. Perdarahan pascapersalinan meningkat kembali setelah usia 35tahun keatas. (Faisal,2010)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mely Andriani,2009 yang berjudul "Analisa Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Atonia Uteri di RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun 2008" bahwa dari 70 ibu yang mengalami atonia uteri terdapat (31.4%) yang berusia < 20 tahun dan > 35 tahun, dan (68.6%) yang berusia 20-35 tahun.

Atonia uteri juga dapat terjadi pada usia 20-35 tahun yang dapat disebabkan oleh faktor lain seperti, apabila ibu tersebut adalah seorang multipara, sedangkan usianya baru sekitar 20-35 tahun karena salah

satu faktor kejadian atonia uteri disebabkan karena paritas yang tinggi atau paritas > 3 .

Teori dan kenyataan dalam penelitian ini terdapat suatu kesenjangan dimana hasil yang telah diperoleh yaitu untuk umur ibu dengan risiko tinggi sebanyak 13 ibu (28,3%) sedangkan yang berisiko rendah yaitu 33 ibu (71,7%), kesenjangan ini kemungkinan disebabkan karena keterbatasan sampel atau kurangnya sampel yang didapatkan oleh peneliti dan tidak sebanding dengan sampel yang diperoleh oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga hasil penelitian yang didapatkan berbanding terbalik dengan teori yang ada.

2. Paritas Ibu

Penelitian yang telah dilakukan di RSIA Siti Fatimah Makassar diperoleh hasil untuk paritas ibu dengan risiko tinggi > 3 sebanyak 14 ibu (30,4%) sedangkan yang berisiko rendah yaitu paritas ≤ 3 sebanyak 32 ibu (69,6%).

Paritas 2-3 merupakan paritas paling aman ditinjau dari sudut kematian maternal karena pada paritas tersebut kondisi miometrium dan tonus otot bekerja dengan baik sehingga tidak menimbulkan kegagalan kontraksi pembuluh darah pada tempat implantasi plasenta . Namun pada kondisi tersebut dapat pula terjadi atonia uteri yang disebabkan oleh faktor lain.

Kelompok paritas ibu yang mempunyai risiko tinggi terjadinya Atonia Uteri yaitu paritas tinggi (lebih dari tiga) mempunyai angka kejadian perdarahan pasca persalinan lebih tinggi. Pada paritas yang tinggi akan menyebabkan otot-otot Uterus sudah tidak mampu untuk berkontraksi karena uterus yang sudah meregang.(Faisal,2010)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mely Andriani,2008 yang berjudul "Analisa Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Atonia Uteri di RSUD M. Yunus Bengkulu Tahun 2008" bahwa dari 70 ibu yang mengalami atonia uteri terdapat (51.4%) yang paritas ≤ 3 dan (48.6%) yang berparitas >3 .

Teori dan kenyataan dalam penelitian ini terdapat suatu kesenjangan dimana hasil yang telah diperoleh untuk paritas ibu dengan risiko tinggi sebanyak 14 ibu (30,4%) sedangkan yang berisiko rendah yaitu 32 ibu (69,9%), kesenjangan ini kemungkinan sebabkan karena keterbatasan sampel atau kurangnya sampel yang didapatkan oleh peneliti dan tidak sebanding dengan sampel yang diperoleh oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti berbanding terbalik dengan teori yang ada.

3. Jarak Persalinan

Penelitian yang telah dilakukan di RSIA Siti Fatimah Makassar diperoleh hasil untuk jarak persalinan ibu dengan resiko tinggi < 2 tahun sebanyak 15 ibu (32,6%) sedangkan yang berisiko rendah ≥ 2 tahun sebanyak 31 ibu (67,4%).

Setelah organ-organ reproduksi istirahat selama 24 bulan atau selama 2 tahun, maka diharapkan semua organ –organ reproduksi ibu akan kembali seperti sebelum hamil, sebaliknya bila jarak kehamilan terlalu pendek atau kurang dari 2 tahun akan sangat berbahaya, karena uterus terutama endometrium belum kembali ke kondisi sebelumnya sehingga pada saat persalinan dapat terjadi atonia uteri.

Jarak ideal persalinan sekurang-kurangnya 2 tahun, jarak persalinan yang terlalu dekat menyebabkan ibu mempunyai waktu singkat untuk memulihkan kondisi rahimnya agar bisa kembali ke kondisi sebelumnya. Perhitungan 2 tahun ini atas dasar pertimbangan kembalinya organ – organ reproduksi baru kembali ke keadaan seperti semula, namun kondisi tersebut masih dapat terjadinya atonia uteri yang disebabkan oleh faktor lain. (Hamidah,2009)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryani,2008 yang berjudul “Hubungan karakteristik ibu bersalin dan antenatal care dengan perdarahan pasca persalinan di RSUD Dr.pirngadi Tahun 2007” bahwa dari 36 ibu yang mengalami atonia uteri terdapat 66,7% yang jarak persalinannya < 2 tahun dan 33,3% yang jarak kelahirannya > 2 tahun.

Teori dan kenyataan dalam penelitian ini terdapat suatu kesenjangan dimana hasil yang telah diperoleh untuk jarak persalinan ibu dengan risiko tinggi sebanyak 15 ibu (32,6%) sedangkan yang

berisiko rendah yaitu 31 ibu (67,4%), kesenjangan ini kemungkinan disebabkan karena keterbatasan sampel atau kurangnya sampel yang diperoleh oleh peneliti dan tidak sebanding dengan sampel yang diperoleh oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga hasil penelitian yang didapatkan berbanding terbalik dengan teori yang ada.

4. Anemia dalam kehamilan

Penelitian yang telah dilakukan di RSIA Siti Fatimah Makassar diperoleh hasil untuk anemia dalam kehamilan dengan risiko tinggi HB < 12 gr% sebanyak 33 ibu (71,7%) sedangkan yang berisiko rendah \geq 12 gr% sebanyak 13 ibu (28,3%).

Setiap ibu hamil dengan anemia memiliki risiko untuk terjadi perdarahan postpartum. Salah satu penyebab perdarahan postpartum adalah karena atonia uteri, anemia dalam kehamilan dapat berpengaruh buruk terutama saat kehamilan, persalinan dan nifas, anemia menjadi salah satu pemicu terjadinya atonia uteri, karena jumlah oksigen yang diikat dalam darah kurang. Sehingga jumlah oksigen yang dikirim keuterus pun kurang. Hal ini menyebabkan otot-otot uterus tidak berkontraksi dengan adekuat sehingga timbul atonia uteri.

Kondisi ibu dengan kadar haemoglobin dibawah 12gr% pada saat hamil, bila terjadi anemia dan tidak tertangani hingga akhir kehamilan maka akan berpengaruh pada saat postpartum. Pada ibu dengan anemia, saat postpartum akan mengalami atonia uteri. Hal ini

disebabkan karena oksigen yang dikirim ke uterus kurang. Jumlah oksigen dalam darah yang kurang menyebabkan otot-otot uterus tidak berkontraksi dengan adekuat sehingga timbul atonia uteri yang mengakibatkan perdarahan banyak. (Wuryanti,2010)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayu Wuryanti,2010 yang berjudul “Hubungan anemia dalam kehamilan dengan perdarah post partum karena atonia uteri di RSUD Wonogiri 2010” bahwa $p < 0,008 < 0,05$ maka dapat disimpulkan terdapat hubungan antara anemia dalam kehamilan dengan perdarahan postpartum karena atonia uteri.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai gambaran angka kejadian atonia uteri Di RSIA Siti Fatimah Makassar periode Januari 2009- Desember 2010, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Usia Ibu, atonia uteri terbanyak pada usia 20-35 tahun sebanyak 71,7%.
2. Berdasarkan Paritas ibu, atonia uteri terbanyak pada paritas ≤ 3 sebanyak 69,9%.
3. Berdasarkan Jarak persalinan ibu, atonia uteri terbanyak pada jarak persalinan ≥ 2 tahun sebanyak 67,4%.
4. Berdasarkan Anemia dalam kehamilan, atonia uteri terbanyak pada HB < 12 gr% sebanyak 71,7%.

B. Saran

1. Perlunya pemberian informasi melalui penyuluhan kepada ibu tentang komplikasi kehamilan dan persalinan secara dini.
2. Tersedianya sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan biaya yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

3. Perlunya pemberian informasi melalui penyuluhan kesehatan kepada ibu yang menikah pada umur kurang dari 20 tahun agar menunda kehamilannya hingga mencapai umur reproduksi sehat (20-35 tahun), dan mengatur jarak persalinannya yaitu jarak persalinannya ≥ 2 tahun serta pada saat hamil, ibu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi disertai dengan istirahat yang cukup agar tidak terjadi anemia dalam kehamilan yang dapat menyebabkan atonia uteri.



DAFTAR PUSTAKA

Ali,Fitriani. “*Manajemen asuhan Kebidanan perdarahan postpartum karena Atonia Uteri Di RSIA Siti Fatimah*” : fakultas ilmu kesehatan UIN Makassar, 2009.

Ambarwati, Eny Retna. 2009. *Asuhan Kebidanan Nifas*. Cet III. Yogyakarta : Mitra Cendekia Press.

Angraini, Yetti. 2010. *Asuhan Kebidanan Masa Nifas*. Cet I. Yogyakarta : Pustaka Rihama.

Anonim. 2010. *atonia uteri*. <http://materikuliahkebidanan.files.wordpress.com/2010/02/atonia-uteri.pdf>, diakses tanggal 23 desember 2010.

Azmanurazizah.2010. *larangan-larangan masa nifas*.
<http://asmanurazizah.blogspot.com/2010/11/aspek-sosial-budaya-pada-masa-nifas.html>,diakses tanggal 24 januari 2011.

Departemen Agama RI. 2005. *Al-Quran & Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit J- ART.

Faisal, 2010.*perdarahan pasca persalinan*. <http://www.scribd.com>, diakses tanggal 14 januari 2011.

Hamidah, *Jarak persalinan*.<http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/103/jtptunimus-gdl-hamidahmei-5109-3-bab2.pdf>, diakses tanggal 14 february 2011.

Hidayat, A., Aziz Alimul. 2007. *Metode Penelitian & Tekhnik Analisa Data*. Jakarta: Salemba Medika.

Hidayat , Afiyah. 2009.*askep atonia uteri*. <http://hidayat2.wordpress.com/2009/06/10/askep-atonia-uteri/>, diakses tanggal 14 januari 2011.

Manuaba, Ida Bagus Gde. 2003. *Penuntun kepanitraan klinik Obstetri dan ginekologi*. Edisi 2. Cet I. Jakarta : FGC.

_____. 2001 . *Kapita Selekta Penatalaksanaan Rutin Obstetri Ginekologi Dan KB*. Cet I. Jakarta : EGC.

Nugroho, Taufan . 2010. *Kasus emergency Kebidanan*. Cet I . Yogyakarta : Nuha Medika.

Profil dinkes-sulsel , www.dinkessulsel.go.id, Diakses tanggal 5 februari 2011.

Saifuddin, Abdul Bari . 2006. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal Dan Neonatal*. Jakarta : YBP-SP.

_____. 2004. *Buku Panduan Praktis Maternal Dan Neonatal*. Edisi I. Cetakan III. Jakarta : YBP-SP.

Saleha , Sitti . 2009 . *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas* . Jakarta : Salemba Medika.

Wiknjastro, Hanifa . 2007. *Ilmu Bedah Kebidanan*. Edisi I. Cet VII . Jakarta : YBP-SP.

_____. 2007. *Ilmu Kebidanan*. Edisi 3. Cet VIII. Jakarta : YBP-
SP.

Wuryanti, Ayu,” *Hubungan Anemia dalam kehamilan dengan Atonia uteri di RSUD Wonogiri* “: Fakultas kedokteran Universitas Sebelas maret, 2010.

MASTER TABEL GAMBARAN ANGKA KEJADIAN ATONIA UTERI
DI RSIA SITI FATIMAH MAKASSAR
PERIODE JANUARI 2009-DESEMBER 2010

No	NO. REG	NAMA IBU	UMUR (thn)	PARITAS	JARAK PERSALINAN (thn)	ANEMIA DALAM KEHAMILAN	
						KETERANGAN	HB (gr%)
1	47256	Ny "W"	30	II	3	Tidak anemia	12,0
2	46111	Ny "V"	32	II	2	Anemia	10,1
3	46177	Ny "I"	35	II	3	Anemia	11,4
4	54970	Ny "N"	28	IV	2	Tidak anemia	13,1
5	55405	Ny "N"	38	IV	1	Anemia	10,7
6	55589	Ny "W"	41	II	1	Tidak Anemia	13,6
7	43197	Ny "N"	24	II	4	Tidak Anemia	12,5
8	55391	Ny "V"	39	III	7	Anemia	9,3
9	57387	Ny "I"	34	III	1	Tidak anemia	14,0
10	55418	Ny "R"	28	IV	1 thn 6 bulan	Tidak Anemia	12,5
11	54743	Ny "M"	32	II	2	Anemia	7,6
12	53672	Ny "A"	23	II	1	Anemia	10,0
13	57134	Ny "M"	30	V	6	Anemia	8,4
14	55621	Ny "K"	36	II	4	Anemia	10,0
15	40468	Ny "N"	39	III	3	Anemia	7,6
16	43197	Ny "R"	36	II	2	Tidak anemia	12,5
17	43927	Ny "S"	32	IV	4	Anemia	10,8
18	45812	Ny "S"	20	II	1	Anemia	7,6
19	45866	Ny "N"	20	I	-	Anemia	11,1
20	46305	Ny "M"	21	I	-	Anemia	9,8
21	46356	Ny "M"	41	VI	6	Anemia	9,4
22	46513	Ny "S"	20	I	-	Anemia	7,8
23	46745	Ny "F"	25	IV	5	Anemia	9,1
24	46991	Ny "L"	32	V	1	Anemia	9,0
25	47603	Ny "S"	19	I	-	Anemia	8,0
26	47635	Ny "T"	27	II	2	Anemia	10,0
27	47990	Ny "Y"	22	II	1	Anemia	7,7
28	48124	Ny "N"	21	I	-	Anemia	10,0
29	48162	Ny "N"	41	V	2	Anemia	8,2
30	48228	Ny "M"	47	V	5	Anemia	8,0

31	56178	Ny”M”	23	I	1	Anemia	8,0
32	55609	Ny”E”	34	V	2	Tidak anemia	14,9
33	55445	Ny”R”	19	I	-	Tidak anemia	13,0
34	55283	Ny”K”	27	IV	3	Tidak anemia	12,0
35	55012	Ny”M”	27	II	1 thn 6 bulan	Anemia	6,6
36	56792	Ny”R”	25	II	1	Tidak anemia	13,0
37	54709	Ny”N”	24	II	2	Anemia	10,6
38	54011	Ny”S”	27	II	1	Anemia	111,8
39	57069	Ny”M”	24	II	1	Tidak anemia	12,8
40	55411	Ny”D”	19	I	-	Anemia	9,5
41	48366	Ny”S”	38	VII	5	Tidak anemia	13,7
42	48986	Ny”F”	30	V	5	Anemia	11,6
43	49518	Ny”H”	21	III	1 thn 6 bulan	Anemia	10,0
44	50542	Ny”H”	30	II	2	Anemia	11,9
45	52353	Ny”L”	25	II	2	Anemia	8,1
46	53028	Ny”S”	29	III	1 thn 6 bulan	Anemia	7,7

LEMBAR KONSUL
KARYA TULIS ILMIAH (KTI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2011

Nama : Sitti Khadijah

Nim : 70400008025

Pembimbing : dr.Rini Fitriani,S.Ked

Judul KTI : Gambaran Angka Kejadian Atonia Uteri Di RSIA Siti Fatimah
Makassar 2011

No	Hari/Tanggal	Materi konsul	Perbaikan	TTD
1	Kamis, 23-12-2010	Acc Judul	-	
2	Selasa, 15-02-2011	Bab I,II,III	Bab I,II,III	
3	Senin, 21-02-2011	Bab I,II,III	Bab II & III	
4	Senin, 28-02-2011	Acc Bab I,II,III	-	
5	Senin, 02-03-2011	Usulan ujian Proposal	-	
6	Kamis, 10-03-2011	Seminar Proposal	-	
7	Kamis, 17-03-2011	Perbaikan proposal	-	
8	Selasa, 26-04-2011	Bab IV	Bab IV	
9	Selasa.	Bab IV	Bab IV	

	10-05-2011			
10	Kamis, 09-06-2011	Bab IV & V	Bab V	
11	Senin , 13-06-2011	Acc KTI	-	
12	Jumat, 17-06-2011	Ujian Hasil	Bab IV	
13	Selasa , 28-06-2011	Perbaikan KTI	-	



Mengetahui,

Pembimbing

dr . Rini Fitriani. S.Ked.

NIP. 19800701 200604 2 005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS

Nama : Sitti khadijah
Nim : 70400008025
Tempat/Tanggal Lahir : ujung pandang/ 05 september 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Btn. Mangga tiga Blok G4/28
Nomor HP : 085255987987

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat SD. Inpres Mangga Tiga daya Tahun 2002
2. Tamat SLTP Negeri 12 Makassar Tahun 2005
3. Tamat SMA Negeri 18 Makassar Tahun 2008
4. Mengikuti Pendidikan Kebidanan UIN Alauddin Makassar Tahun 2008 sampai Tahun 2011.