

UJI AKTIVITAS ANTIMIKROBA ALGA MERAH (*Euchema cottonii*) ASAL KAB. JENEPONTO SECARA KLT-BIOAUTOGRAFI



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Farmasi Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh

**REZKI NURJIAH YUSUF
NIM. 70100107069**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 7 Agustus 2012

Penulis,

REZKI NURJIAH YUSUF

NIM. 70100107069

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Aktivitas Antimikroba Alga Merah (*Euchema cottonii*) Asal Kab. Jeneponto Secara KLT-Bioutografi” yang disusun oleh Rezki Nurjiah Yusuf, NIM : 70100107069, Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar, akan diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2012 M yang bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1433 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar, 7 Agustus 2012 M
15 Ramadhan 1433 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : DR.dr.H.Rasjidin Abdullah,MPH.,MH.,Kes (.....)
Sekretaris : Fatmawaty Mallappiang., SKM., M.Kes (.....)
Pembimbing I : Rusli, S.Si, M.Si, Apt (.....)
Pembimbing II : Gemy Nastity Handayani, S.Si, M.Si, Apt (.....)
Penguji I : Haeria, S.Si, M.Si (.....)
Penguji II : Drs. Supardin, M.HI (.....)

Diketahui:

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH., MH., Kes.
NIP. 19530119 198110 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Uji Aktivitas Antimikroba Alga Merah (*Euchema cottonii*) Asal Kab. Jeneponto Secara KLT-bioautografi ”** dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.

Ucapan terima kasih yang tulus kepada orang tuaku tercinta, ayahanda Muh. Yusuf dan Ibunda Zulmina Zain, saudara-saudaraku Ayatullah Zulfikar Yusuf, dan Muhammad Firdaus, dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan berupa materi, nasehat, dan doa yang tak terhingga dalam penyelesaian skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT, M.S. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak DR. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH., MH., Kes. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Fatmawaty Mallappiang, SKM., M., Kes. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

5. Bapak Drs. Wahyuddin G, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Ibu Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt. sebagai Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan sekaligus pembimbing akademik yang telah membimbing, memberikan saran dan mengarahkan dalam penyempurnaan skripsi penulis.
7. Bapak Rusli, S.Si., M.Si., Apt. selaku Pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Haeria, S.Si., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Farmasi dan sebagai penguji kompetensi dalam penyusunan skripsi ini yang telah banyak berkontribusi besar dalam menyelesaikan skripsi.
9. Bapak Drs. Supardin, M.HI. sebagai penguji agama yang telah memberikan saran dan arahnya dalam penyempurnaan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
11. Rekan-rekan mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, khususnya untuk para laboran terima kasih atas bimbingannya. Teman-teman Anastesi '07 khususnya Farmasi B, adik-adik 08, 09, dan 010 atas bantuan dan kerjasamanya selama penulis melaksanakan pendidikan.


Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa, penulis memiliki keterbatasan sehingga tak luput dari kesalahan dan kekurangan dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang sifatnya membangun akan penulis terima dengan hati yang ikhlas.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamualaikum wr.wb..

Makassar, 7 Agustus 2012

Rezki Nurjiah Yusuf



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Halaman
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1-4
<i>A. Latar Belakang Masalah</i>	1
<i>B. Rumusan Masalah</i>	3
<i>C. Tujuan Penelitian</i>	4
<i>D. Manfaat Penelitian</i>	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5-39
<i>A. Tentang Alga</i>	5
1. Alga Laut	5
2. Morfologi Alga Laut.....	6
3. Kandungan dan Manfaat alga	7
<i>B. Alga Merah (Euchema cottonii)</i>	9
1. Klasifikasi	9

2. Morfologi	9
<i>C. Metode Ekstraksi Bahan alam</i>	12
1. Defenisi Ekstraksi.....	12
2. Mekanisme Ekstraksi.....	12
3. Jenis Ekstraksi	13
a. Nfundasi	13
b. Maserasi	14
c. Perkolasi	14
d. Penyarian berkesinambungan	15
<i>D. Antibiotika</i>	16
1. Defenisi Antimikroba	16
2. Mekanisme Kerja Antimikroba.....	17
a. Menghambat metabolisme sel mikroba	17
b. Menghambat sintesis dinding sel antimikroba	18
c. Mengganggu membran sel mikroba	18
d. Menghambat sintesis protein sel mikroba	19
e. Menghambat sintesis asam nukleat sel mikroba	20
<i>E. Uraian Mikroba Uji</i>	21
1. <i>Bacillus subtilis</i>	21
a. Klasifikasi	21
b. Sifat dan Morfologi.....	21
2. <i>Candida albicans</i>	21
a. Klasifikasi	21

b. Sifat dan Morfologi	22
3. <i>Escherichia coli</i>	22
a. Klasifikasi	22
b. Sifat dan Morfologi.....	22
4. <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	23
a. Klasifikasi	23
b. Sifat dan Morfologi	23
5. <i>Staphylococcus aureus</i>	24
a. Klasifikasi	24
b. Sifat dan Morfologi.....	24
6. <i>Staphylococcus epidermidis</i>	25
a. Klasifikasi	25
b. Sifat dan Morfologi.....	25
7. <i>Salmonella typhi</i>	26
a. Klasifikasi	26
b. Sifat dan Morfologi	26
8. <i>Vibrio sp.</i>	26
a. Klasifikasi	26
b. Sifat dan Morfologi.....	27
F. <i>Metode Sterilisasi</i>	27
1. Sterilisasi secara fisik.....	27
a. Pemanasan basah	27
b. Pemanasan kering.....	28

2. Sterilisasi secara kimia	29
3. Sterilisasi secara mekanik.....	29
G. Metode Pemisahan Secara Kromatografi Lapis Tipis	29
H. Metode Pengujian Antimikroba	31
a. Metode Difusi.....	31
b. Metode dilusi (Turbidimetri)	32
I. KLT-Bioautografi	33
J. Tinjauan Islam Mengenai Alga dan Manfaatnya	35
BAB III METODE PENELITIAN	40-44
A. Alat Dan Bahan	40
1. Alat	40
2. Bahan	40
B. Metode Kerja	40
1. Pengambilan Sampel	40
2. Pengolahan Sampel	41
3. Ekstraksi dan Partisi	41
4. Penyiapan Mikroba Uji.....	41
a. Sterilisasi Alat	41
b. Peremajaan Mikroba Uji	42
c. Pembuatan Suspensi Mikroba Uji	42
5. Pengujian Skrining Antimikroba.....	42
6. Pengujian Aktivitas Antimikroba	43
a. Pemisahan Senyawa Secara KLT	43

b. Pengujian Secara KLT-Bioautografi	43
7. Identifikasi Bercak Aktif dengan Penampak Bercak.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45-52
A. Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan	48
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54-55
LAMPIRAN	56-67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	68

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil ekstraksi <i>Euchema cottonii</i>	45
2. Hasil uji skrining antimikroba ekstrak <i>Euchema cottonii</i> pada konsentrasi 1 mg/ml	46
3. Hasil pemisahan dan pengujian senyawa secara KLT ekstrak larut heksan <i>Euchema cottonii</i> menggunakan campuran eluen heksan : etil asetat (7:1)	47
4. Hasil pengujian identifikasi komponen kimia aktif dari kromatogram ekstrak larut heksan <i>Euchema cottonii</i> dengan menggunakan pereaksi Aluminium klorida dan Besi (III) klorida.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Foto Pengujian Skrining Antimikroba Ekstrak Etanol Alga Merah (<i>Euchema cottonii</i>) Terhadap Bakteri <i>Salmonella thyposa</i> dan <i>Streptococcus mutans</i>	58
2. Foto Pengujian Skrining Antimikroba Ekstrak Etanol Alga Merah (<i>Euchema cottonii</i>) Terhadap Bakteri <i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	59
3. Foto Pengujian Skrining Antimikroba Ekstrak Etanol Alga Merah (<i>Euchema cottonii</i>) Terhadap Bakteri <i>Escherichia coli</i> dan <i>Staphylococcus epidermidis</i>	60
4. Foto Pengujian Skrining Antimikroba Ekstrak Etanol Alga Merah (<i>Euchema cottonii</i>) Terhadap Jamur <i>Candida albicans</i>	61
5. Foto Hasil profil kromatogram ekstrak larut heksan <i>Euchema cottonii</i> dengan cairan pengelusi heksan : etil asetat (7:1)	62
6. Foto hasil pengujian ekstrak larut heksan <i>Euchema cottonii</i> terhadap bakteri <i>Escherichia coli</i> dengan cairan pengelusi heksan : etil asetat (7 : 1).....	63
7. Foto hasil pengujian ekstrak larut heksan <i>Euchema cottonii</i> terhadap bakteri <i>Pseudomonas aeruginosa</i> dengan cairan pengelusi heksan : etil asetat (7:1)	64
8. Foto hasil pengujian ekstrak larut heksan <i>Euchema cottonii</i> terhadap bakteri <i>Staphylococcus epidermidis</i> dengan cairan pengelusi heksan : etil asetat (7 : 1).....	65
9. Foto hasil identifikasi komponen kimia dari kromatogram ekstrak larut heksan <i>Euchema cottoni</i> dengan penampak bercak Aluminium klorida dan Besi (III) klorida	66
10. Foto gambar tanaman Alga Merah (<i>Euchema cottonii</i>)	67

ABSTRAK

Nama Penyusun : Rezki Nurjiah Yusuf
NIM : 70100107069
Judul Skripsi : Uji Aktivitas Antimikroba Alga Merah (*Euchema cottonii*) Asal Kab. Jeneponto Secara KLT-bioautografi.

Telah dilakukan penelitian aktivitas antimikroba terhadap alga merah *Euchema cottonii*. Penelitian pendahuluan dilakukan dengan uji skrining menggunakan mikroba uji *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Salmonella typhi*, *Streptococcus mutans*, *Escherichia coli*, dan *Candida albicans*. Pada ekstrak etanol, ekstrak larut heksan, dan ekstrak tidak larut heksan dari alga merah *Euchema cottonii* dengan kadar 1 mg/ml. hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ekstrak larut heksan aktif memberikan hambatan pertumbuhan mikroba *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* dan *Staphylococcus epidermidis*. Untuk memperkirakan golongan senyawa pada ekstrak larut heksan yang memberikan aktivitas antimikroba dilakukan uji KLT-Biautografi. Diperoleh hasil terbaik dari pemisahan secara KLT-Bioautografi menggunakan cairan pengelusi heksan : etil asetat (7 : 1). Hasil uji KLT-Bioautografi menunjukkan bahwa pada bercak dengan nilai Rf 0,27 memberikan aktivitas antimikroba terhadap *Pseudomonas aeruginosa* dan *Staphylococcus epidermidis* dan nilai Rf 0,74 memberikan aktivitas antimikroba terhadap *Escherichia coli*. Hasil identifikasi komponen kimia menunjukkan bahwa senyawa aktif memberikan hasil positif pada penampak bercak golongan Fenol pada Rf 0,27 serta golongan Flavanoid pada Rf 0,74.

ABSTRACT

Nama Penyusun : Rezki Nurjiah Yusuf
NIM : 70100107069
Judul Skripsi : The Test Antimicrobial Activity of Red Algae *Euchema cottonii* from Jenepono by TLC-Bioautography

An investigation on antimicrobial activity of red algae *Euchema cottonii* has been done. Preliminary research has done by screening test using *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Salmonella typhi*, *Streptococcus mutans*, *Escherichia coli*, and *Candida albicans*. Ethanol, N-Heksan and not dissolve of heksan extract were use in 1 mg/ml. Result which has been obtained exhibit dissolve of heksan extract inhibit the growth of *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* and *Staphylococcus epidermidis*. TLC-Bioautography test has done to get the compound which had antimicrobial activity. The best result was obtained from reparation through TLC-Bioautography by means of eluent heksan : acetate ethyl (7:1). TLC-Bioautography test result shown that the spot in Rf 0,27 has antimicrobial activity on *Pseudomonas aeruginosa* and *Staphylococcus epidermidis* and Rf 0,74 has antimicrobial activity on *Esherichia coli* respectively. Identification result of the chemical component shown that the active compound which given positif result as Fenol on spot viewer were in Rf 0,27 and Rf 0,74 given positif result as flavanoid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian yang berorientasi kelautan saat ini sudah mulai digalakkan terutama dalam pencarian senyawa yang berpotensi sebagai obat terutama golongan antibiotik. Eksplorasi dan penelitian dari biota laut untuk keperluan Farmasi telah berkembang dengan pesat dalam kurun waktu 30-40 tahun terakhir, terutama untuk aktivitas antimikroba (Rismana, E., 2001).

Antimikroba (AM) ialah obat pembasmi mikroba, khususnya mikroba yang merugikan manusia. Berdasarkan sifat toksisitas selektif, ada antimikroba yang bersifat menghambat pertumbuhan mikroba, dikenal sebagai aktivitas bakteriostatik dan ada yang bersifat membunuh mikroba, dikenal sebagai aktivitas bakterisid (Rianto, S., 2007).

Pengujian aktivitas antimikroba dari bahan alam telah banyak dilakukan baik itu dari bagian tanaman seperti akar, batang, biji, buah dan daun. Penelitian obat tradisional saat ini masih demikian diambil dari wilayah daratan, sedangkan di wilayah laut masih kurang. Biota laut yang kaya dengan senyawa bioaktif adalah *spons*, *cnidarians*, *bryozoans*, *tunicates (ascidians)* dan *algae* (Ireland, e.M., et all, 1988).

Alga laut merupakan salah satu biota laut yang sangat potensial untuk dikembangkan. Indonesia memiliki banyak daerah penghasil alga laut, salah satu diantaranya yaitu Kabupaten Jeneponto yang merupakan daerah sentral pengembangan alga laut di daerah Sulawesi Selatan khususnya alga merah

(*Rhodophyta*), yang mana memiliki biodiversitas lebih tinggi dibandingkan dengan alga coklat (*Phaeophyta*) dan alga hijau (*Chlorophyta*) (Biotrends, 2006).

Pemanfaatan alga sebagai komoditi perdagangan atau bahan baku industri masih relatif kecil jika dibandingkan dengan keanekaragaman jenis alga yang ada di Indonesia. Padahal komponen kimiawi yang terdapat dalam alga sangat bermanfaat bagi bahan baku industri makanan, kosmetik, farmasi dan lain-lain (Pratiwi, Sylvia T., 2008).

Pemanfaatan biota laut khususnya alga sebagai sumber daya alam yang potensial sebagai makanan, minuman maupun obat-obatan cenderung makin meningkat seiring dengan penelitian kandungan kimia yang dimilikinya.

Beberapa hasil penelitian mengenai kandungan substansi aktif dalam alga dilaporkan oleh para pakar. Produk alam dari alga telah banyak diekstraksi dan diidentifikasi serta diuji bioaktivitasnya. Dalam kurun waktu 1977-1987 telah berhasil diisolasi dan diidentifikasi sebanyak 2500 produk alam laut yang bersifat bioaktif dan 30% diantaranya berasal dari alga. Beberapa senyawa bioaktivitas alga yang dilaporkan oleh pakar antara lain sifat antimikroba, antivirus, antihipertensi, dan antikanker (Pratiwi, Sylvia T., 2008).

Euchema cottonii diketahui sebagai alga merah (*Rhodophyta*) yang ditemukan di bawah air suhu rata-rata. Alga ini mempunyai talus yang keras, silindris dan berdaging (Romimuhtarto, K., dan Sri Juwana, 1999). Sejak 2700 SM *Euchema cottonii* telah digunakan oleh bangsa cina sebagai bahan sayuran, obat-obatan dan kosmetik, sedangkan di Indonesia digunakan sebagai bahan sayuran, kue, manisan dan obata-obatan (Indriani, H., dan Emi Sumiarsih., 2003).

Menurut penelitian, *Euchema cottonii* memiliki kandungan kimia karagenan dan senyawa fenol, terutama flavanoid (Suptijah, P., 2003). Karagenan merupakan senyawa polisakarida yang dihasilkan beberapa jenis alga merah yang memiliki sifat antimikroba, antiinflamasi, antipiretik, antikoagulan dan aktivitas biologis lainnya. Selain karagenan yang merupakan senyawa metabolit primer alga laut tersebut diperkirakan senyawa metabolit sekundernya yang dapat menghasilkan aktivitas antibakteri (Shanmugan, M. dan K.H Mody., 2000).

Senyawa aktif yang terdapat dalam alga merah (*Euchema cottonii*) dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah suhu, arus, salinitas, dan pH perairan serta jenis mikroorganisme yang tumbuh pada alga tersebut. Dengan demikian, *Euchema cottonii* yang berasal dari daerah yang berbeda, kemungkinan memberikan aktivitas antimikroba yang berbeda (Anonymous., 2009).

Hal inilah yang mendasari perlunya dilakukan penelitian uji aktivitas antimikroba alga merah (*Euchema cottonii*) yang berasal dari kabupaten jeneponto.

B. Rumusan masalah

1. Apakah Alga Merah dapat digunakan sebagai Antimikroba ?
2. Kandungan apakah yang terdapat dalam Alga Merah yang berefek sebagai Antimikroba ?
3. Bagaimana pandangan Agama Islam ditinjau dari segi pengobatan alternatif ?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antimikroba ekstrak alga merah (*Euchema cottonii*) terhadap bakteri secara KLT-Bioautografi.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa biota laut alga merah (*Euchema cottonii*) memiliki komponen yang dapat digunakan sebagai antimikroba, sehingga penggunaan dalam masyarakat dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan nilai tambah bagi penggunaan alga laut khususnya jenis *Euchema cottonii*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tentang Alga*

1. **Alga Laut**

Di dalam lautan terdapat bermacam-macam makhluk hidup baik berupa tumbuhan air maupun hewan air. Salah satu makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang biak di laut adalah alga. Ada tiga divisi alga laut yaitu Chlorophyta (900 spesies), Phaeophyta (1000 spesies), dan Rhodophyta (2500 spesies) (Pratiwi, Sylvia T. 2008).

Inilah alga pertama kali diperkenalkan oleh Linnaeus pada tahun 1754. Pada mulanya penjelasan dijalankan berdasarkan warna. Penjelasan alga berdasarkan kepada ciri-ciri berikut :

- a. Pigmen fotosintesis seperti klorofil dan karotenoid
- b. Komponen dinding sel

Bahan dinding sel terdiri dari polisakarida, lipid dan bahan protein. Komponen khusus yang mencirikan dinding sel termasuk asam poliuronat, asam alginat (Phaeophyta), asam fusinat (banyak terdapat pada Phaeophyta) dan komponen mukopeptida (Cynophyta). Ciri khas yang terdapat pada Chrysophyta ialah mempunyai dinding sel yang bersilika (Pratiwi, Sylvia T. 2008).

- c. Aspek struktur sel

Ketiadaan membran yang memisahkan, pembagian nukleus tidak berlaku secara mitosis seperti yang berlaku pada eukariot,

adanya dinding sel yang melindungi mukopeptida tertentu sebagai komponen yang menguatkannya (Eri, Bachtiar., 2007).

2. Morfologi Alga Laut

Alga laut atau biasa disebut *seaweed* merupakan tanaman makro alga laut yang hidup di laut yang tidak memiliki akar, batang, daun sejati dan pada umumnya hidup di dasar perairan. Alga laut disebut tanaman karena memiliki klorofil (zat hijau daun) sehingga dapat berfotosintesis. Fungsi dari akar, daun dan batang yang tidak dimiliki oleh alga laut digantikan oleh thallus. Alga laut memperoleh atau menyerap makanannya melalui sel-sel yang terdapat pada thallusnya (Junaedi, Wahid, 2004).

Alga laut digolongkan ke dalam tumbuhan tingkat rendah (Thallophyta) karena tidak memiliki akar, batang dan daun seperti umumnya pada tanaman. Bagian-bagian alga laut secara umum terdiri dari *holdfast* yaitu bagian dasar dari alga laut yang berfungsi untuk menempel pada *sustrat* dan *thallus* yaitu bentuk-bentuk pertumbuhan alga laut yang menyerupai percabangan (Junaedi, Wahid., 2004).

Struktur anatomi thallus untuk tiap alga berbeda-beda, misalnya pada famili yang sama antara *Euchema spinosum* dan *Euchema cottonii*, potongan thallus yang melintang mempunyai susunan sel yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini membantu dalam pengenalan berbagai jenis alga baik dalam mengidentifikasi jenis, genus, maupun famili (Kanisius, L.M., 1991).

Selama ini, yang umum dikenal dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomis ada 3 kelas, yaitu Rhodophyta (alga merah), Phaeophyta (alga coklat), dan Chlorophyta (alga hijau). Ketiganya merupakan sumber potensial senyawa bioaktif yang sangat bermanfaat bagi pengembangan industri farmasi, seperti sebagai antibakteri, antitumor, antikanker atau sebagai *reversal agent*. Sedangkan pada industri agrokimia terutama untuk *antifeedant*, *fungisida*, dan *herbisida* (Eri, Bachtiar., 2007).

3. Kandungan dan Manfaat Alga

Pada mulanya orang menggunakan alga hanya untuk sayuran dan belum diketahui zat apa yang ada di dalam alga. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan tentang alga semakin berkembang. Orang semakin tahu zat apa yang terkandung dalam alga, pengetahuan itu digunakan agar alga dapat bermanfaat seoptimal mungkin (Indriani, H., dan Emi Sumiarsih, 2003).

Alga diketahui kaya akan nutrisi esensial, seperti enzim, asam nukleat, asam amino, mineral, vitamin A, B, C, D, E dan K. karena kandungan gizinya yang tinggi, alga mampu meningkatkan sistem kerja hormonal, limfatik, dan juga syaraf. Selain itu, alga juga bisa meningkatkan fungsi pertahanan tubuh, memperbaiki sistem kerja jantung dan peredaran darah, serta sistem pencernaan (Endang, E., 2007).

Alga juga dikenal sebagai obat tradisional untuk batuk, asma, bronkhitis, TBC, cacingan, sakit perut, demam, rematik, bahkan

dipercaya dapat meningkatkan daya seksual. Kandungan iodiumnya diperlukan tubuh untuk mencegah penyakit gondok (Endang, E., 2007).

Serat pada alga laut juga membantu memperlancar proses metabolisme lemak sehingga akan mengurangi resiko obesitas, menurunkan kolesterol darah dan gula darah. Alga laut juga membantu pengobatan tukak lambung, radang usus besar, susah buang air besar dan gangguan pencernaan lainnya (Anonymous., 2009).

Disamping sebagai bahan makanan bergizi, alga laut telah banyak digunakan sebagai bahan pembuatan obat-obatan dan suplemen makanan serta difortifikasi ke produk pangan untuk meningkatkan nilai jual produk tersebut. Berbagai variasi struktur senyawa bioaktif yang sangat unik dari isolat alga merah telah berhasil diisolasi. Namun pemanfaatan sumber bahan bioaktif dari alga belum banyak dilakukan (Anonymous., 2009).

Alga yang banyak dimanfaatkan adalah dari jenis alga merah karena mengandung agar-agar, karaginan, porpiran, maupun furcellaran. Untuk jenis-jenis yang ada di Indonesia selain mengandung agar-agar dan karaginan juga mengandung pigmen fikobilin terdiri dari fikoeritrin dan fikosianin.

Menurut penelitian *Euchema cottonii* memiliki kandungan kimia karagenan dan senyawa fenol, terutama flavanoid (Suptijah, P., 2003). Karagenan, senyawa polisakarida yang dihasilkan dari beberapa jenis alga merah memiliki sifat antimikroba, antiinflamasi, antipiretik,

antikoagulan dan aktivitas biologis lainnya. Dimana telah diteliti aktivitas antibakteri pada karagenan yang dihasilkan oleh alga merah jenis *Condrus crispus*. Selain karagenan yang merupakan senyawa metabolit primer alga tersebut diperkirakan senyawa metabolit sekundernya juga dapat menghasilkan aktivitas antibakteri (Shanmugan, M. dan K.H Mody. 2000).

B. Alga Merah (*Euchema cottonii*)

1. Klasifikasi (Budikusuma, R.Arief., 2008)

Regnum	: Rhodophyta
Divisi	: Rhodophyta
Class	: Florideophycidae
Ordo	: Gigartinales
Famili	: Solieracea
Genus	: Euchema
Spesies	: <i>Euchema cottonii</i>

2. Morfologi

Dari segi morfologi alga merah tidak memperlihatkan adanya perbedaan antara akar, batang, dan daun. Bentuk tersebut adalah thalus belaka. Bentuk thalus belaka. Bentuk thalus alga merah bermacam-macam, antara lain, bulat, pipih, gepeng dan bulat seperti kantong, rambut dan sebagainya. Berdasarkan jumlah sel yang menyusunnya alga ini ada yang tersusun uniseluler (satu sel) atau multiseluler (banyak sel). Pada makro alga, jenis percabangan antara lain adalah pectinase (berderet

searah pada thalus utama), pirunate (bercabang dua-dua sepanjang thalus utamasecara berselang-selang), ferticilate (cabangnya berpusat melingkari aksis atau sumbu utama) dan ada juga yang sederhana tidak bercabang. Sifat substansi thalus juga beraneka ragam ada yang lunak seperti gelatin /gelatinoun, keras mengandung atau diliputi zat kapur (cakeroun), dan sebagainya. Untuk marga *Euchema cottonii* thalusnya adalah bulat silinder atau gepeng, bercabang berselang tidak teratur (DKP Banten, 2007).

Alga merah merupakan tanaman makro alga yang hidup di laut yang tidak memiliki akar, batang, daun sejati dan pada umumnya hidup di dasar perairan. Disebut tanaman karena memiliki klorofil (zat hijau daun) sehingga dapat berfotosintesis. Fungsi dari akar, batang dan daun yang tidak dimiliki oleh alga digantikan oleh thallus. Alga memperoleh atau menyerap makanannya melalui sel-sel yang terdapat pada thallusnya (DKP Banten, 2007).

Karena tidak memiliki akar, batang dan daun seperti pada umumnya pada tanaman, maka alga digolongkan ke dalam tumbuhan tingkat rendah (DKP Banten, 2007).

Alga merah (*Euchema cottonii*) atau Rhodophyta adalah salah satu filum dari alga berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Warna merah pada alga ini disebabkan oleh pigmen fikoeitrin dalam jumlah banyak dibandingkan pigmen klorofil, karoten, dan xantofil. Alga ini pada umumnya banyak sel (multiseluler) dan makroskopis. Panjangnya

antara 10 cm samapi 1 meter dan berbentuk berkas atau lembaran. Sebagian besar alga merah hidup di laut, banyak terdapat di laut tropika. Sebagian kecil hidup di air tawar yang dingin dengan aliran deras dan banyak oksigen. Selain itu ada pula yang hidup di air payau (DKP Banten, 2007).

Beberapa alga merah memiliki nilai ekonomi sebagai bahan makanan (sebagai pelengkap minuman penyegar ataupun sebagai bahan baku agar-agar). Alga merah sebagai bahan makanan memiliki kandungan serat lunak baik bagi kesehatan usus. Alga merah berkembang biak secara vegetatif dan generatif (DKP Banten, 2007).

Perkembangbiakan vegetatif ganggang merah berlangsung dengan pembentukan spora haploid yang dihasilkan oleh sporangium atau talus ganggang yang diploid. Spora ini selanjutnya tumbuh menjadi ganggang jantan atau betina yang sel-selnya haploid (DKP Banten, 2007).

Perkembangbiakan generatif ganggang merah dengan oogami, pembuahan sel kelamin betina (ovum) oleh sel kelamin jantan (spermatium). Alat perkembangbiakan jantan disebut spermatogonium yang menghasilkan spermatium yang tak berflagel. Sedangkan alat kelamin betina disebut karpogonium, yang menghasilkan ovum. Hasil pembuahan sel ovum oleh spermatium adalah zigot yang diploid. Selanjutnya, zigot itu akan tumbuh menjadi ganggang baru yang menghasilkan aplanospora dengan pembelahan melosis. Spora haploid

akan tumbuh menjadi ganggang penghasil gamet. Jadi pada ganggang merah terjadi pergiliran keturunan antara sporofit dan gametofit (DKP Banten, 2007).

C. Metode Ekstraksi Bahan alam

1. Defenisi Ekstraksi

Ekstraksi adalah penyarian zat-zat aktif dari bagian tanaman obat, hewan, beberapa jenis ikan, dan termasuk biota laut. Zat - zat aktif tersebut terdapat di dalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda. Demikian pula ketebalannya sehingga diperlukan metode ekstraksi dengan pelarut tertentu dalam mengekstraksinya (Tobo, Burhanuddin., 2001).

2. Mekanisme Ekstraksi

Umumnya zat aktif yang terkandung dalam tanaman maupun hewan lebih larut dalam pelarut organik. Proses terekstraksinya zat aktif dalam tanaman adalah sebagai berikut; pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel tanaman atau hewan yang mengandung zat-zat aktif. Zat - zat aktif tersebut akan terlarut sehingga akan terjadi perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan pelarut organik di luar sel. Maka larutan terpekat akan berdifusi keluar sel, dan proses ini akan terulang terus sampai terjadi kesetimbangan antara konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel (Tobo, Burhanuddin., 2001).

3. Jenis Ekstraksi

Cara penyarian dapat dibedakan menjadi infundasi, maserasi, perkolasi, dan penyarian berkesinambungan. Dari keempat cara tersebut sering dilakukan modifikasi untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

a. Infundasi

Infundasi adalah proses penyarian yang umumnya digunakan untuk menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. Penyarian dengan cara ini menghasilkan sari yang tidak stabil dan mudah tercemar oleh kuman dan kapang. Oleh sebab itu sari yang diperoleh dengan cara ini tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam

Infus dibuat dengan cara: membasahi bahan bakunya, biasanya dengan air 2 kali bobot bahan, untuk bunga 4 kali bobot bahan dan untuk karagen 10 kali bobot bahan. Bahan baku ditambah dengan air dan dipanaskan selama 15 menit pada suhu 90° - 98° C. Umumnya untuk bagian sari diperlukan 10 bagian bahan. Pada simplisia tertentu tidak diambil 10 bagian, karena kandungan simplisia kelarutannya terbatas, disesuaikan dengan cara penggunaannya dalam pengobatan, berlendir, daya kerjanya keras. Untuk memindahkan penyarian kadang-kadang perlu ditambah bahan kimia. Penyarian dilakukan pada saat cairan masih panas, kecuali bahan yang mengandung bahan yang mudah menguap (Tobo, Burhanuddin., 2001).

b. Maserasi

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara: 10 bagian simplisia dengan derajat halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana, kemudian dituangi dengan 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari terlindung dari cahaya, sambil berulang-ulang diaduk. Setelah 5 hari sari diserakai, ampas diperas, ampas ditambah cairan penyari secukupnya, diaduk dan diserakai hingga diperoleh seluruh sari sebanyak 100 bagian. Bejana ditutup, dibiarkan di tempat sejuk, terlindung dari cahaya selama 2 hari. Kemudian endapan dipisahkan (Tobo, Burhanuddin., 2001).

c. Perkolasi

Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Prinsip perkolasi adalah sebagai berikut: serbuk simplisia ditempatkan dalam suatu bejana silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut, cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai mencapai keadaan jenuh. Gerak ke bawah disebabkan oleh kekuatan gaya beratnya sendiri dan cairan di atasnya, dikurangi dengan daya kapiler yang cenderung untuk menahan. Kekuatan yang berperan pada perkolasi antara lain: gaya berat, kekentalan, daya larut, tegangan

permukaan, difusi, osmosa, adhesi, daya kapiler, dan daya geseran (Tobo, Burhanuddin., 2001).

d. Penyarian Berkesinambungan

Penyarian berkesinambungan menggabungkan kedua proses diatas.

Yang termasuk dalam penyarian berkesinambungan yaitu:

1. Reflux

Prinsip kerja refluks adalah sebagai berikut: cairan penyari diisikan pada labu, serbuk simplisia diisikan pada tabung dari kertas saring atau tabung yang berlubang – lubang dari gelas, baja tahan karat atau bahan lain yang cocok. Cairan penyari dipanaskan hingga mendidih. Uap penyari akan naik ke atas melalui serbuk simplisia. Uap penyari mengembun karena didinginkan oleh pendingin balik. Embun turun melalui serbuk simplisia sambil melarutkan zat aktifnya dan kembali ke labu. Cairan akan menguap kembali berulang proses seperti di atas.

2. Soxhlet

Prinsip kerja soxhlet adalah sebagai berikut: uap cairan penyari naik ke atas melalui pipa samping, kemudian diembunkan kembali oleh pendingin tegak. Cairan turun ke labu melalui tabung yang berisi serbuk simplisia. Cairan penyari sambil turun melarutkan zat aktif serbuk simplisia. Karena adanya sifon maka setelah cairan mencapai permukaan sifon, seluruh cairan akan kembali ke labu.

3. Destilasi Uap

Prinsip kerjanya adalah sebagai berikut: dengan adanya uap yang masuk maka tekanan kesetimbangan uap zat kandungan akan diturunkan menjadi sama dengan tekanan bagian di dalam suatu sistem, sehingga produk akan terdestilasi dan terbawa oleh uap air yang mengalir. Destilasi uap bukan semata-mata suatu proses penguapan pada titik didihnya, tetapi suatu proses perpindahan massa ke suatu media yang bergerak. Uap jenuh akan membasahi permukaan bahan, melunakkan jaringan dan menembus ke dalam melalui dinding sel, dan zat aktif akan pindah ke rongga uap air yang aktif dan selanjutnya akan pindah ke rongga uap yang bergerak melalui antarfasa (Tobo, Burhanuddin., 2001).

D. *Antibiotika*

1. **Definisi Antimikroba**

Antimikroba adalah bahan-bahan atau obat-obat yang digunakan untuk memberantas infeksi mikroba pada manusia. Obat-obat yang digunakan untuk membasmi mikroorganisme yang menyebabkan infeksi pada manusia, hewan ataupun tumbuhan harus bersifat toksisitas selektif artinya obat atau zat tersebut harus bersifat sangat toksis terhadap mikroorganisme penyebab penyakit tetapi relatif tidak toksis terhadap jasad inang atau hospes (Djide, Natsir, dan Sartini., 2008).

Antimikroba dapat bersifat (Djide, Natsir, dan Sartini., 2008):

- a. Bakteriostatika, yaitu zat atau bahan yang dapat menghambat atau menghentikan pertumbuhan mikroorganisme (bakteri).
- b. Bakteriosida, yaitu zat atau bahan yang dapat membunuh mikroorganisme (bakteri).

2. Mekanisme Kerja Antimikroba

Berdasarkan mekanisme kerjanya, antimikroba dibagi dalam 5 kelompok.

- a. **Menghambat Metabolisme Sel Mikroba** (Djide, Natsir, dan Sartini., 2008)

Antimikroba yang termasuk dalam kelompok ini ialah sulfonamide, trimetoprim, asam p-aminosalisilat (PAS) dan sulfon. Dengan mekanisme kerja ini diperoleh efek bakteriostatik.

Mikroba membutuhkan asam folat untuk kelangsungan hidupnya. Berbeda dengan mamalia yang mendapatkan asam folat dari luar, kuman pathogen harus mensintesis sendiri asam folat dari para amino benzoate (PABA) untuk kebutuhan hidupnya. Apabila sulfonamide atau sulfon menang bersaing dengan PABA untuk diikuti sertakan dalam pembentukan asam folat, maka terbentuk analog asam folat yang nonfungsional. Akibatnya kehidupan mikroba akan terganggu. Berdasarkan sifat kompetisi, efek sulfonamide dapat diatasi dengan meningkatkan kadar PABA.

Untuk dapat bekerja dihidrofolat harus diubah menjadi bentuk aktifnya yaitu asam tetrahidrofolat. Enzim dehidrofolat reduktase yang berperan disini dihambat oleh trimetoprim, sehingga asam dihidrofolat tidak dapat direduksi menjadi asam tetrahidrofolat yang fungsional.

b. Menghambat Sintesis Dinding Sel Mikroba (Djide, Natsir, dan Sartini., 2008)

Obat yang termasuk dalam kelompok ini ialah penisilin, sefalosporin, basitrasin, vankomisin, dan sikloserin. Dinding sel bakteri, terdiri dari polipeptidoglikan yaitu suatu kompleks polimer mukopeptida (glikopeptida). Sikloserin menghambat reaksi yang paling dini dalam proses sintesis dinding sel, diikuti berturut-turut oleh basitrasin, vankomisin dan diakhiri oleh penisilin dan sefalosporin, yang menghambat reaksi terakhir (transpeptidasi) dalam rangkaian reaksi tersebut. Oleh karena tekanan osmotik dalam sel kuman lebih tinggi daripada di luar sel maka kerusakan dinding sel kuman akan menyebabkan terjadinya lisis, yang merupakan dasar efek bakterisidal pada kuman yang peka.

c. Mengganggu Membran Sel Mikroba (Djide, Natsir, dan Sartini., 2008)

Obat yang termasuk dalam kelompok ini ialah polimiksin, golongan polien serta berbagai antimikroba kemoterapeutik, umpamanya antiseptic *surface active agents*. Polimiksin sebagai

senyawa ammonium kuarterner dapat merusak membrane sel setelah bereaksi dengan fosfat pada fosfolipid membrane sel mikroba. Polimiksin tidak efektif terhadap kuman Gram positif karena jumlah fosfor bakteri ini rendah. Kuman gram negatif yang menjadi resisten terhadap polimiksin, ternyata jumlah fosfornya menurun. Antibiotic polien bereaksi dengan struktur stero yang terdapat pada membrane sel fungus sehingga mempengaruhi permeabilitas selektif membrane tersebut.

Bakteri tidak sensitif terhadap antibiotic polien, karena tidak memiliki struktur sterol pada membran selnya. Antiseptik yang mengubah tegangan permukaan (surface active agents), dapat merusak permeabilitas selektif dari membrane sel mikroba. Kerusakan membrane sel menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dari sel mikroba yaitu protein, asam nukleat, nukleotida dan lain-lain.

d. **Menghambat Sintesis Protein Sel Mikroba** (Djide, Natsir, dan Sartini., 2008)

Obat yang termasuk dalam kelompok ini ialah golongan aminoglikosid, makrolid, linkomisin, tetrasiklin, dan kloramfenikol. Untuk kehidupannya, sel mikroba perlu mensintesis berbagai protein. Sintesis protein berlangsung di ribosom dengan bantuan mRNA dan tRNA. Pada bakteri, ribosom terdiri atas dua sub unit, yang berdasarkan konstanta sedimentasi dinyatakan sebagai ribosom 30 S dan 50 S. Untuk berfungsi pada sintesis protein, kedua komponen ini

akan bersatu pada pangkal rantai mRNA menjadi ribosom 70 S. Penghambatan sintesis protei terjadi dengan berbagai cara.

Streptomisin berikatan dengan komponen ribosom 30 S dan menyebabkan kode pada mRNA salah dibaca oleh tRNA pada waktu sintesis protein. Akibatnya akan terbentuk protein yang abnormal dan nonfungsional bagi sel mikroba. Antibiotic aminoglikosid lainnya yaitu gentamisin, kanamisin, dan naomisin memiliki mekanisme kerja yang sama, namun potensinya berbeda.

Eritromisin berikatan dengan ribosom 50 S dan menghambat translokasi kompleks tRNA-peptida dari lokasi asam amino ke lokasi peptida. Akibatnya, rantai polipeptida tidak dapat diperpanjang karena lokasi asam amino tidak dapat menerima kompleks tRNA-asam amino yang baru. Linkomisin juga berikatan dengan ribosom 50 S dan menghambat sintesis protein. Tetrasiklin berikatan dengan ribosom 30 S dan menghalangi masuknya kompleks tRNA-asam amino pada lokasi asam amino. Kloramfenikol berikatan dengan ribosom 50 S dan menghambat pengikatan asam amino baru pada rantai polipeptida oleh enzim peptidil transferase.

e. **Menghambat Sintesis Asam Nukleat Sel Mikroba** (Djide, Natsir, dan Sartini., 2008)

Antimikroba yang termasuk dalam kelompok ini ialah rifampisindan golongan kuinolon. Yang lainnya walaupun bersifat antimikroba, karena sifat sitotoksitasnya pada umumnya hanya

digunakan sebagai obat antikanker, tetapi beberapa obat dalam kelompok terakhir ini dapat pula digunakan sebagai antivirus.

Rifampisin salah satu derivat rifamisin, berikatan dengan enzim polymerase-RNA (pada sub unit) sehingga menghambat sintesis RNA dan DNA oleh enzim tersebut. Golongan kuinolon menghambat enzim DNA girase pada kuman yang fungsinya menata kromosom yang sangat panjang menjadi bentuk spiral hingga bias muat dalam sel kuman yang kecil.

E. Uraian Mikroba Uji

1. *Bacillus subtilis* (Garrity G. M; Bell. J.A. and Lilburn. T.G., 2004)

a. Klasifikasi

Domain : Bacteria
Fiilum : Firmicutes
Class : Bacilli
Ordo : Bacillales
Familia : Bacillaceae

Genus : Bacillus

Spesies : *Bacillus subtilis*

b. Sifat dan morfologi

Bacillus subtilis memiliki sel berbentuk batang 0,3-2,2 μm x 1,27-7,0 μm , sebagian besar motil, flagellum khas lateral. Membentuk endospora, tidak lebih satu sel sporangium. Termasuk bakteri gram positif, bersifat kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi sejati,

fermentasi sejati, atau kedua-keduanya, yaitu respirasi dan fermentasi.

Aerobik sejati atau anaerobik fakultatif (Pelczar, Jr, M, J., 1988).

2. *Candida albicans* (Kill, M. A., 1995)

a. Klasifikasi

Filum	: Thallophyta
Subdivisio	: Deuteromycota
Class	: Deuteromycetes
Ordo	: Cryptococaceae
Genus	: Candida
Spesies	: <i>Candida albicans</i>

b. Sifat dan morfologi

Candida albicans mempunyai bentuk sel bermacam-macam, menghasilkan banyak pseudomiselium, dan berbentuk miselium sejati dan kladimidospora. Blastospora dapat dijumpai pada posisi yang khas menurut penguncupan multilateral. Disimilasi mungkin oksidatif, tetapi pada banyak spesies juga dapat sangat fermentatif. Di dalam medium cair dapat berbentuk endapan dan cincin (Pelczar, Jr, M, J., 1988).

3. *Escherichia coli* (Garrity G. M; Bell. J.A. and Lilburn. T.G., 2004)

a. Klasifikasi

Domain	: Bacteria
Filum	: Protobacteria
Class	: Gammaproteobacteria
Ordo	: Enterobacteriales

Familia : Enterobacteriaceae

Genus : Escherichia

Spesies : *Escherichia coli*

b. Sifat dan morfologi

Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif berbentuk batang lurus, 1,1-1,5 μl x 2,0-6,0 μl , motil dengan flagellum peritrikus atau non motil. Tumbuh dengan mudah pada medium nutrisi sederhana. Laktosa difermentasi oleh sebagian besar galur dengan produksi asam dan gas.

4. *Pseudomonas aeruginosa* (Garrity G. M; Bell. J.A. and Lilburn. T.G., 2004)

a. Klasifikasi

Domain : Bacteria

Filum : Protobacteria

Class : Gammaproteobacteria

Ordo : Pseudomonas

Familia : Pseudomonadaceae

Genus : Pseudomonas

Spesies : *Pseudomonas aeruginosa*

b. Sifat dan morfologi

Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri Gram negatif dengan bentuk sel tunggal, batang lurus atau melengkung, namun tidak berbentuk heliks. Pada umumnya berukuran 0,5-1,0 μm . Motil dengan

flagellum polar, monotrikus atau multitrikus. Tidak menghasilkan selongsong prosteka. Metabolisme dengan respirasi, beberapa merupakan kemolitotrof fakultatif, dapat menggunakan H₂ atau CO₂ sebagai sumber energi. Oksigen molekuler merupakan penerima elektron universal, dapat melakukan denitrifikasi dengan menggunakan nitrat sebagai penerima pilihan (Pelczar, Jr, M, J., 1988).

5. *Staphylococcus aureus* (Garrity G. M; Bell. J.A. and Lilburn. T.G., 2004)

a. Klasifikasi

Domain	: Bacteria
Filum	: Firmicutes
Class	: Bacilli
Ordo	: Bacillales
Familia	: Staphylococcaceae
Genus	: Staphylococcus
Spesies	: <i>Staphylococcus aureus</i>

b. Sifat dan morfologi

Staphylococcus aureus adalah bakteri Gram positif. Sel-sel berbentuk bola, berdiameter 0,5-1,5 µm, terdapat dalam tunggal dan berpasangan dan secara khas membelah diri lebih dari satu bidang sehingga membentuk gerombolan yang tak teratur, non motil, tidak diketahui adanya stadium istirahat. Dinding sel mengandung dua komponen utama yaitu peptidoglikan dan asam terikoat yang berkaitan dengannya. Metabolisme dengan respirasi dan fermentatif. Anaerob

fakultatif, tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dalam keadaan aerobik. Suhu optimum 35-42⁰C. Berasosiasi dengan kulit, dan selaput lendir hewan berdarah panas. Kisaran inangnya luas dan banyak galur merupakan patogen potensial (Pelczar, Jr, M, J., 1988).

6. *Staphylococcus epidermidis* (Garrity G. M; Bell. J.A. and Lilburn. T.G., 2004)

a. Klasifikasi

Domain	: Bacteria
Filum	: Firmicutes
Class	: Bacilli
Ordo	: Bacillales
Familia	: Staphylococcaceae
Genus	: Staphylococcus
Spesies	: <i>Staphylococcus epidermidis</i>

b. Sifat dan morfologi

Staphylococcus epidermidis adalah bakteri Gram positif. Sel-sel berbentuk bola, berdiameter 0,5-1,5 µm, termasuk bakteri tunggal dan berpasangan dan secara khas membelah diri lebih dari satu bidang sehingga membentuk gerombolan yang tak teratur. Anaerob fakultatif, tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dalam keadaan aerobik. Suhu optimum 35-40⁰C. Terutama berasosiasi dengan kulit, dan selaput lendir hewan berdarah (Pelczar, Jr, M, J., 1988).

Koloninya berwarna putih atau kuning dan bersifat anaerob fakultatif. Kuman ini tidak mempunyai protein A pada dinding selnya. Bersifat koagulasi negatif meragi glukosa, dalam keadaan anaerob tidak meragi manitol (Pelczar, Jr, M, J., 1988).

7. *Salmonella typhi* (Garrity G. M; Bell. J.A. and Lilburn. T.G., 2004)

a. Klasifikasi

Domain	: Bacteria
Filum	: Proteobacteria
Class	: Gammaproteobacteria
Ordo	: Enterobacteriales
Familia	: Enterobacteriaceae
Genus	: Salmonella
Spesies	: <i>Salmonella typhi</i>

b. Sifat dan morfologi

Salmonella typhi adalah bakteri Gram negatif berbentuk batang lurus dengan ukuran 0.7-1,5 μm , biasanya tunggal dan kadang-kadang membentuk rantai pendek, jenis yang bergerak berflagella peritrik, hidup secara aerobik fakultatif, meragikan glukosa dengan menghasilkan asam kadang-kadang gas. Tumbuh optimal pada suhu 37⁰C dan berkembang baik pada suhu kamar, bakteri ini dapat ditemukan di saluran pencernaan manusia dan hewan. Bakteri ini merupakan penyebab demam tifoid karena adanya infeksi akut pda usus halus manusia dan hewan (Pelczar, Jr, M, J., 1988).

8. *Vibrio sp* (Garrity G. M; Bell. J.A. and Lilburn. T.G., 2004)

a. Klasifikasi

Domain	: Bacteria
Filum	: Proteobacteria
Class	: Gammaproteobacteria
Ordo	: Vibrionales
Familia	: Vibrionaceae
Genus	: <i>Vibrio</i>
Spesies	: <i>Vibrio sp</i>

b. Sifat dan morfologi

Vibrio sp adalah bakteri Gram negatif berbentuk batang pendek, tidak membentuk spora, sumbunya melengkung atau lurus 0,5 μm , terdapat tunggal atau kadang-kadang bersatu dalam bentuk S atau spiral. Motil dengan satu flagellum polar atau pada beberapa spesies dengan dua atau lebih flagellum dan dalam satu berkas polar. Mempunyai sferoplas, biasanya dibentuk dalam keadaan lingkungan yang kurang menguntungkan, tidak tahan asam, dan tidak membentuk kapsul. Tumbuh baik dan cepat pada medium nutrisi baku metabolisme dengan respirasi dan fermentasi. Suhu optimum berkisar dari 18 sampai 37⁰C (Pelczar, Jr, M, J., 1988).

F. Metode Sterilisasi

1. Sterilisasi secara fisik (Waluyo, I., 2004. Djide, Natsir, dan Sartini., 2008)

a. Pemanasan basah

1). Otoklaf

Alat ini berupa tangki minyak yang dapat diisi dengan uap air. Otoklaf memiliki suatu ruangan yang mampu menahan tekanan di atas 1 atm. Biasanya otoklaf sudah diatur sedemikian rupa sehingga pada suhu tersebut, tekanan yang ada 1 atmosfer per 1 cm². Perhitungan waktu 15 atau 20 menit dimulai semenjak termometer pada otoklaf menunjuk 121°C.

2). Tyndalisasi

Proses sterilisasi dengan cara menggunakan pemanasan dengan suhu 100°C selama 30 menit dan dilakukan setiap hari berturut-turut selama tiga hari.

3). Pasteurisasi

Proses pemanasan pada suhu rendah yaitu 63-70°C selama 30 menit dan dilakukan setiap hari selama tiga hari berturut-turut.

b. Pemanasan kering

1). Oven

Sterilisasi ini dengan menggunakan udara panas. Asap panas yang disterilkan ditempatkan dalam oven dimana suhunya dapat mencapai 160-180°C. Oleh karena daya penetrasi panas kering tidak

sebaik panas basah, maka waktu yang diperlukan pada sterilisasi cara ini lebih lama yakni selama 1-2 jam.

2). Pembakaran

Pembakaran merupakan cara sterilisasi yang 100% efektif, tetapi cara ini terbatas penggunaannya. Cara ini biasa dipergunakan untuk mensterilkan alat penanam kuman (jarum ose/sengkelit). Yakni dengan membakarnya sampai pijar. Dengan cara ini semua bentuk hidup akan dimatikan. Pembakaran juga dilakukan untuk bangkai binatang percobaan yang mati.

c. Penyinaran dengan sinar gelombang pendek

Mikroorganisme di udara dapat dibunuh dengan penyinaran memakai sinar ultra violet. Panjang gelombang yang dapat membunuh mikroorganisme adalah di antara 220-290 nm; radiasi yang paling efektif adalah 253,7 nm.

2. Sterilisasi secara Kimia

Antiseptik kimia biasanya dipergunakan dan dibiarkan menguap seperti halnya alkohol. Umumnya isopropyl alkohol 70-90% adalah yang termurah namun merupakan antiseptik yang sangat efektif dan efisien.

3. Sterilisasi secara Mekanik

Untuk beberapa bahan yang akibat pemasakan ataupun tekanan tinggi akan mengalami perubahan ataupun penguraian, sterilisasinya harus dilakukan secara mekanik. Misalnya dengan saringan.

G. Metode Pemisahan Secara Kromatografi Lapis Tipis (Sastrohamidjojo, H., 1991)

Kromatografi merupakan salah satu cara yang sering digunakan untuk memisahkan dan memurnikan komponen-komponen dari campuran lainnya. Pemisahan komponen-komponen itu terjadi atas dasar distribusi 2 fase yaitu fase diam yang sering disebut adsorben dan fase gerak atau cairan pengelusi. Kromatografi yang biasa digunakan adalah kromatografi lapis tipis, kromatografi kertas, kromatografi kolom, dan kromatografi gas.

Kromatografi lapis tipis (KLT) adalah salah satu cara untuk memisahkan suatu komponen berdasarkan adsorpsi dan partisi. Adsorben digunakan berupa bubuk halus dari silika gel yang dibuat serba rata di atas lempeng kaca. Ukuran partikel adsorben harus halus, agar lapisan adsorben pada lempeng kaca terbentuk rata dan homogen, sehingga rembesan dari cairan pengelusi cepat dan rata, dengan demikian komponen dapat terpisah baik. Perbandingan kecepatan Bergeraknya komponen terlarut dalam fase gerak adalah dasar untuk mengidentifikasi komponen yang dipisahkan, perbandingan kecepatan ini dinyatakan dalam R_f (*Retardation of factor*).

$$R_f = \frac{\text{Jarak yang ditempuh oleh senyawa dari titik asal sampai noda yang terbentuk}}{\text{Jarak yang ditempuh oleh eluen dari titik asal sampai batas atas}}$$

Nilai R_f ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor :

- a. Ukuran partikel dari adsorben
- b. Derajat keaktifan dari lapisan adsorben
- c. Kemurnian pelarut
- d. Konsentrasi pelarut

- e. Kejenuhan ruang elusi
- f. Temperatur
- g. Keterampilan bekerja

Dengan memakai KLT, pemisahan senyawa yang amat berbeda seperti senyawa organik alam dan senyawa organik sintetik, kompleks anorganik-organik, dan bahkan ion anorganik, dapat dilakukan dalam beberapa menit dengan alat yang harganya tidak terlalu mahal. Selain itu, pelarut dan cuplikan yang digunakan jumlahnya sedikit.

H. Metode Pengujian Antimikroba

1. Metode Difusi (Djide, Natsir, dan Sartini., 2008)

Difusi adalah proses perpindahan molekul secara acak dari satu posisi ke posisi lain. Ada beberapa metode difusi yang digunakan dalam penetapan potensi, antara lain :

a. Metode lempeng bujur sangkar

Cara ini dapat dilakukan pada laboratorium yang lengkap, karena digunakan lempeng yang terbuka, sehingga harus dihindari kontaminasi dari bakteri di sekitarnya terhadap inokulum dalam lempeng. Hal ini dapat diatasi dengan pemasangan penyaring udara (Laminar Air Flow), udara disterilkan dan dialirkan secara horizontal atau vertikal. Pada lempeng bujur sangkar, ketebalam medium lebih homogen dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme yang digunakan pada penetapan potensi akan sama, sehingga efek yang

diamati hanya semata-mata yang disebabkan oleh jumlah dosis antibiotika yang diuji.

b. Metode lempeng pada cawan petri

Cara ini dapat dilakukan pada laboratorium yang sederhana, keuntungannya adalah dengan menggunakan beberapa cawan petri untuk menenpatkan inokulum, maka kemungkinan kontaminasi akan lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan lempeng bujur sangkar. Di samping itu juga ada kerugian yaitu dengan adanya variasi inokulum dalam beberapa cawan petri, maka kondisi tiap cawan petri akan berlainan. Kondisis tersebut akan mempengaruhi difusi antibiotika yang diuji dari pencadang ke medium agar sekitarnya.

c. Pencadang atau reservoir

Sebagai pencadang pada lempeng digunakan silinder dari kaca, logam tahan karat, silinder kapiler, merjan tulang ikan, cetak lubang (*Punche hole*), cakram kertas (*paper disc*), yang masing-masing mempunyai keuntungan dan kerugian. Pencadang tersebut mempunyai ukuran diameter luar 8 mm, diameter dalam 6 mm dan tinggi 10 mm.

Penggunaan silinder gelas dan logam tahan karat sebagai pencadang mempunyai keuntungan yaitu jumlah larutan uji di dalam silinder dapat diperbanyak untuk menjamin ketersediaannya. Jumlah larutan antibiotika yang digunakan biasanya diatur sesuai kapasitas.

2. Metode Dilusi (Turbidimetri)

Prinsip pengujian potensi antibiotika dengan metode ini adalah membandingkan derajat hambatan pertumbuhan mikroorganisme uji oleh dosis antibiotika yang diuji terhadap hambatan yang sama oleh dosis antibiotika baku pembanding dalam media cair.

Dalam metode ini, koefisien difusi antibiotika tidak lagi berperan dalam hambatan pertumbuhan mikroorganisme uji potensi dengan metode ini adalah lama waktu inkubasi dan keseragaman suhu selama waktu inkubasi.

I. *KLT Bioautografi* (Djide, Natsir, dan Sartini., 2008)

Uji kromatografi merupakan metode spesifik untuk mendeteksi bercak pada kromatogram hasil KLT (kromatografi lapis tipis) yang memiliki aktivitas antibakteri, antifungi, dan antivirus, sehingga mendekati separasi dengan uji biologis. Ciri khas dari prosedur bioautografi adalah didasarkan atas teknik difusi agar, dimana senyawa antimikrobanya dipindahkan dari lapisan KLT ke medium agar yang telah diinokulasikan dengan merata bakteri uji yang peka. Dari hasil inkubasi pada suhu dan waktu tertentu akan terlihat zona hambatan disekeliling dari spot dari KLT yang telah ditempelkan pada media agar. Zona hambatan ditampakkan oleh aktivitas senyawa aktif yang terdapat di dalam bahan yang diperiksa terhadap pertumbuhan mikroorganisme uji.

Keuntungan metode ini adalah sifatnya yang efisien untuk mendeteksi adanya senyawa antimikroba karena letak bercak dapat ditentukan walaupun berada dalam campuran yang kompleks sehingga memungkinkan untuk

mengisolasi senyawa aktif tersebut. Kerugiannya adalah metode ini tidak dapat digunakan untuk menentukan KHM dan KBM.

Bioautografi dapat dibagi atas tiga kelompok yaitu :

1. Bioautografi langsung

Dimana mikroorganisme tumbuh secara langsung diatas lempeng kromatografi lapis tipis (KLT). Prinsip kerja dari metode ini adalah suspensi mikroorganisme uji yang peka dalam medium cair disemprotkan pada permukaan kromatografi lapis tipis (KLT) yang telah dihilangkan sisa-sisa eluen yang menempel pada lempeng kromatogram. Setelah itu dilakukan inkubasi pada suhu dan waktu tertentu. Pengeringan kromatogram dilakukan secara hati-hati dengan menggunakan "*hair dryer*" untuk menghilangkan sisa eluen. Senyawa dalam lempeng kromatogram dideteksi dengan menggunakan sinar UV pada panjang gelombang 254 nm dan 366 nm. Setelah diketahui letak dan jumlah senyawa aktif yang terpisah atau terisolasi, dengan timbulnya noda (spot) pada lempeng KLT, selanjutnya disemprotkan suspensi bakteri uji sebanyak 5-6 ml diatas permukaan lempeng KLT tadi secara merata. Besarnya lempeng KLT yang sering digunakan adalah 20x20 cm dan untuk meratakan suspensi bakteri yang telah disemprotkan dapat menggunakan alat putar atau "*roller*" yang dilapisi dengan kertas kromatogram. Lempeng KLT diinkubasi semalam (1x24 jam) dalam boks plastik dan dilapisi dengan kertas, kemudian disemprot dengan 5 ml larutan cair TTC (20 mg/ml) atau INT (5 mg/ml), INTB (5 mg/ml) serta

MTT (2,5 mg/ml) dan selanjutnya diinkubasi kembali selama 4 jam pada suhu 37⁰C (Djide, Natsir, dan Sartini., 2008).

2. Bioautografi kontak

Dimana senyawa antimikroba dipindahkan dari lempeng KLT kemedium agar yang telah diinokulasikan bakteri uji yang peka secara merata dan melakukan kontak langsung. Metode ini didasarkan atas difusi dari senyawa yang telah dipisahkan dengan kromatografi lapis tipis (KLT) atau kromatografi kertas. Lempeng kromatografi tersebut ditempatkan diatas permukaan medium nutrient agar yang telah diinokulasikan dengan mikroorganisme yang sensitif terhadap senyawa antimikroba yang dianalisis. Setelah 15-30 menit, lempeng kromatografi tersebut dipindahkan diangkat dari permukaan medium. Senyawa antimikroba yang telah berdifusi dari lempeng kromatogram ke dalam media agar akan menghambat pertumbuhan bakteri setelah diinkubasi pada waktu dan suhu yang tepat sampai noda yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme uji tampak pada permukaan membentuk zona yang jernih. Dan untuk memperjelasnya digunakan indikator aktivitas dehidrogenase (Djide, Natsir, dan Sartini., 2008).

3. Bioautografi pencelupan

Dimana medium agar telah diinokulasikan dengan suspensi bakteri dituang diatas lempeng kromatografi lapis tipis (KLT). Prinsip kerja dari metode ini adalah lempeng kromatografi yang telah dielusi, diletakkan dalam cawan petri, sehingga permukaannya tertutup oleh medium

agar yang berfungsi sebagai “*base layer*” setelah medium agar memadat (base layernya memadat), selanjutnya dituangi medium yang telah disuspensikan dengan kultur mikroba yang telah disuspensikan mikroba uji yang berfungsi sebagai “*seed layer*”. Kemudian diinkubasikan pada suhu dan waktu yang sesuai (Djide, Natsir, dan Sartini., 2008).

J. Tinjauan Islam Mengenai Alga dan Manfaatnya

Alga memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan dalam kehidupan manusia, termasuk penggunaannya dalam dunia kesehatan. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya potensial alga sebagai penghasil senyawa antibiotika. Antibiotika merupakan zat-zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme, yang mempunyai kemampuan menghambat atau mematikan mikroorganisme lain. Antibiotika telah menjadi salah satu kebutuhan utama dalam dunia kesehatan untuk mengobati penyakit infeksi. Infeksi adalah timbulnya penyakit tertentu yang disebabkan oleh adanya gangguan mikroorganisme.

Allah SWT menciptakan mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia, dan Allah SWT pula yang menghendaki terciptanya obat dari mikroorganisme tersebut sebagai antibiotika. Hal ini membuktikan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT yang telah menciptakan segala sesuatu di dunia ini dengan manfaat yang beraneka ragam, dan dia pulalah yang mengatur semuanya dengan segala keteraturan yang sempurna. Alam dan segala isinya, termasuk manusia, hewan dan tumbuhan diciptakan dengan berbagai macam rahasia yang belum terungkap sehingga dibutuhkan kajian yang mendalam tentang ciptaanNYA. Allah berfirman dalam Q.S Ali-Imran/3 : 191

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya :

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.

Menurut pendapat M.Quraish shihab tentang ayat ini yaitu mereka adalah orang-orang, baik lelaki maupun perempuan, yang terus-menerus mengingat Allah, dengan ucapan dan hati dalam seluruh situasi dan kondisi saat bekerja atau istirahat, sambil berdiri atau dalam keadaan berbaring, atau bagaimanapun dan mereka memikirkan tentang penciptaan, yakni kejadian dan sistem kerja langit dan bumi dan setelah itu berkata sebagai kesimpulan “Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan alam raya dan segala isinya ini dengan sia-sia, tanpa tujuan yang hak”. Apa yang kami alami atau lihat, atau dengar dari keburukan atau kekurangan (Shihab, M.Quraish., 2002).

Kelompok tumbuh-tumbuhan merupakan salah satu ciptaan Allah yang banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan manusia, diantaranya dalam bidang pangan, perindustrian, serta dalam bidang kesehatan. Salah satunya yaitu kelompok alga yang potensial untuk dikembangkan diberbagai sektor.

Dalam Q.S Al-Nazir/ 79: 31-33

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَهَا ﴿٧٩﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَدَهَا ﴿٨٠﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمْ ﴿٨١﴾

Terjemahnya :

Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancang-Nya dengan teguh, (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Menurut pendapat M. Quraish shihab, ayat di atas menerangkan tentang kuasa Allah dan menggambarkan betapa besar nikmatnya kepada manusia. Kata “*mar’aha*” pada mulanya berarti tempat penggembalaan tetapi ia juga dapat berarti rerumputan dan makanan binatang. Agaknya kata itu dipilih walau yang dimaksud ayat di atas adalah tumbuhan secara umum baik yang dimakan manusia maupun binatang karena konteks ayat ini berbicara tentang mereka yang kafir lagi menolak keniscayaan hari kiamat. Thahir ibn Asyur memperoleh kesan dari penyebutan kata yang hanya khusus digunakan untuk binatang ternak ini bahwa ini menunjukkan rahmat Allah yang demikian luas kepada makhluknya karena kepada binatang saja dia telah menyiapkan bahan pangannya apalagi kepada manusia kekurangan (Shihab, M. Quraish, 2002).

Ayat di atas menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah SWT kepada makhluknya dengan menciptakan dan menyediakan segala kebutuhan seluruh makhluk ciptaannya tanpa terkecuali, dimana Allah telah menciptakan alga merah (*Euchema cottonii*) yang dapat dimanfaatkan oleh manusia tidak hanya sebagai bahan makanan, tetapi juga sebagai bahan pengobatan.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan khususnya dibidang kefarmasian, maka semakin banyak pula rahasia-rahasia dari ayat-ayat Al-qur’an dan Hadist-hadist nabi yang selama ini menjadi misteri, akhirnya dapat dibuktikan makna dan kebenarannya. Dalam dunia kesehatan, kelompok alga dapat digunakan dalam pengobatan penyakit infeksi karena mampu menghasilkan

senyawa antibiotik. Infeksi merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya gangguan dari mikroorganisme. Allah berfirman dalam Q.S Al-Rahman/55 : 19-20.

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿٥٥﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya :

Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya Kemudian bertemu, Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing.

Sebagian ayat-ayat Al-qur'an menjelaskan akan pentingnya lautan bagi kehidupan itu sama halnya dengan daratan. Karena itu kata "*Al Bahri*" disebutkan dalam Al-qur'an sebanyak 33 kali dan beberapa kali dirangkai bersama dengan kata "*Al Barri*". Ayat ini seakan-akan mendorong manusia berusaha dan berfikir semaksimal mungkin, dimana laut dan segala isinya itu dapat dimanfaatkan untuk keperluannya, demikian pula alam semesta ini.

Dalam Q.S Al-Maidah/5 : 96, Allah SWT berfirman :


أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ وَلِلسَّيْرَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ
الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Terjemahnya :

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.

Menurut pendapat M. Quraish Shihab tentang ayat diatas yaitu karena redaksi ayat berbicara tentang perburuan secara umum, tanpa menjelaskan apakah ia menyangkut binatang darat atau laut, maka dari ayat diatas dinyatakan bahwa dihalalkan bagi kamu berburu binatang buruan laut juga sungai, danau atau

tambak dan makanannya yang berasal dari laut seperti ikan, udang atau apapun yang hidup disana dan tidak dapat hidup di darat walaupun telah mati dan mengapung, adalah makanan lezat bagi kamu. Ayat tersebut menegaskan larangan berburu binatang darat dalam keadaan berihram atau ketika berada di tanah haram. Bahwa tidak ada larangan berburu binatang laut dan sungai, bukan saja karena sangat melimpah tetapi juga karena di mekkah dan sekitar daerah tanah haram tidak terdapat laut atau sungai (Shihab, M.Quraish, 2002).



BAB 111

METODE PENELITIAN

A. *Alat dan Bahan*

1. **Alat**

Autoklaf (*Hirayama*), bejana maserasi, cawan petri (*Pyrex*), gelas erlenmeyer (*Pyrex*), gelas ukur 100 ml (*Pyrex*), inkubator (*Memmert*), Laminator air flow (*Esco*), lampu spiritus, lampu UV 254 nm dan 366 nm, lemari pendingin, ose bulat, oven (*Memmert*), penangas air, rotavapor (*Heidolph*), sentrifuge, spoit 10 ml, tabung reaksi (*Pyrex*), timbangan analitik (*Preciso*) dan vial.

2. **Bahan**

Air suling, biakan murni (*Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhosa*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus mutans*, *Staphylococcus epidermidis*, dan *candida albicans*), etanol 96%, medium Glukosa Nutrient Agar (GNA), medium Nutrien Broth (NB), dan sampel Alga *Euchema cottonii*.

B. *Metode Kerja*

1. **Pengambilan sampel**

Lokasi pengambilan alga *Euchema cottonii* berasal dari Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan.

2. **Pengolahan sampel**

Alga *Euchema cottonii* dibersihkan dan dicuci dengan air laut setelah dipisahkan dari bagian yang tidak diperlukan, sampel lalu

dibersihkan dari kotoran-kotoran yang melekat dengan menggunakan air yang mengalir selama 10 menit kemudian dipotong-potong kecil, siap untuk diekstraksi.

3. Ekstraksi dan partisi

Alga merah *Euchema cottonii* yang telah diolah ditimbang sebanyak 300 gr kemudian dimasukkan dalam bejana maserasi, lalu ditambahkan etanol 96% hingga terendam seluruh sampel, dan dibiarkan selama 5 hari dengan pengadukan beberapa kali. Setelah itu, disaring dan ampasnya direndam kembali dengan cairan penyari yang baru sebanyak 2 kali. Hasil penyarian yang didapat lalu dipekatkan dengan menggunakan rotavapor sampai diperoleh ekstrak etanol kental. Ekstrak etanol yang telah didapat kemudian dipartisi padat-cair dengan n-heksan. Sehingga didapatkan senyawa fraksi larut n-heksan dan tidak larut n-heksan. Ekstark n-heksan, tidak larut n-heksan dan ekstrak etanol yang digunakan sebagai sampel uji untuk skrining antimikroba.

4. Penyiapan mikroba uji

a. Sterilisasi alat

Alat-alat yang diperlukan dicuci dengan deterjen, wadah mulut lebar dibersihkan dengan direndam dengan larutan deterjen panas 0,1% dan terakhir dengan air suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi perkamen. Tabung reaksi dan gelas erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dari kaca disterilkan di oven pada suhu 180⁰C selama 2 jam. Alat-alat suntik

dan alat-alat plastik lainnya (tidak tahan pemanasan tinggi) disterilkan dalam otoklaf pada suhu 121⁰C selama 15 menit dengan tekanan 2 atm. Jarum ose disterilkan dengan pemanasan langsung hingga memijar.

b. Peremajaan mikroba uji

Mikroba uji berupa *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella typhosa*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus mutans*, *Staphylococcus epidermidis*, dan *candida albicans*, diambil masing-masing satu ose dari biakan murni kemudian diinokulasikan pada medium GNA miring, lalu diinkubasi pada suhu 37⁰C selama 24 jam untuk bakteri dan pada suhu kamar selama 72 jam untuk jamur.

c. Pembuatan suspensi mikroba uji

Mikroba hasil peremajaan masing-masing disuspensikan dengan larutan NaCl 0,9% steril kemudian diukur dengan transmitannya menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 580 nm pada 25% T untuk bakteri dan 75% untuk jamur, sebagai blanko digunakan larutan NaCl 0,9% steril.

5. Pengujian skrining antimikroba

Ekstrak etanol ditimbang 10 mg lalu dilarutkan dengan DMSO sebanyak 0,2 ml. Setelah larut ekstrak ditambahkan medium GNA 9,8 ml sehingga diperoleh konsentrasi 1 mg/ml. Campuran tersebut dituang kedalam cawan petri lalu dihomogenkan dan dibiarkan memadat. Semua

mikroba yang telah disuspensikan, masing-masing diambil dengan menggunakan ose dan digores di atas medium yang memadat. Lalu diinkubasi pada suhu 37⁰C selama 24 jam untuk bakteri dan pada suhu kamar selama 72 jam untuk jamur.

Perlakuan yang sama juga dilakukan pada ekstrak larut n-heksan dan ekstrak tidak larut n-heksan. Kemudian diamati ekstrak yang memberikan aktivitas penghambatan terhadap mikroba uji, yang ditandai dengan tidak adanya atau sedikitnya pertumbuhan mikroba uji.

6. Pengujian aktivitas antimikroba

Untuk pengujian potensi antimikroba, digunakan ekstrak larut n-heksan yang menunjukkan aktivitas antimikroba pada uji skrining terhadap mikroba uji *Staphylococcus epidermidis*, *Pseudomonas aeruginosa* dan *Escherichia coli*.

a. Pemisahan senyawa secara kromatografi lapis tipis (KLT)

Ekstrak larut n-heksan dipisahkan secara KLT dengan menggunakan campuran eluen n-heksan : etil asetat (7:1), kemudian kromatogram yang dihasilkan diamati bercaknya di bawah sinar UV pada panjang gelombang 254 nm dan 366 nm serta penampak bercak H₂SO₄ 10%.

b. Pengujian Secara KLT-Bioautografi

Ke dalam cawan petri dituang medium GNA sebanyak 10 ml dan ditambahkan suspensi bakteri uji sebanyak 0,02 ml lalu dihomogenkan. Kromatogram hasil pemisahan senyawa secara KLT kemudian diletakkan di atas permukaan medium yang memadat.

Setelah 60 menit, lempeng (kromatogram) diangkat dan dikeluarkan.

Diamati daerah hambatan yang terbentuk.

7. Identifikasi bercak aktif dengan beberapa penampak bercak

Identifikasi bercak aktif kemudian disemprotkan dengan menggunakan beberapa pereaksi berikut :

1. Flavanoid

Pereaksi yang digunakan Aluminium klorida di lampu UV 366 nm, akan dihasilkan noda berfluoresensi kuning untuk senyawa golongan flavanoid.

2. Fenol

Pereaksi yang digunakan Besi (III) klorida akan dihasilkan warna biru atau hijau untuk senyawa golongan fenol.

3. Penampak bercak H_2SO_4

Dipanaskan pada suhu $105^{\circ}C$ selama 5 menit dan diamati. Kebanyakan senyawa organik memberikan warna kuning, coklat, dan hitam.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil ekstraksi Alga *Euchema cottonii*

Setelah dilakukan ekstraksi Alga Merah *Euchema cottonii* sebanyak 300 gram secara maserasi dengan pelarut etanol 96% maka diperoleh hasil ekstraksi *Euchema cottonii* terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil ekstraksi *Euchema cottonii*

No	Ekstrak	Bobot (gram)
1	Etanol	12, 3251
2	Larut heksan	8, 8242
3	Tidak Larut Heksan	6, 3817

2. Pengujian skrining antimikroba

Setelah dilakukan uji skrining pada masing-masing ekstrak *Euchema cottonii* (larut heksan dan tidak larut heksan) terhadap beberapa mikroba uji yaitu *Salmonella typhi*, *Streptococcus mutans*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus epidermidis*, dan *Candida albicans* maka diperoleh hasil skrining (dapat dilihat pada tabel 2 dan gambar 2, 3, 4 dan 5).

Tabel 2. Hasil uji skrining antimikroba ekstrak *Euchema cottonii* pada konsentrasi 1 mg/ml.

No	Ekstrak	Mikroba uji						
		ST	SM	SA	SE	PA	EC	Ca
1	Ekstrak etanol	-	-	-	-	+	+	+
2	Ekstrak larut n-heksan	-	-	-	+	+	+	+
3	Ekstrak tidak larut n-heksan	-	-	-	-	-	+	+

Keterangan :

ST : *Salmonella typhi*

SM : *Streptococcus mutans*

SA : *Staphylococcus aureus*

SE : *Staphylococcus epidermidis*

PA : *Pseudomonas aeruginosa*

EC : *Escherichia coli*

Ca : *Candida albicans*

+ : Bakteri yang menghambat

- : Bakteri yang tidak menghambat

3. Hasil pengujian potensi antimikroba

a. Hasil pemisahan dan pengujian senyawa secara KLT

Pemisahan dan pengujian senyawa ekstrak larut heksan secara KLT menggunakan campuran heksan : etil (7:1) dengan penampak bercak lampu UV 254 nm dan diperoleh 4 bercak. Pada penampak bercak lampu UV 356 nm dan diperoleh 6 bercak. Dan pada penampak bercak H₂SO₄ diperoleh 5 bercak.

Hasil pemisahan dan pengujian senyawa secara KLT (dapat dilihat pada tabel 3 dan lampiran 4, 5 dan 6).

Tabel 3. Hasil pemisahan dan pengujian senyawa secara KLT ekstrak larut heksan *Euchema cottonii* menggunakan campuran eluen heksan : etil asetat (7:1)

Bercak	Rf	Penampak noda			Uji aktif	Bakteri yang dihentikan
		UV 254	UV 366	H ₂ SO ₄		
1	0,74	-	Biru	-	+	EC
2	0,70	-	-	Kuning	-	-
3	0,63	Kuning muda	-	-	-	-
4	0,38	-	Pink	Kuning	-	-
5	0,36	Kuning	-	-	-	-
6	0,29	-	-	Hitam	-	-
7	0,27	Orange	Ungu	-	+	PA dan SE
8	0,21	-	Biru	Kuning	-	-
9	0,14	Kuning muda	Pink	-	-	-
10	0,09	-	Orange	Coklat	-	-

Keterangan :

EC = *Escherichia coli*

PA = *Pseudomonas aeruginosa*

SE = *Staphylococcus epidermidis*

b. Pemisahan komponen kimia aktif

Pada pengujian komponen kimia ekstrak larut heksan *Euchema cottonii* dengan pereaksi Aluminium klorida dan Besi (III) klorida diperoleh hasil. Hasil identifikasi komponen kimia aktif (dapat dilihat pada tabel 4 dan lampiran 7).

Tabel 4. Hasil pengujian identifikasi komponen kimia aktif dari kromatogram ekstrak larut heksan *Euchema cottonii* dengan menggunakan pereaksi Aluminium klorida dan Besi (III) klorida

Bercak	Rf	Warna pada penampak bercak Aluminium klorida dan Besi (III) klorida	Keterangan
1	0,74	Berpendar/ berfluoresensi kuning	+ Flavanoid
2	0,27	Biru kehijauan	+ Fenolik

B. Pembahasan

Alga memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan dalam kehidupan manusia, termasuk penggunaannya dalam dunia kesehatan. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya potensial alga sebagai penghasil senyawa antibiotika. Antibiotika merupakan zat-zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme, yang mempunyai kemampuan menghambat atau mematikan mikroorganisme lain. Allah SWT menciptakan mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia, dan Allah SWT pula yang menghendaki terciptanya obat dari mikroorganisme tersebut sebagai antibiotika. Allah berfirman dalam Q.S Ali-Imran/3 : 191

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya :

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.

Penelitian tentang khasiat antimikroba dari *Euchema cottonii* belum banyak dilakukan, sehingga penelitian ini lebih ditujukan pada khasiat *Euchema cottonii* untuk pengobatan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroba, sehingga untuk mengetahui khasiatnya sebagai antimikroba maka dilakukan pengujian aktivitas antimikroba *Euchema cottonii* dengan metode KLT.

Sampel *Euchema cottonii* yang telah dicuci, dipotong kecil-kecil dengan maksud untuk memperluas permukaan bidang sentuh antara sampel dan pelarut sehingga penyarian dapat lebih efektif, kemudian diekstraksi dengan metode maserasi yang merupakan metode dingin (proses ekstraksi tanpa pemanasan). Karena maserasi adalah proses ekstraksi menggunakan pelarut diam atau dengan beberapa kali pengocokan pada suhu ruangan. Etanol 96% digunakan sebagai cairan penyari karena bersifat polar maupun non polar, sehingga diharapkan semua komponen kimia dalam sampel dapat terekstraksi.

Pemilihan sampel *Euchema cottonii* berasal dari Kabupaten Jeneponto dimana Jeneponto merupakan daerah sentral pengembangan alga laut di daerah Sulawesi Selatan khususnya alga merah (*Rhodophyta*, yang mana memiliki biodiversitas lebih tinggi dibandingkan dengan alga coklat (*Phaeophyta*) dan alga hijau (*Chlorophyta*).

Ekstrak etanol yang diperoleh dipekatkan dengan rotavapor sampai diperoleh ekstrak etanol kental. Setelah diperoleh ekstrak etanol kental kemudian dilanjutkan dengan partisi cair-padat. Partisi digunakan untuk

memisahkan komponen kimia berdasarkan tingkat kepolarnya. Partisi cair-padat merupakan pemisahan komponen kimia berdasarkan kepolaran tinggi dan kepolaran rendah. Kepolaran tinggi untuk senyawa tidak larut heksan dan kepolaran rendah untuk senyawa larut heksan. Hasil pemisahan yang diperoleh yaitu senyawa polar untuk senyawa larut heksan. Selain itu, pemisahan yang dilakukan dimaksudkan agar memudahkan dalam penelusuran senyawa aktif tertentu dari ekstrak.

Selanjutnya, dilakukan pengujian skrining aktivitas antimikroba dilakukan terhadap bakteri *Salmonella typhi*, *Streptococcus mutans*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus epidermidis*, dan *Candida albicans*.

Mikroba uji yang akan digunakan terlebih dahulu diukur transmitannya pada 25% T yang dapat diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang maksimum 580 nm. Pada konsentrasi ini mikroba dalam jumlah optimum untuk dilakukan pengujian.

Adapun pemilihan mikroba uji tersebut karena sifat-sifatnya yang patogenik. *Staphylococcus aureus* merupakan bakteri kokus Gram positif yang bersifat patogenik penyebab infeksi kulit dan keracunan makanan sedangkan *Staphylococcus epidermidis* merupakan penyebab infeksi alat kateter yang dapat menyebabkan endokarditis serta infeksi kulit. *Streptococcus mutans* merupakan bakteri aerob atau anaerob Gram positif yang dapat menyebabkan karies pada gigi. *Bacillus subtilis* termasuk bakteri batang besar, Gram positif, aerob yang dapat tumbuh pada makanan

dan menyebabkan keracunan pada makanan. *Escherichia coli* dan *Salmonella typhi* merupakan bakteri anaerobik fakultatif Gram negative yang bersifat patogenik penyebab utama diare kronik, tifoid dan infeksi saluran kemih. *Pseudomonas aeruginosa* merupakan bakteri aerob, gram negative yang bersifat invasid dan toksigenik menyebabkan infeksi pada mata. *Candida albicans* merupakan jamur yang bersifat patogenik penyebab *candidiasis* atau vaginitis.

Medium Glukosa Nutrien Agar (GNA) merupakan medium agar yang digunakan pada metode dilusi padat dan untuk menumbuhkan biakan mikroba uji. Prinsip kerja dilusi padat ini adalah membandingkan derajat hambatan pertumbuhan mikroorganisme uji oleh dosis antibiotika yang diuji terhadap hambatan yang sama oleh dosis antibiotika baku pembanding dalam media cair.

Dalam metode ini, koefisien difusi antibiotika tidak lagi berperan dalam hambatan pertumbuhan mikroorganisme uji yang digunakan. Yang mempengaruhi keberhasilan uji potensi dengan metode ini adalah lama waktu inkubasi dan keseragaman suhu selama waktu inkubasi.

Untuk mencari ekstrak aktif, dilakukan uji skrining antimikroba ekstrak etanol, ekstrak larut heksan, dan ekstrak tidak larut heksan dengan menggunakan metode dilusi padat dengan konsentrasi 1 mg/ml. Ekstrak dikatakan aktif jika pada konsentrasi 1 mg/ml menunjukkan hambatan pertumbuhan mikroba, maka ekstrak tersebut potensial untuk diteliti lebih lanjut daya antimikrobanya (Hoffman, 1991).

Hasil uji skrining aktivitas antimikroba menunjukkan bahwa ekstrak larut heksan dengan konsentrasi 1 mg/ml mempunyai hambatan pertumbuhan mikroba yang aktif terhadap bakteri *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, dan *Staphylococcus epidermidis* sehingga ekstrak larut heksan potensial untuk diteliti lebih lanjut daya antimikrobanya.

Untuk mengetahui senyawa yang memberikan aktivitas antimikroba dari ekstrak larut heksan *Euchema cottonii*, maka pengujian dilanjutkan dengan metode KLT-Bioautografi yaitu metode kontak. Prinsip kerja dari metode ini didasarkan atas difusi dari senyawa yang telah dipisahkan dengan kromatografi lapis tipis.

Pengujian secara KLT-Bioautografi dilakukan terhadap senyawa hasil pemisahan ekstrak larut heksan secara kromatografi lapis tipis menggunakan campuran eluen heksan : etil asetat (7 : 1) dan diperoleh 4 bercak pada lampu UV 254 nm, 6 bercak pada UV 366 nm dan 5 bercak pada H₂SO₄. Berdasarkan hasil KLT-Bioautografi tersebut, menunjukkan bahwa bercak pada nilai Rf 0,27 memberikan aktivitas antimikroba terhadap *Pseudomonas aeruginosa* dan *Staphylococcus epidermidis* dan nilai Rf 0,74 memberikan aktivitas antimikroba terhadap *Escherichia coli*.

Setelah dilakukan identifikasi komponen kimia dengan menggunakan pereaksi penampak bercak dapat diketahui bahwa pada ekstrak larut heksan terdapat 2 bercak. Dimana Fenol diidentifikasi dengan menggunakan penampak bercak Besi (III) klorida pada bercak dengan nilai Rf 0,27 menghasilkan warna biru kehijauan dan Flavanoid diidentifikasi

dengan menggunakan penampak bercak Aluminium klorida pada bercak dengan nilai R_f 0,74 menghasilkan warna berfluoresensi kuning.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap sampel *Euchema cottonii*, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Ekstrak etanol larut n-heksan alga merah *Euchema cottonii* dapat memberikan aktivitas antimikroba yang lebih aktif dibandingkan dengan ekstrak etanol dan ekstrak etanol tidak larut n-heksan terhadap bakteri *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* dan *Staphylococcus epidermidis*.
2. Senyawa yang memberikan aktivitas antimikroba adalah senyawa flavanoid dan fenol
3. Semua yang ada di bumi ini adalah karunia Allah SWT yang dianugerahkan kepada manusia sebagai tanda kemurahan-Nya, agar dengan demikian manusia mensyukurinya. Amat banyak lagi karunia Allah yang lain yang belum ditemukan manusia, karena itu hendaklah manusia berusaha dan berfikir bagaimana cara menemukannya.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan memformulasikan sediaan dari ekstrak larut n-heksan *Euchema cottonii*.
2. Sebagai makhluk hidup yang diberi akal oleh Allah SWT, kita dituntut untuk berusaha dan tidak putus dalam mempelajari segala yang diciptakan Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, 2000. *Pengunaan Antimikroba Secara Bijak Untuk Meminimalkan Resistensi*, Instalasi RSUD. Soetomo; Surabaya.
- Anonymous ; *Rumput Laut, Lezat dan Menyehatkan*. Available at www.Indonesia.go.id. Diakses 27 november 2009.
- Budikusuma, R.Arief, 2008. *Proses Pengemasan dan Transportasi Bibit Rumput Laut Eucheema cottonii di Lombok Tengah, NTB*.
- Departemen Agama RI, 2005, “ *Al-Qur’an dan terjemahnya*”, PT. Syaamil Cipta Medika, Bandung.
- DKP Banten, 2007. *Transportasi Bibit Rumput Laut Eucheema cottonii*, (online) (File ://A/transportasi bibit at my blog.htm. Diakses 24 November 2008)
- Djide, Natsir, dan Sartini., 2008. *Dasar-Dasar Mikrobiologi Farmasi*, Lembaga Penerbit UNHAS. Makassar.
- Endang, E; 2007. *Isolasi dan Karakteristik Komponen Kimia Aktif Antibakteri Ekstrak Etil Asetat Rumput Laut Turbinaria murayana*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Farmasi. Universitas Muslim Indonesia, Makassar.
- Eri, Bachtiar; 2007. *Penelusuran Sumber Daya Hayati Laut (Alga) sebagai Biotarget Industri*, UNPAD. Makassar.
- Garrity G. M; Bell. J.A. and Lilburn. T.G., *Taxonomic Outline of The Prokaryotes Bergey’s Manual of Systematic Bacteriologi, 2 th Edition, United States of America, Springer, New York Berlin Hendelberg*. 2004.
- Indriani, H., dan Emi sumiarsih, 2003. *Rumput Laut (Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran)*, PT., Penebar Swadaya, Jakarta.
- Ireland, e.M., et all, 1988. *Uniqueness of the marine chemical environment : categories of marine natural products from Invertebrates, In : Biomedical Importance of Marine Organisms (Memoirs of California Academy of Sciences Number 13)*.
- Junaedi, Wahid, 2004. *Rumput Laut, Jenis dan Morfologinya*. DEPDIKNAS. Jakarta.
- Kanisius, L,M., 1991. *Budidaya Rumput Laut ; Yogyakarta*.
- Kill, M. A., 1995. *Candida A Practical hand Book for Sufferers*, Bloomsburry, London.

- Pelczar, Jr, M, J., 1988. *Dasar-Dasar Mikrobiologi*, Penerjemah R.S. Hadioetomo dkk, UI Press. Jakarta.
- Pratiwi, Sylvia T., 2008. *Mikrobiologi Farmasi*, Erlangga.
- Puslit biotek LIPI, 2006. *Biotrends Majalah Populer Bioteknologi Volume 1 Nomor 2*, Bogor.
- Rianto, S., 2007. *Pengantar Antimikroba*. Departemen Farmakologi dan Terapeutik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia : Jakarta.
- Rismana, E., 2001. *Biota Laut Berpotensi Besar Jadi Sumber Bahan Baku Obat Dari Industri Farmasi*, (online) (<file:///A:/Biota%20Laut%20Berpotensi%20Besar%20.htm>). Diakses 04 Januari 2010).
- Romimuharto, K., dan Sri Juwana, 1999. *Biologi Laut*. Jakarta : Puslitbang oseanologi LIPI.
- Samsuari, 2006. *Deskripsi Euchema cottonii*, Ui; Jakarta.
- Sastrohamidjojo, H., 1991. *Kromatografi*. Liberty : Yogyakarta.
- Shanmugan, M. dan K.H Mody. 2000. *Heparinoid-active Sulphated Polysaccharides from Marine Algae as Potential Blood Anticoagulant Agents*. Marine Algae & Marine Environment Discipline. Central Salt & Marine Chemicals Research Institute. Bhavnagar, 364002, India. <http://www.ias.ac.in/cuusci/dec252000/1672.pdf>, diakses 05 April 2005.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran, Volume 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal 573-575.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran, Volume 9. Jakarta: Lentera Hati, . 2002, hal 255-262,187.
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran, Volume 10. Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal 299.
- Suptijah, P. 2003. *Rumput Laut, Prospek dan Tantangannya*. http://members.tripod.com/ugm2/mti_101.htm 28/03/05, 21: 10: 08.
- Tobo, Burhanuddin. *Buku Pegangan Laboratorium Fitokimia I*. Makassar : Laboratorium Fitokimia Jurusan Farmasi Fakultas MIPA, Universitas Hasanuddin, 2001.
- Waluyo, I., 2004. *Mikrobiologi Umum*. Universitas Muhammadiyah : Malang.