

**PENGARUH KONSENTRASI SARI UBI KAYU TERHADAP
MUTU PRODUK NATA DE CASSAVA**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar**

Oleh


RATI FITRIANI

NIM. 70100106043

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperolehnya batal demi hukum.



Makassar, Juni 2010

Penulis,

Rati Fitriani

NIM: 70100106043

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Konsentrasi Sari Ubi Kayu Terhadap Mutu Produk Nata de Cassava” yang disusun oleh Rati Fitriani NIM: 70100106043, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Jum’at, 20 Agustus 2010 M, yang bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1431 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar, 20 Agustus 2010 M
10 Ramadhan 1431 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua Penguji : **Gemy Nastity H, S.Si, M.Si, Apt.** (.....)

Sekretaris Penguji : **Isriany Ismail, S.Si.** (.....)

Penguji I : **Haeria, S.Si.** (.....)

Penguji II : **Drs. H. M. Saleh Ridwan, M. Ag** (.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

dr. H. M. Furqaan Naiem, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19580404 198903 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-NYA yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt., selaku pembimbing pertama dan Ibu Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt., selaku pembimbing kedua atas segala keikhlasannya memberikan bimbingan, motivasi serta meluangkan waktu, tenaga, pikiran kepada penulis sejak rencana penelitian sampai tersusunnya skripsi ini, semoga bantuan dan bimbingannya selama penulis menempuh pendidikan dan melakukan penelitian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Kepada penasehat akademik sekaligus sebagai penguji pertama Ibu Haeria, S.Si., dan Drs. H. Muhammad Saleh Ridwan, M.Ag., selaku penguji agama. Serta mantan Ketua Jurusan Farmasi Abd. Rahim, S Si. M Si., Apt. Penulis mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga atas segala perhatian, nasehat, dan bantuannya selama penulis menempuh pendidikan dan melakukan penelitian.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak dr. M. Furqaan Naiem M. Sc., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Drs. Stang M.Kes., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Drs. Supardin M. HI., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Ibu Gemy Nastity Handayani S Si. M.Si., Apt., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Bapak/Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasa-jasanya mendapatkan balasan dari Allah SWT. Serta seluruh staf Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penghargaan setinggi-tingginya dan rasa terima kasih yang tiada tara penulis persembahkan kepada kedua orang tua khususnya Ibunda Hikmah yang telah membesarkan dan menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi tanpa Ayahanda M.amin tercinta, adik-adik ku Tati Ariyani, Julfikar, Wulan Mulyani yang sangat saya sayangi serta keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, kasih sayang dan bimbingannya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Semoga Allah

SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-NYA kepada kalian.

Amiin Ya Rabbal Alamin

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Amin,,,

Wassalam Wr. Wb.



Makassar, Juni 2010

Rati Fitriani

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama Penyusun : **RATI FITRIANI**
NIM : 70100106043
Judul Skripsi : Pengaruh Konsentrasi sari Ubi Kayu Terhadap Mutu
Produk Nata de Cassava

Telah dilakukan penelitian Pengaruh Konsentrasi Sari Ubi Kayu Terhadap Mutu Produk Nata de Cassava. Penelitian tentang pembuatan Nata de Cassava yang dibuat dengan menggunakan medium *Acetobacter xylinum* dengan penambahan masing – masing konsentrasi substrat sari ubi kayu yaitu 35%, 40% dan 45% serta penambahan urea, dan asam asetat 25% (pH 3-4). Kemudian dilakukan proses fermentasi dalam suhu kamar (28⁰C- 30⁰C) selama 14 hari. Setelah fermentasi berakhir nata yang terbentuk diukur ketebalan, rendamen dan setelah dilakukan proses perendaman, perebusan dan pemotongan maka dilakukan uji organoleptik (Tekstur, rasa, bau, dan warna) yang ditentukan dengan skala hedonik dengan membandingkan nata de cassava dengan nata de coco yang beredar dipasaran.

Tujuan penelitian nata de cassava adalah untuk mengetahui konsentrasi sari ubi kayu yang tepat untuk memproduksi nata yang baik.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sari ubi kayu dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan nata dan nata de cassava yang dibuat dari substrat sari ubi kayu konsentrasi 45% merupakan produk nata terbaik dari segi ketebalan, rendamen dan uji kesukaan.

Kata kunci : Pengaruh Konsentrasi, Sari Ubi kayu, Mutu Nata.

ABSTRACT

Author : **RATI FITRIANI**

Student Reg. Number : 70100106043

Title : The Influence of Concentration Cassava Essence to
Quality of Product Nata de Cassava

It has been done a research about the Influence of Concentration Cassava Essence to Quality of Product Nata de Cassava. The research about making Nata de Cassava by using *Acetobacter xylinum* medium with addition concentration of cassava essence were 35%, 40% and 45%, and with addition of urea and asetic acid 25% (pH 3-4). Then, processed the fermentation at room themperatur (28⁰ C-30⁰ C) along 14 days. After fermentation finished the nata that formed and measured the thickness, immersion and then after soaking, poaching and slaughtering, so conducted an organoleptic test (Textur, teste, smell and colour) which was mentioned with hedonic scale by comparing nata de cassava and nata the coco that circulating in market.

The purpose of the research was to know the appropriate concentration essence of cassava to product the good nata.

The result of this research can be concluded that the enssence quality of cassava can be used as base ingredient for making the nata, then nata de cassava that was making for cassava essence by concentration of 45% was the best product from the thickness, immersion and favourite test.

Keywords: Influence of Concentration, Cassava Essence , Quality of Nata.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|------------------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| KATA PENGANTAR..... | iii |
| ABSTRAK..... | vi |
| ABSTRACK..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| DARTAR LAMPIRAN..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1-3 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 2 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 3 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 3 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 4-37 |
| A. Ubi kayu (<i>Manihot utilissima</i>)..... | 4 |
| B. Nata..... | 6 |
| C. Bakteri <i>Acetobacter xylinum</i> | 13 |
| D. Tinjauan Islam Mengenai Mikroba Penghasil | |

| | | |
|---------|---------------------------------------------------|-------|
| | <i>Nata dan Memanfaatkan Tumbuhan Sebagai</i> | |
| | <i>Bahan Dasar Pembuatan Nata de Cassava.....</i> | 19 |
| BAB III | METODE PENELITIAN..... | 38-43 |
| | A. <i>Alat dan Bahan.....</i> | 38 |
| | B. <i>Metode Kerja.....</i> | 38 |
| BAB IV | HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 44-53 |
| | A. <i>Hasil Penelitian.....</i> | 44 |
| | B. <i>Pembahasan.....</i> | 48 |
| BAB V | PENUTUP..... | 54 |
| | A. <i>Kesimpulan.....</i> | 54 |
| | B. <i>Saran.....</i> | 54 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 55-56 |
| | LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 57-75 |

DAFTAR TABEL

| | | Halaman |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 1 | Kandungan Ubi kayu..... | 5 |
| Tabel 2 | Hubungan Antara Jenis Sumber Nittrogen dengan sifat Pembentukan Nata..... | 13 |
| Tabel 3 | Formula Untuk Pembuatan Nata..... | 41 |
| Tabel 4 | Hasil Pengukuran Ketebalan Nata de Cassava..... | 44 |
| Tabel 5 | Tabel Anava..... | 44 |
| Tabel 6 | Perbandingan antar Konsentrasi sari Ubi Kayu..... | 45 |
| Tabel 7 | Hasil Perhitungan Rendamen..... | 46 |
| Tabel 8 | Hasil Pengujian Hedonik | 47 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gambar 1 | Peremajaan <i>Bakteri Acetobacter xylinum</i> 57 |
| Gambar 2 | Pembuatan Starter..... 58 |
| Gambar 3 | Pembuatan Nata Konsentrasi 35%,40%,45%..... 59 |
| Gambar 4 | Grafik hasil Pengukuran Ketebalan (%) Nata de Cassava dengan Variasi Konsentrasi Substrat Sari Ubi Kayu..... 67 |
| Gambar 5 | Grafik hasil Pengukuran Rendamen (% b/v) Nata de Cassava dengan Variasi Konsentrasi Substrat Sari Ubi Kayu..... 68 |
| Gambar 6 | Foto Sampel..... 69 |
| Gambar 7 | Foto Fermentasi Substrat Sari Ubi Kayu..... 70 |
| Gambar 8 | Foto Hasil Fermentasi Nata de Cassava..... 71 |
| Gambar 9 | Foto Nata de Cassava Setelah Perendaman dan Perebusan 72 |
| Gambar 10 | Foto Sediaan Nata de Cassava..... 73 |
| Gambar 11 | Foto Nata de Coco Sebagai Pembanding..... 74 |
| Gambar 12 | Angket Penilaian Uji Hedonik..... 75 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | | Halaman |
|------------|--------------------------------------------|---------|
| LAMPIRAN 1 | Skema kerja..... | 57 |
| LAMPIRAN 2 | Perhitungan Ketebalan Nata de Cassava..... | 60 |
| LAMPIRAN 3 | Perhitungan Rendamen Nata de Cassava..... | 64 |
| LAMPIRAN 4 | Hasil Pengujian Hedonik..... | 65 |
| LAMPIRAN 5 | Grafik Hasil Pengamatan..... | 67 |
| LAMPIRAN 6 | Foto Sampel..... | 69 |
| LAMPIRAN 7 | Foto Produk Nata de Cassava..... | 70 |
| LAMPIRAN 8 | Angket Penilaian Uji Hedonik..... | 75 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nata merupakan selulosa sintetik yang dihasilkan oleh bakteri *Acetobacter xylinum*, bakteri nata ini berasal dari biakan murni atau bibit. Dengan bantuan bakteri, maka komponen gula yang terdapat di dalam substrat dapat dirubah menjadi suatu substansi yang menyerupai gel yang tumbuh di permukaan media. Adanya gula dalam bahan dasar akan dimanfaatkan oleh *Acetobacter xylinum* sebagai sumber energi, maupun sumber karbon untuk membentuk senyawa metabolit diantaranya adalah selulosa yang membentuk suatu nata. Senyawa peningkat pertumbuhan mikroba (growth promoting faktor) akan meningkatkan pertumbuhan mikroba, sedangkan adanya mineral dalam substrat akan membantu meningkatkan aktifitas enzim kinase dalam metabolisme di dalam sel *Acetobacter xylinum* untuk menghasilkan selulosa (Warisno. 2009 : 14).

Nata merupakan jenis makanan yang sudah lama dikenal di negara Filipina. Belakangan ini nata menjadi makanan atau minuman yang disukai masyarakat Indonesia. Produk nata sudah lama populer dan digemari oleh masyarakat karena makanan ini tergolong makanan rendah kalori maka cocok

digunakan untuk penderita diabetes dan sebagai makanan untuk diet. Awalnya, nata termasuk makanan mewah dan hanya tersedia di tempat tertentu seperti restoran besar dan hotel berbintang. Namun, dengan teknologi pembuatan nata yang semakin berkembang dan murah, daya beli dan konsumsi terhadap nata pun meningkat (Warisno. 2009 : 14).

Nata dapat dibuat dari sari buah semangka (Novricha, Dinda. 2009), Akan tetapi karena beragamnya penggunaan air kelapa, sehingga saat ini menjadi sulit untuk mendapatkan air kelapa sebagai bahan baku nata. Demikian pula dengan buah – buahan yang bersifat musiman. Saat ini perlu difokuskan penggunaan substrat untuk pembuatan nata dari bahan – bahan yang mengandung gula dari umbi – umbian seperti ubi kayu dan ubi jalar, dimana ubi kayu tersedia sepanjang tahun dan harganya murah.

Hal inilah yang mendasari sehingga perlu penemuan dengan cara pembuatan nata dengan penggunaan bahan dasar lain yang bisa tersedia sepanjang tahun dan murah harganya, dalam hal ini digunakan sari ubi kayu.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permasalahan yang timbul adalah :

1. Apakah sari ubi kayu dapat dijadikan substrat untuk pembuatan nata ?
2. Berapa kadar sari ubi kayu yang optimum untuk menghasilkan nata yang baik ?


3. Bagaimana kualitas nata sari ubi kayu yang dihasilkan dengan penggunaan variasi konsentrasi sari ubi kayu ?

B. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui konsentrasi sari ubi kayu yang tepat untuk memproduksi nata yang baik.

C. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa sari ubi kayu dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam pembuatan nata.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ubi kayu (*Manihot utilissima* pohl)

1. Klasifikasi ubi kayu

Klasifikasi ubi kayu yaitu (Tjitrosoepomo, 2005 : 213).

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Regnum | : Plantae |
| Divisi | : Spermatophyta |
| Sub divisi | : Angiospermae |
| class | : Dicotyledoneae |
| Ordo | : Euphorbiales |
| Family | : Euphorbiaceae |
| Genus | : <i>Manihot</i> |
| Spesies | : <i>Manihot utilissima</i> Pohl. |

2. Morfologi tanaman ubi kayu

Ubi kayu (*Manihot utilissima* pohl) termasuk tumbuhan berbatang lunak atau getas (mudah patah). Berbatang bulat dan bergerigi yang terjadi dari bekas pangkal tangkai daun, bagian tengahnya bergabus dan termasuk tumbuhan yang tinggi. Tanaman ini bisa mencapai

ketinggian 1-4 meter. Dapat tumbuh subur di daerah yang berketinggian 1200 meter di atas permukaan air laut. Daunnya memiliki tangkai panjang dan helaian daunnya menyerupai telapak tangan, dan tiap tangkai mempunyai daun sekitar 3-8 lembar (Sigit. 2010).

Ubi kayu merupakan umbi yang berpati mempunyai kulit menyerupai pohon, tebal, dan berdaging putih *creamy*. Karena berkulit mirip kulit pohon, umbi ini dinamai pula ketela pohon. Ada dua jenis ubi kayu yaitu ubi kayu pahit dan ubi kayu manis, kedua – duanya mengandung asam hidrosianat tetapi ubi kayu pahit yang paling banyak mengandung asam hidrosianat tersebut. Ubi kayu menghasilkan gapek, tepung ubi kayu, etanol, gula cair, sorbitol, , tepung aromatik, dan pellets (Ali. 2009 :281).

3. Kandungan ubi kayu

Tabel 1. Kandungan ubi kayu (Ali. 2009 : 281-282).

| Unsur | Satuan | Jumlah |
|---------|--------|--------|
| Air | % | 65 |
| Pati | % | 60 |
| Glukosa | % | 8,36 |
| Serat | Gram | 0,9 |
| Protein | Gram | 1 |
| Lemak | Gram | 0,3 |
| Fosfor | Mg | 24 |
| Kalsium | Mg | 77 |

B. Nata

1. Definisi Nata

Nata juga diartikan sebagai biomassa yang sebagian besar terdiri dari selulosa, berbentuk agar dan berwarna putih. Massa ini berasal dari pertumbuhan *Acetobacter xylinum* pada permukaan cair yang asam dan mengandung gula (Warisno. 2009 : 14).

2. Cara pembuatan Nata

Fermentasi nata dilakukan melalui tahap-tahap berikut : (Tridjoko. 1982, 8-10).

a. Pemeliharaan biakan murni *Acetobacter xylinum*

Produksi nata memerlukan biakan murni *Acetobacter xylinum*, Biakan murni ini harus dipelihara hingga dapat digunakan setiap saat diperlukan. Pemeliharaan tersebut meliputi proses penyimpanan sehingga dalam jangka waktu yang sudah lama kemampuan hidup mikroba tetap dapat dipertahankan. Penyegaran kembali mikroba yang telah disimpan perlu dilakukan, sehingga terjadi pemulihan kemampuan hidup dan mikroba dapat disiapkan sebagai inokulum fermentasi.

b. Pembuatan Starter

Starter adalah populasi mikroba dalam jumlah dan kondisi fisiologis yang siap diinokulasikan pada media fermentasi. Mikroba pada starter tumbuh dengan cepat dan fermentasi segera terjadi. Media starter biasanya identik dengan media fermentasi. Media ini

diinokulasikan dengan biakan murni dari agar miring yang masih segar (umur enam hari). Starter dapat digunakan 6 hari setelah diinokulasi dengan biakan murni. Pada permukaan starter akan tumbuh lapisan berwarna putih. Lapisan ini disebut dengan nata. Semakin lama lapisan ini semakin tebal sehingga ketebalannya mencapai 1,5 cm. Starter yang telah berumur 9 hari (dihitung setelah diinokulasikan dengan biakan murni) tidak dianjurkan digunakan lagi karena kondisi fisiologis mikroba tidak optimum bagi fermentasi dan tingkat kontaminasi makin tinggi. Volume starter disesuaikan dengan volume media fermentasi yang akan disiapkan. Dianjurkan volume starter tidak kurang dari 5 % volume media yang akan difermentasi menjadi nata. Pemakaian starter yang terlalu banyak tidak dianjurkan karena tidak ekonomis.

c. Fermentasi

Fermentasi dilakukan pada media cair yang telah diinokulasikan dengan starter. Fermentasi berlangsung pada kondisi obligat aerobik (membutuhkan oksigen dalam jumlah sedikit). Mikroba tumbuh terutama pada permukaan media. Fermentasi dilangsungkan sampai nata yang terbentuk cukup tebal (1,0-1,5 cm). Biasanya ukuran tersebut telah tercapai setelah 10 hari (semenjak diinokulasi dengan starter) dan fermentasi diakhiri pada hari ke 15. Jika fermentasi tetap diteruskan, kemungkinan permukaan nata akan mengalami kerusakan oleh mikroba pencemar.

3. Hal – Hal yang mempengaruhi pembuatan nata

Nata sebetulnya merupakan pelikel dari bakteri *Acetobacter xylinum* maka ketebalan dan kualitas nata yang terbentuk dari proses pembuatan nata tergantung pada aktivitas bakteri *Acetobacter xylinum* dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

a. Faktor inokulum

Umur biakan starter pada pembuatan nata sangat mempengaruhi rendamen dan ketebalan nata yang diperoleh karena umur ini berkaitan erat dengan aktivitas bakteri pembentuk nata. Oleh karena itu, faktor yang harus diperhatikan pada pembuatan nata adalah pengaturan kondisi pertumbuhan bakteri nata, perlakuan yang aseptik terhadap bahan dasar dan alat-alat yang digunakan dalam fermentasi. Sel bakteri yang digunakan harus muda, jumlah larutan yang sesuai serta harus diperhatikan ketelitian dan perlakuan yang aseptis untuk menghindari kontaminasi mikroba (Atyh. 1979 : 10-11).

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pembuatan nata, sebaiknya digunakan biakan yang berumur 48 jam. pada umur biakan starter 48 jam, kemungkinan *Acetobacter xylinum* dalam keadaan fase logaritma yaitu berdasarkan pada fase logaritma yang pada waktu generasi yang paling pendek dan konstan. Jumlah bakteri untuk generasi ini menjadi dua kali lipat dan metabolismenya paling giat. Biarkan starter pada fase ini, jika dipindahkan pada medium yang sama komposisinya, maka kecepatan pertumbuhannya akan tetap seperti fase

logaritma. Sehingga tidak perlu lagi melalui fase permulaan dan pertumbuhan dipercepat. Jadi untuk memperoleh ketebalan pelikel yang maksimum, akan memerlukan umur biakan starter sekitar 48 jam. Sedangkan jika media sediaan fermentasi mengandung biakan yang umurnya sudah tua, akan mudah mengalami kontaminasi dan aktivitas biologisnya menurun, sehingga menghasilkan nata (pelikel) yang tipis dan jelek penampakannya (Tridjoko. 1992 : 8).

Selain itu, inokulum yang akan digunakan sebagai starter harus mengandung mikroba yang digunakan berasal dari biakan yang tua (lebih dari 5 hari) maka terlebih dahulu harus diremajakan (Widya. 1999 : 8).

b. Penambahan gula

Beberapa parameter kondisi optimum untuk memproduksi nata yang mempengaruhi adalah konsentrasi gula yang ditambahkan pada medium fermentasi berpengaruh terhadap kadar air, kekenyalan dan derajat keputihan nata (Widya. 1984 : 9).

Gula merupakan sumber energi bagi mikroba yang dapat menghasilkan asam asetat bersamaan dengan terbentuknya selulosa yang membungkus sel bakteri, penambahan gula seperti yang dilaporkan dapat meningkatkan tegangan permukaan dan tekanan osmotik media sekitar 6,8 kg/cm, semakin banyak gula yang ditambahkan maka rendamen nata yang diperoleh juga meningkat,

namun demikian dalam proses pembuatan nata, penambahan gula tidak dilakukan jika kadar gula media sudah mencapai 7,5 % dapat menghambat aktivitas bakteri *Acetobacter xylinum* (Soesono. 1984 : 12 dan 14).

c. Pengaruh keasaman

Bakteri *Acetobacter xylinum* tergolong bakteri asam asetat yang menyukai suasana asam atau pH rendah. Tingkat keasaman media fermentasi sangat dipengaruhi jumlah asam yang ditambahkan sehingga keasaman ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan aktivitas *Acetobacter xylinum* sehingga diperlukan adanya kondisi yang optimum (Soesono. 1984 : 15).

Pada pH yang lebih rendah dari 3,5 menyebabkan kondisi yang terlalu asam selama proses fermentasi berlangsung dan sebaliknya pada pH yang lebih besar dari 4,5 akan memungkinkan adanya kontaminasi seperti oleh kapang, khamir dan bakteri – bakteri lainnya yang dapat mengacaukan proses fermentasi *Acetobacter xylinum* (Soesono. 1984: 18).

Selama fermentasi berlangsung, sebagian komponen gula mengalami dekomposisi dan terbentuk senyawa-senyawa seperti asam asetat, asam laktat, dan fraksi-fraksi lainnya. Penurunan pH yang terjadi dapat mengurangi keaktifan bakteri *Acetobacter xylinum*. Asam-asam yang dihasilkan dari aktivitas bakteri *Acetobacter xylinum* tidak cukup untuk menetralkan komponen basa yang ada sehingga meningkatnya pH

yang terjadi dapat mengurangi optimalisasi pertumbuhan serta aktivitas *Acetobacter xylinum* yang lebih menyukai suasana asam (Athy. 1979 : 16-17).

Tingkat keasaman diatur dengan menggunakan asam asetat glasial. PH medium yang baik sekitar 3,5-4,5 dan suhu temperatur optimum fermentasi adalah 28⁰C- 30⁰C (Riyadi. 1987 : 14).

d. Lama fermentasi

Dalam seluruh proses fermentasi, komposisi kimia sel mengalami perubahan karena nutrisi akan dikonsumsi dan zat-zat metabolik akan diproduksi. Sebagai akibatnya, lingkungan pada starter akan mantap. Laju pertumbuhan tidak berpengaruh oleh konsentrasi tertentu. Pada fase logaritma komposisi makromolekul sel tetap konstan (Riyadi. 1987 : 12).

Pada beberapa titik pertumbuhan mulai menurun karena nutrisi esensial telah menjadi berkurang dan adanya hambatan dari produk metabolik yang ditimbun, bagaimanapun sel – sel tersebut akan mengalami transisi sehingga laju pertumbuhan menjadi nol. Dengan demikian fase stasioner akan terjadi bila semua sel berhenti membelah diri atau bila semua sel hidup dan mati mencapai kesetimbangan yaitu dengan laju kematian. Kalau inkubasi dilanjutkan, maka berbagai hal akan dapat terjadi. Hal demikian dapat terjadi pada fermentasi nata diamankan pada kondisi yang sesuai, lapisan akan terbentuk secara perlahan yang semakin lama semakin tebal dipermukaan media.

Lapisan ini mulai nampak setelah dibiarkan 3-4 hari pada suhu kamar. Namun, jika proses fermentasi terlalu lama atau lebih dari 18 hari akan cenderung mengandung kontaminasi karena jamur serta bakteri kontaminan mudah tumbuh dan berkembang biak (Riyadi. 198 :12-13).

e. Kebutuhan akan oksigen

Salah satu sifat dari bakteri yang tergolong *Acetobacter xylinum* adalah obligat aerobik, berdasarkan dari sifat dan aktivitas yang dimiliki bakteri *Acetobacter xylinum*. Proses pemakaian oksigen dapat dijelaskan sebagai berikut : (a) mula-mula oksigen dari udara digunakan untuk menjalankan mekanisme oksidatif yaitu memetabolisir komponen gula dan energi yang dihasilkan digunakan untuk melangsungkan metabolisme zat dalam sel bakteri tersebut. (b) setelah sumber oksigen tersebut relatif habis (anaerobik), perlahan-lahan membentuk extracelluler cellulosa atau dikenal pula dengan nata (Athy. 1979 : 15).

f. Pengaruh sumber nitrogen

Nutrient digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan nitrogen, karbon, vitamin dan mineral bagi pertumbuhan mikroba. Sebagai sumber nitrogen dan sumber mineral, biasanya digunakan yeast extract, pepton, amonium fosfat, natrium nitrat, magnesium sulfat dan amonium sulfat. Sumber nitrogen sangat penting artinya dalam pembentukan pelikel, kadar nitrogen yang biasanya digunakan 0,25 %. Penambahan sumber nitrogen pada taraf konsentrasi yang lebih besar dari 0,25 %

dapat menyebabkan kenaikan pH media mencapai 8,2 sedangkan tanpa penambahan sumber nitrogen pH media hanya sekitar 4,0. Semakin tinggi pH media maka semakin banyak pula jumlah asam yang dibutuhkan untuk mencapai pH optimum pertumbuhan dan aktivitas bakteri *Acetobacter xylinum* (Tridjoko. 1982 : 8- 9).

Tabel 2. Hubungan antara jenis sumber nitrogen dengan sifat pembentukan nata (Tridjoko. 1982 : 10).

| Sumber nitrogen | Sifat pembentukan pelikel |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ | Pembentukan pelikel terjadi sangat lambat |
| NaNO_3 | Pertumbuhan sedang |
| Yeast extract | Pertumbuhan pembentukan pelikel sangat baik/cepat dan berupa lapisan yang keras |
| Pepton | Pertumbuhan pembentukan pelikel sangat baik/cepat dan berupa lapisan yang keras |

Peningkatan konsentrasi nitrogen dalam substrat dapat meningkatkan jumlah polisakarida yang terbentuk, sedangkan ion - ion bivalensi seperti Mg, Ca dan lain - lain sangat diperlukan untuk mengontrol kerja enzim – enzim ekstraseluler dan membentuk ikatan polisakarida tersebut (Atyh. 1979 : 13).

C. Bakteri *Acetobacter xylinum*

1. Klasifikasi bakteri *Acetobacter xylinum* (Uning. 1999 : 17).

Kingdom : Monera

Divisi : Protophyta

| | |
|-------|------------------------------|
| Class | : Shizomycetes |
| Ordo | : Eubacteriales |
| Suku | : Pseudomonaceae |
| Marga | : Acetobacter |
| Jenis | : <i>Acetobacter xylinum</i> |

2. Sifat bakteri *Acetobacter xylinum*

Meskipun ciri yang dimiliki hampir sama dengan spesies lainnya tetapi dapat dibedakan dengan spesies lainnya karena *Acetobacter xylinum* mempunyai sifat yang unik, bila ditumbuhkan pada media yang mengandung gula, bakteri akan memecah komponen gula membentuk suatu polisakarida yang dikenal dalam selulosa ekstra sel (nata). Secara liar bakteri ini termasuk kelompok bakteri pengganggu pada industri minuman alkohol dan hal tersebut dikarenakan sifat yang sangat oksidatif (over oxidizer) sehingga mampu mengoksidasi lebih lanjut menjadi asam asetat (Uning. 1999 : 18-19).

Bakteri ini akan membentuk asam dari glukosa, etil alkohol, propil alkohol dan glikol, mengoksidasi asam asetat menjadi CO₂ dan air. Sifat yang spesifik dari bakteri ini adalah kemampuan untuk membentuk selaput tebal pada permukaan cairan fermentasi, yang ternyata adalah komponen yang mempunyai sellulosa (sellulosic material), komponen inilah yang lebih lanjut disebut nata (Uning. 1999: 16).

3. Pertumbuhan sel

Pertumbuhan sel bakteri didefinisikan sebagai pertumbuhan secara teratur semua komponen di dalam sel hidup. Umur sel ditentukan segera setelah proses pembelahan selesai, sedangkan umur kultur ditentukan dari lamanya inkubasi (Pambayun, Rindit. 1998: 22).

Dalam satu waktu generasi, bakteri akan melewati beberapa fase pertumbuhan sebagai berikut (Pambayun, Rindit. 1998 : 32-34).

a. Fase Adaptasi

Begitu dipindahkan ke media baru, bakteri *Acetobacter xylinum* tidak akan langsung tumbuh dan berkembang. Pada fase ini, bakteri akan terlebih dahulu menyesuaikan diri dengan substrat dan kondisi lingkungan barunya. Oleh sebab itu, fase tersebut disebut fase adaptasi. Meskipun tidak mengalami perbanyakan sel, pada fase ini terjadi aktivitas metabolisme dan bahkan pembesaran sel. Lama fase ini ditentukan oleh medium dan lingkungan pertumbuhan serta jumlah inokulum. Fase adaptasi bagi *Acetobacter xylinum* dicapai antara 0 – 24 jam atau 1 hari sejak inokulasi. Makin cepat fase ini dilalui, makin efisien proses pembentukan nata yang terjadi.

b. Fase Pertumbuhan Awal

Fase ini sel mulai membelah dengan kecepatan rendah, fase ini menandai diawalinya fase pertumbuhan eksponensial. Fase ini dilalui dalam beberapa jam.

c. Fase Pertumbuhan Eksponensial

Fase ini disebut sebagai fase pertumbuhan logaritmik, yang ditandai dengan pertumbuhan yang sangat cepat. Untuk bakteri *Acetobacter xylinum*, fase ini dicapai dalam waktu antara 1 - 5 hari tergantung pada kondisi lingkungan. Pada fase ini juga bakteri nata mengeluarkan enzim ekstraseluler polimerase sebanyak – banyaknya untuk menyusun polimer glukosa menjadi selulosa (nata), fase ini sangat menentukan tingkat kecepatan suatu strain *Acetobacter xylinum* dalam membentuk nata.

d. Fase Pertumbuhan Lambat

Pada fase ini, terjadi pertumbuhan diperlambat karena ketersediaan nutrisi berkurang, terdapatnya metabolit yang bersifat toksik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, dan umur sel telah tua. Pada fase ini, pertumbuhan tidak lagi stabil, tetapi jumlah sel yang tumbuh masih lebih banyak daripada jumlah sel yang mati.

e. Fase Pertumbuhan Tetap

Pada fase ini, jumlah sel yang tumbuh relatif sama dengan jumlah sel yang mati. Penyebabnya adalah di dalam media terjadi kekurangan nutrisi, pengaruh metabolit toksik lebih besar dan umur sel semakin tua. Namun pada fase ini, sel akan lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim jika dibandingkan

dengan ketahanannya pada fase yang lain. nata lebih banyak diproduksi pada fase ini.

f. Fase Menuju Kematian

Pada fase ini, bakteri mulai mengalami kematian karena nutrisi telah habis dan sel kehilangan banyak energi cadangannya.

g. Fase kematian

Pada fase ini, sel dengan cepat mengalami kematian, dan hampir merupakan kebalikan dari fase logaritmik. Sel mengalami lisis dan melepaskan komponen yang terdapat di dalamnya. Kecepatan kematian dipengaruhi oleh nutrisi, lingkungan dan jenis bakteri. Untuk *Acetobacter xylinum*, fase ini dicapai setelah hari kedelapan hingga kelima belas. Pada fase ini, *Acetobacter xylinum* tidak baik apabila digunakan sebagai bibit nata.

Sifat lain dari *Acetobacter xylinum* adalah mampu tumbuh dan melakukan aktivitas dalam keadaan aerob dan anaerob. Ada dua aktivitas penting dari bakteri tersebut (Uning. 1999 : 20-21).

1. Memetabolisme komponen gula secara aksodarif, mula – mula oksigen yang ada baik yang terlarut dalam media maupun yang berasal dari aerasi udara digunakan untuk menjalankan metabolisme oksidatif, yaitu memetabilisir komponen gula melalui lintasan trikarboksilat.

2. Setelah sumber oksigen relatif habis bakteri tersebut mulai menjalankan aktivitas spesifiknya secara perlahan – lahan membentuk selulosa ekstra atau dikenal pula dengan nata.

4. Metabolisme bakteri *Acetobacter xylinum*

Biosintesa nata berawal dari proses hidrolisis karbohidrat yang berasal dari media, dimana sel – sel bakteri tersebut akan mengambil glukosa dari larutan gula, kemudian glukosa tersebut digabungkan dengan asam lemak membentuk prekursor dan penciri nata pada membran sel. Prekursor selanjutnya dikeluarkan dalam bentuk ekskresi dan bersama enzim mempolarisasi glukosa menjadi selulosa luar sel. Bila ditumbuhkan pada media yang mengandung gula, bakteri penghasil nata dapat mengubah gula menjadi selulosa. Selulosa yang diekskresikan ke dalam medium tersebut berupa benang – benang yang bersama dengan polisakarida membentuk suatu jalinan seperti tekstil (Uning, 1999 : 24).

Biosintesis selulosa meliputi beberapa tahap, yaitu aktivasi monomer, transfer monomer teraktifasi dari dalam sel ke luar sel dan penyusunan polimer. Enzim yang terlibat dalam sintesa selulosa tertambat dan terikat pada membran sel sehingga laju sintesis tidak turun dengan adanya pencucian (Riyadi, 1987 : 20-21).

Biosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kandungan oksigen pada permukaan medium, kondisi medium mengalami agitasi atau tidak dan sumber karbon. Biosintesa akan

menjadi optimum pada keadaan diam dan menurun atau tidak terjadi sintesis pada keadaan yang mengalami agitasi (Riyadi. 1987 : 18).

D. Tinjauan Islam Mengenai Mikroba Penghasil Nata dan Memanfaatkan Tumbuhan Sebagai Bahan Dasar pembuatan Nata de Cassava.

a. Manfaat Ciptaan Allah Menurut Islam

Segala yang ada di dunia ini adalah ciptaan dan milik Allah swt. Tanpa terkecuali, termasuk mikroorganisme-mikroorganisme yang ada di bawah tanah sekalipun. Hal ini sejalan dengan Firman Allah swt.

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

Terjemahnya :

Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah (*Q.s. Thaahaa : 6*).

Di dalam Al Quran, Allah SWT menyiratkan akan penciptaan makhluk hidup termasuk penciptaan mikroorganisme yang merupakan bagian dari makhluk hidup ciptaan Allah SWT, serta proses penciptaan

dan komponen penyusun makhluk hidup termasuk mikroorganisme seperti dalam beberapa ayat yaitu :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ
 اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
 بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ
 مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا
 مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ
 الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَعْقِلُونَ

Terjemahnya :

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan

di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan” (Q. S. Al_Baqarah : 164).

Dari ayat diatas menjelaskan, bahwa begitu kuasanya Allah yang secara detail tanpa cacat sedikitpun mengatur semua yang ada dilangit maupun dibumi. Allah anugerahkan kepada hambanya air hujan agar manusia dan hewan dapat menggunakan air sebagai kebutuhan hidup dan tumbuhan dapat tumbuh dengan subur. Dan Allah menciptakan hewan untuk dipelihara untuk dijual untuk bekal masa depan dan digunakan untuk makananmu. Dan kita harus menyadari begitu besarnya kuasa Allah SWT dan begitu kecilnya kita.

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّا فَمِنَهُمْ مَّن يَمْشِي

عَلَىٰ بَطْنَيْهِ ۚ وَمِنَهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ

وَمِنَهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۗ تَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٤﴾

Terjemahnya :

Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Q.S. An Nur : 45).

وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مَسْخَرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya :

Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami (nya)” (Q. S An Nahl : 12).

Dari beberapa ayat diatas dapat kita ketahui bahwa Allah SWT telah menciptakan makhluk hidup termasuk mikroorganisme secara sempurna atau secara mendetail tanpa ada hal yang tertinggal atau kurang pada diri makhluk hidup tersebut termasuk mikroorganisme. Sehingga kita sebagai makhluk hidup harus bersukur

dengan pemberian Allah SWT, termasuk penciptaan mikroorganisme yang banyak memberi manfaat kepada manusia, salah satunya digunakan sebagai sumber untuk pembuatan nata.

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ
وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dia menumbuhkan tanaman-tanaman untukmu, seperti zaitun, korma, anggur dan buah-buahan lain selengkapnya, sesungguhnya pada hal-hal yang demikian terdapat tanda-tanda Kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau memikirkan (Q.s.al-Nahl:11).

Wahbah al-Zuhaily,1418 H mengatakan bahwa dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan betapa pentingnya tumbuh-tumbuhan dalam berbagai jenis, warna, rasa, bau dan bentuknya, khususnya buah-buahan. Dalam kehidupan umat manusia buah-buahan dapat dijadikan sebagai penghasilan dan makanan untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini. Bahkan Iman al-Qurthuby, 2000 mengatakan bahwa tumbuh-tumbuhan tersebut bias menjadi rezki dan sebagai nikmat.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي
 السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ
 وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ
 وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ^ص وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ
 الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ ^ج إِنَّ
 اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

Terjemahnya:

Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia? dan banyak di antara manusia yang Telah ditetapkan azab atasnya. dan barangsiapa yang dihinakan Allah Maka tidak seorangpun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki (Q.s. Al Hajj : 18).

Dalam ayat diatas menjelaskan, bahwa manusia adalah makhluk yang sangat lemah dihadapan Allah SWT. Begitupun dengan alam semesta yang diciptakan Nya seperti bumi, langit, bulan, bintang, gunung-gunung yang ada di alam semesta. Kita harus menyadari

tentang kekuasaan Allah SWT, yang memberikan kita kehidupan. jika Allah murka, maka dengan sekejap semua akan sirna dan tenggelam.

Kandungan dan makna dari ayat itu sendiri adalah untuk mengingatkan kepada kita sebagai makhluk lemah agar selalu mengingatNya. Mengingat bukan hanya melalui pemikiran manusia, melainkan dibuktikan melalui perbuatan manusia. Dan Allah telah menetapkan azab bagi manusia yang tidak mengakui keberadaan Allah SWT.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ
 مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ
 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
 مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
 حَقَّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Terjemahnya:

Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan (Q.s. Al An'aam : 141).

Dalam ayat ini menjelaskan, bahwa Allah SWT menciptakan tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Dan ketika tiba waktunya manusia diperingatkan untuk memetik hasilnya. Dari hasil yang dipetik tersebut, maka manusia hendaklah bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan kepada manusia. Bukan hanya manusia yang membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya, tapi hewan juga makhluk yang membutuhkan sesuatu yang bisa menunjang kelangsungan hidupnya. Sehingga manusialah yang menjaga kelestarian alam yang diberikan oleh Allah SWT.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ
مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

Terjemahnya :

Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan (Q.s. An-Nahl : 67).

Dalam ayat ini menjelaskan, bahwa Allah menciptakan buah – buahan untuk kamu manfaatkan sebagai sumber rezkiimu dan untuk biaya kehidupan sehari – hari. Kita juga harus menggunakan otak kita

untuk berpikir bahwa kita tidak boleh memanfaatkan ciptaan Allah dengan hal yang dilarang oleh agama salah satunya memanfaatkan ciptaan Allah untuk membuat arak yang jelas – jelas dilarang dalam agama kita untuk dikonsumsi.

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ
ذُلًّا تَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ
فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan makanlah oleh kamu bermacam-macam sari buah-buahan, serta tempuhlah jalan-jalan yang telah digariskan Tuhanmu dengan lancar. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam jenisnya dijadikan sebagai obat untuk manusia. Di alamnya terdapat tanda-tanda Kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau memikirkan (Q.s. An Nahl : 69).

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa pengobatan dengan mencari saripati tumbuh-umbuhan yang ada sebagai bentuk upaya pencarian fungsi dan pendayagunaan dari tumbuhan-tumbuhan yang di ciptakan Allah SWT. Hingga saat ini banyak pengobatan herbal dan mencari tumbuh tumbuhan sebagai bahan utama pembuatan obat-obatan termasuk sebagai bahan dasar pembuatan nata.

Disinilah Allah SWT memperlihatkan kekuasaannya sebagai pencipta Alam dan seluruh isinya sehingga bagaimanapun kecerdasan manusia melakukan pengobatan dan rekayasa genetik belum mampu melewati ketentuan-ketentuan Sang Pencipta sebab Allah SWT yang mengetahui manusia dan apa yang ada dilangit dan di bumi dengan sedetail-detailnya, sehingga dengan ayat ini sebagai seorang hamba yang mempelajari ilmu pengobatan agar senantiasa bersyukur dan tidak mengukufurinya serta mengharap ridho-Nya semoga apa yang telah di usahakan oleh manusia mampu menjadi obat yang dapat menyembuhkan manusia dengan izin dan kekuasaan Sang Pencipta sebab segala sesuatunya apa yang ada akan kembali kepada-Nya.

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَبِّرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ
 أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ وَصِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ
 يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ
 فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
 يَعْقِلُونَ

Terjemahnya :

Dan di bumi Ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang

bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir (Q.s. Ar Ra'd : 4).

Berbagai macam tumbuhan yang ada di muka bumi yang diciptakan oleh Allah SWT. Manusia hendaklah menyadari bahwa setiap yang diciptakan oleh Tuhan adalah anugerah yang sangat besar untuk umat manusia. Manusia juga harus melestarikan dan menjaga pemberian Allah SWT, karena ketika manusia menjaga dan mensyukuri apa yang telah diberikan, maka manusia akan dilebihkan nikmat dari hidupnya.

b. Penyakit, Obat dan Kesehatan Dalam Islam

Kesehatan merupakan salah satu hak bagi tubuh manusia" demikian sabda Nabi Muhammad SAW. Karena kesehatan merupakan hak asasi manusia, sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, maka Islam menegaskan perlunya istiqomah memantapkan dirinya dengan menegakkan agama Islam. Satu-satunya jalan dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Allah berfirman :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن

رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى

وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ


Terjemahnya :

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh-penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman" (Q.S: Yunus 57).

Sabda Rasulullah SAW: Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cinta kepada Allah daripada orang mukmin yang lemah..." (Hadis Riwayat Bukhari).

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa orang Mukmin yang jasmani dan rohaninya kuat akan lebih cinta kepada Allah dari pada orang Mukmin yang lemah.

Sebagaimana islam memperhatikan kesehatan islam juga memperhatikan pengobatan baik yang bersifat kuratif maupun preventif. Dan islam menentang pengobatan versi dukun dan para tukang sihir. Sebaliknya islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari dengan ilmu pengetahuan, penelitian, eksperimen ilmiah dan hokum sebab akibat.



Terjemahnya :

Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku (QS. Asy-Syu'ara : 80).

Dalam ayat diatas menjelaskan, bahwa allah swt yang maha menyembuhkan penyakit. Kita hanya berusaha dan berdo'a, dan kita harus nyakin bahwa dialah yang maha menyembuhkan penyakit.

Kebutuhan akan obat-obatan di era modern seperti sekarang ini sangat besar seiring dengan munculnya berbagai macam penyakit di kalangan masyarakat termasuk penyakit susah buang air besar dan proses diet dikalangan masyarakat sekarang ini yang menghalalkan segala cara untuk merubah bentuk tubuh.

Diriwayatkan oleh Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah bersabda :

أَنْزَلَ اللَّهُ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الدَّاءَ (رواه البخاري)

Artinya :

Allah yang menurunkan penyakit, dan Dia juga yang menurunkan obatnya.”(HR. Bukhari).

Setiap apa yang diciptakan oleh-Nya kemudian diperuntukkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Ini bukan berarti bahwa manusia boleh dengan seenaknya atau semaunya menggunakan apa yang telah diciptakan-Nya itu melainkan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya.

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ
بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى (رواه مسلم)

Artinya :

Setiap penyakit ada obatnya. Dan jika suatu obat mengenai tepat pada penyakitnya, ia akan sembuh dengan izin Allah Ta'ala."(HR. Muslim).

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ
شِفَاءً، عِلْمَهُ مَنْ عِلِمَهُ وَجَهْلُهُ مَنْ جَهْلُهُ

Artinya :

Tidaklah Allah azza jalla menurunkan penyakit, kecuali pasti Allah juga menurunkan penyembuhnya. Hanya saja, ada orang yang mengetahuinya dan ada yang tidak mengetahuinya".

Dari kedua hadist diatas menjelaskan bahwa, setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah SWT ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah SWT yang menyembuhkan, akan tetapi Allah SWT menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhannya.

Ungkapan, “Setiap penyakit ada obatnya,” artinya bias bersifat umum, Sehingga termasuk di dalamnya penyakit-penyakit mematikan dan berbagai penyakit yang tidak bisa di sembuhkan oleh para dokter. Allah sendiri telah menjadikan untuk penyakit tersebut obat-obatan yang dapat menyembuhkannya. Akan tetapi ilmu tersebut tidak ditempatkan Allah kepada umat manusia, dan mereka tidak diperkenankan oleh Allah untuk menggapainya. Oleh sebab itu, Kesembuhan terhadap penyakit dikaitkan oleh Rasulullah dengan proses “kecocokan” obat dengan penyakit yang diobati. Karena setiap ciptaan Allah itu pasti ada anti penawarnya. Maka setiap pasti ada obatnya yang menjadi anti penawarnya agar penyakit itu sembuh. Itu merupakan poin lebih dari hanya sekedar keberadaan obat itu. Karena kalau obat itu diberikan dengan cara yang kurang tepat, dengan diberikan dosis yang berlebih dari stadium penyakitnya dalam pemakaiannya atau jumlahnya. atau kuantitasnya lebih dari yang seharusnya, justru itu bisa menyebabkan munculnya penyakit lain. Namun kalau dosisnya kurang, juga tidak bisa mengobati dan pengobatan seperti ini tidaklah sempurna. Ketika orang yang diobati tidak menerima obat itu, atau obatnya tidak mengenai penyakitnya, maka tidak akan sembuh.

Obat setiap penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli di bidang pengobatan, dan tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Dan Allah menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan di obati sehingga akan mendorong kesembuhan. Hal

tersebut dijelaskan dalam hadis yang berasal dari sahabat jabir ra bahwa Nabi SAW bersabda:

“Karena setiap penyakit ada obatnya, maka pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya itu aka segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT”.

Hal tersebut diatas lebih dipertegas dalam sabda rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: *“Barang siapa yang mengobati, namun ia tidak menguasai ilmu pengobatan, maka ia harus bertanggung jawab”*.

Segala sesuatu yang ingin kita lakukan harus dilakukan dengan penuh keyakinan atau tanpa keraguan, baik dalam melaksanakan ibadah maupun dalam melakukan kegiatan sehari – hari. Begitu juga halnya dalam melakukan pengobatan terhadap suatu penyakit, kita tidak boleh sembarang berobat kepada orang yang bukan ahlinya.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ



Terjemahnya :

Maka bertanyalah kamu kepada orang yang ahli jika kamu tidak mengetahuinya (Q.s. An- Nahl : 43).

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa dalam usaha untuk mengobati penyakit maka kita harus berobat pada ahlinya atau dokter. Dan apabila tidak berobat pada ahlinya maka bisa saja penyakit tidak sembuh (tambah parah) dan bahkan akan timbul penyakit yang baru.

Cara yang paling sering digunakan manusia dalam usaha penyembuhan adalah pengobatan fisik. Rasulullah saw. mengatakan sebuah prinsip dasar dalam pengobatan untuk setiap penyakit adalah perawatan (*ma anzala allahu daa; illa anzala lahu shifa'a*. Kitaab al Tibb, al Bukhari). Hal ini mendorong kita untuk mencari cara pengobatan. Dengan demikian, tradisi pengobatan ala Nabi tidak hanya berhenti pada pengajaran pengobatan oleh Rasulullah, melainkan untuk mendorong manusia agar terus mencari dan bereksperimen dengan ilmu pengobatan baru. Hal tersebut merupakan implikasi bahwa pengobatan ala Nabi tidaklah statis. Ada ruang untuk berkembang, bahkan memunculkan dasar ilmu yang baru. Implikasi-implikasi lainnya dari hadist ini adalah pengobatan tidak bertentangan dengan qadar (ketentuan awal). Keduanya baik penyakit maupun penyembuhannya adalah bagian dari qadar.

Pengobatan fisik biasanya melalui pemeriksaan medis dan pemberian obat. Pengetahuan dalam dunia medis adalah salah satu contoh penerapan ilmu teknologi. Sekarang, ada beberapa pengobatan yang dapat dilakukan antara lain, dengan menggunakan obat-obatan sintesis maupun obat-obatan tradisional. Begitu banyak jenis obat yang tersebar di pasaran yang digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit manusia.

Obat-obat ini muncul sebagai bukti dari sabda Rasulullah saw., tidak ada penyakit yang tidak dapat diobati. Dunia pengobatan sejak dulu selalu berjalan seiring dengan kehidupan umat manusia. Karena sebagai makhluk hidup, manusia sudah akrab dengan berbagai macam penyakit ringan maupun berat. Teknologi pengobatan manusiapun semakin disibukkan dengan berbagai penelitian untuk menemukan berbagai formula obat-obatan baru untuk mengatasi berbagai macam penyakit aneh yang muncul belakangan. Sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang artinya :

ALLAH telah menurunkan penyakit dan penawarnya dan Dia telah menentukan setiap penawar untuk setiap penyakit. Jadi rawatlah dirimu sendiri dengan menggunakan obat-obatan sekuatmu, tetapi jangan menggunakan sesuatu yang jelas-jelas dilarang (HR. Abu Dawud dari Abu Al-Darda).

Selain itu, Rasulullah saw. juga mengajarkan banyak doa kesembuhan yang diriwayatkan dalam berbagai hadis, yang antara lain: "Ya Allah, Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah penyakit ini karena hanya Engkau lah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkannya kecuali izin Engkau." (HR. Bukhari dan Muslim).

Doa dan pengobatan fisik perlu disinergikan, karena keduanya saling mendukung satu sama lain. Makanya, alangkah baiknya, banyak rumah sakit dalam prakteknya tidak saja mengandalkan tentang ilmu kedokteran dan farmasi dalam upaya penyembuhan penyakit si pasien, tetapi juga dibekali kekuatan keyakinan dan doa. Semua jenis pengobatan dan obat-obatan tersebut hanya terasa khasiatnya bila disertai dengan sugesti dan keyakinan. Disinilah kekuatan Do'a - Dzikir, maka Islam mengenal istilah

do'a dan keyakinan. Dengan pengobatan yang tepat (tentunya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman puluhan tahun), dosis obat yang sesuai disertai doa dan keyakinan, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan terkecuali maut.

Disitulah akan terlihat korelasi yang erat antara sistem pengobatan Ilahi dengan sistem pengobatan manusia. Karena Allah telah menegaskan : "*Telah diciptakan bagi kalian semua segala apa yang ada dimuka bumi ini*". Untuk itu mari kita tidak boleh mengabaikan tentang kepercayaan/keyakinan terhadap metode pengobatan Ilahiyah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah saw, sebagai metode terbaik yang mujarab untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, hingga penyakit yang sulit disembuhkan oleh Medis sekalipun.

Berobat bukanlah termasuk perkara darurat dari berbagai pendapat ulama yang lebih kuat dan berobat bukanlah suatu kewajiban menurut mayoritas ulama. Sampai-sampai Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan : "Aku tidak mengetahui satu ulama salaf (ulama terdahulu) yang mewajibkan untuk berobat.

Syaikh Muhammad bin 'Ibrahim Alu Syaikh *rahimahullah* mengatakan, "Hukum asal berobat adalah dibolehkan, namun bukanlah wajib. Maka tidak boleh seseorang berobat dengan yang terlarang karena alasan melakukan sesuatu yang dibolehkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Alat dan Bahan*

1. **Alat-alat**

Autoklav, blender, jarum ose, jangka sorong, kertas pH universal, laminar air flow, oven, timbangan kasar, timbangan analitik, termometer, toples.

2. **Bahan-bahan**

Ubi kayu, biakan bakteri *Acetobacter xylinum*, asam asetat glasial, ekstrak yeast, glukosa, agar, K_2HPO_4 , $MgSO_4$, air suling.

B. *Metode Kerja*

1. **Sterilisasi alat**

Alat –alat yang terbuat dari gelas disterilkan dengan menggunakan oven pada suhu 180^0 C selama 2 jam, untuk alat-alat seperti logam disterilkan dengan cara dipijarkan dengan menggunakan bunsen dan alat-alat yang terbuat dari karet, plastik serta gelas ukur disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121^0 C selama 15 menit.

2. Penyiapan mikroba

a. Pembuatan medium agar miring

Komposisi medium (Muiin, 2009) :

Asam asetat 25 %, K_2HPO_4 5 g, $MgSO_4$ 0,2 g, $(NH_4)_2SO_4$ 0,6 g, ekstrak yeast 5 g, agar 18 g, glukosa 75 g, air kelapa 1 liter.

Cara pembuatan

Larutan I :

Bahan ditimbang, kemudian dicampur 18 g agar kedalam 500 ml air kelapa. Setelah itu panaskan, kemudian tambahkan 5 g ekstrak yeast. Masukkan 3 ml larutan kedalam tabung reaksi dan tutup dengan kapas.

larutan II :

Bahan ditimbang kemudian dicampur 75 g glukosa, asam asetat 25%, K_2HPO_4 , $(NH_4)_2SO_4$, $MgSO_4$, dan 500 ml air kelapa. Masukkan 3 ml larutan kedalam tabung reaksi dan tutup dengan kapas.

Larutan I dan II dicampurkan kedalam tabung reaksi, kemudian disterilkan dalam autoklav, medium steril dimiringkan hingga mengeras.

b. Peremajaan biakan mikroba

Biakan *Acetobacter xylinum* diremajakan dengan cara inokulasikannya pada media miring, selanjutnya diinkubasi pada suhu 37⁰ C selama 1 x 24 jam.

3. Pembuatan Nata

a. Pembuatan starter

Komposisi medium (Muiin, 2009) :

Asam asetat 25 %, urea 5 g, glukosa 75 g, air kelapa 1 liter.

Cara pembuatan :

Bahan ditimbang, kemudian air kelapa disaring dan dipanaskan sampai mendidih. Kemudian ditambahkan asam asetat glasial (hingga pH 3-4), dan gula 75 g. Kemudian, tambahkan urea 5 g. Media dipindahkan ke dalam beberapa botol kaca dan tutup dengan kertas koran. Setelah dingin, tambahkan 5 ml suspensi mikroba. Kemudian media diinkubasi pada suhu kamar selama 6-8 hari sampai terbentuk lapisan putih pada permukaan media.

b. Pengambilan bahan penelitian

Bahan penelitian adalah sari ubi kayu yang diperoleh dari pasar Pa'baeng – baeng kota Makassar, mikroorganisme yang digunakan *Acetobacter xylinum* yang diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Farmasi UIN Alauddin Makassar.

c. Pembuatan sari ubi kayu

Sebanyak 500 g ubi kayu dibuat jus dengan menggunakan juicer, kemudian dihitung volume sari yang diperoleh dan dihitung kadar glukosa/ml sesuai kandungan glukosa ubi kayu yang terdapat pada tabel 1.

c. Pembuatan nata de cassava dengan variasi konsentrasi sari ubi kayu

Dibuat nata dengan variasi konsentrasi sari ubi kayu 35%, 40%,45%, kemudian dimasukkan kedalam wadah steril. Ditambahkan urea masing - masing 0,25 % dan diatur pH 4 dengan penambahan asam asetat glasial, didihkan. Ditambahkan starter masing – masing 12,5 %, kemudian ditutup secara aseptis. Inkubasi selama 14 x 24 jam dengan suhu kamar, nata yang terbentuk dipanen. Kemudian nata hasil fermentasi direndam dalam air selama 24 jam lalu dimasak, setelah itu ditiriskan selama 1-2 jam. Nata yang telah ditiriskan kemudian dievaluasi.

Tabel 3. Formula untuk pembuatan nata

| Bahan | Perlakuan | | | Ket |
|--------------------|-----------|-------|-------|-----|
| | I | II | III | |
| Sari Ubi Kayu (ml) | 87,5 | 100 | 112,5 | |
| Urea (gram) | 0,625 | 0,625 | 0,625 | |

| | | | | |
|---------------------|------|------|------|------------------|
| Asam asetat 25 % | q.s | q.s | q.s | sampai pH 3-4 |
| Starter (ml) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | |
| Aquadest ad (ml) | 250 | 250 | 250 | |

Keterangan :

I = Substrat Sari Ubi Kayu Konsentrasi 35%

II = Substrat Sari Ubi Kayu Konsentrasi 40%

III = Substrat Sari Ubi Kayu Konsentrasi 45%

4. Evaluasi Mutu Nata

a. Pengukuran ketebalan

Ketebalan nata yang diperoleh ditentukan berdasarkan pengukuran dengan menggunakan alat jangka sorong.

b. Perhitungan Rendamen

Perhitungan rendamen nata yang diperoleh ditentukan berdasarkan perbandingan antara berat nata dengan volume media fermentasi. Rendamen nata dapat dihitung dengan rumus rendamen yaitu $A/B \times 100\%$.

Keterangan :

A = Berat nata yang diperoleh

B = volume media fermentasi

c. Uji Organoleptis

Uji organoleptis meliputi warna, rasa, bau dan tekstur. Uji ini dilakukan berdasarkan skala hedonik yang digunakan adalah 1= tidak suka, 2 = cukup suka, 3 = agak suka, 4 = suka, 5= amat sangat suka.

d. Pemilihan Panelis

Pengujian ini berdasarkan panelis dipilih sebanyak 10 orang yang memenuhi kriteria sebagai panelis yaitu dalam kondisi sehat.

e. Penyiapan Nata

Sediaan nata yang dihasilkan dengan konsentrasi sari ubi kayu, masing-masing dimasukkan ke dalam gelas. Tiap gelas diberi kode sesuai dengan konsentrasi sari ubi kayu yang digunakan.

f. Teknik Pengujian Sediaan Nata

Nata hasil fermentasi dilakukan pengukuran ketebalan, rendamen, dan diameter. Kemudian dilakukan pencucian, perendaman, perebusan dan pemotongan. Sediaan nata diberikan kepada panelis dan melakukan skoring terhadap organoleptis meliputi warna, rasa, bau dan tekstur. Panelis mengamati warna, rasa, bau dan tekstur lalu memberikan skoring terhadap masing-masing konsentrasi nata dengan membandingkan dengan produk nata de coco yang diperoleh dari pasar.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ketebalan Nata de Cassava

Ketebalan nata yang diperoleh ditentukan berdasarkan pengukuran dengan menggunakan alat jangka sorong.

Tabel 4. Hasil Pengukuran Ketebalan Nata de Cassava

| Sari Ubi Kayu | Ketebalan (cm) | | | Jumlah | Rata - Rata | Diameter nata (cm) |
|----------------|----------------|------|------|--------|-------------|--------------------|
| | I | II | III | | | |
| S ₁ | 2,11 | 1,51 | 1,61 | 5,23 | 1,74 | 15 |
| S ₂ | 3,79 | 2,47 | 2,22 | 8,48 | 2,83 | 15 |
| S ₃ | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 11,3 | 3,77 | 15 |

Keterangan :

- S₁ : Substrat Sari Ubi Kayu Konsentrasi 35%
- S₂ : Substrat Sari Ubi Kayu Konsentrasi 40%
- S₃ : Substrat Sari Ubi Kayu Konsentrasi 45%
- I : Pengukuran Bagian Pertama Nata de Cassava
- II : Pengukuran Bagian Kedua Nata de Cassava
- III : Pengukuran Bagian Ketiga Nata de Cassava

Tabel 5. Tabel Anava

| Sumber Keragaman | DB | JK | KT | F.hitung | F. Tabel | |
|------------------|----|------|------|----------|----------|-------|
| | | | | | 5% | 1% |
| Perlakuan | 2 | 6,15 | 3,1 | | | |
| Galat | 6 | 1,67 | 0,28 | | 5,14 | 10,92 |

| | | | | | | |
|-------|---|------|------|------|--|--|
| | | | | 11,1 | | |
| Total | 8 | 7,82 | 3,38 | | | |

$$H_0 = S_1 = S_2 = S_3$$

$$H_0 = S_1 \neq S_2 \neq S_3$$

Keterangan : F.Hitung > F. Tabel_(0,05 dan 0,01) berarti H_0 ditolak (Signifikan).

Tabel 6. Perbandingan antar Konsentrasi Substrat Sari Ubi Kayu

| Perbandingan | Selisih | BNT Hitung | | Keterangan |
|--------------|---------|------------|------|-------------------|
| | | 5% | 1% | |
| B – A | 1,09 | 1,28 | 2,73 | Tidak Berbeda |
| C – A | 2,09 | 1,28 | 2,73 | Sangat Signifikan |
| C – B | 0,94 | 1,28 | 2,73 | Tidak Berbeda |

Keterangan :

A : Sari Ubi Kayu Konsentrasi 35%

B : Sari Ubi Kayu Konsentrasi 40%

C : Sari Ubi Kayu Konsentrasi 45%

B – A = Substrat sari ubi kayu konsentrasi 35% dan 40% tidak berbeda produk nata yang dihasilkan dari segi ketebalannya.

C – A= Substrat sari ubi kayu konsentrasi 35% dan 45% produk nata yang dihasilkan dari kedua sari ubi kayu tersebut yang paling bagus adalah konsentrasi 45%.

C – B= Substrat sari ubi kayu konsentrasi 40% dan 45% tidak berbeda produk nata yang dihasilkan dari segi ketebalannya.

Sehingga dari perhitungan dapat disimpulkan bahwa dari ketiga konsentrasi sari ubi kayu tersebut yang membentuk nata yang paling tebal adalah nata sari ubi kayu konsentrasi 45%.

2. Rendamen Nata

Rendamen nata yang diperoleh ditentukan berdasarkan perbandingan antara berat nata dengan volume media fermentasi. Rendamen nata dapat dihitung dengan rumus rendamen yaitu $A/B \times 100\%$.

Keterangan :

A = Berat nata yang diperoleh

B = volume media fermentasi

Tabel 7. Hasil Perhitungan Rendamen

| Substrat sari Ubi Kayu | Rendamen (% b/v) |
|------------------------|------------------|
| S ₁ | 22,56 |
| S ₂ | 31,72 |
| S ₃ | 35,72 |

Keterangan :

- S₁ : Substrat Sari Ubi Kayu Konsentrasi 35%
 S₂ : Substrat Sari Ubi Kayu Konsentrasi 40%
 S₃ : Substrat Sari Ubi Kayu Konsentrasi 45%

3. Uji Organoleptis

Uji organoleptis meliputi warna, rasa, bau dan tekstur. Uji ini dilakukan berdasarkan skala hedonik yang digunakan adalah 1= tidak suka, 2 = cukup suka, 3 = agak suka, 4 = suka, 5= amat sangat suka.

Panelis diminta untuk mengemukakan pendapatnya dengan membandingkan Nata de Cassava dengan Nata de Coco yang diperoleh dipasaran. Dimana penilaian dengan menggunakan skala hedonik (1= tidak suka, 2 = cukup suka, 3 = agak suka, 4 = suka, 5= amat sangat suka).

Tabel 8. Hasil Pengujian Hedonik

| Panelis | Total Nilai Kesukaan | | | |
|----------------|----------------------|------|-----|---------|
| | Warna | Rasa | Bau | Tekstur |
| N ₁ | 42 | 43 | 37 | 41 |
| N ₂ | 45 | 41 | 44 | 43 |
| N ₃ | 42 | 46 | 44 | 45 |
| N ₄ | 45 | 46 | 45 | 45 |

Keterangan :

Warna : $N_2 = N_4 > N_1$ dan N_3

Bau : $N_4 > N_1, N_2$ dan N_3

Tekstur : $N_3 = N_4 > N_1$ dan N_2

Rasa : $N_3 = N_4 > N_1$ dan N_2

N_1 : Nata de Cassava Konsentrasi 35%
 N_2 : Nata de Cassava Konsentrasi 40%
 N_3 : Nata de Cassava Konsentrasi 45%
 N_4 : Nata de Coco Sebagai Pembanding
 $>$: Lebih Disukai
 $=$: Sama Disukai.

B. Pembahasan

Nata juga diartikan sebagai biomassa yang sebagian besar terdiri dari selulosa, berbentuk agar dan berwarna putih. Massa ini hasil dari pertumbuhan *Acetobacter xylinum* pada permukaan cair yang asam dan mengandung gula. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan nata diantaranya adalah bakteri dimana starter yang digunakan 6 hari setelah diinokulasi dengan biakan murni, starter yang telah berumur 9 hari (dihitung setelah diinokulasikan dengan biakan murni) tidak dianjurkan digunakan lagi karena kondisi fisiologis mikroba tidak optimum bagi fermentasi dan tingkat kontaminasi makin tinggi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah gula dimana gula merupakan sumber energi bagi mikroba yang dapat menghasilkan asam asetat bersamaan dengan terbentuknya selulosa yang membungkus sel bakteri. Namun pada penelitian ini tidak dilakukan penambahan gula karena menurut Ali (2009)

bahwa ubi kayu mengandung glukosa sebanyak 8,36% sehingga pada penelitian ini substrat sari ubi kayu tidak lagi dilakukan penambahan gula. Nitrogen juga sangat berperan dalam pertumbuhan *Acetobacter xylinum* maka digunakan urea dimana urea berguna untuk meningkatkan aktivitas *Acetobacter xylinum*. Suhu dan keasaman juga diperlukan untuk pertumbuhan bakteri *Acetobacter xylinum*, dimana pH medium yang baik sekitar 3 - 4 dan suhu temperatur optimum fermentasi adalah 28⁰C- 30⁰C.

Penelitian ini dilakukan untuk mengamati pengaruh penambahan konsentrasi sari ubi kayu dari konsentrasi 35%, 40%, 45% terhadap ketebalan, rendamen dan uji organoleptik yang meliputi tekstur (kekenyalan), warna, rasa, dan bau dari nata yang dihasilkan.

1. Ketebalan

Pada proses pembuatan nata de cassava, ketebalan merupakan salah satu faktor yang diperlukan untuk melihat hasil akhirnya. Ketebalan jalinan selulosa sebagai hasil dari proses fermentasi meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah sari ubi kayu yang ditambahkan pada medium fermentasi. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan nutrisi yang cukup pada medium tumbuh menyebabkan bakteri mampu melakukan metabolisme dan reproduksi yang cukup tinggi, sehingga produk metabolismenya pun semakin banyak. Monomer-monomer selulosa hasil sekresi *Acetobacter xylinum* terus berikatan satu dengan yang lainnya membentuk lapisan-lapisan yang terus menerus menebal seiring dengan berlangsungnya metabolisme *Acetobacter xylinum*.

Semakin banyak hasil sekresi *Acetobacter xylinum*, maka semakin tebal pula selulosa yang dihasilkan dari proses fermentasi.

Dari gambar 4 menunjukkan hasil pengukuran dari ketebalan nata rata - rata diperoleh ketebalan yang terbaik adalah substrat sari ubi kayu 45% dengan ketebalan nata 3,77 cm. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah sari ubi kayu pada medium fermentasi menyebabkan ketersediaan nutrien semakin besar, pada medium yang nutriennya tinggi (sampai batas tertentu) akan menyebabkan kesempatan *Acetobacter xylinum* untuk melakukan reproduksi semakin besar sehingga populasi *Acetobacter xylinum* pada medium pun lebih banyak.

2. Rendamen

Perhitungan rendamen nata yang diperoleh ditentukan berdasarkan perbandingan antara berat nata dengan volume media fermentasi. Dari hasil penimbangan, berat nata yang diperoleh sebelum pencucian yaitu 89,3 gr maka rendamen yang terbaik adalah nata de cassava konsentrasi 45% yaitu 22,56% b/v.

Berat selulosa yang dihasilkan semakin besar seiring dengan meningkatnya jumlah nutrien yang ditambahkan pada medium tumbuh. Semakin banyak nutrien yang tersedia, maka semakin banyak pula jalinan-jalinan selulosa yang dihasilkan sebagai produk metabolit sekunder. Jalinan-jalinan selulosa tersebut terus berikatan membentuk ikatan yang kokoh dan kompak. Menurut Djutikah (2002), berat selulosa yang dihasilkan selain dipengaruhi oleh tebal tipisnya selulosa, juga dipengaruhi

oleh kekompakan ikatan. Semakin kompak ikatannya akan semakin bertambah beratnya.

3. Uji Organoleptis

Uji organoleptis merupakan cara-cara pengujian terhadap sifat – sifat karakteristik bahan pangan dengan menggunakan indera manusia termasuk indera penglihatan, perasa, pembau, dan peraba.

Dalam penelitian ini, pengujian digunakan untuk menilai kualitas nata sari ubi kayu hasil eksperimen yang meliputi warna, rasa, bau, dan tekstur. Panelis diminta untuk menilai penampilan sampel berdasarkan sifat yang dinilai. Alat yang digunakan untuk melaksanakan pengujian panelis dipilih secara acak. Sifat yang dinilai ada beberapa kriteria yaitu warna, rasa, bau dan tekstur nata.

Dalam penelitian ini kategori nilai yaitu angka 5 untuk nilai amat sangat suka, angka 4 untuk nilai suka, angka 3 untuk nilai agak suka, angka 2 untuk nilai cukup suka dan angka 1 untuk nilai tidak suka. Dalam penilaian organoleptis ini digunakan nata de coco yang beredar dipasaran sebagai pembanding.

Warna pada suatu makanan sangatlah penting, karena dapat membangkitkan selera makan. Warna nata yang dihasilkan sebenarnya tergantung dari bahan dasar yang digunakan, tetapi melalui proses perebusan mempengaruhi warna dari nata menjadi putih bening. Untuk mengamati pengaruh setiap perlakuan terhadap warna nata de cassava yang dihasilkan, dilakukan penilaian warna nata oleh panelis. Dari

penilaian panelis diperoleh bahwa panelis lebih menyukai warna nata de cassava dari substrat ubi kayu konsentrasi 40% dibandingkan nata ta de cassava dari substrat sari ubi kayu konsentrasi 35% dan 45%.

Tekstur merupakan kenampakan dari luar yang dapat secara langsung dilihat oleh penilai sehingga akan mempengaruhi penilaian terhadap diterima atau tidaknya produk tersebut. Tekstur nata yang sebenarnya adalah kenyal artinya apabila digigit tidak lembek dan mengeras serta nata tersebut tidak tertinggal disela-sela gigi. Dari penilaian panelis diperoleh bahwa panelis lebih menyukai testur nata de cassava dari substrat sari ubi kayu konsentrasi 45% dibandingkan nata ta de cassava dari substrat sari ubi kayu konsentrasi 35% dan 40%.

Rasa dari nata yang sebenarnya adalah tidak berasa, tetapi karena proses perebusan dengan menggunakan gula dan penambahan sirup sehingga rasa nata menjadi enak. Dari penilaian panelis diperoleh bahwa panelis lebih menyukai rasa nata de cassava dari substrat sari ubi kayu konsentrasi 45% dibandingkan nata ta de cassava dari substrat sari ubi kayu konsentrasi 35% dan 40%.

Bau yang sukar diukur sehingga biasanya menimbulkan pendapat yang berlainan dalam menilai kualitas aromanya. Perbedaan pendapat disebabkan tiap orang memiliki perbedaan penciuman, meskipun mereka dapat membedakan bau namun setiap orang mempunyai kesukaan yang berlainan. Penilaian panelis diperoleh bahwa panelis lebih menyukai bau nata de cassava dari substrat sari ubi kayu konsentrasi 40% dan 45%

dibandingkan nata ta de cassava dari substrat sari ubi kayu konsentrasi 35%.

Pembuatan nata dengan menggunakan substrat sari ubi kayu yang konsentrasinya berbeda, dalam penelitian ini telah menunjukkan hasil, bahwa perbedaan konsentrasi substrat sari ubi kayu menyebabkan perbedaan ketebalan nata yang dihasilkan oleh *Acetobacter xylinum*. Perbedaan ini menggambarkan perbedaan kemampuan *Acetobacter xylinum* dalam menjalin selulosa (serat). Perbedaan kemampuan ini disebabkan adanya perbedaan kadar nutrisi yang tersedia dalam medium.

Dari hasil pengujian hedonik antara ke 3 konsentrasi nata de cassava yang dibuat dari substrat sari ubi kayu memperoleh hasil bahwa nata yang bermutu baik dari segi tekstur, rasa dan bau adalah nata de cassava dari substrat sari ubi kayu konsentrasi 45%. Warna nata de cassava dari substrat sari ubi kayu konsentrasi 45% yang disukai dapat dilakukan modifikasi dari segi formulasi sediaannya. Sedangkan dari Hasil pengujian hedonik dengan membandingkan nata de cassava dengan nata de coco sebagai pembanding, maka diperoleh hasil bahwa nata de cassava dari substrat sari ubi kayu mempunyai kualitas yang hampir sama dengan nata de coco yaitu dari segi warna, tekstur dan rasa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembuatan nata dari sari ubi kayu dalam beberapa konsentrasi diperoleh hasil antara lain :

1. Sari ubi kayu dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan nata.
2. Nata de cassava yang dibuat dari substrat sari ubi kayu konsentrasi 45% merupakan produk nata terbaik dari segi ketebalan, rendamen dan uji kesukaan.
3. Nata de Cassava yang dihasilkan mempunyai kualitas yang hampir sama dengan Nata de Coco yang ada dipasaran yaitu dari segi tekstur, warna dan rasa.

B. Saran


Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menggunakan hasil hidrolisis sari ubi kayu sebagai bahan dasar pembuatan produk nata.

DAFTAR PUSTAKA


- Al – Qur'an dan Terjemahannya.
- Athy. 1979. *Pengolahan Air Kelapa*. Perhimpunan teknologi Palawija Indonesia. Balai Penelitian kimia, Bogor.
- Ali. 2009. *Rahasia Sehat Untuk Makanan Berkhasiat*. PT. Agromedia Pustaka, jakarta.
- Agung. 2003. *Pembuatan Nata de Pina dari Filtrat Kulit dan Bonggol Nanas*. UNDIP, Semarang.
- Fardiaz. 2002. *Fisiologi Fermentasi*. Institute Pertanian, Bogor.
- Gembong. 2005. *Taksonomi Umum (Dasar-dasar Taksonomi Tumbuhan) Edisi Tiga*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Listianto. 2002. *Nata de Rice Salah Satu Diversifikasi Produk Hasil Pertanian*. UNDIP, Semarang.
- Lubis. 2002. *Pengawetan Dedak Dengan Metode Inkubasi*. Balitpa Sukamandi, Kerawang.
- Marlinda. 2006. *Membuat Nata de Coco*. Adicita Karya Nusa, Jakarta.
- Muiin. *Nata dan Acetobacter xylinum*. www.bdpunib.org. Di akses 03 Desember 2009.
- Nilawati. 2000. *Pengaruh Lama Penyimpanan Limbah Cair Tahu Dan Konsentrasi Asam Asetat Terhadap Mutu Nata De Soya*. Buletin HPI Balai Industri, Banda Aceh
- Octavia. 2003. *Pembuatan Nata de Banana dari Kulit Pisang Secara Fermentasi*. UNTAG, Semarang.
- Poedjiadi. 1994. *Dasar-dasar Biokimia*. Universitas Indonesia, Jakarta
- Pambayun. 2002. *Teknologi Pengolahan nata de Coco*. Teknologi Tepat Guna, Bogor.
- Riyadi. 1987. *Telaah Mengenai Mikroba Yang Berperan Dalam Pembuatan Nata de Coco*. Jurusan Biologi fakultas MIPA. IPB.

- Sigit. *Mengenal Khasiat Ubi Kayu*. [http : //Asian Brain. com](http://AsianBrain.com). Diakses 5 januari 2010.
- Soesono. 1987. *Sari Kelapa*. Inti Sari, Jakarta.
- Suratiningsih. 1997. *Pembuatan Nata dengan Menggunakan Berbagai Macam Buah dan Limbah*. STIP Farming, Semarang.
- Sutarminingsih, 2004. *Peluang Usaha Nata de coco*. Kanisius, Yogyakarta.
- Sugiono. 2005. *Statistika dalam Penelitian*. Alfabeta, Bandung.
- Sudarmaji. 1989. *Analisa Bahan Makanan dan Pertanian*. Penerbit Liberti, Yogyakarta.
- Sandi. 2008. *Rahasia Tumbuhan Berkhasiat Obat Perspektif Islam*. Universitas Islam Negeri Press, Malang.
- Tridjoko. *Nata Dibuat Dalam Lingkungan Sehat*. [http : //Kodinss. Or. Id](http://Kodinss.Or.Id). Diakses 1 januari 2010.
- Trijoko. 1992. *Pembuatan Nata de Coco*. Departemen Perindustrian Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Industri Hasil Pertanian, Bogor.
- Uning. 1999. *Studi Mengenai Umur Kultur bakteri Acetobacter xylinum Terhadap Pembentukan Polikel Pada Pembuatan Nata de Coco Secara Fermentasi Dalam Medium Air Kelapa*. Universitas Gajah mada, Yogyakarta.
- Widya. 1999. *Mempelajari Pengaruh Penambahan Skim Milk Kelapa Dan Jenis Gula Dengan Berbagai Konsentrasi Pada Pembuatan Nata de Coco*. Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Warisno. 2009. *Inspirasi Usaha Membuat Aneka Nata*. PT. Agromedia Pustaka, Jakarta.


Lampiran 1 : Skema Kerja




Gambar 1. Peremajaan Bakteri *Acetobacter xylinum*



Gambar 2. Pembuatan Starter





Gambar 3. Pembuatan Nata Konsentrasi 35%, 40 %, 45%

Lampiran 2 : Perhitungan Ketebalan Nata de Cassava

Tabel 4. Hasil Pengukuran Ketebalan Nata de Cassava

| Sari Ubi Kayu | Ketebalan (cm) | | | Jumlah | Rata – Rata | Diameter nata (cm) |
|----------------|----------------|------|------|--------|-------------|--------------------|
| | I | II | III | | | |
| S ₁ | 2,11 | 1,51 | 1,61 | 5,23 | 1,74 | 15 |
| S ₂ | 3,79 | 2,47 | 2,22 | 8,48 | 2,83 | 15 |
| S ₃ | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 11,3 | 3,77 | 15 |

Keterangan :

S₁ : Substrat Sari Ubi Kayu Konsentrasi 35%

S₂ : Substrat Sari Ubi Kayu Konsentrasi 40%

S₃ : Substrat Sari Ubi Kayu Konsentrasi 45%

Rancangan acak Kelompok Untuk Ketebalan Nata de Cassava

$$FK = \frac{625,5}{9} = 69,5$$

$$JK \text{ Total} = 77,32 - 69,5$$

$$= 7,82$$

$$JK \text{ Perlakuan} = \frac{226,96}{3}$$

$$= 6,15$$

$$JK \text{ Galat} = JK \text{ Total} - JK \text{ Perlakuan}$$

$$= 7,82 - 6,15$$

$$= 1,67$$

Keterangan :

FK : Faktor Koreksi

JK Perlakuan : Jumlah Kuadrat Perlakuan

JK Galat : Jumlah Kuadrat Galat

JK Total : Jumlah Kuadrat Total

$$\begin{aligned} \text{Diketahui, KT Galat} &= \frac{\text{JK Galat}}{\text{DB Galat}} \\ &= \frac{1,71}{6} \\ &= 0,28 \end{aligned}$$

Tabel 5. Tabel Anava

| Sumber Keragaman | DB | JK | KT | F.hitung | F. Tabel | |
|------------------|----|------|------|----------|----------|-------|
| | | | | | 5% | 1% |
| Perlakuan | 2 | 6,15 | 3,1 | | | |
| Galat | 6 | 1,67 | 0,28 | 11,1 | 5,14 | 10,92 |
| Total | 8 | 7,82 | 3,38 | | | |

$$H_0 = S_1 = S_2 = S_3$$

$$H_0 = S_1 \neq S_2 \neq S_3$$

Keterangan : F.Hitung > F. Tabel_(0,05 dan 0,01) berarti H_0 ditolak

(Signifikan). Analisis antar perlakuan dengan uji beda nyata terkecil

(BNT). Dari daftar tabel dengan DB Galat = 6, diperoleh :

$$t_{0,05} = 5,14$$

$$t_{0,01} = 10,92$$

$$\text{Sehingga BNT (5\%)} = \text{BNT 5\%} \times \frac{\sqrt{2 \text{ KT Galat}}}{n}$$

$$= 5,14 \times \frac{\sqrt{2 \times 0,28}}{3}$$

$$= 1,28$$

$$\text{BNT (1\%)} = \text{BNT 1\%} \times \frac{\sqrt{2 \text{ KT Galat}}}{n}$$

$$= 10,92 \times \frac{\sqrt{2 \times 0,28}}{3}$$

$$= 2,73$$

Tabel 6. Perbandingan antar Konsentrasi Substrat Sari Ubi Kayu

| Perbandingan | Selisih | BNT Hitung | | Keterangan |
|--------------|---------|------------|------|-------------------|
| | | 5% | 1% | |
| B – A | 1,09 | 1,28 | 2,73 | Tidak Berbeda |
| C – A | 2,09 | 1,28 | 2,73 | Sangat Signifikan |
| C – B | 0,94 | 1,28 | 2,73 | Tidak Berbeda |

Keterangan :

A : Substrat Sari Ubi Kayu Konsentrasi 35%

B : Substrat Sari Ubi Kayu Konsentrasi 40%

C : Substrat Sari Ubi Kayu Konsentrasi 45%

B – A = Substrat Sari ubi kayu konsentrasi 35% dan 40% tidak berbeda terhadap produk nata yang dihasilkan dari segi ketebalannya.

C – A= Substrat Sari ubi kayu konsentrasi 35% dan 45% berbeda nyata terhadap produk nata dari segi ketebalannya. Jadi, produk nata yang dihasilkan dari kedua sari ubi kayu tersebut yang paling bagus adalah konsentrasi 45%.

C – B= Substrat Sari ubi kayu konsentrasi 40% dan 45% tidak berbeda terhadap produk nata yang dihasilkan dari segi ketebalannya.

Kesimpulan : Konsentrasi 45% memiliki ketebalan terbaik pada pembuatan nata de cassava dari substrat sari ubi kayu.



Lampiran 3. Perhitungan Rendamen Nata de Cassava

Tabel 7. Hasil Perhitungan Rendamen

| Substrat sari Ubi Kayu | Rendamen (% b/v) |
|------------------------|------------------|
| S ₁ | 22,56 |
| S ₂ | 31,72 |
| S ₃ | 35,72 |

Keterangan :

S₁ : Substrat Sari Ubi Kayu Konsentrasi 35%

S₂ : Substrat Sari Ubi Kayu Konsentrasi 40%

S₃ : Substrat Sari Ubi Kayu Konsentrasi 45%

Perhitungan Rendamen

$$\begin{aligned} \text{Rendamen Nata de Cassava Konsentrasi 35\%} &= A/B \times 100\% \\ &= 66,4 \text{ g}/250 \text{ ml} \times 100\% \\ &= 26,56\% \text{ b/v} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rendamen Nata de Cassava Konsentrasi 40\%} &= A/B \times 100\% \\ &= 79,3 \text{ g}/250 \text{ ml} \times 100\% \\ &= 31,72\% \text{ b/v} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rendamen Nata de Cassava Konsentrasi 45\%} &= A/B \times 100\% \\ &= 89,3 \text{ g}/250 \text{ ml} \times 100\% \\ &= 35,72\% \text{ b/v.} \end{aligned}$$

Lampiran 4. Hasil Pengujian Hedonik

Tabel 8. Hasil Pengujian Hedonik

| Panelis | Total Nilai Kesukaan | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Warna | | | | Bau | | | | Tekstur | | | | Rasa | | | |
| | N ₁ | N ₂ | N ₃ | N ₄ | N ₁ | N ₂ | N ₃ | N ₄ | N ₁ | N ₂ | N ₃ | N ₄ | N ₁ | N ₂ | N ₃ | N ₄ |
| 1. | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 3. | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 4. | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 6. | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 7. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8. | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9. | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 10. | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Total | 42 | 45 | 42 | 45 | 37 | 44 | 44 | 45 | 41 | 43 | 45 | 45 | 43 | 41 | 46 | 46 |

Keterangan : Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa hasil pengujian hedonik antara

ke3 konsentrasi Nata de Cassava dapat disimpulkan bahwa :

Warna : $N_2 > N_1$ dan N_3

Bau : $N_3 = N_1 > N_2$

Tekstur : $N_3 > N_1$ dan N_2

Rasa : $N_3 > N_1$ dan N_2

Sedangkan dari perbandingan antara Nata de Cassava dengan Nata de

Coco dapat disimpulkan bahwa :

Warna : $N_2 = N_4 > N_1$ dan N_3

Bau : $N_4 > N_1, N_2$ dan N_3

Tekstur : $N_3 = N_4 > N_1$ dan N_2

Rasa : $N_3 = N_4 > N_1$ dan N_2

N_1 : Nata de Cassava Konsentrasi 35%


N_2 : Nata de Cassava Konsentrasi 40%

N_3 : Nata de Cassava Konsentrasi 45%


N_4 : Nata de Coco Sebagai Pembanding

> : Lebih Disukai

= : Sama Disukai.

Lampiran 5 : Grafik Hasil Pengamatan

Gambar 4. Grafik Hasil Pengukuran Ketebalan (%) Nata de Cassava dengan Variasi Konsentrasi Substrat Sari Ubi Kayu.




Gambar 5. Grafik hasil Perhitungan Rendamen (% b/v) Nata de Cassava dengan Variasi Konsentrasi Substrat Sari Ubi Kayu.

Lampiran 6 : Foto Sampel**Gambar 6. Foto Sampel**

Keterangan :

A = Foto Ubi Kayu

B = Foto Sari Ubi Kayu

Lampiran 7 : Foto Produk Nata de Cassava


Gambar 7. Foto Fermentasi Substrat Sari Ubi Kayu

Keterangan :

A = Foto Fermentasi Substrat Sari Ubi Kayu Konsentrasi 35%

B = Foto Fermentasi Substrat Sari Ubi Kayu Konsentrasi 40%


C = Foto Fermentasi Substrat Sari Ubi Kayu Konsentrasi 45%



Gambar 8. Foto Hasil Fermentasi Nata de Cassava

Keterangan :


- A = Foto Hasil Fermentasi Nata de Cassava Konsentrasi 35%
- B = Foto Hasil Fermentasi Nata de Cassava Konsentrasi 40%
- C = Foto Hasil Fermentasi Nata de Cassava Konsentrasi 45%



Gambar 9. Foto Nata de Cassava Setelah Perendaman dan Perebusan

Keterangan :

- A = Foto Nata de Cassava Konsentrasi 35%
- B = Foto Nata de Cassava Konsentrasi 40%
- C = Foto Nata de Cassava Konsentrasi 45%



Gambar 10. Foto Sediaan Nata de Cassava

Keterangan :

- A = Foto Sediaan Nata de Cassava Konsentrasi 35%
- B = Foto Sediaan Nata de Cassava Konsentrasi 40%
- C = Foto Sediaan Nata de Cassava Konsentrasi 45%



Gambar 11. Foto Nata de Coco Sebagai Pembanding



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R