

**GAMBARAN KONDISI LINGKUNGAN FISIK RUMAH
PENDERITA MALARIA KLINIS DI KEL. MATEKKO
KEC. GANTARANG KAB. BULUKUMBA**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A IKA HANDAYANI R
NIM : 70200108041

**PROGRAM STUDI KESEHATAN LINGKUNGAN
JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika kemudian terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat dengan bantuan orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini atau gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 2 Agustus 2012

Penulis

Ika Handayani
NIM 70200108041

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Gambaran Kondisi Lingkungan Fisik Rumah Penderita Malaria Klinis di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*” yang disusun oleh **Ika Handayani NIM : 70200108041** mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari **Senin**, tanggal **30 Juli 2012**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH, MH.Kes (.....)

Sekretaris : Fatmawaty Mallapiang, SKM, M.Kes (.....)

Pembimbing I : Andi Susilawaty, S.Si, M.Kes (.....)

Pembimbing II: Irviani A Ibrahim, SKM, M.Kes (.....)

Penguji I : dr. Muchlis Manguluang, M.Kes (.....)

Penguji II : Drs. Wahyuddin G, M.Ag (.....)

Samata Gowa, 2 Agustus 2012

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH, MH.Kes
NIP. 19530119 198110 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Persepsi Remaja Tentang Citra Tubuh (body image) di SMK Negeri 8 Makassar*” yang disusun oleh **Rini Jusriani NIM : 70200108076** mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, tanggal **3 Agustus 2012**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH, MH.Kes (.....)


Sekretaris : Fatmawaty Mallapiang, SKM, M.Kes (.....)

Pembimbing I : Hj. Syarfaini, SKM, M.Kes (.....)

Pembimbing II: Andi Susilawaty, S.Si, M.Kes (.....)

Penguji I : Dr. Hikmawati Mas'ud, M.Kes (.....)

Penguji II : Drs. Hamsah Hasan, M.Ag (.....)



Samata Gowa, 3 Agustus 2012

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Rasyidin Abdullah, MPH, MH.Kes
NIP. 19530119 198110 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Analisis Faktor Risiko Kejadian Tuberkulosis(TB) Paru di Wilayah Puskesmas Panambungan Kota Makassar Tahun 2012*” yang disusun oleh **Ana Utami Zainal NIM : 70200108012** mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari **Senin**, tanggal **23 Juli 2012**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Rasyidin Abdullah, MPH, MH.Kes (.....)

Sekretaris : Drs. Wahyuddin G, M.Ag (.....)

Pembimbing I : Nurdiyanah S, SKM, MPH (.....)

Pembimbing II: Fatmawaty Mallapiang, SKM, M.Kes (.....)

Penguji I : Ruslan La Ane, SKM, MPH (.....)

Penguji II : Drs. Supardin, M.HI (.....)

Samata Gowa, 30 Juli 2012

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Rasyidin Abdullah, MPH, MH.Kes
NIP. 19530119 198110 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Hubungan Kebiasaan Merokok dan Status Gizi dengan Prestasi Belajar pada Siswa SMA Negeri 10 Kota Makassar Tahun 2012*” yang disusun oleh **Awal Arjuna Saputra NIM : 70200108020** mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, tanggal **2 Agustus 2012**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH, MH.Kes (.....)

Sekretaris : Drs. Wahyuddin G, M.Ag (.....)

Pembimbing I : Nurdiyanah S, SKM, MPH (.....)

Pembimbing II: Hj.Syarfaini, SKM, M.Kes (.....)

Penguji I :dr. Muh.Kidri Alwi (.....)

Penguji II : Drs. Hamsah Hasan, M.HI (.....)



Samata Gowa, 03 Agustus 2012

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH, MH.Kes
NIP. 19530119 198110 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Studi Penggunaan Zat Pengawet Boraks dan Formalin Pada Makanan Jajanan Oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Sentral Makassar Tahun 2012*” yang disusun oleh **Chairul Amal Muthalib NIM : 70200108021** mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari **Jumat, tanggal 3 Agustus 2012**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH, MH.Kes (.....)

Sekretaris : Drs. Wahyuddin G, M.Ag (.....)

Pembimbing I : Hj.Syarfaini, SKM, M.Kes (.....)

Pembimbing II: Nurdiyanah S, SKM, MPH (.....)

Penguji I : Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH, MH.Kes (.....)

Penguji II : Muh.Sabir Maidin, S.Ag, M.Ag (.....)

Samata Gowa, 03 Agustus 2012

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH, MH.Kes
NIP. 19530119 198110 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Gambaran Kondisi Lingkungan Fisik Rumah Penderita Malaria Klinis di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba*”. Laporan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana di Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari tanpa bantuan berbagai pihak tidak banyak yang bisa penulis lakukan dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan laporan skripsi ini kepada :

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT. M.S. Selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH. MH. Kes Selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Andi Susilawaty, S.Si. M.Kes Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan dalam skripsi ini.
4. Irviani A Ibrahim, SKM. M.Kes Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan dalam skripsi ini.
5. dr. Muchlis Manguluang, M.Kes Selaku penguji I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan dalam skripsi ini.

6. Drs. Wahyuddin G, M.Ag Selaku penguji II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan dalam skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu prodi kesehatan masyarakat yang telah berjasa mengajar dan mendidik selama kuliah di UIN.
8. Kepala dinas kesehatan Kabupaten Bulukumba dan pak Ikhwan selaku pengelola program malaria yang telah memberikan banyak bantuan pada saat pengambilan data dan penelitian skripsi ini.
9. Kepala Puskesmas Ponre Kelurahan Matekko, Bapak Lurah Matekko, Bapak M.Yusuf selaku juru malaria Kelurahan Matekko yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.
10. Yang tersayang, terkasih, dan tercinta kedua orang tuaku Zulkifli dan Yumna yang telah memberikan doa tanpa kenal waktu, semangat, nasihat, dukungan, dan kasih sayang yang tak terhitung banyaknya.
11. Buat keluarga besar penulis yang telah banyak membantu dalam segala hal baik itu materi dan doa yang tulus serta nasihat dan dorongan selama kuliah sampai penyelesaian skripsi ini.
12. Special thanks for my friendship never die (Nanna, Helmi, Nurhasanah, Ratna, Mirna, Nur) atas doa, bantuan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama ini dan telah menunjukkan arti sebuah persahabatan.
13. Sahabat seperjuanganku “Team Malaria” Rahmat, Iwan, dan Nitzar atas bantuan, saran, tenaga, pikiran, dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

14. Sahabat KesMas angkatan 2008 (08 Kiii Iniee) Khususnya peminatan Kesling ; Auza yang telah banyak membantu penulis, Buu Aji, Ntut, dara, ical, Andi Adnan, atas doa bantuan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis.
15. Sahabat Jawi-Jawi- KKN 47, terima kasih buat persahabatan, perhatian, dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Kalian telah memberikan warna dalam hidupku.
16. Terima kasih juga buat kak Anti, kak uti, wana, ci'ma, cute, ib, yang telah banyak membantu dalam penelitian. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan serta masih diperlukan penyempurnaan, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya.



Makassar, Juli 2012

Penulis

Ika Handayani
70200108041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1-9
a. Latar Belakang	1
b. Rumusan Masalah.....	7
c. Tujuan Penulisan.....	7
d. Manfaat Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10-54
a. Tinjauan Umum Tentang Malaria.....	10
b. Tinjauan Umum Tentang Nyamuk Anopheles	30
c. Tinjauan Umum Tentang Variabel yang diteliti	46
d. Kerangka Teori	54
BAB III KERANGKA KONSEP	55-60
a. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian	55
b. Kerangka Konseptual	58
c. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	58
BAB IV METODE PENELITIAN	61-65
a. Jenis Penelitian	61
b. Lokasi Penelitian	61
c. Populasi dan Sampel	62
d. Tehnik Pengumpulan Sampel	64
e. Cara Pengumpulan Data	64

f. Instrumen Penelitian	65
g. Pengolahan dan Penyajian Data	65
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66-93
a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	66
b. Hasil Penelitian	75
c. Hasil Pembahasan	80
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	94-95
a. Kesimpulan	94
b. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel II.1	Daftar penelitian tentang kejadian malaria	52
Tabel V.1	Jumlah penduduk Kelurahan Matekko menurut usia.....	68
Tabel V.2	Jumlah penduduk Kelurahan Matekko menurut agama.....	69
Tabel V.3	Jumlah mesjid di Kelurahan Matekko menurut lingkungan	69
Tabel V.4	Jumlah penduduk Kelurahan Matekko menurut pekerjaan.....	70
Tabel V.5	Jumlah penderita malaria klinis tahun 2008-2012	72
Tabel V.6	Jumlah penderita malaria positif tahun 2008-2012.....	73
Tabel V.7	Distribusi penderita malaria klinis berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.....	77
Tabel V.8	Distribusi penderita malaria klinis berdasarkan umur di Kelurahan Marekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.....	78
Tabel V.9	Distribusi penderita malaria klinis berdasarkan kondisi fisik rumah di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.....	78
Tabel V.10	Distribusi rumah penderita malaria klinis berdasarkan suhu udara dalam rumah di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.....	79

Tabel V.11	Distribusi rumah penderita malaria klinis berdasarkan kelembaban udara dalam rumah di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.....	79
Tabel V.12	Distribusi rumah penderita malaria klinis berdasarkan keberadaan <i>breeding place</i> di sekitar rumah di Kelurahan Marekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Tahun 2012	78
Tabel V.13	Distribusi rumah penderita malaria klinis berdasarkan jenis <i>breeding place</i> di sekitar rumah di Kelurahan Marekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.....	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar II.1	Penyebaran vektor malaria di Indonesia	18
Gambar II. 2	Cara penularan penyakit malaria.....	23
Gambar II. 3	Cara penularan penyakit malaria.....	23
Gambar II. 4	Nyamuk <i>Anopheles</i>	30
Gambar II. 5	Siklus hidup nyamuk <i>Anopheles</i>	34
Gambar II. 6	Telur nyamuk <i>Anopheles</i>	34
Gambar II. 7	Larva nyamuk <i>Anopheles</i>	35
Gambar II. 8	Pupa nyamuk <i>Anopheles</i>	36
Gambar V.1	Jumlah penduduk Kelurahan Matekko menurut jenis kelamin.....	67

DAFTAR SINGKATAN

ACD	: Active Case Detection
AMI	: Annual Malaria Incidence
An	: Anopheles
API	: Annual Parasite Incidence
KLB	: Kejadian Luar Biasa
Kopem	: Komando operasi pembasmian malaria
MOMI	: Monthly Malaria Incidence
PCD	: Passive Case Detection
RMB	: Roll Back Malaria
WHO	: World Health Organization

ABSTRAK

Nama Penyusun : Ika Handayani
Nim : 70200108041
Judul : Gambaran Kondisi Lingkungan Fisik Rumah Penderita Malaria Klinis di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.
(Nama Pembimbing : Andi Susilawaty, S.Si, M.Kes dan Irviani A Ibrahim, SKM, M.Kes).

Malaria masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Kelurahan Matekko merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Gantarang yang Endemis malaria dengan AMI (*Annual Malaria Incidence*) yaitu 39,9 % pada tahun 2011. Kejadian malaria disebabkan adanya kontak manusia dengan nyamuk *Anopheles* dan didukung oleh kondisi perumahan dan lingkungan yang kurang baik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi lingkungan fisik rumah penderita malaria klinis di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.

Jenis penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan Deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh rumah yang terdapat di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba sebanyak 820 rumah. Dengan pengambilan sampel secara purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 74 rumah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi fisik rumah yang meliputi 17,7% rumah yang tidak memiliki ventilasi, 94,1% rumah yang tidak memakai kawat kasa nyamuk, 56,5% rumah terdapat lubang, 58,1% rumah yang tidak memiliki plafon/langit-langit rumah, 74,1% suhu rumah dalam kondisi optimum dalam perkembangbiakan nyamuk anopheles, 98,3% kelembaban rumah dalam kondisi optimum dalam perkembangbiakan nyamuk anopheles, 61,3% rumah terdapat breeding place disekitar rumah.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi fisik rumah belum mampu menghalangi nyamuk masuk ke dalam rumah, suhu dan kelembaban rumah merupakan suhu optimum dalam perkembangbiakan nyamuk anopheles, breeding place menunjang kehidupan nyamuk anopheles. Disarankan agar menghindari gigitan nyamuk, hendaknya ventilasi dipasang kawat kasa agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, dan rumah hendaknya dipasang langit-langit untuk mencegah nyamuk masuk ke dalam rumah, dan pentingnya diperhatikan lingkungan sekitar rumah terutama genangan air untuk mencegah terbentuknya *breeding place* nyamuk.

Kata Kunci : Lingkungan, Kondisi fisik rumah, Malaria.

Kepustakaan : 33 (2000-2011)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium* yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia dan secara alami ditularkan melalui gigitan nyamuk *Anopheles* betina. Penyakit malaria sampai saat ini ternyata masih menjadi masalah kesehatan umum yang utama di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang, seperti negara-negara Amerika Latin, Afrika sub-Sahara, Asia Selatan, sebagian Asia Timur (terutama Cina), dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia (Nugroho, A. dkk, 2000).

Dalam buku *The World Malaria Report 2005*, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa malaria merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat utama di 104 negara di dunia. Terutama pada negara-negara yang tersebar diantara 64 derajat garis lintang utara dan 32 derajat lintang selatan. Di dunia diperkirakan kurang lebih ada 300 juta hingga 500 juta kasus malaria dengan kematian berkisar antara 750.000 hingga 2 juta kematian setiap tahun (Gunawan, 2000).

Sekitar 2 juta kematian per tahun di seluruh dunia karena infeksi *Plasmodium*. Sebagian besar terjadi pada anak di bawah usia 5 tahun di negara-negara Afrika sub-Sahara. Ada sekitar 400 juta kasus baru per tahun di seluruh dunia. Di Amerika, kebanyakan orang didiagnosis terinfeksi malaria yang diperoleh dari luar negeri, biasanya ketika tinggal atau melakukan

perjalanan melalui daerah dimana merupakan kawasan endemik penyakit malaria.

Berdasarkan laporan dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), terdapat lebih dari 2400 juta penduduk atau 40% penduduk dunia tinggal di daerah endemis malaria. Data WHO menyebutkan tahun 2008 terdapat 544.470 kasus malaria di Indonesia, di mana tahun 2009 terdapat 1.100.000 kasus dan tahun 2010 meningkat lagi menjadi 1.800.000 kasus dan telah mendapat pengobatan.

Berdasarkan kasus diatas diperlukan pendekatan baru dalam pemberantasan malaria yakni dengan mengembangkan suatu program satu respon terpadu untuk mengatasi masalah endemis malaria di negara-negara berkembang. Respon tersebut berupa *Roll Back Malaria* (RBM) yang diartikan sebagai "gebrak malaria" yang merupakan gerakan bersama, terpadu antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga donor dan masyarakat. Dimana Badan Kesehatan Dunia (WHO) selain sebagai pemimpin prakarsa juga bertindak sebagai katalisator dalam kemitraan tersebut *Roll Back Malaria* (RBM) bertujuan mengurangi penderita malaria sebanyak 50% pada tahun 2010 melalui pendekatan partnership (Laihad, 2000).

Indonesia merupakan salah satu negara dari 104 negara di dunia yang mengalami masalah kesehatan terkait dengan malaria. Di Indonesia penyakit malaria sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat. Oleh karena malaria menyebabkan tingginya angka kematian bayi, anak balita, wanita hamil yang muaranya dapat menurunkan produktivitas sumber daya

manusia. Umumnya penyakit malaria ditemukan di daerah-daerah terpencil dan sebagian penderitanya dari golongan ekonomi lemah. Dan salah satu permasalahan yang muncul di beberapa wilayah di Indonesia yaitu terjadinya resistensi nyamuk pembawa terhadap insektisida, sedangkan parasit telah mengembangkan resistensi terhadap antibiotik. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam mengendalikan baik tingkat infeksi dan penyebaran penyakit malaria ini (Yusri, 2011).

Dengan melihat permasalahan diatas Indonesia telah mengeluarkan satu program Indonesia bebas malaria tahun 2030 dengan eliminasi malaria. Untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Kab. Kepulauan Seribu saat ini dalam proses persiapan memasuki tahap eliminasi malaria disusul Provinsi Bali dan Pulau Batam. Pada tahun 2015 ditargetkan Provinsi Aceh, Kepulauan Riau dan Pulau Jawa. Pada tahun 2020 untuk seluruh wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan NTB. Selanjutnya pada tahun 2030 wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT, sehingga seluruh Indonesia akan bebas malaria pada tahun 2030 (Kemkes RI). Dari 576 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, 424 kabupaten/kota merupakan daerah endemis malaria. (Depkes RI, 2006).

Bulukumba sebagai salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang merupakan daerah endemik malaria. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba tercatat pada tahun 2007 ditemukan kasus malaria klinis 1.955 orang dan yang positif sebanyak 528 orang. Pada tahun 2008 ditemukan kasus malaria klinis 2.677 orang dan yang positif sebanyak 1.920

orang. Pada tahun 2009 ditemukan kasus malaria klinis 5.899 orang dan yang positif 1.777 orang, sedangkan pada tahun 2010 ditemukan kasus malaria klinis 8.605 orang dan yang positif sebanyak 2.077 orang, sedangkan pada tahun 2011 ditemukan kasus malaria klinis sebanyak 7.947 orang dan yang positif sebanyak 112 orang (Dinkes Kab. Bulukumba, 2011).

Proses penanggulangan dan pemberantasan malaria di Kabupaten Bulukumba sudah lama dilakukan akan tetapi masih ada masyarakat yang menderita malaria, hal ini kemungkinan besar disebabkan karena adanya mobilitas penduduk luar yang masuk ke daerah ini dalam jumlah yang besar dan bersamaan. Selain itu karakteristik Wilayah Kabupaten Bulukumba yang secara geografis yang memiliki pantai, daerah persawahan, dan laut lepas sangat menunjang populasi vektor. Selain itu di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bulukumba yang berada di daerah-daerah dataran rendah yang umumnya terletak di sepanjang pantai dimana sering terjadi pasang laut yang mencapai daratan, sehingga meninggalkan genangan-genangan air bila pasang berakhir. Demikian juga dengan perilaku penduduk yang membiarkan sampah-sampah berserakan dan tidak membersihkan lingkungan di sekitar rumahnya sehingga mempermudah penularan malaria.

Kecamatan Gantarang merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bulukumba. dimana Kecamatan Gantarang terdiri dari 20 Desa/Kelurahan. Kecamatan ini memiliki unit pelayanan kesehatan yang berupa Puskesmas. Puskesmas Ponre merupakan salah satu Puskesmas yang berada di Kecamatan Gantarang, wilayah kerja Puskesmas Ponre terdiri dari

13 Desa/Kelurahan yaitu Kelurahan Matekko, Kelurahan Jalanjang, Kelurahan Mariorennu, Desa Barombong, Desa Bialo, Desa Bontosunggu, Desa Bontonyeleng, Desa Bukit harapan, Desa Bukit tinggi, Desa Dampang, Desa Polewali, Desa Paenre Lompoe, Desa Palambarae. Dari beberapa Desa/Kelurahan tersebut Kelurahan Matekko yang menempati posisi tertinggi dalam kasus malaria (Puskesmas Ponre, 2011).

Dari data malaria yang tercatat di laboratorium Puskesmas tersebut tercatat pada tahun 2007 ditemukan kasus malaria klinis sebanyak 1.228 orang dengan AMI sebesar (27,9%) dan positif sebanyak 447 orang dengan API sebesar (10,2%). Pada tahun 2008 terjadi penurunan kasus yakni ditemukan kasus malaria klinis sebanyak 833 orang dengan AMI sebesar (18,9%) dan yang positif sebanyak 362 orang dengan API sebesar (8,2%). Sedangkan pada tahun 2009 kembali terjadi peningkatan yakni ditemukan kasus malaria klinis 1.195 orang dengan AMI sebesar (27,1%) dan yang positif sebanyak 388 orang dengan API sebesar (8,8%). Dan pada tahun 2010 terjadi peningkatan secara drastis yakni ditemukan kasus malaria klinis 1.965 orang dengan AMI sebesar (44,5%) dan yang positif sebanyak 459 orang dengan API sebesar (10,4%). Adanya kasus di daerah tersebut menunjukkan bahwa penularan penyakit masih terus berlangsung dan pengendalian vektor harus dilakukan (Puskesmas Ponre, 2011).

Serangan penyakit malaria di wilayah Kerja Puskesmas Ponre khususnya di Kelurahan Matekko memang menunjukkan grafik peningkatan kasus. Hal ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan penanganan yang

lebih serius agar dapat mengurangi jumlah penderita malaria. Kasus ini sudah sangat mengerikan dan apabila tidak segera dilakukan pemberantasan berbagai dampak kesehatan akan timbul, Salah satu faktor pemicu mewabahnya penyakit malaria adalah masa pergantian musim kemarau ke musim hujan, pergantian global iklim, dan keadaan konstruksi rumah penduduk yang terdiri dari penggunaan kawat kasa pada ventilasi, kelembaban udara dalam rumah, dan suhu udara dalam rumah, yang mempunyai dampak langsung pada reproduksi vektor perkembangan, dan penularannya.

Berdasarkan hasil penelitian Pamela (2009) menyatakan bahwa ada hubungan yang bermakna antara keberadaan kawat kasa pada ventilasi, keberadaan langit-langit, kerapatan dinding, keberadaan semak-semak, keberadaan parit atau selokan dan keberadaan kandang ternak dengan kejadian malaria. dan berdasarkan hasil penelitian Romadon (2001) menyatakan bahwa ada hubungan bermakna antara keberadaan genangan air dengan kejadian malaria. Selain itu juga telah dilakukan penelitian oleh Darmadi (2002), diketahui bahwa ada hubungan yang bermakna antara kondisi fisik rumah dengan kejadian malaria.

Peningkatan kasus malaria di Kelurahan Matekko di perkirakan berkaitan dengan kondisi fisik rumah yaitu mudah tidaknya nyamuk masuk ke dalam rumah yang dipengaruhi oleh keberadaan ventilasi, keberadaan kawat kasa pada ventilasi, dinding rumah, keberadaan plafon/langit-langit rumah, suhu udara dalam rumah, kelembaban udara dalam rumah dan

keberadaan *breeding place* lingkungan sekitar rumah. Berdasarkan data yang dihimpun di Kelurahan Matekko jumlah rumah yang terdapat di Kelurahan Matekko sebanyak 820 rumah, rata-rata rumah di Kelurahan Matekko dominan rumah panggung hanya sebagian kecil rumah permanen ini disebabkan Kelurahan Matekko adalah daerah pesisir pantai selain itu mayoritas penduduk Kelurahan Matekko bermata pencaharian petani rumput laut, nelayan, dan petani padi.

Berdasarkan data tersebut rumah penduduk di Kelurahan Matekko masih banyak yang berkategori rendah, hal ini dapat memicu timbulnya penyakit menular misalnya penyakit malaria. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi kejadian penyakit malaria adalah berkaitan dengan kondisi fisik rumah, kondisi lingkungan fisik rumah, kondisi lingkungan sekitar rumah (Ambarwati dan Dina, 2007).

Berdasarkan latar belakang di atas maka merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk diteliti olehnya itu dilakukan penelitian tentang ***Gambaran Kondisi Lingkungan Fisik Rumah Penderita Malaria Klinis di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran kondisi lingkungan fisik rumah penderita malaria klinis di

Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Tahun 2012”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran kondisi lingkungan fisik rumah penderita malaria klinis di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mendapatkan/memperoleh gambaran tentang kondisi fisik rumah yang meliputi keberadaan ventilasi, keberadaan kawat kasa pada ventilasi, dinding rumah, dan keberadaan plafon/langit-langit rumah pada rumah penderita malaria klinis di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.
- b. Untuk mendapatkan gambaran tentang suhu udara dalam rumah penderita malaria klinis di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.
- c. Untuk mendapatkan gambaran tentang kelembaban udara dalam rumah penderita malaria klinis di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.
- d. Untuk mengetahui keberadaan *breeding place* lingkungan sekitar rumah penderita malaria klinis di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi institusi kesehatan sebagai bahan masukan bagi dinas kesehatan, puskesmas dan instansi terkait dalam melakukan pengendalian dan pemberantasan penyakit malaria.
2. Bagi masyarakat sebagai informasi bagi masyarakat tentang penyakit malaria dan faktor-faktor penyebabnya terutama faktor lingkungan yang bisa menjadi tempat perindukan nyamuk sehingga pencegahan penyakit malaria dapat dilaksanakan.
3. Bagi peneliti sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi peneliti yang berkaitan dengan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kejadian malaria sehingga dapat dilakukan pemberantasan penyakit malaria pada daerah tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Malaria

1. Pengertian Malaria

Malaria adalah suatu istilah yang diperkenalkan oleh Dr. Francisco Torti pada abad ke 17, malaria berasal dari bahasa Itali *Mal* = kotor, sedangkan *Aria* = udara berarti udara yang kotor (Gandahusada, 2006).

Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium* yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia. Penyakit ini secara alami ditularkan melalui gigitan nyamuk anopheles betina. Penyakit malaria ini dapat menyerang siapa saja terutama penduduk yang tinggal di daerah di mana tempat tersebut merupakan tempat yang sesuai dengan kebutuhan nyamuk untuk berkembang biak (PP & PL, 2008).

Malaria diduga berasal dari benua Afrika, asal muasal umat manusia dimana Fosil nyamuk ditemukan pada lapisan geologi yang berumur 30 juta tahun (Putu S, dalam Babba 2007). Kemudian ditemukan kembali oleh Laveran pada tahun 1880 dengan melihat adanya bentuk seperti pisang dalam darah penderita malaria, sehingga diketahui bahwa penularan malaria dilakukan oleh nyamuk yang banyak terdapat di sekitar rawa-rawa.

Menurut Hipocrates (460 SM- 377 SM) menyebutnya sebagai Malaria atau udara buruk, karena penderita menggigil karenanya. Penderita umumnya tinggal dirawa-rawa yang mengeluarkan gas-gas yang

berbau busuk, sehingga sebagian besar masyarakat pada zamannya menduga atau percaya bahwa udara buruk sekitar rawa menjadi penyebab malaria (Achmadi,2005).


Di Indonesia ditemukan 4 spesies parasit malaria yang menginfeksi manusia yaitu *Plasmodium falciparum*, *Plasmodium vivax*, *Plasmodium malariae*, dan *Plasmodium ovale*. Dimana *Plasmodium falciparum* menyebabkan malaria tropika. Plasmodium ini merupakan sebagian besar penyebab kematian akibat malaria. Organisme bentuk ini sering menghalangi jalan darah ke otak, menyebabkan koma, mengigau dan kematian, *Plasmodium vivax* menyebabkan malaria tertiana, jenis malaria ini merupakan jenis malaria yang paling ringan, *Plasmodium malariae* menyebabkan malaria kuartana, memiliki masa inkubasi lebih lama dari pada penyakit malaria tertiana atau tropika, *Plasmodium ovale* menyebabkan malaria ovale (Prasetyo, 2006).

Penyakit malaria juga dapat dikatakan sebagai penyakit yang muncul kembali (*re-emerging disease*). Hal ini disebabkan oleh pemanasan global yang terjadi karena polusi akibat ulah manusia yang menghasilkan emisi dan gas rumah kaca yang menyebabkan atmosfer bumi memanas dan merusak lapisan ozon, sehingga radiasi matahari yang masuk ke bumi semakin banyak dan terjebak di lapisan bumi karena terhalang oleh rumah kaca, sehingga temperatur bumi kian memanas dan terjadilah pemanasan global (Soemirat, dalam Harmendo, 2008).

Akibat pemanasan global adalah menipisnya lapisan ozon yang mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan, dan mengakibatkan

penyebaran penyakit parasitik yang ditularkan melalui nyamuk dan serangga lainnya semakin mengganas. Perubahan temperatur, kelembaban, dan curah hujan yang ekstrim mengakibatkan nyamuk lebih sering bertelur sehingga vektor sebagai penular penyakit pun bertambah dan sebagai dampak muncul berbagai penyakit, diantaranya demam berdarah dan malaria (Harijanto, 2000).

Terjadinya perubahan di bumi mengakibatkan terjadinya degradasi dan kerusakan lingkungan, sekarang ini memang sudah terlihat jelas bahwa begitu banyak kerusakan yang telah terjadi di bumi baik itu di darat maupun dilaut. hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam Q.S. Ar-rum (30) : 41



Terjemahnya :

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dalam Tafsir al-Misbah diuraikan tentang ayat-ayat diatas yaitu mempersekutukan Allah dan mengabaikan tuntunan-tuntunan agama, berdampak buruk terhadap diri mereka, masyarakat, dan lingkungan. Ini dijelaskan oleh ayat diatas dengan menyatakan: *telah nampak kerusakan di darat*, seperti kekeringan, paceklik, hilangnya rasa aman, *dan di laut*,

seperti ketertenggelaman, kekurangan hasil laut dan sungai, *disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang durhaka sehingga akibatnya Allah mencicipkan*, yakni merasakan sedikit, *kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan dosa dan pelanggaran mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.*

Dosa dan pelanggaran yang dilakukan manusia mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat dan di laut. Sebaliknya, ketiadaan keseimbangan di darat dan di laut mengakibatkan siksaan kepada manusia. Demikian pesan ayat di atas. Semakin banyak perusakan terhadap lingkungan, semakin besar pula dampak buruknya terhadap manusia. Semakin banyak dan beraneka ragam dosa manusia, semakin parah pula kerusakan lingkungan (Shihab, 2002).


Banyaknya dosa yang diperbuat oleh manusia, semakin parah pula kerusakan lingkungan. Hal ini menjadi bukti bahwa semakin banyaknya penyakit yang diturunkan oleh Allah swt kepada manusia akibat kerusakan lingkungan, salah satunya adalah malaria.


Salah satu perbuatan yang dilakukan oleh penduduk Kelurahan Matekko menurut hasil wawancara langsung oleh masyarakat sekitar pantai bahwa sudah dilakukan penebangan hutan bakau di daerah pantai, sehingga kemungkinan besar bekas penebangan tersebut menghasilkan genangan air sehingga memberikan konstribsi positif bagi nyamuk *Anopheles* untuk berkembangbiak.

Kerusakan lingkungan juga berkaitan erat dengan pemanasan global, Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa pemanasan global (global warming) akan banyak berdampak bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Perubahan temperatur dan curah hujan yang ditimbulkan memberikan kesempatan berbagai macam virus dan bakteri penyakit tumbuh lebih luas. Salah satu dampak dari pemanasan global ini adalah mewabahnya penyakit menular seperti malaria.

Penyakit menular berkaitan erat dengan iklim, terutama penyakit tropis seperti malaria yang ditularkan melalui nyamuk. Nyamuk bergantung pada suhu hangat serta tingginya curah hujan agar mereka bisa bertahan. Dan dalam kondisi tersebut, penularan malaria bisa meningkat jika suhu global meningkat

Untuk itu perlu adanya introspeksi diri agar supaya kerusakan lingkungan bisa ditangani dan memang sudah barangtentu manusia harus peduli terhadap lingkungan, apalagi manusia telah diangkat oleh Allah sebagai khalifah. Hal ini dapat dilihat dalam Surat Al-Baqarah (2) : 30 yang berbunyi sebagai berikut :





Terjemahnya :


Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Dalam Tafsir al-Misbah diuraikan tentang ayat-ayat diatas yaitu kelompok ayat ini dimulai dengan penyampaian keputusan Allah kepada para malaikat tentang rencana-Nya menciptakan manusia di bumi. Penyampaian kepada mereka penting karena malaikat akan dibebani sekian tugas menyangkut manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa kekhalifahan terdiri dari wewenang yang dianugerahkan Allah SWT. Makhluk yang disertai tugas, yakni Adam as. Dan cucunya serta wilayah tempat bertugas yakni bumi yang terhampar ini. Jika demikian, kekhalifahan mengharuskan makhluk yang disertai tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah yang memberinya tugas dan kewenangan. Kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah pelanggaran terhadap makna dan tugas kekhalifahan. (Shihab, 2002).

Dalam ayat Al-Quran di atas telah dijelaskan bahwa manusia diciptakan di muka Bumi ini sebagai khalifah yang ditugaskan untuk mengatur bumi, memakmurkan bumi, mengolah bumi agar makmur, menjaga bumi dari kerusakan akan tetapi manusia belum mampu melakukan hal itu. Manusia diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk

hidup di Dunia untuk memakmurkan dunia ini. Hal ini sesuai dengan

Firman Allah dalam Surah Huud (11) : 61



Terjemahnya :

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Dalam Tafsir al-Misbah diuraikan tentang ayat-ayat di atas yaitu dijelaskan bahwa manusia dijadikan di dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia. Kata *memakmurkan* dipahami sebagai antonim dari kata kehancuran dan ada yang memahaminya dalam arti perintah sehingga kata tersebut berarti Allah memerintahkan kamu memakmurkan bumi dan ada juga yang memahaminya sebagai fungsi penguat, yakni menjadikan kamu benar-benar mampu memakmurkan dan membangun bumi. Kemudian mengolah bumi sehingga beralih menjadi suatu tempat dan kondisi yang memungkinkan manfaatnya dapat dipetik, seperti membangun pemukiman untuk dihuni, mesjid untuk tempat beribadah,

tanah untuk pertanian, taman untuk dipetik buahnya dan rekreasi. (Shihab, 2002).

2. Gejala Klinis dan Masa Inkubasi Malaria

Keluhan dan tanda klinis, merupakan petunjuk yang penting dalam diagnosa malaria. Gejala klinis ini dipengaruhi oleh jenis *Plasmodium*, imunitas tubuh dan jumlah parasit yang menginfeksi. Waktu mulai terjadinya infeksi sampai timbulnya gejala klinis dikenal sebagai waktu inkubasi, sedangkan waktu antara terjadinya infeksi sampai ditemukannya parasit dalam darah disebut periode prepaten (Harijanto P.N, 2000).

a. Gejala Klinis

Gejala klinis malaria meliputi keluhan dan tanda klinis, merupakan petunjuk yang penting dalam diagnosis malaria. Gejala klinis tersebut dipengaruhi oleh strain plasmodium, imunitas tubuh dan jumlah parasit yang menginfeksi.

Menurut Harijanto PN (2000) Gejala klinis malaria pada umumnya terdiri dari tiga stadium (*trias malaria*) yaitu :

- 1) Stadium ini penderita merasa kedinginan. Stadium ini mulai dengan menggigil dan perasaan yang sangat dingin. Gigi gemeretak dan penderita biasanya menutupi tubuhnya dengan segala macam pakaian dan selimut yang tersedia. Nadi cepat tetapi lemah, bibir dan jari-jari pucat atau sianosis, kulit kering

dan pucat, penderita mungkin muntah dan pada anak-anak sering terjadi kejang. Stadium ini berlangsung antara 15 menit sampai 1 jam.

- 2) Stadium ini penderita merasa kepanasan. Muka merah, kulit kering dan terasa sangat panas seperti terbakar, sakit kepala, mual serta muntah seringkali terjadi. Nadi menjadi kuat lagi. Biasanya penderita menjadi sangat haus dan suhu badan dapat meningkat sampai 41°C atau lebih. Stadium ini berlangsung antara 2-12 jam. Demam disebabkan karena pecahnya sizon darah yang telah matang dan masuknya merozoit darah ke dalam aliran darah.
- 3) Stadium ini penderita berkeringat banyak sekali, sampai-sampai tempat tidurnya basah, kemudian suhu badan menurun dengan cepat, kadang-kadang sampai di bawah normal. Penderita dapat tidur dengan nyenyak, badan terasa lemah setelah bangun. Stadium ini berlangsung 2-4 jam.

Gejala-gejala tersebut tidak selalu ditemukan pada setiap penderita, dan ini tergantung pada spesies parasit, umur, dan tingkat imunitas penderita (Sutisna, 2004).

Di daerah dengan tingkat endemisitas malaria tinggi, sering kali orang dewasa tidak menunjukkan gejala klinis meskipun darahnya mengandung parasit malaria. Hal ini merupakan imunitas yang terjadi akibat infeksi yang berulang-ulang. Limpa penderita biasanya membesar pada serangan pertama yang berat/ setelah beberapa kali

serangan dalam waktu yang lama. Bila dilakukan pengobatan secara baik maka limpa akan berangsur-angsur mengecil.

b. Masa Inkubasi

Menurut Nugroho (2010) masa inkubasi terdiri dari dua yaitu masa inkubasi pada manusia dan masa inkubasi pada nyamuk ;

1) Masa inkubasi pada manusia (*Intrinsik*)

Masa inkubasi bervariasi pada masing-masing *Plasmodium*. Secara umum masa inkubasi *Plasmodium falciparum* adalah 9 sampai 14 hari, *Plasmodium vivax* adalah 12 sampai 17 hari, *Plasmodium ovale* adalah 16 sampai 18 hari, sedangkan *Plasmodium malariae* bisa 18 sampai 40 hari. Infeksi melalui transfusi darah, masa inkubasinya tergantung pada jumlah parasit yang masuk dan biasanya bisa sampai kira-kira 2 bulan.

2) Masa inkubasi nyamuk (*Ekstrinsik*)

Adapun masa inkubasi atau lamanya stadium sporogoni pada nyamuk adalah *Plasmodium vivax* 8-10 hari, *Plasmodium falciparum* 9-10 hari, *Plasmodium ovale* 12-14 hari dan *Plasmodium malariae* 14-16 hari.

3. Vektor Malaria

Malaria ditularkan melalui nyamuk *Anopheles* betina genus *Plasmodium*, spesies *Anopheles* (*aconitus*, *sundaicus*, *balabacensis*, *vagus*, dan lain-lain). Diketahui lebih dari 422 spesies *Anopheles* di dunia. Di

Indonesia hanya ada 80 spesies dan 25 diantaranya ditetapkan menjadi vektor malaria. Nyamuk tersebut hidup di daerah tertentu dengan kondisi habitat lingkungan yang spesifik seperti daerah pantai, rawa-rawa, persawahan, hutan dan pegunungan (Gandahusada, 2006).

Di Indonesia konfirmasi vektor telah dilakukan sejak tahun 1919 sampai tahun 2009, dan selama periode tersebut terdapat 25 spesies ditemukan positif membawa parasit malaria. Berikut ini 25 vektor malaria yang ada di Indonesia :

<u>An. Aconitus</u>	<u>An. Barbirostris</u>	<u>An.annullaris</u>
<u>An. Flavirostris</u>	<u>An. Leucosphyrus</u>	<u>An. Sundaicus</u>
<u>An. Ludlowi</u>	<u>An. Nigerrimus</u>	<u>An.ludlowi</u>
<u>An. Sinensis</u>	<u>An. Vagus</u>	<u>An. Kochi</u>
<u>An. Balabacensis</u>	<u>An. Farauti</u>	<u>An. Minimus</u>
<u>An. Koliensis</u>	<u>An. Punctulatus</u>	<u>An. Karwari</u>
<u>An. Maculatus</u>	<u>An. Parangensis</u>	<u>An. Tesellatus</u>
<u>An. Subpictus</u>		<u>An. Umbrosus</u>
<u>An. Letifer</u>		<u>An. Bancrofti</u>

Semua vektor tersebut hidup sesuai dengan kondisi ekologi setempat antara lain ada nyamuk yang hidup di persawahan, perbukitan/hutan dan pantai/aliran sungai Vektor malaria yang berkembang biak di daerah persawahan adalah *An.aconitus*, *An.annullaris*, *An. barbirostris*, *An. kochi*, *An.karwari*, *An.nigerrimus*, *An.sinensis*, *An.tesellatus*, *An.vagus*, *An. letifer*. Vektor malaria yang berkembang biak di perbukitan/hutan adalah

An.balabacensis, *An.bancrofti*, *An.punctulatus*, *An.umbrosus*. Sedangkan untuk daerah pantai/aliran sungai jenis vektor malaria adalah *An.flavirostris*, *An.koliensis*, *An.ludlowi*, *An.minimus*, *An.punctulatus*, *An.parangensis*, *An.sundaicus*, *An.subpictus*.

Waktu aktivitas menggigit vektor malaria yang sudah diketahui yaitu jam 17.00-18.00, sebelum jam 24 (20.00-23.00), setelah jam 24 (00.00-4.00). Vektor malaria yang aktivitas menggigitnya jam 17.00-18.00 adalah *An.tesselatus*, sebelum jam 24 adalah *An.aconitus*, *An.annularis*, *An.barbirostris*, *An.kochi*, *An.sinensis*, *An.vagus*, sedangkan yang menggigit setelah jam 24 adalah *An.farauti*, *An.koliensis*, *An.leucosphyrosis*, *An.unctullatus*.

Perilaku vektor malaria seperti tempat berkembang biak dan waktu aktivitas menggigit ini sangat penting diketahui oleh pengambil keputusan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan intervensi dalam pengendalian vektor yang lebih efektif (Ditjen PP & PL Depkes RI, 2009).

Penyakit malaria berkaitan erat dengan keadaan wilayah, di kawasan tropika seperti Indonesia penularan penyakit ini sangat rentan, karena keadaan cuaca yang mempunyai kelembaban tinggi akan memberikan habitat yang sesuai untuk perkembangbiakan nyamuk yang menjadi vektor penularan kepada penyakit ini. Selain itu, peningkatan suhu dunia juga menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya penyakit malaria (Prasetyo, 2006).

4. Cara Penularan Malaria


Tingginya penularan malaria tergantung dari densitas vektor, frekuensi gigitan, lamanya hidup vektor, lamanya siklus sporogoni, angka sporozoit (parasit yang terdapat pada kelenjar liur nyamuk) dan adanya reservoir parasit (manusia yang mempunyai parasit dalam darah) (Anies, 2005).

Menurut Rampengan TH (2000) penularan malaria terdiri dari dua yaitu penularan secara alamiah dan penularan bukan alamiah ;


a. Penularan secara alamiah

Cara penularan diawali dari adanya nyamuk Anopheles yang menggigit penderita malaria, menyebabkan parasit malaria (gametosit) yang ada dalam tubuh penderita akan terbawa oleh nyamuk sewaktu nyamuk tersebut menghisap darah penderita. Nyamuk Anopheles yang menghisap darah (menggigit) adalah nyamuk Anopheles betina yang memerlukan darah untuk pertumbuhan telurnya. Nyamuk yang telah menghisap darah penderita akan terinfeksi oleh parasit malaria. Selanjutnya, nyamuk yang sudah mengandung parasit malaria tersebut kemudian menggigit orang sehat. Akibatnya, orang sehat yang digigit oleh nyamuk yang sudah terinfeksi parasit akan sakit malaria karena pada saat ia digigit, parasit malaria (sporozoit) yang ada dalam tubuh nyamuk akan masuk ke dalam darah manusia yang digigit.

Siklus hidup parasit malaria dapat digambarkan pada bagan berikut ;



Gambar II.2
Cara penularan penyakit malaria



Gambar II.3
Cara penularan penyakit malaria

b. Penularan yang tidak alamiah

1) Malaria bawaan (Malaria Kongenital)

Terjadi pada bayi yang baru dilahirkan karena ibunya menderita malaria. Penularan terjadi karena adanya kelainan

sawar plasenta sehingga tidak ada penghalang infeksi dari ibu kepada bayi yang dikandungnya. Selain melalui plasenta penularan dari ibu kepada bayi melalui tali pusat (Rampengan TH, 2000)

Malaria kongenital lebih sering terjadi pada kehamilan pertama pada kelompok masyarakat yang imunitasnya kurang (Susana, 2010).

2) Secara mekanik

Cara ini sering terjadi di daerah-daerah endemik. Setelah serangan malaria, donor tetap infeksi selama bertahun-tahun (1-3 tahun di *P. Falciparum*, 3-4 tahun di *P. Vivax*, dan 15-50 tahun di *P. malariae*) (Susana, 2010)

Penularan terjadi melalui transfusi darah atau melalui jarum suntik. Penularan melalui jarum suntik banyak terjadi pada para morfinis yang menggunakan jarum suntik yang tidak steril lagi, cara penularan ini pernah dilaporkan terjadi di salah satu rumah sakit di Bandung pada tahun 1981, pada penderita yang dirawat dan mendapatkan suntikan *intravena* dengan menggunakan alat suntik yang dipergunakan untuk menyuntik beberapa pasien, dimana alat suntik itu seharusnya dibuang/sekali pakai (*disposable*) (Depkes RI, 1999).

Infeksi malaria melalui transfusi hanya menghasilkan siklus eritrositer karena tidak melalui sporozoit yang memerlukan siklus

hati sehingga dapat diobati dengan mudah (Rampengan T.H ,2000)

5. Pencegahan Malaria

Dengan semakin berkembangnya globalisasi dan kemajuan transportasi di dunia saat ini, semakin banyak orang yang bepergian ke segala penjuru dunia, baik untuk berwisata maupun untuk tugas-tugas kedinasan. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana mencegah penyakit menular yang endemis di negara yang akan dikunjungi terutama di negara-negara tropis. Salah satu penyakit menular utama di daerah tropis yang berbahaya adalah malaria (Nugroho, 2010).

Upaya pencegahan dengan berbagai cara harus tetap dilakukan baik memberantas nyamuk, melenyapkan habitat nyamuk maupun mencegah penularan berupa gigitan nyamuk. Namun, tidak kalah penting yang harus dilakukan dengan meningkatkan kondisi tubuh, agar memperoleh daya tahan tubuh yang baik. Upaya peningkatan yang sangat dianjurkan adalah dengan memperbaiki status gizi. (Anies, 2005).

Menurut (Prabowo, 2004) Pencegahan penyakit malaria secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi beberapa kegiatan :

a. Pencegahan primer

Pencegahan primer adalah upaya untuk mempertahankan orang yang sehat tetap sehat atau mencegah orang yang sehat menjadi sakit. Kegiatannya sederhana dan dapat dilakukan oleh sebagian besar masyarakat, seperti :

- 1) Daerah yang jumlah penderitanya sangat banyak, tindakan untuk menghindari gigitan nyamuk sangat penting. Maka dari itu disarankan untuk memakai baju lengan panjang dan celana panjang saat keluar rumah terutama pada malam hari, memasang kawat kasa di jendela dan ventilasi rumah, serta menggunakan kelambu saat tidur. Masyarakat juga dapat memakai minyak anti nyamuk saat tidur dimalam hari untuk mencegah gigitan nyamuk malaria, karena biasanya vektor malaria menggigit pada malam hari.
- 2) Membersihkan tempat sarang nyamuk dengan cara membersihkan semak-semak di sekitar rumah dan melipat kain-kain yang bergantung, dan mengalirkan atau menimbun genangan-genangan air serta tempat-tempat yang dapat menjadi tempat perindukan nyamuk *Anopheles*.
- 3) Membunuh nyamuk dewasa dengan penyemprotan insektisida.
- 4) Membunuh jentik-jentik dengan menebarkan ikan pemakan jentik.
- 5) Membunuh jentik dengan menyemprot larvasida.

Pencegahan terhadap parasit juga dilakukan dengan pengobatan profilaksis yaitu sebagai berikut :

- 1) Orang yang akan berpergian ke daerah-daerah endemis malaria harus minum obat antimalaria sekurang-kurangnya seminggu

sebelum keberangkatan sampai empat minggu setelah orang tersebut meninggalkan daerah endemis malaria.

- 2) Wanita hamil yang akan berpergian ke daerah endemis malaria diperingatkan tentang risiko yang mengancam kehamilannya. Sebelum berpergian, ibu hamil disarankan untuk berkonsultasi ke klinik atau rumah sakit dan mendapatkan obat antimalaria.
- 3) Bayi dan anak-anak berusia di bawah empat tahun dan hidup di daerah endemis malaria harus mendapat obat anti malaria karena tingkat kematian bayi/anak akibat infeksi malaria cukup tinggi.

b. Pencegahan sekunder

Pencegahan sekunder adalah upaya untuk mencegah orang yang telah sakit agar sembuh, Kegiatannya meliputi: pencarian penderita secara aktif melalui skrining dan secara pasif dengan melakukan pencatatan dan pelaporan kunjungan penderita malaria, diagnosa dini dan pengobatan yang adekuat, dan memperbaiki status gizi guna membantu proses penyembuhan.

c. Pencegahan tertier

Adalah upaya untuk mengurangi ketidakmampuan dan mengadakan rehabilitasi. Kegiatannya meliputi: penanganan lanjut akibat komplikasi malaria, dan rehabilitasi mental/psikologi.

6. Pemberantasan Malaria

Laporan pertama mengenai malaria dibuat oleh dokter-dokter militer pada permulaan abad ke-19. Laporan kemudian adalah tentang adanya

wabah malaria seperti di Cirebon pada tahun 1852-1854. Pemberantasan terutama dilaksanakan dengan obat kina.

Pada tahap awal (1919-1927) pemberantasan malaria dilaksanakan dengan perbaikan sanitasi lingkungan untuk mengurangi perindukan nyamuk anopheles yang terpenting serta pengobatan dengan kina. Untuk keperluan tersebut telah dibentuk Biro Malaria Pusat yang bersama dinas Pekerjaan Umum untuk mengadakan pemberantasan malaria melalui pengaturan irigasi dan pengaturan saluran air (drainase). Penimbunan dan penyaluran genangan air dan lagun ternyata memberi hasil yang baik.

Sesuai dengan kebijakan WHO, upaya pemberantasan ditingkatkan menjadi pembasmian malaria (1959-1968) yang bertujuan untuk menghentikan transmisi malaria diseluruh Indonesia pada tahun 1970. Kegiatan dimulai dengan dibentuknya organisasi vertical khusus, yaitu KOPEM (komando operasi pembasmian malaria). Sejak saat itu telah dilakukan pembasmian dengan penyemprotan rumah dan pencarian serta pengobatan penderita secara aktif.

Kegiatan pemberantasan kemudian diarahkan khususnya pada Indonesia bagian timur dengan memfokuskan pada daerah prioritas (transmigrasi wilayah pembangunan), dan penyemprotan rumah dilaksanakan secara selektif surveilas ditingkatkan dengan mengikutkan peran serta masyarakat dan lintas sektor disertai pengobatan kasus malaria dan pemberantasan jentik dengan penanganan lingkungan (Laihad dan Gunawan S, 2000).

Upaya untuk menekan angka kesakitan dan kematian dilakukan melalui program pemberantasan malaria yang kegiatannya antara lain meliputi diagnosis dini, pengobatan cepat dan tepat, surveilans dan pengendalian vektor yang kesemuanya ditujukan untuk memutus mata rantai penularan malaria (Ditjen PP & PL Depkes RI, 2009).

Pemberantasan malaria harus ditujukan untuk memutus penularan penyakit malaria, dengan sasaran antara lain

a. Penemuan penderita

Penemuan penderita secara dini merupakan salah satu cara memutus penyebaran penyakit malaria. Kegiatan tersebut antara lain dilakukan dengan penemuan penderita malaria secara aktif (*ACD = Active Case Detection*) dilakukan oleh petugas juru malaria desa yang mengunjungi rumah secara teratur. Penemuan penderita secara pasif (*PCD = Passive Case Detection*) yakni berdasarkan kunjungan pasien di unit pelayanan kesehatan (puskesmas pembantu, puskesmas, dan rumah sakit) yang menunjukkan gejala klinis malaria.

b. Pengobatan penderita


Kegiatan pengobatan penderita antara lain :

- 1) Pengobatan malaria klinis, adalah pengobatan penderita malaria berdasarkan diagnosa klinis tanpa pemeriksaan laboratorium.
- 2) Pengobatan radikal, adalah pengobatan penderita malaria berdasarkan diagnosa secara klinis dan pemeriksaan laboratorium sediaan dara

- 3) Pengobatan MDA (*Mass Drug Administration*), adalah pengobatan massal pada saat KLB, mencakup > 80% jumlah penduduk di daerah tersebut yang diobati.
- 4) Profilaksis, adalah pengobatan pencegahan dengan sasaran warga transmigrasi dan ibu hamil di daerah endemis malaria.

B. Tinjauan Umum Tentang Nyamuk *Anopheles*

1. Pengertian nyamuk *anopheles*



Gambar II.4

Nyamuk adalah serangga yang memiliki dua sayap bersisik yang mampu mengepak 1000 kali per menit, tubuh yang langsing dan enam kaki panjang. Nyamuk memiliki ukuran yang berbeda-beda tetapi jarang sekali ukurannya melebihi 15 mm.

Dalam bahasa Inggris, nyamuk dinamakan “Mosquito”, yang berasal dari bahasa yon atau portugis yang berarti *lalat kecil*. Penggunaan kata *Mosquito* berawal sejak tahun 1583. Di negeri inggris nyamuk dikenal sebagai (*gnats*).

Tercatat lebih dari tiga ribu spesies nyamuk yang beterbangan di muka bumi ini, baik di tempat yang beriklim panas maupun dingin. Meskipun mampu hidup di kutub, sebagian besar nyamuk lebih suka hidup di daerah yang beriklim tropis dengan kelembaban tinggi seperti di Indonesia.

Nyamuk *Anopheles* adalah nyamuk yang mampu menularkan parasit *plasmodium* ke dalam tubuh manusia.

Dalam susunan taksonomi, nyamuk *Anopheles* diklasifikasikan sebagai berikut (Bruce-Chwatt, dalam Susana 2010).

Phylum : Arthropoda
 Kelas : Insekta
 Ordo : Diptera
 Famili : Culicidae
 Subfamili : Culicinae
 Tribus : Anophelini
 Genus : *Anopheles*

2. Siklus Hidup Nyamuk *Anopheles*

Nyamuk merupakan binatang yang sangat dibenci manusia. Berbagai cara pun ditempuh untuk mengusir nyamuk bahkan dibunuh dengan berbagai cara. Meski demikian nyamuk tak pernah putus asa untuk mengganggu manusia seperti juga syetan yang tak pernah puas dan terus menerus mengganggu manusia. Tetapi yang lebih menyebalkan, nyamuk menjadi perantara berbagai macam penyakit yang dapat

Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu[33]. adapun orang-orang yang beriman, Maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan Ini untuk perumpamaan?." dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah[34], dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik.

Nyamuk sering dianggap sebagai makhluk yang biasa dan tidak penting. Namun ternyata nyamuk itu sangat berarti untuk diteliti dan dipikirkan sebab didalamnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Inilah sebabnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Seekor nyamuk jantan yang telah cukup dewasa untuk kawin akan menggunakan antena organ pendengar untuk menemukan nyamuk betina (Quraish Shihab, 2002).


Makna dari perumpamaan pada ayat diatas menjelaskan bahwa Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk karena didalamnya terdapat kebesaran Allah swt. Selain itu pada dasarnya nyamuk diberikan kemampuan khusus oleh Allah swt sehingga nyamuk dapat menyimpan berjuta-juta parasit didalam tubuhnya, parasit ini dapat menyebabkan penyakit bagi manusia seperti malaria. Selain itu nyamuk diberikan organ penciuman untuk mencari mangsanya.

Dalam surah ini dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan beberapa jenis hewan dari air, artinya sebuah kebenaran bahwa peranan air disini merupakan tempat berkembangbiaknya makhluk hidup yang kecil seperti nyamuk, dimana nyamuk meletakkan telurnya di dalam air, sehingga dengan melalui tahapan kehidupan berkembang menjadi nyamuk dewasa,

melalui empat tahap yakni dari telur, larva/jentik, pupa, dan nyamuk dewasa. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dengan segala sesuatu.


Nyamuk *Anopheles* dewasa adalah vektor penyebab malaria. Nyamuk betina dapat bertahan hidup selama sebulan.

Siklus nyamuk *Anopheles* sebagai berikut :



Gambar II.5 Siklus hidup nyamuk *anopheles*
Sumber : Munstermann, 1995

a) Telur



Sumber: CDC. Life Cycle of the Malaria Parasite.
Gambar II.6 Telur nyamuk *anopheles*

Nyamuk dewasa akan meletakkan telurnya dipermukaan air. Nyamuk mengeluarkan telur sebanyak $\pm 100-300$ butir sekali bertelur

dan besarnya telur sekitar 5 mm. Setelah 1-2 hari telur itu menetas menjadi jentik yang sangat halus seperti jarum.

b) Larva (Jentik)



Sumber: CDC. Life Cycle of the Malaria Parasite.

Gambar II.7 Larva nyamuk *anopheles*

Larva nyamuk memiliki kepala dan mulut yang digunakan untuk mencari makan, sebuah torak dan sebuah perut. Mereka belum memiliki kaki. Dalam perbedaan nyamuk lainnya, larva *Anopheles* tidak mempunyai saluran pernafasan dan untuk posisi badan mereka sendiri sejajar dipermukaan air.


Larva bernafas dengan lubang angin pada perut dan oleh karena itu harus berada di permukaan. Kebanyakan Larva memerlukan makan pada alga, bakteri, dan mikroorganismenya lainnya di permukaan. Mereka hanya menyelam di bawah permukaan ketika terganggu. Larva berenang tiap tersentak pada seluruh badan atau bergerak terus dengan mulut.

Larva berkembang melalui 4 tahap atau stadium, setelah larva mengalami metamorfosis menjadi kepompong. Disetiap akhir

stadium larva berganti kulit, larva mengeluarkan *exoskeleton* atau kulit ke pertumbuhan lebih lanjut. Habitat Larva ditemukan di daerah yang luas tetapi kebanyakan spesies lebih suka di air bersih. Larva pada nyamuk *Anopheles* ditemukan di air bersih atau air payau yang memiliki kadar garam, rawa bakau, di sawah, selokan yang ditumbuhi rumput, pinggir sungai dan kali, dan genangan air hujan. Banyak spesies lebih suka hidup di habitat dengan tumbuhan. Habitat lainnya lebih suka sendiri. Beberapa jenis lebih suka di alam terbuka, genangan air yang terkena sinar matahari.

Waktu yang diperlukan untuk pertumbuhan jentik menjadi kepompong sekitar 8-10 hari tergantung suhu, makanan dan spesies nyamuk. Setelah 8-10 hari maka jentik itu akan berubah menjadi kepompong (pupa).

c) Pupa (Kepompong)



Sumber: CDC. Life Cycle of the Malaria Parasite.

Gambar II.8 Pupa nyamuk *anopheles*

Kepompong terdapat dalam air dan tidak memerlukan makanan tetapi memerlukan udara. Pada kepompong belum ada perbedaan antara jantan dan betina. Kepompong menetas dalam 1-2

hari menjadi nyamuk, dan pada umumnya nyamuk jantan lebih dulu menetas daripada nyamuk betina. Lamanya dari telur berubah menjadi nyamuk dewasa bervariasi tergantung spesiesnya dan dipengaruhi oleh panasnya suhu. Nyamuk bisa berkembang dari telur ke nyamuk dewasa paling sedikit membutuhkan waktu 10-14 hari.

d) Nyamuk dewasa

Nyamuk yang baru keluar akan terbang dan mencari darah untuk makanannya. Umur nyamuk relatif pendek dimana nyamuk jantan umumnya berumur kurang dari seminggu, sedangkan nyamuk betina umurnya lebih panjang sekitar rata-rata 1-2 bulan. Nyamuk jantan akan terbang di sekitar tempat perindukannya dan makan cairan tumbuhan yang ada disekitarnya. Nyamuk betina hanya kawin satu kali untuk seumur hidupnya. Perkawinan biasanya terjadi 24-48 jam setelah keluar dari kepompong. Makanan nyamuk betina yaitu darah, yang dibutuhkan untuk pertumbuhan telurnya.

3. Bionomik Nyamuk Anopheles

Pengetahuan tentang bionomik vektor sangat diperlukan dalam perencanaan pengendaliannya. Bionomik adalah bagian dari ilmu biologi yang menerangkan hubungan antara organisme dengan lingkungannya (WHO, 1975). Bionomik dari vektor malaria sangat beragam. Bionomik vektor yang sangat beragam ini ikut menentukan cara penanggulangannya. Hal ini menyangkut tempat dan waktu nyamuk meletakkan telur, perilaku perkawinan, perilaku menggigit (*biting habit*)

dari nyamuk dewasa dan faktor-faktor lingkungan seperti iklim yang mempengaruhi kehidupan nyamuk (Bruce-Chwatt, dalam Susana 2011).

a. Perilaku Nyamuk *Anopheles*

Dalam kehidupan nyamuk, ada tiga macam tempat dan perilaku yang diperlukan untuk kelangsungan hidupnya. Ketiganya merupakan suatu sistem dimana satu sama lain saling terkait untuk menunjang kelangsungan hidup nyamuk tersebut.

1) Tempat Perkembangbiakan (Breeding Places)

Keberadaan nyamuk malaria di suatu daerah sangat tergantung pada lingkungan, keadaan wilayah seperti perkebunan, keberadaan pantai, curah hujan, kecepatan angin, suhu, sinar matahari, ketinggian tempat dan bentuk perairan yang ada. Ada jenis yang senang terkena sinar matahari seperti *An. Sundaicus*, ada jenis yang berkembang biak di air payau dan adapula yang berkembang biak di air tawar. Jadi nyamuk *Anopheles* betina memiliki kemampuan untuk memilih tempat perindukan/berkembangbiak sesuai dengan kebutuhan dan kesenangannya (Susana, 2011).

2) Tempat Istirahat

Tempat istirahat alam nyamuk *Anopheles* berbeda berdasarkan spesiesnya. Pada umumnya nyamuk beristirahat pada tempat yang teduh dan aman. Namun jika diamati lebih

lanjut, ternyata nyamuk memiliki perilaku istirahat yang berbeda-beda (Susana, 2011).

Nyamuk memiliki dua cara beristirahat yaitu istirahat yang sebenarnya yaitu selama waktu menunggu proses perkembangan telur, dan istirahat sementara yaitu pada waktu sebelum dan sesudah mencari darah. Pada waktu malam, ada nyamuk yang masuk ke dalam rumah hanya untuk menghisap darah lalu keluar, namun ada pula nyamuk yang sebelum maupun sesudah menghisap darah hinggap di dinding untuk beristirahat dahulu (Susana, 2011).

Dalam memilih tempat hinggap atau istirahat nyamuk dapat di bagi dalam :

- a) Eksofilik : nyamuk lebih suka hinggap atau istirahat di luar rumah.
- b) Endofilik : nyamuk lebih suka hinggap atau istirahat di dalam rumah.
- c) Eksofagik : nyamuk lebih suka menggigit di luar rumah.
- d) Endofagik : nyamuk lebih suka menggigit di dalam rumah.

3) Aktivitas Menghisap Darah

Nyamuk *Anopheles* umumnya aktif mencari darah pada waktu malam hari, mulai senja hingga tengah malam, dan ada pula yang mulai tengah malam sampai menjelang pagi.

Frekuensi membutuhkan darah tergantung pada spesiesnya serta dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban, siklus pemasakan telur (gonotropi) umumnya berlangsung 48-96 jam untuk daerah iklim tropis. Nyamuk betina umumnya hanya satu kali kawin dalam hidupnya. Untuk mempertahankan serta memperbanyak keturunannya ia hanya memerlukan darah untuk proses perkembangan telurnya (Susana, 2011).

b. Vektor utama malaria di Sulawesi

Menurut Ditjen PP & PL Depkes RI (2009), terdapat vektor malaria di Sulawesi dan akan dijelaskan sebagai berikut:

1) *Anopheles punctulatus*

Spesies ini hidup di habitat air yang langsung terkena sinar/cahaya matahari, kolam-kolam, tanah yang tergenang air bersih maupun keruh, pipa-pipa yang terisi air, tong-tong yang terisi air, genangan-genangan/rawa tempat tumbuhnya sagu, di sungai yang menjadi tempat perindukan nyamuk ini terutama pada musim hujan. Kolam-kolam dimana spesies ini hidup ada terdapat rumput tetapi kadang-kadang tidak, terdapat tumbuhan alga yang padat yang sangat disukai sebagai habitatnya karena langsung terkena sinar/cahaya matahari namun juga bisa hidup ditempat teduh. Saat musim panas nyamuk ini dapat istirahat di sungai-sungai. Kadang-kadang setelah hujan deras jentik spesies ini terdapat pada kolam-kolam sementara. Selama musim hujan

An. punctulatus berkembangbiak sangat baik dan sebagai habitat *An. punctulatus* dari daerah pantai sampai dekat dengan gunung-gunung yang terdapat sungai-sungai. *Anopheles punctulatus* tidak ditemukan di air payau sebaliknya *An. farauti* ditemukan terdapat pada air payau. Jentik *An. punctulatus* banyak terdapat pada genangan-genangan air kecil yang berwarna keruh dan juga bekas tapak kaki hewan. Nyamuk dewasa terbang pada malam hari dan diketahui lebih suka menghisap darah manusia, namun jarang ditemukan menggigit dan istirahat di dalam rumah. Nyamuk ini sangat berbahaya sebagai penular malaria dan dilaporkan spesies ini lebih suka menghisap darah manusia dan berkembangbiak lebih banyak.

2) *Anopheles balabacensis*

Larva ditemukan di kolam yang teduh tapi terutama pada jebakan/kubangan hewan dan tempat-tempat yang airnya tidak selalu ada, seringnya pada tanah gempung. Juga jenting *An. balabacensis* sering kali ditemukan dalam jumlah besar digenangan air terbuka, agak teduh atau banyak terkena sinar matahari, seperti bekas tapak roda kendaraan dan macam-macam kubangan, yang biasanya mempunyai dasar endapan lumpur dengan air jernih (Yudhastuti, dalam Susana 2010). Tetapi Bruce-Chwatt (1985) menyebutkan bahwa jentik *An. balabacensis* adalah genangan air yang tertutup semak berupa

kobakan atau cekungan air di dasar sungai, di kolam yang rimbun dengan air yang jernih dan daun mati.

Nyamuk *An. balabacensis* betina lebih tertarik mengisap darah orang dari pada binatang, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Aktivitas mencari darah umumnya setelah tengah malam hingga pukul 04.00, walaupun sudah mulai terlihat sejak senja sampai menjelang pagi. Dari pengamatan yang dilakukan selama 24 Bulan di Kalimantan timur, ternyata pada malam hari spesies tersebut banyak ditemukan istirahat di dinding rumah baik sebelum dan sesudah menghisap darah. Pada siang hari tidak ditemukan nyamuk yang beristirahat di dalam rumah. Tempat istirahat di habitat aslinya (hutan) belum diketahui dengan pasti.

Kebun salak merupakan tempat istirahat dari *An. balabacensis* tempat perindukan nyamuk ini adalah pada genangan air tawar dalam hutan, baik yang permanen maupun yang sementara. Kecuali genangan air yang tidak mengalir seperti bekas tapak kaki, bekas roda kendaraan dan sebagainya, jentik nyamuk ini ditemukan juga di pinggir sungai, terutama pada musim kemarau (Suwasti *dalam* Susana, 2011).

3) *Anopheles kochi*

Larva ditemukan bervariasi terutama di air yang berlumpur seperti bekas jejak kaki binatang dan pematang

sawah sehabis panen. Nyamuk dewasa beristirahat terutama di luar di antara vegetasi dekat tanah, walaupun sewaktu-waktu ditemukan di dalam ruangan (Susana, 2010)

4) *Anopheles subpictus*

Anopheles subpictus lebih senang darah ternak dari pada manusia, aktif sepanjang malam, hinggap di dinding sebelum dan sesudah menggigit. Habitat larva hampir sama dengan *An. sundaicus* (Departemen Kesehatan, 1999). Larva ditemukan di dekat pantai, nyamuk dewasa ditemukan di kandang ternak dan di dalam rumah tetapi hanya sebagian kecil yang menyerang manusia.

5) *Anopheles vagus*

Nyamuk dewasa istirahat di dalam ruangan sepanjang hari tapi sedikit yang menggigit manusia, kebanyakan menggigit ternak dan bukan sebagai human disease. Larva tipikalnya ditemukan dilumpur terbuka, seringnya di air yang dangkal yang kadang-kadang juga pada air yang dalam.

6) *Anopheles annularis*

Anopheles annularis berkembang biak di daerah persawahan

7) *Anopheles sinensis*

Anopheles sinensis berkembang biak di daerah persawahan

8) *Anopheles minimus*

Anopheles minimus berkembang biak di pantai atau aliran sungai.

9) *Anopheles flavirostris*

Anopheles flavirostris berkembang biak di pantai atau aliran sungai.

10) *Anopheles nigerrimus*

Anopheles nigerrimus berkembang biak di daerah persawahan.

4. Plasmodium

Parasit malaria memerlukan dua hospes untuk siklus hidupnya, yaitu manusia dan nyamuk *Anopheles* betina (Harijanto P.N.2000).

a. Siklus pada manusia

Pada waktu nyamuk *Anopheles* infeksi mengisap darah manusia, sporozoit yang berada dalam kelenjar liur nyamuk akan masuk ke dalam peredaran darah selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu sporozoit akan masuk ke dalam sel hati dan menjadi tropozoit hati. Kemudian berkembang menjadi skizon hati yang terdiri dari 10.000 sampai 30.000 merozoit hati. Siklus ini disebut siklus eksoeritrositer yang berlangsung selama kurang lebih 2 minggu. Pada *P. vivax* dan *P. ovale*, sebagian tropozoit hati tidak langsung berkembang menjadi skizon, tetapi ada yang menjadi bentuk dorman yang disebut hipnozoit. Hipnozoit tersebut dapat tinggal di dalam sel hati selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Pada suatu saat bila imunitas tubuh menurun, akan menjadi

aktif sehingga dapat menimbulkan relaps (kambuh) (Depkes RI.2006).

Merozoit yang berasal dari skizon hati yang pecah akan masuk ke dalam peredaran darah dan menginfeksi sel darah merah. Di dalam sel darah merah, parasit tersebut berkembang dari stadium trophozoit sampai skizon (8-30 merozoit). Proses perkembangan aseksual ini disebut skizogoni. Selanjutnya eritrosit yang terinfeksi skizon pecah dan merozoit yang keluar akan menginfeksi sel darah merah lainnya. Siklus inilah yang disebut dengan siklus eritrositer. Setelah 2-3 siklus skizogoni darah, sebagian merozoit yang meninfeksi sel darah merah dan membentuk stadium seksual yaitu gametosit jantan dan betina. (Depkes RI. 2006).

b. Siklus pada nyamuk *Anopheles* betina

Apabila nyamuk *Anopheles* betina menghisap darah yang mengandung gametosit, di dalam tubuh nyamuk, gamet jantan dan gamet betina melakukan pembuahan menjadi zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi ookinet kemudian menembus dinding lambung nyamuk. Di luar dinding lambung nyamuk ookinet akan menjadi ookista dan selanjutnya menjadi sporozoit yang nantinya akan bersifat infeksius dan siap ditularkan ke manusia. (Hariyanto, 2000)

Masa inkubasi atau rentang waktu yang diperlukan mulai dari sporozoit masuk ke tubuh manusia sampai timbulnya gejala klinis yang ditandai dengan demam bervariasi, tergantung dari spesies

Plasmodium. Sedangkan masa prepaten atau rentang waktu mulai dari sporozoit masuk sampai parasit dapat dideteksi dalam darah dengan pemeriksaan mikroskopik (Harijanto, 2000).

C. Tinjauan tentang Variabel yang Diteliti

1. Kondisi lingkungan fisik rumah

Rumah adalah struktur fisik, orang menggunakan untuk tempat berlindung yang dilengkapi beberapa fasilitas yang berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani baik untuk keluarga maupun individu. Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping pangan dan sandang, agar rumah dapat berfungsi sebagai tempat tinggal yang baik diperlukan beberapa persyaratan.

Rumah adalah tempat berteduh bagi setiap individu dalam keluarga dari kesibukan di luar. Di dalamnya menjanjikan sejuta kedamaian dan kasih sayang yang harmonis. Islam sebagai dien sempurna yang mengatur bagaimana mewujudkan kebahagiaan ini, menciptakan rumah sebagaimana slogan “Baiti Jannati” [Rumahku, Surgaku]. Rumah yang didalamnya ditemukan kedamaian, kasih sayang dan rahmat dari Illahi, laksana sebuah surga di dunia.

Rumah sehat harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain :

- a. Rumah harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat terpenuhi kebutuhan fisik dasar dari penghuninya. Hal-hal yang perlu diperhatikan di sini ialah :
 - a) Rumah tersebut harus terjamin penerangannya yang dibedakan atas cahaya matahari dan lampu.
 - b) Rumah tersebut harus mempunyai ventilasi yang sempurna, sehingga aliran udara segar dapat terpelihara.
 - c) Rumah tersebut dibangun sedemikian rupa sehingga dapat dipertahankan suhu lingkungan.
- b. Rumah harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat terpenuhi kebutuhan kejiwaan dasar dari penghuninya. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :
 - a) Terjamin berlangsungnya hubungan yang serasi antara anggota keluarga yang tinggal bersama.
 - b) Menyediakan sarana yang memungkinkan dalam pelaksanaan pekerjaan rumah tangga tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan.
- c. Rumah tersebut harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dari penularan penyakit atau berhubungan dengan zat-zat yang membahayakan kesehatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :
 - a) Rumah yang di dalamnya tersedia air bersih yang cukup.
 - b) Ada tempat pembuangan sampah dan tinja yang baik.

- c) Terlindung dari pengotoran terhadap makanan.
 - d) Tidak menjadi tempat bersarang binatang melata ataupun penyebab penyakit lainnya.
- d. Rumah harus dibangun sedemikian rupa sehingga melindungi penghuni dari kemungkinan terjadinya bahaya kecelakaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :
- a) Rumah yang kokoh.
 - b) Terhindar dari bahaya kebakaran.
 - c) Alat-alat listrik yang terlindungi.
 - d) Terlindung dari kecelakaan lalu lintas (Azwar 1996 dalam Junita 2010).

Dari beberapa persyaratan yang telah dijelaskan diatas memang dalam islam di anjurkan untuk senantiasa selalu menjaga kebersihan khususnya kebersihan lingkungan, hal ini sesuai dengan Hadist Dari Aisyah r.a, Rosululloh SAW bersabda :

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 الْإِسْلَامُ نَظِيفٌ ، فَتَنْظِفُوا فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَظِيفٌ

Artinya :Islam itu agama yang bersih, maka hendaknya kamu menjadi orang yang bersih, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih (H.R.Tobroni) (*Kitab Majmu' al zawaid, halaman 158 jilid 5*)

Dalam hadist di atas telah dijelaskan mengenai kebersihan, dimana kebersihan yang dimaksud bukan hanya kebersihan

perseorangan melainkan juga kebersihan lingkungan, lingkungan yang bersih akan berdampak positif bagi kesehatan manusia terutama lingkungan fisik rumah.

Hadits di atas merupakan dalil bahwa agama islam yang kita anut adalah agama yang bersih. Oleh karena itu, kita diperintahkan supaya memelihara kebersihan. Dan seorang muslim yang tidak akan masuk surga apabila ia tidak bersih. Bersih yang diperintahkan dalam hadits ini ialah bersih lahir dan batin. Lahirnya kita yaitu badan, pakaian, alat-alat, tempat tinggal dan lingkungan harus bersih. Batiniyah kita juga harus bersih artinya hati kita, pikiran kita, tingkah laku kita juga harus bersih.

Kondisi lingkungan fisik rumah berkaitan sekali dengan kejadian malaria, terutama yang berkaitan dengan mudah atau tidaknya nyamuk masuk ke dalam rumah adalah ventilasi yang tidak di pasang kawat kasa dapat mempermudah nyamuk masuk kedalam rumah. Langit-langit atau pembatas ruangan dinding bagian atas dengan atap yang terbuat dari kayu, internit maupun anyaman bambu halus sebagai penghalang masuknya nyamuk ke dalam rumah dilihat dari ada tidaknya langit-langit pada semua atau sebagian ruangan rumah. Kualitas dinding yang tidak rapat jika dinding rumah terbuat dari anyaman bambu kasar ataupun kayu/papan yang terdapat lubang lebih dari $1,5 \text{ mm}^2$ akan mempermudah nyamuk masuk ke dalam rumah (Darmadi, 2002).

Suhu dan kelembaban dalam rumah juga sangat berperan penting di dalam transmisi penularan penyakit malaria;

a. Suhu

Secara fisis suhu dapat didefinisikan sebagai tingkat gerakan molekul benda, makin cepat gerakan molekul, makin tinggi suhunya. Suhu dapat juga didefinisikan sebagai tingkat panas suhu benda (Tjasjono, *dalam* Susana 2011).

Pengukuran suhu udara dalam ruangan dapat dilakukan dengan menggunakan thermometer ruangan. Suhu udara sangat mempengaruhi panjang pendeknya siklus sporogoni atau masa inkubasi ekstrinsik. Makin tinggi suhu (hingga batas tertentu), maka masa inkubasi ekstrinsik akan semakin pendek, dan sebaliknya semakin rendah suhu semakin panjang masa inkubasi ekstrinsik (Gunawan, 2000).

Suhu optimum bagi perkembangan *Plasmodium* dalam nyamuk berbeda-beda, yaitu: 25⁰C bagi *P. vivax*, 30⁰C bagi *P. Falciparum*, dan 22⁰C bagi *P. malariae*. *Plasmodium* tidak dapat berkembang di luar suhu 14-38⁰C. pada suhu kurang dari 15⁰C bagi *P. vivax*, *P. malariae*, *P. ovale*, serta suhu kurang dari 19⁰C bagi *P. Falciparum* siklus sporogoni dapat tertunda. Pada suhu yang melebihi 32⁰C parasit dalam tubuh nyamuk akan mati. peningkatan yang sedikit saja pada rata-rata suhu minimum dapat mempercepat masa inkubasi ekstrinsik (McMichael, 1996; Depkes, 1993).

Selain perkembangan parasit, kelangsungan hidup nyamuk juga ditentukan oleh suhu udara. Suhu optimum bagi nyamuk untuk

bertahan hidup adalah antara 25-30⁰C. suhu yang terlalu tinggi dapat meningkatkan mortalitas pada nyamuk (Bruce Chwatt, Susana, 2005 dalam Achmadi, 2008).

Menurut penelitian Barodji (1987) bahwa proporsi tergigit nyamuk *Anopheles* menggigit adalah untuk di luar rumah 23-24⁰C dan di dalam rumah 25-26⁰C sebagai suhu optimal.

b. Kelembaban

Kelembaban udara adalah jumlah uap air yang terdapat dalam udara yang dinyatakan dalam ukuran berat uap air (dalam gram) per volume udara (dalam m³), dan dinyatakan sebagai kelembaban udara absolut. Karena suhu dan tekanan udara berpengaruh terhadap kelembaban udara maka biasanya kelembaban udara yang diukur dinyatakan sebagai kelembaban relatif. Kelembaban relatif adalah persentase uap air yang ada di udara saat pengukuran dibandingkan dengan kelembaban udara jenuh pada suhu dan tekanan pada saat yang sama (Suin, 1999).

Kelembaban mempengaruhi kelangsungan hidup (*survival rate*), kebiasaan menggigit, istirahat dan lain-lain dari nyamuk. Kelembaban mempengaruhi umur nyamuk, berkembang biak, kebiasaan menggigit, pencarian tempat istirahat dari nyamuk (Depkes RI, 1991). Penularan lebih mudah terjadi ketika kelembaban tinggi, sebaliknya didaerah yang gersang penularan tidak terjadi

karena usia nyamuk yang tidak panjang sehingga parasit tidak dapat menyelesaikan siklusnya.

Nyamuk umumnya menyukai kelembapan 60-80% (Bruce Chwatt, Susana, 2005 dalam Achmadi, 2008).

Kelembaban yang rendah akan memperpendek umur nyamuk. Pada kelembaban yang lebih tinggi, nyamuk akan menjadi lebih aktif dan lebih sering menggigit (Gunawan, 2000).

Menurut penelitian Barodji (1987) menyatakan bahwa nyamuk *Anopheles* paling banyak menggigit di luar rumah pada kelembaban 84-88% dan di dalam rumah 70-80%.

c. Keberadaan *Breeding Place* di lingkungan sekitar rumah

Breeding place merupakan tempat perindukan nyamuk dari *Anopheles* seperti rawa-rawa, kolam sementara dan habitat yang berwadah.


Tabel II.1
Daftar penelitian tentang kejadian malaria

No	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil
1.	Hubungan faktor lingkungan fisik rumah dengan kejadian penyakit malaria di Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Propinsi Aceh Tahun 2010. Sri Junita.	Jenis penelitian Cross Sectional, jumlah sampel 100 kepala keluarga.	Hasil uji secara statistik dengan uji <i>Chi Square</i> , di ketahui bahwa ada hubungan yang signifikan antara pemakaian kawat kasa pada ventilasi, semak-semak, langit-langit/plafon rumah,

			kerapatan dinding, kelembaban dan parit atau selokan dengan kejadian malaria pada α 0,05 dimana ($p < 0,05$)
2.	Gambaran faktor lingkungan daerah endemis malaria di daerah berbatasan tahun 2007. Sutatik dan Soehendro.	Jenis penelitian observasional, jumlah sampel tidak ditentukan.	Hasil penelitian diolah secara deskriptif, variable suhu, kelembaban, dan breeding places mempengaruhi perkembangbiakan vektor.
3.	Analisis faktor risiko lingkungan dan perilaku penduduk terhadap kejadian malaria di Kabupaten Asmat Tahun 2008. Jeppry Kurniawan.	Jenis penelitian observasional dengan pendekatan case control, jumlah sampel 47	Lingkungan fisik (suhu dan kelembaban udara) sangat mendukung bagi kelangsungan hidup dan perkembangbiakan vektor malaria. Kawat kasa yang tidak terpasang pada ventilasi rumah mempengaruhi kejadian malaria 6,381 kali lebih besar daripada yang terpasang kawat kasa ($p=0,001$; 95% CI :2,243-18,153); Genangan air yang terdapat di sekitar rumah mempengaruhi kejadian

			<p>malaria 14,639 kali lebih besar daripada yang tidak terdapat genangan air ($p=0,023$; 95% CI=1,443-148,52).</p>
--	--	--	---

D. Kerangka Teori





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian

Penyakit malaria adalah penyakit menular yang ditularkan oleh nyamuk *Anopheles* dan dapat menyerang semua orang baik laki-laki maupun perempuan pada semua golongan umur. Penyakit ini merupakan penyakit endemis di Indonesia dan merupakan masalah kesehatan masyarakat yang harus diatasi karena penyakit malaria dapat mempengaruhi angka kematian dan angka kesakitan serta dapat menurunkan produktivitas kerja.

Penyebaran malaria tergantung pada interaksi antara agent, host dan lingkungan. Faktor lingkungan khususnya lingkungan fisik yang meliputi kondisi fisik rumah, suhu udara dalam rumah, kelembaban udara dalam rumah, dan keberadaan *breeding place* lingkungan sekitar rumah, sangat berperan penting di dalam perkembangbiakan dan penularan nyamuk *Anopheles* selain itu lingkungan juga sebagai faktor penentu kejadian malaria pada suatu wilayah endemis malaria. Hal ini terjadi karena komponen yang lain (plasmodium, nyamuk, dan manusia) sangat erat kaitannya dengan lingkungan. Kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap kecepatan perkembangbiakan nyamuk. Penularan malaria dapat terjadi akibat adanya lingkungan yang kondusif untuk tempat perindukan nyamuk malaria (Hidajah dkk, 2006 dalam Soehendro 2007).

Pada prinsipnya faktor lingkungan fisik seperti kondisi fisik rumah berpengaruh terhadap mudah tidaknya nyamuk masuk ke dalam rumah, suhu

udara sangat berpengaruh terhadap siklus hidup parasit, sedangkan kelembaban udara juga mempengaruhi umur nyamuk karena apabila kelembaban udara rendah maka akan memperpendek umur nyamuk tersebut sehingga dapat memperkecil penularan penyakit malaria, serta keberadaan breeding place sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk anopheles.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran kondisi lingkungan fisik rumah penderita malaria klinis di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dimana penelitian ini terdiri dari beberapa variabel yaitu, kondisi fisik rumah, suhu udara dalam rumah, kelembaban udara dalam rumah, dan keberadaan breeding place lingkungan sekitar rumah..

Variabel tersebut dipilih karena pertimbangan peneliti menganggap ke empat variabel tersebut yang akan diteliti sangat erat kaitannya dengan kejadian malaria selain itu karena keterbatasan peneliti untuk meneliti variabel yang lain.

Masing-masing faktor tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut :

1. Kondisi fisik rumah

Rumah adalah struktur fisik, orang menggunakan untuk tempat berlindung yang dilengkapi beberapa fasilitas yang berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani baik untuk keluarga maupun individu. Kondisi fisik rumah berkaitan sekali dengan kejadian malaria, terutama yang berkaitan dengan mudah atau tidaknya nyamuk masuk ke dalam rumah adalah ventilasi yang tidak di pasang kawat kasa dapat

mempermudah nyamuk masuk ke dalam rumah. Langit-langit atau pembatas ruangan dinding bagian atas dengan atap yang terbuat dari kayu, internit maupun anyaman bambu halus sebagai penghalang masuknya nyamuk ke dalam rumah dilihat dari ada tidaknya langit-langit pada semua atau sebagian ruangan rumah. Kualitas dinding yang tidak rapat jika dinding rumah terbuat dari anyaman bambu kasar ataupun kayu/papan yang terdapat lubang lebih dari 1,5 mm² akan mempermudah nyamuk masuk ke dalam rumah.

2. Suhu udara

Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya udara. Suhu udara sangat mempengaruhi panjang pendeknya siklus *sporogoni* atau masa inkubasi ekstrinsik pada nyamuk anopheles. Makin tinggi suhu (sampai batas tertentu) makin pendek masa inkubasi ekstrinsik, dan sebaliknya makin rendah suhu makin panjang masa inkubasi ekstrinsik. suhu udara yang optimum bagi kehidupan nyamuk berkisar antara 25-30⁰ C. (Bruce Chwatt, Susana, 2005 dalam Achmadi, 2008).

3. Kelembaban udara


Kelembaban udara adalah banyaknya kandungan uap air dalam udara yang biasanya dinyatakan dalam persen (%). Kelembaban berpengaruh terhadap umur nyamuk. Kelembaban mempengaruhi kecepatan berkembang biak, kebiasaan menggigit, istirahat, dan kemampuan terbang nyamuk. tingkat kelembaban 60% merupakan batas paling rendah untuk memungkinkan hidupnya nyamuk. Pada kelembaban yang

tinggi nyamuk menjadi lebih aktif dan lebih sering menggigit, sehingga meningkatkan penularan malaria (Gunawan, S. 2000).

4. Keberadaan *Breeding Place*

Breeding place merupakan tempat perindukan atau perkembangbiakan nyamuk dari *Anopheles* seperti genangan air tawar atau air payau, rawa-rawa, selokan, bekas lubang galian, bekas jejak kaki, kolam sementara, habitat yang berwadah, Semak-semak, parit, dan kubangan.

B. Kerangka Konseptual



Ket: _____ : Variabel yang diteliti

C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Kondisi fisik rumah

Kondisi fisik rumah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadaan rumah responden yang meliputi keberadaan ventilasi rumah, keberadaan

kawat kasa pada ventilasi, dinding rumah, dan keberadaan plafon/langit-langit rumah.

Kriteria Objektif :

- a. Ada : apabila pada rumah penderita malaria klinis terdapat ventilasi, terdapat kawat kasa pada ventilasi, terdapat lubang pada dinding rumah, dan terdapat plafon/langit-langit rumah.
- b. Tidak ada : apabila pada rumah penderita malaria klinis tidak terdapat ventilasi, tidak terdapat kawat kasa pada ventilasi, tidak terdapat lubang pada dinding rumah, dan tidak terdapat plafon/langit-langit rumah.

2. Suhu udara

Suhu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suhu udara didalam rumah responden. Dilakukan dengan pengukuran secara langsung dengan menggunakan alat thermohygrometer.

Kriteria Objektif :

- a. Optimum : apabila suhu udara dalam rumah berkisar $25-30^{\circ}\text{C}$, karena suhu tersebut merupakan suhu optimum untuk perkembangbiakan parasit plasmodium dalam tubuh nyamuk.
- b. Tidak optimum : apabila suhu udara dalam rumah $< 25^{\circ}\text{C}$ atau $> 30^{\circ}\text{C}$. karena pada suhu tersebut parasit dalam tubuh nyamuk tidak bisa berkembangbiak.

3. Kelembaban udara

Kelembaban yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kelembaban udara dalam rumah responden. Dilakukan dengan pengukuran secara langsung dengan menggunakan alat thermohygrometer.

Kriteria Objektif :

- a. Optimum : apabila kelembaban udara dalam rumah berkisar antara 60-80% karena pada kelembaban tersebut nyamuk lebih aktif menggigit.
- b. Tidak optimum : apabila kelembaban udara dalam rumah <60%.

4. Keberadaan *Breeding Place*

Breeding place yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu tempat perindukan nyamuk dari *Anopheles* yang berada di sekitar rumah yang meliputi rawa-rawa, kolam, habitat yang berwadah, Semak-semak, parit, genangan air, genangan air pantai dan kubangan.

Kriteria Objektif :

- a. Ada : apabila ditemukan tempat perindukan nyamuk *Anopheles* seperti pada kriteria di atas.
- b. Tidak ada : apabila tidak ditemukan tempat perindukan nyamuk *Anopheles* seperti pada kriteria di atas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Penelitian ini bersifat observasional dengan pendekatan deskriptif yaitu untuk mengetahui gambaran kondisi lingkungan fisik rumah penderita malaria klinis di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang (Notoatmodjo, 2005).

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang akurat dari sejumlah karakteristik masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif berguna untuk mendapatkan makna baru, menggambarkan kategori suatu masalah, menjelaskan frekuensi suatu kejadian dari sebuah fenomena (Suyanto, 2009).

B. *Lokasi Penelitian*

Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba pada tanggal 11-24 Juni 2012.

Kelurahan Matekko merupakan daerah dataran rendah dan merupakan daerah pesisir pantai.

C. *Populasi dan Sampel*

1. Populasi

Menurut suyanto (2009) populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yakni Seluruh rumah yang terdapat di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba sebanyak 820 rumah.

2. Sampel

Sampel merupakan sebahagian yang diambil dari keseluruhan objek penelitian dan dianggap mewakili populasi (Suyanto, 2009). Sampel dalam penelitian ini adalah rumah yang terdapat di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Adapun besar sampel dapat di rumuskan sebagai berikut :

$$n = \frac{N \cdot Z^2 (p \cdot q)}{d^2 (N - 1) + Z^2 (p \cdot q)}$$

Ket : n : besar sampel

N : besar populasi

P : proporsi untuk sifat tertentu yang diperkirakan terjadi pada populasi (0,5)

q : 1 – p : 0,5

d : tingkat kepercayaan/ketepatan yang di inginkan 0,1.

Z : standar deviasi normal digunakan 1,96 sesuai dengan derajat kemaknaan 95%

Berdasarkan rumus di atas maka besar sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{N \cdot Z^2 (p \cdot q)}{d^2 (N - 1) + Z^2 (p \cdot q)}$$

$$\frac{820 \cdot 1,96^2 (0,5 \cdot 0,5)}{0,1^2 (820 - 1) + 1,96^2 (0,5 \cdot 0,5)}$$

$$\frac{820 \cdot 3,84 (0,25)}{0,01 (819) + 3,84 (0,25)}$$

$$\frac{787,2}{8,19 + 0,96}$$

$$\frac{787,2}{9,15}$$

86 Sampel.

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui besar sampel sebanyak 86 rumah akan tetapi dari 86 rumah tersebut dikategorikan menurut Kriteria inklusi sebagai berikut :

- a. Tinggal dan berdomisili di Kelurahan Matekko.
- b. Rumah yang salah satu atau lebih anggota keluarganya pernah menderita malaria klinis pada Bulan September 2011 – April 2012 menurut data rekam medis di Puskesmas Ponre.
- c. Bersedia menjadi responden

Berdasarkan Kriteria Inklusi yang tersebut di atas rumah yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai sampel adalah sebanyak **74 rumah**.

D. *Tehnik Pengumpulan Sampel*

Prosedur pengambilan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah *Purposive Sampling*

Pengambilan sampel secara purposive didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Notoatmodjo, 2005).

E. *Cara Pengumpulan Data*

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh melalui teknik wawancara langsung dengan responden dan hasil observasi langsung terhadap kondisi lingkungan fisik rumah responden yang meliputi kondisi fisik rumah, suhu udara dalam rumah, kelembaban udara dalam rumah, serta observasi langsung dilapangan tentang ada atau tidaknya *breeding place* atau tempat perindukan nyamuk lingkungan sekitar rumah, dengan menggunakan kuesioner yang berisi pertanyaan. Pada pengukuran suhu dan kelembaban dalam rumah dilakukan satu kali pengukuran yakni mulai jam 09.00 – 17.00 WITA.

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari instansi yang terkait dengan penelitian ini yaitu data dari Puskesmas Ponre, dinas kesehatan Kabupaten Bulukumba, kantor Kelurahan Matekko.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Satu unit note book/komputer, adalah alat yang digunakan untuk menulis, mengolah dan analisa data.
2. Thermohygrometer, adalah alat untuk mengukur kelembaban dan suhu udara.
3. Lembar observasi adalah alat yang digunakan untuk panduan wawancara kepada sampel penelitian (responden), sebagai data dasar penelitian.

G. Pengolahan dan Penyajian Data

Pengolahan data digunakan dengan sistem komputerisasi dan penyajian data disajikan dalam bentuk tabel distribusi disertai penjelasannya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografis

Kelurahan Matekko merupakan salah satu Kelurahan dari 20 Desa/Kelurahan di Kecamatan Gantarang yang terletak pada wilayah pantai dan daerah persawahan. Dan mempunyai luas wilayah sekitar 268 Km² yang terdiri dari 2 Lingkungan dan 8 RT. Kelurahan Matekko memiliki batas – batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Desa Bontomacinna
Sebelah Selatan	: Kec. Ujung Bulu
Sebelah Timur	: Desa Bialo
Sebelah Barat	: Kel. Jalanjang


Wilayah Kelurahan Matekko merupakan daerah yang dikelilingi oleh pantai dan persawahan sehingga sebahagian besar penduduknya bermata pencaharian nelayan dan petani. Dan sebahagian kecil sebagai pegawai.

2. Demografis

Pertumbuhan penduduk di Kelurahan Matekko secara alami berdasarkan registrasi penduduk yaitu 4.063 jiwa, dan terdapat 936 kepala keluarga.

- a) Berdasarkan data monografi Kelurahan Matekko jumlah penduduk menurut jenis kelamin seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar V.1
Jumlah Penduduk Kelurahan Matekko Menurut Jenis Kelamin



Ket: ■ Laki-laki : 2042 jiwa
■ Perempuan : 2021 jiwa

Sumber : *Kantor Kelurahan Matekko, 2012*

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah laki-laki yang terdapat di Kelurahan Matekko sebanyak 2.042 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 2.021 jiwa. Kelurahan Matekko merupakan salah satu kelurahan yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi sehingga dapat memberikan peluang lebih besar untuk terjadinya kontak nyamuk dengan manusia. Kepadatan penduduk yang tinggi dapat berpotensi terhadap aktivitas social yang tinggi pula seperti kegiatan di luar rumah seperti nelayan yang mencari ikan dari sore hari sampai pagi hari.

Anopheles yang memiliki sifat lebih suka menggigit diluar rumah (Eksofagik) dan lebih suka menggigit manusia (Antrofilik) akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk menggigit sumber darah dan berpotensi untuk menularkan malaria lebih tinggi pada

masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah. Sehingga kepadatan penduduk tinggi memiliki potensi lebih besar dibandingkan penduduk kepadatan rendah untuk mendukung perkembang biakan nyamuk dan penularan malaria.

- b) Berdasarkan data dari Kelurahan Matekko jumlah penduduk menurut usia seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel V.1
Jumlah Penduduk Kelurahan Matekko Menurut Usia

No	Usia	Jumlah Penduduk	Persen (%)
1	0-6	395	0.09
2	7-12	733	17.9
3	13-18	381	9.34
4	19-24	791	19.4
5	25-55	1.409	34.5
6	56-79	314	7.70
7	80 thn >	40	0.9
8	Cacat	13	0.31
Total		4076	100.0

Sumber : Kantor Kelurahan Matekko, 2012

Berdasarkan tabel di atas di ketahui bahwa usia 25-55 tahun merupakan jumlah penduduk paling banyak yaitu 1.409 jiwa penduduk, ini menunjukkan bahwa banyaknya pasangan suami istri yang berusia muda dan merupakan usia produktif.

- c) Berdasarkan data dari Kelurahan Matekko jumlah penduduk menurut agama seperti terlihat pada table di bawah ini.

Tabel V.2
Jumlah Penduduk Kelurahan Matekko Menurut Agama

No	Agama	Jumlah Penduduk	Persen
1	Islam	4063	100.0
2	Kristen	-	-
3	Hindu	-	-
4	Budha	-	-
Total		4063	100.0

Sumber : Kantor Kelurahan Matekko, 2012

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa penduduk kelurahan matekko semuanya beragama islam.

- d) Berdasarkan data dari Kelurahan Matekko jumlah masjid menurut lingkungan.

Tabel V.3
Jumlah Masjid di Kelurahan Matekko Menurut Lingkungan

No	Lingkungan	Jumlah Masjid
1	Ponre 1	1
2	Ponre 2	1
3	Togambang	1
Total		3

Sumber : Kantor Kelurahan Matekko, 2012

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah masjid yang terdapat di Kelurahan Matekko sebanyak 3 masjid.

e) Berdasarkan data dari Kelurahan Matekko jumlah penduduk menurut pekerjaan.

Tabel V.4
Jumlah Penduduk Kelurahan Matekko Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah penduduk	Persen (%)
1	Pegawai	51	7.78
2	Petani	211	32.2
3	Nelayan	191	29.1
4	Wiraswasta	98	14.9
5	Lain-lain	104	15.8
Total		655	100.0

Sumber : Kantor Kelurahan Matekko, 2012

Berdasarkan tabel di atas mata pencaharian penduduk pada Kelurahan Matekko sebahagian besar sebagai petani dan nelayan dan yang paling besar adalah petani. Dalam satu keluarga seorang kepala keluarga bisa memiliki dua pekerjaan sekaligus yaitu sebagai petani dan nelayan, tergantung kondisi cuaca di daerah tersebut. Apabila daerah tersebut dalam keadaan musim angin maka seorang kepala keluarga yang tadinya sebagai nelayan akan beralih pekerjaan sebagai petani dan dibantu oleh sebagian anggota keluarganya yang mampu untuk berkebun. Di Kelurahan Matekko ini memiliki dua lingkungan yaitu lingkungan togambang dan lingkungan ponre dimana pada lingkungan togambang yang biasa di sebut kampung nelayan yang mayoritas penduduknya memiliki pekerjaan sebagai nelayan akan tetapi banyak juga masyarakat yang memilih untuk bertani rumput laut. Dilingkungan togambang ini banyak anak-anak yang putus sekolah ini disebabkan karena anak-anak tersebut membantu orang tuanya mencari rezeki. Aktivitas penduduk sebagai nelayan sebagian besar dilakukan pada pagi hari dan

pulang pada sore hari atau keesokan paginya dan hal ini menjadi potential terhadap risiko terkena malaria karena terjadi kontak dengan nyamuk malaria.

Untuk di lingkungan Ponre kebanyakan penduduk memilih untuk bertani, ada juga yang berprofesi sebagai PNS, dan ada juga yang memilih untuk bertani rumput laut dan berkebun. Aktifitas penduduk yang berprofesi sebagai petani rumput laut yang aktifitasnya biasanya dibawah kolom rumah untuk pembibitan rumput laut dan pemisahan rumput laut yang berkualitas baik, berdasarkan pengamatan langsung oleh peneliti pekerjaan ini banyak di dominasi oleh kaum ibu-ibu dan sebagian kecil juga terdapat anak-anak. Aktifitas ini dilakukan mulai jam 10 pagi sampai jam 5 sore, ini merupakan waktu yang sangat disukai oleh nyamuk malaria untuk menggigit sehingga dapat berpotensi kejadian malaria.

Sedangkan aktivitas penduduk di lahan perkebunan yang sebagian besar merupakan perkebunan ubi jalar dan ketela yang panas dan lembab, banyak tumbuh semak-semak menjadi tempat yang potensial terjadinya penularan malaria melalui gigitan nyamuk vektor malaria.

3. Kondisi Kesehatan

a) Prasarana kesehatan

Jumlah prasarana kesehatan yang ada di Kelurahan Matekko yaitu terdiri dari 1 Puskesmas dan 4 posyandu.

b) Berdasarkan data yang didapat dari pengelola program malaria di Puskesmas Ponre Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba jumlah penderita malaria klinis setiap Bulan (*Monthly Malaria*

Incidence/MOMI) sepanjang tahun 2005-2008 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.5
Jumlah Penderita Malaria Klinis Tahun 2008-2012

No	Bulan	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1	Januari	127	159	93	54
2	Februari	103	193	189	37
3	Maret	65	182	101	66
4	April	85	175	95	18
5	Mei	89	216	55	-
6	Juni	108	163	33	-
7	Juli	85	114	16	-
8	Agustus	120	114	33	-
9	September	77	125	41	-
10	Oktober	77	246	63	-
11	November	93	156	38	-
12	Desember	166	122	18	-
Total		1.195	1965	775	175

Sumber : *Puskesmas Ponre, 2012*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penderita malaria klinis pada tahun 2009 yaitu 1.195 dimana posisi tertinggi pada bulan Desember yaitu sebanyak 166 penderita malaria klinis dan posisi terendah pada bulan maret yaitu sebanyak 65 penderita, sedangkan pada tahun 2010 terdapat 1.965 penderita dimana tertinggi pada bulan Oktober yaitu sebanyak 246 dan terendah pada bulan juli dan agustus sebanyak 114, kemudian disusul pada tahun 2011 sebanyak 775 penderita posisi tertinggi pada Bulan Februari sebanyak 189 penderita dan terendah pada Bulan Desember sebanyak 18 penderita. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah penderita sampai Bulan April sebanyak 175 penderita. Berdasarkan

data tersebut kecamatan Gantarang khususnya Kelurahan Matekko dapat dikatakan bahwa daerah tersebut tinggi angka kejadian malaria sepanjang tahun.

- c) Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari Puskesmas Ponre jumlah penderita malaria tahun 2009-2012 adalah sebagai berikut :

Tabel V.6
Jumlah Penderita Malaria Positif Tahun 2008-2012

No	Bulan	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1	Januari	51	85	5	-
2	Februari	28	38	1	1
3	Maret	25	51	-	-
4	April	35	36	-	-
5	Mei	19	70	-	-
6	Juni	40	40	-	-
7	Juli	14	21	-	-
8	Agustus	26	23	-	-
9	September	13	21	-	-
10	Oktober	13	36	1	-
11	November	45	25	1	-
12	Desember	79	13	1	-
Total		388	459	9	1

Sumber : *Puskesmas Ponre, 2012*

Berdasarkan tabel di atas jumlah penderita malaria positif pada tahun 2009 yaitu sebanyak 388 penderita, dimana tertinggi pada Bulan Desember dan terendah pada Bulan September dan Oktober, sedangkan pada tahun 2010 yaitu sebanyak 459 penderita, dimana tertinggi pada bulan Januari sebanyak 85 penderita dan terendah pada bulan Desember yaitu sebanyak 13 penderita. Jumlah penderita malaria dari tahun 2009 sampai tahun 2010 terjadi peningkatan sedangkan pada tahun 2011 sampai tahun 2012 menunjukkan penurunan jumlah kasus malaria, ini disebabkan kemungkinan besar penduduk atau masyarakat

Kelurahan Matekko sudah resisten terhadap nyamuk malaria atau sudah terjadi kekebalan.

Selain itu Penurunan ini terjadi karena adanya upaya pemberantasan yang dilakukan melalui penyemprotan dan pembagian kelambu berinsektisida oleh petugas puskesmas. Dan secara terus menerus dilakukan penelitian mengenai malaria setiap bulannya.

d) Lingkungan

Kelurahan Matekko merupakan daerah pesisir pantai, bentuk rumah tempat tinggal sebagian besar adalah rumah tradisional yang merupakan rumah panggung dengan letak rumah yang tidak tertata rapi, serta jarak antar rumah terlalu berdekatan. Lokasi pemukiman penduduk yang umumnya mengelompok serta disekitarnya terdapat banyak parit atau selokan ada yang mengalir ada pula yang tergenang, juga terdapat kubangan, lagun, dan semak-semak yang terdapat disekitar rumah penduduk. Ini berarti adanya kesempatan bagi nyamuk anopheles berkembangbiak dan beristirahat sehingga terjadi penularan malaria. Sebahagian wilayah Kelurahan Matekko masih terdapat lahan kosong yang tidak terawat dan ditumbuhi semak-semak dan dijadikan tempat pembuangan sampah sementara, semak-semak ini kemungkinan merupakan tempat istirahat nyamuk malaria.

Keadaan lingkungan berpengaruh besar terhadap ada-tidaknya malaria di suatu daerah. Adanya genangan air payau, genangan air di

persawahan, genangan air di pesisir pantai di suatu daerah akan meningkatkan kemungkinan timbulnya penyakit malaria karena tempat-tempat tersebut merupakan tempat perindukan nyamuk malaria.

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Penderita Malaria Klinis

a. Jenis kelamin

Tabel V.7
Distribusi Penderita Malaria Klinis Berdasarkan Jenis Kelamin di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Tahun 2012

No	Jenis kelamin	n	%
1	laki-laki	33	44.6
2	Perempuan	41	55.4
Total		74	100.0

Sumber : *Data Primer, 2012*

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa penderita malaria klinis yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 33 orang (44.6%), sedangkan penderita malaria klinis yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 41 orang (55,4%).

b. Umur penderita malaria klinis

Tabel V.8
Distribusi Penderita Malaria Klinis Berdasarkan Umur di Kelurahan
Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.

No	Umur Penderita	n	%
1	0-5	17	23.0
2	6-7	3	4.1
3	8-15	11	14.9
4	16-24	11	14.9
5	25-45	20	27.0
6	>46	12	16.2
Total		74	100.0

Sumber : *Data Primer, 2012*

Pada usia yang masih tergolong anak-anak sangat berpotensi untuk terjangkit malaria sesuai dengan hasil penelitian didapatkan data karakteristik menurut umur responden yaitu dari segi umur responden 0-5 tahun yaitu sebanyak 17 penderita (23.0%), kemudian disusul dari segi umur responden 6-7 tahun sebanyak 3 penderita (4.1%), pada usia 8-15 tahun sebanyak 11 penderita (14.9%), pada usia 16-24 sebanyak 11 penderita (14.9%), pada usia 25-45 tahun sebanyak 20 penderita (27.0%) pada usia ini merupakan usia yang masih tergolong produktif kebiasaan untuk berada di luar rumah sampai larut malam dimana vektornya lebih bersifat eksofilik dan eksofagik akan memperbesar jumlah gigitan nyamuk. Sedangkan dari segi umur responden 46 tahun ke atas sebanyak 12 penderita (16.2%).

2. Hasil Penelitian Variabel yang Diteliti

a. Kondisi fisik rumah

Tabel V.9
Distribusi Rumah Penderita Malaria Klinis Berdasarkan Kondisi Fisik
Rumah di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten
Bulukumba Tahun 2012

No	Kondisi fisik rumah	n	%
1.	Ventilasi		
	Ada	56	75.7
	Tidak ada	18	24.3
	Total	74	100.0
2.	Keberadaan kawat kasa		
	Ada	3	5.4
	Tidak ada	53	94.6
	Total	56	100.0
3.	Lubang pada dinding rumah		
	Ada	35	47.3
	Tidak Ada	39	52.7
	Total	74	100.0
4.	Plafon/langit-langit rumah		
	Ada	28	37.8
	Tidak ada	46	62.2
	Total	74	100.0

Sumber : *Data Primer, 2012*

Berdasarkan tabel di atas pada ventilasi dapat diketahui bahwa terdapat 56 rumah (75.7%) yang memiliki ventilasi sedangkan 18 rumah (24.3%) yang tidak memiliki ventilasi. Pada penggunaan kawat kasa terdapat 3 rumah (5.4%) yang memiliki kawat kasa pada ventilasi sedangkan 53 rumah (94.6%) yang tidak memiliki kawat kasa pada ventilasi. Pada dinding rumah responden terdapat 39 rumah (52.7%) yang tidak terdapat lubang sedangkan 35 rumah (47.3%) yang terdapat lubang pada dinding rumah. Pada plafon/langit-langit rumah terdapat 28

rumah (37.8%) yang memiliki plafon/langit-langit sedangkan 46 rumah (62.2%) yang tidak memiliki plafon/langit-langit.

b. Suhu udara dalam rumah

Tabel V.10
Distribusi Rumah Penderita Malaria Klinis Berdasarkan Suhu Udara Dalam Rumah di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.

No	Suhu udara dalam rumah	n	%
1	Optimum	59	79.7
2	Tidak optimum	15	20.3
Total		74	100.0

Sumber : *Data Primer, 2012*

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa dari 74 rumah penderita terdapat 59 rumah (79.7%) yang memiliki suhu udara optimum dalam rumah sedangkan terdapat 15 rumah (20.3%) yang memiliki suhu udara tidak optimum dalam rumah.

c. Kelembaban udara dalam rumah

Tabel V.11
Distribusi Rumah Penderita Malaria Klinis Berdasarkan Kelembaban Udara Dalam Rumah di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Tahun 2012.

No	Kategori rumah	n	%
1	Optimum	73	98.6
2	Tidak optimum	1	1.4
Total		74	100.0

Sumber : *Data Primer, 2012*

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa kelembaban udara dalam rumah penderita yang optimum sebanyak 73 rumah (98.6%) sedangkan tidak optimum sebanyak 1 rumah (1.4%).

- d. Keberadaan *breeding place* di sekitar rumah

Tabel V.12
Distribusi Rumah Penderita Malaria Klinis Berdasarkan Keberadaan
***Breeding Places* di Sekitar Rumah di Kelurahan Matekko Kecamatan**
Gantarang Kabupaten Bulukumba Tahun 2012

No	<i>Breeding place</i>	n	%
1	Ada	47	63.5
2	Tidak ada	27	36.5
Total		74	100.0

Sumber : *Data Primer, 2012*

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa dari 74 rumah penderita terdapat 47 rumah (63.5%) yang terdapat *breeding place* di sekitar rumah penderita dan 27 rumah (36,5%) yang tidak terdapat *breeding place* di sekitar rumah penderita.

- e. Jenis *breeding place* di sekitar rumah

Tabel V.13
Distribusi Rumah Penderita Malaria Klinis Berdasarkan Jenis *Breeding*
***Places* di Sekitar Rumah di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang**
Kabupaten Bulukumba Tahun 2012

No	<i>Breeding place</i>	n	%
1	Parit/Selokan	27	57.4
2	Genangan air	8	17.0
3	Kolam/sawah	8	17.0
4	Rawa-rawa	1	2.1
5	Lagun	3	6.4
Total		47	100.0

Sumber : *Data Primer, 2012*

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa dari 38 rumah yang ditemukan terdapat *breeding place* terdapat 27 (57.4%) rumah yang disekitar rumahnya terdapat *breeding place* berupa parit/selokan, 8 (17.0%) rumah yang

disekitar rumahnya terdapat *breeding place* berupa genangan air, 8 (17.0%) rumah yang disekitar rumahnya terdapat *breeding place* berupa kolam/sawah, 1 (2.1%) rumah yang disekitar rumahnya terdapat *breeding place* berupa rawa-rawa, 3 (6.4%) rumah yang disekitar rumahnya terdapat *breeding place* berupa lagun.

C. Pembahasan

1. Kondisi fisik rumah

a. Ventilasi rumah

Berdasarkan hasil penelitian pada kondisi fisik rumah seperti pada tabel V.9 diketahui bahwa persentase memiliki ventilasi sebesar 75.7% dan yang tidak memiliki ventilasi sebesar 24.3%. dalam penelitian ini pada rumah penderita malaria klinis persentase memiliki ventilasi lebih besar dari pada yang tidak memiliki ventilasi, ini disebabkan karena rata-rata rumah penderita malaria klinis berjenis rumah permanen.

Kondisi rumah yang memiliki ventilasi memberikan dampak positif bagi penghuni rumah karena fungsi ventilasi adalah sebagai sirkulasi udara/jalannya masuk udara ke dalam rumah. Akan tetapi hal ini akan menjadi boomerang apabila ventilasi tersebut tidak dipasang kawat kasa, karena tidak adanya kawat kasa akan memberikan peluang bagi nyamuk untuk masuk ke dalam rumah.

Pada penelitian ini terdapat 24.3% rumah penderita yang tidak memiliki ventilasi, tidak adanya ventilasi rumah mengakibatkan meningkatnya tingkat kelembaban dalam rumah, dan kondisi rumah tersebut kurang terang. Kurangnya ventilasi akan menyebabkan kurangnya O₂ di dalam rumah yang berarti kadar CO₂ yang bersifat racun bagi penghuninya menjadi meningkat. Di samping itu tidak cukupnya ventilasi akan menyebabkan kelembaban udara di dalam ruangan naik karena terjadi proses penguapan cairan.

b. Keberadaan kawat kasa pada ventilasi

Kondisi ventilasi rumah yang tidak terpasang kawat kasa seperti pada tabel V.9 menunjukkan bahwa rumah penderita malaria klinis dengan kondisi ventilasi yang tidak terpasang kawat kasa sebesar 94.6% dan rumah penderita malaria klinis dengan kondisi ventilasi terpasang kawat kasa sebesar 5.4%.

Kondisi ventilasi yang tidak terpasang kawat kasa mempunyai risiko untuk terjadinya penyakit malaria. Adanya kejadian malaria disebabkan rumah yang tidak terpasang kawat kasa akan mempermudah masuknya nyamuk ke dalam rumah. Kawat kasa merupakan penghalang bagi nyamuk untuk masuk ke dalam rumah bila kawat kasa dalam keadaan baik.

Keadaan ini sesuai dengan penelitian Darmadi (2002) di Desa Buaran Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa

kondisi ventilasi yang tidak terpasang kawat kasa mempunyai kecenderungan untuk terjadinya penyakit malaria. Sesuai juga dengan pernyataan subdit malaria bahwa pemasangan kawat kasa pada ventilasi rumah akan memperkecil kontak dengan nyamuk.

c. Dinding rumah

Kondisi rumah dengan dinding yang tidak rapat atau terdapat lubang dapat dilihat pada tabel V.9 menunjukkan bahwa kejadian malaria klinis pada rumah dengan dinding rumah terdapat lubang sebesar 47.3% sedangkan pada rumah dengan dinding rumah tidak terdapat lubang sebesar 52.7%.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi dinding rumah penderita malaria klinis lebih banyak yang memiliki dinding rumah tidak terdapat lubang di bandingkan dengan dinding rumah yang terdapat lubang. Ini disebabkan Karena rumah penderita malaria klinis pada penelitian ini sebahagian besar berjenis rumah permanen sehingga pada dinding rumah tidak terdapat lubang.

Namun beberapa teori mengatakan bahwa keadaan dinding berlubang akan mempermudah masuknya nyamuk ke dalam rumah lebih besar bila dibandingkan dengan kondisi dinding rumah rapat.

Keadaan dinding yang demikian akan mempermudah masuknya nyamuk ke dalam rumah lebih besar bila dibandingkan dengan kondisi dinding rumah yang rapat. Kondisi tersebut menyebabkan

penghuni rumah lebih potensial digigit nyamuk *Anopheles*, karena nyamuk lebih leluasa masuk ke dalam rumah, sehingga akan memperbesar risiko terjadinya penularan penyakit malaria

Keadaan ini sesuai dengan hasil penelitian Darmadi (2002) di Desa Buaran Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa keluarga yang tinggal di rumah dengan kondisi dinding yang tidak rapat mempunyai kecenderungan untuk terjadinya penyakit malaria.

d. Plafon/langit-langit rumah

Kondisi plafon/langit-langit rumah dapat dilihat pada tabel V.9 pada penelitian ini menunjukkan bahwa rumah penderita malaria klinis yang tidak memiliki langit-langit sebesar 62.2% sedangkan pada rumah penderita malaria klinis yang memiliki langit-langit sebesar 37.8%.

Pada rumah yang terdapat langit-langit sebesar 37.8% atau sebanyak 28 rumah dengan dilihat kondisi langit-langit terdapat diseluruh ruangan sebanyak 4 rumah (14.3%) dan kondisi langit-langit hanya terdapat disebagian ruangan sebanyak 24 rumah (85.7%).

Keluarga yang tinggal di rumah dengan kondisi terdapat langit-langit pada semua atau sebagian ruangan rumah mempunyai risiko untuk terjadinya penyakit malaria dibanding dengan keluarga yang tinggal dirumah yang terdapat langit-langit pada semua bagian ruangan rumah. Hal ini disebabkan rumah yang seluruh ruangnya tidak

diberi langit-langit akan mempermudah masuknya nyamuk ke dalam rumah. Langit-langit merupakan pembatas ruangan dinding bagian atas dengan atap yang terbuat dari kayu, internet maupun anyaman bambu halus. Jika tidak ada langit-langit berarti ada lobang atau celah antara dinding dengan atap sehingga nyamuk lebih leluasa masuk ke dalam rumah. Dengan demikian risiko untuk kontak antara penghuni rumah dengan nyamuk *Anopheles* lebih besar dibanding dengan rumah yang ada langit-langitnya (Depkes RI, 1999).

Keadaan ini sesuai dengan hasil penelitian Darmadi (2002) di Desa Buaran Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa kondisi rumah yang seluruh ruangnya tidak diberi langit-langit mempunyai kecenderungan untuk terjadinya penyakit malaria. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Gambiro (1998), menyatakan langit-langit sangat menentukan mudah tidaknya nyamuk masuk ke dalam rumah.

2. Suhu udara dalam rumah

Pengukuran suhu di rumah responden dilakukan selama 1 kali pengukuran yakni dilakukan mulai pukul 09.00-17.00, pengukuran ini dilakukan pada ruangan di tempat-tempat seperti ruang keluarga.

Hasil pengukuran suhu udara dalam rumah oleh peneliti pada rumah penderita malaria klinis dilokasi penelitian di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba menunjukkan bahwa

temperature di lokasi penelitian selama penelitian berlangsung dapat dikatakan tidak terlalu panas, dengan kisaran $26^{\circ}\text{C} - 32^{\circ}\text{C}$.

Berdasarkan tabel V.10 hasil pengukuran suhu udara dalam rumah penderita malaria klinis selama penelitian berlangsung dengan rata-rata sebesar $27,5^{\circ}\text{C}$ dengan suhu udara di luar rumah responden selama penelitian berlangsung dengan rata-rata sebesar $29,0^{\circ}\text{C}$.

Dari hasil penelitian tersebut keadaan suhu tersebut sangat optimal bagi kehidupan nyamuk sehingga pertumbuhan nyamuk tidak akan terhenti. Dalam waktu yang lama populasi nyamuk akan bertambah padat. Sehingga penyakit malaria mudah terjadi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya kasus malaria klinis setiap tahunnya di wilayah penelitian.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu ini sangat memungkinkan sekali untuk perkembangan parasit dalam tubuh nyamuk. menurut Harijanto, suhu optimum untuk perkembangan parasit dalam tubuh nyamuk berkisar antara $20^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$, sedangkan suhu yang sedikit dibawah suhu optimum dan sedikit diatas optimum masih memungkinkan untuk perkembangan parasit dalam tubuh nyamuk. Suhu sangat mempengaruhi perkembangan parasit dalam tubuh nyamuk, makin tinggi suhu (sampai batas tertentu) makin pendek masa inkubasi ekstrinsik (sporogoni) dan sebaliknya makin rendah suhu makin panjang masa inkubasi ekstrinsiknya.

Depkes RI (2004) menunjukkan bahwa nyamuk adalah binatang berdarah dingin dan karenanya proses metabolisme dan siklus kehidupannya tergantung pada suhu lingkungan. Pertumbuhan nyamuk akan terhenti sama sekali bila suhu kurang dari 10⁰C atau lebih dari 40⁰C. toleransi terhadap suhu tergantung pada spesies nyamuk, tetapi pada umumnya suatu spesies tidak akan tahan lama bila suhu lingkungan meninggi di atas batas dimana spesies secara normal dapat beradaptasi.

Karena nyamuk adalah binatang berdarah dingin, maka proses-proses metabolisme dan siklus kehidupannya tergantung pada suhu lingkungan. Nyamuk tidak dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri terhadap perubahan-perubahan diluar tubuhnya.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian Harmendo (2008) dengan judul faktor risiko kejadian malaria di Wilayah Kerja Puskesmas Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan hasil penelitian bahwa suhu dilokasi penelitian berkisar antara 26⁰C – 34⁰C. dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa suhu ini sangat memungkinkan sekali untuk perkembangbiakan nyamuk.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian Naswir (2012) dengan judul Fauna dan Status Kerentanan Nyamuk *Anopheles spp* Terhadap Insektisida Golongan Sintetik Piretroid di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dengan hasil penelitian bahwa suhu dilokasi penelitian berkisar antara 28-30⁰C dengan hasil penelitian terdapat

hubungan yang bermakna antara kepadatan nyamuk *Anopheles spp* dengan suhu lingkungan.

Pada pengaruh suhu, Pinontoan (2009) menyatakan bahwa suhu berhubungan positif secara signifikan dengan persentase nyamuk *Anopheles* yang ditangkap baik didalam maupun diluar rumah pada penelitian di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. Suhu udara selain berpengaruh pada nyamuk sebagai vektor, juga mempengaruhi pertumbuhan parasit di dalam tubuh vektor. Suhu kritis terendah rata-rata untuk siklus sporogonik di dalam tubuh nyamuk

Penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dengan judul pengaruh faktor iklim terhadap kejadian malaria di Pulau Kapoposang Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan mengatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara suhu dengan kejadian malaria, tetapi terdapat pengaruh yang bermakna antara variasi curah hujan dan kecepatan angin dengan kejadian malaria.

3. Kelembaban udara dalam rumah

Pengukuran kelembaban dalam rumah responden dilakukan selama 1 kali pengukuran yakni dilakukan mulai pukul 09.00-17.00, pengukuran ini dilakukan pada ruangan di tempat-tempat seperti ruang keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat pada tabel V.11 menunjukkan bahwa kelembaban udara dalam rumah responden berkisar

antara 59-78% dengan rata-rata kelembaban adalah 70%. Pengukuran ini dilakukan pada siang hari sampai sore hari.

Kelembaban udara di wilayah penelitian selama penelitian berlangsung berada diatas kelembaban minimal untuk kehidupan nyamuk, sehingga kemungkinan nyamuk untuk bertahan hidup adalah besar. Selanjutnya nyamuk akan mencari darah untuk bertahan hidup.

Pengukuran kelembaban udara dilakukan untuk mengetahui pengaruh kelembaban relatife terhadap populasi nyamuk. Pada kelembaban yang lebih tinggi nyamuk menjadi aktif dan lebih sering menggigit, sehingga meningkatkan penularan malaria tingkat kelembaban 60% merupakan batas paling rendah untuk memungkinkan hidup nyamuk (Gunawan, 2000).

Adanya kelembaban yang tinggi juga mempengaruhi nyamuk untuk mencari tempat yang lembab dan basah di luar rumah sebagai tempat hinggap dan istirahat pada siang hari (Depkes RI, 2004). Teori tersebut mendukung dengan terdapatnya tempat-tempat yang lembab di daerah penelitian seperti semak-semak di sekitar rumah responden. Tingginya kelembaban juga diakibatkan daru curah hujan pada waktu melakukan penelitian. Kelembaban yang disyaratkan menurut permenkes no.1077/menkes/per/V/2011 adalah 40-60%.

Kelembaban juga dapat bertindak sebagai faktor pembatas dalam penyebaran dan lama hidup. Pada saat musim kering, nyamuk berada

dalam ruangan di rumah-rumah atau tempat beristirahat dalam ruangan dimana iklim mikro yang memberikan kelembaban yang menguntungkan. Nyamuk yang diluar ruangan akan beristirahat pada vegetasi dekat dengan tanah selama musim kemarau. Sepanjang siang dan malam ada perubahan suhu dan kelembaban sesuai karakteristik masing-masing area. Aktivitas serangga berkorelasi dengan irama perubahan itu. Sepanjang hari nyamuk beristirahat di tempat-tempat dingin. Saat senja, ketika penurunan suhu dan kelembaban meningkat, nyamuk tiba-tiba menjadi aktif (WHO dalam Naswir 2012).

Hasil penelitian ini diperkuat lagi oleh penelitian Raharjo (2003) di lereng Barat dan Timur Pegunungan Muria Jawa Tengah, dimana kelembaban >60% sebagai pendukung untuk tumbuh dan berkembang nyamuk malaria.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Naswir (2012) dengan judul Fauna dan Status Kerentanan Nyamuk *Anopheles spp* Terhadap Insektisida Golongan Sintetik Piretroid di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dimana kepadatan nyamuk *Anopheles spp* cenderung meningkat bila kelembaban juga meningkat dan sebaliknya kepadatannya menurun bila kelembaban juga menurun.

4. Keberadaan *breeding place*

Breeding place dalam hal ini adalah tempat perindukan nyamuk *Anopheles* seperti lagun, parit/selokan, kubangan air, genangan pantai, genangan air dan kolam/persawahan.

Stadium telur, jentik dan kepompong berada dalam air dan tempat yang mengandung air tersebut dinamakan *breeding places*. Sumber air tersebut yang dapat digunakan sebagai breeding places nyamuk anopheles adalah pantai, lagun, kubangan air, genangan air, parit/selokan, kolam. Untuk tiap jenis nyamuk mempunyai tipe *breeding places* yang berlainan (Depkes RI, 1999).

Genangan air yang dijumpai di wilayah penelitian yaitu di Kelurahan Matekko adalah pantai, kubangan, lagun, parit yang tidak terurus merupakan tempat yang potensial untuk perkembangbiakan (*breeding places*) nyamuk anopheles. Keberadaan *breeding places* di sekitar rumah tentunya merupakan faktor risiko terjadinya penularan malaria.

Jenis *Anopheles* terbesar yang terdapat di Kabupaten Bulukumba adalah *An. Barbirostris*, *An. Subpictus*, dan *An. Vagus* hal ini karena terdapatnya habitat potensial di Kabupaten Bulukumba seperti persawahan, pantai, genangan air, bekas tapak kaki hewan. Selain itu pada penelitian Naswir (2012) di Kelurahan Caile yang merupakan daerah berbatasan dengan Kelurahan Matekko pada penelitiannya jenis *Anopheles* yang didapatkan yaitu *An. Barbirostris*, *An. Vagus*, *An.*

Subpictus, *An. Indefinitus*, *An. Nigerrimus*, *An. Tesselatus*, *An. Flavirostris*, dan *An. Kochi*.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa terdapat 47 (63,5%) rumah yang di sekitarnya terdapat *breeding place*, dan 27 (36,5%) rumah yang disekitarnya tidak terdapat *breeding place*.

Adapun jenis *breeding place* yang terdapat di Kelurahan Matekko yaitu lagun, parit/selokan, genangan air, genangan air pantai, persawahan/kolam.

Terdapatnya kasus malaria pada rumah yang disekitarnya terdapat genangan air dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa proporsi keberadaan genangan air disekitar rumah lebih besar. Dengan adanya genangan air yang ditumbuhi oleh rumput-rumput, lumut-lumut dan berupa payau di sekitar rumah tentunya peningkatan populasi nyamuk disekitar rumah.

Hal ini tentunya sangat berisiko meningkatkan peluang kontak antara nyamuk sebagai vektor malaria dengan orang yang rumahnya berada disekitar genangan air. Jika kepadatan disekitar rumah tinggi dan didukung dengan ketersediaan manusia maka akan meningkatkan kapasitas vektor sehingga kemungkinan orang di sekitar genangan air untuk tertular malaria akan semakin besar.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian Kusumawati dkk (2008) di Kabupaten Bangka, dimana pada air yang tergenang berupa payau/rawa digunakan oleh nyamuk sebagai *breeding places*. Hasil ini terbukti juga dengan penelitian Suwito (2005) di Wilayah Kerja Puskesmas Benteng Kabupaten Bangka Tengah, dimana rumah penduduk yang sekelilingnya ditemukan genangan air mempunyai risiko terkena malaria.

Dalam hal ini faktor kebersihan lingkungan memegang peranan penting.

Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, dapat kita lihat bahwa surat pertama yang diturunkan adalah panggilan kepada ilmu, sedang yang kedua adalah panggilan kebersihan. Surat pertama yang diturunkan adalah surat "Iqra" yang artinya "bacalah", sedang surat yang kedua adalah QS. Al-Mudatsir : " dan pakaianmu bersihkanlah"

Berikut ini dijelaskan dalam Q.S. Albaqarah/2 : 222



Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Islam agama yang mencintai kebersihan, baik lahir maupun batin, jasmani maupun rohani. Dalam Islam, istilah yang dekat dengan kebersihan adalah kesucian.

Salah satu sifat manusia yang secara tegas dicintai Allah SWT adalah orang-orang yang selalu menjaga kebersihannya dan kebersihan digandengkan dengan taubat. Taubat menghasilkan kesehatan mental sedangkan kebersihan menghasilkan kesehatan fisik. (M. Quraisy Shihab.1996).

Ajaran kebersihan dalam Agama Islam berpangkal atau merupakan konsekuensi dari pada iman kepada Allah, berupaya menjadikan dirinya suci/bersih supaya Ia berpeluang mendekat kepada Allah SWT. Kebersihan itu bersumber dari iman dan merupakan bagian dari iman. Dengan demikian kebersihan dalam Islam mempunyai aspek ibadah dan aspek moral.

Ajaran kebersihan tidak hanya merupakan slogan atau teori belaka, tetapi harus dijadikan penuntun dan dipraktikkan dalam kehidupan seperti kebersihan lingkungan sangat perlu untuk dijaga karena banyak hal negative jika kebersihan lingkungan terabaikan misalnya banyaknya sampah yang berserakan, terdapatnya semak-semak disekitar rumah, adanya genangan air disekitar rumah hal akan menjadi kontribusi positif untuk terjadinya penularan penyakit khususnya malaria.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kondisi fisik rumah penderita malaria klinis di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba yang memiliki ventilasi sebanyak 56 rumah dan yang tidak memiliki ventilasi sebanyak 18 rumah, yang memiliki kawat kasa pada ventilasi sebanyak 3 rumah dan yang tidak memiliki kawat kasa pada ventilasi sebanyak 53 rumah, terdapat lubang pada dinding sebanyak 35 rumah dan yang tidak memiliki lubang pada dinding sebanyak 39 rumah, yang memiliki plafon/langit-langit rumah sebanyak 28 rumah dan yang tidak memiliki plafon/langit-langit rumah sebanyak 46 rumah dimana kondisinya memberikan peluang bagi nyamuk masuk ke dalam rumah.
2. Suhu udara dalam rumah penderita malaria klinis di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba adalah berkisar 26-32⁰C, suhu ini merupakan suhu optimum untuk perkembangbiakan nyamuk anopheles.
3. Kelembaban udara dalam rumah penderita malaria klinis di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba adalah berkisar 59-78% dengan rata-rata 70%. Ini merupakan kelembaban optimum yang disukai oleh nyamuk.

4. Keberadaan *breeding places* di lingkungan sekitar rumah penderita malaria klinis di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba adalah ditemukannya tempat-tempat perindukan seperti lagun, parit/selokan, genangan air, rawa-rawa dimana kondisinya memungkinkan sebagai tempat berkembangbiak nyamuk Anopheles.

B. Saran

1. Bagi institusi kesehatan
Khususnya Puskesmas Ponre Kelurahan Matekko melakukan survey jentik di Wilayah Kelurahan Matekko.
2. Bagi masyarakat
 - a. Pentingnya diperhatikan lingkungan sekitar rumah, terutama genangan air untuk mencegah terbentuknya *breeding places* nyamuk, dengan cara membersihkan rumput-rumput disekitarnya atau pemberian ikan pemakan jentik atau dengan larvasida.
 - b. Hendaknya ventilasi atau lubang angin dipasang kawat kasa agar nyamuk tidak dapat masuk ke dalam rumah.
3. Bagi peneliti lain
Melakukan penelitian pengambilan sampel darah pada penderita malaria klinis di Kelurahan Matekko Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anulkarim.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Departemen Agama RI. Bandung : Syaamil Al-Qur'an.
- Achmadi, U. F, 2008. *Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah*. Jakarta : UI-Press.
- Anies. 2005. *Manajemen berbasis lingkungan (solusi mencegah dan menanggulangi penyakit menular)*. Jakarta : PT. Alex media komputindo.
- Anies. 2005. *Mewaspada penyakit lingkungan*. Jakarta : PT. Alex media komputindo.
- Bruce-chwatt dalam Susana Dewi. 2010. *Dinamika penularan malaria*. Jakarta : UI-Press
- Damar, T.B. 2002. *Studi epidemiologi malaria di daerah endemik malaria kabupaten Banjarnegara*.
<http://digilib.litbang.depkes.go.id/90.php?id=jkpkbppk-gdl-res-2002-damar-1737-malaria> (15 November 2010).
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2006. *Pedoman surveilans malaria*. Direktorat pengendalian penyakit bersumber binatang. Direktorat jenderal pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Jakarta.
- Direktorat jenderal P2 dan PL. 2008. *Pedoman penatalaksanaan kasus malaria di Indonesia*. Jakarta : Depkes RI.
- Direktorat jenderal P2 dan PL. 2009. *Epidemiologi malaria di Indonesia*. Jakarta : Depkes RI.
- Eli, Winandi. 2004. *Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian malaria di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu*. Tesis, Universitas Indonesia.
- Gandahusada Srisasi, dkk. 2006. *Parasitologi kedokteran*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Gassing, Qadir dan Halim, Wahyuddin. 2009. *Pedoman penulisan karya tulis ilmiah*. Makassar : Alauddin Press.
- Gunawan, S. 2000. *Epidemiologi malaria dalam malaria : Epidemiologi, pathogenesis, manifestasi klinis dan penanganannya*. Jakarta : EGC.

- Harijanto P.N. 2000. *Malaria, epidemiologi, pathogenesis, manifestasi klinis dan penanganan*. Jakarta : EGC.
- Harijanto, P.N, dkk. 2010. *Malaria dari molekuler ke klinis*. Jakarta : EGC.
- Hidajah, Atike, dkk. 2006. *Dinamika penularan malaria di daerah berbatasan*. Surabaya : Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
- H.R.Tobroni. *Kitab Majmu' al zawaid, halaman 158 jilid 5*.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. *Metodologi penelitian kesehatan*. Cet. III ; Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Nugroho, Agung. 2010. *Malaria dari molekuler ke klinis*. Jakarta : EGC.
- P2 dan PL Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman ekologi dan aspek perilaku vektor*. Jakarta : Departemen Kesehatan.
- P2 dan PL Dinkes Prov. Sulsel. *Kasus malaria di sulasel masih tinggi di Selayar, Bulukumba, Pangkep dan Luwu*. 2010. <http://>
- Prabowo, A. 2004. *Malaria mencegah dan mengatasinya*. Jakarta : Puspa Swara.
- Prasetyo, A. 2006. Malaria. <http://www.pusatinformasipenyakitinfeksihususnyahiv-aids-penyakit-malaria.html> (15 November 2011).
- Prabawati Th Ari. *Mengolah data statistic hasil penelitian dengan SPSS 17*. 2010. Yogyakarta : Andi. Semarang : Wahana Komputer.
- Putu S dalam Ikrayama Babba. 2007. *Faktor-faktor risiko yang mempengaruhi kejadian malaria*. Tesis tidak diterbitkan. Program studi magister epidemiologi UNDIP Semarang.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Almishbah : pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati.
- Siregar, Syofian. 2011. *Statistika deskriptif untuk penelitian (dilengkapi perhitungan manual dan aplikasi SPSS versi 17)*. Jakarta :PT Rajagrafindo Persada.
- Soemirat, J dalam Harmendo. 2008. *Faktor risiko kejadian malaria di wilayah kerja Puskesmas Kenanga Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka*. Tesis tidak diterbitkan. Program studi magister kesling. UNDIP Semarang.

Sopiyudin, M Dahlan. *Statistik untuk kedokteran dan Kesehatan*. 2009. Jakarta : Salemba Medika.

Susana, Dewi. 2011. *Dinamika penularan malaria*. Jakarta : UI-Press

Sutisna, P. 2004. *Malaria secara ringkas*. Jakarta : EGC.

Suyanto dan Umami Salamah. 2009. *Metodologi dan Aplikasi*. Jogjakarta : Mitra Cendikia Press.

Yusri, 2011. *Pengertian, sejarah dan penyebaran penyakit*. <http://www.kesehatan123.com/1853/malaria-pengertian-sejarah-dan-penyebaran-penyakit/>. (diakses 12 Mei 2012).





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LEMBAR OBSERVASI

GAMBARAN KONDISI LINGKUNGAN FISIK RUMAH PENDERITA MALARIA KLINIS DI KELURAHAN MATEKKO KECAMATAN GANTARANG KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2012

A. Data Penderita Malaria Klinis

1. Nomor rumah :
2. Tanggal wawancara :
3. Alamat :
4. Nama :
5. Jenis kelamin :
6. Umur :
7. Jumlah anggota keluarga :
8. Pendidikan :
 - a. Belum sekolah
 - b. Tidak tamat SD
 - c. SD
 - d. SLTP
 - e. SLTA
 - f. Akademi/Perguruan tinggi
9. Pekerjaan :
 - a. Petani
 - b. Nelayan
 - c. Wiraswasta
 - d. Pegawai swasta
 - e. PNS/TNI/Polri
 - f. Pensiunan
 - g. Belum bekerja
 - h. Tidak bekerja

B. Observasi Kondisi Lingkungan Fisik Rumah

No	Observasi	Keberadaan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Ventilasi		
2.	Kawat kasa pada ventilasi		
3.	Lubang pada dinding rumah		

4.	Plafon/langit-langit rumah		
5.	Langit-langit terdapat di seluruh ruangan		

No	Pengukuran	Hasil
1.	Suhu udara dalam rumah	
2.	Kelembaban udara dalam rumah	

No	Observasi	Keberadaan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Breeding Place		
2.	Jenis Breeding Place		

OUTPUT LEMBAR OBSERVASI

Alamat rumah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ponre	61	82.4	82.4	82.4
	Saloloangnge	3	4.1	4.1	86.5
	Togambang	10	13.5	13.5	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Jenis kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	33	44.6	44.6	44.6
	Perempuan	41	55.4	55.4	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0-5	17	23.0	23.0	23.0
	6-7	3	4.1	4.1	27.0
	8-15	11	14.9	14.9	41.9
	16-24	11	14.9	14.9	56.8
	25-45	20	27.0	27.0	83.8
	>46	12	16.2	16.2	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

AnggotaKeluarga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2-5	36	48.6	48.6	48.6
	6-10	38	51.4	51.4	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Belum sekolah	19	25.7	25.7	25.7
	Tidak tamat SD	13	17.6	17.6	43.2
	SD	17	23.0	23.0	66.2
	SLTP	7	9.5	9.5	75.7
	SLTA	11	14.9	14.9	90.5
	Akademi/Perguruan tinggi	7	9.5	9.5	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Pekerjaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Petani	7	9.5	9.5	9.5
	Nelayan	10	13.5	13.5	23.0
	Wiraswasta	5	6.8	6.8	29.7
	Pegawai swasta	5	6.8	6.8	36.5
	PNS/TNI/Polri	3	4.1	4.1	40.5
	Pensiun	1	1.4	1.4	41.9
	Belum bekerja	33	44.6	44.6	86.5
	Tidak bekerja	10	13.5	13.5	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Jenis rumah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Panggung	27	36.5	36.5	36.5
	Permanen	44	59.5	59.5	95.9
	Semi Permanen	3	4.1	4.1	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Ventilasi rumah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	56	75.7	75.7	75.7
	Tidak Ada	18	24.3	24.3	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Jika ada, dipasang kawat kasa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	3	5.4	5.4	5.4
	Tidak Ada	53	94.6	94.6	100.0
	Total	56	100.0	100.0	

Dinding rumah terdapat lubang

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak terdapat lubang >1.5 mm	39	52.7	52.7	52.7
	Terdapat lubang > 1.5 mm	35	47.3	47.3	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Plafon/langit-langit rumah responden

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	28	37.8	37.8	37.8
	Tidak Ada	46	62.2	62.2	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Bila ada terdapat di seluruh ruangan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Langit-langit diseluruh ruangan	4	14.3	14.3	14.3
	Langit-langit hanya terdapat di sebagian ruangan	24	85.7	85.7	100.0
	Total	28	100.0	100.0	

SuhuDalam

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Optimum	59	79.7	79.7	79.7
	Tidak Optimum	15	20.3	20.3	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

KelembabanDalam

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Optimum	73	98.6	98.6	98.6
	Tidak Optimum	1	1.4	1.4	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Pencahayaan dalam rumah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang terang sehingga tidak dapat membaca dengan keadaan normal	10	13.5	13.5	13.5
	Terang dan tidak silau sehingga dapat membaca dengan keadaan normal	64	86.5	86.5	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Semak semak di sekitar rumah responden


		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	53	71.6	71.6	71.6
	Tidak Ada	21	28.4	28.4	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Breeding Place di Lingkungan Sekitar Rumah

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ada	47	63.5	63.5	63.5
	Tidak ada	27	36.5	36.5	100.0
	Total	74	100.0	100.0	

Jenis Breeding Place Lingkungan sekitar rumah

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Parit/Selokan	27	57.4	57.4	57.4
Genangan air	8	17.0	17.0	74.5
Kolam/sawah	8	17.0	17.0	91.5
Rawa-rawa	1	2.1	2.1	93.6
Lagun	3	6.4	6.4	100.0
Total	47	100.0	100.0	



PROSEDUR PENGUKURAN SUHU DAN KELEMBABAN

A. Alat

Thermohygrometer

B. Prosedur kerja

1. Siapkan alat thermohygrometer
2. Tekan tombol on
3. Catat angka yang muncul
4. Setelah selesai tekan tombol off.



DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar pada saat dilakukan penelitian dengan wawancara kepada responden



Gambar pada saat melakukan observasi di rumah responden



Gambar rumah responden yang memiliki ventilasi




Gambar rumah responden yang memiliki kawat kasa pada ventilasi



Gambar dinding rumah responden yang terdapat lubang





Gambar rumah responden yang tidak memiliki plafon/langit-langit




Gambar rumah responden yang memiliki plafon/langit-langit





Gambar breeding place di sekitar rumah responden



Gambar pengukuran suhu dan kelembaban di dalam rumah responden



Gambar pada saat melakukan wawancara pada penduduk di sekitar pantai





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1077/MENKES/PER/V/2011**

TENTANG

PEDOMAN PENYEHATAN UDARA DALAM RUANG RUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa kualitas udara yang buruk dalam ruang rumah dapat menimbulkan gangguan kesehatan, sehingga perlu upaya penanggulangan secara tepat dan berkesinambungan oleh semua pihak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyehatan Udara Dalam Ruang Rumah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang ...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1407/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYEHATAN UDARA DALAM RUANG RUMAH**

Pasal ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Pengaturan Pedoman penyehatan udara dalam ruang rumah bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemilik rumah, penghuni rumah, pengembang pembangunan perumahan, Pemerintah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota dalam rangka upaya penyehatan kualitas udara dalam ruang rumah.

Pasal 2

Pedoman penyehatan udara dalam ruang rumah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi persyaratan kualitas udara dalam ruang rumah, faktor risiko dan upaya penyehatan udara dalam ruang rumah, serta tata laksana pengawasan kualitas udara dalam ruang rumah.

Pasal 4

Pemantauan terhadap kualitas udara dalam ruang rumah dilaksanakan oleh petugas kesehatan lingkungan di puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 5

- (1) Setiap pengembang pembangunan perumahan harus memenuhi persyaratan kualitas udara dalam ruang rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan sanksi administrasi kepada pengembang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan rekomendasi atau pencabutan surat izin usaha perdagangan (SIUP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Menteri Kesehatan, Kepala Dinas kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Peraturan Menteri ini.

(2) Pembinaan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan upaya penyehatan udara dalam ruang rumah oleh masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi, advokasi, sosialisasi, bimbingan teknis, peningkatan sumber daya manusia, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/MENKES/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan, sepanjang mengenai kualitas udara dalam ruang rumah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2011

MENTERI KESEHATAN,

ttd

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1077/MENKES/PER/V/2011

TENTANG

PEDOMAN PENYEHATAN UDARA DALAM RUANG RUMAH





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencemaran udara dalam ruang (*indoor air pollution*) terutama rumah sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, karena pada umumnya orang lebih banyak menghabiskan waktu untuk melakukan kegiatan di dalam rumah sehingga rumah menjadi sangat penting sebagai lingkungan mikro yang berkaitan dengan risiko dari pencemaran udara.

Dampak dari adanya pencemar udara dalam ruang rumah terhadap kesehatan dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Gangguan kesehatan secara langsung dapat terjadi setelah terpajan, antara lain yaitu iritasi mata, iritasi hidung dan tenggorokan, serta sakit kepala, mual dan nyeri otot (*fatigue*), termasuk asma, hipersensitivitas pneumonia, flu dan penyakit-penyakit virus lainnya. Sedangkan gangguan kesehatan secara tidak langsung dampaknya dapat terjadi beberapa tahun kemudian setelah terpajan, antara lain penyakit paru, jantung, dan kanker, yang sulit diobati dan berakibat fatal (USEPA, 2007).

Selain penyakit tersebut di atas, Bronkhitis kronis, Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), kanker paru, kematian Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), kematian bayi usia kurang dari satu minggu, otitis media dan ISPA, *tuberculosis* sering dijumpai pada lingkungan dengan kualitas udara dalam ruang yang tidak baik.

Di negara maju diperkirakan angka kematian pertahun karena pencemaran udara dalam ruang rumah sebesar 67% di pedesaan dan sebesar 23% di perkotaan, sedangkan di negara berkembang angka kematian terkait dengan pencemaran udara dalam ruang rumah daerah perkotaan sebesar 9% dan di daerah pedesaan sebesar 1%, dari total kematian (Buletin WHO 2000). Pneumonia merupakan penyebab utama kematian pada anak dibawah 5 tahun dengan jumlah kematian lebih dari 2 juta jiwa setiap tahunnya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Lebih dari 2 (dua) dasawarsa ini penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) selalu menduduki peringkat pertama dari 10 penyakit terbanyak di Indonesia. Salah satu penyebab terjadinya ISPA adalah rendahnya kualitas udara baik di dalam maupun di luar rumah, baik secara biologis, fisik, maupun kimia (Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, <http://udarakota.bappenas.go.id> diakses tanggal 29 November 2007). ISPA mendominasi kesakitan ada anak di bawah 5 tahun (balita) dan menyebabkan kematian sekitar empat juta balita pertahunnya (Kartasasmita, 2004; Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2001).

Kualitas udara di dalam ruang rumah dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain, bahan bangunan (misal; asbes), struktur bangunan (misal; ventilasi), bahan pelapis untuk furniture serta interior (pada pelarut organiknya), kepadatan hunian, kualitas udara luar rumah (*ambient air quality*), radiasi dari Radon (Rd), formaldehid, debu, dan kelembaban yang berlebihan. Selain itu, kualitas udara juga dipengaruhi oleh kegiatan dalam rumah seperti dalam hal penggunaan energi tidak ramah lingkungan, penggunaan sumber energi yang relatif murah seperti batubara dan biomasa (kayu, kotoran kering dari hewan ternak, residu pertanian), perilaku merokok dalam rumah, penggunaan pestisida, penggunaan bahan kimia pembersih, dan kosmetika. Bahan-bahan kimia tersebut dapat mengeluarkan polutan yang dapat bertahan dalam rumah untuk jangka waktu yang cukup lama.

Pencemaran udara dalam ruang rumah, khususnya di daerah perdesaan pada negara-negara berkembang, antara lain dikarenakan penggunaan bahan bakar padat sebagai energi untuk memasak dengan tungku sederhana/kompur tradisional. Bahan bakar tersebut menghasilkan polutan dalam konsentrasi tinggi dikarenakan terjadi proses pembakaran yang tidak sempurna. Keadaan tersebut akan memperburuk kualitas udara dalam ruang rumah apabila kondisi rumah tidak memenuhi syarat fisik, seperti ventilasi yang kurang memadai, serta tidak adanya cerobong asap di dapur.

Gangguan kesehatan akibat pencemaran udara dalam ruang rumah sebagian besar terjadi di perumahan yang cenderung menggunakan energi untuk memasak dengan energi biomasa.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat dari pencemar udara dalam ruang rumah, maka diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan acuan dalam pengendalian pencemaran udara dalam ruang rumah.

B. Pengertian

1. Penyehatan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas udara dalam ruang rumah dan pencegahan terhadap penurunan kualitas udara dalam ruang rumah.
2. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
3. Pencemaran Udara dalam Ruang Rumah adalah, suatu keadaan adanya satu atau lebih polutan dalam ruangan rumah yang karena konsentrasinya dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan penghuni rumah.
4. Energi Biomasa adalah energi yang dihasilkan dari pembakaran bahan biomasa yang belum diproses seperti kayu, kotoran kering dari hewan ternak, dan sisa hasil pertanian.
5. Faktor Risiko Pencemar Udara adalah unsur yang berpengaruh terhadap kesehatan akibat pencemaran udara secara fisik, kimia, dan biologi.
6. Kualitas Fisik Udara dalam Ruang Rumah adalah nilai parameter yang mengindikasikan kondisi fisik udara dalam rumah seperti kelembaban, pencahayaan, suhu, dan partikulat.
7. Kualitas Kimiawi Udara dalam Ruang Rumah adalah nilai parameter yang mengindikasikan kondisi kimiawi udara dalam rumah seperti *Sulfur dioksida* (SO_2), *Nitrogen dioksida* (NO_2), *Ozon*, *Karbon dioksida* (CO_2), *Karbon monoksida* (CO), *Timbal* (Plumbum=Pb), dan Asbes.
8. Kualitas Biologi Udara dalam Ruang Rumah adalah nilai parameter yang mengindikasikan kondisi biologi udara dalam rumah seperti bakteri dan jamur.
9. Asap Rokok (*Environmental Tobacco Smoke/ETS*) adalah gas beracun yang dikeluarkan dari pembakaran produk tembakau yang biasanya mengandung *Polycyclic Aromatic Hydrocarbons* (PAHs) yang berbahaya bagi kesehatan manusia.
10. Laju ventilasi adalah laju pertukaran udara melalui ventilasi (lubang udara permanen selain jendela dan pintu).



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II PERSYARATAN KUALITAS UDARA DALAM RUANG RUMAH

Persyaratan kualitas udara dalam ruang rumah meliputi :

- Kualitas fisik, terdiri dari parameter: partikulat (*Particulate Matter*/PM_{2,5} dan PM₁₀), suhu udara, pencahayaan, kelembaban, serta pengaturan dan pertukaran udara (laju ventilasi);
- Kualitas kimia, terdiri dari parameter: *Sulfur dioksida* (SO₂), *Nitrogen dioksida* (NO₂), *Karbon monoksida* (CO), *Karbon dioksida* (CO₂), *Timbal* (Plumbum=Pb), asap rokok (*Environmental Tobacco Smoke/ETS*), *Asbes*, *Formaldehid* (HCHO), *Volatile Organic Compound* (VOC); dan
- Kualitas biologi terdiri dari parameter: bakteri dan jamur.

A. Persyaratan Fisik

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar yang dipersyaratkan
1.	Suhu	°C	18 - 30
2.	Pencahayaan	Lux	Minimal 60
3.	Kelembaban	% Rh	40 - 60
4.	Laju Ventilasi	m/dtk	0,15 - 0,25
5.	PM _{2,5}	µg/m ³	35 dalam 24 jam
6.	PM ₁₀	µg/m ³	≤ 70 dalam 24 jam

B. Persyaratan Kimia

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimal yang dipersyaratkan	Keterangan
1.	<i>Sulfur dioksida</i> (SO ₂)	ppm	0,1	24 jam
2.	<i>Nitrogen dioksida</i> (NO ₂)	ppm	0,04	24 jam
3.	<i>Carbon monoksida</i> (CO)	ppm	9,00	8 jam
4.	<i>Carbondioksida</i> (CO ₂)	ppm	1000	8 jam
5.	<i>Timbal</i> (Pb)	µg/m ³	1,5	15 menit



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimal yang dipersyaratkan	Keterangan
6.	Asbes	serat/ ml	5	Panjang serat 5 μ
7.	Formaldehid (HCHO)	ppm	0,1	30 menit
8.	Volatile Organic Compound (VOC)	ppm	3	8 jam
9.	Environmental Tobacco Smoke (ETS)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	35	24 jam

C. Persyaratan Kontaminan Biologi

Parameter kontaminan biologi dalam rumah adalah parameter yang mengindikasikan kondisi kualitas biologi udara dalam rumah seperti bakteri, dan jamur.

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar maksimal
1.	Jamur	CFU/m ³	0 CFU/m ³
2.	Bakteri patogen	CFU/m ³	0 CFU/m ³
3.	Angka kuman	CFU/m ³	< 700 CFU/m ³

Catatan :

- CFU= Coloni Form Unit
- Bakteri patogen yang harus diperiksa : *Legionela*, *Streptococcus aureus*, *Clostridium* dan bakteri patogen lain bila diperlukan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

BAB III UPAYA PENYEHATAN

Upaya penyehatan udara dalam ruang rumah meliputi upaya penyehatan terhadap sumber pencemar fisik, kimia, dan biologi.

A. Sumber pencemar Fisik

Upaya penyehatan terhadap sumber pencemar fisik yang terdiri dari suhu, pencahayaan, kelembaban, laju ventilasi, PM_{2.5}, PM₁₀. Kualitas udara yang tidak memenuhi persyaratan fisik akibat faktor risiko dapat menimbulkan dampak kesehatan dan perlu dilakukan upaya penyehatan.

1. Suhu

a. Dampak

Suhu dalam ruang rumah yang terlalu rendah dapat menyebabkan gangguan kesehatan hingga *hypotermia*, sedangkan suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan dehidrasi sampai dengan *heat stroke*.

b. Faktor risiko

Perubahan suhu udara dalam rumah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) Penggunaan bahan bakar biomassa
- 2) Ventilasi yang tidak memenuhi syarat
- 3) Kepadatan hunian
- 4) Bahan dan struktur bangunan
- 5) Kondisi Geografis
- 6) Kondisi Topografi

c. Upaya Penyehatan

- 1) Bila suhu udara di atas 30°C diturunkan dengan cara meningkatkan sirkulasi udara dengan menambahkan ventilasi mekanik/buatan.
- 2) Bila suhu kurang dari 18°C, maka perlu menggunakan pemanas ruangan dengan menggunakan sumber energi yang aman bagi lingkungan dan kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

2. Pencahayaan

a. Dampak

Nilai pencahayaan (*Lux*) yang terlalu rendah akan berpengaruh terhadap proses akomodasi mata yang terlalu tinggi, sehingga akan berakibat terhadap kerusakan retina pada mata.

Cahaya yang terlalu tinggi akan mengakibatkan kenaikan suhu pada ruangan.

b. Faktor Risiko

Intensitas cahaya yang terlalu rendah, baik cahaya yang bersumber dari alamiah maupun buatan.

c. Upaya Penyehatan

Pencahayaan dalam ruang rumah diusahakan agar sesuai dengan kebutuhan untuk melihat benda sekitar dan membaca berdasarkan persyaratan minimal 60 *Lux*.

3. Kelembaban

a. Dampak

Kelembaban yang terlalu tinggi maupun rendah dapat menyebabkan suburnya pertumbuhan mikroorganisme.

b. Faktor risiko

Konstruksi rumah yang tidak baik seperti atap yang bocor, lantai, dan dinding rumah yang tidak kedap air, serta kurangnya pencahayaan baik buatan maupun alami.

c. Upaya Penyehatan

1) Bila kelembaban udara kurang dari 40%, maka dapat dilakukan upaya penyehatan antara lain :

- a) Menggunakan alat untuk meningkatkan kelembaban seperti *humidifier* (alat pengatur kelembaban udara)
- b) Membuka jendela rumah
- c) Menambah jumlah dan luas jendela rumah
- d) Memodifikasi fisik bangunan (meningkatkan pencahayaan, sirkulasi udara)

2) Bila kelembaban udara lebih dari 60%, maka dapat dilakukan upaya penyehatan antara lain :

- a) Memasang genteng kaca
- b) Menggunakan alat untuk menurunkan kelembaban seperti *humidifier* (alat pengatur kelembaban udara)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

4. Laju Ventilasi

a. Dampak

Pertukaran udara yang tidak memenuhi syarat dapat menyebabkan suburnya pertumbuhan mikroorganisme, yang mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan manusia.

b. Faktor Risiko

- 1) Kurangnya ventilasi (jumlah dan luas ventilasi tidak cukup, sesuai persyaratan kesehatan).
- 2) Tidak ada pemeliharaan AC secara berkala.

c. Upaya Penyehatan

Upaya penyehatan dapat dilakukan dengan mengatur pertukaran udara, antara lain yaitu :

- 1) Rumah harus dilengkapi dengan ventilasi, minimal 10% luas lantai dengan sistem ventilasi silang
- 2) Rumah ber-AC (*Air Condition*) pemeliharaan AC dilakukan secara berkala sesuai dengan buku petunjuk, serta harus melakukan pergantian udara dengan membuka jendela minimal pada pagi hari secara rutin
- 3) Menggunakan *exhaust fan*
- 4) Mengatur tata letak ruang

5. Partikel debu diameter $2,5\mu$ (PM_{2,5}) dan Partikel debu diameter 10μ (PM₁₀)

a. Dampak

PM_{2,5} dan PM₁₀ dapat menyebabkan pneumonia, gangguan sistem pernapasan, iritasi mata, alergi, bronchitis khronis.

PM_{2,5} dapat masuk kedalam paru yang berakibat timbulnya emfisema paru, asma bronchial, dan kanker paru-paru serta gangguan kardiovaskular atau *kardiovaskular* (KVS).

b. Faktor Risiko

Secara umum PM_{2,5} dan PM₁₀ timbul dari pengaruh udara luar (kegiatan manusia akibat pembakaran dan aktifitas industri).

Sumber dari dalam rumah antara lain dapat berasal dari perilaku merokok, penggunaan energi masak dari bahan bakar biomasa, dan penggunaan obat nyamuk bakar.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

c. Upaya Penyehatan

Upaya penyehatan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan konsentrasi $PM_{2,5}$ antara lain:

- 1) Rumah dibersihkan dari debu setiap hari dengan kain pel basah atau alat penyedot debu.
- 2) Memasang penangkap debu (*electro precipitator*) pada ventilasi rumah dan dibersihkan secara berkala.
- 3) Menanam tanaman di sekeliling rumah untuk mengurangi masuknya debu ke dalam rumah.
- 4) Ventilasi dapur mempunyai bukaan sekurang-kurangnya 40% dari luas lantai, dengan sistem silang sehingga terjadi aliran udara, atau menggunakan teknologi tepat guna untuk menangkap asap dan zat pencemar udara.

B. Sumber pencemar Kimia

Upaya penyehatan terhadap sumber pencemar kimia terdiri dari Sulfur dioksida (SO_2), Nitrogen dioksida (NO_2), Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO_2), Timbal (Plumbum = Pb), Asbes, Formaldehid (HCHO), *Volatile Organic Compounds/VOCs* (senyawa organik yang mudah menguap), Asap rokok (*Environmental Tobacco Smoke/ETS*). Kualitas udara yang tidak memenuhi persyaratan kimia akibat faktor risiko dapat menimbulkan dampak kesehatan dan perlu dilakukan upaya penyehatannya.

1. Sulfur dioksida (SO_2)

a. Dampak

Sulfur dioksida (SO_2) dapat mempengaruhi sistem pernapasan dan gangguan fungsi paru, menyebabkan iritasi pada mata, *inflamasi* pada saluran pernapasan menyebabkan batuk, sekresi lendir, memicu *asma* dan *bronkhitis* kronis serta tekanan darah rendah, nadi cepat, dan sakit kepala.

b. Faktor Risiko

- 1) Penggunaan bahan bakar seperti arang, kayu, minyak bumi dan batu bara.
- 2) Merokok di dalam rumah.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

c. Upaya Penyehatan

Upaya penyehatan yang dapat dilakukan dalam mengendalikan kadar SO_2 antara lain:

- 1) Menggunakan ventilasi alami atau mekanik dalam rumah agar terjadi pertukaran udara;
- 2) Menggunakan bahan bakar rumah tangga yang ramah lingkungan, seperti *Liquid Petroleum Gas* (LPG) dan listrik;
- 3) Tidak merokok di dalam rumah.

2. Nitrogen dioksida (NO_2)

a. Dampak

Nitrogen dioksida (NO_2) dapat menimbulkan gangguan sistem pernapasan seperti lemas, batuk, sesak napas, *bronchopneumonia*, *edema* paru, dan *cyanosis* serta *methemoglobinemia*.

b. Faktor Risiko

- 1) Penggunaan bahan bakar seperti arang, kayu, minyak bumi dan batu bara.
- 2) Merokok di dalam rumah.

c. Upaya Penyehatan

Upaya penyehatan yang dapat dilakukan dalam mengendalikan kadar NO_2 antara lain:

- 1) Menggunakan ventilasi alami atau mekanik dalam rumah agar terjadi pertukaran udara;
- 2) Menggunakan bahan bakar rumah tangga yang ramah lingkungan, seperti LPG dan listrik;
- 3) Tidak merokok di dalam rumah.

3. Karbon monoksida (CO)

a. Dampak

- 1) Efek toksik CO menyebabkan kegagalan transportasi O_2 ke jaringan dan mengakibatkan *anoksia* jaringan, gangguan sistem syaraf pusat (kehilangan sensitifitas ujung jari, penurunan daya ingat, pertumbuhan mental buruk terutama pada balita, berat badan bayi lahir rendah, kematian janin dan gangguan kardiovaskular).
- 2) Gejala yang muncul akibat keracunan gas CO , antara lain pusing, mual, gelisah, sesak napas, sakit dada, bingung, pucat, tidak sadar, kegagalan pernapasan dan kematian.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

b. Faktor Risiko

- 1) Penggunaan bahan bakar seperti arang, kayu, minyak bumi, dan batu bara.
- 2) Merokok di dalam rumah.

c. Upaya Penyehatan

Upaya penyehatan yang dapat dilakukan dalam mengendalikan kadar CO antara lain:

- 1) Menggunakan ventilasi alami atau mekanik dalam rumah agar terjadi pertukaran udara untuk mengalirkan udara sisa hasil pembakaran
- 2) Menggunakan bahan bakar rumah tangga yang ramah lingkungan, seperti LPG dan listrik
- 3) Tidak merokok di dalam rumah
- 4) Tidak menghidupkan mesin kendaraan bermotor dalam ruangan tertutup
- 5) Melakukan pemeliharaan peralatan pembakaran secara berkala.

4. Karbon dioksida (CO₂)

a. Dampak

- 1) Pada konsentrasi di atas nilai ambang batas yang dipersyaratkan, dapat menyebabkan mengantuk, sakit kepala, dan menurunkan aktivitas fisik.
- 2) Pada konsentrasi 3% (30.000 ppm), bersifat narkotik ringan dan menyebabkan peningkatan tekanan darah serta gangguan pendengaran.
- 3) Pada konsentrasi 5% (50.000 ppm), menyebabkan stimulasi pernapasan, pusing-pusing, dan kesulitan pernapasan yang diikuti oleh sakit kepala.
- 4) Pada konsentrasi >8% (80.000 ppm,) dapat menyebabkan sakit kepala, berkeringat terus menerus, tremor, dan kehilangan kesadaran setelah paparan selama 5-10 menit.

b. Faktor Risiko

- 1) Penggunaan bahan bakar seperti arang, kayu, minyak bumi, dan batu bara
- 2) Merokok di dalam rumah
- 3) Kepadatan penghuni dalam ruang tinggi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

c. Upaya Penyehatan

Upaya penyehatan yang dapat dilakukan dalam mengendalikan kadar CO₂ antara lain:

- 1) Menggunakan ventilasi alami atau mekanik dalam rumah agar terjadi pertukaran udara
- 2) Menggunakan bahan bakar rumah tangga yang ramah lingkungan, seperti LPG dan listrik
- 3) Tidak merokok di dalam rumah
- 4) Tidak menghidupkan mesin kendaraan bermotor dalam ruangan tertutup
- 5) Pemeliharaan kendaraan bermotor secara berkala (lulus uji emisi gas buang)
- 6) Menanam tanaman di sekeliling rumah

5. Timbal (Plumbum = Pb)

a. Dampak

- 1) Gangguan pada sistem saraf pusat, sel darah, dan ginjal.
- 2) Dalam konsentrasi tinggi, dapat menyebabkan *konvulsi*/kejang, koma, bahkan kematian.
- 3) Paparan pada anak-anak atau janin dapat lebih parah, karena menyebabkan pertumbuhan yang terlambat, penurunan kecerdasan, mengurangi konsentrasi, dan gangguan perilaku.

b. Faktor Risiko

- 1) Cat yang bahan dasarnya mengandung Pb
- 2) Gas timbal dapat pula berasal dari luar rumah

c. Upaya Penyehatan

- 1) Membersihkan lantai dan ruangan tempat anak-anak bermain, menggunakan campuran air dan deterjen yang mengandung *fosfat* berkonsentrasi tinggi, sehingga dapat membersihkan timbal yang ada beserta debu
- 2) Membiasakan anak-anak selalu mencuci tangan dengan sabun
- 3) Mencuci mainan dan boneka anak-anak secara rutin
- 4) Tidak menggunakan cat yang mengandung Pb
- 5) Tidak membakar, membersihkan, atau mengerok/mengelupas kayu bercat karena kemungkinan cat tersebut mengandung Pb
- 6) Bagi pekerja yang berhubungan dengan Pb (pekerja pabrik aki bekas/pemulung) sebaiknya mengganti pakaian kerja serta



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

mencuci tangan dan kaki dengan sabun sebelum memasuki rumah

- 7) Mengonsumsi makanan yang mengandung kalsium dan zat besi yang tinggi
- 8) Pemeliharaan kendaraan bermotor secara berkala (lulus uji emisi gas buang)

6. Asbes

a. Dampak

Asbes dapat memicu kanker (bersifat *karsinogenik*), dan *asbestosis* (kerusakan paru permanen).

b. Faktor Risiko

Bahan bangunan yang mengandung asbes (atap dan langit-langit), dan sebagai isolasi tahan api.

c. Upaya Penyehatan

- 1) Pastikan bahan yang mengandung asbes dalam kondisi baik, periksa secara berkala dan mengganti bahan bangunan sebelum mengalami kerusakan (pelapukan).
- 2) Jangan memotong, mengampas, atau menggunakan bahan bangunan yang mengandung bahan asbes.
- 3) Jangan membuang bahan yang mengandung asbes secara sembarangan. Apabila akan memusnahkan bahan yang mengandung asbes, sebaiknya menggunakan tenaga terlatih.
- 4) Menggunakan alat pelindung diri pada saat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan asbes.

7. Formaldehid (HCHO)

a. Dampak

- 1) Gas *formaldehid* dapat menyebabkan mata berair, rasa terbakar pada mata dan tenggorokan, sulit bernapas terutama dalam konsentrasi lebih dari 0,1 ppm.
- 2) Pada konsentrasi lebih tinggi dapat menjadi pencetus serangan *asma* dan mungkin dapat menyebabkan kanker pada manusia.

b. Faktor risiko:

- 1) Bahan bangunan dan produk-produk rumah tangga.
- 2) Hasil samping dari pembakaran bahan bakar biomassa dan proses alamiah lainnya, sehingga gas ini secara alamiah berada dalam ruang maupun luar ruang.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- 3) Dalam rumah, berasal dari kayu olahan yang diawetkan dengan *resin formaldehid urea* atau *fenol formaldehid*, cat, lem dan produk-produk kayu olahan lainnya.

c. Upaya Penyehatan

- 1) Menggunakan produk kayu untuk perabotan (*pressed woods*) yang direkomendasikan aman bagi kesehatan, yaitu yang beremisi lebih rendah karena mengandung *fenol resin* dan bukan *urea resin*.
- 2) Mencari tahu tentang kadar formaldehida dalam perabotan atau bahan baku bangunan sebelum anda membelinya.
- 3) Menggunakan penyejuk udara (*Air Conditioning/AC*) dan pengatur kelembaban untuk mempertahankan suhu sedang (tidak terlalu panas atau dingin) serta mengurangi tingkat kelembaban.
- 4) Rumah harus dilengkapi dengan ventilasi.

8. Volatile Organic Compounds/VOCs (senyawa organik yang mudah menguap)

a. Dampak

- 1) Gangguan kesehatan akibat pajanan VOCs cukup bervariasi tergantung dari jenis senyawanya seperti iritasi mata, hidung, tenggorokan, sakit kepala, mual, kehilangan koordinasi sampai dengan kerusakan ginjal, hati dan sistem syaraf pusat.
- 2) Produk-produk yang mengandung *methylene chloride* termasuk cat, pelarut dan *aerosol* cat diketahui menyebabkan kanker pada hewan.
Senyawa ini juga dapat dikonversi menjadi *karbon monoksida* dalam tubuh dan dapat menimbulkan gejala seperti keracunan *karbon monoksida*.

b. Faktor risiko

- 1) Dikeluarkan sebagai gas oleh beragam produk seperti cat dan vernis, cairan pembersih dan disinfektan, pestisida, bahan-bahan bangunan dan pelapis, peralatan kantor seperti mesin fotokopi dan printer, bahan-bahan kerajinan dan grafis, termasuk lem dan perekat, spidol permanen, dan pelarut fotografi.
- 2) Penggunaan maupun penyimpanan bahan bakar minyak atau pelarut organik.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- 3) *Formaldehid* adalah salah satu senyawa *VOCs* dengan mudah diukur.
 - 4) *Benzena* adalah *karsinogen*
 - 5) Asap tembakau
 - 6) Cat pasokan
 - 7) Bahan bakar
 - 8) Emisi mobil di garasi
 - 9) Emisi dari pakaian yang dicuci dengan cara *dry-clean* berupa senyawa *perchloroethylene*.
- c. Upaya Penyehatan
- 1) Meningkatkan ventilasi ketika menggunakan produk yang memancarkan *VOCs*.
 - 2) Tidak menyimpan kontainer bahan yang mengandung *VOCs* baik yang masih terpakai maupun yang tidak terpakai.
 - 3) Kurangi pajanan dengan melindung/menutup semua permukaan panel dan perabotan lainnya yang terbuka.
 - 4) Menggunakan teknik-teknik pengelolaan hama terpadu untuk mengurangi kebutuhan akan pestisida.
 - 5) Gunakan produk rumah tangga sesuai dengan petunjuk pabriknya.
 - 6) Jauhkan bahan-bahan yang mengandung *VOCs* dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan.
 - 7) Jangan pernah mencampur produk perawatan rumah tangga, kecuali sesuai dengan petunjuk pada label kemasan.
 - 8) Ikuti petunjuk penggunaan apabila menggunakan bahan yang mengandung *VOCs*.
 - 9) Dilarang merokok.

9. Asap rokok (*Environmental Tobacco Smoke/ETS*)

a. Dampak

- 1) *ETS* dapat memperparah gejala anak-anak penderita asma
- 2) Senyawa dalam asap rokok menyebabkan kanker paru pada manusia, impotensi, serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin, bersifat iritan yang kuat.
- 3) Bayi dan anak-anak yang orang tuanya perokok mempunyai risiko lebih besar terkena gangguan saluran pernapasan dengan gejala sesak napas, batuk dan lendir berlebihan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

b. Faktor Risiko

Asap rokok yang terhirup oleh pernapasan.

c. Upaya Penyehatan

- 1) Merokok di luar rumah yang asapnya dipastikan tidak masuk kembali ke dalam rumah.
- 2) Merokok di tempat yang telah disediakan apabila berada di fasilitas/tempat-tempat umum.
- 3) Penyuluhan kepada para perokok.
- 4) Penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya menghirup asap rokok.

C. Sumber Pencemar Biologi

Upaya penyehatan terhadap sumber pencemar biologi terdiri dari parameter jamur, bakteri patogen dan angka kuman. Kualitas udara yang tidak memenuhi persyaratan biologi akibat faktor risiko dapat menimbulkan dampak kesehatan dan perlu dilakukan upaya penyehatannya.

Jamur, bakteri patogen, dan angka kuman;

a. Dampak

- 1) Penyakit yang berhubungan dengan bioaerosol dapat berupa penyakit infeksi seperti *flu*, *hipersensitivitas (asma, alergi)*, dan juga *toxycosis* yaitu toksin dalam udara di ruangan yang terkontaminasi sebagai penyebab gejala *Sick Building Syndrome/SBS*. Gejala SBS antara lain sakit kepala, kehilangan konsentrasi, tenggorokan kering, iritasi mata dan kulit.
- 2) Beberapa bentuk penyakit yang berhubungan dengan SBS yaitu iritasi mata dan hidung, kulit dan lapisan lendir yang kering, kelelahan mental, sakit kepala, *Infeksi Saluran Pernapasan Akut/ISPA*, batuk, bersin-bersin, dan reaksi *hipersensitivitas*.
- 3) Gejala fisik yang biasa dijumpai akibat kontaminan biologis adalah batuk, dada sesak, demam, menggigil, nyeri otot, dan reaksi alergi seperti iritasi *membran mukosa* dan *kongesti* saluran napas atas. Salah satu bakteri kontaminan udara dalam ruang yaitu *Legionella sp.*, menyebabkan *Legionnaire's disease*.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

b. Faktor Risiko

- 1) Serangga
- 2) Bakteri
- 3) Kutu binatang peliharaan
- 4) Jamur
- 5) Serbuk sari yang masuk ke dalam ruang
- 6) Bakteri *Legionella* yang berasal dari *soil borne* yang menembus dalam ruang
- 7) Alga yang tumbuh dekat kolam/danau masuk ke dalam ruangan melalui hembusan angin
- 8) Serangga di luar ruang yang dapat menembus bangunan tertutup
- 9) Kontaminasi yang berasal dari dalam ruang dengan kelembaban tinggi, maka spora jamur akan meningkat

c. Upaya Penyehatan

- 1) Perabotan rumah tangga dibersihkan secara rutin
- 2) Rumah harus dilengkapi dengan ventilasi yang *adequate*
- 3) Membersihkan AC minimal 3 atau 6 bulan sekali
- 4) Membersihkan dan mengeringkan karpet yang basah atau lembab.
- 5) Apabila hendak menggunakan *basement* sebagai salah satu ruang tempat tinggal, pastikan tidak ada kebocoran dan ruangan memiliki system ventilasi yang baik. Apabila perlu, gunakan mesin pengatur kelembaban untuk menjaga kelembaban udara antara 40 - 60%
- 6) Lantai selalu dibersihkan dengan antiseptik secara berkala
- 7) Mengisolasi anggota rumah tangga yang mempunyai penyakit menular dan mencegah kontaminasi dari bahan dan peralatan yang telah dipakai oleh penderita dengan cara disinfeksi.
- 8) Mengupayakan sinar matahari pagi dapat memasuki rumah terutama setiap kamar tidur.
- 9) Mengelola sampah basah dengan baik.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

BAB IV TATA LAKSANA PENGAWASAN KUALITAS UDARA DALAM RUANG RUMAH

Pelaksanaan pengawasan kualitas udara dalam ruang rumah dimaksudkan untuk mewujudkan kualitas udara dalam ruang rumah agar memenuhi persyaratan.

Pengawasan dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengolahan dan analisis data, rekomendasi, rencana tindak lanjut, serta pelaporan.

A. Pemantauan

Pemantauan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan meliputi persiapan tenaga, bahan dan alat, biaya, waktu.
 - Tenaga adalah petugas kesehatan lingkungan puskesmas dan kabupaten/kota
 - Bahan dan alat:
Bahan meliputi formulir wawancara pemantauan kualitas udara dalam ruang rumah (Form 1.), formulir observasi pemantauan kualitas udara dalam ruang rumah (Form 2.), formulir data penyakit di puskesmas (LB1), dan laporan kegiatan klinik sanitasi.
 - Alat deteksi kualitas udara;

No.	Jenis alat/detektor	Fungsi	Cara pengukuran
1.	Alat pengukur pajanan personal PM _{2,5}	Mengukur banyaknya partikel debu dengan $\varnothing 0,1\mu\text{m} - \leq 2,5\mu\text{m}$ yang terhirup (pajanan)	Selama 24 jam, menyertai individu berkegiatan di dalam dan luar rumah




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No.	Jenis alat/detektor	Fungsi	Cara pengukuran
2.	Alat pengukur udara lingkungan mikro untuk PM Ultrafine	Mengukur banyaknya debu, gas, aerosol dalam rumah/gedung /kendaraan yang berukuran $\varnothing 0,01 - 0,1 \mu\text{m}$	Selama 12 jam (waktu kegiatan puncak, memasak, jam makan, jam kumpul keluarga), radius 10m dari individu yang diukur
3.	Personal gas sampler dan fisik udara	Mengukur suhu, kelembaban, CO dan SO ₂	Selama 24 jam menyertai individu berkegiatan di dalam dan di luar rumah
4.	Alat ukur kapasitas paru	Mengukur kondisi kapasitas paru-paru responden	Sebanyak 3 kali pengukuran berNapas normal
5.	Mata perih dan berair	Mengetahui adanya pajanan gas <i>formaldehide</i>	Saat memasak

- Waktu pelaksanaan/frekuensi: minimal 1 kali dalam setahun.
- Biaya bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Alur pemantauan





MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Keterangan:

- a. Pengumpulan data primer melalui pemetaan faktor risiko wilayah sekitar permukiman/perumahan untuk mengetahui gangguan penyakit dan faktor risiko di dalam rumah maupun di luar rumah dengan menggunakan Formulir Wawancara Pemantauan Kualitas Udara dalam Ruang Rumah (Form 1) dan Formulir Observasi Pemantauan Kualitas Udara dalam Ruang Rumah (Form 2).
 - b. Pengumpulan data sekunder informasi tentang gangguan kesehatan atau kejadian penyakit pada masyarakat dengan menggunakan LB1 dan data dari kegiatan klinik sanitasi.
 - c. Metode pengumpulan data : survei cepat
 - d. Jumlah sampel : (7 kluster, setiap kluster ada 30 rumah total 210 rumah)
3. Pelaksanaan pengukuran kualitas udara dilakukan pada rumah yang mempunyai salah satu atau lebih faktor risiko dengan kondisi sebagai berikut:
- a. Bahan bakar untuk memasak menggunakan biomassa/minyak tanah;
 - b. Ventilasi < 20 % dari luas lantai;
 - c. Ada anggota keluarga dan atau orang lain yang merokok di dalam rumah; dan
 - d. Menggunakan obat nyamuk bakar/semprot/elektrik dan penyegar ruangan dalam bentuk semprot.

B. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan data

Pengolahan data hasil pemantauan, baik pemantauan kondisi kesehatan lingkungan rumah maupun gangguan kesehatan/penyakit dan pengukuran kualitas udara dalam rumah dilakukan dengan mengelompokkan data menurut orang (jenis kelamin, umur, pendidikan, status perkawinan, lama tinggal di rumah), tempat (Rukun tetangga/RT, Rukun Warga/RW, Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota), dan waktu



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

2. Analisis data

Analisis data dilakukan dalam bentuk univariat dan bivariat sebagai berikut :

- 1) Analisis *univariat* yaitu data hasil pemantauan dibuat presentase untuk melihat komposisi sesuai variabel yang diinginkan.
- 2) Analisis *bivariat* yaitu mencari hubungan dari hasil pemantauan dengan kejadian penyakit.

3. Penyajian data

Data disajikan dalam bentuk tabel, gambar/grafik dan interpretasinya

4. Diseminasi Informasi

Hasil interpretasi disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait guna proses pengambilan keputusan selanjutnya.

Hasil ini juga dapat dipergunakan untuk :

- a. Bahan penyusunan *modelling* perbaikan kualitas udara dalam ruang rumah;
- b. Menyusun *trend/kecenderungan* kualitas udara dalam ruang rumah dan dampaknya terhadap kesehatan;
- c. Menyusun proyeksi kualitas udara dalam ruang rumah; dan
- d. Bahan perencanaan jangka panjang pengelolaan kualitas udara dalam ruang rumah.

C. Rekomendasi

Menyampaikan hasil dari analisis kepada pemangku kepentingan, opsi upaya penyehatan untuk dapat ditindaklanjuti.

D. Rencana Tindak Lanjut

Kegiatan yang dapat dilakukan sebagai rencana tindak lanjut serta dilaksanakan di level, diantaranya yaitu;

No.	Bentuk Tindak Lanjut	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi	Pusat
1.	Penyuluhan	V	V		
2.	Pengukuran kualitas udara		V	V	



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No.	Bentuk Tindak Lanjut	Kecamatan	Kab/Kota	Provinsi	Pusat
3.	Perbaikan faktor risiko seperti perbaikan ventilasi	V	V		
4.	Pemberian stimulan		V	V	V
5.	Pengembangan Teknologi Tepat Guna (Pembuatan tungku bebas asap, dll)		V	V	V
6.	Pembuatan bahan penyuluhan (leaflet, poster, dll)		V	V	V
8.	Pembinaan dan pemantauan		V	V	V
9.	Pendampingan kepada masyarakat	V	V		
10.	Fasilitasi sarana/teknis		V	V	V
11.	Diseminasi informasi	V	V	V	V
12.	Perencanaan tindak lanjut	V	V	V	V
13.	Sosialisasi dan advokasi	V	V	V	V
14.	Peningkatan kapasitas petugas dan pemangku kepentingan (berjenjang)	V	V	V	V

E. Laporan

Dinas Kesehatan menyampaikan laporan tahunan kondisi kualitas udara dalam ruang rumah di wilayahnya kepada Gubernur/Bupati/Walikota guna pemantauan dan evaluasi serta ditembuskan kepada Menteri Kesehatan c.q. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

BAB V PENUTUP

Dengan ditetapkannya Persyaratan Kualitas Udara dalam Ruang Rumah diharapkan terwujudnya kualitas udara dalam ruang rumah yang memenuhi persyaratan kesehatan, untuk mendukung program rumah sehat dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari risiko penyakit. Upaya penyehatan kualitas udara dalam ruang rumah memerlukan komitmen yang tinggi dari pemerintah, pemerintah daerah, lintas program, lintas sektor, penyelenggara perumahan, dan masyarakat serta *stakeholder* terkait.

MENTERI KESEHATAN,

ttd

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FORMULIR WAWANCARA
PEMANTAUAN KUALITAS DALAM UDARA DALAM RUANG RUMAH**

I. DATA UMUM

1. Provinsi :
2. Kab/Kota :
3. Kec. :
4. Puskesmas :
5. Desa/Kel. :
- RT :
- RW :
6. Dusun :
7. Lokasi permukiman : (industri / jalan raya /
.....)
8. Nama KK :
9. Nama Responden :
10. Umur responden : Tahun bulan
11. Hubungan KK dengan Responden :
12. Jenis kelamin responden :
13. Status perkawinan responden : Menikah/tidak menikah
14. Jumlah penghuni rumah : orang
15. Pendidikan responden :
 Tidak sekolah
 Tamat SD
 Tamat SLTP
 Tamat SLTA
 Tamat Perguruan Tinggi/Akademi
16. Lama tinggal di rumah :
17. Waktu observasi :
18. Nama petugas/kader :

II. KRITERIA RESPONDEN :

1. Ibu Rumah Tangga / anggota keluarga dewasa lainnya
2. Rumah tangga yang memiliki anggota keluarga usia di bawah lima tahun

III. DATA KHUSUS

No	PERTANYAAN	JAWABAN
18	Jenis alat untuk memasak yang Saudara pakai : a. Kompor gas 1. Ya 2. Tidak b. Kompor minyak tanah (kerosin)..... 1. Ya 2. Tidak c. Kompor listrik 1. Ya 2. Tidak d. Tungku 1. Ya 2. Tidak e. Pasangan bata 1. Ya 2. Tidak f. Lain-lain sebutkan 1. Ya 2. Tidak	
19	Jenis bahan bakar / sumber yang dipakai untuk memasak : a. Listrik b. LPG c. Minyak tanah d. Kayu bakar e. Arang (kayu, batok kelapa, dll) f. Sekam g. Briket batubara (Bila jawaban selain d atau e atau f atau g, maka langsung ke pertanyaan no : 21)	
20	Apakah kayu yang Saudara gunakan sebagai bahan bakar mengeluarkan cairan kecoklatan (yang menyebabkan mata perih dan berair) setelah dibakar ? a. Ya b. Tidak	
21	Apakah Saudara menggunakan lampu minyak sebagai penerangan di rumah ? a. Ya b. Tidak	
22	Apakah di dapur Saudara ada ventilasi / lubang angin ? a. Ya b. Tidak	
23	Apakah semua jendela dibuka pada pagi hari ? a. Ya b. Tidak	
24	Apakah ada anggota keluarga yang merokok di dalam rumah ? a. Ya b. Tidak	

No	PERTANYAAN	JAWABAN
25	Apakah ada diantara tamu keluarga ini yang juga merokok saat bertemu ? a. Ya b. Tidak	
26	Apakah di rumah Saudara menggunakan obat nyamuk (bakar / semprot /elektrik) ? a. Ya b. Tidak	
27	Berapa lama Saudara memasak setiap hari ? jam
28	Apakah pada saat memasak balita anda juga berada di dapur? a. Ya b. Tidak	
KONDISI KESEHATAN		
29	Apakah hari ini atau 2 minggu terakhir ini Saudara atau anggota keluarga lainnya mengalami tanda-tanda seperti di bawah ini ? (pilihan - 26 -ias lebih dari satu) → gejala ISPA a. Pusing b. Mual c. Batuk d. Sesak Napas e. Sakit tenggorokan f. Mata perih dan berair g. Pilek	
30	Berapa orang yang mengalami tanda-tanda di atas ? orang

**FORMULIR OBSERVASI
PEMANTAUAN KUALITAS UDARA DALAM RUANG RUMAH**

No	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Tata ruang dalam rumah a. Bersekat b. Tidak bersekat	
2	Dinding/sekat pemisah dapur a. Ada b. Tidak ada	
3	Dinding rumah a. Permanen b. Semi Permanen c. Bilik/papan d. Lain-lain	
4	Luas ventilasi/lubang angin di ruang tempat berkumpulnya keluarga : a. < 20 % dari luas lantai b. ≥ 20 % dari luas lantai	
5	Luas ventilasi/lubang angin di kamar tidur : a. < 20 % dari luas lantai b. ≥ 20 % dari luas lantai	
6	Apakah dapur memiliki lubang keluarnya asap hasil kegiatan memasak? a. Ya, bentuknya (lanjut ke no. ventilasi dapur) b. Tidak	
7	Luas ventilasi/lubang angin di dapur : a. < 20 % dari luas lantai b. ≥ 20 % dari luas lantai	
8	Cerobong asap dapur : a. Ada b. Tidak ada	