

**PENGARUH PEMBERIAN MASASE KULIT TERHADAP PENURUNAN  
SENSASI NYERI SENDI PADA LANSIA DI PSTW GAU MABAJI  
KABUPATEN GOWA**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Keperawatan  
pada Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Oleh :

**HAMDAYANI**

NIM.703 001 080 31

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**2012**

## LEMBARAN PERSETUJUAN RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

Dengan ini menyatakan bersedia dan tidak keberatan menjadi responden di dalam penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “ *Pengaruh Pemberian Masase Kulit terhadap Penurunan Sensasi Nyeri Sendi pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa*”. Di mana pernyataan ini saya buat dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun dan kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, Juli 2012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN** Responden  
M A K A S S A R

( )

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu..*

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa terkirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul ” Pengaruh pemberian Masase kulit terhadap penurunan Sensasi Nyeri Sendi pada Lansia di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa” ini ditulis sebagai Tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.

Penulisan skripsi ini tidak sedikit tantangan dan hambatan yang penulis peroleh baik dari segi waktu, materil, moril, emosional dan spiritual. Namun berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak dan dengan segala keterbatasan peneliti sehingga segala hambatan akhirnya dapat terlewati. Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda Abdul Hakim S.Pd dan Ibunda Hj. Darmah N., S.Pd tercinta, serta Saudara- saudara tersayang, Mukhlis, Muhammad Syaiful, dan Nurazizah atas segala do'a, kasih sayang dan dukungan tanpa henti serta ajaran moral tanpa pernah bisa terbalaskan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada bapak Muh, Anwar Hafid S.Kep., Ns.,M.Kes selaku pembimbing I dan bapak H. Syamsul Rijal S.Kep., Ns selaku pembimbing II, serta kepada bapak Penguji I bapak Mukhtar Sa'na

S.Kep., Ns., M.Kes dan penguji II bapak Dr. H. Nurmn Said M.A atas segala bimbingan, arahan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar –besarnya penulis kepada semua pihak yang sangat manbantu sebingga skripsi ini dapat selesai sebagaimana mestinya, kepada orang-orang yang senantiasa mnedukung:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar yakni Bapak Prof. Dr. H.A. Qadir Gassing HT, M.S
2. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Univarsitas Islam Negeri Alauddin Makassar Dr. dr H. Rasjidin Abdullah, MPH, MH.Kes.
3. Ketua Program Studi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam negeri Alauddin Makassar, ibu Nur Hidayah S.Kep.,Ns., M.Kes. Atas segla keramahan, perhatian dan bantuan yang diberikan.
4. Bapak/ ibu Dosen pada yang ada di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Kepala panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa serta para staf dan pegawai setempat. Serta Nenek-nenek dan Kakek-kakek di Panti yang telah menjadi responden dalam penelitian ini.
6. Kepada orang tua keduaku, Ibu Hj. Bunga Bantung dan Muhammad Yusuf, serta sepupuku Busra, Anthy, dan Hasni.
7. Sahabat-sahabatku di SF, Ayu, Fadliah, Wiwi, Susi, Marwah, Diba, Dian, Inenk, Rahman, dan Wawan.
8. Teman-teman KKN angkatan 47 kecamatan Bulukumpa Teguh, Awal, Ikram, Mumu, Syarif, Acci, Bhona, Ika, dan Titi. Dan semua pihak yang pernah menjadi bagian dri KKN, Pak Lurah, Ibu Lurah, Aji Ahmad, dll.Yang selalu memberikan motivasi yang tak ternilai harganya.

9. Teman-teman Keperawatan angkatan 08, khususnya buat Yunita, K'Fani. Serta pihak-pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan yang ada dalam skripsi ini, olehnya itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan agar lebih baik pada penelitian selanjutnya,, amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Makassar, Agustus 2012

Penulis



# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Lanjut Usia.....	7
B. Definisi Nyeri.....	21
C. Osteoarthritis pada Lanjut Usia.....	34
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Kerangka Konsep Penelitian.....	52
B. Kerangka Kerja.....	55
C. Definisi Operasional dan Kriteria Obyektif.....	56
D. Hipotesis Penelitian.....	58
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	59

B. Populasi dan Sampel.....	60
C. Teknik Pengambilan Sampel.....	60
D. Pengumpulan Data.....	62
E. Pengolahan Data dan Analisa Data.....	63
F. Jadwal Penelitian .....	64
G. Etika Penelitian.....	66

**BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	67
B. Pembahasan .....	74

**BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	86

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Nyeri Akut dan Kronik

Tabel 2.2 Skala Tingkat Nyeri

Tabel 4.1 Desain Penelitian

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Menderita Nyeri Sendi

Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lokasi Nyeri

Tabel 5.6 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Karakter Nyeri

Tabel 5.7 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Waktu Muncul Nyeri

Tabel 5.8 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Observasi Tingkatan Nyeri  
Sebelum Masase Kulit

Tabel 5.9 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Observasi Tingkatan Nyeri  
Setelah Masase Kulit

Tabel 5.10 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pemberian Masase Kulit  
Terhadap Penurunan Sensasi Nyeri Sendi.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Teori Pengendalian Gerbang atau Gate Control Theory

Gambar 2.2 Skala Verbal Analog

Gambar 2.3 Respon inflamasi pada sendi

Gambar 2.4 Penyempitan Rongga Sendi

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

Gambar 3.2 Kerangka Kerja Penelitian



## ABSTRAK

**Nama : Hamdayani**

**NIM : 70300108031**

**Judul : Pengaruh Pemberian Masase Kulit terhadap Penurunan Sensasi Nyeri terhadap Penurunan Sensasi Nyeri Sendi pada Lansia di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa.**

---

Manusia dalam hidupnya akan mengalami beberapa masa yang secara garis besar terbagi atas empat masa yaitu masa kecil atau kanak-kanak, lalu masa remaja, masa dewasa, dan yang terakhir masa tua. Setiap orang yang hidup di dunia ini akan mengalami keempat masa tersebut.

Menjadi tua merupakan proses alamiah, yang berarti seseorang telah melalui tiga tahap kehidupannya, yaitu anak, dewasa dan tua. Tiga tahap ini berbeda, baik secara biologis maupun psikologis. Memasuki usia tua berarti mengalami kemunduran, misalnya kemunduran fisik yang ditandai dengan kulit yang mengendur, rambut memutih, gigi mulai ompong, pendengaran kurang jelas, penglihatan semakin memburuk, gerakan lambat, dan figure tubuh tidak proporsional. Sejalan dengan bertambahnya usia pada lansia, berbagai penyakit menghampiri, salah satunya adalah penyakit reumatik. Penyakit sendi ini yang paling banyak di jumpai terutama pada orang-orang diatas 40 tahun di seluruh penjuru dunia adalah osteoarthritis.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9 Juli sampai 22 Juli 2012, di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 100 orang, pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Non Probability yaitu purposive sampling yang mana jumlah sampel yang menjadi subyek penelitian ini adalah 12 sampel masing-masing 6 untuk kelompok kontrol dan 6 untuk kelompok kasus. Analisa data dilakukan dengan menggunakan uji statistik Non parametrik dengan menggunakan Uji U Mann-Whitney.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh pemberian Masase Kulit terhadap penurunan sensasi nyeri sendi pada lansia.

Kesimpulan dalam penelitian ini pengaruh pemberiana masase kulit terhadap penurunan sensasi nyeri sendi dimana nilai signifikan  $p=0,014 < \text{dari } 0,05$ .

Berasarkn hasil penelitian ini, kita mempunyai pengetahuan untuk mengatasi nyeri sendi yang dialami lansia di sekitar kita, dengan memberikan Masase Kulit.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang Masalah

Manusia dalam hidupnya akan mengalami beberapa masa yang secara garis besar terbagi atas empat masa yaitu masa kecil atau kanak-kanak, lalu masa remaja, masa dewasa, dan yang terakhir masa tua. Setiap orang yang hidup di dunia ini akan mengalami keempat masa tersebut. ( Bustan, 2007)

Menua atau menjadi tua adalah suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Proses menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan proses kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiyah, yang berarti seseorang telah melalui tiga tahap kehidupannya, yaitu anak, dewasa dan tua. Tiga tahap ini berbeda, baik secara biologis maupun psikologis. Memasuki usia tua berarti mengalami kemunduran, misalnya kemunduran fisik yang ditandai dengan kulit yang mengendur, rambut memutih, gigi mulai ompong, pendengaran kurang jelas, penglihatan semakin memburuk, gerakan lambat, dan figure tubuh tidak proporsional. ( Nugroho, 2008)

Berdasarkan sensus penduduk tahun 1971, jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas sebesar 5,3 juta (4,5 %) dari jumlah penduduk. Selanjutnya pada tahun 1980, jumlah ini meningkat pada  $\pm$  8 juta (5,5 %) dari jumlah penduduk dan pada tahun 1990, jumlah ini meningkat menjadi  $\pm$ 11,3 juta ( 6,4%). Pada tahun 2000, diperkirakan meningkat sekitar 15,3 juta ( 7,4 %) dari jumlah penduduk dan pada tahun 2005, jumlah ini diperkirakan meningkat menjadi  $\pm$ 18,3 juta (8,5 %).

Pada tahun 2005-2010 jumlah lanjut usia akan sama dengan jumlah anak balita yaitu sekitar 19,3 juta jiwa ( $\pm 9\%$ ) dari jumlah penduduk. Bahkan pada tahun 2020-2025, Indonesia akan menduduki peringkat Negara dengan struktur dan jumlah penduduk lanjut usia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat, dengan umur harapan hidup di atas 70 tahun. ( Nugroho, 2008). Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian terakhir dari Zeng QY et al pada 2008 lalu, prevalensi nyeri sendi mencapai 23,6 % hingga 31,3 %.

Menurut BPS provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, jumlah lansia mencapai 448805 dari 7.771.671 penduduk Sulawesi Selatan. Dari sekian lansia yang ada di Sulawesi Selatan, lansia yang mengalami nyeri sendi sekitar  $\pm 20\%$  (Dinas kesehatan Provinsi Sul-Sel, 2009). Sedangkan jumlah penduduk yang tergolong lansia di kota Makassar mencapai 40.508 dari 1.248.436 penduduk kota Makassar dan jumlah penduduk yang tergolong lansia di kabupaten Gowa mencapai 27.856 dari 702.433 penduduk kabupaten Gowa ( Dinas Kesehatan Provinsi Sul-Sel, profil Kesehatan Provinsi Sul-Sel, 2007).

Adapun data yang diperoleh dari Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa tahun 2010 bahwa sebagian besar lansia yang berjumlah 100 orang dipanti Tresnha Werdha menderita nyeri sendi yaitu sekitar 12 orang ( 12 %).

Sejalan dengan bertambahnya usia pada lansia, berbagai penyakit menghampiri, salah satunya adalah penyakit reumatik. Penyakit sendi ini yang paling banyak di jumpai terutama pada orang-orang diatas 40 tahun di seluruh penjuru dunia adalah osteoarthritis. Hal ini sama dengan kutipan dari buku ajar

geriatri, penyakit yang paling tinggi presentasinya adalah osteoarthritis, yaitu mencapai 49% (Kuntaraf, 1992). Osteoarthritis adalah penyakit pada sendi-sendi penahan berat tubuh yang bersifat progresif, noninflamasi, nonsistemik, dan recurrent. Dalam suatu survey radiografi pada wanita di bawah usia 40 tahun hanya 2% yang mengalami osteoarthritis, Pada usia 45-60 tahun mencapai 30% sementara pada usia di atas 61 tahun lebih dari 65% (Noer, 1996).

Adanya nyeri sendi membuat penderitanya seringkali takut untuk bergerak sehingga mengganggu aktivitas sehari-harinya dan dapat menurunkan produktifitasnya.

Diperkirakan penderita reumatik di dunia telah mencapai 335 juta jiwa. Angka ini akan terus meningkat dan pada tahun 2025 diperkirakan lebih dari 25% akan mengalami kondisi kelumpuhan akibat kerusakan tulang dan penyakit sendi. Pada suatu survey radiografi pada wanita dibawah 40 tahun hanya 2% menderita osteoarthritis, akan tetapi pada usia 45-60 tahun angka kejadiannya 30% sementara orang-orang di atas 60 tahun angka kejadiannya lebih dari 65%. (Suyono, 2001). Stimulasi kutaneus, distraksi, relaksasi, imajinasi terbimbing dan hypnosis adalah contoh intervensi nonfarmakologis yang sering digunakan dalam keperawatan untuk mengelola nyeri. Pada osteoarthritis, umumnya pengelolaan nyeri dilakukan dengan stimulasi kutaneus, terapi panas/dingin, latihan/ aktifitas fisik dan distraksi (Reeves, 1999; Koopman, 1997). Apabila individu mempersepsikan sentuhan sebagai stimulus untuk relaks. Kemudian akan muncul respon relaksasi. Relaksasi sangat penting untuk meningkatkan kenyamanan dan

membebaskan diri dari ketakutan serta stress akibat penyakit yang dialami dan nyeri yang tak berkesudahan (Potter & Perry, 1997). Salah satu teknik memberikan masase adalah tindakan masase punggung dengan usapan perlahan (Slow- Stroke Back Massage). Vasodilatasi pembuluh darah akan meningkatkan peredaran darah pada area yang diusap sehingga aktifitas sel meningkat dan akan mengurangi rasa sakit serta menunjang proses penyembuhan luka (Kusyati E, 2006; Stevens, 1999). Sensasi hangat juga akan meningkatkan rasa nyaman (Reeves, 1999). Nilai terapeutik yang lain dari masase punggung termasuk mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan relaksasi fisik dan psikologis (Kusyati E, 2006) beberapa penelitian juga telah mengidentifikasi manfaat dari Slow-stroke massage ini. Salah satunya adalah penurunan secara bermakna pada intensitas nyeri dan kecemasan serta perubahan positif pada denyut jantung dan tekanan darah, yang mengindikasikan relksasi pada pasien lansia dengan stroke (Mok, E et al 2004).

Seperti halnya juga masyarakat usia produktif, lansia juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif meliputi bio-psiko-sosial dan spiritual. Anjuran untuk selalu memperhatikan, menghormati, dan memuliakan lansia.

Dan sebagai perawat yang professional perlu mengetahui asuhan keperawatan yang dapat diberikan pada lanjut usia dengan penyakit reumatik untuk mencegah cedera lebih lanjut, salah satunya adalah masase kulit untuk mengurangi sensasi nyeri. Oleh karena itu perlu pengkajian lanjut tentang pemberian masase kulit pada pasien.

Berdasarkan data dan uraian di atas tampak bahwa keluhan pasien pada Reumatik merupakan masalah keperawatan, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh pemberian masase kulit terhadap penurunan sensasi nyeri sendi pada pasien nyeri sendi di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: “ apakah ada pengaruh pemberian masase kulit terhadap penurunan sensasi nyeri sendi pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa?”

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian masase kulit ( stimulasi kutaneus: slow-stroke back massage) terhadap penurunan sensasi nyeri sendi pada lansia dipanti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengidentifikasi intensitas nyeri osteoarthritis sebelum pemberian masase kulit ( stimulasi kutaneus: slow-stroke back massage) pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.
- b. Untuk mengidentifikasi intensitas nyeri osteoarthritis setelah pemberian masase kulit ( stimulasi kutaneus: slow-stroke back massage) pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.

- c. Untuk mengetahui pengaruh pemberian masase masase kulit (stimulasi kutaneus: slow-stroke back massage) pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi profesi perawat

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perawat tentang pengaruh pemberian masase kulit terhadap penurunan sensasi nyeri sendi pada lansia.

2. Bagi instansi Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Gowa

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi yang dapat membantu tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada lansia khususnya di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa,

3. Bagi pendidikan

Sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya keterampilan dalam memberikan masase kulit terhadap penurunan sensasi nyeri sendi pada Lansia.

4. Bagi peneliti

Sebagai pengalaman yang sangat berharga dan dapat menambah wawasan peneliti mengenai pemberian masase kulit terhadap penurunan sensasi nyeri pada lansia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan tentang Lanjut Usia**

##### **1. Defenisi Lanjut Usia**

Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia pada BAB I pasal 1 ayat 2 “lanjut usia (*old age*) adalah seseorang yang mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.”

Menurut Bustan, M.N (2007) Lanjut Usia atau manusia usia lanjut (manula), adalah kelompok berumur tua. Golongan penduduk yang mendapat perhatian atau pengelompokkan tersendiri ini adalah populasi berumur 60 tahun atau lebih.

Menurut Alex Comfort yang dikutip oleh Afdol (1995), lansia adalah suatu keadaan yang ditandai oleh kegagalan dari makhluk hidup untuk mempertahankan keseimbangan (homeostasis) terhadap kondisi stress fisiologis. Kegagalan ini berhubungan dengan penurunan daya kemampuan untuk hidup serta peningkatan kepekaan secara individual.

Menurut Darmojo (2004) Menjadi tua merupakan proses yang alamiah yang berarti seseorang telah melalui tiga tahap kehidupannya, yaitu anak, dewasa, dan tua. Menua bukanlah suatu penyakit tetapi merupakan proses yang berangsur-angsur mengakibatkan perubahan yang kumulatif, merupakan proses menurunnya daya tahan tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam dan luar tubuh yang berakhir dengan kematian.

## 2. Batas-batas lanjut usia

Umur yang dijadikan patokan sebagai lanjut usia berbeda-beda, umumnya berkisar antara 60-65 tahun. Beberapa pendapat para ahli tentang batasan umur yaitu

a. Menurut organisasi kesehatan dunia, WHO, ada empat tahap yakni:

- 1) Usia Pertengahan (*middle age*) ialah kelompok usia 45 sampai 59 tahun.
- 2) Lanjut Usia (*elderly*) ialah antara 60 dan 74 tahun.
- 3) Lanjut Usia Tua (*old*) ialah antara 75 dan 90 tahun
- 4) Usia Sangat Tua (*very old*) ialah di atas 90 tahun.

b. Menurut Dra. Ny Jos Masdani lanjut usia merupakan kelanjutan dari usia dewasa, kedewasaan dapat dibagi menjadi:

- 1) Fase inventus usia antara 25 – 40 tahun
- 2) Fase fertilitas usia antara 40 – 50 tahun
- 3) Fase prasenium usia antara 55 – 65 tahun
- 4) Fase senium usia antara 65 tahun hingga tutup usia.

c. Menurut Prof.DR.Ny Sumiati Ahmad Muhammad (alm), Guru Besar Universitas Gajah Mada Fakultas Kedokteran, periodisasi biologis perkembangan manusia dibagi sebagai berikut:

- 1) Usia 0-1 tahun (masa bayi)
- 2) Usia 1-6 tahun (masa prasekolah)
- 3) Usia 6-10 tahun (masa sekolah)

- 4) Usia 10-20 tahun (masa pubertas)
  - 5) Usia 40-65 tahun (masa setengah umur, prasenium)
  - 6) Usia 65 tahun keatas (masa lanjut usia, senium)
- d. Menurut prof. DR. Koesoemanto Setyonegoro, SpKJ, lanjut usia dikelompokkan sebagai berikut:
- 1) Usia dewasa muda (elderly adulthood) (usia 18/20-25 tahun)
  - 2) Usia dewasa penuh (middle years) atau maturitas (usia 25-60/65 tahun)
  - 3) Lanjut usia (geriatric age)(usia lebih dari 65/70 tahun), terbagi:
    - a) Usia 70-75 tahun (young old)
    - b) Usia 70-80 tahun (old)
  - 4) Usia lebih dari 80 tahun (very old).
- e. Menurut Bee (1996), tahapan masa dewasa adalah sebagai berikut:
- 1) Usia 18-24 tahun (masa dewasa muda)
  - 2) Usia 25-40 tahun (masa dewasa awal)
  - 3) Usia 40-65 tahun (masa dewasa tengah)
  - 4) Usia 65-75 tahun (masa dewasa lanjut)
  - 5) Usia >75 tahun (masa dewasa sangat lanjut)
- f. Referensi lain mengklasifikasikan lansia sebagai berikut : (Depkes RI, 2003) :
- 1) Pra lansia (prasenilis)  
Seseorang yang berusia antara 45-59 tahun

2) Lansia

Seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih

3) Lansia resiko tinggi

Berusia 70 tahun atau lebih atau usia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan

4) Lansia potensial

Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa

5) Lansia tidak potensial

Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah, sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

**3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penuaan**

Penuaan dapat terjadi secara fisiologis dan patologi. Bila seseorang mengalami penuaan fisiologis (*fisiological aging*), diharapkan mereka dapat tua dalam keadaan sehat. Penuaan ini sesuai dengan kronologis usia dipengaruhi oleh faktor endogen. Perubahan ini dimulai dari sel jaringan organ sistem pada tubuh. Sedangkan faktor lain yang juga berpengaruh pada proses penuaan adalah faktor eksogen seperti lingkungan, sosial budaya, dan gaya hidup. Mungkin pula terjadi perubahan degeneratif yang timbul karena stress yang dialami individu. (Pudjiastuti& Utomo, 2003).

Yang termasuk faktor lingkungan antara lain pencemaran lingkungan akibat kendaraan bermotor, pabrik, bahan kimia, bising, kondisi lingkungan

yang tidak bersih, kebiasaan menggunakan obat dan jamu tanpa kontrol, radiasi sinar matahari, makanan berbahan kimia, infeksi virus, bakteri dan mikroorganisme lain. Faktor endogen meliputi genetik, organik dan imunitas. Faktor organik yang dapat ditemui adalah penurunan hormone pertumbuhan, penurunan hormone testosterone, peningkatan prolaktin, penurunan melatonin, perubahan foliceal stimulating hormone dan luteinizing hormone (Sumampouw Albert, 2003).

Menurut Wahyudi Nugroho (2008), faktor yang mempengaruhi penuaan adalah hereditas (keturunan), nutrisi/makanan, status kesehatannya, pengalaman hidup, lingkungan dan stress.

#### **4. Perubahan yang terjadi pada lanjut usia**

Perubahan yang berhubungan dengan proses menua normal sebagian besar merupakan akibat kehilangan atau penurunan secara bertahap. Kehilangan tersebut sebenarnya sudah dimulai sejak awal usia muda, tetapi pada sebagian system organ, kehilangan tersebut baru bermakna secara fungsional setelah terjadi kehilangan yang besar. Pada beberapa sistem organ, sekelompok individu tampak mengalami penurunan fungsi secara bertahap sepanjang waktu (misalnya organ ginjal), sedangkan fungsi organ-organ lain tetap konstan. (Suyono S, 2001)

##### **a. Perubahan fisik dalam hal ini system muskuloskeletal**

Perubahan normal muskuloskeletal terkait usia pada lansia termasuk penurunan tinggi badan, redistribusi massa otot dan lemak subkutan,

peningkatan porositas tulang, atrofi otot, pergerakan yang lambat, pengurangan kekuatan dan kekakuan sendi. Tulang kehilangan densitas (cairan) dan semakin rapuh. Perubahan pada tulang, otot, dan sendi mengakibatkan terjadinya perubahan penampilan, kelemahan, dan lambatnya pergerakan yang menyertai penuaan. Komposisi otot berubah sepanjang waktu (myofibril digantikan oleh lemak, kolagen dan jaringan parut). Aliran darah ke otot berkurang sejalan dengan proses menua (Nogroho, W. 2008).

Kekuatan muscular mulai merosot sekitar usia 40 tahun, dengan suatu kemunduran yang dipercepat setelah usia 60 tahun. Perlambatan pergerakan yang kurang aktif dihubungkan dengan perpanjangan waktu kontraksi otot, periode laten, dan periode relaksasi dari unit motor dalam jaringan otot. Sendi-sendi seperti pinggul, lutut, siku, pergelangan tangan, leher, dan vertebra menjadi sedikit fleksi pada usia lanjut. Peningkatan fleksi disebabkan oleh perubahan dalam kolumna vertebralis, ankilosis (kekakuan) ligament dan sendi, penyusutan dan sklerosis tendon dan otot, dan perubahan degenerative system ekstrapiramidal. Secara umum terdapat kemunduran kartilago sendi sebagian besar terjadi pada sendi-sendi yang menahan berat, dan pembentukan tulang dipermukaan sendi. Komponen-komponen kapsul pecah dan kolagen yang terdapat pada jaringan penyambung meningkat secara progresif yang jika tidak di pakai lagi, mungkin menyebabkan inflamasi, nyeri, penurunan mobilitas sendi,

dan deformitas. Seiring dengan bertambahnya usia yang sejalan dengan penurunan fungsi dari system tubuh menyebabkan banyaknya penyakit yang sering diderita oleh lansia (Stanley, 2006).

b. Perubahan Mental

Masalah kesehatan mental pada lansia dapat berasal dari 4 aspek yaitu fisik, psikologik, sosial dan ekonomi. Masalah tersebut dapat berupa emosi labil, mudah tersinggung, gampang merasa dilecehkan, kecewa, tidak bahagia, perasaan kehilangan, dan tidak berguna. Lansia dengan problem tersebut menjadi rentan mengalami gangguan psikiatrik seperti depresi, *ansietas* (kecemasan), psikosis (kegilaan) atau kecanduan obat. Pada umumnya masalah kesehatan mental lansia adalah masalah penyesuaian. Penyesuaian tersebut karena adanya perubahan dari keadaan sebelumnya (fisik masih kuat, bekerja dan berpenghasilan) menjadi kemunduran (akhmadi,2009).

Perubahan kepribadian yang drastis jarang terjadi, lebih sering berupa ungkapan yang tulus dari perasaan seseorang, kekakuan mungkin karena faktor lain seperti penyakit. Berkurangnya penampilan, persepsi dan ketrampilan psikomotor, perubahan pada daya membayangkan karena tekanan dari faktor waktu (Nogroho, W. 2008).

c. Perubahan Psikososial

Perubahan sosialisasi karena produktivitas menurun, berkurangnya kesibukan sosial, kehilangan finansial, status, teman atau relasi, pekerjaan

atau kegiatan. Merasakan atau sadar akan kematian, perubahan dalam cara hidup, perubahan ekonomi akibat pemberhentian dari jabatan, meningkatnya biaya hidup pada penghasilan yang sulit, bertambahnya biaya pengobatan. menimbulkan masalah yang besar bagi lansia. (Sumampouw Albert, 2003)

##### **5. Penyakit yang umum terjadi pada lanjut usia**

Menurut Stieglitz (1945) yang dikutip dalam Buku Keperawatan Gerontik mengemukakan adanya empat penyakit yang sangat erat hubungannya dengan proses menua, yakni:

- a. Gangguan sirkulasi darah seperti hipertensi, kelainan pembuluh darah, gangguan pembuluh darah di otak dan ginjal
- b. Gangguan metabolisme hormonal, seperti diabetes mellitus, klimakterium, dan ketidakseimbangan tiroid.
- c. Gangguan pada persendian, seperti osteoarthritis, gout arthritis.
- d. Berbagai penyakit neoplasma

Menurut The National Old People's Welfare Council di Inggris (2000) dikutip dalam buku Keperawatan Gerontik (2008) mengemukakan bahwa penyakit atau gangguan umum pada lanjut usia ada 12 macam yakni: Depresi mental, gangguan pendengaran, bronkitis kronis, gangguan pada tungkai/sikap berjalan, gangguan pada koxa/sendai panggul, anemia, demensia, gangguan penglihatan, ansietas/kecemasan, dekomposisi kordis, diabetes melitus, osteomalasia, dan hipotiroidisme, gangguan pada defekasi.

Sedangkan di Indonesia penyakit yang sering dijumpai pada lansia meliputi; penyakit sistem persarafan, penyakit kardiovaskuler dan pembuluh darah, penyakit pencernaan makanan, penyakit urogenital, penyakit gangguan metabolik, penyakit persendian dan tulang, dan penyakit-penyakit akibat keganasan (Nogroho, W. 2008).

## 6. Pandangan Agama tentang Lansia

Seperti kita ketahui bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, agama yang meliputi seluruh lini kehidupan dan mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk diantaranya ialah menghargai **masyarakat** pada usia produktif dan mereka yang sedang **lansia**, juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif yang meliputi diantaranya bio-psiko-sosial dan spiritual. Ini adalah tugas yang harus dijalankan oleh perawat. Lansia adalah orang tua yang harus dirawat, dihormati, dan dimuliakan. Maka hal ini sangat dianjurkan bahkan diwajibkan dalam syariat Islam, Sebagaimana FirmanNya.

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ

الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا

كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا

رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

*Terjemahan:*

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia (23)

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua Telah mendidik Aku waktu kecil".(24)

Ayat 23 diatas menyatakan Dan TuhanMu yang selalu membimbing dan berbuat baik kepadamu-telah menetapkan dan memerintahkan supaya kamu, yakni engkau, Nabi Muhammad dan seluruh manusia, jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tuamu, yakni Ibu-Bapak kamu, dengan kebaktian sempurna. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya mencapai ketuaan, yakni berumur lanjut atau dalam keadaan lemah sehingga mereka terpaksa disisimu, yakni dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan 'ah' atau suara dan kata yang mengandung makna kemarahan/pelecehan/kejemuan. Walau sebanyak dan sebesar apapun pengabdian dan pemeliharaanmu kepadanya dan janganlah engkau

membentak keduanya menyangkut apapun yang mereka lakukan, apalagi melakukan yang lebih buruk daripada membentak dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yakni perkataan yang baik, lembut, dan penuh kebaikan serta penghormatan. (Shihab, M. Quraish, 2002)

Keyakinan akan keesaan Allah serta kewajiban mengikhlaskan diri kepada-Nya adalah dasar yang padanya bertitik tolak segala kegiatan. Nah, setelah itu kewajiban bahkan aktivitas apapun harus dikaitkan denganNya serta didorong olehNya. Kewajiban pertama dan utama setelah kewajiban mengesakan Allah SWT dan beribadah kepada Nya adalah berbakti kepada kedua orang tua.

Ayat 24 masih lanjutan tuntunan bakti kepada ibu-bapak. Tuntunan kali ini melebihi dalam peringkatnya dengan tuntutan yang lalu. Ayat ini memerintahkan anak bahwa dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua didorong oleh karena rahmat kasih sayang kepada keduanya, bukan karena takut atau malu dicela orang bila tidak menghormatinya dan ucapkanlah yakni berdoalah secara tulus, ”wahai Tuhanku, yang memelihara dan mendidik aku antara lain dengan menanamkan kasih kepada ibu bapakku, kasihilah mereka keduanya disebabkan karena atau sebagaimana mereka berdua telah melimpahkan kasih kepadaku antara lain dengan mendidikku waktu kecil. (Shihab, M. Quraish, 2002)

Redaksi kata (Al-Janah) pada mulanya berarti sayap dan terdapat tambahan kata (adz-dzull) yang berarti kerendahan. Dalam konteks keadaan burung, binatang ini mengembangkan sayapnya pada saat ia takut untuk menunjukkan ketundukannya kepada ancaman. Nah, disini sang anak diminta untuk merendahkan diri kepada orang tuanya terdorong oleh penghormatan dan rasa takut melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kedudukan ibu bapaknya.

Ayat-ayat diatas memberi tuntutan kepada anak dengan menyebut tahap demi tahap secara berjenjang keatas. Ia dimulai, dengan janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" yakni jangan menampakkan kejemuan dan kejengkelan serta ketidaksopanan kepadanya. Lalu disusul dengan tuntutan mengucapkan kata-kata yang mulia. Ini lebih tinggi tingkatannya dari pada tuntutan pertama karena ia mengandung pesan menampakkan penghormatan dan pengagungan melalui ucapan-ucapan. Selanjutnya, meningkat lagi dengan perintah untuk berperilaku yang menggambarkan kasih sayang sekaligus kerendahan di hadapan kedua orang tua itu. Perilaku yang lahir dari rasa kasih sayang, yang menjadikan mata sang anak tidak lepas dari orang tuanya, yakni selalu memperhatikan dan memenuhi keinginan mereka berdua. Akhirnya sang anak dituntun untuk mendoakan orang tua sambil mengingat jasa-jasa mereka lebih-lebih waktu sang anak masih kecil dan tak berdaya. Kini kalau orang tuapun telah mencapai usia lanjut dan tidak berdaya, sang anak pun suatu ketika pernah

mengalami ketidakberdayaan yang lebih besar dari pada yang sedang dialami orang tuanya. (Shihab, M. Quraish, 2002)

Dari ayat diatas mengingat bahwa kita sebagai seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Sebagaimana pada saat kita masih bayi hingga dewasa orang tua dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan, kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya. Merawat buah hatinya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan hingga kita beranjak dewasa kasih sayangnya tiada batas apapun. Dan merupakan suatu kewajiban bagi seorang anak untuk merawat dan menghormati orang tuanya tatkala mereka menginjak usia lanjut.

Menghormati orang tua bukan hanya budaya, namun bagian dari akhlak mulia dan terpuji yang diseru oleh Islam. Hal ini dilakukan dengan cara memuliakannya dan memperhatikan hak-haknya. Terlebih, bila umurnya yang sudah tua, juga lemah fisik, mental, dan status sosialnya. Terkhusus kepada anak dan keluarga, memelihara orang tua merupakan kewajiban. Selama anak dan keluarga masih hidup, hendaknya merekalah yang memelihara orang tua, setidak-tidaknya sebagai perwujudan bakti kepada orang tua, bahkan Nabi SAW juga mengingatkan dalam sabdanya :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال ( أمك ) . قال ثم من ؟ قال ( ثم أمك ) . قال ثم من ؟ قال ( ثم أمك ) . قال ثم من ؟ قال ( ثم أبوك ) (رواه البخاري)

Artinya, “Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, lalu bertanya, “Ya Rasulullah! Siapakah manusia yang paling berhak aku pergauli dengan baik? “Rasulullah menjawab, “Ibumu”. Dia

*bertanya lagi, “Kemudian siapa?” Rasulullah menjawab, “Ibumu” Dia bertanya lagi, “Kemudian siapa?” Rasulullah menjawab, “Ibumu”. Dia bertanya lagi, “Kemudian siapa?” Rasulullah menjawab, “Bapakmu”. (HR Bukhori)<sup>1</sup>*

Salah satu hadist yang penulis kutip diatas menganjurkan untuk menghormati orang tua dan orang lanjut usia, baik laki – laki maupun perempuan, tapi dalam konteks ini pula lebih diutamakan perempuan, karena perempuan sangatlah berperan besar dalam lini kehidupan dan menjadi media sentra terhadap anak, ketika kita kembali merujuk pula pada ayat 24 diatas.

Begitu pula dalam sabda Nabi SAW yang riwayatkan oleh Abdullah bin umar:

2842 - سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فاستأذنه في الجهاد فقال ( أحي والدك ) . قال نعم قال ( ففيهما فجاهد )

Artinya :saya mendengar Abdullah bin Umar Ra berkata, “Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam meminta ijin kepadanya untuk ikut berjihad. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertanya kepadanya, “Apakah kedua orang tuamu masih hidup?” Dia menjawab, “Ya”. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepadanya, “Berjihadlah (dengan berbakti) pada keduanya.”<sup>2</sup>

Hadist diatas mengajarkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, karena berbakti kepada orang tua bagian dari jihad. Maka beberapa penjelasan penulis diatas, menyimpulkan bahwa agama islam sangatlah memperhatikan perawatan terhadap orang tua kita, usia lanjut atau kondisi lemah.

---

<sup>1</sup>. Muhammad Bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Bierut dar bin Kasir, jilid 5, hal 2227.

<sup>2</sup>. Muhammad bin Ismail Abdullah Al-Bukhari, *Jamiul Shahih*, Bierut Dar bin Kasir, bab Izin berjihad, jilid 3, hal 1094.

Sedangkan yang sama kondisinya dengan usia lanjut ialah kondisi-kondisi sakit yang menjadikan manusia dalam keadaan lemah dan memerlukan perawatan orang lain, serta tidak mampu bertindak sendiri untuk menyelenggarakan keperluannya.

## **B. Defenisi Nyeri**

### **1. Defenisi nyeri**

Nyeri merupakan kondisi berupa perasaan tidak menyenangkan bersifat sangat subyektif karena perasaan nyeri berbeda pada setiap orang dalam hal skala atau tingkatannya, dan hanya orang tersebutlah yang dapat menjelaskan atau mengevaluasi rasa nyeri yang dialaminya. (Aziz Alimul, 2006).

Menurut Mc. Caffery (1979) dikutip dalam buku Konsep & Penatalaksanaan Nyeri (Anas Tamsuri, 2006), Nyeri didefenisikan sebagai suatu keadaan yang mempengaruhi seseorang, dan eksistensinya diketahui bila seseorang pernah mengalaminya.

### **2. Klasifikasi nyeri**

Klasifikasi nyeri secara umum dibagi menjadi dua, yakni nyeri akut dan kronis. Nyeri akut merupakan nyeri yang timbul secara mendadak dan cepat menghilang, yang tidak melebihi 6 bulan dan ditandai adanya peningkatan tegangan otot. Nyeri kronis merupakan nyeri yang timbul secara perlahan lahan, biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup lama, yaitu lebih dari 6 bulan. Yang termasuk dalam kategori kronis adalah nyeri terminal, syndrome nyeri kronis, dan nyeri psikosomatis. Ditinjau dari sifat

terjadinya, nyeri dapat dibagi kedalam beberapa kategori, diantaranya nyeri tersusuk dan nyeri terbakar (Aziz Alimul, 2006).


Tabel 2.1 Perbedaan nyeri akut dan kronis

Karakteristik	Nyeri Akut	Nyeri Kronis
Pengalaman	Satu Kejadian	Satu situasi, status eksistensi
Sumber	Sebab eksternal atau penyakit dari dalam	Tidak diketahui atau pengobatan yang terlalu lama
Serangan	Mendadak	Bisa mendadak, berkembang dan terselubung.
Waktu	Sampai 6 bulan	Lebih dari 6 bulan sampai bertahun-tahun
Pernyataan Nyeri	Daerah nyeri tidak diketahui dengan pasti	Daerah nyeri sulit dibedakan intensitasnya, sehingga sulit dievaluasi (perubahan perasaan)
Gejala-gejala klinis	Pola respon yang khas dengan gejala yang lebih jelas	Pola respon yang bervariasi dengan sedikit gejala (adaptasi)
Pola	Terbatas	Berlangsung ters, dapat bervariasi
Perjalanan	Biasanya berkurang setelah beberapa saat	Penderitaan meningkat setelah beberapa saat.

Terdapat jenis nyeri yang spesifik di antaranya nyeri somatic, nyeri visceral, nyeri menjalar (referent pain), nyeri psikogenik, nyeri phantom dari ekstermitas, nyeri neurologis, dan lain-lain.

Nyeri menjalar adalah nyeri yang terasa pada bagian tubuh yang lain, umumnya terjadi akibat kerusakan pada cedera organ viseral. Nyeri psikogenik adalah nyeri yang tidak diketahui secara fisik yang timbul akibat psikologis. Nyeri phantom adalah nyeri yang disebabkan karena salah satu ekstermitas diamputasi. Nyeri neurologis adalah bentuk nyeri yang tajam karena adanya spasme di sepanjang atau di beberapa jalur saraf. (Aziz alimul, 2006).

### 3. Mekanisme penurunan nyeri ( Teori Pengendalian Gerbang atau Gate Control Theory)



Gambar 2.1 Teori Pengendalian Gerbang atau Gate Control Theory

Sumber : Potter & Perry, 1997

Terdapat berbagai teori yang berusaha menggambarkan bagaimana nosiseptor dapat menghasilkan rangsang nyeri. Sampai saat ini dikenal berbagai teori yang mencoba menjelaskan bagaimana nyeri dapat timbul. Salah satunya adalah Teori Gerbang Kendali Nyeri (Gate Control Theory) (Melzack & Wall 1982 dalam Potter & Perry, 1997) menyatakan terdapat semacam pintu gerbang yang dapat memfasilitasi atau memperlambat transmisi sinyal nyeri. Secara umum dapat dijelaskan bahwa didalam tubuh manusia terdapat dua macam transmisi impuls nyeri yang berfungsi untuk menghantarkan sensasi nyeri dan sensasi yang lain seperti rasa dingin, hangat, sentuhan dan sebagainya (Anas Tamsuri, 2006).

Pada penerimaan dan transmisi nyeri Terdapat tiga jenis neuron (sel-sel saraf) yang terlibat, yaitu neuron aferen atau sensori, neuron eferen atau motorik, dan interneuron atau neuron konektor. Semua sel saraf ini terdiri dari badan sel, akson, dan dendrite. Neuron memiliki reseptor reseptor pada ujungnya yang menyebabkan impuls nyeri dikonduksikan ke medula spinalis atau otak. Reseptor-reseptor ini (nosiseptor) memiliki akhir yang terspesialisasi sangat tinggi yang memulai impuls dalam berespon terhadap perubahan fisik atau kimia. (Arif Muttaqin, 2006).

Cedera pada sel atau jaringan menstimulasi nosiseptor untuk melepaskan berbagai zat kimia yang memulai impuls nyeri dan menimbulkan respon-respon nyeri. Zat-zat ini terjadi secara alami dan termasuk histamine, substansi P, kolinesterase, bradikinin, dan prostaglandin. Ketika dilepaskan,

zat-zat ini merangsang ujung-ujung saraf dan mentransmisikan impuls nyeri pada tingkatan yang lebih tinggi didalam otak. (Arif Muttaqin, 2006).

Kemudian serat saraf perifer menyalurkan impuls nyeri ke system saraf pusat (SSP). Respon nyeri mengaktifasi saraf perifer A-delta. Impuls berjalan secara cepat ke substansia gelatinosa pada kornu dorsalis medulla spinalis, tempat mekanisme gerbang beroperasi. Impuls aferen (sensoris) memasuki kornu dorsalis medulla spinalis. Impuls keluar medulla spinalis melalui impuls-impuls aferen (motorik) dari kornu anterior. Impuls nyeri ditransmisikan melewati sinaps saraf dengan bantuan neurotransmitter seperti asetilkolin, norepinefrin, epinefrin, serotonin, dan dopamin. (Arif Muttaqin, 2006)

Reseptor berdiameter kecil (Serabut A dan Serabut C) berfungsi untuk mentransmisikan nyeri yang sifatnya keras dan reseptor ini biasanya berupa ujung saraf bebas yang terdapat diseluruh permukaan kulit dan pada struktur tubuh yang lebih dalam seperti tendon, fascia dan tulang serta organ-organ interna. Sedangkan transmitter yang berdiameter besar (Serabut A-Beta) memiliki reseptor yang terdapat pada struktur permukaan tubuh dan fungsinya selain menstransmisikan sensasi nyeri, juga lebih berfungsi untuk menstransmisikan sensasi lain seperti getaran, sentuhan, sensasi panas/dingin, serta juga terdapat tekanan halus, impuls dari serabut A-Beta mempunyai sifat inhibitor (penghambatan) yang ditransmisikan ke serabut C dan A-delta (Anas Tamsuri, 2006).

Selanjutnya impuls menyebarangi medulla spinalis sisi yang berlawanan dan pada pusat yang lebih tinggi dalam otak melalui traktus spinotalamikus. Traktus spinotalamikus memasuki otak dan berjalan ke thalamus. Thalamus memainkan peran dalam memori, mengingat dan respons emisional. Dari thalamus, impuls berjalan ke korteks dan daerah yang lain. Semua tingkat yang lebih tinggi dalam otak memainkan suatu bagian dalam proses stimulus nyeri (thalamus, hypothalamus, batang otak, dan korteks). Ketika transmisi nyeri disampaikan ke otak, nyeri diterima secara subyektif. Jalur serat saraf eferen yang menurun meluas dari korteks turun ke medulla spinalis dan dapat juga memengaruhi impuls-impuls pada tingkat medulla spinalis (Arif Muttaqin, 2006).

#### **4. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nyeri**

Nyeri yang dialami oleh pasien dipengaruhi oleh sejumlah faktor diantaranya:

##### **a. Usia**

Usia merupakan variabel yang penting mempengaruhi nyeri, khususnya pada anak-anak dan lansia. Pada lansia yang mengalami nyeri, perlu dilakukan pengkajian, diagnosis dan penanganan secara agresif. Cara lansia berespon terhadap nyeri dapat berbeda dengan cara berespon dengan orang yang berusia lebih muda. Namun individu yang berusia lanjut memiliki resiko tinggi mengalami situasi-situasi yang membuat mereka merasakan nyeri. Karena lansia hidup lebih lama, mereka

kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami kondisi patologis yang menyertai nyeri. Sekali klien yang berusia lanjut menderita nyeri, maka ia dapat mengalami gangguan fungsi yang serius.

b. Jenis kelamin

Secara umum, pria dan wanita tidak berbeda secara bermakna dalam berespon terhadap nyeri. Diragukan apakah hanya jenis kelamin saja yang merupakan suatu faktor dalam pengekspresian nyeri. Beberapa kebudayaan yang mempengaruhi jenis kelamin, misalnya menganggap bahwa seorang anak laki-laki harus berani dan tidak boleh menangis, sedangkan seorang anak perempuan boleh menangis dalam situasi yang sama.

c. Budaya

Kebudayaan dan nilai-nilai budaya mempengaruhi cara individu mengatasi nyeri. Individu mempelajari apa yang diharapkan dan apa yang diterima oleh kebudayaan mereka. Hal ini meliputi bagaimana bereaksi terhadap nyeri. Cara individu mengekspresikan nyeri merupakan sifat kebudayaan.

d. Perhatian

Tingkat seorang klien memfokuskan perhatiannya pada nyeri dapat mempengaruhi persepsi nyeri. Perhatian yang meningkat dihubungkan dengan nyeri yang meningkat, sedangkan upaya pengalihan dihubungkan dengan respon nyeri yang menurun.

e. Makna nyeri

Makna seseorang yang dikaitkan dengan nyeri mempengaruhi pengalaman nyeri dan cara seseorang beradaptasi terhadap nyeri. Hal ini juga dikaitkan secara dekat dengan latar belakang budaya individu tersebut. Individu akan mempersepsikan nyeri dengan cara berbeda-beda, apabila nyeri tersebut memberi kesan ancaman, suatu kehilangan, hukuman atau tantangan.

f. Gaya coping yang digunakan

Pengalaman nyeri dapat menjadi suatu pengalaman yang membuat seseorang merasa kesepian. Hal yang sering terjadi adalah klien merasa kehilangan kontrol terhadap lingkungan atau kehilangan kontrol terhadap hasil akhir dari peristiwa yang terjadi. Dengan demikian. Gaya coping mempengaruhi kemampuan individu tersebut untuk mengatasi nyeri.

g. Kecemasan dan stressor lain

Hubungan antara kecemasan dan nyeri bersifat kompleks. Kecemasan seringkali meningkatkan persepsi nyeri, tetapi nyeri juga dapat menimbulkan suatu perasaan kecemasan. Individu yang sehat secara emosional biasanya lebih mampu mentoleransi nyeri sedang hingga berat daripada individu yang memiliki status emosional yang kurang stabil.

h. Lingkungan dan dukungan orang terdekat

Faktor lain yang bermakna yang mempengaruhi respon nyeri adalah kehadiran orang-orang terdekat klien dan bagaimana sikap mereka terhadap klien. Individu yang mengalami nyeri seringkali bergantung terhadap anggota keluarga atau teman dekat untuk memperoleh dukungan, bantuan dan perlindungan.

i. Pengalaman nyeri yang lalu

Setiap individu belajar dari pengalaman nyeri yang lalu. Pengalaman nyeri sebelumnya berarti bahwa individu tersebut akan menerima nyeri dengan lebih mudah pada masa yang akan datang. Apabila individu sejak lama sering mengalami serangkaian episode nyeri tanpa pernah sembuh atau menderita nyeri yang berat, maka ansietas bahkan rasa takut dapat muncul. Namun dapat juga sebaliknya. (Smeltzer, S. C & Bare, B.G.(2001) dan Potter dan Perry. (2005).

**5. Pengkajian nyeri**

Pengkajian keperawatan pada individu dengan nyeri termasuk deskripsi nyeri juga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi nyeri yaitu pengalaman masa lalu, ansietas, usia serta respon individu terhadap strategi pereda nyeri (Smeltzer, S. C & Bare, B.G, 2001).

Alat-alat pengkajian nyeri dapat digunakan untuk mengkaji persepsi nyeri seseorang. Agar alat-alat pengkajian nyeri dapat bermanfaat, alat tersebut harus memenuhi kriteria berikut : mudah dimengerti dan digunakan, memerlukan sedikit upaya pada pasien, mudah dinilai, dan sensitif terhadap perubahan kecil dalam intensitas nyeri. (Smeltzer, S. C & Bare, B.G, 2001)

Individu merupakan penilai terbaik dari nyeri yang dialaminya dan karenanya harus diminta untuk menggambarkan dan membuat tingkatannya. Informasi yang diperlukan harus menggambarkan nyeri individu dalam beberapa cara:

- a. Intensitas nyeri. Individu dapat diminta untuk membuat tingkatan nyeri pada skala verbal, misalnya tidak nyeri, sedikit nyeri, nyeri hebat, nyeri sangat hebat atau 0 sampai 10: 0=tidak nyeri, 10= nyeri sangat hebat.
- b. Karakteristik nyeri termasuk letak, durasi, irama, dan kualitas nyeri.
- c. Faktor-faktor yang meredakan nyeri misalnya gerakan, kurang gerak, pengerahan tenaga, istirahat, obat-obat.
- d. Efek nyeri terhadap aktivitas kehidupan sehari-hari misalnya tidur, napsu makan, konsentrasi, gerakan fisik, bekerja, aktivitas-aktivitas lain.
- e. Kekawatiran individu tentang nyeri.

## **6. Skala pengukuran derajat nyeri**

Pemeriksaan nyeri dapat dilakukan menggunakan skala:

- a. Verbal Analog Scale (VAS). Pengukuran derajat nyeri dengan cara menunjuk satu titik pada garis skala nyeri (0 – 10 cm) satu ujung menunjukkan tidak nyeri dan ujung yang lain menunjukkan nyeri hebat. Panjang garis mulai dari titik tidak nyeri sampai titik yang ditunjuk menunjukkan besarnya nyeri. Besarannya dalam satuan millimeter, misalnya 10 – 20 – 30 mm



Gambar 2.2. Skala Verbal Analog (Menurut Pudjiastuti dan utomo (2003))

- b. Verbal Descriptive Scale (VDS). Cara pengukuran derajat nyeri dengan tujuh skala penilaian yaitu nilai 1=tidak nyeri, 2=nyeri sangat ringan, 3=nyeri ringan, 4=nyeri tidak begitu berat, 5=nyeri cukup berat, 6=nyeri berat dan 7=nyeri hampir tak tertahankan.

- c. Skala empat tingkat merupakan parameter pengukuran derajat nyeri dengan memakai 4 skala, yaitu 0 = tidak nyeri, tidak ada rasa nyeri pada waktu istirahat dan aktivitas, 1 = ringan istirahat tidak ada nyeri, perasaan nyeri timbul sewaktu bekerja lama, berat dan penekanan kuat terasa sakit. 2 = sedang, rasa sakit terus-menerus atau kadang timbul tetapi masih dapat diabaikan/tidak mengganggu, LGS normal, pada penekanan kuat terasa sakit, fleksi dan ekstensi sakit. 3 = berat, nyeri menyulitkan lansia hampir tak tertahankan dan gerakan fleksi/ekstensi hampir tidak ada/tidak mampu. (Pudjiastuti, S. S. & Utomo, B, 2003)

Tabel 2.2 Skala Tingkat Nyeri

No	RESPON	3	2	1	0
1	Perhatian	Lebih memperhatikan nyeri, sangat sulit dialihkan	Sebagian perhatian pada nyeri, mudah dialihkan	Sedikit perhatian pada nyeri, mudah dialihkan	Tidak ada perhatian pada nyeri, sangat mudah dialihkan
2	Anxietas	Tegang, mudah marah, khawatir	Agak tegang, mudah marah, khawatir	Sedikit tegang, mudah marah, khawatir	Tidak tegang, tidak khawatir
3	Verbal	Ada nyeri hebat	Agak nyeri	Sedikit nyeri	Tidak ada nyeri
4	Perspirasi	Ada perspirasi, Jelas lembab, Dingin	Ada perspirasi, sedikit lembab	Sedikit perspirasi, sedikit lembab	Perspirasi normal
5	Suara	Merintih dengan keras	Merintih dengan	Mengeluh dengan	Berbicara dengan

			lembut	dengkuran lembut	tekanan normal
6	Nausea	Mengatakan ingin muntah	Merasa sakit perut	Merasa mual	Tidak merasa mual
7	Ketegangan otot	Kaku, tekanan kuat terasa sakit, tegang	Agak kaku, tekanan kuat terasa sakit, agak tegang	Sedikit kaku, tekanan yang sangat kuat terasa sakit.sedikit tegang	Rileks, tidak kaku, Tidak tegang
8	Interaksi Sosial	Sedikit komunikasi, lebih fokus pada nyeri	Percakapan baik, sedikit fokus pada nyeri	Percakapan baik, perhatian menurun	Komunikasi normal
9	Ekspresi wajah	Kening mengerut, mulut dan gigi terkatup,tdk menggeretak	Kening mengerut, mulut dan gigi tidak terkatup	Sedikit mengerut	Tidak mengerut
10	Aktifitas Persendian	Hanya mapu menggerakan sedikit persendian, menggangu aktifitas	Fleksi dan ekstensi sakit, sedikit menggangu aktifitas	Fleksi dan ekstensi tidak maksimal	Fleksi dan ekstensi normal.

Sumber : Marlina Malik (Suyono, S., Waspadji, S., Lesmana,

L., et al, 2001

Keterangan :

1 - 10 : Nyeri ringan

11 – 20 : Nyeri Sedang

21 – 30 : Nyeri Berat

### C. Osteoartritis pada Lanjut Usia

## 1. Defenisi Osteoarthritis

Osteoarthritis merupakan penyakit pada sendi- sendi penahan berat tubuh yang progressif, non- inflamasi, nonsistemik dan kronis ( Reeves, 1999). Osteoarthritis merupakan gangguan kronik, tidak meradang dan progresif lambat, yang seakan- akan merupakan proses penuaan. Sel-sel dan matriks tulang rawan mengalami degenerasi disertai pertumbuhan tulang baru pada bagian tepi sendi ( Price, 1995). Batasan consensus saat ini : penyakit osteoarthritis adalah hasil dari peristiwa mekanik dan biologik yang mengakibatkan tidak stabilnya perangkai normal dari degradasi dan sintesis kondrosit kartilago artikular dan matriks ekstraseluler, dan tulang subkondral, meskipun keadaan tersebut diawali oleh berbagai faktor, termasuk genetik, pertumbuhan, metabolik, dan traumatik ( Leena Sharma, 2001 dalam Darmojo, 2006)

## 2. Faktor Resiko

Faktor resiko individual dapat diklasifikasikan berdasarkan mekanisme patogenetiknya. Terdapat faktor yang mengarah pada peningkatan kerentanan terhadap osteoarthritis ( susceptibility factors) dan faktor yang menyebabkan biomekanisme abnormal ( mechanical factor) pada area sendi spesifik ( Kaufman et al,1996) sebagai berikut:

### ) Susceptibility Factors

#### 1. Usia

Usia adalah faktor resiko yang paling kuat kearah osteoarthritis. Mekanisme dari hubungan ini belum sepenuhnya dimengerti, namun mungkin akibat refleksi perubahan kimia dari kartilago artikuler seiring dengan usia.

## 2. Obesitas

Obesitas umumnya berhubungan dengan osteoarthritis tumit, sedikit berhubungan dengan osteoarthritis tangan. Mekanismenya lebih kepada faktor metabolik daripada beban mekanik yang berlebihan. Penelitian menunjukan osteoarthritis pinggul dan osteoarthritis lutut jarang pada osteoarthritis yang berhubungan dengan kegemukan.

## 3. Faktor Herediter

Faktor herediter penting, Khususnya pada poliartikuler osteoarthritis. Factor ini tampaknya poligenik dan diturunkan sebagai gen autosomal dominan pada perempuan dan gen autosomal resesif pada laki-laki.

## 4. Perempuan

Dominasi osteoarthritis oleh perempuan, khususnya pada poliartikuler osteoarthritis dan peningkatan prevalensi pada perempuan post menopause, menjadikan adanya asumsi bahwa hormon perempuan mungkin punya peranan pada penyakit ini.

## ) Faktor Mekanis

Trauma, khususnya yang berhubungan dengan injuri olahraga, adalah penyebab umum dari monoartikuler osteoarthritis. Lutut adalah area yang sering terkena osteoarthritis berhubungan dengan trauma. Bentuk sendi yang berubah dapat mengarah pada perkembangan osteoarthritis. Hal ini terekam dengan baik pada gangguan pinggul pada anak-anak, seperti Perthes Disease, Slipped, Capital Epiphysis dan congenital Dislocation of the Hip. Penggunaan kelompok sendi khusus secara berulang juga dihubungkan dengan osteoarthritis.

### **3. Patofisiologi**

Penyakit utama menyebabkan kesalahan dalam pembentukan jaringan ikat sendi, degenerasi, dan hipertrofi tulang atau pertumbuhan tulang berlebih dalam bentuk taji/ tonjolan tulang. Bagian-bagian tonjolan-tonjolan ini atau kartilago yang remuk masuk ke dalam cairan sinovial dan menyebabkan nyeri. Kartilago artikuler akan terus memburuk, ujung tulang akan saling bergesekan satu sama lain sehingga menyebabkan rasa sakit dan membengkak menjadi gejala yang lebih banyak dialami oleh pasien (Revees, 1999).

Terdapat 2 perubahan morfologi utama yang mewarnai osteoarthritis yaitu kerusakan fokal tulang rawan sendi yang progresif dan pembentukan tulang rawan baru pada dasar lesi tulang rawan sendi dan tepi sendi (osteofit). Keadaan ini diawali oleh perubahan-perubahan metabolik tulang rawan sendi. Perubahan tersebut berupa peningkatan aktifitas enzim-enzim yang merusak makromolekulmatriks tulang rawan sendi seperti proteoglikan

dan kolagen yang menyebabkan penurunan kadar proteoglikan air tulang rawan sendi ( Noer, 1996)

Pada pasien osteoarthritis, sintesi proteoglikan dan kolagen oleh kondrosit meningkat tajam, tetapi substansi ini juga dihancurkan dengan kecepatan yang lebih tinggi sehingga pembentukan tidak seimbang dengan kebutuhan. Sejumlah kecil serat kolagen tipe I diganti tipe II, sehingga terjadi perubahan diameter dan orientasi dari serat kolagen yang merubah biomekanik dari tulang rawan. Hal ini menyebabkan tulang rawan kehilangan sifat kompresibilitnya. Peningkatan usia mempunyai hubungan dengan perubahan-perubahan dalam fungsi kondrosit, meningkatkan perubahan pada komposisi tulang rawan sendi yang mengarah pada osteoarthritis ( Price, 1995).

Hormon estrogen juga berperan dalam proses terjadinya osteoarthritis. Estrogen mengatur keseimbangan antara proses pembentukan tulang dan proses penyerapan kalsium dari tulang oleh osteoklas. Penurunan estrogen pada menopause menyebabkan aktifitas osteoklas meningkat sehingga tulang kehilangan kalsium dan menjadi keropos. Proses ini juga terjadi di tulang rawan ( Hartono, 2000)

#### **4. Klasifikasi**

Secara umum dibagi 2 yaitu osteoarthritis primer yang penyebabnya tidak diketahui ( idiopatik) dan osteoarthritis sekunder yang diakibatkan karena peristiwa-peristiwa tertentu misalnya cedera sendi, deformitas

kongenital dan penyakit radang sendi lain termasuk Rheumatoid Arthritis. Klasifikasi osteoarthritis sebagai berikut ( Solomon, 1997 & Brant, 1997 dalam Darmojo, 2006).

## 1. Osteoarthritis Primer

### ) Lokalisata

Osteoarthritis hanya terjadi pada lokasi-lokasi tertentu saja dari bagian-bagian tubuh, dan pengelompokan didasarkan pada lokasi tadi yaitu:

- a. Pinggul-pangkal paha
- b. Lutut
- c. Spinal Apophyseal ( tulang punggung)
- d. Tangan
- e. Kaki
- f. Lain-lain ( bahu, siku, pergelangan tangan, perglengan kaki)

### ) Generalisata

Osteoarthritis terjadi pada beberapa lokasi tubuh, yaitu:

- a. Tangan ( nodus Herbeden)
- b. Tangan dan lutut ( spinal aphopyseal)

## 2. Osteoarthritis Sekunder

- ### ) Diplastik ( chondrodysplasia, Dysplasia Epiphyseal, salah satu sendi yang congenital, gangguan pertumbuhan: penyakit Perthes, Epifisiolisis)

- ) Pasca trauma ( akut, berulang, post operasi)
- ) Kegagalan struktur ( osteonekrotic, osteochondritis)
- ) Pasca inflamasi ( infeksi, atropati inflamatoar)
- ) Endokrin dan metabolik ( hemocromatosis, gangguan timbunan Kristal, akromegali, okronosis)
- ) Jaringan ikat ( sindrom hipermobilitas, Mucopolysaccharinedosus)
- ) Sebab tak jelas ( penyakit Kashin-Beck)

## 5. Pemeriksaan Diagnostik

Diagnosis osteoarthritis pada umumnya didasarkan pada manifestasi klinis dan gambaran radiologis.

### a. Manifestasi Klinis.

#### 1. Nyeri sendi

Rasa nyeri pada sendi merupakan gambaran primer osteoarthritis. Nyeri biasanya bertambah dengan kegiatan fisik sedang sampai berat dan sedikit berkurang dengan istirahat ( Noer, 1996). Rasa sakit biasanya pada penerima bobot digambarkan sebagai rasa sakit yang berat saat mengangkat atau menahan beban. Rasa sakit ini akan membatasi mobilitas pasien ( Price, 1995)

#### 2. Hambatan gerak sendi

Perubahan ini seringkali sudah ada meskipun pada osteoarthritis yang masih dini. Biasanya bertambah berat dengan semakin beratnya penyakit, sampai sendi hanya bias digoyangkan

menjadi kontraktur ( Noer, 1996). Mungkin ini disengaja karena rasanyeri yang dialami atau karena penyempitan ruang sendi atau kurang digunakannya sendi yang bersangkutan ( Price, 1995)

### 3. Kaku pagi

Pembengkakan sendi sehingga timbul kekakuan dan hilang gerakan, terutama setelah diistirahatkan. Perasaan kaku yang paling sering dialami pada pagi hari atau setelah bangun tidur. Biasanya berlangsung kurang lebih 30 menit dan akan berkurang setelah sendi-sendi itu digerakkan ( Smeltzer & Bare, 1994).

### 4. Krepitasi

Gejala ini lebih berguna untuk pemeriksaan klinis osteoarthritis lutut. Gejala ini timbul dikarenakan ada gesekan antara kedua permukaan tulang sendi pada saat sendi digerakkan secara pasif dimanipulasi ( Noer, 1996)

### 5. Pembesaran sendi

Pembesaran sendi dapat timbul karena eusi pada sendi atau bisa juga disebabkan karena adanya osteofit yang dapat mengubah permukaan sendi ( Noer, 1996).

### 6. Perubahan bentuk ( deformitas)


Ada perubahan bentuk dengan deformitas pada posisi fleksi. Terjadi karena kontraktur sendi yang lama, perubahan permukaan sendi, berbagai kecacatan, dan gaya berdiri ( Noer, 1996).

## 7. Perubahan gaya berjalan

Sering berhubungan dengan nyeri karena menjadi tumpuan berat badan. Terutama dijumpai pada lutut, sendi paha dan tulang belakang dengan stenosis spinal (Noer, 1996)


## 8. Gambaran Radiologis

1. Penyempitan celah sendi yang seringkali asimetris ( lebih berat pada bagian yang menanggung beban) yang disebabkan hancurnya tulang rawan artikular, tonjolan atau taji tulang atau osteofit pada tepi sendi, kista, dan deformitas atau kelainan bentuk pada persendian.
2. Peningkatan densitas ( sklerosis tulang subkondral)( Noer, 1996)



Gambar 2.3 Respon inflamasi pada sendi (A) sendi pada gambar sebelah kiri mengalami pembengkakan dan penumpukan cairan.

(B) Sendi pada gambar sebelah kanan memperlihatkan pannus, kartilago artikuler yang erosif dan penyempitan rongga sendi semua ini turut menyebabkan atrofi otot dan ankilosis. (Menurut Smelzer dan Bare (1996).



Gambar 2.4 Penyempitan rongga sendi dan osteofit (bone spurs) merupakan ciri khas perubahan degeneratif dalam sendi. Menurut Smeltzer s.c., dan Bare (1996).

## 6. Penatalaksanaan nyeri sendi

Sampai sekarang belum ada obat yang spesifik yang khas untuk Nyeri sendi. Program penanganan melibatkan tim multidisiplin termasuk pasien sendiri merupakan dasar bagi penatalaksanaan Nyeri sendi. Sifat kronik pada sebagian besar penyakit ini mengharuskan pasien untuk memahaminya, mendapatkan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terbaik secara mandiri berkenaan dengan penanganan penyakit dan memperoleh program terapi yang dapat disesuaikan dengan gaya hidupnya (Smeltzer, S. C & Bare, B.G, 2001).

Obat-obatan digunakan pada penyakit ini adalah untuk mengendalikan inflamasi dan ada sebagian kasus untuk memodifikasi penyakit. Ada tiga kategori dasar obat yang berkasiat untuk mengobati reumatik yaitu: kelompok salisilat, kelompok obat anti inflamasi non steroid (*NSAID*) dan preparat anti reumatik yang kerjanya lambat. Obat-obatan non opioid kerap kali digunakan untuk penanganan nyeri, khususnya sampai pada tahap awal dalam program therapi, sampai tindakan lainnya dapat dikerjakan secara efektif. (Suyono, S., Waspadji, S., Lesmana, L., et al, 2001).

Penatalaksanaan nonfarmakologis terdiri dari berbagai tindakan penanganan nyeri berdasarkan stimulasi fisik maupun perilaku kognitif. Penanganan fisik meliputi stimulasi kulit, stimulasi elekktrik saraf kulit transkutan (TENS, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), akupuntur dan pemberian placebo. Intervensi perilaku kognitif meliputi tindakan distraksi, teknik relaksasi, imajinasi terbimbing, umpan balik biologis, hypnosis, dan sentuhan terapeutik. Penanganan nyeri dengan tindakan fisik dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: Meningkatkan kenyamanan, Memperbaiki adanya disfungsi fisik, Mengubah respons fisiologik, Menurunkan kecemasan yang berhubungan dengan imobilitas karena nyeri atau karena adanya pembatasan aktivitas. (Anas T, 2006).

Adapun penanganan nyeri secara non-farmakologi yaitu:

a. Stimulasi Kontralateral

Stimulasi kontralateral adalah memberi stimulasi pada daerah kulit di sisi yang berlawanan dari daerah terjadinya nyeri. Stimulasi kontralateral dapat berupa garukan pada daerah yang berlawanan jika terjadi gatal, menggosok (masase) jika kram (kejang) atau pemberian kompres dingin atau panas serta pemberian balsam atau obat gosok. Metode ini mungkin berguna jika daerah yang mengalami nyeri tidak dapat disentuh karena hipersensitif, tertutup perban atau gips atau terjadi nyeri bayangan atau fantom. (Anas T, 2006).

b. Acupressure (Pijat Refleksi)

Acupressure dikembangkan dari ilmu pengobatan kuno Cina dengan menggunakan system akupunktur. Terapi memberi tekanan jari-jari pada berbagai titik organ tubuh seperti pada akupunktur. Tindakan ini merupakan tindakan sederhana dan mudah dipelajari.

c. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)

Stimulasi saraf elektrik transkutan unit peralatan yang dijalankan dengan elektroda yang dipasang pada kulit untuk menghasilkan sensasi kesemutan, getaran, atau mendengung pada area kulit tertentu. TENS telah digunakan baik untuk menghilangkan nyeri akut atau kronis. TENS diduga dapat menurunkan nyeri dengan menstimulasi reseptor nonnyeri di area yang sama dengan serabut yang mentransmisi nyeri.

d. Imobilisasi

Imobilisasi terhadap organ tubuh yang mengalami nyeri hebat mungkin dapat meredakan nyeri. Kasus seperti arthritis rheumatoid mungkin memerlukan teknik untuk mengatasi nyeri.

e. Distraksi

Distraksi adalah pengalihan dari fokus perhatian terhadap nyeri ke stimulus yang lain. Macam-macam distraksi yaitu Distraksi visual, distraksi pendengaran, distraksi pernapasan, distraksi intelektual, teknik pernapasan, imajinasi terbimbing.

f. Relaksasi

Relaksasi otot rangka dipercaya dapat menurunkan nyeri dengan mereleksasikan ketegangan otot yang mendukung rasa nyeri. Relaksasi memberikan efek secara langsung terhadap fungsi tubuh, seperti: Penurunan tekanan darah, nadi, dan frekwensi pernapasan, penurunan komsumsi oksigen oleh tubuh, penurunan ketegangan otot, meningkatkan kemampuan konsentrasi, dan menurunkan perhatian terhadap stimulus lingkungan.

g. Umpan Balik Tubuh

Umpan balik tubuh adalah (biofeedback) adalah teknik mengatasi nyeri dengan memberikan informasi kepada klien tentang respon fisiologis tubuh terhadap nyeri yang di alami klien (misalnya, tekanan

darah atau ketegangan otot serta EEG) dan cara untuk mengendalikan secara involunter respons tersebut.

h. Sentuhan Terapeutik

Teknik yang digunakan adalah perawat melakukan meditasi dalam waktu singkat sebelum kontak dengan klien. Pada periode ini, perawat menyembunyikan tingkat energi internal, kemudian meraba klien dan mentransmisikan energy penyembuhan. Rasionalisasi keberhasilan metode ini tidak dapat dimengeti dengan jelas. (Anas T, 2006).

i. Kompres panas

Pengertian pemberian kompres panas memberikan rasa hangat pada klien dengan menggunakan cairan atau alat yang menimbulkan hangat pada tubuh yang memerlukannya. Tujuannya memperlancar sirkulasi darah, mengurangi rasa nyeri, merangsang peristaltic usus, memperlancar penguluaran getah radang (eksudat), member rasa nyaman dan tenang. (Eni Kusyati, 2006)

j. Stimulasi Kutaneus: Slow-Stroke Back Massage

1) Definisi

Stimulasi kutaneus adalah stimulasi kulit yang dilakukan untuk menghilangkan nyeri, bekerja dengan cara mendorong pelepasan endorphin, sehingga mmblok transmisi stimulus nyeri. Cara lainnya adalah dengan mengaktifkan transmisi serabut saraf sensori A-beta yang lebih besar dan lebih cepat, sehingga

menurunkan transmisi nyeri melalui serabut C dan A-delta berdiameter kecil sehingga menutup gerbang sinap untuk transmisi impuls nyeri (Potter & Perry, 1997)

Slow-Stroke Back Massage adalah tindakan masase punggung dengan usapan perlahan selama 3-10 menit (Potter & Perry, 1997).

## 2) Pengaruh

Pengaruh Stimulasi Kutaneus : Slow-Stroke Back Massage meliputi:

- a. Pelebaran pembuluh darah dan memperbaiki peredaran darah di dalam jaringan tersebut. Dengan cara ini prnyaluran zat asam dan bahan makanan ke sel-sel diperbesar dan pembuangan dari zat-zat yang tidak terpakai akan diperbaiki. Jadi akan timbul proses pertukaran zat yang lebih baik. Aktifitas sel yang meningkat akan mengurangi rasa sakit dan akan menunjang proses penyembuhan luka, radang empedu, dan juga beberapa radang persendian. (Stevens, 1999; Kenworthy, 2002; Kusyati E, 2006).
- b. Pada otot-otot, memiliki efek mengurangi ketegangan (Kusyati E, 2006).
- c. Meningkatkan relaksasi fisik dan psikologis (Kusyati E, 2006).

- d. Penggunaan stimulus kutaneus yang benar dapat mengurangi persepsi nyeri dan membantu mengurangi ketegangan otot yang dapat meningkatkan nyeri.
- e. Penurunan intensitas nyeri, kecemasan, tekanan darah, dan denyut jantung secara bermakna ( Mook E, 2003).

3) Petunjuk ( Priharjo, 1993)

- a. Perawat harus bertanya pertama kali apakah klien menyukai usapan punggung karena beberapa klien tidak menyukai kontak secara fisik.
- b. Perlu diperhatikan kemungkinan adanya alergi atau kulit mudah terangsang, sebelum memberikan lotion.
- c. Hindari untuk melakukan masase pada area kemerah-merahan, kecuali bila kemerahan tersebut hilang sewaktu di masase.
- d. Masase punggung dapat merupakan kontraindikasi pada pasien imobilitas tertentu yang dicurigai mempunyai gangguan penggumpalan darah.

Identifikasi juga factor-faktor atau kondisi seperti fraktur tulang rusuk atau vertebra, luka bakar, daerah kemerahan pada kulit, atau luka terbuka yang menjadi kontraindikasi untuk masase punggung. Pada klien yang mempunyai riwayat hipertensi atau disritmia, kaji denyut nadi dan tekanan darah.

4) Metode ( Potter & Perry, 1997 )

Tehnik untuk stimulasi kutaneus : Slow-Stroke Back Massage dilakukan dengan mengusap kulit klien secara perlahan dan berirama dengan tangan dengan kecepatan 60 kali usapan permenit. Kedua tangan menutup suatu area yang lebarnya 5 cm pada kedua sisi tonjolan tulang belakang, dari ujung kepala sampai area sacrum. Tehnik ini berlangsung selama 3-10 menit.

5) Prosedur Pelaksanaan ( Potter & Perry, 1997)

- a. Subyek penelitian dipersilahkan untuk memilih posisi yang diinginkan selama intervensi, bias tidur miring, telungkup atau duduk.
- b. Buka punggung klien, bahu, dan lengan atas. Tutup sisanya dengan selimut.
- c. Peneliti mencuci tangan dalam air hangat. Hangatkan lotion di telapak tangan dan tepatkan botol ke dalam air hangat. Tuang sedikit lotion di tangan. Jelaskan prosedur pada responden bahwa lotion akan terasa dingin dan basah basah. Gunakan lotion sesuai kebutuhan.
- d. Lakukan usapan pada punggung dengan menggunakan jari-jari dan telapak tangan sesuai dengan metode diatas. Jika responden mengeluh tidak nyaman, prosedur langsung dihentikan.
- e. Akhiri usapan dengan gerakan memanjang dan beritahu klien bahwa perawat mengakhiri usapan.

- f. Bersihkan kelebihan dari lubrikan dari punggung klien dengan handuk mendi. Ikat kembali gaun atau bantu memakai baju atau piyama. Bantu klien posisi yang nyaman.
- g. Letakkan handuk yang kotor pada tempatnya dan cuci tangan.

6) Stimulasi Kutaneus dalam Menurunkan Nyeri Osteoarthritis

Degenerasi pada kartilago artikuler dan hipertrofi tulang atau pertumbuhan tulang berlebih dalam bentuk taji/ tonjolan tulang yang terjadi pada penyakit osteoarthritis akan menimbulkan pergesekan yang merangsang nyeri. Sendi adalah salah satu organ yang banyak memiliki reseptor nyeri ( Guyton & Hall), 1997). Stimulus nyeri yang mencapai ambang nyeri akan menyebabkan aktivasi reseptor dan terjadi penjalaran impuls nyeri oleh serabut saraf A-delta C. adanya impuls ini akan menyebabkan gerbang nyeri di substansiagelantinososa terbuka. Namun dengan pemberian stimulasi kutab berupa usapan punggung, dimana stimulus ini direspon oleh serabut A beta yang lebih besa, maka stimulus ini akan mencapai otak lebih dahulu, dengan demikian akan menutup gernagn nyeri sehingga nyeri tidak timbul. Disamping itu, system control desenden juga akan bereaksi dengan melepaskan endorphin yang merupakan morfin alami tubuh sehingga perspsi nyeri tidak terjadi.

## BAB III

### KERANGKA KONSEPTUAL

#### A. Kerangka Konsep Penelitian


Lansia mengalami berbagai perubahan akibat proses penuaan. Perubahan ini mengakibatkan terjadinya gangguan, salah satunya adalah gangguan musculoskeletal yaitu osteoarthritis. Pada penyakit ini, gejala yang paling sering muncul dan menyebabkan lansia mencari perawatan kesehatan adalah nyeri pada persendian. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mengurangi sensasi nyeri yaitu

Berbagai upaya nonfarmakologis dapat dilakukan untuk mengurangi sensasi nyeri dan salah satunya adalah stimulasi kutaneus: Slow-Stroke Back massage, dapat digunakan untuk menurunkan intensitas nyeri pada persendian. Sebelum dilakukan pemberian stimulasi kutaneus: Slow-Stroke back massage, intensitas nyeri diukur begitu pula sesudah pemberian stimulasi kutaneus: Slow –Stroke Back massage.


Berdasarkan uraian di atas maka kerangka konsep yang digunakan untuk melihat pengaruh pemberian stimulasi kutaneus: Slow-Stroke Back Massage terhadap penurunan sensasi nyeri sendi.

**Variabel Independen**


**Variabel Dependen**



Keterangan:



: Variabel yang tidak diteliti




: Variabel yang diteliti

Dari gambar diatas maka dapat dijelaskan bahwa ada beberapa penanganan nyeri yang dapat dilakukan yaitu, stimulasi kontralateral, Acupressure ( pijat refleksi), Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS), immobilisasi, distraksi, relaksasi, umpan balik tubuh, sentuhan terapeutik, kompres panas basah dan Stimulasi Kutaneus: Slow-Stroke Back Massage. Dengan kompres panas basah dapat membantu mengurangi nyeri sendi misalnya mengurangi nyeri sendi pada lansia di Panti Tresna Wredha. Dengan meminimalkan nyeri yang dialami lansia dapat meningkatkan kualitas dan kesejahtraan hidup lansia.



## B. Kerangka Kerja



Gambar 3.2 Kerangka Kerja Penelitian

## A. Definisi Operasional Dan Kriteria Objektif

### 1. Nyeri sendi

Yang dimaksud dengan nyeri sendi dalam penelitian ini adalah pengalaman yang tidak menyenangkan yang dialami oleh lansia diakibatkan oleh kerusakan pada jaringan sendi yang diukur dengan alat pengukur nyeri obyektif skala pendeskripsian nyeri empat tingkat.

Kriteria objektif

1 – 10 : Nyeri ringan

11 – 20 : Nyeri sedang

21 – 30 : Nyeri berat

Alat ukur : Format observasi

Skala ukur : Ordinal

### 2. Lanjut Usia

Yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia diatas 60 tahun, tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari nafkah sendiri untuk keperluan hidupnya sehari-hari.

Kriteria Objektif: Lanjut Usia (*elderly*) ialah antara 60 dan 74 tahun.

Lanjut Usia Tua (*old*) ialah antara 75 dan 90 tahun

Alat ukur : Kuisioner

Skala ukur : Nominal

### 3. Stimulasi Kutaneus: Slow-Stroke Back Massage

Yang dimaksudkan dengan Teknik stimulasi kutaneus : Slow-Stroke Back Massage adalah tehnik yang dilakukan dengan mengusap kulit klien secara perlahan dan berirama dengan tangan dengan kecepatan 60 kali usapan permenit. Kedua tangan menutup suatu area yang lebarnya 5 cm pada kedua sisi tonjolan tulang belakang, dari ujung kepala sampai area sacrum. Tehnik ini berlangsung selama 3-10 menit. Dengan proosedur pelaksanaan:

- a. Subyek penelitian dipersilahkan untuk memilih posisi yang diinginkan selama intervensi, bias tidur miring, telungkup atau duduk.
- b. Buka punggung klien, bahu, dan lengan atas. Tutup sisanya dengan selimut.
- c. Peneliti mencuci tangan dalam air hangat. Hangatkan lotion di telapak tangan dan tepatkan botol ke dalam air hangat. Tuang sedikit lotion di tangan. Jelaskan prosedurpada responden bahwa lotion akan terasa dingin dan basah basah. Gunakan lotion sesuai kebutuhan.
- d. Lakukan usapan pada punggung dengan menggunakan jari-jari dan telapak tangan sesuai dengan metode diatas. Jika responden mengeluh tidak nyaman, prosedur langsung dihentikan.

- e. Akhiri usapan dengan gerakan memanjang dan beritahu klien bahwa perawat mengakhiri usapan.
- f. Bersihkan kelebihan dari lubrikan dari punggung klien dengan handuk mendi. Ikat kembali gaun atau bantu memakai baju atau piyama. Bantu klien posisi yang nyaman.
- g. Letakkan handuk yang kotor pada tempatnya dan cuci tangan.

**B. Hipotesis penelitian.**

Hipotesis Alternatif (Ha)

Ada pengaruh positif pemberian stimulasi kutaneus: Slow-Stroke Back Massage terhadap penurunan sensasi nyeri sendi.

Hipotesis nol (Ho)

Tidak ada pengaruh pemberian stimulasi Kutaneus: Slow-Stoke Back Massage terhadap penurunan sensasi nyeri sendi

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**BAB IV**  
**METODE PENELITIAN**

**A. Jenis Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan adalah rancangan penelitian Quasy Eksperimen dengan pendekatan Nonequivalent Control Group Design. Dimana penelitian ini memberikan pengujian hipotesis dan menggunakan dua kelompok yaitu kelompok ekperimental dan kelompok kontrol dengan melakukan observasi sebelum dan sesudah intervensi.(Aziz Alimul, 2008).

Tabel 4.1 Desain Penelitian

Subyek	Pretest	Perlakuan	Posttest
KA	O	X	O1-A
	O	-	O1-B
KB	Time 1	Time 2	Time 3

Keterangan :

KA : Kelompok kasus

KB : Kelompok kontrol

O : Observasi sensasi nyeri sendi sebelum dilakukan Stimulasi Kutaneus

X : Intervensi stimulasi Kutaneus

O1 : Observasi sensasi nyeri sendi setelah dilakukan Stimulasi Kutaneus pada kelompok kasus

OB : Observasi sensasi nyeri sendi pada kelompok kontrol setelah pemberian Stimulasi Kutaneus atau Masase Kulit.

## **B. Populasi Dan Sampel**

### 1. Populasi

Populasi adalah setiap subjek yang diteliti (Nursalam, 2008). Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kelompok lanjut usia yang tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji kabupaten Gowa dengan nyeri sendi sebanyak 12 orang

### 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi terjangkau yang dapat digunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling.

## **C. Teknik Pengambilan Sampel**

### a. Teknik Sampling

Sampling adalah suatu proses dalam menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat mewakili populasi (Nursalam, 2008). Dalam penelitian ini pemilihan sampel dengan cara *Non Probability Sampling* jenis *Purposive Sampling* yaitu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. (Nursalam, 2008). Dan memenuhi kriteria inklusi yaitu sebanyak 12 orang masing-masing 6 orang untuk kelompok kontrol dan 6 orang untuk kelompok kasus.

b. Keiteria Inklusi dan Eksklusi

*Kriteria inklusi* adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti. *Kriteria eksklusi* adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari studi karena pelbagai sebab.

Kriteria Inklusi :

- 1) Lansia dengan penyakit reumatik yang mengalami nyeri sendi.
- 2) Lansia yang masuk dalam kelompok elderly (60-74 tahun) dan lanjut usia tua/old (75-90 tahun)
- 3) Lansia dalam keadaan sadar
- 4) Lansia yang dapat diajak komunikasi
- 5) Lansia yang mengalami kegemukan ( obesitas)

Kriteria Eksklusi :

- 1) Lansia yang mendapat terapi analgetik
- 2) Lansia very old (diatas 90 tahun)
- 3) Lansia dengan luka terbuka pada daerah sendi yang nyeri
- 4) Lansia dengan nyeri sangat berat dan tidak dapat diajak berkomunikasi dan tidak sadar
- 5) Tidak bersedia menjadi responden.

#### D. Pengumpulan Data

##### Instrumen penelitian

Instrumen atau alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dirancang oleh peneliti sesuai dengan literatur yang ada.

1. Kuisisioner untuk mengetahui identitas umum pasien
2. Observasi dengan teknik observasi berstruktur menggunakan lembar observasi skala pendeskripsian nyeri empat tingkat.

Terdapat 10 respon klien yang diobservasi antara lain :perhatian, ansietas, verbal, perspirasi, suara, nausea, musculo, ketegangan otot, ekspresi wajah, dan aktivitas sendi.

Jika observasi nilainya antara : 1 – 10 maka nyeri ringan

Jika observasi nilainya antara : 11 – 20 maka nyeri sedang

Jika observasi nilainya antara : 21 – 30 maka nyeri berat.

##### Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara melakukan pengisian kuisisioner terhadap responden dengan menggunakan kuisisioner yang telah tersedia untuk mendapatkan identitas umum pasien, dan melakukan observasi berdasarkan

Stimulasi kutaneus yang dilakukan dalam hal ini observasi terhadap dilakukan atau tidak dilakukannya Stimulasi kutaneus pada kelompok kasus dan kelompok kontrol menggunakan lembar observasi yang sudah disediakan.

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari instansi terkait yaitu Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Gau Mabaji kabupaten Gowa.

## **E. Pengolahan Data Dan Analisa Data**

### **1. Editing**

Setelah data terkumpul maka akan dilakukan editing atau penyuntingan untuk memeriksa setiap lembar kuisioner dan lembar observasi yang telah diisi, lalu data dikelompokkan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

### **2. Koding**

Dilakukan untuk memudahkan pengolahan data yaitu dengan melakukan pengkodean pada daftar pertanyaan yang telah diisi yaitu setiap keluhan/jawaban dari pasien.

### **3. Tabulasi**

Setelah dilakukan pengkodean kemudian data dimasukkan kedalam tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk memudahkan penganalisaan data.

### **4. Analisis Data**

Setelah selesai pembuatan kode selanjutnya dengan pengolahan data kedalam satu tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki.

#### **a. Analisis Univariat**

Dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. Analisa ini menghasilkan distribusi dan presentasi dari tiap variabel yang diteliti.

b. Analisis Bivariat

Dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi. Data yang diperoleh dalam bentuk ordinal dianalisa dengan menggunakan uji statistik., uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemberian Stimulasi Kutaneus: Slow-Stroke Back Massage terhadap penurunan sensasi nyeri sendi pada pasien reumatik .

**F. Jadwal Penelitian**

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji kabupaten Gowa.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei 2012 sampai Juni 2012.

3. Prosedur pengumpulan data

- a. Mengurus kelengkapan surat pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Ketua Prodi Keperawatan kepada Kepala Poliklinik Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa
- b. Mencari sampel sesuai dengan kriteria inklusi
- c. Meminta persetujuan partisipan dengan memberikan penjelasan mengenai tujuan, kemudian menyerahkan lembar persetujuan untuk ditandatangani oleh responden.

- d. Membagi dua kelompok sampel yaitu kelompok kasus dan kelompok kontrol.
- e. Memberikan Stimulasi Kutaneus: Slow-Stroke Back Massage pada kelompok kasus selama 3 hari dengan 2 kali perlakuan selang waktu 1 jam. Sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan stimulasi kutaneus : Slow-Stroke Back Massage.
- f. Setelah stimulasi kutaneus : Slow-Stroke Back Massage diberikan , peneliti mengobservasi kembali sensasi nyeri sendi pada kelompok lansia yang diberi stimulasi kutaneus: Slow Stroke Back Massage (kelompok kasus ) dan kelompok kontrol yang tidak diberikan stimulasi Kutaneus :Slow-storke Back Massage menggunakan tabel penilaian tingkat nyeri.
- g. Melakukan langkah-langkah pengolahan data.

#### **G. Etika Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti memandang perlu adanya rekomendasi dari pihak lain dengan mengajukan permohonan izin kepada instansi tempat penelitian dalam hal ini Panti sosial Tresna werdha (PSTW) Gau Mabaji kabupaten Gowa.

Etika penelitian bertujuan untuk melindungi hak-hak subjek antara lain menjamin kerahasiaan identitas responden dan kemungkinan terjadinya ancaman terhadap responden. Setelah mendapat persetujuan barulah peneliti melakukan penelitian dengan memperhatikan masalah etika yang meliputi :

1. Informed Consent

Lembar persetujuan diberikan kepada responden yang akan diteliti yang memenuhi kriteria inklusi. Kepada responden dijelaskan tentang manfaat dan resiko penelitian yang mungkin muncul. Bila subjek menolak maka peneliti tidak akan memaksakan kehendak dan tetap menghormati hak-hak subjek.

2. Anomity

Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan mencantumkan nama responden tetapi lembar tersebut diberi kode.

3. Confidentiality

Kerahasiaan informasi dari responden dijamin, peneliti hanya melaporkan data tertentu sebagai hasil penelitian.



## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9 Juli sampai 22 Juli 2012, di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 100 orang, pengambilan sampel dengan menggunakan teknik Non Probability yaitu purposive sampling yang mana jumlah sampel yang menjadi subyek penelitian ini adalah 12 sampel masing-masing 6 untuk kelompok kontrol dan 6 untuk kelompok kasus.

Dalam penelitian ini peneliti membagi sampel dalam dua kelompok yaitu kelompok lansia sebagai kontrol dan kelompok lansia sebagai kasus. Pada kelompok kasus diberikan intervensi Slow-stroke Back Massage sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan intervensi Slow-stroke Back Massage. Pada kedua kelompok diawali dengan observasi nyeri sebelum intervensi Slow-stroke Back Massage. Setelah dilakukan intervensi pada lansia kelompok kasus, maka kedua kelompok diobservasi kembali skala nyerinya.

Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan pengolahan data meliputi Editing, koding dan tabulasi. Selanjutnya data dalam bentuk ordinal di analisa dengan analisis Univariat dan analisis bivariat.

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan, maka hasil penelitian dapat disajikan sebagai berikut :

#### **1. Analisis Univariat**

- a. Distribusi frekuensi Jenis kelamin, umur dan pendidikan ( Karakteristik Responden)

Distribusi frekuensi pada lansia berdasarkan Jenis Kelamin, umur dan pendidikan di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan jenis Kelamin  
di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji  
Kabupaten Gowa

Jenis Kelamin	N	%
Laki- laki	5	41,7
Perempuan	7	58,3
Total	12	100

Sumber : Data Primer 2012

Dari tabel 5.1 ditemukan bahwa frekuensi responden terbanyak adalah perempuan sebanyak 7 orang ( 41,7 %). Sisanya adalah laki-laki dengan jumlah 5 orang ( 58,3%).

Tabel 5.2  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur  
di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji  
Kabupaten Gowa

Umur	N	%
Lanjut Usia (Elderly)	7	58,3
Lanjut Usian Tua ( Old)	5	41,7
Total	12	100

Sumber : Data Primer 2012

Dari tabel 5.2 ditemukan bahwa frekuensi Responden terbanyak adalah dengan Lanjut usia( Elderly) sebanyak 7 orang (58,3% ).sedangkan lanjut Usia Tua (Old) sebanyak 5 orang ( 41,7 %)

Tabel 5.3  
Distribusi Frekuensi berdasarkan Pendidikan  
di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji  
Kabupaten Gowa

Pendidikan	N	%
Tidak Sekolah	7	58,3
SD	2	16,7
SMP	2	16,7
SMA	1	8,3
Total	12	100

*Sumber : Data Primer 2012*

Dari tabel 5.3 ditemukan bahwa frekuensi responden terbanyak adalah Responden yang tidak pernah mengenyam pendidikan atau tidak sekolah adalah sebanyak 7 orang ( 58,3 %), sedangkan frekuensi responden yang bersekolah sampai jenjang Sekolah Dasar ( SD ) adalah sebanyak 2 orang (16,7%), persentasi yang sama juga ditunjukkan pada frekuensi responden yang mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Pertama ( SMP), sementara yang mengenyam pendidikan sampai pada Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah 1 orang ( 8,3 %).

- b. Distribusi frekuensi Lama menderita nyeri sendi, Lokasi Nyeri, Karakter nyeri, Waktu muncul nyeri, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 5.4  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Karakteristik  
(Lama Menderita Nyeri Sendi) di Panti Sosial Tresna  
Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa

Lama Nyeri	N	%
6 Bulan	12	100
1Bulan	0	0
1 Minggu	0	0
Total	12	100

Sumber :Data primer 2012

Jumlah lansia berdasarkan lama menderita nyeri sendi dalam tabel 5.4 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini semua responden telah mengalami nyeri sendi selama 6 Bulan (100 %).

Tabel 5.5  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lokasi Nyeri  
di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji  
Kabupaten Gowa

Lokasi Nyeri	N	%
Sendi- sendi Tubuh	11	91,7
Punggung	1	8,3
Total	12	100

Sumber : Data Primer 2012

Pada tabel 5.5 Responden yang mengalami nyeri pada Lokasi/ titik nyeri di sendi –sendi Tubuh adalah yang terbanyak yaitu sebanyak 11 orang (91,7%), sedangkan responden dengan nyeri pada lokasi punggung adalah sebanyak 1 orang ( 8,3 %). Sementara responden dengan lokasi nyeri di titik lain di tubuh tidak ada.

Tabel 5.6  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Karakter Nyeri  
di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji  
Kabupaten Gowa

Karakter Nyeri	N	%
Terikat	3	25,0
Remuk	2	16,7
Tumpul/tajam	7	58,3
Total	12	100

Sumber : Data Primer 2012

Pada tabel 5.6 jumlah lansia yang berdasarkan karakteristik nyeri sendi menunjukkan bahwa responden yang mengalami nyeri sendi dengan karakter tajam dan sebanyak 7 orang ( 58,3%), adalah terbanyak dibandingkan dengan responden yang mengalami nyeri dengan karakter terikat dan susah digerakkan sebanyak 3 orang (25,0 %) dan yang paling sedikit adalah responden dengan karakter nyeri remuk dan tak berdaya hanya 2 orang ( 16,7%).

Tabel 5.7  
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Waktu Muncul Nyeri  
di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji  
Kabupaten Gowa

Waktu Muncul Nyeri	N	%
Pagi Hari	10	83,3
Malam hari	2	16,7
Total	12	100

Sumber : Data Primer 2012

Dari tabel 5.7 di peroleh data lansia yang mengalami nyeri sendi pada pagi hari adalah 10 orang (83,3%) jumlah ini lebih banyak daripada

jumlah lansia yang mengalami nyeri pada malam hari yakni 2 orang (16,7%)

- c. Distribusi Observasi tingkatan Nyeri sebelum Masase Kulit untuk memperoleh gambaran distribusi responden berdasarkan tingkatan nyeri sebelum Masase Kulit di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.8  
Distribusi Responden Berdasarkan Observasi Tingkatan Nyeri Sendi sebelum Masase Kulit di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa

Tingkatan Nyeri Sebelum Masase Kulit	Lansia dengan Reumatik				Total	
	kontrol		kasus			
	N	%	N	%	n	%
Nyeri Ringan	1	16,7	0	0	1	16,7
Nyeri Sedang	5	83,3	4	66,6	9	75
Nyeri Berat	0	0	2	33,3	2	16,6
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>100</b>

Sumber :Data Primer 2012

Pada tabel 5.8 distribusi lansia berdasarkan observasi tingkatan nyeri sendi sebelum masase kulit menunjukkan bahwa lebih dari setengah total responden lansia yang ada mengalami mengalami nyeri sedang yaitu sebanyak 9 orang (75 %), masing-masing 5 orang ( 83,3%) kelompok kontrol dan 4 orang ( 66,6%) kelompok kasus sedangkan pada nyeri berat pada kelompok kasus 2 orang (33,3%) dan tidak ada responden pada

kelompok kontrol yang mengalami nyeri berat. Sedangkan yang mengalami nyeri ringan hanya 1 orang pada kelompok kontrol, dan tidak ada responden pada kelompok kasus yang mengalami nyeri ringan.

d. Distribusi observasi setelah Masase Kulit.

Untuk memperoleh gambaran distribusi responden berdasarkan observasi tingkatan nyeri setelah masase kulit di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.9  
Distribusi Frekuensi Berdasarkan Observasi Tingkatan Nyeri Sendi Setelah Masase Kulit di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa

Tingkatan Nyeri Setelah Masase Kulit	Lansia dengan Reumatik				Total	
	kontrol		kasus			
	N	%	N	%	n	%
Nyeri Ringan	4	66,6	2	33,3	6	50
Nyeri Sedang	2	33,3	4	66,6	6	50
Nyeri Berat	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>6</b>	<b>100</b>	<b>12</b>	<b>100</b>

Sumber : data primer 2012

Pada tabel 5.9 di atas diperoleh informasi distribusi lansia berdasarkan observasi tingkatan nyeri sendi setelah Masase Kulit menunjukkan bahwa pada responden kelompok Kontrol ditemukan tingkat nyeri yang terbanyak adalah nyeri ringan yaitu sebanyak 4 orang (66,6 %), sedangkan pada kelompok kasus hanya 2 orang (33,3%). Sementara lansia yang mengalami



pemberian intervensi Masase Kulit responden justru meningkat menjadi 4 orang dengan nyeri ringan (66,6%) dan 2 orang dengan Nyeri sedang (33,3%). Sementara pada kelompok kasus tingkatan nyeri terbanyak sebelum masase kulit adalah nyeri sedang yakni 4 orang(66,6%) 2 orang dengan nyeri berat (33,3%). Sedangkan setelah pemberian Masase Kulit responden terbanyak pada tingkatan nyeri sedang yakni 4 orang (66,6 %) dan 2 orang (33,3%) dengan nyeri ringan.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dan disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian Masase Kulit terhadap penurunan Sensasi nyeri sendi pada pasien Reumatik di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa, maka pembahasan hasil penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

### **1. Analisis Univariat**

Nyeri merupakan kondisi berupa perasaan tidak menyenangkan bersifat sangat subyektif karena perasaan nyeri berbeda pada setiap orang dalam hal skala atau tingkatannya, dan hanya orang tersebutlah yang dapat menjelaskan atau mengevaluasi rasa nyeri yang di alaminya.( Aziz Alimul, 2006).

Respon perilaku klien terhadap nyeri yang dapat di observasi dalam penelitian ini mencakup: Perhatian Klien terhadap nyeri, kecemasan Klien tentang nyerinya, Pernyataan Verbal Klien terhadap nyeri yang dirasakan, perspirasi ( Pengeluaran keringat melalui pori-pori kulit, kelembaban kulit ), suara klien (dapat menangis, berteriak, mengaduh, mendengkur), Nausea,

ketegangan Otot ( dapat berupa kekakuan, tegang, gelisah), interaksi social ( berupa menghindari percakapan, kontak social, focus pada nyeri yang dirasakan), ekspresi wajah ( dapat berupa meringis, bermuka masam, mulut dan gigi terkatup, menggeretakkan gigi), ktifitas persendian, ( Tidak mampu menggerakkan kaki dan tangan, persendian, serta ketidakmampuan melakukan aktifitas).

Menurut Teori Suyono ,S.,(2001) menyatakan bahwa nyeri sendi yang dirasakan dengan karakter nyeri seperti terikat, kaku, susah digerakkan dan pada kasus-kasus tertentu terasa tumpul dan tajam disebabkan karena desakan cairan yang berada di sekitar jaringan. Nyeri pada malam hari dan pagi hari terutama dirasakan sebagai suatu regangan akibat peningkatan tekanan intrakranial akibat suatu nekrosis avaskuler atau kolaps tulang akibat arthritis yang berat.

Respon-respon perilaku klien yang di observasi dapat berada pada tingkat skala nyeri yang paling berat, namun dapat pula pada skala yang paling ringan. Hal ini apat dilihat pada masing- masing kelompok.

**a. Keluhan Nyeri Sebelum Masase Kulit**

1). Kelompok Kontrol

Dari tabel 5.8 menunjukkan bahwa saat observasi nyeri sebelum Masase Kulit dilakukan pada kelompok kontrol, ditemukan nyeri terbanyak adalah nyeri sedang yakni 5 orang (83,3 %), urutan kedua yaitu tingkatan nyeri ringan yaitu 1 orang (16,7%). Nyeri merupakan gejala umum. Salah satu ketakutan paling ini dirasakan pada setiap klien yang

didiagnosis suatu penyakit ialah kekhawatiran nyeri yang akan mereka rasakan.

Pada kelompok kontrol yang tidak diberikan intervensi, nyeri sedang merupakan keluhan terbanyak dibanding dengan nyeri ringan,,bahkan tidak ada responden pada kelompok kontrol yang mengalami nyeri berat. Dimana nyeri itu sendiri merupakan suatu kondisi yang lebih dari sekedar sensasi tunggal yang disebabkan oleh stimulus tertentu. Nyeri bersifat subyektif dan sangat individualis. Nyeri mengarah kepada ketidakmampuan.

Menurut Dra Adelia, S, 2011, sekitar 50 persen keluhan nyeri sendi disebabkan oleh pengapuran. Pengapuran berarti menipisnya tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan persendian. Bantalan dalam persendian yang Aus itu menyebabkan terjadinya gesekan tulang sehingga menyebabkan nyeri. Pengapuran ini merupakan proses degenerasi yang dimulai pada usia 40 tahun. Kecepatan proses degenerasi berbeda pada tiap-tiap orang.

## 2). Kelompok Kasus

Pada tabel 5.8 menunjukkan bahwa saat observasi nyeri sebelum Masase Kulit dilakukan pada kelompok kasus, tingkatan nyeri terbanyak adalah nyeri sedang dengan jumlah 4 orang (66,6%), sedangkan 2 orang dengan nyeri berat (33,3%). Dan pada kelompok ini tidak ada lansia yang mengalami nyeri ringan.

Penurunan tingkat nyeri pada kelompok kasus, tidak serta merta berubah dari tingkat nyeri berat ke nyeri ringan, tetapi bertahap. Misalnya responden yang sebelum diobservasi mengalami nyeri berat, setelah di Masase berubah menjadi nyeri sedang,, begitupula pada responden yang awalnya mengalami nyeri sedang, berubah menjadi nyeri ringan setelah di berikan Masase Kulit.

Pada kelompok kasus yang merupakan kelompok yang diberikan intervensi, nyeri sedang merupakan karakteristik yang lebih besar daripada lansia yang mengalami nyeri berat. Dimana nyeri yang dirasakan membuat lansia tidak dapat beraktifitas. Nyeri yang dirasakan ada yang bersifat akut dan kronik. Dan yang dialami oleh lansia adalah umumnya nyeri kronis akibat rematik.

Sekitar 50 % keluhan reumatik adalah osteoarthritis yang merupakan peradangan pada sendi yang disebabkan karena rapuhnya atau pengeroposan kapsul sendi, sehingga merusak lapisan tulang rawan yang menutup permukaan ujung-ujung tulang.

**b. Keluhan Nyeri setelah Masase Kulit**

1). Kelompok kontrol

Pada tabel 5.9 menunjukkan bahwa observasi nyeri setelah Masase Kulit terdapat 4 orang (66,6 %) dengan nyeri Ringan dan 2 orang dengan nyeri sedang (33,3 % ). Nyeri sendi yang dialami oleh lansia sejalan dengan penurunan seluruh fungsi sistem dalam tubuh. Dan yang paling

tampak adalah penurunan fungsi sendi yang dialami mulai dari usia 40 tahun.

Sendi seseorang dapat mulai bermasalah pada usia 40-an. Namun ada orang yang sampai usia 70-an sendinya masih baik-baik saja. Cepat lambatnya proses tersebut ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor resiko antara lain, mutu tulang rawan dan kelebihan berat badan. Tulang rawan yang bagus akan lebih tahan terhadap kondisi aus.

## 2). Kelompok kasus

Pada tabel 5.9 menunjukkan bahwa observasi nyeri setelah Masase Kulit terdapat 2 orang (33,3%) responden dengan nyeri ringan, dan 4 orang (66,6 %) responden dengan nyeri sedang.

Respon nyeri yang dialami lansia dengan reumatik biasanya dipengaruhi oleh karakter responden dan karakter nyeri. Karakter responden yaitu jenis kelamin, umur dan pendidikan. Sedangkan karakter nyeri yaitu, lama menderita nyeri, lokasi nyeri, karakter nyeri dan waktu muncul nyeri.

Menurut teori Suyono, S (2001), menyatakan bahwa yang paling beresiko terkena reumatik adalah perempuan dibanding laki-laki. Secara keseluruhan dibawah 45 tahun frekuensi terjadinya reumatik kurang lebih sama pada laki-laki dan perempuan. Namun diatas 50 tahun perempuan lebih banyak menderita reumatik. Hal ini menunjukkan adanya peran hormonal pada patogenesis reumatik.

Pada usia 50 tahun ke atas wanita akan mengalami menopause, seiring dengan ovarium akan mengisut, produksi estrogen akan menurun. Menurunnya produksi estrogen mengurangipembentukan osteoblas tetapi meningkatkan aktifitas osteoklas (sel-sel yang menfagosit tulang). Hal ini akan mengurangi kepadatan tulang, tulang menjadi rapuh dan rentan terhadap infeksi dan degenerasi. Tulang akan mengeras dan mengalami hipertrofi pada permukaan sendi dan ligament akan mengalami kalsifikasi sebagai akibatnya terbentuk efusi sendi yang steril dan terjadi sinovitis sekunder.

Nyeri sendi yang berlangsung lama biasanya lebih dari 6 bulan. Selama proses penyakit nyeri yang hilang timbul atau intermitten, tergantung pada pencetus nyeri. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Reeves (1999) yang menyatakan bahwa nyeri sendi pada kasus reumatik merupakan nyeri yang bersifat kronik. Nyeri ini berlangsung lama, intensitas bervariasi, bersifat menetap dan intermitten dan biasanya berlangsung lebih dari 6 bulan.

## **2. Analisis Bivariat**

Pengaruh pemberian Masase Kulit terhadap penurunan sensasi nyeri sendi

### **1) Kelompok Kontrol**

Kelompok kontrol adalah responden yang tidak diberikan intervensi Masase Kulit. Pada analisa statistik Non parametrik dengan menggunakan U<sub>i</sub> U Mann-Whitney tidak ditemukan nilai yang bermakna dengan nilai signifikansi 0,523 lebih besar dari  $\alpha=0,05$ .

Pada tabel 5.10 menunjukkan bahwa saat observasi nyeri sebelum pemberian Masase Kulit ditemukan 1 orang (16,7%) dengan nyeri ringan namun setelah di observasi kembali justru mengalami peningkatan yakni 4 orang (66,6 %). Peningkatan ini diduga akibat semakin beratnya perjalanan reumatik.

Sebagian responden yang mengalami nyeri sedang tergolong masih dapat melaksanakan aktifitasnya. Menurut teori yang di kemukakan oleh Suyono S., (2001) menyatakan bahwa sensasi nyeri sendi yang dialami dapat berkurang bila klien beraktifitas. Setelah digerak-gerakkan, cairan synovial akan menyebar dari jaringan yang mengalami inflamasi sehingga pasien merasa terlepas dari ikatan nyeri yang disebabkan karena kekakuan.

Sementara pada tingkat nyeri sedang sebelum diberikan Masase Kulit pada kelompok Kontrol terdapat 5 orang (83,3 %) tetapi setelah di observasi kembali menurun menjadi 2 orang (33,3 %).

Peneliti juga berasumsi bahwa penurunan jumlah ini dipengaruhi oleh adanya faktor psikologis, dimana dengan memberikan perhatian yang lebih dapat juga menurunkan sensasi nyeri yang bersifat subyektif yang dirasakan oleh klien. Mereka yang berusia lanjut secara harfiah kembali kepada masa seperti saat balita dimana mereka membutuhkan perhatian, kasih sayang yang lebih.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Potter dan Perry 2005, bahwa respon nyeri seseorang dipengaruhi oleh Usia, jenis kelamin, budaya, perhatian, makna nyeri, gaya koping yang digunakan, kecemasan

dan stressor lain. Lingkungan dan dukungan orang terdekat, pengalaman nyeri yang lalu. Faktor lain yang bermakna mempengaruhi respon nyeri adalah kehadiran orang-orang terdekat klien dan bagaimana sikap mereka terhadap klien. Individu yang mengalami nyeri seringkali bergantung pada anggota keluarga atau teman dekat untuk memperoleh dukungan, bantuan dan perlindungan. Dengan memberikan perhatian kepada lansia dapat membuat lansia merasa nyaman dan mempengaruhi respon nyeri yang dirasakan.

## 2). Kelompok Kasus

Berdasarkan analisa dengan menggunakan analisa Statistik Non parametrik yakni Uji U Mann-Whitney diperoleh kesimpulan bahwa ada pengaruh pemberian Masase Kulit terhadap penurunan sensasi nyeri sendi pada pasien reumatik. Hal ini ditandai dengan tingkat signifikansi  $p=0,014$  lebih kecil dari  $\alpha=0,05$ .

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa saat observasi nyeri sebelum pemberian Masase Kulit ditemukan 2 orang (33,3%) dengan nyeri berat namun setelah pemberian Masase Kulit sudah tidak ada lagi responden yang mengalami nyeri berat. Pada tingkat nyeri sedang terdapat 4 orang (66,6%), dan setelah pemberian masase Kulit tetap terdapat 4 orang yang mengalami nyeri pada tingkat sedang. Sedangkan pada tingkat nyeri ringan setelah diberikan Masase Kulit terdapat 2 orang (33,3%) .

Peneliti berpendapat bahwa berkurangnya rasa nyeri atau menurunnya sensasi nyeri dari nyeri berat menjadi nyeri sedang, dari nyeri sedang

menjadi nyeri ringan karena efek dari panas. Efek dari panas dapat memperlambat impuls motorik menuju otot yang dapat mengurangi spasme/ kekakuan pada area persendian, serta relaksasi yang maksimal.

Menurut teori Perry dan Potter (1997) menyatakan bahwa respon fisiologis tubuh terhadap panas adalah vasodilatasi, viskositas darah menurun, ketegangan otot menurun, metabolisme jaringan meningkat, serta permeabilitas kapiler.

Teori gate control yang dikemukakan oleh Melzack dan Wall (1965) dalam Potter dan Perry (1997) menyatakan bahwa impuls nyeri dihantarkan saat sebuah pertahanan dibuka dan impuls dihambat saat sebuah pertahanan tertutup. Mekanisme pertahanan ini dapat ditemukan di sel-sel gelatinosa substansia di dalam kornu dorsalis pada medulla spinalis, thalamus dan system limbik. Apabila masukan yang dominan berasal dari serabut beta A, mekanoreseptor yang lebih cepat akan melepaskan neurotransmitter penghambat untuk menutup pertahanan . Dengan demikian hanya efek panas yang dominan dalam waktu yang cukup lama dapat menstimulasi mekanoreseptor sehingga dapat dilepaskan neurotransmitter yang menghambat terbukanya gerbang pertahanan di sel-sel gelatinosa substansia dalam medulla spinalis sehingga impuls tidak ditransmisikan ke pusat otak yang lebih tinggi bahkan ke korteks serebri untuk yang dipersepsikan. Selain itu penanganan nyeri ditinjau dari pandangan islam yaitu dapat dilakukan dengan banyak membaca Al-Quran

dan memperbanyak dzikir. Karena dengan memperbanyak dzikir dapat membuat hati tenang dan menurunkan sensasi nyeri.

Seperti yang dijelaskan dalam Surat Ar-Ra'ad/13;28

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ



Terjemahannya:

“(yaitu), orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang”.

Orang-orang yang mendapat petunjuk ilahi dan kembali menerima tuntunan-Nya, sebagaimana disebut pada Ayat yang lalu itu adalah orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang setelah sebelumnya bimbang dan ragu. ketenangan itu yang bersemi di dadamereka disebabkan karena dzikrullah, yakni mengingat Allah, atau karena ayat-ayat Allah yakni Al-Quran.

Dengan mengingat Allah, maka timbullah Tawakkal dan penyerahan diri kita kepada Allah. Allah SWT telah berpesan yaitu jangan menyembah selain dari pada-Nya. Ini berarti kita diperintahkan untuk meminta hanya kepada Allah yang Maha Esa dan dilakukan secara berkelanjutan. Kita sebagai manusia biasanya tidak terlepas untuk berhadapan dengan ujian dalam hidup. Semuanya itu adalah ujian dari Allah SWT yang berkuasa untuk menguji keimanan kita sebagai hambaNya. Oleh Karen itu, sudah seharusnya kita berprangka baik

terhadap Allah dan janganlah menyalahkannya jika terjadi sesuatu pada diri kita. Begitupun pada lansia yang mengalami nyeri sendi dapat memperbanyak berdzikir guna menenangkan hatidan pikirannya.

Sebagaiman kita ketahui Nyeri bersifat Subyektif dan sangat individualis dimana nyeri tersebut mengarah pada penyebab ketidakmampuan dan salah satu ketakutan paling dini dirasakan setiap klien yang didiagnosis suatu penyakit ialah kekhawatira nyeri yang akan mereka rasakan. Kekhawatiran ini dapat menyebabkan lansia menjadi depresi. Dan dengan banyak berdzikir hal tersebut dapat menenangkan hati dan menurunkan respon nyeri yang bersifat subyektif.



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa dari tanggal 09 Juli sampai dengan tanggal 22 Juli 2012 dapat disimpulkan bahwa :

1. Keluhan nyeri berdasarkan observasi sebelum Masase Kulit yaitu terbanyak pada tingkat nyeri sedang yaitu 9 orang (75%), masing-masing 5 orang (83,3%) pada kelompok control dan 4 orang (66,6%) pada kelompok kasus.
2. Pada kelompok kontrol tidak ada pengaruh yang signifikan pada pemberian Masase Kulit terhadap penurunan sensasi nyeri sendi pada pasien reumatik dengan nilai signifikan  $p=0,523$ .
3. Pada kelompok kasus ada pengaruh yang signifikan pada pemberian Masase Kulit terhadap penurunan sensasi nyeri sendi pada pasien reumatik dengan nilai signifikan  $p=0,014$ .

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi instansi Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji

- a. Agar pihak Instansi Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa lebih memperhatikan kesehatan para lansia dimana seminggu sekali mengontrol kesehatan para lansia.
  - b. Diharapkan dapat memberikan asuhan keperawatan yang optimal terutama intervensi Masase Kulit kepara lansia yang menderita Reumatik.
  - c. Dapat mensosialisasikan ketrampilan Masase Kulit kepada para lansia sehingga mereka dapat secara mandiri melakukan Masase Kulit bila ada serangan nyeri tanpa harus membutuhkan bantuan tenaga kesehatan maupun keluarga.
2. Bagi Instansi
- Demi meningkatkan keilmuan dan mutu pendidikan keperawatan, diharapkan perlunya untuk memperhatikan pengembangan informasi dan keterampilan mahasiswa dalam memberikan asuhan keperawatan pada penderita reumatik khususnya ketrampilan dalam memberikan intervensi Masase Kulit.
3. Bagi peneliti berikutnya
- Melihat bahwayeri sendi merupakan keluhan yang utama pada penderita reumatik yang dapat mengganggu aktivitas lansia, maka bagi peneliti berikutnya dapat meneliti tentang teknik nonfarmakologis lainnya untuk penurunan sensasi nyeri sendi antara lain: imajinasi terbimbing, Bio fed back, kompres parafin.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

Adelia, S, 2011., *Libas Rematik dan Nyeri Otot dari Hidup Anda.*, Yogyakarta: Brilliant Books

Akhmadi (2009), *Permasalahan Lanjut Usia ( Lansia)*. (On Line)

<http://kesehatan/326-permasalahan-lanjut-usia.html>. diakses Januari 2012

Bustan, M.N, 2007., *Epidemiologi: Penyakit Tidak Menular.*, Jakarta: Rineka Cipta

Badan Pusat Statistik Sulsel. 2009. *profil Kesehatan SULSEL*. makassar: Dinas Kesehatan SULSEL

Departemen Agama RI. 1996. *Al-Quran dan terjemahannya*. Semarang: Toha Putra

Departemen kesehatan RI. 2003. *Lansia dan Perawatannya*. Jakarta: Salemba Medika

Dr. Eleanorbul, 2007., *Nyeri Punggung.*, Jakarta

Ns Eni Kusyati, S.Kep, 2006., *Keterampilan dan Prosedur Laboratorium Keperawatan Dasar.*, Jakarta: EGC

Hidayat, A. (2005). *Kebutuhan Dasar Manusia*. Jakarta: Salemba Medika

Hidayat, A. Aziz Alimul, 2008. *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan ilmiah*, Jakarta: Salemba Medika

Hegner, Barbara R, 2003., *Asisten Keperawatan: Suatu Pendekatan Proses Keperawatan* ., Jakarta: EGC

Kementrian Koordinato Bidang Kesejahteraan Rakyat ( 2010). *Lansia Masa Kini Dan Mendatang*. (On Line) <http://tkskponorogo.com/2012/02/lansia-masa-kini-dan-mendatang.html>. diakses Januari 2012

Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* , Bierut dar bin Kasir, jilid 5, hal 2227 dan jilid 3 hal 1094.


Nugroho, Wahyudi. 2008. *Keperawatan Gerontik & Geriatri Ed.3*. Jakarta :EGC

Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.

Profil Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kab. Gowa. (2006). *Tidak diterbitkan*.

Pudjiastusi, S.S. & Utomo, B. (2003). *Fisioterapi pada Lansia*. Jakarta: EGC

- Potter dan Perry. (2006). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan Ed.4*. Jakarta: EGC
- Perry, Peterson, Potter.(2002).*Buku Saku Keterampilan dan Prosedur Dasar*. Ed 5. Terjemahan Rosida, D., Monika, E.2005.EGC.Jakarta
- Shihab, M. Quraish, 2002., *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an.*, Jakarta: Lentera Hati
- Stanley, Mickey.2006.*Buku Ajar Keperawatan Gerontik*. Jakarta:EGC.
- Suyono, S., Waspadji, S., Lesmana, L. et al. (2001). *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*. Ed 3. Jilid I,II..Jakarta: Penerbit FKUI
- Smeltzer, S.C & Bare, B.G.(2001).*Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*. Ed 8. Terjemahan Agung W, Monica, H.Y Kuncara. 2002 EGC. Jakarta.
- Tiro, Muhammad Ari, 2009., *Penelitian:Skripsi, Tesis, dan Disertasi.*, Makassar: Andira Publisher.



## Format Observasi Nyeri

### Sebelum Intervensi Masase Kulit

Nama : .....(Initial)

No. Kode Responden :.....

Tanggal Penelitian :.....

Petunjuk:

Berilah tanda Cecklist ( ) sesuai dengan skala nyeri seperti pada tabel skala tingkatan nyeri.

NO	Respon Yang di Observasi	NILAI					Total
		4	3	2	1	0	
1	Perhatian Klien terhadap nyeri						
2	Anxietas Klien tentang nyeri						
3	Verbalisasi klien tentang nyeri						
4	Perspirasi						
5	Suara						
6	Nausea						
7	Ketegangan Otot						
8	Interaksi Sosial						
9	Ekspresi Wajah						
10	Aktifitas Persendian						
<b>Total</b>							

## Format Observasi Nyeri

### Setelah Intervensi Masase Kulit

Nama : .....(Initial)

No. Kode Responden :.....

Tanggal Penelitian :.....

Petunjuk:

Berilah tanda Cecklist ( ) sesuai dengan skala nyeri seperti pada tabel skala tingkatan nyeri.

NO	Respon Yang di Observasi	NILAI					Total
		4	3	2	1	0	
1	Perhatian Klien terhadap nyeri						
2	Anxietas Klien tentang nyeri						
3	Verbalisasi klien tentang nyeri						
4	Perspirasi						
5	Suara						
6	Nausea						
7	Ketegangan Otot						
8	Interaksi Sosial						
9	Ekspresi Wajah						
10	Aktifitas Persendian						
<b>Total</b>							

## PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada

Yth. Bapak/ibu/Saudara(i)

Di- Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hamdayani

Nim : 70300108031

Adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang mengadakan penelitian tentang Pengaruh Pemberian Masase Kulit terhadap Penurunan Sensasi Nyeri Sendi pada Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Gau Mabaji Kabupaten Gowa.

Kegiatan yang di harapkan dari Bapak/Ibu /Saudara(i) adalah mengisi lembaran pernyataan yang diberikan oleh peneliti dan menjawab pertanyaan sesuai petunjuk yang diberikan. Akan saya jaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian saja serta bila sudah tidak digunakan lagi akan dimusnahkan.

Apabila Bapak/ibu/Saudara (i) bersedia, mohon tanda tangani lembaran persetujuan dan mengisi daftar pertanyaan yang disertakan dalam lembaran ini.

Demikian atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) diucapkan banyak terima kasih.

Peneliti

**(Hamdayani)**

## RIWAYAT HIDUP



**HAMDAYANI**, dilahirkan pada tanggal 27 Juli 1990 di Desa Kampiri, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, buah cinta pasangan Abdul Hakim S.Pd dan Hj. Darmah N, S.Pd.

Penulis memulai pendidikan di SDN.100 Bijinangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai pada tahun 1996 dan tamat pada tahun 2002. Penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Sinjai Utara pada tahun yang sama dan tamat pada tahun 2005. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di kota yang sama, yakni di SMA Negeri 2 Sinjai Utara pada tahun 2005 dan tamat pada tahun 2008. Pada tahun 2008, penulis mengikuti seleksi penerimaan Mahasiswa Jalur SPMB Lokal di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan diterima di Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan. Dan tahun 2012 penulis menyelesaikan studinya dengan diterimanya Skripsi yang berjudul “*Pengaruh pemberian Masase Kulit terhadap Penurunn Sensasi Nyeri Sendi pada Lansia di PSTW Gau Mabaji Kabupaten Gowa.*”

Pengalaman organisasi penulis salah satunya adalah pengurus HMJ Keperawatan, dan pengurus Lembaga Kemahasiswaan BEM Fakultas Ilmu Kesehatan periode 2011-2012.