

**PENGARUH SENAM REMATIK TERHADAP PENURUNAN NYERI DAN
PENINGKATAN RENTANG GERAK *OSTEOARTRITIS* LUTUT LANSIA**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

OLEH :

MUH. WAHID SANGRAH
70300113053

**JURUSAN KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Wahid Sangrah
NIM : 70300113053
Tempat/Tanggal Lahir : Jeneponto, 27 Juli 1994
Jur/Prodi/Konsentrasi : Keperawatan
Alamat : BTN Cita Alam Lestari
Judul : Pengaruh Senam Rematik Terhadap Penurunan Nyeri dan Peningkatan Rentang Gerak Osteoarthritis Lutut Lansia

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 10 Juli 2017

Penyusun



MUH. WAHID SANGRAH
70300113053

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pengaruh Senam Rematik Terhadap Penurunan Nyeri Dan Peningkatan Rentang Gerak Osteoarthritis Lutut lansia” yang disusun oleh Muh. Wahid Sangrah, NIM: 70300113053, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2017 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Makassar, 10 Juli 2017 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc (.....)

Sekretaris : Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes (.....)

Munaqisy I : Risnah, SKM., S.Kep., Ns., M.Kes (.....)

Munaqisy II : Erwin Hafid. Lc., M.Pdi., M.Ed (.....)

Pembimbing I : Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kes (.....)

Pembimbing II: Huriati S.Kep., Ns., M.Kes (.....)

Diketahui oleh:

 Dekan Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar 


Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc 
NIP: 19520811 198203 1 001

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt., atas rahmat dan hidayah-Nya yang masih tercurah kepada penulis, sehingga skripsi ini yaitu dapat terselesaikan, dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad saw. yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang sampai sekarang ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Sarjana Keperawatan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Tahun Akademik 2017, dengan judul penelitian **“Pengaruh Senam Rematik Terhadap Penurunan Nyeri Dan Peningkatan Rentang Gerak *Osteoarthritis* Lutut Lansia.”**

Dalam penyusunan skripsi ini berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh peneliti, mulai dari tahap persiapan, pengumpulan bahan materi sampai penyelesaian tulisan, namun itu tidak menjadi penghalang bagi peneliti berkat karunia Allah swt dan tentunya berkat doa restu dan kasih sayang kedua orang tua tercinta yang memberikan motivasi dan dukungan serta bantuan pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing kami dan memberikan masukan-masukannya serta dukungan teman-teman sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua sayatercinta ,Ayahanda Muh. Rasang dan Ibunda Rahmatia atas cinta dan kasih sayang, dukungan baik materil, moril, maupun spiritual serta

motivasi yang diberikan kepada saya selama ini, serta keluarga besarku yang juga tiada hentinya memberikan dukungan serta doa restunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Prof. Dr. Musafir Pababbari M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta staf-stafnya atas bantuannya selama peneliti mengikuti pendidikan.
3. Dr.dr.H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.,selaku Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Para Wakil Dekan beserta staf Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu selama peneliti mengikuti pendidikan.
5. Dr. Anwar Hafid S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku Ketua Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Eny sutria S.Kep., Ns., M.Kes sebagai pembimbing I dan Huriati S.Kep.,Ns., M.Kes selaku pembimbing II, yang telah banyak membimbing dan memberi masukan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Risnah, SKM., S.Kep., M.Kes. dan Erwin Hafid. Lc., M.Pdi., M.Ed. selaku tim penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dalam pelaksanaan ujian hasil.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Keperawatan UIN Alauddin Makassar yang telah berjasa memberikan bekal pengetahuan untuk memperkaya dan mempertajam daya kritis penulis.
9. Kepala Puskesmas Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa beserta staf dan jajarannya yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian hingga selesai.


10. Kepada Sahabat jendral 013, Am13ulasi, Kkn Uinam angkatan 53 dan kawan-kawan seperjuangankuyang sudah membantu memberi begitu banyak inspirasi, inovasi, dan motifasi serta semangat dalam menyelsaikan skripsi ini.
11. Kepada himpunan mahasiswa jurusan keperawatan Uin Alauddin Makassar, himpunan mahasiswa islam komisariat kesehatan, himpunan mahasiswa keperawatan sulawesi selatan, dan ikatan lembaga mahasiswa ilmu keperawatan indonesia sebagai wadah pengembangan intelektual menuju insan cipta, yang akademis, dan pengabdian yang bernapaskan islam.

Semoga kebaikan yang diberikan kepada peneliti dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Dalam penullisan skripsi ini, peneliti menyadari masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga penelitian dimasa mendatang akan lebih baik. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan bacaan bagi perkembangan ilmu keperawatan. *Amin Yaa Rabbal Alamin.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Gowa, 10 Juli 2017

Penyusun



MUH. WAHID SANGRAH
70300113053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang.....	1
B. RumusanMasalah.....	4
C. TujuanPenelitian	5
D. ManfaatPenelitian	5
E. DefinisiOperasional	6
F. KajianPustaka	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Nyeri.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Rentang Gerak.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Osteoarthritis.....	21
D. Tinjauan Umum Tentang Senam Rematik.....	35

E. Kerangka Pikir	39
F. Kerangka Konsep.....	40

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
C. Populasi dan Sampel.....	42
D. Teknik Sampling.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Instrumen Penelitian	45
G. Pengolahan dan Analisis Data	45
H. Etika Penelitian.....	47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil puskesmas	50
B. Hasil penelitian	50
C. Analisa univariat.....	52
D. Analisa bivariat	54
E. Pembahasan	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Defenisi Operasioanal	6
Tabel 1.2 kajian pustaka.....	8
Tabel 4.1 karakteritikresponden.....	51
Tabel 4.2 hasil uji perbandingan skala nyeri dan rentang gerak pre test dan post test pada kelompok kontrol.....	54
Tabel 4.3 hasil uji perbandingan skala nyeri dan rentang gerak pre test dan post test pada kelompok intervensi	55
Tabel 4.4 hasil uji perbandingan skala nyeri dan rentang gerak post test pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol	56

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka konsep penelitian.....	35
Bagan 2.2 Alur penelitian	37
Bagan 4.1 Perbandingan skala dan nyeri rentang gerak pada kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol sebelum perlakuan	52
Bagan 4.2 Perbandingan skala dan nyeri rentang gerak pada kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol sesudah perlakuan.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SOP Senam Rematik


Lampiran 2 Lembar Kuesioner

Lampiran 3 Master Tabel kelompok kontrol dan perlakuan

Lampiran 4 Uji Normalitas kelompok intervensi dan kontrol

Lampiran 5 Uji Hubungan

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian



ABSTRAK

Nama : Muh. Wahid Sangrah
Nim : 70300113053
Judul : Pengaruh Senam Rematik Terhadap Penurunan Nyeri Dan Peningkatan Rentang Gerak Osteoarthritis Lutut Pralansia

Permasalahan pada lansia cukup banyak salah satunya osteoarthritis lutut yang dapat mengganggu aktivitas fisik lansia karena adanya peningkatan skala nyeri dan penurunan rentang gerak. Salah satu cara mengatasi osteoarthritis dengan mengikuti senam rematik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh senam rematik terhadap penurunan nyeri dan peningkatan rentang gerak osteoarthritis lutut pralansia. Penelitian ini merupakan penelitian *Quasi Experiment* dengan rancangan pretest posttest. Populasi penelitian ini adalah seluruh lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Samata yang memiliki masalah osteoarthritis. Dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu 12 responden pada kelompok intervensi dan 12 responden pada kelompok kontrol. Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan antara pemberian terapi senam rematik terhadap penurunan nyeri dan peningkatan rentang gerak osteoarthritis lutut pralansia dimana dari hasil uji *Mann-Whitney Test* diperoleh $p = 0.000$ (skala nyeri) dan $p = 0.017$ (rentang gerak) atau $p \text{ value} < 0.05$ yang artinya ada hubungan yang signifikan untuk penurunan nyeri.

Kata kunci : *Skala Nyeri, Rentang Gerak, Osteoarthritis lutut, Senam rematik.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Osteoarthritis merupakan penyakit sendi degeneratif pada kartilago sendi dengan perubahan reaktif pada batas-batas sendi, seperti pembentukan osteofit, perubahan tulang subkondral, perubahan sumsum tulang, reaksi fibrous pada sinovium, dan penebalan kapsul sendi (Ervan, 2011 dalam Yuliastari, 2012).

Osteoarthritis (OA) merupakan penyakit persendian yang kasusnya paling umum dijumpai secara global, suatu penyakit kerusakan tulang rawan sendi yang berkembang lambat dan tidak diketahui penyebabnya, meskipun terdapat beberapa faktor resiko yang berperan. Keadaan ini berkaitan dengan usia lanjut (Elvira, 2010). Diketahui bahwa OA diderita oleh 151 juta jiwa di seluruh dunia dan mencapai 24 juta jiwa di kawasan Asia Tenggara.

Menurut organisasi kesehatan dunia *World Health Organization* (WHO) dalam Sabara (2013), prevalensi penderita osteoarthritis di dunia pada tahun 2004 mencapai 151,4 juta jiwa dan 27,4 juta jiwa berada di Asia Tenggara. Di Indonesia, prevalensi osteoarthritis mencapai 5% pada usia <40 tahun, 30% pada usia 40-60 tahun, dan 65% pada usia >61 tahun. Untuk osteoarthritis lutut prevalensinya cukup tinggi yaitu 15,5%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *Centers for Disease Control and Prevention* (2007), 38% (17 juta) penderita penyakit rematik di Amerika Serikat mengeluhkan keterbatasan fungsi fisik akibat dari pada penyakitnya Eustice (2007). Sementara, berdasarkan hasil penelitian dari

Qing(2008) prevalensi nyeri rematik di beberapa negara ASEAN adalah, 26.3% Bangladesh, 18.2% India, 23.6-31.3% Indonesia, 16.3% Filipina, dan 14.9% Vietnam. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Negara Indonesia mempunyai prevalensi nyeri rematik yang cukup tinggi dimana keadaan seperti ini dapat menurunkan produktivitas Negara akibat keterbatasan fungsi fisik penderita yang berdampak terhadap kualitas hidupnya.

Prevalensi penyakit sendi di Indonesia juga cukup tinggi, sebesar 24,7%. Pada usia 45-54 prevalensinya sebesar 37,2%, usia 55-64 sebesar 45,0%, usia 65-74 sebesar 51,9% dan usia lebih dari 75 sebesar 54,8% (RISKESDAS, 2013). Secara khusus prevalensi osteoarthritis di Indonesia berjumlah 5% pada usia < 40 tahun, 30% pada usia 40-60 tahun dan 65% pada usia > 61 tahun (Bactiar, 2010). Untuk provinsi Sulawesi Selatan, prevalensi penyakit ini adalah 27,7%, Prevalensi penyakit sendi berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan atau gejala tertinggi di Nusa Tenggara Timur (33,1%), diikuti Sumatera barat (33%), Jawa Barat (32,1%), dan Bali (30%)(RISKESDAS, 2013).

Alasan peneliti memilih lokasi di wilayah kerja puskesmas Samata kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa karena jumlah lansia yang terdaftar termasuk angka yang cukup tinggi yaitu mencapai 750 jiwa. Dan menurut data dari puskesmas samata terdaftar 243 jumlah lansia yang memiliki ciri-ciri osteoarthritis lutut. Dimana osteoarthritis merupakan masalah penyakit yang hampir semua lansia alami di wilayah kerja puskesmas samata.

Penyebab pasti dari osteoarthritis belum bisa dipahami dengan baik dan belum bisa dipastikan. Secara tradisional, penuaan dan beban berat tubuh yang berlebihan dipahami sebagai 2 faktor dominan. Namun, osteoarthritis tidak

dapat langsung terjadi karena dua faktor tersebut (McCarthy dan Frassica, 2015). Selain usia dan beban berat tubuh berlebih, faktor trauma, gaya hidup, dan genetika, telah disebut-sebut sebagai faktor predisposisi dalam perkembangan osteoarthritis (Meiner, 2011).

Kejadian osteoarthritis biasanya ditemukan pada pasien yang mempunyai faktor resiko. Faktor resiko pada pasien osteoarthritis terbagi menjadi faktor yang bisa dimodifikasi dengan faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Faktor yang tidak bisa dimodifikasi adalah genetik, usia, dan jenis kelamin (Zhang Y, 2010). Pertambahan usia dan obesitas pada populasi barat menjadikan faktor resiko utama pada timbulnya osteoarthritis (Zhang Y, 2010). Adapun faktor resiko yang dapat dimodifikasi untuk mencegah terjadinya osteoarthritis antara lain seperti cedera sendi, kegiatan fisik, kelainan metabolic, pekerjaan dan kelainan pertumbuhan (Mary B, 2011).

Secara non-farmakologi, tatalaksana yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengurangi beban pada sendi (memperbaiki postur tubuh yang salah, beban berlebihan pada sendi yang terlibat harus dihindarkan, pasien rematik, pinggul atau lutut harus menghindari berdiri lama, berlutut dan berjongkok dan istirahat secukupnya tanpa immobilisasi total). Selain itu, dilakukan modalitas termis dengan aplikasi panas pada sendi rematik atau mandi dengan air hangat. Pasien juga di minta untuk berolahraga. Selanjutnya diberikan edukasi pada pasien (edukasi tentang manajemen diri, motivasi, nasihat tentang olahraga, rekomendasi untuk mengurangi beban pada sendi yang terlibat) (Fauci, A. S., & Langford, C.A., 2006). Salah satu

teknik gerakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi nyeri pada penderita rematik yaitu dengan melakukan gerakan senam rematik.

Masalah dalam penelitian ini yaitu tingginya angka kejadian dan masalah penyakit osteoarthritis pada lansia dan pralansai di wilayah kerja puskesmas samata yang menyebabkan lansia mengalami hambatan fisik atau mengalami kekakuan sendi saat beraktivitas. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian senam rematik karna caranya yang cukup mudah dan efisien, tetapisangat bermanfaat dan berkhasiat untuk menurunkan nyeri osteoarthritis lutut dan peningkatan rentang gerak pada penderita osteoarthritis.

Senam rematik merupakan salah satu metode yang praktis dan efektif dalam memelihara kesehatan tubuh. Gerakan yang terkandung dalam senam rematik adalah gerakan yang sangat efektif, efisien, dan logis karena rangkaian gerakannya dilakukan secara teratur dan terorganisasi bagi penderita rematik (Wahyudi Nugroho, 2008).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu “bagaimanapengaruh senam rematik terhadap penurunan nyeri dan peningkatan rentang gerak pada *osteoarthritis* lututlansia?”

C. Hipotesis

Hipotesis alternatif (ha) Ada pengaruh senam rematik terhadap penurunan nyeri dan peningkatan rentang gerak osteoarthritis lutut pada lansia.

D. Tujuan penelitian

1. Tujuan Umum

Diketahui pengaruh senam rematik terhadap penurunan nyeri dan peningkatan rentang gerak pada penderita nyeri osteoarthritis lutut.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui tingkat nyeri sebelum diberikan senam rematik.
- b. Diketahui rentang gerak sebelum diberikan senam rematik.
- c. Diketahui tingkat nyeri setelah diberikan senam rematik.
- d. Diketahui rentang gerak setelah diberikan senam rematik.
- e. Diketahui perubahan tingkat nyeri sebelum dan setelah senam rematik.
- f. Diketahui perubahan rentang gerak sebelum dan sesudah senam rematik.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang peneliti harapkan setelah proses penelitian yaitu:

1. Bagi peneliti

Sebagai referensi yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya, menambah pengetahuan peneliti terhadap pengaruh senam rematik terhadap penurunan nyeri osteoarthritis lutut. Serta peneliti selanjutnya dapat mengembangkan apa yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Misalnya, dengan mencari bentuk variabel lain.

2. Bagi institusi

Sebagai salah satu wawasan baru bagi mahasiswa dalam menurunkan keluhan nyeri dan peningkatan rentang gerak dengan menggunakan senam rematik.

3. Bagi masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui informasi yang terkait dengan penelitian ini agar bisa menjadi acuan dalam menjalani pola hidup yang sehat kedepannya.

F. Definisi Operasional

Tabel 1.1 Definisi Operasional.

No	Variabel	Definisi	Alat Ukur	Skala	Hasil Ukur
1.	Independen : Senam Rematik	Pemberian senam rematik yang dilakukan pada responden untuk salah satu tindakan terapi pengobatan. Pemberian dilakukan setelah melakukan observasi tingkat skala nyeri (pre). Pelaksanaan ini dilakukan selama 1 minggu yaitu hari kedua hingga hari kedelapan.dengan frekuensi 1 kali pemberian senam dalam sehari yaitu pada pagi hari.	Observasi, leaflet, sop senam rematik		
2.	Dependen: Nyeri osteoetritis	Penurunan rasa nyeri osteoarthritis merupakan keadaan dimana nyeri osteoarthritis lutut	Observasi	Skala nyeri: 1) 0: Tidak Nyeri 2) 1-2: Nyeri Ringan	

		<p>menurun secara signifikan. pengukuran dilakukan 2 kali. pengukuran skala nyeri awal (pre) dilakukan setelah melakukan observasi tingkat skala nyeri pada hari pertama dan sebelum pemberian intervensi senam rematik. Kemudian dilakukan pengukuran kedua (post) pada hari ke sembilan setelah intervensi selama 1 minggu.</p>		<p>3) 3-5: Nyeri Sedang 4) 6-7 : Nyeri Berat 5) 8-10: Nyeri Yang Tidak Tertahankan</p>
	Rentang gerak	<p>Penurunan rentang gerak osteoarthritis merupakan keadaan dimana rentang gerak osteoarthritis lutut menurun secara signifikan. pengukuran dilakukan 2 kali. pengukuran rentang gerak awal (pre) dilakukan setelah melakukan observasi tingkat rentang gerak pada hari pertama dan sebelum pemberian intervensi senam rematik. Kemudian dilakukan pengukuran kedua (post) pada hari ke sembilan setelah intervensi selama 1</p>	Observasi	<p>Derajat I: gerakan penuh tanpa hambatan (normal: 100%) Derajat II : gerakan tidak penuh (good: 75%) Derajat III: gerakan tidak penuh ada hambatan (fair: 50%) Derajat IV: gerak ada hambatan (poor: 25%) Derajat V: tidak gerak (trace: 0%)</p>

		minggu.			
--	--	---------	--	--	--

G. Kajian Pustaka

Tabel 1.2 Kajian Pustaka


No	Judul Penelitian	Tujuan	Metode	Hasil	Persamaan dengan Riset	Perbedaan dengan Riset
1.	Perbedaan Nyeri Rematik Sebelum Dan Sesudah Senam Rematik Pada Lansia Di Desa Handipolo Kudus.	Untuk mengetahui pengaruh senam rematik terhadap lansia sebelum dan sesudah senam rematik.	pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian <i>pre experiment</i>	Hasil uji Wilcoxon di dapatkan perbedaan nyeri rematik sebelum dan sesudah senam rematik dengan rata-rata nyeri sebelum senam sebesar 5,44 dalam skala nyeri sedangkan rata-rata nyeri sesudah senam sebesar 3.11 dalam skala nyeri dan p value 0.0001	Sama-sama meneliti tentang skala nyeri sebelum dan sesudah senam rematik	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh rochman (2012) memiliki perbedaan judul yaitu pada penelitian ini mengangkat judul “perbedaan nyeri rematik sebelum dan sesudah senam rematik pada lansia di desa handipolo kudas”

						sedangkan pada penelitian yang saya lakukan mengankat judul “pengaruh senam rematik terhadap penurunan nyeri dan peningkatan rentang gerak osteoarthritis lutut di wilayah kerja puskesmas samata.
2.	Pengaruh Senam Rematik Terhadap Pengurangan Rasa nyeri pralansia di kehidupan sehari-hari	Untuk membandingkan efek perlakuan terhadap pengurangan rasa nyeri antara pre test dan post test pada kelompok kontrol maupun	Penelitiannya menggunakan uji normalitas dan uji hipotesis menggunakan uji analisis non parametrik menggunakan uji Wicoxo	Uji Beda Pre Dan Post Kelompok Kontrol Pre Post dan Rerata Beda Rerata menunjukkan bahwa nyeri pada pre test adalah 4.44 dan pada post test adalah Analisis kemaknaan	Sama-sama meneliti tentang skala nyeri sebelum dan sesudah senam rematik	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suhendriyo (2014) memiliki perbedaan judul yaitu pada penelitian ini mengankat judul Pengaruh Senam Rematik

		pada kelompok perlakuan, sehingga dapat diketahui tingkat perbedaan signifikan	n	dengan menggunakan uji Wilcoxon Signed Z p 0.005		Terhadap Pengurangan Rasa nyeri pralansia di kehidupan sehari-hari. sedangkan pada penelitian yang saya lakukan mengankat judul “pengaruh senam rematik terhadap penurunan nyeri dan peningkatan rentang gerak osteoarthritis lutut di wilayah kerja puskesmas Samata.
3.	Pengaruh senam rematik terhadap nyeri sendi pada lansia di panti Sosial tresna werdha budimulia	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh senam rematik terhadap nyeri	Penelitian ini menggunakan desain quasy eksperiment dengan metode grup	Hasil penelitian ini menunjukkan karakteristik pasien nyeri sendi berusia antara 70-86 tahun (56,3%), berjenis kelamin	Sama sama meneliti tentang pengaruh senam rematik terhadap penurunan skala nyeri	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Heri Kuswanto (2014) hanya meneliti tingkat skala nyeri

04 margaguna Jakarta selatan	sendi.	pretest- postes. Sampel yang digunaka n adalah pasien nyeri sendi yang aktif mengikut i program senam rematik sebanyak 32 orang dengan teknik total sampling. Metode pengump ulan data dengan melakuka n intervens i senam rematik sebanyak tiga kali pada bulan agustus 2014. Data dianalisa sacara statistik dengan menggun akan rumus uji wilcoxon signed	perempuan (62,5%), berpendidika n terakhir SD dan SMP (40,8%), dan tidak bependidika n (43,8%). Ratarata hasil nyeri sendi sebelum senam rematik (34,4%). Rata-rata hasil nyeri sendi setelah senam rematik (28,1%). Uji statistik menunjukkan ada penurunan nyeri sendi yang signifikan ($p < 0,05$)	sendi pada lansia, seda ngkan penelitian yang saya lakukan meneliti tentang pengaruh senam rematik terhadap penurunan nyeri dan peningkata n rentang gerak osteoarthritis lutut pada lansia.
---------------------------------------	--------	---	---	---

			rank test			
--	--	--	-----------	--	--	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Nyeri

1. Pengertian Nyeri

Nyeri (*Pain*) adalah kondisi perasaan yang tidak menyenangkan. Sifatnya sangat subjektif karena perasaan nyeri berbeda pada setiap orang baik dalam hal skala ataupun tingkatannya dan hanya orang tersebutlah yang dapat menjelaskan dan mengefakuasi rasa nyeri yang dialaminya (Hidayat, 2008).

Nyeri adalah pengalaman sensori nyeri dan emosional yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual dan potensial yang tidak menyenangkan yang terlokalisasi pada suatu bagian tubuh ataupun sering disebut dengan istilah destruktif dimana jaringan rasanya seperti di tusuk-tusuk, panas terbakar, melilit, seperti emosi, perasaan takut dan mual (Judha, 2012).

2. Teori- Teori Nyeri

a. Teori Spesivitas (Specivicity Theory)

Teori Spesivitas ini diperkenalkan oleh Descartes, teori ini menjelaskan bahwa nyeri berjalan dari reseptor-reseptor nyeri yang spesifik melalui jalur neuroanatomik tertentu ke pusat nyeri di otak (Andarmoyo, 2013).

Teori spesivitas ini tidak menunjukkan karakteristik multidimensi dari nyeri, teori ini hanya melihat nyeri secara sederhana yakni paparan

biologis tanpa melihat variasi dari efek psikologis individu (Prasetyo, 2010).

b. Teori Pola (Pattern theory)

Teori Pola diperkenalkan oleh Goldscheider pada tahun 1989, teori ini menjelaskan bahwa nyeri di sebabkan oleh berbagai reseptor sensori yang di rangsang oleh pola tertentu, dimana nyeri ini merupakan akibat dari stimulasi reseptor yang menghasilkan pola dari implus saraf (Andarmoyo, 2013).

Pada sejumlah *causalgia*, nyeri pantom dan *neuralgia*, teori pola ini bertujuan untuk menimbulkan rangsangan yang kuat yang mengakibatkan berkembangnya gaung secara terus menerus pada spinal cord sehingga saraf transmisi nyeri bersifat *hypersensitif* yang mana rangsangan dengan intensitas rendah dapat menghasilkan transmisi nyeri (Lewis, 1983 dalam Andarmoyo, 2013).

c. Teori Pengontrol Nyeri (Theory Gate Control)

Teori gate control dari Melzack dan Wall, menyatakan bahwa implus nyeri dapat diatur dan dihambat oleh mekanisme pertahanan disepanjang sistem saraf pusat, dimana implus nyeri dihantarkan saat sebuah pertahanan dibuka dan implus dihambat saat sebuah pertahanan tertutup (Andarmoyo, 2013).

d. Endogenous Opiat Theory

Teori ini di kembangkan oleh Avron Goldstein, ia mengemukakan bahwa terdapat substansi seperti opiet yang terjadi selama alami didalam tubuh, substansi ini disebut *endorphine*

(Andarmoyo, 2013). Diinterpretasikan sebagai nyeri. Endorphine kemungkinan bertindak sebagai neurotransmitter maupun neoromodulator yang menghambat transmisi dari pesan nyeri (Andarmoyo, 2013).

3. Klasifikasi Nyeri

a. Klasifikasi Nyeri Berdasarkan Durasi

1) Nyeri Akut

Nyeri akut adalah nyeri yang terjadi setelah cedera akut, penyakit, atau intervensi bedah dan memiliki proses yang cepat dengan intensitas yang bervariasi (ringan sampai berat), dan berlangsung untuk waktu yang singkat (Andarmoyo, 2013). Nyeri akut berdurasi singkat (kurang lebih 6 bulan) dan akan menghilang tanpa pengobatan setelah area yang rusak pulih kembali (Prasetyo, 2010).

2) Nyeri kronik

Nyeri kronik adalah nyeri konstan yang intermiten yang menetap sepanjang suatu periode waktu. Nyeri ini berlangsung lama dengan intensitas yang bervariasi dan biasanya berlangsung lebih dari 6 bulan (McCaffery, 1986 dalam Potter & Perry, 2013).

b. Klasifikasi Nyeri Berdasarkan Asal

1) Nyeri Nosisepatif

Nyeri nosisepatif merupakan nyeri yang diakibatkan oleh aktivitas atau sensitivitas nosisepor perifer yang merupakan reseptor khusus yang mengantarkan stimulus noxious (Andarmoyo, 2013). Nyeri nosisepor ini dapat terjadi karena adanya stimulus yang

mengenai kulit, tulang, sendi, otot, jaringan ikat, dan lain-lain (Andarmoyo, 2013).

2) Nyeri neuropatik

Nyeri neuropatik merupakan hasil suatu cedera atau abnormalitas yang di dapat pada struktur saraf perifer maupun sentral , nyeri ini lebih sulit diobati (Andarmoyo, 2013).

c. Klasifikasi Nyeri Berdasarkan Lokasi

1) Supervicial atau kutaneus

Nyeri supervisial adalah nyeri yang disebabkan stimulus kulit. Karakteristik dari nyeri berlangsung sebentar dan berlokalisasi. Nyeri biasanya terasa sebagai sensasi yang tajam (Sulistyo, 2013). Contohnya tertusuk jarum suntik dan luka potong kecil atau laserasi.

2) Viseral Dalam

Nyeri viseral adalah nyeri yang terjadi akibat stimulasi organ-organ internal (Sulistyo, 2013). Nyeri ini bersifat difusi dan dapat menyebar kebeberapa arah. Nyeri ini menimbulkan rasa tidak menyenangkan dan berkaitan dengan mual dan gejala-gejala otonom. Contohnya sensasi pukul (crushing) seperti angina pectoris dan sensasi terbakar seperti pada ulkus lambung.

3) Nyeri Alih (Referred pain)

Nyeri alih merupakan fenomena umum dalam nyeri viseral karna banyak organ tidak memiliki reseptor nyeri. Karakteristik nyeri dapat terasa di bagian tubuh yang terpisah dari sumber nyeri dan dapat terasa dengan berbagai karakteristik (Sulistyo, 2013).

Contohnya nyeri yang terjadi pada infark miokard, yang menyebabkan nyeri alih ke rahang, lengan kiri, batu empedu, yang mengalihkan nyeri ke selangkangan.

4) Radiasi

Nyeri radiasi merupakan sensasi nyeri yang meluas dari tempat awal cedera ke bagian tubuh yang lain (Sulistyo, 2013). Karakteristik nyeri terasa seakan menyebar ke bagian tubuh bawah atau sepanjang ke bagian tubuh. Contoh nyeri punggung bagian bawah akibat diskusi intervertebral yang ruptur disertai nyeri yang meradiasi sepanjang tungkai dari ritasi saraf skiatik.

4. Pengukuran Intensitas Nyeri

Intensitas nyeri adalah gambaran tentang seberapa parah nyeri dirasakan oleh individu. Pengukuran intensitas nyeri bersifat sangat subjektif dan nyeri dalam intensitas yang sama dirasakan berbeda oleh dua orang yang berbeda (Andarmoyo, 2013). Pengukuran nyeri dengan pendekatan objektif yang paling mungkin adalah menggunakan respon fisiologik tubuh terhadap nyeri itu sendiri, namun pengukuran dengan pendekatan objektif juga tidak dapat memberikan gambaran pasti tentang nyeri itu sendiri (Tamsuri, 2007 dalam Andarmoyo, 2013). Intensitas nyeri dibedakan menjadi lima dengan menggunakan skala numerik yaitu:

- a. 0 : Tidak Nyeri
- b. 1-2 : Nyeri Ringan
- c. 3-5 : Nyeri Sedang
- d. 6-7 : Nyeri Berat

e. 8-10 : Nyeri Yang Tidak Tertahankan (Judha, 2012).

B. Rentang Gerak

1. Definisi Rentang gerak

Rentang gerak atau *range of motion* (ROM) adalah latihan yang dilakukan untuk mempertahankan atau memperbaiki tingkat kesempurnaan kemampuan menggerakkan persendian secara normal dan lengkap untuk meningkatkan massa otot dan tonus otot (Potter & Perry, 2005).

Range of motion adalah gerakan dalam keadaan normal dapat dilakukan oleh sendi yang bersangkutan (Suratun, dkk, 2008). Latihan *range of motion* (ROM) merupakan istilah baku untuk menyatakan batas atau batasan gerakan sendi yang normal dan sebagai dasar untuk menetapkan adanya kelainan ataupun untuk menyatakan batas gerakan sendi yang abnormal (Arif, M, 2008).

2. Klasifikasi latihan Rentang gerak

Latihan ROM pasif adalah latihan ROM yang dilakukan pasien dengan bantuan perawat pada setiap-setiap gerakan. Indikasi latihan pasif adalah pasien semikoma dan tidak sadar, pasien dengan keterbatasan mobilisasi tidak mampu melakukan beberapa atau semua latihan rentang gerak dengan mandiri, pasien tirah baring total atau pasien dengan paralisis ekstermitas total (suratun, dkk, 2008). Rentang gerak pasif ini berguna untuk menjaga kelenturan otot-otot dan persendian dengan menggerakkan otot orang lain secara pasif misalnya perawat mengangkat dan menggerakkan kaki pasien. Sendi yang digerakkan pada ROM pasif adalah seluruh

persendian tubuh atau hanya pada ekstremitas yang terganggu dan klien tidak mampu melaksanakannya secara mandiri.

Latihan ROM aktif adalah Perawat memberikan motivasi, dan membimbing klien dalam melaksanakan pergerakan sendi secara mandiri sesuai dengan rentang gerak sendi normal. Hal ini untuk melatih kelenturan dan kekuatan otot serta sendi dengan cara menggunakan otot-ototnya secara aktif. Sendi yang digerakkan pada ROM aktif adalah sendi di seluruh tubuh dari kepala sampai ujung jari kaki oleh klien sendiri secara aktif.

3. Tujuan Rentang gerak

- a. Mempertahankan atau memelihara fleksibilitas dan kekuatan otot
- b. Memelihara mobilitas persendian
- c. Merangsang sirkulasi darah
- d. Mencegah kelainan bentuk, kekakuan dan kontraktur
- e. Mempertrahankan fungsi jantung dan pernapasan

4. Manfaat Rentang gerak

- a. Memperbaiki tonus otot
- b. Meningkatkan mobilisasi sendi
- c. Memperbaiki toleransi otot untuk latihan
- d. Meningkatkan massa otot
- e. Mengurangi kehilangan tulang

5. Indikasi Rentang gerak

- a. Stroke atau penurunan tingkat kesadaran
- b. Kelemahan otot
- c. Fase rehabilitasi fisik

d. Klien dengan tirah baring lama

6. Jenis Rentang gerak

Menurut Potter & Perry, (2005), ROM terdiri dari gerakan pada persendian sebaga berikut:

a. Lutut

Fleksi : Mengerakan tumit ke arah belakang paha, rentang 120-130°

Ekstensi : Mengembalikan tungkai kelantai, rentang 120-130°

b. Mata kaki

Dorsifleksi :Menggerakan kaki sehingga jari-jari kaki menekuk ke atas, rentang 20-30°

Plantarfleksi :Menggerakan kaki sehingga jari-jari kaki menekuk ke bawah, rentang 45-50°

c. Kaki

Inversi : Memutar telapak kaki ke samping dalam, rentang 10°

Eversi :Memutar telapak kaki ke samping luar, rentang 10°

7. Penilaian hasil pengukuran rentang gerak

DERAJAT FUNGSI	RENTANG GERAK SENDI
I : Normal	Gerak penuh hambatan (100%)
II : Good	Gerak tidak penuh (75%)
III: Fair	Gerak tidak penuh ada hambatan (50%)
IV : Poor	Gerak ada hambatan (25%)
V : Trance	Tidak ada gerak (0%)

C. Osteoarthritis

Osteoarthritis (OA) merupakan penyakit sendi degeneratif, dimana keseluruhan struktur dari sendi mengalami perubahan patologis. Ditandai dengan kerusakan tulang rawan (kartilago) hyalin sendi, meningkatnya ketebalan serta sklerosis dari lempeng tulang, pertumbuhan osteofit pada tepian sendi, meregangnya kapsula sendi, timbulnya peradangan, dan melemahnya otot-otot yang menghubungkan sendi (Felson, 2008).

Osteoarthritis (OA) juga bisa ditemukan pada lanjut usia dimana lansia merupakan manusia yang memasuki tahap akhir kehidupan yang artinya segala penyakit yang bersangkutan dengan perubahan patologis tubuh bisa dialami karna pada proses penuan ini ditandai dengan gagalnya mempertahankan keseimbangan terhadap kondisi sters psikologis (Taruna, dkk 2013). Dan menurut WHO dalam buku setianto 2004 menggolongkan lansia sebagai berikut :- Usia pertengahan : 45-59 tahun

- Lanjut usia : 60-74 tahun
- Lanjut usia tua : 75-90 tahun
- Sangat tua : >90 tahun

OA terbanyak didapatkan pada sendi lutut. Lutut adalah sendi yang paling banyak dipakai bergerak, saat berjalan, duduk, jongkok dan memanjat. Progresifitas OA lutut membutuhkan waktu bertahun-tahun, sebab sekali terjadi sendi dapat berada pada kondisi yang tetap selama beberapa tahun. OA merupakan penyebab utama rasa sakit dan ketidakmampuan dibandingkan OA pada bagian sendi lainnya (Sugondo.S, 2009).

Prevalensi OA lutut berdasar diagnosis radiologis di Indonesia cukup tinggi, yaitu mencapai 15,5% pada pria dan 12,7% pada wanita. Karena prevalensi yang cukup tinggi dan sifatnya yang kronik progresif, OA mempunyai dampak sosioekonomi yang besar baik di negara maju maupun di negara berkembang. Diperkirakan 1 sampai 2 juta orang lanjut usia di Indonesia menderita cacat karena OA (Sugondo.S, 2009).

Osteoarthritis lutut adalah suatu penyakit sendi degeneratif yang berkaitan dengan kerusakan kartilago sendi lutut, merupakan suatu penyakit kerusakan tulang rawan sendi yang berkembang lambat dan tidak diketahui penyebabnya, meskipun terdapat beberapa faktor resiko yang berperan. Keadaan ini berkaitan dengan usia lanjut (Elvira, 2010). Faktor risiko osteoarthritis adalah usia di atas 55 tahun dimana pada usia tersebut wanita lebih banyak dibanding laki-laki. Pekerja mengangkat barang, naik tangga atau berjalan jauh juga merupakan faktor risiko. Selain itu olahraga yang mengalami trauma pada sendi seperti sepak bola, basket dan voli juga penyebab osteoarthritis (Hamijoyo, 2013). Menurut Hamijoyo tahun 2014 gejala yang dialami biasanya nyeri yang muncul perlahan-lahan, nyeri biasanya dibangkitkan oleh suatu aktivitas fisik yang berat, nyeri biasanya memburuk ketika sendi digunakan dan membaik ketika istirahat, pada saat digerakkan menimbulkan suara krepitus selain itu disertai bengkak dan kaku yang berlangsung kurang lebih 15-20 menit.

Menurut Soeroso tahun 2008. Gambaran Radiografi sendi yang menyokong diagnosis osteoarthritis penyempitan celah sendi yang seringkali asimetris, peningkatan densitas tulang subkondral (sklerosis), kista

pada tulang, osteofit pada pinggir sendi dan perubahan struktur anatomi sendi.

1. Epidemiologi Osteoartritis

Osteoartritis merupakan penyakit sendi pada orang dewasa yang paling umum di dunia. Felson (2008) melaporkan bahwa satu dari tiga orang dewasa memiliki tanda-tanda radiologis terhadap OA. OA pada lutut merupakan tipe OA yang paling umum dijumpai pada orang dewasa. Penelitian epidemiologi dari Joern et al (2010) menemukan bahwa orang dewasa dengan kelompok umur 60-64 tahun sebanyak 22%. Pada pria dengan kelompok umur yang sama, dijumpai 23% menderita OA. Pada lutut kanan, sementara 16,3% sisanya didapati menderita OA pada lutut kiri. Berbeda halnya pada wanita yang terdistribusi merata, dengan insiden OA pada lutut kanan sebanyak 24,2% dan pada lutut kiri sebanyak 24,7.

2. Patogenesis Osteoartritis

Berdasarkan penyebabnya, OA dibedakan menjadi dua yaitu OA primer dan OA sekunder. OA primer, atau dapat disebut OA idiopatik, tidak memiliki penyebab yang pasti (tidak diketahui) dan tidak disebabkan oleh penyakit sistemik maupun proses perubahan lokal pada sendi. OA sekunder, berbeda dengan OA primer, merupakan OA yang disebabkan oleh inflamasi, kelainan sistem endokrin, metabolik, pertumbuhan, faktor keturunan (herediter), dan immobilisasi yang terlalu lama. Kasus OA primer lebih sering dijumpai pada praktik sehari-hari dibandingkan dengan OA sekunder (Soeroso, 2008).

Selama ini OA sering dipandang sebagai akibat dari proses penuaan dan tidak dapat dihindari. Namun telah diketahui bahwa OA merupakan gangguan keseimbangan dari metabolisme kartilago dengan kerusakan struktur yang penyebabnya masih belum jelas diketahui (Soeroso, 2008). Kerusakan tersebut diawali oleh kegagalan mekanisme perlindungan sendi serta diikuti oleh beberapa mekanisme lain sehingga pada akhirnya menimbulkan cedera (Felson, 2008).

Mekanisme pertahanan sendi diperankan oleh pelindung sendi yaitu: Kapsula dan ligamen sendi, otot-otot, saraf sensori aferen dan tulang di dasarnya . Kapsula dan ligamen-ligamen sendi memberikan batasan pada rentang gerak (Range of motion) sendi (Felson, 2008).

Cairan sendi synovial mengurangi gesekan antar kartilago pada permukaan sendi sehingga mencegah terjadinya keletihan kartilago akibat gesekan. Protein yang disebut dengan lubricin merupakan protein pada cairan sendi yang berfungsi sebagai pelumas. Protein ini akan berhenti disekresikan apabila terjadi cedera dan peradangan pada sendi (Felson, 2008). Ligamen, bersama dengan kulit dan tendon, mengandung suatu mekanoreseptor yang tersebar di sepanjang rentang gerak sendi. Umpan balik yang dikirimkannya memungkinkan otot dan tendon mampu untuk memberikan tegangan yang cukup pada titik-titik tertentu ketika sendi bergerak (Felson, 2008).

Otot-otot dan tendon yang menghubungkan sendi adalah inti dari pelindung sendi. Kontraksi otot yang terjadi ketika pergerakan sendi memberikan tenaga dan akselerasi yang cukup pada anggota gerak untuk

menyelesaikan tugasnya. Kontraksi otot tersebut turut meringankan stres yang terjadi pada sendi dengan cara melakukan deselerasi sebelum terjadi tumbukan (impact). Tumbukan yang diterima akan didistribusikan ke seluruh permukaan sendi sehingga meringankan dampak yang diterima. Tulang di balik kartilago memiliki fungsi untuk menyerap guncangan yang diterima (Felson, 2008).

Kartilago berfungsi sebagai pelindung sendi. Kartilago dilumasi oleh cairan sendi sehingga mampu menghilangkan gesekan antar tulang yang terjadi ketika bergerak. Kekakuan kartilago yang dapat dimampatkan berfungsi sebagai penyerap tumbukan yang diterima sendi. Perubahan pada sendi sebelum timbulnya OA dapat terlihat pada kartilago sehingga penting untuk mengetahui lebih lanjut tentang kartilago (Felson, 2008).

Terdapat dua jenis makromolekul utama pada kartilago, yaitu Kolagen tipe dua dan Aggrekan. Kolagen tipe dua terjalin dengan ketat, membatasi molekul – molekul aggrekan di antara jalinan-jalinan kolagen. Aggrekan adalah molekul proteoglikan yang berikatan dengan asam hialuronat dan memberikan kepadatan pada kartilago (Felson,2008).

Kondrosit, sel yang terdapat di jaringan avaskular, mensintesis seluruh elemen yang terdapat pada matriks kartilago. Kondrosit menghasilkan enzim pemecah matriks, sitokin { Interleukin-1 (IL-1), Tumor Necrosis Factor (TNF)}, dan faktor pertumbuhan. Umpan balik yang diberikan enzim tersebut akan merangsang kondrosit untuk melakukan sintesis dan membentuk molekul-molekul matriks yang baru.

Pembentukan dan pemecahan ini dijaga keseimbangannya oleh sitokin faktor pertumbuhan, dan faktor lingkungan (Felson, 2008).

Kondrosit mensintesis metaloproteinase matriks (MPM) untuk memecah kolagen tipe dua dan aggrekan. MPM memiliki tempat kerja di matriks yang dikelilingi oleh kondrosit. Namun, pada fase awal OA, aktivitas serta efek dari MPM menyebar hingga ke bagian permukaan (superficial) dari kartilago (Felson, 2008).

Stimulasi dari sitokin terhadap cedera matriks adalah menstimulasi pergantian matriks, namun stimulasi IL-1 yang berlebihan malah memicu proses degradasi matriks. TNF menginduksi kondrosit untuk mensintesis prostaglandin (PG), oksida nitrit (NO), dan protein lainnya yang memiliki efek terhadap sintesis dan degradasi matriks. TNF yang berlebihan mempercepat proses pembentukan tersebut. NO yang dihasilkan akan menghambat sintesis menggerakkan dan meningkatkan proses pemecahan protein pada jaringan. Hal ini berlangsung pada proses awal timbulnya OA (Felson, 2008).

Kartilago memiliki metabolisme yang lambat, dengan pergantian matriks yang lambat dan keseimbangan yang teratur antara sintesis dengan degradasi. Namun, pada fase awal perkembangan OA kartilago sendi memiliki metabolisme yang sangat aktif (Felson, 2008).

Pada proses timbulnya OA, kondrosit yang terstimulasi akan melepaskan aggrekan dan kolagen tipe dua yang tidak adekuat ke kartilago dan cairan sendi. Aggrekan pada kartilago akan sering habis serta jalinan-jalinan kolagen akan mudah mengendur (Felson, 2008).

Kegagalan dari mekanisme pertahanan oleh komponen pertahanan sendi akan meningkatkan kemungkinan timbulnya OA pada sendi (Felson, 2008).

3. Faktor Resiko

Adapun beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan resiko terjadinya OA lutut, antara lain:

a. Umur

Peningkatan kelemahan disekitar sendi, penurunan kelenturan sendi, kalsifikasi tulang rawan dan menurunkan fungsi kondrosit disebabkan oleh proses penuaan, yang semuanya mendukung terjadinya OA (Maharani 2007 dan Nursarifaf.R 2011).

Peningkatan OA lutut ini terjadi pada usia lebih dari 65 tahun. Prevalensi OA lutut akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia dengan rata-rata usia pada lakilaki 59,7 tahun dan rata-rata usia pada perempuan 65,3 tahun (Nursarifah.R 2011).

Studi Framingham menunjukkan bahwa 27% orang berusia 63-70 tahun memiliki bukti radiografik menderita OA lutut, yang meningkat mencapai 40% pada usia 80 tahun atau lebih. Studi lain membuktikan bahwa resiko seseorang mengalami gejala timbulnya OA lutut adalah mulai usia 50 tahun. Studi mengenai kelenturan pada OA telah menemukan bahwa terjadi penurunan kelenturan pada pasien usia tua pada OA lutut (Maharani 2007).

b. Jenis Kelamin

Prevalensi OA pada laki-laki sebelum usia 50 tahun lebih tinggi dibandingkan perempuan, tetapi setelah usia lebih dari 50 tahun prevalensi perempuan lebih tinggi menderita OA dibanding laki-laki. OA lutut umumnya terjadi dua kali lipat pada perempuan dibanding laki-laki (Nursarifah.R 2011).

Perbedaan tersebut menjadi semakin berkurang setelah menginjak usia 80 tahun. Hal tersebut diperkirakan karena pada usia 50-80 tahun wanita mengalami pengurangan hormone estrogen yang signifikan (Maharani, 2007).

Penelitian di Malang menemukan prevalensi OA lutut pada pasien usia 60-70 tahun didapatkan hasil laki-laki 10,7 % dan wanita 14,1% (Gede kambayana, 2011).

c. Riwayat Trauma Lutut

Trauma dapat mengakibatkan rusaknya rawan sendi, baik yang bersifat trauma akut maupun trauma berulang yang melebihi kekuatan otot dan tendon periartikular (Nursarifah.R 2011). Trauma lutut yang akut termasuk robekan pada ligamentun krusiatum dan meniscus merupakan faktor resiko timbulnya OA lutut. Studi Framingham menemukan bahwa orang dengan riwayat trauma lutut memiliki resiko 5-6 kali lipat lebih tinggi untuk menderita OA lutut. Hal tersebut biasanya terjadi pada kelompok usia yang lebih muda serta dapat menyebabkan kecacatan yang lama dan pengangguran (Maharani, 2007).

d. Obesitas

Obesitas merupakan faktor resiko terkuat yang dapat dimodifikasi. Selama berjalan, setengah berat badan tertumpu pada sendi lutut. Peningkatan berat badan akan melipat gandakan beban sendi lutut saat berjalan (Maharani 2007). Obesitas pada orang dewasa dapat ditemukan dengan menggunakan rumus Indeks Massa Tubuh (IMT) (Sugondo 2009). Resiko terjadinya OA akan meningkat sebanyak 9-13% pada individu dengan peningkatan 1kg berat badan. Menurut penelitian yang dilakukan Marks dengan Metode Cohort dilaporkan bahwa terdapat setidaknya 80% penderita OA yang obesitas dengan IMT yang lebih tinggi mengalami nyeri lebih dari individu dengan IMT yang lebih rendah. Setiap penurunan berat 5 kg akan mengurangi faktor resiko OA dikemudian hari sebesar 50%. Demikian juga peningkatan resiko mengalami OA lutut yang progresif tampak pada orang-orang yang kelebihan berat badan dengan penyakit pada bagian tubuh tertentu. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa semakin berat tubuh akan meningkatkan prognosa menjadi lebih buruk (Marhani 2007 dan Nursarifah.R, 2001).

e. Aktivitas Fisik

Aktivitas dan latihan yang normal tidak menyebabkan OA, tetapi bila aktivitas tersebut dilakukan sangat berat, berulang atau pekerjaan yang menuntut fisik seseorang dapat meningkatkan resiko OA (Nursarifah.R, 2011).

Aktivitas fisik berat seperti berdiri lama (2 jam atau lebih setiap hari), berjalan jarak jauh (2 jam atau lebih setiap hari), mengangkat barang berat (10 – 50 kg selama 10 kali atau lebih setiap minggu), mendorong objek yang berat (10 – 50 kg selama 10 kali atau lebih setiap minggu), dan naik turun tangga setiap hari (Marhani 2007). Pekerjaan dan olahraga yang berat dapat meningkatkan resiko OA lutut. Penelitian HANES I menyebutkan bahwa pekerja yang sering membebani sendi lutut mempunyai resiko lebih besar disbanding dengan pekerja yang jarang membebani sendi lutut (Nursarifah.R 2011).

f. Kebiasaan Kerja dengan Beban Berat

Terdapat hubungan signifikan antara pekerjaan yang menggunakan kekuatan lutut dan kejadian OA lutut. Prevalensi lebih tinggi menderita OA lutut ditemukan pada kuli pelabuhan, petani dan penambang dibandingkan pada pekerja yang tidak banyak menggunakan kekuatan lutut. (Marhani 2007) Penambahan 1kg meningkatkan resiko terjadinya OA sebesar 10%. Karena pembebanan lutut dan panggul dapat menyebabkan kerusakan kartilago, kegagalan ligament, dan dukungan structural lain (Amrullah.A, 2013).

Menurut penelitian yang dilakukan Eka Pratiwi (2007) di RSUP DR. Kariadi Semarang kebiasaan kerja dengan beban yang berpengaruh adalah $\geq 17,5$ kg. kebiasaan tersebut berupa melakukan

pekerjaan dengan mengangkat/mendorong beban setiap hari (Amrullah.A, 2013).

4. Tanda dan Gejala Klinis

Pada umumnya, pasien OA mengatakan bahwa keluhan-keluhan yang dirasakannya telah berlangsung lama, tetapi berkembang secara perlahan. Berikut adalah keluhan yang dapat dijumpai pada pasien OA:

a. Nyeri sendi

Keluhan ini merupakan keluhan utama pasien. Nyeri biasanya bertambah dengan gerakan dan sedikit berkurang dengan istirahat. Beberapa gerakan dan tertentu terkadang dapat menimbulkan rasa nyeri yang melebihi gerakan lain. Perubahan ini dapat ditemukan meski OA masih tergolong dini (secara radiologis). Umumnya bertambah berat dengan semakin beratnya penyakit sampai sendi hanya bisa digoyangkan dan menjadi kontraktur, Hambatan gerak dapat konsentris (seluruh arah gerakan) maupun eksentris (salah satu arah gerakan saja) (Soeroso, 2009).

Kartilago tidak mengandung serabut saraf dan kehilangan kartilago pada sendi tidak diikuti dengan timbulnya nyeri. Sehingga dapat diasumsikan bahwa nyeri yang timbul pada OA berasal dari luar kartilago (Felson, 2008).

Pada penelitian dengan menggunakan MRI, didapat bahwa sumber dari nyeri yang timbul diduga berasal dari peradangan sendi (sinovitis), efusi sendi, dan edema sumsum tulang (Felson, 2008).

Osteofit merupakan salah satu penyebab timbulnya nyeri. Ketika osteofit tumbuh, invasi neurovaskular menembusi bagian dasar tulang hingga ke kartilago dan menuju ke osteofit yang sedang berkembang Hal ini menimbulkan nyeri (Felson, 2008).Nyeri dapat timbul dari bagian di luar sendi, termasuk bursae di dekatsendi. Sumber nyeri yang umum di lutut adalah akibat dari anserine bursitis dan sindrom iliotibial band (Felson, 2008).

b. Hambatan gerakan sendi

Gangguan ini biasanya semakin bertambah berat secara perlahan sejalandengan pertambahan rasa nyeri (Soeroso, 2009).

c. Kaku pagi

Rasa kaku pada sendi dapat timbul setelah pasien berdiam diri atau tidak melakukan banyak gerakan, seperti duduk di kursi atau mobil dalam waktu yang cukup lama, bahkan setelah bangun tidur di pagi hari(Soeroso, 2009).

d. Krepitasi

Repitasi atau rasa gemeratak yang timbul pada sendi yang sakit. Gejala ini umum ijumpai pada pasien OA lutut. Pada awalnya hanya berupa perasaan akan adanya sesuatu yang patah atau remuk oleh pasien atau dokter yang memeriksa. Seiring dengan perkembangan penyakit, krepitasi dapat terdengar hingga jarak tertentu (Soeroso, 2009).Pembesaran sendi (deformitas)Sendi yang terkena secara perlahan dapat membesar (Soeroso, 2009).

e. Pembengkakan sendi yang asimetris

Pembengkakan sendi dapat timbul dikarenakan terjadi efusi pada sendi yang biasanya tidak banyak (< 100 cc) atau karena adanya osteofit, sehingga bentuk permukaan sendi berubah (Soeroso, 2009).

f. Tanda-tanda peradangan

Tanda-tanda adanya peradangan pada sendi (nyeri tekan, gangguan gerakan, rasa hangat yang merata, dan warna kemerahan) dapat dijumpai pada OA karena adanya synovitis. Biasanya tanda – tanda ini tidak menonjol dan timbul pada perkembangan penyakit yang lebih jauh. Gejala ini sering dijumpai pada OA lutut (Soeroso, 2009).

g. Perubahan gaya berjalan

Gejala ini merupakan gejala yang menyusahkan pasien dan merupakan ancaman yang besar untuk kemandirian pasien OA, terlebih pada pasien lanjut usia. Keadaan ini selalu berhubungan dengan nyeri karena menjadi tumpuan berat badan terutama pada OA lutut (Soeroso, 2009).

5. Terapi non-farmakologis

a. Edukasi

Edukasi atau penjelasan kepada pasien perlu dilakukan agar pasien dapat mengetahui serta memahami tentang penyakit yang dideritanya, bagaimana agar penyakitnya tidak bertambah semakin parah, dan agar persendiannya tetap terpakai (Soeroso, 2008).

b. Terapi fisik atau rehabilitasi

Pasien dapat mengalami kesulitan berjalan akibat rasa sakit. Terapi ini dilakukan untuk melatih pasien agar persendianya tetap dapat dipakai dan melatih pasien untuk melindungi sendi yang sakit. (Soeroso, 2008).

c. Penurunan berat badan

Berat badan yang berlebih merupakan faktor yang memperberat OA. Oleh karena itu, berat badan harus dapat dijaga agar tidak berlebih dan diupayakan untuk melakukan penurunan berat badan apabila berat badan berlebih (Soeroso, 2008)

d. Terapi farmakologis

Penanganan terapi farmakologi melingkupi penurunan rasa nyeri yang timbul, mengoreksi gangguan yang timbul dan mengidentifikasi manifestasi klinis dari ketidakstabilan sendi (Felson, 2006).

e. Obat Antiinflamasi Nonsteroid (AINS), Inhibitor Siklooksigenase-2 (COX-2), dan Asetaminofen Untuk mengobati rasa nyeri yang timbul pada OA lutut, penggunaan obat AINS dan Inhibitor COX-2 dinilai lebih efektif daripada penggunaan asetaminofen. Namun karena risiko toksisitas obat AINS lebih tinggi daripada asetaminofen, asetaminofen tetap menjadi obat pilihan pertama dalam penanganan rasa nyeri pada OA. Cara lain untuk mengurangi dampak toksisitas dari obat AINS adalah dengan cara mengombinasikannya dengan menggunakan inhibitor COX-2 (Felson, 2006).

- f. Chondroprotective Agent Chondroprotective Agent adalah obat-obatan yang dapat menjaga atau merangsang perbaikan dari kartilago pada pasien OA. Obat – obatan yang termasuk dalam kelompok obat ini adalah: tetrasiklin, asam hialuronat, kondroitin sulfat, glikosaminoglikan, vitamin C, dan sebagainya (Felson, 2006).

D. Senam Rematik

1. Pengertian senam rematik

Senam rematik merupakan salah satu metode yang praktis dan efektif dalam memelihara kesehatan tubuh. Gerakan yang terkandung dalam senam rematik adalah gerakan yang sangat efektif, efisien, dan logis karena rangkaian gerakannya dilakukan secara teratur dan terorganisasi bagi penderita rematik (Wahyudi Nugroho, 2008).

Islam menghasut pemeluknya untuk menjadi kuat dan sehat baik secara rohani maupun jasmani. Islam menunjukkan keutamaan kekuatan dan kesehatan sebagai modal besar di dalam beramal saleh dan beraktivitas di dalam urusan agama dan urusan dunia seorang muslim. Allah Subhanah wa Ta'ala berfirman:

قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

Terjemahnya :

(Nabi mereka) berkata, “Sesungguhnya Allah Subhanah wa Ta’ala telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa.” (QS. al-Baqarah: 247).

Rasulullah Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Dan pada masing-masingnya terdapat kebaikan.

Bersemangatlah terhadap perkara-perkara yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau bersikap lemah.” (HR. Muslim).

Ibnu Qoyyim Al Jauziyah berkata,” Bagian organ mana saja yang banyak digerakkan maka akan kuat. Khususnya berkaitan dengan jenis olah raga tersebut, bahkan seluruh kekuatan berawal dari sini, misalnya siapa yang banyak menghapal maka akan kuat hapalannya, siapa yang banyak berfikir maka akan kuat kecerdasan pikirannya. Setiap organ tubuh memiliki organ yang khusus.

Dengan dilakukannya senam rematik dapat mempermudah seseorang yang mengalami kekakuan dalam aktivitas fisik menjadi lebih mudah digerakkan dan sesuai dengan perkataan Ibnu qoyyim Al Jauziyah bagian organ mana saja yang banyak digerakkan maka akan kuat, sehingga mempermudah seseorang untuk beramal saleh dan beraktivitas didalam urusan agama dan urusan dunia seorang muslim.

2. Tujuan Senam Rematik
 - a) Mengurangi nyeri pada penderita rematik
 - b) Menjaga kesehatan jasmani menjadi lebih baik.
3. Keuntungan Senam Rematik
 - a) Tulang menjadi lebih lentur.
 - b) Otot-otot akan menjadi tetap kencang.
 - c) Memperlancar peredaran darah.
 - d) Memperlancar cairan getah bening.
 - e) Menjaga kadar lemak tetap normal.
 - f) Jantung menjadi lebih sehat.

- g) Tidak mudah mengalami cedera.
 - h) Kecepatan reaksi menjadi lebih baik
4. Cara melakukan senam rematik
- a) Gerakan Duduk
 1. Angkat kedua bahu keatas mendekati telinga, putar kedepan dan kebelakang.
 2. Bungkukan badan, kedua lengan meraih ujung kaki lantai.
 3. Angkat kedua sisi sejajar dada, tarik kedepan dada.
 4. Angkat paha dan lutut secara bergantian, kedua lengan menahan tubuh.
 5. Putar tubuh bagian atas kesamping kanan dan kiri, kedua lengan diatas pinggang.
 - b) Gerakan berbaring atau tidur
 1. Bentangkan kedua lengan dan tangan, ambil nafas dalam-dalam dan hembuskan.
 2. Kedua tangan disamping tekuk siku dan tangan mengepal.
 3. Tangan di luruskan keatas lalu tepuk tangan
 4. Tekuk sendi panggul dan tekuk lutut dengan kedua tangan tarik sampai diatas dada.
 5. Pegang erat kedua tangan diatas perut, tarik kebelakang kepala dan kebawah.
 6. Angkat tungkai bawah bergantian dengan bantuan kedua tangan

E. Kerangka pikir


Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh senam rematik terhadap pengurangan rasa nyeri osteoarthritis lutut. Banyak faktor yang mempengaruhi untuk meminimalisir komplikasi yang biasa terjadi pada osteoarthritis diantaranya terapi fisik atau rehabilitasi, penurunan berat badan, menghindari beban kerja yang berat dan lain sebagainya. Faktor tersebut harus dikontrol guna untuk meminimalisir komplikasi yang mungkin terjadi.

Melakukan senam adalah cara yang baik untuk mengurangi rasa nyeri pada osteoarthritis lutut. Dalam hal ini senam rematik karna senam rematik memiliki banyak manfaat untuk mempertahankan kesehatan otot, tulang dan persendian. Melakukan senam rematik dalam penelitian ini sebagai variabel bebas yang telah dipercaya mampu mengurangi nyeri osteoarthritis lutut dengan gerakan gerakan yang mampu membuat tulang menjadi lebih lentur, otot otot akan lebih kencang, dan memperlancar peredaran darah.

F. Kerangka konsep penelitian

Berdasarkan kajian teori, maka berikut akan diuraikan kerangka konsep yang bisa berfungsi sebagai penentuan dan alur pikir serta bisa dijadikan sebagai dasar penyusunan hipotesis. Kerangka konseptual menjadi dasar penelitian ini adalah pengaruh senam rematik terhadap pengurangan nyeri osteoarthritis lutut.

Variabel kontrol

**Keterangan:**

: Variabel kontrol

→ : Penghubung Variabel Kontrol


: Variabel Terikat

: Variabel bebas

→ : Penghubung Variabel yang diteliti

Bagan 2.1 Variabel Kontrol

Alur penelitian



Bagan 2.2 Alur Penelitian

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di wilayah kerja puskesmas samata Kecamatan somba Opu Kabupaten Gowa pada bulan April 2017.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian *quasy eksperimental* bersifat kuantitatif.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah setiap subjek yang memenuhi karakteristik yaitu penderita osteoarthritis lutut diwilayah kerja puskesmas Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang berjumlah 243 orang.

2. Sampel Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan jumlah sampel adalah 24 responden. Dimana 12 sampel kelompok perlakuan yang diberikan intervensi senam rematik dan 12 sampel dijadikan kelompok kontrol. Jumlah sampel yang digunakan 12 orang , karena menggunakan 2 kelompok. Penentuan dan pengambilan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus yang diterapkan oleh Alimul Hidayat yaitu 10-15% dari total keseluruhan jumlah populasi yaitu 243 orang yang berada diwilayah kerja puskesmas Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

D. Teknik Pengambilan Sampel

1. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan secara *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* atau *judgement sampling*. Yaitu cara pengambilan sampel dilakukan dengan memilih sampel yang memenuhi kriteria penelitian sampai kurung waktu tertentu sehingga jumlah sampel terpenuhi (Hidayat, 2008).

Peneliti terlebih dahulu mengumpulkan responden yang bersedia diberikan intervensi keperawatan senam rematik sebanyak 12 orang yang sesuai dengan kriteria inklusi di wilayah kerja puskesmas Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dengan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus yang diterapkan oleh Alimul Hidayat yaitu 10% dari jumlah populasi. Setelah responden intervensi senam rematik didapatkan, lalu diobservasi skala nyeri pre dan selanjutnya pemberian intervensi yaitu pada hari kedua sampai hari ketujuh dan observasi skala nyeri post pada hari kedelapan. Kemudian, setelah kelompok intervensi senam rematik selesai diobservasi, peneliti mengumpulkan kelompok kontrol yang diberikan intervensi berbeda sebanyak 12 responden, lalu diobservasi dalam jangka waktu yang sama selama satu minggu.

a. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

1. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi adalah kriteria atau standar yang ditetapkan sebelum penelitian. Kriteria inklusi digunakan untuk menentukan apakah seseorang dapat berpartisipasi dalam penelitian tersebut.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah:

- a) Bersedia menjadi responden dan menandatangani surat persetujuan (*informed consent*).
 - b) Pasien yang memiliki ciri ciri osteoarthritis.
 - c) Pasien yang aktif melakukan aktivitas fisik.
 - d) Pasien yang tidak mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri osteoarthritis dalam seminggu terakhir.
 - e) Pasien berusia 60-74 tahun.
2. Kriteria Eksklusi
- a) Pasien yang dropout.
 - b) Pasien osteoarthritis yang memiliki komplikasi penyakit.

E. Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber penelitian yaitu orang yang mengalami osteoarthritis di wilayah kerja puskesmas Samata Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Data Sekunder.

b. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah perhitungan skala nyeri, senam rematik dan lembar observasi berisi identitas responden, hasil pengukuran skala nyeri serta pemberian senam rematik untuk mendapatkan informasi dari responden.

F. Instrumen Penelitian

Menurut Nursalam (2008), instrument yang digunakan untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Data karakteristik responden diperoleh dengan wawancara langsung dengan responden, yang isinya menekankan pada informasi karakteristik yaitu; nama, usia, jenis kelamin dan lain-lain.

2. Pengukuran Observasi

Pengukuran observasi dilakukan melalui lembar observasi. Penurunan rasa nyeri dan peningkatan rentang gerak dapat diobservasi adalah nyeri dan rentang gerak osteoarthritis lutut sebelum dan sesudah intervensi serta nyeri dan rentang gerak osteoarthritis lutut sebelum dan sesudah tanpa intervensi.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan secara manual yaitu dengan mengisi lembar observasi yang disediakan. Pengolahan data tersebut kemudian diolah menggunakan program SPSS dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Editing

Proses editing dilakukan setelah data terkumpul dan dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data, kesalahan pengisian dan konsistensi dari setiap jawaban.

b. Koding

Dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan data, semua jawaban atau data perlu disederhanakan yaitu dengan simbol-simbol tertentu untuk setiap jawaban (pengkodean).

c. Tabulasi data

Setelah selesai pembuatan kode selanjutnya dengan pengolahan data ke dalam atau tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Analisa data

Dalam penelitian ini, data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dengan teknik statistik. Proses pemasukan data dan pengolahan data menggunakan aplikasi perangkat lunak komputer dengan menggunakan program SPSS 20.

Penelitian ini menggunakan dua cara dalam menganalisis data yaitu analisis data Univariat dan Bivariat.

a. Analisa Univariat

Analisa univariat dilakukan terhadap variabel dari hasil penelitian menghasilkan distribusi frekuensi dari tiap variabel yang diteliti.

b. Analisa Bivariat

Setelah data-data tersebut ditabulasi, maka dilakukan interpretasi terhadap data yang terkumpul dengan menggunakan komputerisasi. Rumus statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *paired T-test* *uji Wilcoxon signed ranks* dan *mann-whitney* untuk mengetahui perbedaan masing-masing variabel kelompok perlakuan dan kelompok kontrol.

H. Kode Etik Penelitian

Menurut Nursalam (2008), ada tiga bagian yang menjadi prinsip etis dalam penelitian (pengumpulan data), yaitu:

1. Prinsip manfaat

a. Bebas dari penderitaan

Peneliti menjelaskan prosedur perawatan yang akan dijalankan dan meyakinkan responden intervensi yang akan diberikan tidak menyakiti responden. Jika responden merasa ada ketidaknyamanan dalam memberikan intervensi, responden akan dieksklusikan.

b. Bebas dari eksploitasi

Peneliti menjelaskan secara jelas manfaat dan tujuan penelitian untuk perkembangan ilmu keperawatan, sehingga responden mengerti dan yakin bahwa informasi yang diberikannya untuk peneliti digunakan untuk tujuan dan kepentingan penelitian dan tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan lainnya.

c. Risiko (*benefits ratio*)

Peneliti harus berhati-hati memperhitungkan resiko dan keuntungan yang akan berakibat pada subjek pada setiap tindakan dalam penelitian.

2. Prinsip Menghargai Hak-Hak Subjek

a. Hak untuk ikut atau tidak menjadi responden (*right to self determination*)

Subjek harus diperlakukan secara manusiawi. Subjek mempunyai hak memutuskan apakah mereka bersedia menjadi subjek atau tidak tanpa adanya paksaan ataupun sanksi yang akan berakibat kepada subjek

- b. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan (*right to full disclosure*)

Peneliti menjelaskan secara terbuka semua informasi penelitian kepada responden, mulai dari tujuan penelitian, manfaat, keuntungan dan risiko penelitian, intervensi dan prosedur yang dipakai, serta semua informasi yang terkait kepada responden.

- c. *Informed consent*

Peneliti menjelaskan kepada responden bahwa responden memiliki hak untuk menyetujui atau menolak berpartisipasi dalam penelitian ini. Peneliti memberikan hak bebas apakah responden ini menandatangani *informed consent* atau tidak. Jika responden menandatangani *informed consent* itu berarti responden setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.

- 3. Prinsip keadilan (*right to justice*)

- a. Hak untuk mendapatkan pengobatan yang adil (*right in fair treatment*)

Peneliti memperlakukan semua responden secara adil perawatan yang diberikan pada responden. Meskipun intervensi senam rematik diberikan pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Peneliti berlaku adil terhadap pemberian intervensi tersebut.

- b. Hak dijaga kerahasiaannya (*right to privacy*)

Peneliti merahasiakan semua informasi terkait dengan identitas responden dengan cara menyamarkan setiap nama responden dengan menggantinya

dengan kode responden dimana hanya peneliti yang mengetahui kode responden tersebut. Selain itu, semua data terkait informasi responden disimpan oleh peneliti dan tidak akan disebarluaskan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Puskesmas Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Puskesmas samata Kec. Somba Opu Kab.Gowa adalah salah satu puskesmas yang berada di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Puskesmas Samata merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Puskesmas Samata Kec. Somba Opu Kab. Gowa terletak di jalan JL.Mustafa Dg.Bunga Kelurahan Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Puskesmas Samata terbagi menjadi beberapa wilayah kerja salah satunya adalah Wilayah kerja Samata dengan jumlah lansia sebanyak 750 Orang, sedangkan lansia yang memiliki ciri ciri osteoarthritis lutut sejumlah 243 orang. Namun hanya 24 orang yang akan dijadikan responden sesuai dengan kriteria inklusi, yang akan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 12 orang kelompok perlakuan dan 12 orang kelompok kontrol. Penentuan dan pengambilan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus yang diterapkan oleh Alimul Hidayat yaitu 10-15% dari total keseluruhan jumlah populasi yaitu 243 orang yang berada di wilayah kerja puskesmas Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa (hidayat, 2008)

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini tentang pengaruh senam rematik terhadap penurunan nyeri dan peningkatan rentang gerak osteoarthritis lutut lansia yang telah dilakukan sejak bulan April 2017. Responden dalam penelitian ini adalah lansia yang mengalami

osteoarthritis lutut dengan jumlah responden sebanyak 24 orang dengan 12 responden sebagai kelompok intervensi dan 12 responden sebagai kelompok kontrol.

Jenis penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian quasi eksperimental. Desain penelitian berupa Pre-Test dan Post-Test. Dalam rancangan ini, kelompok eksperimental diberikan perlakuan sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan. Penelitian ini dilaksanakan selama 7 hari dimana hari pertama dilakukan observasi skala nyeri selanjutnya diberikan senam rematik selama seminggu kedepan dan pada hari kedelapan dilakukan Post Test. Pemberian senam rematik dilakukan selama tujuh hari dengan frekuensi 1 kali sehari yaitu dilakukan pada pagi hari.

1. Karakteristik responden

Table 4.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Dan Pekerjaan Pada Pralansia yang Mengalami Nyeri Osteoarthritis Lutut.

Karakteristik Responden	Kelompok Responden				Total	
	perlakuan		kontrol		F	%
	F	%	F	%		
Umur						
60-74	11	45	10	45	21	90
75-90	1	5	2	5	3	10
>90	0	0	0	0	0	0
Jumlah (n)	12	50	12	50	24	100
Jenis kelamin						
Laki-laki	3	10	2	10	5	20
Perempuan	9	40	10	40	19	80
Jumlah (n)	12	50	12	50	24	100
Pekerjaan						
IRT	9	40	10	40	19	80
Petani	3	10	2	10	5	20
Jumlah (n)	12	50	12	50	24	100


Sumber : Data Primer,2016

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, menunjukkan bahwa distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat usia adalah sebagian besar responden berusia 60-74 tahun yaitu sebanyak 11 orang atau sekitar 90% sedangkan yang berusia 74-90 tahun yaitu sebesar 1 orang atau sekitar 10%.


Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 3 orang atau sekitar 30% dan 9 orang responden atau sekitar 70% berjenis kelamin perempuan. Distribusi frekuensi responden berdasarkan pekerjaan adalah sebanyak 9 orang responden atau sekitar 70% bekerja sebagai ibu rumah tangga dan 3 orang atau sekitar 30% responden bekerja sebagai petani.

2. Analisa univariat

Perbedaan rerata skala nyeri dan rentang gerak pada kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol sebelum dilakukan intervensi (Pre-Test) terlihat dalam bagan dengan rincian sebagai berikut:



Berdasarkan bagan terlihat bahwa skala nyeri dan rentang gerak pada saat Pre-Test kelompok perlakuan skala nyeri yang paling tinggi adalah skala nyeri 9 dengan medium 7.00 dan rentang gerak adalah nilai 4 dengan medium 2.50. Sedangkan skala nyeri pada kelompok kontrol skala nyeri yang paling tinggi adalah 8 dengan medium 8.00 dan rentang gerak yang paling tinggi adalah 4 dengan mean 3.00. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan mean antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol, dimana pada kelompok perlakuan lebih tinggi dari pada kelompok kontrol.



Sumber : Data Primer, 2016

Berdasarkan bagan terlihat bahwa skala nyeri dan rentang gerak osteoarthritis lutut pralansia setelah Post-Test pada kelompok perlakuan skala nyeri yang paling tinggi adalah skala nyeri 6 dengan mean 4.50 dan rentang gerak yang paling tinggi

adalah 3 dengan mean 2.00 Sedangkan skala nyeri pada kelompok kontrol yang paling tinggi adalah 8 dengan mean 8.00 dan rentang gerak yang paling tinggi adalah 4 dengan mean 3.00 Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan mean bermakna antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol, dimana pada kelompok perlakuan memiliki skala nyeri dan rentang gerak lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol.

3. Analisa bivariat

Analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Senam rematik) dengan variabel dependen (Skala nyeri dan rentang gerak) ditujukan dengan nilai $p < 0,05$. Selanjutnya untuk mengetahui apakah data penelitian terdistribusi normal pada data penurunan skala nyeri dan peningkatan rentang gerak sebelum dan sesudah diberi intervensi senam rematik, maka digunakan uji normalitas dengan menggunakan uji *shapiro-wilk test*. Setelah dilakukan uji normalitas menunjukkan bahwa tidak semua data terdistribusi secara normal hanya data pre dan post rentang gerak kelompok kontrol yang terdistribusi secara normal. Hasil uji perbandingan skala nyeri dan rentang gerak Pre Test dan Post Test pada kelompok kontrol (*Wilcoxon Signed Ranks Test*).

Tabel 4.2

Hasil Uji Perbandingan Skala Nyeri Dan Rentang Gerak Pre Test Dan Post Test pada kelompok kontrol (*Wilcoxon Signed Ranks Test*)

Skala Nyeri dan Rentang Gerak	Pre Test	Post Test	P-value
Medium Skala Nyeri	8.00	8.00	1.000
Medium Rentang Gerak	3.00	3.00	2.75

Sumber: Data Primer,2016

Setelah dilakukan Uji *Wilcoxon Signed Ranks Test* didapatkan p-value pada kelompok kontrol (pre-post test skala nyeri) sebesar 1.000 atau $p > 0,05$ berarti tidak ada pengaruh variabel kelompok kontrol (skala nyeri) terhadap penurunan skala nyeri osteoarthritis lutut. Kemudian dilakukan Uji *Wilcoxon signed Ranks Test* didapatkan p-value pada kelompok kontrol (pre-post test rentang gerak) sebesar 2,75 atau $p > 0,05$ berarti tidak ada pengaruh variabel kelompok kontrol (rentang gerak) terhadap peningkatan rentang gerak osteoarthritis lutut.

Tabel 4.3
Hasil Uji Perbandingan Skala Nyeri Dan Rentang Gerak Pre Test Dan Post Test pada kelompok Intervensi

Skala Nyeri dan Rentang Gerak	Pre Test	Post Test	P-value
Medium Skala Nyeri	7.00	4.50	0.002
Medium Rentang Gerak	2.50	2.00	0.059

Sumber: Data Primer, 2016

Hasil *Wilcoxon signed Ranks Test* pada skala nyeri dan peningkatan rentang gerak pre dan post (skala nyeri) pada kelompok intervensi didapatkan p-value 0,002 atau $p < 0,005$ berarti ada pengaruh variabel kelompok intervensi (skala nyeri) terhadap penurunan skala nyeri osteoarthritis lutut. Sedangkan hasil uji *Wilcoxon signed Ranks Test* pada skala nyeri dan peningkatan rentang gerak pre dan post test (rentang gerak) pada kelompok intervensi didapatkan p-value 0,059 atau $p < 0,05$ berarti tidak ada pengaruh variabel kelompok intervensi (rentang gerak) terhadap peningkatan rentang gerak osteoarthritis lutut. Untuk melihat pengaruh variabel independen dan variabel dependen maka dilakukan uji *Mann-Whitney*. Hasil Uji perbandingan skala nyeri dan rentang gerak Post Test pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol (*Mann-Whitney*) dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Perbandingan Skala Nyeri Dan Rentang Gerak Post Test pada
Kelompok Intervensi Dan Kelompok Kontrol (*Mann-Whitney*)

Variabel	Medium (min-max)		P-value
	Intervensi	Control	
Skala nyeri	4.50	8.00	0.000
Rentang gerak	2.00	3.00	0.017

Sumber : Data Primer,2016

Setelah dilakukan Uji *Mann-Whitney* didapatkan p-value pada post test skala nyeri intervensi dan kontrol sebesar 0.000 atau $p < 0.05$ berarti ada perbedaan yang sangat bermakna antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi skala nyeri pada post test atau ada pengaruh variabel kelompok intervensi terhadap penurunan nyeri osteoarthritis lutut.

Sedangkan hasil Uji *Mann-Whitney* didapatkan p-value pada post test Rentang Gerak intervensi dan kontrol sebesar 0.017 atau $p < 0.05$ berarti ada perbedaan yang sangat bermakna antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi rentang gerak pada post test atau ada pengaruh variabel kelompok intervensi terhadap peningkatan rentang gerak osteoarthritis lutut.

4. Pembahasan

Osteoarthritis merupakan penyakit sendi degeneratif pada kartilago sendi dengan perubahan reaktif pada batas-batas sendi, seperti pembentukan osteofit, perubahan tulang subkondral, perubahan sumsum tulang, reaksi fibrous pada sinovium, dan penebalan kapsul sendi (Ervan, 2011 dalam Yuliastari, 2012).

Nyeri adalah pengalaman sensori nyeri dan emosional yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual dan potensial yang tidak menyenangkan yang terlokalisasi pada suatu bagian tubuh ataupun sering disebut dengan istilah distruktif dimana jaringan rasanya seperti di tusuk-tusuk, panas terbakar, melilit, seperti emosi, perasaan takut dan mual.

Rentang gerak atau *range of motion* (ROM) adalah latihan yang dilakukan untuk mempertahankan atau memperbaiki tingkat kesempurnaan kemampuan menggerakkan persendian secara normal dan lengkap untuk meningkatkan massa otot dan tonus otot.

Range of motion adalah gerakan dalam keadaan normal dapat dilakukan oleh sendi yang bersangkutan. Latihan *range of motion* (ROM) merupakan istilah baku untuk menyatakan batas atau batasan gerakan sendi yang normal dan sebagai dasar untuk menetapkan adanya kelainan ataupun untuk menyatakan batas gerakan sendi yang abnormal.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain *quasy experimental* yaitu mengungkapkan kemungkinan adanya sebab akibat antara variabel tanpa adanya manipulasi suatu variabel. Dimana terdapat dua kelompok eksperimen yang diberi perlakuan berbeda. Sampel pada penelitian ini diobservasi terlebih dahulu sebelum diberi perlakuan, kemudian setelah diberikan perlakuan sampel tersebut diobservasi kembali.

Peneliti memilih lokasi di wilayah kerja puskesmas Samata kecamatan Somba Opu kabupaten Gowa karena jumlah lansia yang terdaftar termasuk angka yang cukup tinggi yaitu mencapai 750 jiwa. Dan menurut data dari puskesmas samata terdaftar 243 jumlah lansia yang memiliki ciri-ciri osteoarthritis lutut.

Distribusi frekuensi responden berdasarkan tingkat usia adalah sebagian besar responden berusia 60-74 tahun yaitu sebanyak 11 orang atau sekitar 90% sehingga dapat diketahui bahwa penyakit osteoarthritis lutut lebih banyak ditemukan pada lansia umur 60-70 tahun dikarenakan pada usia tersebut lansia sudah mengalami penurunan fungsi pada persendian dan penurunan cairan sendi synovial yang membuat otot-otot dan tendon yang menghubungkan sendi mengalami gesekan yang menimbulkan rangsang nyeri dan penurunan rentang gerak. Sedangkan yang berusia 75-90 tahun yaitu sebesar 1 orang atau sekitar 10%, tidak berbeda jauh dengan usia 60-74 yang tercatat sebagai usia yang dominan terjadinya osteoarthritis pada usia 75-90 juga merupakan usia yang sangat rawan terjadinya osteoarthritis lutut karena penyakit ini merupakan penyakit sendi degeneratif yang berkaitan dengan kerusakan kartilago sendi lutut yang menyebabkan pada usia 75 tahun keatas mengalami penyakit osteoarthritis lutut karena kurangnya cairan sendi yang melumasi kartilago sehingga terjadi gesekan saat bergerak yang menyebabkan peningkatan nyeri dan penurunan rentang gerak pada responden.

Distribusi frekuensi responden berdasarkan jenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 3 orang atau sekitar 30% dan 9 orang responden atau sekitar 70% berjenis kelamin perempuan, dikarenakan prevalensi osteoarthritis lutut pada laki-laki sebelum usia sebelum 50 tahun ke atas lebih tinggi tetapi pada penelitian ini distribusi responden kebanyakan pada usia 50-60 tahun dan kebanyakan terkena pada perempuan karena pada perempuan mengalami pengurangan hormone ekstrogen yang signifikan. Distribusi frekuensi responden berdasarkan pekerjaan adalah sebanyak 9 orang responden atau sekitar 70% bekerja sebagai ibu rumah tangga dan 3 orang atau

sekitar 30% responden bekerja sebagai petani, pekerjaan tersebut sangat menjadi faktor pemicu munculkan osteoarthritis lutut akibat aktivitas fisik.

Perbandingan skala nyeri dan rentang gerak pada saat Pre-Test kelompok perlakuan skala nyeri yang paling tinggi adalah skala nyeri 9 dengan medium 7.00 dan rentang gerak adalah nilai 4 dengan medium 2.50. Sedangkan skala nyeri pada kelompok kontrol skala nyeri yang paling tinggi adalah 8 dengan medium 8.00 dan rentang gerak yang paling tinggi adalah 4 dengan medium 3.00. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan mean antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol, dimana pada kelompok perlakuan lebih tinggi dari pada kelompok kontrol.

Perbandingan skala nyeri dan rentang gerak osteoarthritis lutut pralansia setelah Post-Test pada kelompok perlakuan skala nyeri yang paling tinggi adalah skala nyeri 6 dengan medium 4.50 dan rentang gerak yang paling tinggi adalah 3 dengan medium 2.00. Sedangkan skala nyeri pada kelompok kontrol yang paling tinggi adalah 8 dengan medium 8.00 dan rentang gerak yang paling tinggi adalah 4 dengan medium 3.00. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan mean bermakna antara kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol, dimana pada kelompok perlakuan memiliki skala nyeri dan rentang gerak lebih rendah dibandingkan kelompok kontrol.

Dari hasil hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara Pre-Test dan Post-Test pada kelompok intervensi yaitu terjadi penurunan tingkat nyeri dan peningkatan rentang gerak pada osteoarthritis lutut setelah dilakukannya senam rematik. Sehingga dapat diketahui bahwa senam rematik dapat memberikan pengobatan secara non medis pada penderita osteoarthritis lutut

karna hasil pembuktian dari Pre-Test dan Post-Test pada kelompok intervensi. Dan untuk kelompok kontrol tidak terjadi perubahan atau penurunan skala nyeri dan peningkatan rentang gerak pada osteoarthritis lutut sebelum dan sesudahnya dilakukan pengukuran pada responden, karna tidak adanya implementasi yang diberikan kepada responden.

Setelah dilakukan pengolahan data dan menguji hasil penelitian secara kuantitatif dengan menggunakan uji *Mann-Whitney Test* dapat diketahui bahwa ada hubungan antara pemberian terapi senam rematik terhadap penurunan nyeri dan peningkatan rentang gerak osteoarthritis lutut pralansia dimana hasil yang diperoleh $p = 0.000$ (skala nyeri) dan $p = 0.017$ (rentang gerak) atau $p \text{ value} < 0.05$ yang artinya ada hubungan yang signifikan.

Senam rematik merupakan salah satu metode yang praktis dan efektif dalam memelihara kesehatan tubuh. Gerakan yang terkandung dalam senam rematik adalah gerakan yang sangat efektif, efisien, dan logis karena rangkaian gerakannya dilakukan secara teratur dan terorganisasi bagi penderita rematik. Osteoarthritis lutut adalah suatu penyakit sendi degeneratif yang berkaitan dengan kerusakan kartilago sendi lutut, dan merupakan penyakit kerusakantulangrawansendi yang berkembang secara lambat dan tidak diketahui penyebabnya meskipun terdapat beberapa faktor resiko yang berperan, sehingga dengan senam rematik dapat membuat otot-otot akan menjadi tetap kencang, memperlancar peredaran darah, memperlancar cairan getah bening dan menjaga kadar lemak tetap normal sehingga dapat menurunkan tingkat nyeri dan dapat meningkatkan rentang gerak pada penderita osteoarthritis lutut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rochman (2012). Penelitian Perbedaan Nyeri Rematik Sebelum Dan Sesudah Senam Rematik Pada Lansia Di Desa Handipolo Kudus dilakukan pada 24 sampel, dari hasil uji Wilcoxon di dapatkan perbedaan nyeri rematik sebelum dan sesudah senam rematik p dengan rata-rata nyeri sebelum senam sebesar 5,44 dalam skala nyeri sedangkan rata-rata nyeri sesudah senam sebesar 3.11 dalam skala nyeri dan p value.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhendriyo (2014) dengan judul penelitian Pengaruh Senam Rematik Terhadap Pengurangan Rasa nyeri pralansia di kehidupan sehari-hari. Dimana hasil penelitiannya menggunakan uji normalitas dan uji hipotesis menggunakan uji analisis non parametrik menggunakan uji Wicoxon menunjukkan bahwa rerata nyeri pada pre test adalah 4.44 dan pada post test 2.05 adalah Analisis kemaknaan dengan menggunakan uji Wilcoxon Signed Z p 0.005 menunjukkan adanya penurunan rasa nyeri setelah dilakukannya senam rematik. Dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan dan beberapa jurnal pendukung dapat disimpulkan bahwa senam rematik dapat memberikan manfaat yang luar biasa sebagai terapi non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri dan peningkatan rentang gerak pada penderita osteoarthritis lutut dan juga dapat di lakukan oleh semua masyarakat karna caranya yang cukup mudah dan efesian dan yang terkendala dimasalah ekonomi.

Islam menghasung pemeluknya untuk menjadi kuat dan sehat baik secara rohani maupun jasmani. Islam menunjukkan keutamaan kekuatan dan kesehatan sebagai modal besar di dalam beramal saleh dan beraktivitas di dalam urusan agama dan urusan dunia seorang muslim.

Allah Subhanah wa Ta'ala juga berfirman:

قَالَتِ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)

Terjemahnya :

“Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat fisiknya lagi dapat dipercaya.” (QS. al-Qashash: 26).

Rasulullah Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Dan pada masing-masingnya terdapat kebaikan. Bersemangatlah terhadap perkara-perkara yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau bersikap lemah.” (HR. Muslim).

Dengan dilakukannya senam rematik dapat mempermudah seseorang yang mengalami kekakuan dalam aktivitas fisik menjadi lebih mudah digerakkan dan sesuai dengan perkataan Ibnu qoyyim Al Jauziyah bagian organ mana saja yang banyak digerakkan maka akan kuat, sehingga mempermudah seseorang untuk beramal saleh dan beraktivitas didalam urusan agama dan urusan dunia seorang muslim.

Menurut Alquran pertumbuhan dan perkembangan manusia memiliki pola umum yang dapat diterapkan pada manusia, meskipun terdapat perbedaan individual. Pola yang terjadi adalah bahwa setiap individu tumbuh dari keadaan lemah menuju keadaan yang kuat dan kemudian kembali melemah. Dengan kata lain, pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan hukum alam, ada kenaikan dan penurunan Alquran menyatakan sebagai berikut:

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikanmu sesudah lemah itu menjadi kuat, kemudian menjadi lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui Lagi Maha Kuasa. (QS Al-Ruum 30:54).

Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan diantara kamu ada yang dikembalikan pada umur yang paling lemah (pikun), supaya dia tidak mengetahui segala sesuatunya yang pernah dia ketahui. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana. (QS An-Nahl 16:70)

Dengan demikian terlihat bahwa pola yang disebutkan dalam ayat ini menyatakan bahwa seseorang lansia sama dengan masa bayi yang mengalami kelemahan sampai tidak tahu apa-apa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Samata Kec. Somba Opu Kab. Gowa didapatkan hasil bahwa terjadi penurunan skala nyeri dan peningkatan rentang gerak pada penderita osteoarthritis lutut pralansia yang bermakna setelah dilakukan intervensi terapi senam rematik. Penurunan skala nyeri dan peningkatan rentang gerak bisa terjadi karna gerakan yang terkandung dalam senam rematik adalah gerakan yang sangat efektif, efisien, dan logis karena rangkaian gerakannya dilakukan secara teratur dan terorganisasi bagi penderita senam rematik sehingga membuat otot-otot akan menjadi tetap kencang, memperlancar peredaran darah memperlancar cairan getah bening dan menjaga kadar lemak tetap normal sehingga dapat menurunkan tingkat nyeri dan dapat meningkatkan rentang gerak bagi penderita osteoarthritis lutut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai pengaruh senam rematik terhadap penurunan nyeri dan peningkatan rentang gerak osteoarthritis lutut pralansia di Wilayah Kerja Puskesmas Samata Kec. Somba Opu Kab. Gowa disimpulkan sebagai berikut :

1. Didapatkan bahwa rata-rata tingkat skala nyeri responden pada kelompok intervensi (pre test) adalah 7.00.
2. Didapatkan rata-rata tingkatan rentang gerak responden pada kelompok intervensi (pre test) adalah 2.50.
3. Didapatkan bahwa rata-rata tingkat skala nyeri responden pada kelompok intervensi (post test) adalah 4.50.
4. dan rata-rata tingkatan rentang gerak responden pada kelompok intervensi (post test) adalah 2.00.
5. Ada hubungan antara pemberian terapi senam rematik terhadap penurunan nyeri osteoarthritis lutut lansia dimana dari hasil uji *Mann-Whitney Test* diperoleh $p = 0.000$ (skala nyeri) yang artinya ada hubungan yang signifikan.
6. Ada hubungan antara pemberian terapi senam rematik terhadap peningkatan rentang gerak osteoarthritis lutut lansia dimana dari hasil uji *Mann-Whitney Test* dimana didapatkan $p = 0.017$ (rentang gerak) atau $p \text{ value} < 0.05$ yang artinya ada hubungan yang signifikan.

B. Saran

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data dasar dalam meluaskan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh senam rematik terhadap penurunan nyeri dan peningkatan rentang gerak osteoarthritis lutut pralansia.

2. Bagi institusi

Informasi hasil penelitian ini dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas institusi dan pendidikan agar informasi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk memperkaya pengetahuan dan keperluan referensi ilmu keperawatan gerontik tentang pengaruh pemberian senam rematik terhadap penurunan nyeri dan peningkatan rentang gerak osteoarthritis lutut pralansia.

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan panti sosial untuk melaksanakan terapi senam rematik kepada para lansia dan pralansia yang mengalami penyakit osteoarthritis lutut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terhemahannya. Kementerian agama RI. (2013).
- Amrullah, A. *Analisis Faktor Resiko Derajat Osteoarthritis Lutut pada Pasien Rawat Jalan di Poli Reumatologi RSUP dr. Kariadi Semarang*. Universitas Muhammadiyah Semarang 2013.
- Andarmoyo, S. *Persalinan Tanpa Nyeri Berlebihan*. Jogjakarta: Ar-RuzzMedia (2013).
- Afroh, F., Mohamad Judha, Sudarti, *Teori Pengukuran Nyeri & Nyeri Persalinan*, Yogyakarta : Nuha Medika (2012).
- Arief, M. *Pengantar Metodologi Penelitian untuk Ilmu Kesehatan*. Surakarta: UNS press. 2008
- Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid II Edisi V. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. p.1195-1201.
- Bachtiar, A. *Pengaruh Ekstrak Jahe (Zingiber Officinale) terhadap Tanda dan Gejala Osteoarthritis pada Pasien Rawat Jalan di Puskesmas Pandan Wangi Kota Malang*. Tesis FIK UI, 1-87. (2010).
- Elvira. *Osteoarthritis Genu*. (Online) diakses tanggal 14 juni 2015 dari <http://www.diskdr-online.com/news/5/OSTEOARTHRITIS-GENU>. 2010.
- Ervan, Hartanto S. Osteoarthritis. Diakses : 04/06/2012. <http://fisioterapishartanto.blogspot.com/osteoarthritis-oa>. (2011).
- Fauci, A.S. and Langford, C.A. *Harrison's Rheumatology*. Mc Grawz-Hill: Medical Publishing Division. 2006.
- Felson D.T, Zhang Y., Hannan M.T., et al. *The Incidence and Natural History of Knee Osteoarthritis in the Elderly : The Framingham Osteoarthritis Study*. Arthritis Rheumatology; 2008; 38 : 1500 – 1505.
- Felson D.T., Zhang Y. *An Update on the Epidemiology of Knee and Hip Osteoarthritis with a View to Prevention*. Arthritis Rheumatology, 2008
- Felson D.T., *Osteoarthritis New Insights. Part 1 : The Disease and Its Risk Factors*. Ann Intern Med, 2006
- Gede Kambayana. IGN Eka Imbawan, Tjokorda Raka Putra, *Korelasi Kadar Matrix Metalloproteinases 3 (MMP-3) dengan Derajat Beratnya Osteoarthritis*

Lutut. Divisi Reumatologi, Bagian Ilmu Penyakit Dalam FK Unud/RSUP Sanglah. 2011.

- Hamijoyo L. *Pengapuran Sendi atau Osteoarthritis*. Diakses tanggal 23 April 2015 dari <http://reumatologi.or.id/reuarttail?id=232013>.
- Hidayat. A.Aziz Alimul. *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis Data*. Jakarta : Salemba Medika2011.
- Hidayat, A. Aziz Alimul, *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Proses Keperawatan Buku 1*, Jakarta: Salemba Medika.2008.
- Kesehatan RI ; *Hal. 2 (Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan)*.2013.
- M.A., Sabara-Saga. *Diet intensif dan aktifitas fisik untuk wanita lansia penderita osteoarthritis dengan obesitas*. Medula. 2013.
- McCarthy, E., Frassica, F.J. *Pathology of Bone and Joint Disorders with Clinical and Radiographic Correlation (2nded.)*. United Kingdom: Cambridge University Press.2015.
- Mary B, Goldring and Otero M,*Inflammation in Osteoarthritis*. Curr Opin Rheumatology. 2011.
- Meiner, S.E. *Gerontologic Nursing (4thed.)*. St. Louis, Missouri: Elsevier Mosby.(2011).
- Maharani, EP*Faktor-faktor resiko Osteoarthritis Lutut (Studi kasus di RS Dr. Kariadi Semarang)*. (Tesis). Semarang. Program Pascasarjana Magister Epidemiologi UNDIP.2007.
- Nursarifah, R. *Hubungan antara Obesitas Dengan Kejadian Osteoarthritis Lutut di RSUP dr. Kariadi Semarang*. FK Unimus Semarang.2011.
- Nursalam.*Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Edisi 2 Pedoman Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika2011.
- Nugroho, Wahyudi. *Keperawatan Gerontik & Geriatrik*.Edisi ke 2.Jakarta: EGC
- Potter, P.A., Perry, A.G., Stockert, P.A., Hall, A.M. (2013). *Fundamentals of Nursing(8thed.)*. St. Louis, Missouri: Elsevier Mosby. 2008.
- Potter & Perry, *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik*, Jakarta: EGC 2005.

- Prasetyo,S,N. *Konsep dan Proses Keperawatan Nyeri*. Yogyakarta : Garaha Ilmu. 2010.
- Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS). *Hasil Riskesdas 2013*. Jakarta: Badan Litbangkes, DEPKES RI, 2013.
- Soeroso, Juwono. *Comprehensive Management of Osteoarthritis, dalam : Rheumatology, Osteoporosis & Phy topharmaca Update I*. Yogyakarta.2008.
- Suratun dkk, *Pelayanan Keluarga Berencana dan Pelayanan Kontrasepsi*. Trans Info Media. Jakarta.2008.
- Soeroso S, Isbagio H, Kalim H, Broto R, Pramudiyo R. *Osteoarthritis*. In: Sudoyo AW, Setiyohadi B, Alwi I, Simadibrata M, Setiati S, editors. 2009.
- Sugondo S,*Obesitas*. In: Sudoyo AW, Setiyohadi B, Alwi I, Simadibrata M, Setiadi S, editors. *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*.2009.
- Sulistyo, Andarmayo dan Suharti. *Persalinan Tanpa Rasa Nyeri Berlebihan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.2013.
- Sugiyono. *metode penelitian kuantitatif kualitatif Dan R&D*.Bandung Alfabeta. 2010
- Yuliastari Aminurul. *Pengaruh Kompres Panas dengan Kompres Dingin Terhadap Pengurangan Nyeri pada Osteoarthritis Sendi Lutut*. Naskah Publikasi. Fakultas Ilmu Kesehatan Universiats Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.2012.
- Zhang Y, Joanne M, Jordan, MD. *Epidemiology of Osteoarthritis*. Clint Geriatry Med. 2010 August.2010.

L

A

M

P

I



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

A

N

LAMPIRAN 1

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SENAM REMATIK

A. Senam Rematik

Senam rematik merupakan salah satu metode yang praktis dan efektif dalam memelihara kesehatan tubuh. Gerakan yang terkandung dalam senam ergonomik adalah gerakan yang sangat efektif, efisien, dan logis karena rangkaian gerakannya dilakukan secara teratur dan terorganisasi bagi penderita rematik. (Wahyudi Nugroho,2008).

B. Keuntungan senam rematik, yaitu:

- Tulang menjadi lebih lentur.
- Otototot akan menjadi tetap kencang.
- Memperlancar peredaran darah.
- Menjaga kadar lemak darah tetap normal.
- Jantung menjadi lebih sehat.
- Tidak mudah mengalami cedera.

C. Cara melakukan senam rematik, sebagai berikut:

1. Gerakan Duduk :

- a) Angkat kedua bahu keatas mendekati telinga, putar kedepan dankebelakang.
- b) Bungkukan badan, kedua lengan meraih ujung kaki lantai.



- c) Angkat kedua siku sejajar dada, tarik ke depan dada.
- d) Angkat paha dan lutut secara bergantian, kedua tangan menahan tubuh.



- e) Putar tubuh bagian atas kesamping kanan dan kiri, kedua lengan di ataspinggang.
2. Gerakan berbaring atau tidur
- a) Bentangkan kedua lengan dan tangan, ambil nafas dalam-dalam dan hembuskan.
 - b) Kedua tangan di samping tekuk siku dan tangan megapal.



- c) Tangan luruskan ke atas, lalu tepuk tangan.
- d) Tekuk sendi panggul dan tekuk lutut dengan kedua tangan tarik sampai diatas dada.



- d) Pegang erat kedua tangan di atas perut, tarik kebelakang kepala dan kebawah.
- e) Angkat tungkai bawah bergantian dengan bantuan kedua tangan.



LAMPIRAN 2**LEMBAR KUESIONER****PENGARUH SENAM REMATIK TERHADAP PENURUNAN NYERI DAN
PENINGKATAN RENTANG GERAK *OSTEOARTRITIS* LUTUT LANSIA**

Inisiasi subjek :

Tanggal / waktu penelitian : 20-April-2016

Intervensi yang dilakukan : -

Petunjuk : Jawaban akan di isi oleh peneliti berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti

BAGAN I : PENGKAJIAN DATA DEMOGRAFI

a. Jenis kelamin :

Laki laki

Perempuan

b. Usia : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

c. Pekerjaan :

Pegawai Negeri

Pegawai swasta, sebutkan

Ibu rumah tangga

Petani / buruh

Lain-lain

d. Tingkat pendidikan terakhir

Pendidikan tinggi

- SMA/Sederajat
- SMP/Sederajat
- Tak sekolah

BAGAN II : PENGKAJIAN SEBELUM DAN SESUDAH INTERVENSI

Skala Intensitas Nyeri

Sebelum dan sesudah Intervensi (sebelum dan sesudah dilakukan senam rematik

)

Petunjuk : Pada skala ini, angka 0 menunjukkan tidak nyeri, angka 1-3 nyeri ringan, angka 4-7 nyeri sedang, angka 8-10 nyeri berat, silahkan ibu menunjukkan salah satu angka yang sesuai menurut ibu untuk menggambarkan tingkat nyeri yang ibu rasakan.

KELOMPOK PERLAKUAN DAN KONTROL

SKALA NYERI



RENTANG GERAK

DERAJAT FUNGSI

I : Normal
(100%)

RENTANG GERAK SENDI

Gerak penuh hambatan

II	: Good	Gerak tidak penuh (75%)
II	: Fair	Gerak tidak penuh ada
	hambatan(50%)	
IV	: Poor	Gerak ada hambatan (25%)
V	: Trance	Tidak ada gerak (0%)

**LEMBAR OBSERVASI SKALA NYERI DAN RENTANG GERAK
KELOMPOK PERLAKUAN DAN KONTROL**

NO	INISIAL	SKALA NYERI		RENTANG GERAK		KETERANGAN
		Pre Test	Post Test	Pre Test	Post Test	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						

PERSETUJUAN SEBAGAI RESPONDEN PENELITIAN

Dengan menandatangani lembaran ini, saya:

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Pendidikan terakhir :

Memberikan persetujuan untuk mengisi angket yang diberikan peneliti. Saya mengerti bahwa saya menjadi bagian dari penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh senam rematik terhadap penurunan nyeri dan peningkatan rentang gerak osteoarthritis lutut pralansia di Puskesmas Samata Kec. Somba Opu Kab. Gowa.

Saya telah diberi tahu peneliti bahwa jawaban kuesioner ini bersifat sukarela dan hanya dipergunakan untuk keperluan penelitian. Oleh karena itu dengan sukarela saya ikut berperan serta dalam penelitian ini.

Samata, April 2017

Responden

()

LAMPIRAN 3

MASTER TABEL KELOMPOK PERLAKUAN

NO	INISIAL	UMUR	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	TINGKAT PENDIDIKAN	SKALA NYERI		RENTANG GERAK	
						PRE	POST	PRE	POST
1	NY. SA	2	2	2	2	5	3	2	2
2	NY. MA	2	2	2	2	9	6	4	3
3	NY.SB	2	2	2	1	6	3	2	2
4	NY. KN	2	2	2	3	5	3	1	1
5	NY. BU	2	2	2	2	9	6	2	2
6	NY. MU	2	2	2	2	5	3	2	2
7	NY. DA	2	2	2	2	9	6	2	2
8	NY. RA	2	2	2	2	9	6	2	2
9	NY. MT	2	2	2	2	8	6	4	3
10	TN. SA	2	1	2	2	7	4	4	3
11	TN.SP	2	1	3	2	6	4	4	2
12	TN. RI	2	1	1	4	7	5	2	2

Keterangan :

Umur :

45 – 59 : 1

: 1

60 – 74 : 2

: 2

: 3

: 4

: 5

Rentang gerak :

Derajat I : I

Derajat II : II

Derajat IV : IV

Derajat V : V

Jenis Kelamin :

L : 1

P : 2

Pekerjaan :

PNS : 1

IRT : 2

PETANI : 3

Tingkatan Pendidikan

Tidak sekolah : 1

SD : 2

SMP : 3

S1 : 4

Skala Nyeri

0 : Tidak Nyeri

1-2 : Nyeri Ringan

3-5 : Nyeri Sedang

6-7 : Nyeri Berat

8-9 : Nyeri Tak Tertahankan

MASTER TABEL KELOMPOK KONTROL

NO	INISIAL	UMUR	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN	TINGKAT PENDIDIKAN	SKALA NYERI		RENTANG GERAK	
						PRE	POST	PRE	POST
1	NY. NE	2	2	2	1	8	8	3	3
2	TN. BS	2	1	3	1	8	8	3	3
3	NY. PT	3	2	2	2	8	8	4	4
4	NY. SG	2	2	2	2	8	8	4	4
5	TN. JM	2	1	3	1	7	7	3	3
6	NY. JL	2	2	2	2	8	8	3	3
7	NY. AM	2	2	2	2	7	7	2	2
8	NY. HW	2	2	2	2	7	7	1	1
9	NY. SN	2	2	2	2	7	7	3	3
10	NY. MS	2	2	2	2	8	8	4	4
11	NY. KR	2	2	2	2	8	8	4	4
12	NY. HB	2	2	2	2	5	5	2	2

Keterangan :

Umur :
45 – 59 : 1
60 – 74 : 2

Jenis Kelamin :
L : 1
P : 2

Pekerjaan :
PNS : 1
IRT : 2
PETANI : 3
S1 : 4

Tingkatan Pendidikan
Tidak sekolah : 1
SD : 2
SMP : 3

Skala Nyeri
0 : Tidak Nyeri : 1
1-2 : Nyeri Ringan : 2
3-5 : Nyeri Sedang : 3
6-7 : Nyeri Berat : 4
8-9 : Nyeri Tak Tertahankan : 5

Rentang gerak :
Derajat I : I
Derajat II : II
Derajat III : III
Derajat IV : IV
Derajat V : V

LAMPIRAN 4

Uji Normalitas kelompok intervensi

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
pre testskalanyeri	.207	12	.166	.848	12	.034

a. Lilliefors Significance Correction

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
post testskalanyeri	.265	12	.020	.779	12	.005

a. Lilliefors Significance Correction

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
pre testtrentanggerak	.371	12	.000	.741	12	.002

a. Lilliefors Significance Correction

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
post testtrentanggerak	.364	12	.000	.753	12	.003

a. Lilliefors Significance Correction

Uji Normalitas kelompok kontrol

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
pre testskalanyeri	.325	12	.001	.679	12	.001

a. Lilliefors Significance Correction

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
post testskalanyeri	.325	12	.001	.679	12	.001

a. Lilliefors Significance Correction

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
pre testtrentanggerak	.250	12	.037	.862	12	.051

a. Lilliefors Significance Correction

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
post testtrentanggerak	.250	12	.037	.862	12	.051

a. Lilliefors Significance Correction

LAMPIRAN 5

Uji hubungan

Wilcoxon Signed Ranks Test

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
post testskalanyeriintervensi - pre testskalanyeriintervensi	Negative Ranks	12 ^a	6.50	78.00
	Positive Ranks	0 ^b	.00	.00
	Ties	0 ^c		
	Total	12		

a. post testskalanyeriintervensi < pre testskalanyeriintervensi

b. post testskalanyeriintervensi > pre testskalanyeriintervensi

c. post testskalanyeriintervensi = pre testskalanyeriintervensi

Test Statistics ^a	
	post testskalanyeriintervensi - pre testskalanyeriintervensi
Z	-3.145 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.002

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

Wilcoxon Signed Ranks Test

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Posttestskalanyerikontrol- pretestskalanyerikontrol	Negative Ranks	0 ^a	.00	.00
	Positive Ranks	0 ^b	.00	.00
	Ties	12 ^c		
	Total	12		

a. posttestskalanyerikontrol < pretestskalanyerikontrol

b. posttestskalanyerikontrol > pretestskalanyerikontrol

c. posttestskalanyerikontrol = pretestskalanyerikontrol

Test Statistics^a

	Post test skalanyerikontrol– pretestskalanyerikontrol
Z	.000 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.

Wilcoxon Signed Ranks Test

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Posttestrentanggerakintervensi– pretestrentanggerakintervensi	Negative Ranks	4 ^a	2.50	10.00
	Positive Ranks	0 ^b	.00	.00
	Ties	8 ^c		
	Total	12		

a. posttestrentanggerakintervensi<pretestrentanggerakintervensi

b. posttestrentanggerakintervensi>pretestrentanggerakintervensi

c. posttestrentanggerakintervensi = pretestrentanggerakintervensi

Test Statistics^a

	Posttestrentanggerakintervensi– pretestrentanggerakintervensi
Z	-1.890 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.059

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on positive ranks.

T-Test**Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	pre testrentanggerakkontrol	3.00 ^a	12	.953	.275
	post testrentanggerakkontrol	3.00 ^a	12	.953	.275

a. The correlation and t cannot be computed because the standard error of the difference is 0.

Mann-Whitney Test

Ranks				
	Kelompok	N	Mean Rank	Sum of Ranks
skalanyeri	post testskalanyerikontrol	12	18.04	216.50
	post testskalanyeriintervensi	12	6.96	83.50
Total		24		

Test Statistics ^a	
	skalanyeri
Mann-Whitney U	5.500
Wilcoxon W	83.500
Z	-3.924
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.000 ^b

a. Grouping Variable: kelompok

b. Not corrected for ties.

Mann-Whitney Test


Ranks				
	Kelompok	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Rentanggerak	post testrentanggerakkontrol	12	15.75	189.00
	post testrentanggerakintervensi	12	9.25	111.00
Total		24		

Test Statistics ^a	
	Rentanggerak
Mann-Whitney U	33.000
Wilcoxon W	111.000
Z	-2.391
Asymp. Sig. (2-tailed)	.017
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	.024 ^b

a. Grouping Variable: kelompok

b. Not corrected for ties.

LAMPIRAN 6

SENAM REMATIK**Apa itu senam rematik...?**

Senam rematik merupakan salah satu metode yang praktis dan efektif dalam memelihara kesehatan tubuh. Gerakan yang terkandung dalam senam ergonomik adalah gerakan yang sangat efektif, efisien, dan logis karena rangkaian gerakannya dilakukan secara teratur dan terorganisasi bagi penderita rematik. (Wahyudi Nugroho, 2008)

Tahukah keuntungan senam rematik...?

- + Tulang menjadi lebih lentur.
- + Otot-otot akan menjadi tetap kencang.
- + Memperlancar peredaran darah.
- + Menjaga kadar lemak darah tetap normal.
- + Jantung menjadi lebih sehat.

Cara melakukan senam rematik...**1. Gerakan Duduk;**

- a. Angkat kedua bahu keatas mendekati telinga, putar kedepan dan kebelakang.
- b. Bungkukan badan, kedua lengan meraih ujung kaki lantai.
- c. Angkat kedua siku sejajar dada, tarik ke depan dada.
- d. Angkat paha dan lutut secara bergantian, kedua tangan menahan tubuh.
- e. Putar tubuh bagian atas kesamping kanan dan kiri, kedua lengan di atas pinggang.

**2. Gerakan berbaring atau tidur**

- a. Bentangkan kedua lengan dan tangan, ambil nafas dalam-dalam dan hembuskan.
- b. Kedua tangan di samping tekuk siku dan tangan megapal.
- c. Tangan luruskan ke atas, lalu tepuk tangan.



- d. Tekuk sendi panggul dan tekuk lutut dengan kedua tangan tarik sampai di atas dada.
- e. Pegang erat kedua tangan di atas perut tarik kebelakang kepala dan kebawah.
- f. Angkat tungkai bawah bergantian dengan bantuan kedua tangan.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muh. Wahid Sangrah , Lahir di Agang Je'ne, pada tanggal 27 Juli 1995. Merupakan Anak pertama dan anak semata wayang dari pasangan **Muh. Rasang dan Rahmatia**. Mulai mengikuti pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar di **SDN 47 Ganrang Batu** pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007, pada tahun yang sama pula melanjutkan pendidikan menengah pertama di **SMP Negeri 1 Turatea kabupaten Jeneponto** dan tamat pada tahun 2010, kemudian melanjutkan ke pendidikan menengah kejuruan di **SMK Primanegara Jeneponto** pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013. Terdaftar sebagai mahasiswa jurusan **Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar** pada tahun 2013 melalui jalur undangan atau jalur UMM. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif diberbagai kegiatan kemahasiswaan yakni: HMI Keperawatan UIN Alauddin Makassar, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Kesehatan, Himpunan mahasiswa keperawatan (HMK) SULAWESI-SELATAN, Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia (ILMIKI) Wilyah VI.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R