

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA NY. "J" GESTASI
32 MINGGU 4 HARI DENGAN ANEMIA BERAT DI RSIA SITTI FATIMAH
MAKASSAR TANGGAL 24-30 JUNI 2010**



Karya Tulis Ilmiah

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya Kebidanan
Jurusan Kebidanan pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar**

Oleh: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Arifa Usman
70400007004

**PRODI KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2010

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Ruang Lingkup permasalahan
- C. Tujuan penulisan
 - 1. Tujuan umum
 - 2. Tujuan khusus
- D. Manfaat penulisan
- E. Metode penulisan
- F. Sistematika penulisan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Kehamilan
 - 1. Pengertian Kehamilan
 - 2. Perubahan yang terjadi pada kehamilan
 - a. Perubahan anatomi dan fisiologik
 - b. Perubahan Psikologi
- B. Tinjauan tentang Anemia
 - 1. Pengertian anemia
 - 2. Macam-macam Anemia
 - 3. Klasifikasi anemia
 - 4. Patofisiologi terjadinya anemia
 - 5. Gejala dan tanda
 - 6. Pengaruh Anemia terhadap kehamilan
 - a. Pengaruh Anemia terhadap ibu
 - b. Pengaruh Anemia terhadap janin
 - 7. Diagnosa Anemia
 - 8. Pencegahan dan pengobatan anemia
- C. Tinjauan tentang antenatal

1. Pengertian antenatal
2. Tujuan pengawasan antenatal
3. Kebijakan program antenatal
4. Jadwal kunjungan antenatal

D. Proses manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Manajemen asuhan kebidanan
2. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan
3. Pendokumentasian Manajemen Asuhan Kebidanan

BAB III. STUDI KASUS

Langkah 1 : Pengkajian Data Dan Analisa Data

Langkah 2 : Merumuskan Diagnosa Masalah Aktual

Langkah 3 : Merumuskan Diagnosa Masalah Potensial

Langkah 4 : Tindakan Segera dan Kolaborasi Asuhan Kebidanan

Langkah 5 : Merencanakan tindakan Asuhan Kebidanan

Langkah 6 : Melaksanakan tindakan Asuhan Kebidanan

Langkah 7 : Evaluasi Tindakan Asuhan Kebidanan

Pendokumentasian Asuhan Kebidanan

BAB IV. PEMBAHASAN KASUS

Pada Bab ini dibahas tentang kesenjangan antara teori dan fakta Adapun langkah-langkah yaitu sesuai dengan proses manajemen asuhan Kebidanan langkah 1 sampai dengan langkah 7.

BAB V.PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anemia adalah suatu konsentrasi apabila hemoglobin < 150 g/L atau penurunan kapasitas darah dalam membawa oksigen, hal tersebut terjadi akibat penurunan produksi sel darah merah atau penurunan hemoglobin (Hb) dalam darah. (<http://www.ajcn.org>, Renee. *et al.* 2005. *relationship between intensity of soil transmitted helminth infections and anemia during pregnancy*).

Anemia adalah berkurangnya atau turunnya kadar sel darah merah atau hemoglobin dalam darah, anemia terjadi maka seluruh tubuh akan kekurangan oksigen dan fungsi. Hemoglobin adalah menyalurkan oksigen keseluruh tubuh, anemia banyak ditemukan pada ibu hamil dan anemia disebabkan oleh berbagai keadaan diantaranya kekurangan zat besi, pendarahan, hemolitik (sel darah merah pecah) dan gangguan pembentukan sel darah merah. Anemia dalam kehamilan membawa pengaruh buruk baik pada ibu maupun pada janinnya.

Menurut WHO (World Health Organization) pada tahun 2009 tercatat 40 % kematian ibu di Negara berkembang termasuk Indonesia berkaitan dengan anemia dalam kehamilan. Kebanyakan anemia dalam kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi dan pendarahan akut bahkan tidak jarang keduanya saling bereaksi (Sarwono, 2006. Hal 89).

Tahun 2009 di Indonesia angka kejadian anemia relative tinggi yaitu 63,5 % sekitar 10-15 % tergolong anemia berat dalam kehamilan yang sudah tentu akan mempengaruhi tumbuh kembang janin dalam rahim. (<http://www.google.co.id>. Diakses tanggal 28 Pebruari 2010).

Seorang,baik pria maupun wanita, dinyatakan menderita anemia apabila kadar hemoglobin dalam darahnya kurang dari 12 g/100 ml. Anemia lebih sering di jumpai dalam kehamilan. Hal ini disebabkan karena dalam kehamilan keperluan akan zat-zat makanan bertambah dan terjadi pula perubahan-perubahan dalam darah dan sum-sum tulang. (Wikenjosastro, 2005, 448).

Seorang wanita hamil yang memiliki Hb kurang dari 10g/100ml barulah disebut menderita anemia dalam kehamilan. Karena itu, para wanita hamil dengan Hb antara 10-12 g/100ml tidak dianggap menderita anemia patologik, akan tetapi anemia fisiologik.

Di seluruh dunia frekuensi anemia dalam kehamilan cukup tinggi, berkisar antara 10% dan 20%. Karena defisiensi makanan memegang peranan yang sangat penting dalam timbulnya anemia maka dapat difahami bahwa frekuensi itu lebih tinggi lagi di negeri-negeri yang sedang berkembang, di bandingkan dengan negeri-negeri yang sudah maju. Menurut penyelidikan Hoo Swie Tjiong frekuensi anemia dalam kehamilan setinggi 18,8%, pseudoanemia 57,9%, dan wanita hamil dengan Hb 12g/100ml atau lebih sebanyak 23,6%; Hb rata-rata 12,3 g/ml dalam trimester I, 11,3g/100ml dalam trimester II, dan 10,8 g/100ml dalam trimester III. Hal itu disebabkan

karena pengenceran darah menjadi makin nyata dengan lanjutan umur kehamilan sehingga frekuensi anemia dalam kehamilan meningkat pula (Wiknjosastro, 2005, 450).

Anemia sangat berbahaya bagi ibu yang sedang hamil. Penyakit anemia anemia sering menyerang pada masa kehamilan sebab pada saat hamil, Kebutuhan ibu pada unsur-unsur makanan semakin banyak seperti zat besi, folic acid dan protein.

Anemia yang paling lazim dialami oleh ibu adalah anemia kekurangan zat besi. Ini tidak mengherankan sebab kekurangan protein menyebabkan berkurangnya pembentukan hemoglobin dan pembentukan sel darah merah. Sementara berkurangnya hemoglobin dalam darah menyebabkan hilang atau berkurangnya unsur zat besi dalam darah (Atihif Lamadhah, 2006, 75-76).

Kesehatan ibu dan anak amat menentukan untuk tercapainya kualitas hidup yang baik pada keluarga dan masyarakat. Survei Demokrasi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 1994 dan tahun 1997 menunjukkan bahwa terdapat penurunan angka kematian ibu (AKI) dari 390 menjadi 334 per 100.000 kelahiran hidup. Sebab utama kematian ibu tidak langsung antara lain gangguan pada kehamilan, seperti anemia, kurang energi protein (KEP), dan kurang energi kronis (KEK). Prevalensi anemia pada ibu hamil 51%.

Anemia dalam kehamilan memberi pengaruh kurang baik bagi kehamilan, persalinan maupun nifas karna dapat menyebabkan keguguran, partus prematurus, partus lama, perdarahan post partum, syok, infeksi intra partum dan dalam nifas, dan dalam anemia yang sangat berat Hb <4 gr% dapat

menyebabkan payah jantung sedangkan yang terjadi pada janin ialah kematian mudigah, kematian janin dalam kandungan, cacat bawaan, prematuritas, cadangan zat besi kurang pada tubuh janin yang lahir (Salmah H, 2006, 1).

Menyikapi angka kematian ibu maka selaku bidan harus melakukan pengawasan secara intensif penyuluhan tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan , pemberian obat yang sangat diperlukan dalam kehamilan, seperti vitamin dan obat – obat pendukung lainnya .

Berdasarkan data di atas maka, penulis merasa tertarik untuk membuat Karya tulis ilmiah dengan judul “ Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal care pada Ny ‘J’ Gestasi 32 Minggu 4 hari dengan Anemia Berat di Rumah Sakit Ibu dan Anak ST Fatimah Makassar tanggal 24 juni dan 30 juni 2010.

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan karya tulis ini adalah “Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal care pada Ny ‘J’ Gestasi 32 Minggu 4 hari dengan Anemia Berat di Rumah Sakit Ibu dan Anak ST Fatimah Makassar tanggal 24 juni dan 30 juni 2010.

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Mampu melaksanakan manajemen asuhan kebidanan Antenatal care pada Ny ‘J’ Gestasi 32 Minggu 4 hari dengan Anemia Berat di Rumah Sakit Ibu dan Anak ST Fatimah Makassar tanggal 24 juni dan 30 juni 2010 dengan menggunakan pendekatan manajemen sesuai dengan kewenangan bidan

2. Tujuan Khusus

- a. Dapat melaksanakan pengkajian data pada Ny 'J' Gestasi 32 Minggu 4 hari dengan Anemia Berat pada tanggal 24 juni dan 30 juni 2010.
- b. Dapat menetapkan diagnosa serta masalah aktual yang terjadi pada Ny 'J' Gestasi 32 Minggu 4 hari dengan Anemia Berat pada tanggal 24 juni dan 30 juni 2010.
- c. Dapat merumuskan diagnosa serta masalah potensial yang terjadi pada Ny 'J' Gestasi 32 Minggu 4 hari dengan Anemia Berat pada tanggal 24 juni dan 30 juni 2010.
- d. Dapat menyusun perencanaan , tujuan , tindakan rasional pada Ny 'J' Gestasi 32 Minggu 4 hari dengan Anemia Berat pada tanggal 24 juni dan 30 juni 2010.
- e. Dapat melaksanakan tindakan yang telah direncanakan pada Ny 'J' Gestasi 32 Minggu 4 hari dengan Anemia Berat pada tanggal 24 juni dan 30 juni 2010.
- f. Dapat mengevaluasi tindakan yang telah dilaksanakan pada Ny 'J' Gestasi 32 Minggu 4 hari dengan Anemia Berat pada tanggal 24 Juni dan 30 Juni 2010.
- g. Dapat mendokumentasikan proses Manajemen asuhan Kebidanan pada Ny 'J' Gestasi 32 Minggu 4 hari dengan Anemia Berat pada tanggal 24 Juni dan 30 Juni 2010.

D. Manfaat Penulisan

1. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan ahli madya kebidanan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Sebagai bahan masukan bagi petugas kesehatan utamanya di Rumah sakit Ibu dan Anak ST Fatimah Makassar.
3. Sebagai bahan masukan bagi Institusi tentang penerapan manajemen kebidanan dengan Anemia berat
4. Bagi penulis ini merupakan pengalaman yang dapat menambah pengetahuan dalam penerapan manajemen asuhan kebidanan dengan kasus anemia berat dan mempraktekkan teori-teori yang dapat dipelajari

E. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Mempelajari buku-buku literature dan buku-buku yang berhubungan dengan anemia pada ibu hamil, mengakses data melalui internet dan mempelajari karya tulis yang ada.

2. Studi Kasus

Dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan yang meliputi pengumpulan data, merumuskan diagnosa / masalah aktual, merumuskan diagnosa masalah potensial, tindakan segera dan

kolaborasi asuhan kebidanan, menyusun rencana asuhan kebidanan, implementasi asuhan kebidanan dan evaluasi asuhan kebidanan .

Untuk memperoleh data dalam pengkajian menggunakan tehnik:

1. Anamnesa

Mengadakan tanya jawab langsung dengan ibu, suami, dan keluarga yang terlibat guna mendapatkan data yang di perlukan untuk memberikan asuhan kebidanan pada klien tersebut.

2. Pemeriksaan fisik

Melakukan pemeriksaan fisik secara sistematis pada klien mulai dari kepala sampai kaki dengan memulai pemeriksaan inspeksi, palpasi auskultasi, perkusi dan pemeriksaan laboratorium untuk memperoleh data objektif.

3. Studi dokumentasi

Membaca dan mempelajari status klien yang berhubungan dengan keadaan klien berdasarkan catatan medic yang terkait dengan kasus klien.

4. Diskusi

Mengadakan konsultasi dengan bidan, dokter yang menangani klien serta pembimbing yang menangani penulisan karya tulis ilmiah ini mengenai masalah yang dialami klien yaitu anemia berat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami karya tulis penulis menyusun dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kehamilan

1. Pengertian Kehamilan

Kehamilan adalah dimulai dari ovulasi sampai partus, lamanya adalah kira-kira 280 hari (40 minggu), dan tidak lebih dari 300 hari (43 minggu). Kehamilan 40 minggu ini disebut kehamilan matur (cukup bulan). (Wiknjosastro H, 2005. Hal 125).

Masa kehamilan adalah dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin, lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. (Prawirohardjo S, 2006. Hal 89)

Sebagaimana dalam Q.S. Al-Mukminun:12-16 tentang perkembangan kejadian manusia yakni:

ثُمَّ عَلَّمْنَاهُ فِقْرًا ثُمَّ نَزَلْنَاهُ مِزْجًا رَافِقًا فَجَعَلْنَاهُ نَفْسًا فَخَلَقْنَا ظُفُرًا فَجَعَلْنَاهُ نَاقَةً فَجَعَلْنَاهُ إِنْسًا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (13)
مُضْغَةً فَخَلَقْنَا مِنْهَا صُلْبًا لَازِبًا وَجَعَلْنَاهُ نُطْقًا مَا يُؤْتِيهِمْ إِلَّا نُطْقًا مِنْ أَفْوَاهٍ وَإِن يَسْأَلُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَنْ أَصْحَابِ النَّارِ فَلْيَقُولُوا هُمْ عَذَابٌ مُّسْتَعْتَبٌ (14)
ثُمَّ نَزَلْنَاهُ نَفْسًا فَخَلَقْنَا مِنْهَا صُلْبًا لَازِبًا وَجَعَلْنَاهُ نُطْقًا مَا يُؤْتِيهِمْ إِلَّا نُطْقًا مِنْ أَفْوَاهٍ وَإِن يَسْأَلُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَنْ أَصْحَابِ النَّارِ فَلْيَقُولُوا هُمْ عَذَابٌ مُّسْتَعْتَبٌ (15)
إِن يَسْأَلُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَنْ أَصْحَابِ النَّارِ فَلْيَقُولُوا هُمْ عَذَابٌ مُّسْتَعْتَبٌ (16)

Terjemahan:

Dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim), kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat.

Ungkapan ilmiah dari ayat tersebut 15 abad silam telah menjadi bahan penelitian bagi para ahli biologi untuk memperdalam ilmu tentang organ-organ jasad manusia. Dimana al-Qur'an mengungkapkan bahwa manusia pada awalnya berasal dari saripati yang berasal dari tanah sebagai substansi dasar kehidupan manusia, seperti protein, sari-sari makanan yang kita makan yang semua berasal dan hidup dari tanah. Kemudian melalui proses metabolisme yang ada di dalam tubuh diantaranya menghasilkan hormon (sperma), kemudian hasil dari pernikahan (hubungan seksual), maka terjadilah pembauran antara sperma (lelaki) dan ovum (sel telur wanita) di dalam rahim. Kemudian berproses selanjutnya dari segumpal darah yang menempel di dinding rahim, kemudian menjadi membesar sedikit demi sedikit hingga mewujudkan bentuk manusia yang sempurna. (Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, 2005, Juz. IX, h.165-167.)

Sedangkan dalam ilmu kesehatan proses kejadian manusia yaitu mulai dari ovulasi sampai dengan partus. Hal ini membuktikan bahwa ada keterkaitan antara proses kejadian manusia menurut agama dan menurut ilmu kesehatan.

Ditinjau dari tuanya kehamilan, kehamilan dibagi dalam 3 bagian; masing- 1 triwulan kedua (antara 12 sampai 28 minggu); dan 3) kehamilan triwulan terakhir (antara 28 sampai 40 minggu). (Wiknjosastro H, 2005. Hal 125).

Hal itu sejalan dengan apa yang diungkapkan dalam al-Qur'an QS: al-Zumar/39 :6

يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا لَّيْسَ لَكُمْ فِيهِ ظُلُمَاتٌ ثَلَاثَ

Terjemahannya:

“Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan”.

Ayat di atas menjadi bukti yang konkrit bahwa ada tiga kegelapan yang terjadi pada saat kehamilan yaitu kegelapan di dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutup/membungkus anak dalam rahim). Sehingga dalam penelitian ilmu genetika (janin) bahwa selama embriyo berada di dalam kandungan ada tiga selubung yang menutupinya yaitu dinding abdomen (perut) ibu, dinding uterus (rahim), dan lapisan tipis amichirionic.

2. Perubahan-perubahan Yang terjadi Pada Kehamilan

a. Perubahan anatomi Dan fisiologi

Pada kehamilan terdapat perubahan pada seluruh tubuh wanita, khususnya pada alat gebetalia eksterna dan interna. Adapun perubahan yang terdapat pada wanita hamil ialah sebagai berikut :

1) Perubahan sistem reproduksi

a) Uterus

Uterus akan membesar pada bulan-bulan pertama dibawah pengaruh estrogen dan progesterone yang kadarnya meningkat. Pembesaran ini pada dasarnya disebabkan oleh hipertropi otot polos uterus; disamping itu, serabut-serabut kolagen yang adapun menjadi higroskopik akibat meningkatnya kadar estrogen sehingga uterus dapat mengikuti pertumbuhan janin. Berat uterus normal lebih kurang 30 gram, pada akhir kehamilan 40 minggu berat uterus ini menjadi 1000 gram, dengan panjang lebih kurrang 20 cm dan dinding lebih kurang 2,5 cm.

pada bulan-bulan pertama kehamilan bentuk uterus seperti buah alvokad agak gepeng. Pada kehamilan 4 bulan uterus berbentuk bulat selanjutnya pada akhir kehamilan kembali seperti bentuk semula lonjong seperti telur dan ismos lebih nyata dan berkembang (wiknjosastro H,2005.Hal 89).

b) Serviks

Serviks uteri pada kehamilan juga mengalami perubahan karena hormon estrogen . Korpus uteri mengandung lebih banyak jaringan otot , sedangkan serviks lebih banyak mengandung jaringan ikat , hanya 10 % jaringan otot . Jaringan ikat serviks banyak mengandung kolagen .Akibat kadar estrogen meningkat , dan dengan adanya hipervaskularisasi maka konsistensi serviks menjadi lunak. (Wiknjosastro H , 2005. Hal 94)

c) Vagina dan Vulva

Vagina dan vulva mengalami perubahan pula akibat hormone estrogen. Adanya hipervaskularisasi mengakibatkan vagina dan vulva tampak lebih merah dan kebiru-biruan .tanda ini disebut tanda Chadwick. (Wiknjosastro H,2005.Hal 95).

d) Ovarium

Pada permulaan kehamilan masih terdapat korpus luteum graviditatis sampai terbentuknya plasenta kira – kira kehamilan 16 minggu kemudian ia mengecil setelah plasenta terbentuk dimana korpus

luteum mengeluarkan hormone estrogen dan progesterone.
(Wiknjosastro H,2005.Hal 95)

e) Payudara

Payudara akan membesar dan tegang akibat hormon somatomammotropin, estrogen dan progesterone, akan tetapi belum mengeluarkan air susu. Estrogen menimbulkan hipertrofi sistem saluran, sedangkan progesteron menambah sel – sel asinus pada payudara. Somatomammotropin mempengaruhi pertumbuhan asinus pula dan menimbulkan perubahan dalam sel – sel , sehingga terjadi pembuatan kasein , laktalbumin dan laktoglobulin . Dengan demikian, mamma dipersiapkan untuk laktasi . Pada kehamilan 12 minggu ke atas dari puting susu dapat keluar cairan berwarna putih agak jernih yang disebut kolostrum. (Wiknjosastro H,2005.Hal 95)

f) Sistem Sirkulasi Darah

Sirkulasi darah ibu dalam kehamilan dipengaruhi oleh adanya sirkulasi ke plasenta,uterus yang membesar dengan pembuluh-pembuluh darah yang membesar pula,mamma dan alat-alat lainnyayang memang berfungsi dalam kehamilanya

Volume darah akan bertambah banyak,kira-kira 25%,dengan puncak kehamilan 32 minggu,diikuti dengan *cardiac output* yang meninggi sebanyak 30%.Akibat hemodilusi tersebut ,yang mulai jelas timbul pada kehamilan 16 minggu,ibu yang mempunyai penyakit

jantung dapat jatuh dalam keadaan dekompensasi kardis.

(Wiknjosastro H,2005.Hal 96)

2) Perubahan Sistem Respirasi

Sistem respirasi mengalami perubahan untuk memenuhi oksigen yang meningkat kira-kira 20%,sehingga wanita hamilselalu bernapas lebih dalam.Hal ini ditemukan pada kehamilan 32 minggu keatas. (Wiknjosastro H,2005.Hal 96)

3) Perubahan Pada Traktus Uranus

Pada bulan-bulan pertama kehamilan kandung kencing tertekan oleh uterusyang mulai membesar,sehingga tnbul sering kencing.keadaan ini hilang dengan makin tuanya umur kehamilan dan akan timbul lagi keluhan sering kencing,bila kepala janin mulai turun kebawahpintu atas panggul.

4) Perubahan Pada Traktus Digestivus

Pada bulan-bulan pertama kehamilan terdapat perasaan enek (nausea).Ini akibat kadar hormon estrogen yang meningkat.Tonus otot-otot pada traktus digestivus menurun,sehingga motilitas seluruh traktus digestivus juga berkurang.Makanan lebih lama berada didalam lambungdan apa yang telah dicernakan lebih lama berda di dalam usus.Tidak jarang dijumpai pada bulan-bulan pertama kehamilan gejala muntah (emesis). (Wiknjosastro H,2005.Hal 97)

g) Kulit

Pada kulit terjadi deposit pigmen dan hiperpigmentasi yang disebabkan oleh pengaruh melanophore stimulating hormone (MSH) yang meningkat. Kadang-kadang terdapat deposit pigmen pada dahi, pipi dan hidung yang dikenal dengan kloasma gravidarum.

5) Metabolisme Dalam Kehamilan

Dengan terjadinya kehamilan, metabolisme basal meningkat hingga 15-20% yang umumnya ditemukan pada triwulan terakhir. Kebutuhan nutrisi semakin tinggi untuk pertumbuhan janin dan persiapan laktasi. Kebutuhan nutrisi selama hamil yaitu kalori, protein, zat besi, asam folat, vitamin c dan mineral lainnya.

Tambahan kalori untuk ibu hamil selama kehamilan adalah 10 mg/hari. Kebutuhan zat besi selama kehamilan bertambah 800 mg dengan 30-50mg/hari dan asam folat meningkat 200 menjadi 400 mg atau 0,4-0,8 mg/hari .

b. Perubahan Psikologis (Salma H , 2006)

Kondisi hamil mengganggu citra tubuh dan juga perlu mengkaji kembali perubahan peran dan hubungan sosialnya . Stress ibu hamil dipengaruhi oleh emosinya , lingkungan sosial , latar belakang budaya , dan penerimaan atau penolakan terhadap kehamilan . Respon emosi dan Psikologis ibu hamil selama hamil termasuk menolak menerima , introspeksi perubahan perasaan dan perubahan citra tubuh

1) Trimester I

Trimester pertama merupakan periode penyesuaian diri terhadap kenyataan bahwa dia hamil dan menyatakan ide tentang anak di dalam tubuhnya dan gambaran dirinya . Tingkat penerimaan ini digambarkan dengan kesiapan wanita tersebut untuk hamil dan respon emosionalnya

Pada Trimester I seorang ibu akan selalu mencari tanda-tanda untuk lebih meyakinkan bahwa dirinya hamil . Setiap perubahan yang terjadi pada tubuhnya akan selalu diperhatikan . Dengan adanya gangguan umum seperti mual , muntah , dan sebagainya membuat ibu tidak sehat , seringkali membenci kehamilannya dan sedih .

2) Trimester II

Pada Trimester kedua adalah relative tenang yang dialami , yaitu morning sickness sudah lewat dan ancaman abortus spontan juga sudah lewat. Ia akan mulai menghadapi kenyataan kehamilannya seperti

- a) Menerima tumbuhnya fetus yang merupakan makhluk yang berbeda dengan dirinya, yaitu dengan adanya gerakan fetus pada minggu ke 20 yang diraskan sebagai persepsi dan perubahan yang dramatis bahwa ia akan mempunyai bayi.
- b) Mengembangkan kedekatan hubungan dengan kehamilannya dan merasa senang.

- c) Mendengar denyut jantung janin , merasakan gerakan , menempatkan perempuan tersebut pada kondisi ingin menyendiri, dan berfantasi tentang anaknya , ia akan senang dengan anak kecil.

3) Trimester III

Pada trimester ketiga sering disebut sebagai periode menunggu , terdapat kombinasi antara perasaan bangga dan cemas tentang apa yang akan terjadi pada saat melahirkan . Pada saat ini ibu akan mengalami :

- a) Merasa diri diistimewakan di lingkungan (ia bisa senang atau menolak).
- b) Proses kedekatan dengan janinnya berlanjut .
- c) Persiapan menjadi orang tua atau ibu .
- d) Spekulasi mengenai jenis kelamin anak dan nama anak .
- e) Keluarga berinteraksi dengan menempelkan telinga di perut ibu , berbicara dengan janin .

3. **Diagnosis Kehamilan**

Diagnosis kehamilan didasarkan atas gejala dan tanda-tanda tertentu yang diperoleh melalui anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Gejala dan tanda-tanda kehamilan adalah sebagai berikut:

- a. Amenorea (tidak dapat haid)

Untuk menentukan usia kehamilan dan perkiraan persalinan yang akan terjadi.

- b. Nausea (enek) dan emesis (muntah)

Bisa terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan, disertai kadang-kadang oleh emesis.

c. Mengidam (ingin makanan khusus)

Mengidam sering terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan akan tetapi menghilang dengan makin tuanya kehamilan.

d. Pingsan

e. Anoreksia (tidak ada nafsu makan)

f. Payudara membesar, tegang dan sedikit terasa nyeri disebabkan pengaruh hormone estrogen dan progesterone yang merangsang duktuli dan alveoli

g. Sering kencing

Terjadi karena kandung kencing pada bulan-bulan pertama kehamilan tertekan oleh uterus yang mulai membesar, dan akan hilang pada kehamilan triwulan kedua karena uterus yang membesar keluar dari rongga panggul. Pada akhir kehamilan gejala ini akan kembali karena kandung kemih tertekan oleh kepala janin.

h. Obstipasi

Terjadi karena tonus otot menurun yang disebabkan oleh pengaruh hormon steroid, pengaruh hormon ini dapat menghambat peristaltik usus mengakibatkan usus kesulitan untuk buang air besar.

i. Pigmentasi kulit

Terjadi pada kehamilan 12 minggu ke atas. Pada pipi, hidung dan dahi kadang-kadang tampak deposit pigmen yang berlebihan, dikenal sebagai kloasma gravidarum. Areola mammae juga menjadi lebih hitam karena didapatkan deposit pigmen yang berlebihan. Daerah leher menjadi lebih

hitam. Demikian pula linea alba di garis tengah abdomen menjadi lebih hitam. Pigmentasi ini terjadi karena pengaruh dari hormon kortiko-steroid plasenta yang merangsang melanofor dan kulit.

j. Epulis

Adalah suatu hipertrofi papilla gingivae, sering terjadi pada triwulan pertama

k. Varises

Sering dijumpai pada triwulan terakhir, didapat pada daerah genitalia eksterna, fossa poplitea, kaki dan betis.

Pada kehamilan muda sering pula ditemukan:

1) Tanda hegar

2) Tanda Chadwick

Adanya hipervaskularisasi mengakibatkan vagina dan vulva tampak lebih merah kebiru-biruan.

3) Tanda Piskasek

Uterus membesar ke salah satu jurusan hingga menonjol jelas ke jurusan pembesaran tersebut.

4) Tanda Braxton-Hicks

Bila uterus dirangsang mudah berkontraksi.

5) Suhu basal

Adalah salah satu tanda akan adanya kehamilan.

6) Cara khas yang dipakai untuk menentukan adanya human chorionic gonadotropin pada kehamilan muda adalah air kencing pertama pada pagi

hari. Dengan tes kehamilan tertentu air kencing pada pagi hari dapat membantu diagnosis kehamilan sedini-dininya.

Adapun diagnosis pasti kehamilan adalah:

- 1) Dapat diraba kemudian dikenal bagian-bagian janin
- 2) Dapat dicatat dan didengar bunyi jantung janin dengan beberapa cara
- 3) Dapat dirasakan gerakan janin dan balotemen
- 4) Pada pemeriksaan dengan sinar rontgen tampak kerangka janin
- 5) Dengan ultrasonografi (scanning) dapat diketahui ukuran kantong janin janin, panjangnya janin, dan diameter biparietal hingga dapat diperkirakan tuanya kehamilan, dan selanjutnya dapat dipakai untuk menilai pertumbuhan janin.

B. Tinjauan Tentang Anemia

1. Pengertian Anemia

- a. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar Hemoglobin dibawah 11g% pada trimester I dan III atau kadar <10,5g% pada trimester II. (Sarwono, 2006. Hal 281)
- b. Anemia adalah penurunan jumlah sel darah merah atau penurunan konsentrasi hemoglobin didalam sirkulasi darah. Defenisi anemia yang diterima secara umum adalah kadar Hb kurang dari 12,0 gram per 100 milliliter (12 gram/desiliter) untuk wanita tidak hamildan kurang dari 10,0 gram per 100 milliliter (10 gram/desiliter) untuk wanita hamil. Anemia pada kehamilan yang disebabkan kekurangan zat besi mencapai kurang lebih 95%.

2. Macam-macam Anemia

Macam-macam Anemia dalam kehamilan diklasifikasikan kedalam:

a. Anemia Difisiensi besi (kekurangan zat besi)

Anemia difisiensi besi disebabkan karena kurang masuknya unsur besi dalam Makanan.

b. Anemia Megaloblatik

Anemia megaloblatik disebabkan karena asam folik, jarang sekali karena kekurangan vitamin B 12, biasanya malnutrisi.

c. Anemia Hipoplastik

Anemia hipoplastik disebabkan karena sum-sum tulang kurang mampu membuat sel-sel darah merah baru, penyebab belum diketahui pasti kecuali yang disebabkan infeksi berat.

d. Anemia Hemolitik

Anemia hemolitik disebabkan karena penghancuran sel darah merah berlangsung lebih cepat dari pembuatannya. Wanita dengan anemia hemolitik sukar menjadi hamil, apabila ia hamil, maka anemianya biasa menjadi lebih berat. (Wiknjosastro H, 2005. Hal 452-457)

3. Klasifikasi Anemia (<http://www.com.2009.sebab-sebab> dan morfologi Anemia. Diakses tanggal 25 mei 2010).

Anemia berdasarkan tingkatannya dibagi atas:

a. Anemia ringan dengan Hb 8-10 g/dl

b. Anemia sedang dengan Hb 7-8 g/dengan

- c. Anemia berat dengan Hb < 7 g/dl

4. Patofisiologi Terjadinya Anemia

Perubahan hematologi sehubungan dengan kehamilan adalah oleh karena perubahan sirkulasi yang meningkat dari plasenta dari penambahan payudara, volume plasma meningkat 45%-65% ml pada trimester ke dua kehamilan dan maksimum terjadi pada bulan ke 9 dan meningkatnya sekitar 1000 ml, menurun sedikit menjelang aterm dan kembali normal tiga bulan setelah partus. (<http://www.com.2009>. Sebab-sebab dan morfologi anemia. Diakses tanggal 25 Mei 2010).

Perubahan fisiologis alami yang terjadi selama kehamilan akan mempengaruhi jumlah sel darah normal pada kehamilan. Peningkatan volume darah ibu terutama terjadi akibat peningkatan plasma, bukan akibat peningkatan jumlah sel darah merah. Walaupun pada peningkatan jumlah sel darah merah di dalam sirkulasi, tetapi jumlah tidak seimbang dengan peningkatan volume plasma. Ketidakseimbangan ini akan terlihat dalam bentuk penurunan kadar Hb (hemoglobin). Peningkatan jumlah erosit ini juga merupakan salah satu faktor penyebab peningkatan kebutuhan akan zat besi selama kehamilan sekaligus untuk janin. Ketidakseimbangan jumlah eritrosit dan plasma mencapai puncaknya pada trimester kedua sebab peningkatan volume plasma terhenti menjelang akhir kehamilan, sementara produksi sel darah merah terus meningkat.

Anemia sebenarnya adalah tanda suatu penyakit, bukan penyakit itu sendiri. Dalam menentukan etiologi anemia, akan sangat membantu

jika kita mempertimbangkan berbagai tes laboratorium yang hasilnya dapat digunakan mengategorikan kemungkinan penyebab anemia, dilanjutkan dengan melakukan diagnosis banding, kemudian menegakkan diagnosis. Pemeriksaan laboratorium awal dilakukan untuk menentukan sel darah merah. Pemeriksaan laboratorium lanjutan yang perlu dilakukan adalah menentukan anemia tertentu dalam suatu kategori misalnya, kekurangan asam folat atau B12.

5. Gejala dan Tanda-tanda Anemia (Varney, 2009. Hal 127)

Tanda-tanda dan gejala anemia antara lain:

a. Tanda-tanda Anemia

- 1) pucat
- 2) ikterus
- 3) Hipotensi
- 4) Edema perifer
- 5) Membran dan mukosa dan bantalan kuku pucat
- 6) lidah halus (papil tak menonjol), lecet

b. Gejala Anemia

- 1) kelelahan atau mengantuk
- 2) kelemahan
- 3) pusing
- 4) sakit kepala
- 5) malaise
- 6) pica
- 7) nafsu makan kurang, perubahan dalam kesukaan makanan

- 8) perubahan mood
- 9) perubahan kebiasaan tidur.

6. Pengaruh Anemia Dalam Kehamilan.(Wikenjosastro H,2005.Hal 450)

Anemia dalam kehamilan memberi pengaruh kurang baik bagi ibu, baik dalam kehamilan ,persalinan maupun dalam masa nifas dan masa selanjutnya. Berbagai penyulit dapat timbul akibat anemia, seperti:

a. Pengaruh anemia terhadap ibu

- 1) Dapat terjadi abortus
- 2) partus prematurus
- 3) partus lama karena inersia uteri
- 4) pendarahan post partum karena atonia uteri
- 5) syok
- 6) infeksi, baik intrapartum maupun postpartum
- 7) Anemia yang sangat berat dengan Hb kurang dari 4g/100 ml dapat menyebabkan dekompensasi kordis, seperti dilaporkan oleh Lie-Injo Luang Eng dkk.

Hipoksia akibat anemia dapat menyebabkan syok dan kematian ibu pada persalinan sulit, walaupun tidak terjadi pendarahan

b. Pengaruh Anemia terhadap janin

- 1) Dapat menyebabkan kematian mudigah
- 2) Dapat menyebabkan kematian perinatal
- 3) Prematuritas
- 4) Dapat terjadi cacat bawaan

5) Cadangan besi kurang

jadi, anemia dalam kehamilan merupakan sebab potensial morbiditas serta mortalitas ibu dan anak.

7. Diagnosa Anemia (Manuaba I.B.G.2001, Hal 68-69)

Diagnosa anemia dalam kehamilan dilakukan dengan cara

a. Anamnesa

Pada anamnesa didapat keluhan cepat lelah, sering pusing dan mata berkunang-kunang dan keluhan mual muntah lebih hebat dari hamil muda.

b. Pemeriksaan Darah

Pemeriksaan kadar hemoglobin, pemeriksaan hendak dilakukan minimal dua kali selama kehamilan, yaitu pada trimester pertama dan ketiga.

8. Pencegahan Dan Pengobatan Anemia

a. Pencegahan

Dengan menghindarinya anemia sebaiknya ibu melakukan pemeriksaan sebelum hamil sehingga dapat diketahui data dasar kesehatan ibu tersebut, dalam pemeriksaan kesehatan disertai pemeriksaan laboratorium.

Jika terjadi anemia, tidak ada pilihan lain segera mengobatinya dengan cepat, utamanya demi menjaga kesehatan janin. Sebab jika anemia ini langsung parah (kadar hemoglobin kurang dari 50%), maka dimungkinkan akan terjadi keguguran, atau janin akan lahir premature

sebelum tumbuh sempurna, atau bahkan janin akan mati dalam rahim sebagai akibat kurangnya pasokan oksigen dalam darah. Atau, janin akan dalam keadaan cacat.

Sebab itulah, ibu yang hamil harus memeriksakan diri (dengan memeriksakan sampel darah), khususnya ketika pemeriksaan pertama kali. Kemudian pada minggu ke-30. Untuk menjaga agar tidak terjadi anemia juga harus memperhatikan makanan yang dikonsumsi, dengan mengupayakan bagaimana semua unsure yang diperlukan bisa terpenuhi.

Jika kondisi membutuhkan, zat besi ini bisa diberikan secara oral. Namun jika anemia baru diketahui menjelang melahirkan, maka bisa diberikan melalui suntikan atau dengan tetes, atau bahkan dengan transfusi darah. (Athif lamadhah, 2009. Hal 77-78)

Ketika seseorang terserang anemia, biasanya dia tidak menyantap cukup makanan yang mengandung zat besi. Zat besi membantu darah membawa oksigen dari udara yang kita hirup ke semua bagian tubuhnya. Beberapa jenis anemia disebabkan oleh penyakit, bukan karena kekurangan zat besi. Beberapa jenis anemia diturunkan (secara genetik). Yang ini tidak bisa disembuhkan dengan mengonsumsi makanan atau pil-pil yang mengandung zat besi.

Banyak wanita hamil menderita anemia, wanita dengan anemia lebih lemah ketika melahirkan dan lebih berpotensi mengalami pendarahan berat, menjadi sakit setelah persalinan, bahkan meninggal.

Sebagaimana dalam Q.S. Al-Luqman:14 tentang pesan Allah swt. agar anak bersyukur dan hormat terhadap ibu yang telah bersusah payah mengandungnya.

وَوَيْضًا الْبَائِسِدَّ بَوَالِدَيْهِمْ مَاتَتْهُمُ مَوَاهِنًا عَلَيَّ وَهَزَنُوا فَصَلَّاهُ فِي
 امْعِينَ كُرْأَن لِّي ثَوَّلُوا رَدِيكَ إِلَيَّ الْمَصْرِير

Terjemahannya:

“Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu”.

Secara umum, ayat diatas menjelaskan bahwa ibu yang sedang hamil akan mengalami fisik yang lemah bahkan kelemahan fisiknya semakin bertambah seiring bertambah besar dan beratnya kandungan. Dan juga kehamilan merupakan suatu resiko karena ada banyak komplikasi yang terjadi seperti anemia dalam kehamilan, yang sangat berbahaya baik pada ibu maupun pada janinnya.

Biasanya anemia bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besinya seperti buncis, daging, dan ubi rambat, kuning telur, ikan segar dan sayuran yang berwarna hijau dan makanan yang tinggi vitamin C-nya, seperti buah-buahan yang mengandung sitrus dan tomat-tomatan dan dengan mengkonsumsi suplemen mengandung zat besi. Setelah menggunakan metode-metode ini, ibu mestinya diperiksa lagi sekitar empat minggu. Jika dia tidak juga menjadi baik, mintalah rujukan medis. Mungkin dia terserang penyakit atau memerlukan suplemen yang lebih tinggi zat besinya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S.An-Nahl/16: 10-11 tentang pentingnya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَائِفًا لَكُمْ مِنْهُ نَهْدَرُ آبُوا مِنْهُ شَدَجْرًا فَيَخْتَضِئُونَ
 يَذُبُّونَ بِهِ الرِّيحَ الْعَارِضَاتِ وَالَّذِينَ يَدْرُونَ الْبَابِ الْأَعْدَابِ مِنَ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Terjemahnya:

“Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan”.

Ayat di atas menjelaskan betapa pentingnya tumbuh-tumbuhan dalam kehidupan manusia dengan berbagai jenis, warna, rasa dan bentuknya. Begitu juga buah-buahan karena dapat dijadikan sebagai penghasilan dan makanan yang bernutrisi demi kelanjutan kehidupan di dunia ini. Bahkan tumbuh-tumbuhan tersebut bisa menjadi penghasilan, makanan, lauk dan buah-buahan yang dikonsumsi setiap saat. (Wahbah al-Zuhaili, al-Tafsir al-Munir, 1418 H., Jilid XIV, h. 98)

Pada ayat yang lain, Allah swt. menjelaskan juga tentang pentingnya daging, daging yang masih segar seperti dalam QS: al-Nahl/16:

14:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ تَأْكُلُوا مِنْهُ حَمَاطًا رِيًّا تَنْسَخُوهَا مِنْهَا حُلِيًّا لِيَذُقُوا مِنْهُ لَذَّةَ بَحْرٍ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلُ وَتَرَى الْفُلَ لَكُمْ وَآخِرَ فَوَيْلًا تَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

Terjemahnya:

“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”.

Ayat ini menjelaskan bahwa memakan daging yang masih segar seperti ikan akan membantu pertumbuhan dan perkembangan badan seseorang. Hal ini

menjadi bukti bahwa daging yang segar merupakan salah satu unsur yang mengandung zat besi nonhem yang sangat dibutuhkan dalam perkembangan jasmani.

Untuk mengatasi anemia dengan suplemen, berikan 300 sampai 325 mg besi sulfat, diminum 2 kali sehari. Jika seorang wanita hamil mengalami serangan anemia sangat tinggi pada bulan ke-9 kehamilannya, dia mestinya merencanakan bayinya untuk lahir di instansi medis. (Palma, 2008. Hal 160-161).

b. Pengobatan

1) Pada anemia ringan

Pada kehamilan dengan kadar Hb 9 – 10,5 gr masih dianggap anemia sehingga hanya diperlukan diberikan kombinasi 60 ml gr zat besi dan 400 mg asam folat tiap hari.

2) Pada anemia sedang

Pengobatan dapat dimulai dengan preparat besi ferus 600 – 1000 ml gr per hari seperti sulfat ferrosus atau glukosa ferrosus.

3) Pada anemia berat

Pemberian preparat frenteral yaitu dengan ferus dextran sebanyak 1000 ml gr (20 ml) intravena atau 2 x 10 ml intramuskuler. Transfusi darah pada kehamilan lanjut diberikan walaupun sangat jarang mengingat resiko transfusi bagi ibu dan janin.

C. Tinjauan Tentang Antenatal

1. Pengertian

Antenatal adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan untuk memeriksa keadaan ibu dan janinnya secara berkala yang diikuti dengan antenatal. Pengawasan antenatal memberikan manfaat dengan ditemukannya berbagai kelainan dan dipersiapkan langkah-langkah dalam pertolongan persalinan. (Manuaba I.B.G.2001.Hal 129).

Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam standar pelayanan antenatal (SPK).

Pelayanan antenatal yang berkualitas adalah yang sesuai dengan standar pelayanan antenatal seperti yang ditetapkan dalam buku standar pelayanan kebidanan (SPK). Pelayanan antenatal sesuai standar meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus sesuai resiko yang ditemukan dalam pemeriksaan. (Retna Ambarwati E,2009.Hal 81-82).

2. Tujuan pemeriksaan dan pengawasan ibu hamil (Retna Ambarwati,E.2009.Hal 82)

a. Tujuan Umum

Salah satu tujuan utama dari pemeriksaan dan pengawasan ibu hamil adalah untuk mendiagnosis dan menghitung umur kehamilan ,juga harus mengkaji status kesehatan untuk mengetahui masalah medis,masalah

psikososial atau masalah potensial yang mungkin saja terjadi pada ibu hamil, sehingga bidan dapat berkolaborasi dengan ibu hamil untuk membuat rencana asuhan yang dapat memenuhi kebutuhan ibu, janinnya dan keluarganya.

b. Tujuan Khusus

- 1) Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi.
- 2) Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu dan bayi.
- 3) Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan dan pembedahan.
- 4) Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat, ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin.
- 5) Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian asi eksklusif.
- 6) Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal. (Sarwono, 2006. Hal 90)

3. **Kebijakan Program** (Sarwono, 2006. Hal 90)

a. Kebijakan Program

Kunjungan antenatal sebaiknya dilakukan paling sedikit 4 kali selama kehamilan.

- 1) Satu kali pada triwulan pertama
- 2).Satu kali pada triwulan kedua
- 3).Dua kali pada triwulan ketiga

Dengan mendapat pelayanan atau standar termasuk 7 T yaitu:

- 1.Timbang berat badan
- 2.Ukur tekanan darah
- 3.Ukur tinggi fundus uteri
- 4.Pemberian imunisasi (Tetanus Toksoid) TT lengkap
- 5.Pemberian Tablet zat besi,minimum 90 tablet selama kehamilan
- 6.Tes terhadap penyakit menular seksual (PMS)
- 7.Temu wicara dalam rangka persiapan rujukan

Pelayanan/asuhan antenatal ini hanya ini hanya dapat diberikan oleh tenaga kesehatan profesional dan tidak dapat diberikan oleh dukun bayi.

b. Kebijakan Teknis

Setiap kehamilan dapat berkembang menjadi masalah atau komplikasi setiap saat. Itu sebabnya mengapa ibu hamil memerlukan pemantauan selama kehamilannya.Penatalaksanaan ibu hamil secara keseluruhan meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan kehamilan yang sehat
- 2) Melakukan deteksi dini komplikasi,melakukan penatalaksanaan awal serta rujukan bila diperlukan
- 3) Persiapan persalinan yang bersih dan aman

- 4) Perencanaan antisipatif dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi komplikasi.

4. **Jadwal Kunjungan Antenatal** (Retna Ambarwati, E, 2009. Hal 82)

Dalam memberikan asuhan antenatal, bidan harus mampu memberikan pelayanan dan pemantauan antenatal yang terfokus dan berkualitas.

- a. Kunjungan I (kurang dari 16 minggu) dilakukan untuk:
 - 1) Penapisan dan pengobatan anemia
 - 2) perencanaan persalinan
 - 3) pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya
- b. Kunjungan II (24 – 28 minggu) dan kunjungan III (32 minggu) dilakukan untuk:
 - 1) Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatan
 - 2) Pre-eklamsia, gemelli, infeksi alat reproduksi dan saluran perkemihan
 - 3) Mengulang rencana persalinan
- c. Kunjungan IV (36 minggu) sampai akhir
 - 1) Sama dengan kegiatan kunjungan II dan III
 - 2) Mengenali adanya kelainan letak
 - 3) Memantapkan rencana persalinan
 - 4) Mengenali tanda-tanda persalinan

D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian manajemen asuhan kebidanan

Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari

pengkajian,analisi data,diagnosa kebidanan,perencanaan,pelaksanaan dan evaluasi.(Hidayat A,2009.Hal 74).

2. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

Adapun prinsip dari proses manajemen asuhan kebidanan adalah:

- a. Secara sistematis mengumpulkan dan memperbaharui data yang lengkap dan relevan dengan melakukan pengkajian yang komprehensif terhadap kesehatan setiap klien,termasuk mengumpulkan riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik.
- b. Mengidentifikasi masalah dan membuat diagnosa berdasarkan interpretasi data dasar.
- c. Mengidentifikasi kebutuhan terhadap asuhan kebidanan dalam menyelesaikan masalah dan merumuskan tujuan asuhan kebidanan bersama klien.
- d. Memberi informasi dan support sehingga klien dapat membuat keputusan dan bertanggung jawab terhadap kesehatannya.
- e. Membuat rencana asuhan yang komprehensif bersama klien.
- f. Secara pribadi bertanggung jawab terhadap implementasi rencana individu.
- g. Melakukan konsultasi,perencanaan dan melaksanakan manajemen dengan kolaborasi dan merujuk klien untuk mendapatkan asuhan selanjutnya.
- h. Merencanakan manajemen terhadap komplikasi tertentu,dalam situasi darurat dan bila ada penyimpangan dari keadaan normal.

- i. Melakukan evaluasi bersama klien terhadap pencapaian asuhan kesehatan dan merevisi rencana asuhan sesuai dengan kebutuhan.

Proses manajemen asuhan kebidanan adalah terdiri dari 7 langkah yaitu:

- a. Langkah I (pertama): Pengumpulan data dasar

Langkah pertama merupakan awal yang akan menentukan langkah berikutnya. Mengumpulkan data adalah menghimpun informasi tentang klien/orang yang meminta asuhan. Memilih informasi data yang tepat diperlukan analisa suatu situasi yang menyangkut manusia yang rumit karena sifat manusia yang kompleks. Data yang tepat adalah data yang relevan dengan situasi yang sedang ditinjau.

Kegiatan pengumpulan data dimulai saat klien masuk dan dilanjutkan secara terus menerus selama proses asuhan kebidanan berlangsung. Data dikumpulkan dari berbagai sumber. Sumber yang dapat memberikan informasi paling akurat yang dapat diperoleh secepat mungkin.

Teknik pengumpulan data ada tiga yaitu:

- 1) Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui indera penglihatan (perilaku, tanda fisik, kecacatan, ekspresi wajah,) pendengaran (bunyi batuk, bunyi nafas), penciuman (bau nafas, bau luka), perabaan (suhu badan, dan nadi).

2) Wawancara

Wawancara adalah pembicaraan terarah yang umumnya dilakukan pada pertemuan tatap muka. Dalam wawancara yang penting diperhatikan adalah data yang ditanyakan diarahkan ke data yang relevan.

3) Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan dengan memakai instrumen/alat pengukur. Tujuannya untuk memastikan batas dimensi angka irama, kuantitas, misalnya: tinggi badan dengan berat badan dengan timbangan, tekanan darah dengan tensimeter.

Data secara garis besar, diklasifikasikan menjadi data subjektif dan data objektif.

Pada waktu mengumpulkan data subjektif bidan harus mengembangkan hubungan antar personal yang efektif dengan pasien yang diwawancarai, lebih memperhatikan hal-hal yang menjadi keluhan utama pasien dan yang mencemaskan, berupa mendapatkan data / fakta yang sangat bermakna dalam kaitan dengan masalah pasien.

Pada waktu mengumpulkan data obyektif bidan harus mengamati ekspresi dan perilaku pasien, mengamati perubahan/kelainan fisik, memperhatikan aspek sosial budaya pasien, menggunakan tehnik pemeriksaan yang tepat dan

benar, melakukan pemeriksaan yang terarah dan berkaitan dengan keluhan pasien.

b. Langkah II (kedua): Interpretasi data dasar

Pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data-data yang dikumpulkan.

Langkah awal dari perumusan masalah atau diagnosa kebidanan adalah pengolahan atau analisa data yaitu menggabungkan dan menghubungkan data satu dengan lainnya sehingga tergambar fakta.

Masalah adalah kesenjangan yang diharapkan dengan fakta atau kenyataan. Analisa adalah proses pertimbangan tentang nilai sesuatu yang dibandingkan dengan standar. Standar adalah aturan yang telah diterima secara umum dan digunakan sebagai dasar perbandingan dalam kategori yang sama. Pengertian masalah /diagnosa adalah “suatu pernyataan dari masalah pasien/klien yang nyata atau potensial dan membutuhkan tindakan”. Dalam pengertian yang lain masalah/diagnosa adalah “pernyataan yang menggambarkan masalah spesifik yang berkaitan dengan keadaan kesehatan seseorang dan didasarkan pada penilaian asuhan kebidanan yang bercorak negatif.

Dalam asuhan kebidanan kata masalah dan diagnosa keduanya dipakai karena bebapa masalah tidak dapat didefinisikan sebagai diagnosa tetapi tetap perlu dipertimbangkan untuk membuat rencana

yang menyeluruh. Masalah sering berhubungan dengan bagaimana wanita itu mengalami kenyataan terhadap diagnosanya. Contoh: diagnosanya: ibu hamil trimester III, masalah yang berhubungan mungkin ibu ketakutan akan persalinannya nanti. Ketakutan tidak cocok untuk suatu kategori diagnosa standar tapi tetap merupakan masalah yang membutuhkan pengkajian lebih jauh dan perlu suatu perencanaan dalam mengatasinya.

- c. Langkah III (ketiga): Mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial

Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila memungkinkan dilakukan pencegahan, sambil mengamati klien bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa/masalah potensial ini benar-benar terjadi.

- d. Langkah IV (keempat) Mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera.

Beberapa data menunjukkan situasi emergensi dimana bidan perlu bertindak segera demi keselamatan ibu dan bayi, beberapa data menunjukkan situasi yang menunjukkan tindakan segera sementara menunggu instruksi dokter. Mungkin juga memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lain. Bidan mengevaluasi situasi setiap pasien untuk menentukan asuhan pasien yang paling tepat.

Langkah ini mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan.

- e. Langkah V (kelima): Merencanakan asuhan yang komprehensif/ menyeluruh

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atauantisipasi, pada langkah ini informasi/data dasar yang tidak lengkap dilengkapi. Oleh karena tugas dalam langkah ini termasuk membuat dan mendiskusikan rencana dengan wanita itu begitu juga termasuk penegakan akan persetujuannya.

Perencanaan supaya terarah, dibuat pola pikir dengan langkah sebagai berikut: tentukan tujuan tindakan yang akan dilakukan yang berisi tentang sasaran/target dan hasil yang akan dicapai, selanjutnya ditentukan rencana tindakan sesuai dengan masalah atau diagnosa dan tujuan yang akan dicapai.

- f. Langkah VI (keenam): Melaksanakan perencanaan

Pada langkah ini rencana asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah kelima dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan dan sebagian lagi dilakukan oleh klien, atau anggota tim kesehatan lainnya. Jika bidan tidak melakukannya sendiri, ia tetap memikul tanggung jawab untuk mengarahkan

pelaksanaannya (memastikan langkah tersebut benar-benar terlaksana).Dimana bidan berkolaborasi dengan dokter dan keterlibatannya dalam manajemen asuhan bagi pasien yang mengalami komplikasi,bidan juga bertanggung jawab terhdap terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tesebut.Manajemen yang efesien akan menyingkat waktu,biaya dan meningkatkan mutu asuhan.

g. Langkah VII (ketujuh): Evaluasi

Pada langkah ini dilkukan evaluasi keefektivan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana telah diidentifikasi didalam masalah dan diagnose.(Hidayat A,2009.Hal 75-79)

3. Pendokumentasian Manajemen Asuhan Kebidanan (SOAP)

Menurut Helen Varney,alur berpikir bidan saat menghadapi klien meliputi 7 langkah.Untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh seorang bidan melalui proses berpikir sistematis,didokumentasikan dalam bentuk SOAP,yaitu

a. Data Subjektif

Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesis sebagai langkai I Varney.

b. Data objektif

Menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium dan uji diagnostik lain yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung asuhan sebagai langkah I Varney.

c. Assesment

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan interpretasi data subjektif dan objektif dalam suatu indentifikasi:

- 1) Diagnosa/masalah
- 2) Antisipasi diagnosa/masalah potensial
- 3) Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter, konsultasi/kolaborasi atau rujukan sebagai langkah 2,3,dan 4 Varney.

d. Planning (perencanaan)

Menggambarkan pendokumentasian dan tindakan (I) dan evaluasi perencanaan (E) berdasarkan assesment sebagai langkah 5,6, dan 7 Varney.

Rencana kegiatan mencakup langkah-langkah yang dilakukan oleh bidan dalam melakukan intervensi untuk memecahkan masalah pasien atau klien. (Salmah,2009. Hal 172)

BAB III
STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE PADA NY
‘J’ GESTASI 32 MINGGU EMPAT HARI DENGAN ANEMIA
BERAT DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SITI FATIMAH
MAKASSAR TANGGAL 24 DAN 30 JUNI 2010

No. Register : 048821
Tanggal Kunjungan : 24 Juni 2010 Jam 10.00 Wita
Tanggal Pengkajian : 24 Juni 2010 Jam 10.10 Wita

Langkah I. Identifikasi Data Dasar

A. Identitas Ibu/Suami

Nama : Ny.”J” / Tn.”M”
Umur : 40 Tahun / 34 Tahun
Nikah : 1 kali / + 10 Tahun
Suku : Bugis / Bugis
Agama : Protestan / Protestan
Pendidikan : SMP / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jl. Teuku Umar No. 1

B. Riwayat Kehamilan Sekarang

1. Ibu mengatakan ini kehamilan ketujuh dan tidak pernah keguguran.

2. HPHt tanggal 08 November 2009, TP tanggal 15 Agustus 2010.
3. Menurut ibu umur kehamilannya 8 bulan.
4. Ibu merasakan pergerakan janinnya bulan maret 2009.
5. Pergerakan janin dirasakan ibu terutama pada perut sebelah kanan.
6. Menurut ibu tidak ada nyeri perut selama hamil.
7. Ibu mengeluh pusing pada saat mau berdiri dan mudah lelah sesak Nafas setelah beraktifitas.
8. Ibu mengeluh badannya lemah.
9. Ibu sudah memeriksakan kehamilannya dan sudah mendapat suntikan TT lengkap.

C. Riwayat Kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu

No	Thn	Kehamilan		Persalinan			Bayi/Anak			Nifas	
		Umur (Bln)	Keadaan	Jenis	tempat	penolong	L/P	BBL/PBL (gr/cm)	Disusui		keadaan
1	1994	9	Aterm	Spontan PBK	RSIA Fatimah	Bidan	P	3000/50	Ya	Baik	Normal
2	1996	9	Aterm	Spontan PBK	RSIA Fatimah	Bidan	P	3000/49	Ya	Baik	Normal
3	1998	9	Aterm	Spontan PBK	RSIA Fatimah	Bidan	L	3100/50	Ya	Baik	Normal
4	2000	9	Aterm	PBK	RSIA Fatimah	Bidan	L	3000/50	Ya	Baik	Normal
5	2002	9	Aterm	Spontan PBK	RSIA Fatimah	Bidan	P	2800/48	Ya	Baik	Normal
6	2004	9	Aterm	Spontan PBK	RSIA Fatimah	Bidan	L	2900/48	Ya	Baik	Normal
7	Kehamilan sekarang 2010										

D. Riwayat Kesehatan /Penyakit yang lalu sekarang

1. Ibu tidak ada riwayat penyakit jantung, hipertensi, malaria, dan diabetes

2. Tidak pernah menderita penyakit kulit dan kelamin
3. Tidak pernah diopname
4. Tidak ada riwayat keturunan kembar
5. Tidak pernah merokok dan mengkonsumsi alkohol dan obat - obatan terlarang.

E. Riwayat Reproduksi

1. Menarche umur 13 tahun
2. Siklus haid 28-30 hari
3. Lamanya haid 4-7 hari
4. Tidak ada rasa nyeri waktu haid

F. Riwayat Psikososial, Ekonomi dan Spritual

1. Suami maupun keluarga merasa senang degan kehamilan ibu
2. Pengambil keputusan dalam keluarga adalah suami
3. Ibu mengerjakan urusan rumah tangga di bantu oleh anak
4. Ibu dan keluarga taat menjalankan ibadah.

G. Riwayat Keluarga Berencana

Ibu pernah menjadi akseptor KB jenis suntikan 3 bulan (depoprogestin) pada tahun 2006 -2008, selama 3 tahun kemudian berhenti karena ingin punya anak lagi.

H. Data Psikososial, Ekonomi dan Spritual

1. Ibu dan keluarga senang dengan kehamilannya

2. Hubungan keluarga dengan tetangga baik
3. Suami sebagai pencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya
4. Ibu menganggap bahwa kehamilannya merupakan anugerah Tuhan
5. Ibu melaksanakan sholat 5 waktu bersama keluarga
6. Ibu dan keluarga ingin persalinan ditolong oleh bidan dan berlangsung secara alamiah di Rumah sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar
7. Ibu makan 2 kali sehari dengan menu nasi, lauk pauk dan sayuran kadang-kadang
8. BAK 6 – 7 kali sehari. Warna kuning, bau amoniak
BAB 1 – 2 kali sehari, konsistensi lunak
9. Mandi 2 kali sehari, keramas 2 kali seminggu
10. Kebutuhan istirahat tidur siang tidak pernah
11. Kebutuhan istirahat tidur malam 5 – 6 jam

I. Pemeriksaan Fisik

1. Penampilan umum : Klien tampak lemah
2. Kesadaran : Composmentis
3. Tinggi badan : 160 cm
4. Berat badan sebelum hamil : 55 kg
5. Berat badan sekarang : 61 kg
6. Lila : 25 cm
7. Tanda – tanda vital
 - a. Tekanan darah : 90 / 60 mmHg
 - b. Nadi : 80x / menit

- c. Suhu badan : 36,7
 d. Pernapasan : 24x / menit

8. Pemeriksaan khusus

a. Kepala

Kulit dan rambut bersih, dan tidak mudah rontok

b. Wajah

Tampak pucat dan tidak ada oedema

c. Mata

Conjungtiva tampak pucat, sclera mata putih

d. Hidung

Simetris kiri dan kanan dan tidak ada pengeluaran secret

e. Mulut / gigi

Mulut tampak bersih, tidak ada karies, bibir tampak pucat

f. Leher

Tidak ada pembesaran kelenjar tyroid, limfe, vena jugularis tidak menonjol tidak teraba pembesaran kelenjar gondok

g. Payudara

Simetris kiri dan kanan, puting susu terbentuk dan menonjol, adanya hiperpigmentasi pada areola mammae, teraba hangat, tidak ada tumor dan keluar colostrums saat dipencet.

h. Abdomen

Tidak ada bekas operasi, tonus otot sudah kendur, tampak striae albicans.

Palpasi menurut Leopold

- 1) Leopold I : 3 jrbpx
 - 2) Leopold II : punggung kiri
 - 3) Leopold III : presentase kepala
 - 4) Leopold IV : Convergen
 - 5) Lingkar perut : 86 cm
 - 6) Lingkar perut : 84 cm
 - 7) Menurut Mc. Donald, TFU 30 cm
 - 8) TBJ : $30 \times 86 = 2.580$ gram
 - 9) Auskultasi DJJ 130x / menit, terdengar jelas disisi kiri bawah perut ibu.
- i. Ekstremitas bawah
- Simetris kiri dan kanan, tidak ada oedema pada pretibia dan varices.
Refleks patella positif kiri dan kanan
- j. Pemeriksaan laboratorium tanggal 24 juni 2010
- 1) Darah : Hb 6,8 gram %
 - 2) Urine : Albumin dan reduksi negative

Langkah II. Merumuskan Diagnosa / Masalah Aktual

GVII PVI A0, gestasi 32 minggu empat hari , punggung kiri, presentase kepala, convergen, intra uteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik, ibu dengan anemia berat.

1. GVII PVI A0

a. Data Subjektif

Ibu mengatakan hamil ketujuh dan tidak pernah keguguran

b. Data Objektif

- 1). Tampak stiae albicans
- 2). Tonus otot tampak kendor
- 3). Teraba bagian – bagian janin pada saat palpasi

c. Analisa dan Interpretasi Data

Ibu mengatakan hamil ketujuh, pada pemeriksaan fisik tonus otot perut tampak kendor akibat dari pecahnya pembuluh darah perifer pada kehamilan sebelumnya dimana perut eolah – olah retak dan warnahnya berubah agak hiperemik dan tampak pada seorang multigravida (Wikenjosastro H, 2005.97 – 98)

2. Gestasi 32 minggu empat hari

a. Data Subjektif

- 1) HPHT tanggal 8 November 2009
- 2) Menurut ibu umur kehamilannya 8 bulan

b. Data Objektif

- 1) TFU 3 jrbpx
- 2) TP tanggal 15 Agustus 2010

c. Analisa dan Interpretasi Data

- 1) Membesarnya uterus disebabkan oleh pengaruh hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan hipertropi, hiperplasia sel uterus dan hipervaskularisasi pembuluh darah (Wikenjosastro H, 2005.Hal 89)
- 2) Menurut rumus Neagle dari HPHT tanggal 08 November 2009 sampai

Dengan tanggal 15 Agustus 2010, masa gestasi adalah 32 minggu empat hari (Mochtar R, 1998.Hal 48)

3. Punggung Kiri

a. Data Subjektif

Pergerakan janin dirasakan terutama pada kuadran kanan perut ibu

b.Data Objektif

Palpasi Leopold II teraba punggung kiri

c. Analisa dan Interpretasi Data

Palpasi Leopold II dapat ditentukan batas samping uterus dan dapat pula ditentukan letak punggung janin yang membujur dari atas ke bawah menghubungkan bokong dan kepala. Pada palpasi teraba tahanan keras lebar seperti papan pada sisi kiri perut ibu dan sisi kanan teraba bagian – bagian kecil yang menunjukkan bahwa punggung kiri (Wiknjosastro H,2005.Hal 156)

4. Presentase Kepala, Convergen

a. Data Subjektif :-

b. Data Objektif :

1). Palpasi Leopold III teraba pada bagian terendah

2). Palpasi Leopold IV convergen

c. Analisa dan Interpretasi Data

palpasi Leopold III dapat menentukan bagian terendah janin. Pada palpasi teraba bagian keras, bulat dan melenting menandakan kepala dan palpasi Leopold IV dapat menentukan bagian terendah apakah sudah masuk ke

dalam pintu atas panggul. Dan saat palpasi kedua tangan pemeriksa masih bertemu menandakan kepala masih convergen. (Wikenjosastro H, 2005. Hal 256)

5. Intra Uterin

a. Data Subjektif

Ibu merasakan pergerakan janin kuat dan tidak ada nyeri perut

b. Data Objektif

Pada saat dilakukan palpasi ibu tidak merasa nyeri

c. Analisa dan Interpretasi Data

Salah satu tanda kehamilan intra uterin adalah terasa gerakan janin dalam rahim, tidak terasa nyeri saat palpasi dan perkembangan rahim sesuai dengan tuanya kehamilan. (Wikenjosastro H,2005.Hal 89)

6. Tunggal

a. Data Subjektif

Ibu merasakan janinnya bergerak kuat pada perut sebelah kanan

b. Data Objektif

Djj terdengar lebih jelas pada perut sebelah kanan kuadaran bawah dengan frekuensi 130x / menit.

c. Analisa dan Interpretasi Data

- 1) Pada palpasi hanya teraba 2 bagian besar janin yaitu kepala pada bagian bawah abdomen dan bokong pada fundus uteri, ini menandakan kehamilan tunggal. (Manuaba I. B.G, 2001.Hal 153)

- 2) Auskultasi Djj pada hamil tunggal akan terdengar pada satu sisi, sedangkan pada kehamilan ganda terdengar Djj pada dua lokasi dengan perbedaan kurang lebih 10 denyutan (Manuaba I.B.G,2001.Hal 153)

7. Hidup

a. Data Subjektif

Ibu merasakan janinnya bergerak kuat

b. Data Objektif

Djj terdengar kuat dan teratur di sebelah kanan dengan frekuensi 130x / menit

c. Analisa dan Interpretasi Data

- 1) Adanya gerakan janin dan Djj merupakan tanda bahwa janin hidup. Gerakan janin pada primigravida dapat dirasakan pada umur kehamilan 18 minggu sedangkan pada multigravida umur kehamilan 16 minggu. Djj dapat didengar dengan leanec pada umur kehamilan 18 – 20 minggu. (Wikenjosastro H,2005. Hal 129)
- 2) Janin dalam keadaan sehat , bunyi jantungnya teratur dan frekuensinya antara 120 – 160 x / menit (Manuaba I.B.G, 2001.Hal 136)

8. Keadaan Janin Baik

a. Data Subjektif

Ibu merasakan pegerakan janin kuat

b. Data Objektif

- 1) Djj 130x/ menit
- 2) TBJ 2.580 gram

a. Analisa dan Interpretasi Data

janin bergerak kuat, bunyi jantung teratur dan TBJ diatas 500 gram menandakan janin dalam keadaan baik. (Wiknjosatro H,2005.Hal 154)

9. Ibu dengan Anemia Berat

a. Data Subjektif

Ibu mengeluh sering pusing pada saat mau berdiri, mual, muntah dan mudah lelah setelah beraktifitas.

b. Data Objektif

- 1) Ibu tampak lemah
- 2) Konjungtiva tampak pucat
- 3) Pada pemeriksaan darah Hb 6,8 gram%

c. Analisa dan Interpretasi Data

keperluan tambahan zat besi dalam kehamilan sangat penting untuk meningkatkan jumlah sel darah merah dan pembentukan sel janin ke plasenta. Makin sering wanita mengalami kehamilan dan melahirkan maka janin banyak kehilangan zat besi dan menjadi anemia. Seorang wanita hamil yang memiliki Hb kurang dari ≤ 7 gr% dikategorikan sebagai anemia berat. Adapun tanda dan gejala anemia berat yaitu mudah lelah, nafsu makan kurang, pusing, kulit pucat, mukosa dan kuku jari pucat, takhikardi, rambut dan kuku rapuh, lidah licin dan nafas pendek (Varney dkk,2001.Hal 152)

Langkah III. Merumuskan Diagnosa / Masalah Potensial

1. Potensial terjadinya partus prematurus

a. Data Subjektif

Ibu mengeluh sering pusing, mudah lelah, badan lemah dan sesak nafas setelah beraktifitas

b. Data objektif

- 1) Wajah tampak pucat
- 2) Konjungtiva pucat
- 3) Hb 6,8 gr %

c. Analisa dan Interpretasi Data

anemia dalam kehamilan yang tidak diatasi dan melihat umur kehamilan yang hampir aterm, dapat menyebabkan pendarahan post partum karena kurangnya suplai nutrisi dan O₂ ke jaringan termasuk uterus tidak dapat berkontraksi secara adekuat. (Sarwono, 1998.Hal 450)

Langkah IV. Identifikasi Perlunya Tindakan Segera Dan Kolaborasi

Kolaborasi dengan dokter untuk pemberian vitamin yaitu SF 3 x 1 tablet / hari, B complex 3 x 1 tablet / hari, vitamin C 3 x 1 tablet / hari , injeks neurosanbe 500 ml / IM.

Langkah V . Rencana Tindakan

Tanggal 24 Juni 2010 Jam 10.10 Wita

1. Tujuan

- a. Kehamilan dapat berlangsung normal
- b. Keadaan ibu dan janin baik
- c. Anemia berat teratasi

2. Kriteria Keberhasilan

- a. TFU sesuai dengan umur kehamilan
- b. Tanda- tanda vital dalam batas normal
 - 1) Tekanan darah : Systole 100 – 130 mmHg
Diastole 70 – 90 mmHg
 - 2) Nadi : 80 – 90x / menit
 - 3) Suhu badan : 36 – 37 °c
 - 4) Pernapasan : 16 – 20x / menit
- c. Keadaan janin sehat dengan kriteria
 - 1) Djj dalam batas normal 120 -160x / menit
 - 2) TBJ > 2500 gram
- d. Hemoglobin > 11 gr %
- e. Conjunctiva tidak pucat
- f. Keluhan ibu berkurang hilang mengenai rasa pusing dan tidak mudah lelah
- g. Kehamilan dapat berlangsung sampai aterm yaitu 37 - 42 minggu

3. Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan

- a. Jelaskan pada ibu tentang kondisi kehamilannya

Rasional : Dengan menjelaskan mengenai keadaan yang dialaminya maka ibu akan mengerti sehingga ibu akan bersifat kooperatif terhadap tindakan dan anjuran petugas kesehatan.

- b. Beri He tentang :

- 1) Gizi ibu hamil

Rasional : Kebutuhan gizi pada ibu hamil lebih dari biasanya karena digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dan persiapan laktasi, apabila ibu dalam keadaan anemia berat.

2) Hygiene dalam kehamilan

Rasional : personal hygiene sangat penting untuk memberikan rasa nyaman pada ibu dan untuk mencegah terjadinya infeksi

3) Istirahat yang cukup

Rasional : Dengan istirahat yang cukup dapat meringankan beban kerja jantung yang mengalami peningkatan dalam masa kehamilan dan dapat menghemat penggunaan energi.

4) Anjurkan ibu untuk menghitung pergerakan janinnya

Rasional : Untuk melibatkan ibu dalam memantau kesehatan janinnya.

c. Hal tentang Sembilan tanda bahaya kehamilan

Rasional : Dengan memberitahukan ibu tentang Sembilan tanda bahaya kehamilan, maka ibu dapat mengerti dan melaksanakan anjuran bidan jika mengalami salah satu dari tanda bahaya kehamilan tersebut, sehingga ibu terhindar dari 3T (terlambat di deteksi, terlambat dirujuk dan terlambat diberikan pertolongan ditempat rujukan).

- d. Diskusikan dengan ibu tentang komplikasi dalam kehamilan

Rasional : Agar ibu lebih berhati – hati dalam menghadapi anemia yang sedang dialaminya dan lebih memperhatikan apa yang dianjurkan dan segera datang ke bidan dan BERDOA (Bersama donor, Ongkos, dan Angkutan)

- e. Diskusikan tentang persiapan kelahiran dan persalinan

Rasional : Dengan mendiskusikan dapat membantu ibu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi persalinan terutama biaya persalinan, tempat bersalin, penolong persalinan serta keluarga yang akan ditinggalkan selama dirumah sakit bersalin dengan mengingat SURGA (serahkan urusan rumah tangga pada keluarga)

- f. Penatalaksanaan pemberian vitamin

- 1) SF 3 x 1 tablet / hari

Rasional : Suflemen zat besi direkomendasikan sebagai dasar yang rutin karena banyak ibu yang tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi apalagi ibu dengan anemia berat.

- 2) Vitamin B kompleks

Rasional : Vitamin B kompleks merangsang relaksasi otot – otot polos dan memperlancar aliran darah sehingga membantu metabolisme termasuk saluran pencernaan.

3) Vitamin C

Rasional : Sebagai anti oksidan senyawa yang membantu penyerapan pembentukan kolagen dan membantu penyerapan zat besi.

4) Injeksi neorosambe 500 ml / IM

Rasioanal : Kombinasi dari tiga macam vitamin yaitu 100 mg vitamin B1, 20 mg vitamin B6 dan 200 mg vitamin B12 yang berperan dalam metabolisme karbohidrat, metabolisme asam amino dan berguna untuk pertumbuhan reproduksi sel.

g. Anjurkan ibu untuk datang kembali tanggal

Rasional : Dengan penjelasan kepada ibu kapan ia harus kembali maka ibu mengadakan kesepakatan dengan bidan sehingga tujuan asuhan dapat dicapai secara efisien dan efektif.

Langkah VI. Pelaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan

Tanggal 24 juni 2010 Jam 10.30 wita

1. Menjelaskan pada ibu tentang kondisi kehamilannya yaitu : letak janin baik, kepala berada dibawah, DJJ terdengar jelas dengan frekuensi 130x / menit, keadaan ibu sering pusing , mudah lelah, badan lemah, sesak nafas, merupakan akibat dari penurunan Hb dalam darah yang jumlahnya hanya 6,8 gr %.Hal ini diatasi dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi dan Fe seperti: ikan, daging , tahu, tempe, telur, dan sayur – sayuran yang berwarna hijau dan buah – buahan.

2. Memberi He tentang :

a. Gizi pada ibu hamil

- 1) Kebutuhan kalori selama kehamilan meningkat sebesar 285 kalori perhari yang diperoleh dari kacang – kacangan, buah segar, beras merah, sayur – sayuran dan kentang.
- 2) Kebutuhan protein sebesar 60 mg perhari. Protein dapat di peroleh dari tahu, tempe, daging, ikan, susu dan telur.
- 3) Kebutuhan kalsium sebesar 600 mg perhari. Sumber kalsium yaitu susu, tahu, brokoli, kacang – kacangan .
- 4) Zat besi yang diperlukan sebesar 600 mg perhari. Sumber zat besi yaitu bayam, daging segar, hati, ikan, telur, dan kedelai.
- 5) Kebutuhan asam folat (vitamin B) disarankan 300 mg perhari. Sumber asam folat yaitu orange juice, bayam, brokoli, stroberi juga roti.
- 6) Vitamin C diperlukan sebanyak 40 mg perhari yang dapat diperoleh dari buah apel dan jeruk manis.

b. Personal Hygiene dalam kehamilan

Menganjurkan ibu untuk menjaga kebersihan tubuh agar terhindar dari infeksi dan mengganti apabila basah atau kotor. Ibu mengerti dan mau melaksanakan anjuran tersebut.

c. Istirahat yang cukup

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melaksanakan aktifitas yang dapat membuat ibu kelelahan. Ibu mengerti dan akan menggunakan waktu yang lebih banyak untuk istirahat.

- d. Mengajarkan ibu untuk menghitung pergerakan janinnya

Perhitungan dilakukan saat baring miring, pergerakan janin normal 1 kali atau minimal 10 kali perhari. Ibu bersedia menghitung pergerakan janinnya setiap hari.

3. Mendiskusikan tanda – tanda bahaya kehamilan

- a. Perdarahan jalan lahir
- b. Sakit kepala yang hebat
- c. Penurunan gerakan janin
- d. Ketuban pecah sebelum waktunya
- e. Gangguan penglihatan
- f. Demam
- g. Muntah terus menerus
- h. Nyeri perut yang hebat
- i. Kejang

4. Mendiskusikan dengan ibu tentang komplikasi dalam kehamilan dengan mengingat doa. (Donor, Ongkos, Angkut). Keadaan yang dialami oleh ibu sekarang adalah anemia berat. Komplikasi yang mungkin terjadi adalah prematurus, BBLR, KJDR, dan pendarahan pada saat persalinan. Ibu mengerti dan akan datang ke klinik apabila ada komplikasi.

5. Mendiskusikan dengan ibu tentang persiapan kelahiran dan persalinan

- a. Pemilihan tempat peralihan
- b. Penentuan penolong persalinan
- c. Persiapan biaya persalinan

- d. Persiapan keluarga yang akan ditinggalkan selama di rumah sakit bersalin dengan mengingat SURGA (Serahkan Urusan Rumah tangga Pada keluarga) .
- Ibu merencanakan melahirkan di rumah sakit Siti Fatimah Makassar dan ditolong oleh dokter atau bidan. Suami sudah menyiapkan biaya persalinan dan pekerjaan rumah tangga akan diserahkan pada mertuanya apabila sudah mau melahirkan.

6. Penatalaksanaan pemberian vitamin

- a. Fe 3 x 1 tablet perhari
 - b. Bcom 3 x 1 tablet perhari
 - c. Vit C 3 x 1 tablet perhari
 - d. Neurosanbe injeksi 500 ml / IM
- Ibu mengerti dan akan mengkonsumsi obat – obatan yang diberikan sesuai dengan dosis yang dianjurkan.

7. Menganjurkan ibu kembali ke klinik untuk memeriksakan kehamilannya tanggal 30 Juni 2010, tetapi bila ada keluhan, ibu boleh datang kapan saja

Langkah VII. Evaluasi Hasil Asuhan Kebidanan

Tanggal 24 Juni 2010 jam 10.50 Wita

1. Kehamilan berlangsung normal

- a. TFU 3 Jr bpx (30 cm), teraba bokong pada fundus
- b. Tanda - tanda vital
 - 1) Tekanan Darah : 90 / 60 mmHg
 - 2) Nadi : 80 x / menit
 - 3) Suhu : 36,8 °C

- 4) Pernapasan : 24x / menit
2. Bayi dalam kondisi yang baik dan Djj terdengar jelas di perut sebelah kiri dengan frekuensi 130 x / menit.
 3. Keadaan ibu anemia berat dengan Hb 6,8 gr %.
 4. Ibu bersedia datang kembali tanggal 30 Juni 2010 untuk memeriksakan kehamilannya.



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL CARE
PADA NY"J" GESTASI 32 MINGGU EMPAT HARI
DI RSIA SITI FATIMAH MAKASSAR
TANGGAL 24 JUNI 2010

No. Register : 048821
Tanggal kunjungan : 24 Juni 2010 Jam 10.00 Wita
Tanggal pengkajian : 24 Juni 2010 Jam 10.10 Wita
Ruangan : ANC Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah

Identitas ibu / suami

Nama : Ny. "J" / Tn. "M"
Umur : 40 tahun / 34 tahun
Nikah : 1 Kali / ± 9 Tahun
Suku : Makassar / Makassar
Agama : Protestan / Protestan
Pendidikan : SMP / SMA
Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
Alamat : Jl. Teuku Umar No. 12

Subjektif :

1. Ini adalah hamil yang ketujuh dan tidak pernah keguguran
2. Ibu mengatakan HPHT : 8 November 2009.
3. Menurut ibu kehamilannya 8 bulan.

4. Sejak terlambat haid ibu tidak pernah merasa nyeri perut.
5. Ibu merasakan pergerakan janinnya mulai bulan Maret 2009 dan ibu merasakan pergerakan janinnya kuat disebelah kanan perut ibu.
6. Ibu mengeluh pusing, mudah lelah, badan lemah, dan sesak nafas setelah beraktifitas.
7. Ibu sudah pernah memeriksakan kehamilannya dan sudah mendapatkan suntikan TT lengkap.

Objektif :

1. Tafsiran persalinan tanggal 15 Agustus 2010
2. Keadaan umum baik dan tanda – tanda vital :
 - a. Tanda – tanda vital :

Tekanan Darah	: 90 / 60 mmHg
Nadi	: 80x / menit
Suhu	: 36,8 ^o C
 - b. Pernapasan : 24x / menit
 - b. Keadaan emosi stabil dapat berkomunikasi dengan baik
 - c. Berat badan 61 kg (sebelum hamil 55 kg)
 - d. Lila 25 cm
3. Tidak ada oedema pada wajah.
4. Konjungtiv tampak pucat , sklera tidak ikterus.
5. Tampak striae albicans, dan tonus otot sudah regang.
6. Pemeriksaan abdomen (palpasi) menurut Leopold.
 - a. Leopold I : TFU 3 Jr bpx (30 cm), teraba bokong pada pundus

- b. Leopold II : Punggung Kiri
 - c. Leopold III : Presentasi Kepala
 - d. Leopold IV : Convergen
7. Djj : 130x / menit
 8. Lingkar perut : 86 cm
 9. Tidak oedema dan varice pada kedua tungkai
 10. Refleks patellapositif (+ / +)
 11. Pemeriksaan laboratorium tanggal 24 Juni 2010
 - a. Hb : 6,8 gr %
 - b. Urine : Albumin dan reduksi negative

Assessment :

GVII PVI A0, gestasi 32 minggu empat hari, punggung kiri, presentase kepala, convergen, intra uterin, tunggal, hidup. Keadaan janin baik dan keadaan ibu anemia berat.

Planning :

Tanggal 24 Juni 2010

1. Memberitahu tentang hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa kehamilan normal, ibu dalam keadaan anemia berat dan ibu sudah mengerti keadaan kehamilannya.
2. Memberi He tentang :
 - a. Gizi pada ibu hamil

- 1) Kebutuhan kalori selama kehamilan meningkat sebesar 285 kalori perhari diperoleh dari kacang – kacangan, buah segar, beras merah, sayur – sayuran, kentang.
- 2) Kebutuhan protein sebesar 60 gr perhari. Protein dapat diperoleh dari tahu, tempe, daging, ikan, susu, telur.
- 3) Kebutuhan kalsium sebesar 900 mg perhari. Sumber kalsium yaitu susu, tahu, brokoli, kacang – kacangan.
- 4) Zat besi diperlukan sebesar 600 mg perhari. Sumber zat besi yaitu bayam, daging segar, hati, ikan, telur, dan kedelai.
- 5) Kebutuhan asam folat (vitamin B) disarankan 300 mg perhari. Sumber asam folat yaitu orange juice, bayam, brokoli, stroberi juga roti.
- 6) Vitamin C diperlukan sebanyak 40 mg perhari yang dapat diperoleh dari buah apel, jeruk manis.

Ibu sudah mengerti tentang penyuluhan yang diberikan dan ibu bersedia mengonsumsi makanan yang dianjurkan.

b. Hygiene dalam kehamilan

Menganjurkan ibu untuk mencegah infeksi sering mengganti pakaian apabila basah dan kotor. Ibu mengerti tentang HE yang diberikan.

c. Istirahat yang cukup

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melakukan aktifitas yang berlebihan yang dapat membuat ibu kelelahan. Ibu mengerti dan akan menggunakan waktu lebih banyak untuk istirahat.

b. Mengajarkan ibu untuk menghitung pergerakan janinnya

Perhitungan dilakukan saat baring miring, pergerakan janin normal 1 kali atau minimal 10 kali perhari.

3. Mendiskusikan tanda bahaya dalam kehamilan

a. Pendarahan dari jalan lahir

b. Sakit kepala yang hebat

c. Penurunan gerakan janin

d. Ketuban pecah sebelum waktunya

e. Gangguan penglihatan

f. Demam

g. Muntah terus menerus

h. Nyeri abdomen

i. Kejang

Ibu sudah mengerti dan bersedia menghubungi bidan jika mengalami salah satu tanda bahaya kehamilan

4. Mendiskusikan tentang kesiapan ibu dan keluarganya jika timbul komplikasi, mengenai kendaraan yang mengantar jika dibutuhkan, siapa yang bersedia menjadi donor dan persediaan biaya dan ibu sudah mengerti.

5. Mendiskusikan dengan ibu tentang persiapan kelahiran dan persalinan

a. Pemilihan tempat persalinan

b. Penentuan penolong persalinan

c. Persiapan biaya persalinan

d. Persiapan keluarga yang akan ditinggalkan selama dirumah sakit bersalin.

Ibu merencanakan melahirkan di rumah sakit Siti Fatimah Makassar dan ditolong oleh dokter atau bidan. Suami sudah menyiapkan biaya persalinan dan pekerjaan rumah tangga akan diserahkan pada mertuanya apabila akan melahirkan.

1. Penatalaksanaan pemberian vitamin.

- a. Fe 3 x 1 tablet perhari
- b. Bcom 3 x 1 table perhari
- c. Vit C 3 x 1 tablet perhari
- d. Neurosanbe injeksi 500 ml / IM

Ibu mengerti dan akan mengkonsumsi obat – obatan yang diberikan sesuai dengan dosis yang dianjurkan.

2. Menganjurkan ibu kembali ke klinik untuk memeriksakan kehamilannya tanggal 30 Juni 2010, tetapi bila ada keluhan ibu boleh datang kapan saja.

PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL
CARE GESTASI 33 MINGGU EMPAT HARI DI
RSIA SITI FATIMAH MAKASSAR
TANGGAL 30 JUNI 2010

Subjektif :

1. Pergerakan janin kuat 1 – 2 kali dalam 1 jam.
2. Perasaan pusing sudah berkurang.
3. Ibu masi merasa lemah setelah melakukan aktifitas.

Objektif :

1. Ibu kelihatan masih pucat
2. Berat badan sekarang 61,6 kg
3. Tanda – tanda vital :
 - a. Tekanan Darah : 100 / 70 mmHg
 - b. Nadi : 80x / menit
 - c. Suhu Badan : 36,6 °C
 - d. Pernapasan : 24x / menit
4. Konjungtiva agak pucat, sclera tidak ikterus.
5. Pembesaran perut sesuai umur kehamilan.
6. Tidak ada oedema pada wajah dan tungkai.
7. Palpsi abdomen :
Leopold I : TFU 3 Jr bpx (30 cm)
Leopold II : Punggung kiri

Leopold III : Presentasi kepala

Leopold IV : Convergen

Auskultasi Djj : 130x / menit kuat dan teratur.

3. Tanggal 30 Juni 2010 : Hb 7,2 gr %

Assesment :

GVII PVII A0, gestasi 33 minggu empat hari, punggung kiri, presentase kepala, convergen, intra uteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik dan keadaan ibu anemia berat.

Planning :

Tanggal 30 Juni 2010 jam 09.30 Wita

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu bahwa kehamilan normal dan ibu dalam keadaan anemia sedang.
2. Mengingatkan pada ibu untuk tetap melaksanaka He yaitu :
 - a. Gizi pada ibu hamil dengan memenuhi kebutuhan kalori, protein, kalsium, zat besi, asam folat dan vitamin C.
Ibu sudah mengerti tentang penyuluhan yang diberikan dan bersedia mengkonsumsi makanan yang dianjurkan.
 - b. Hygiene dalam kehamilan
Menjelaskan pada ibu tentang personal hygiene terutama tentang kebersihan genitalia, pakaian, serta, kebersihan payudara dan ibu sudah mengerti.

c. Istirahat

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup yaitu tidur siang 1 – 2 jam dan 6 – 8 jam pada malam hari dan ibu sudah mengerti.

3. Mengingat tentang tanda bahaya dalam kehamilan dan ibu segera ke bidan atau dokter jika mengalami salah satu dari tanda bahaya kehamilan dan ibu sudah mengerti.
4. Penatalaksanaan pemberian obat –obatan, diantaranya :
 - a. Pemberian obat biosanbe : 1 x 1kapsul sehari selama 10 hari.
 - b. Pemberia obat vitamin C (70 mg) : 2 x 1kapsul sehari selama 10 hari.
5. Menganjurkan ibu periksa kembali sesuai tanggal yang sudah ditentukan.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang kesenjangan antara konsep dasar dengan penerapan asuhan kebidanan pada Ny. “ J” gestasi 32 minggu empat hari dengan anemia berat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar tanggal 24 dan 30 juni 2010.

Untuk memudahkan dalam menguraikan kesenjangan antara teori dan studi kasus, maka penulis menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang terdiri dari 7 langkah.

Langkah I. Identifikasi Data Dasar

Pada langkah awal ini penulis melakukan pengkajian data dasar yang meliputi identitas klien, data biologis, data psikologis, Sosial, ekonomi dan spiritual. Informasi yang diperoleh mengenai data–data tersebut penulis dapatkan dengan mengadakan wawancara langsung dari klien dan keluarganya serta sebagian bersumber dari pemeriksaan fisik yang dimulai dari kepala sampai ke kaki yang meliputi inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi, dan pemeriksaan penunjang / laboratorium.

Dalam tinjauan pustaka dikatakan bahwa tanda dan gejala anemia meliputi lemas, pusing, cepat lelah, mudah mengantuk, pandangan berkunang – kunang terutama bila mau berdiri dan conjungtiva tampak pucat.

Pada kasus Ny. “ J” data yang dikumpulkan dan hasil pengkajian yaitu ibu mengeluh sering pusing, badan lemah, dan cepat lelah setelah melakukan aktifitas, konjungtiva pucat, hasil pemeriksaan Hb : 6,8 gr %.

Berdasarkan uraian diatas ada persamaan gejala dan keluhan antara teori dan kasus sehingga penulis tidak ada hambatan yang berarti karena pada saat pengumpulan data baik keluarga, klien, bidan, dan dokter dilokasi praktek bersedia memberikan informasi atau data yang ada hubungannya dengan penyakit dan perawatan ibu sehingga memudahkan dalam pengumpulan data.

Dengan demikian apa yang dijelaskan pada konsep dasar dan yang ditemukan pada studi kasus secara garis besar tidak ada kesenjangan.

Langkah II. Merumuskan Diagnosa / Masalah Aktual

Berdasarkan dalam konsep dasar bahwa dalam menegakkan suatu diagnosa / masalah kebidanan harus berdasarkan pada pendekatan asuhan kebidanan yang didukung dan ditunjang oleh beberapa data baik data subjektif maupun data objektif.

Adapun diagnosa masalah aktual yang diidentifikasi pada Ny.“ j” adalah GVII PVI A0, gestasi 32 minggu empat hari, situs memanjang , punggung kiri, presentasi kepala, convergen, intra uteri, tunggal, hidup, keadaan janin baik, ibu dengan anemia berat Hb 6,8 gr %.

Berdasarkan data diatas masalah aktual adalah anemia berat dimana ditemukan teori jumlah pada anemia berat < 7 gram %, sehingga apa yang telah diperoleh dari pengkajian data tidak ada kesenjangan masalah aktual antara teori dengan yang ditemukan pada studi kasus Ny “ J”.

Langkah III. Merumuskan Diagnosa / Masalah Potensial

Dalam konsep dasar hemoglobin yang normal pada ibu hamil 11 gr %, atau lebih dan dikatakan anemia bila kadar Hb kurang dari 11 gr% sehingga digolongkan menjadi anemia ringan (Hb 8-10 gr%), anemia sedang (Hb 7-8 gr%), berat (Hb < 7 gr%).

Bila anemia berat tidak ditangani secara dini akan mengarah pada kasus potensial .

1. Terjadinya partus prematurus yang disebabkan karena kurangnya kemampuan sel – sel darah merah untuk mengantarkan zat – zat nutrisi dan oksigen ke uterus dan keseluruhan tubuh sehingga kebutuhan janin akan nutrisi tidak terpenuhi yang menyebabkan gangguan pertumbuhan janin.
2. Terjadinya pendarahan post partum yang disebabkan oleh kurangnya suplai nutrisi, O₂ ke jaringan termasuk uterus sehingga uterus tidak dapat berkontraksi secara adekuat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengkajian data tidak ada kesenjangan masalah potensial antara teori dengan yang ditemukan pada studi kasus Ny. “j”.

Langkah IV. Identifikasi Perlunya Tindakan Segera dan Kolaborasi

Kolaborasi dengan dokter mengenai pemberian vitamin yaitu SF 3x1 tablet/hari, B complex 3x1 tablet perhari, vitamin C 3x1 tablet perhari, injeksi neourosanbe 500 ml/IM.

Langkah V. Rencana Tindakan

Perencanaan adalah proses penyusunan suatu rencana tindakan berdasarkan identifikasi masalah lain yang mungkin terjadi. Perencanaan tindakan berdasarkan tujuan yang akan dicapai disertai kriteria keberhasilannya.

Adapun rencana tindakan pada kasus Ny. “j” adalah :

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu.
2. Memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu tentang gizi ibu hamil, hygiene dalam kehamilan serta istirahat.
3. Menganjurkan ibu untuk menghitung pergerakan janinnya.
4. Mendiskusikan tanda bahaya dalam kehamilan.
5. Mendiskusikan tentang persiapan jika timbul komplikasi.
6. Mendiskusikan tentang persiapan kelahiran dan persalinan.
7. Pemberian vitamin SF 3x1 tablet/hari, B com 3x1 tablet/hari, vitamin C 3x1 tablet/hari.
8. Anjurkan ibu untuk datang kembali sesuai jadwal yang ditetapkan atau bila ada keluhan.

Dari tinjauan pustaka dan asuhan kebidanan pada Ny. “L” berdasarkan pada rencana tindakan, ditemukan adanya persamaan antara apa yang ada diteori dengan yang dilakukan dilahan praktek.

Langkah VI. Pelaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan

Tindakan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai rencana dan tahap pelaksanaan tindakan asuhan kebidanan ini. Penulis tidak menemukan hambatan yang berarti karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari

klien dan keluarga yang kooperatif dan adanya sarana dan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan tindakan.

Langkah VII. Evaluasi

Evaluasi merupakan langkah terakhir dari proses manajemen asuhan kebidanan dimana pada tahap ini dinilai adanya kemajuan dan keberhasilan dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh klien. Dalam evaluasi selama 2 kali pemeriksaan tanggal 24 dan 30 Juni 2010 pada Ny. “j” yaitu kehamilan berlangsung normal ditandai dengan KU baik, pembesaran perut sesuai dengan umur kehamilan, DJJ dalam batas normal.

Anemia berat sudah teratasi dengan pusing dan lelah dirasakan sudah berkurang, Hb meningkat dari 6,8 gr% menjadi 7,2 gr% ibu menghabiskan obat yang diberikan. Dengan melihat hasil asuhan kebidanan pada Ny “j” penulis mendapat kesenjangan karena masalah, yang ada pada Ny. “j” belum teratasi dengan baik, dimana peningkatan Hb dari 6,8 gr% meningkat menjadi 7,2 gr% sedangkan pada tinjauan pustaka anemia pada ibu hamil dapat teratasi apabila Hb mencapai 11gr%.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan bab–bab sebelumnya,sbb :

A. KESIMPULAN

1. Anemia adalah penurunan jumlah sel darah merah atau penurunan konsentrasi hemoglobin didalam sirkulasi darah.
2. Salah satu penyebab anemia dalam kehamilan yang paling sering dijumpai adalah anemia akibat defisiensi zat besi (Fe). Zat besi adalah salah satu unsur gizi yang membentuk Hb atau sel darah merah. Kebutuhan zat besi selama hamil mutlak diperlukan untuk pertumbuhan janin, plasenta dan volume darah ibu.
3. Untuk menghindari terjadinya anemia, sebaiknya ibu hamil melakukan pemeriksaan secara rutin sejak awal kehamilannya (trimester I) sampai ibu melahirkan, untuk deteksi dini adanya kelainan pada ibu hamil dan janinnya serta diberikan tindakan yang tepat.
4. Upaya lain yang dilakukan untuk menanggulangi anemia ibu hamil yaitu dengan memberikan suplementasi berupa zat besi (iron) dalam bentuk sulfas ferrosus 200 mg dan juga dilakukan melalui upaya perbaikan gizi keluarga. Pemberian tablet besi ini diberikan pada ibu hamil sejak kehamilan trimester ke II dan diharapkan ibu hamil dapat minum 1 tablet setiap hari paling sedikit 90 tablet selama kehamilannya.

5. Pendokumentasian yang digunakan dalam bentuk SOAP secara logis, sistematis dan berkesinambungan sebagai pertanggungjawaban dan tanggung gugat.

B. SARAN

1. Bagi Ibu Hamil

- a. Sebaiknya ibu hamil melakukan pemeriksaan secara rutin sejak awal kehamilannya (trimester 1) sampai ibu melahirkan sehingga kelainan yang timbul dapat diketahui secara dini dan tersedia cukup waktu untuk penanganan masalah yang ibu hadapi sesuai kebutuhan.
- b. Mengonsumsi makanan yang banyak mengandung zat gizi yang tinggi untuk pemenuhan kebutuhan ibu dan janinnya serta diharapkan mengonsumsi tablet SF setiap hari sebanyak 90 tablet selama hamil.
- c. Mengerti dan melaksanakan setiap anjuran dan pendidikan kesehatan yang diberikan.

2. Bagi Pelaksana Pelayanan Kesehatan

- a. Bidan sebagai salah satu pelaksana utama dalam memberikan pelayanan asuhan kebidanan terhadap masyarakat khususnya pada ibu hamil, agar lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan banyak membaca buku serta mengikuti pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Setiap pelayanan ibu hamil mampu melaksanakan pemeriksaan kadar hemoglobin terutama bagi ibu hamil yang kontak pertama kali dengan petugas kesehatan termasuk pemeriksaan tinja untuk mendeteksi adanya

infeksi parasit, serta melaksanakan penyuluhan secara berkesinambungan.

- c. Profesi bidan harus mampu mengambil suatu keputusan klinik untuk menghindari keterlambatan dalam merujuk sehingga dapat mencegah kematian ibu dan bayi.

3. Bagi Institusi

Diharapkan bagi penerapan manajemen kebidanan dalam pemecahan masalah lebih ditingkatkan dan dikembangkan, mengingat proses tersebut sangat bermanfaat dalam membina tenaga bidan guna menciptakan sumber daya manusia yang berpotensi dan professional.



DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, E.R dan Rismintai Y.S. 2009. *Asuhan Kebidanan Komunitas*. Cet. I; Jakarta: Nuha Medika.
- Azwar, Azrul. 2005. <http://www.ajen.org.larocque,rennee. et al.> *Relationship between intensity of soil transmitted helminth infection and anemia during pregnancy*. Di akses tanggal 28 Feburari 2010.
- Hidayat, A. 2009. *Konsep Kebidanan*. Cet. I; Yogyakarta. Mitra Cendika.
- Hidayati, Afiyah. 2005. <http://www.goole.co.id>. *Anemia dalam Kehamilan*. Di akses tanggal 28 Feburari 2010.
- Manuaba, IBG. 2001. *Gawat Darurat Obstetri Ginekologi dan Obstetri Ginekologi Sosial Untuk Profesi Bidan*. Jakarta: EGC.
- Munandar, Rois. 2009. <http://www.wordpress.com>. *Sebab-sebab dan morfologi anemia*. Di akses tanggal 25 Mei 2010.
- Palmal. 2008. *Panduan Lengkap Kebidanan*. Cet. III; Yogyakarta: Palmal.
- Saifuddin, AB. 2006. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Cet. 4: Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Salmah, dkk. 2006. *Asuhan Kebidanan Antenatal*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir al Misbah Juz. VI*. Cet. IV; Jakarta: Lentera Hati
- Varney, H. 2007. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan*. Cet. I; Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Wiknjosastro, H. 2005. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka

Lampiran 1

SATUAN ACARA PENYULUHAN

1. Topik : Nutrisi ibu hamil
2. Sasaran : Ny. "J"
3. Waktu : Kamis, 24 Juni 2010
4. Tempat : Ruang KIA RSIA Siti Fatimah Makassar
5. Tujuan :
 - a. Umum : Setelah penyuluhan ibu mengetahui dan mengerti tentang nutrisi ibu hamil.
 - b. Khusus :
 - 1) Ibu mengerti tentang pentingnya gizi selama kehamilan.
 - 2) Ibu mengerti tentang gizi dan pengaruh perubahan fisiologi kehamilan.
 - 3) Ibu mengerti kebutuhan gizi ibu hamil.
6. Metode : Ceramah dan diskusi
7. Alat dan bahan : Leaf leaf
8. Referensi :
 - a. Cunningham, Mc Donal, William Obstetric, edisi 18, ECG, jakarta
 - b. Kasdu Dini, 2004 Gizi, Gizi ibu hamil Agar Anak Cerdas, edisi I, Jakarta