

**GAMBARAN PENGETAHUAN, SIKAP DAN TINDAKAN IBU
MENGENAI PEMBERIAN REHIDRASI ORAL PADA BAYI
YANG TERKENA DIARE DI BEBERAPA
RUMAH SAKIT RUJUKAN
TAHUN 2012**



Karya Tulis Ilmiah

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Ahli Madya
Kebidanan Jurusan Kebidanan pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN
Alauddin Makassar**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

**Oleh
MAWAR HANDAYANI
NIM. 70400009018**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 Agustus 2012

Penyusun

Mawar Handayani
70400009018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LEMBAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Mawar Handayani
Nim : 70400009018
Judul : Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Ibu Mengenai Pemberian Cairan Rehidrasi Oral pada Bayi yang Terkena Diare di Beberapa Rumah Sakit Rujukan Tahun 2012.

Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan pada Seminar Hasil tanggal 29 Agustus 2012 Program Studi DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pembimbing

dr. Nadyah, S. Ked., M. Kes.
Nip : 19790417 200801

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN

M A K A S S A R
Mengetahui,
Ketua Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb.
NIP : 19760126 200604 2 001

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “**Gambaran Pengetahuan Sikap dan Tindakan Mengenai Pemberian Cairan Rehidrasi Oral pada Bayi yang Terkena Diare di Beberapa Rumah Sakit Rujukan Tahun 2012**” yang disusun oleh **Mawar Handayani, NIM: 70400009018**, mahasiswi Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 29 Agustus 2012 M
11 Syawal 1433 H

DEWAN PENGUJI

- Ketua : DR. dr. Rasjidin Abdullah, MPH., MH.Kes. (.....)
- Sekretaris : dr. Rini Fitriani, S.Ked., M.Kes. (.....)
- Pembimbing : dr. Nadyah, S.Ked., M.Kes (.....)
- Penguji I : Sitti Saleha, S.Si.T., SKM., M.Keb. (.....)
- Penguji II : Drs. Muh. Sabir Maidin, M.Ag. (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

DR. dr. Rasjidin Abdullah, MPH., MH.Kes.
NIP. 19530119 198110 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, kami memuji-Nya serta memohon pertolongan dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami dan kejelekan perbuatan kami. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, niscaya tidak ada yang dapat menyesatkannya dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Dialah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* adalah hamba dan utusan-Nya.

Alhamdulillah, atas limpahan Rahmat dan pertolongan Allah penulis dapat menyusun Karya Tulis Ilmiah ini, dengan judul **“Gambaran Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Ibu Mengenai Pemberian Rehidrasi Oral pada Bayi yang Terkena Diare di Beberapa Rumah Sakit Rujukan Tahun 2012”**. Penulis banyak mendapatkan tantangan, rintangan, dan hambatan. Namun berkat bantuan, bimbingan, masukan dari berbagai pihak, sejumlah tantangan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Olehnya itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Hasanuddin dan ibunda Husnia yang telah bersusah payah mengasuh, membesarkan, mendidik, dan membina penulis dengan penuh keikhlasan dan pengorbanan baik lahiriah maupun batiniah serta

lantunan do'a yang selalu terucap dalam shalat dan sujud beliau untuk penulis. Demikian pula kepada kakak-kakakku Herniati, Sirajuddin, Hermansyah dan juga kepada seluruh keluarga besarku yang telah setia memberikan bantuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua. Amin Yaa Robbal 'Alamiin.

2. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT. Ms, selaku rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan serta mengerahkan segala kemampuan demi membangun kampus UIN Alauddin Makassar agar menjadi perguruan tinggi yang terdepan dan lebih berkualitas.
3. Bapak Dr. dr. Rasjidin Abdullah, MPH., MH.Kes., selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, yang telah memberikan waktu dan tempat untuk menimba ilmu selama kuliah di jurusan kebidanan.
4. Ibu Sitti Saleha, S.Si.T, SKM., M. Keb., selaku ketua prodi kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makasar sekaligus penguji I yang telah banyak memberikan masukan/saran serta telah menuntun, mendidik dan mengajarkan kepada penulis berbagai disiplin ilmu.
5. Ibu dr. Rini Fitriani, S.Ked., M.Kes., selaku sekretaris jurusan kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Ibu dr. Nadyah, S.Ked., M.Kes., selaku pembimbing Karya Tulis Ilmiah yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

7. Almarhum bapak Muh. Arief Alim, M.Ag., selaku penguji II yang telah banyak memberikan masukan dan saran kepada penulis, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan lebih banyak.
8. Bapak Drs. Muh. Sabir Maidin, M. Ag., selaku penguji II, yang telah memberikan banyak masukan dan saran sehingga karya Tulis Ilmiah (KTI) ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Para dosen dan seluruh staf UIN Alauddin terkhusus pada Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis serta memberikan wawasan, pengetahuan dan nasehat selama penulis menuntut ilmu dalam Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar.
10. Gubernur Sulawesi Selatan/Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
11. Bupati Gowa/Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
12. Direktur Rumah Sakit Syekh Yusuf, Rumah Sakit Haji, dan Rumah Sakit Labuang Baji yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
13. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2009 yang telah banyak memberikan semangat, perhatian dan membantu penulis dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
14. Murabbiahku, saudari-saudariku di Hafidzaat 12, saudari-saudariku di FSRN, dan di Study Club Al-‘Aafiyah *Jazaakumullahu Khairan* atas kebersamaan

dalam dakwah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang tegar di jalan-Nya dan menjadikan kita generasi-generasi yang berguna bagi kejayaan Islam, bangsa dan negara.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun Karya Tulis Ilmiah ini, masih banyak kekurangan di dalamnya. Olehnya itu penulis sangat mengharapkan masukan, kritikan yang bersifat menmbangun demi perbaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

Tiada sesuatu yang bisa penulis berikan, kecuali segala sesuatu yang telah kita lakukan untuk menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini, semoga bernilai pahala di sisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Amin Yaa Robbal 'Alamiin.

Makassar, 25 Agustus 2012
Penulis

Mawar Handayani
70400009018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KTI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
1. Tujuan Umum.....	7
2. Tujuan Khusus.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan umum tentang pengetahuan	9
1. Defenisi pengetahuan.....	9
2. Tingkat pengetahuan.....	9
B. Tinjauan umum tentang sikap (<i>Attitude</i>).....	11
1. Defenisi sikap (<i>Attitude</i>).....	11
2. Tingkat sikap (<i>Attitude</i>).....	11
C. Tinjauan umum tentang tindakan (<i>Practice</i>).....	12
1. Defenisi tindakan (<i>Practice</i>)	12
2. Tingkat tindakan (<i>Practice</i>).....	12
D. Tinjauan umum tentang diare.....	13

1. Defenisi diare.....	13
2. Klasifikasi diare.....	14
3. Etiologi diare.....	16
4. Patofisiologi diare.....	17
5. Gejala klinis diare.....	25
E. Tinjauan umum tentang diare pada bayi.....	26
1. Diare pada bayi.....	26
2. Gejala klinis diare pada bayi.....	27
F. Tinjauan umum tentang rehidrasi oral.....	29
1. Defenisi cairan rehidrasi oral.....	29
2. Cara pembuatan cairan rehidrasi oral.....	30
3. Cara pemberian cairn rehidasi oral.....	31
G. Tinjauan Islam tentang diare.....	36
H. Kerangka Konsep.....	40
1. Dasar pemikiran variabel penelitian.....	40
2. Skema kerangka konsep.....	40
3. Defenisi operasional dan kriteria objektif.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penenlitian.....	44
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	44
1. Lokasi penelitian.....	44
2. Waktu penelitian.....	44
C. Populasi dan Sampel.....	44
1. Populasi.....	44
2. Sampel.....	44
D. Teknik pengambilan sampel.....	45
E. Metode pengumpulan data.....	45
F. Metode pengolahan data analisis data.....	46
1. Pengolahan data.....	46
2. Analisis data.....	46
G. Penyajian data.....	47

1. <i>Editing</i>	47
2. <i>Coding</i>	47
3. <i>Tabulating</i>	47
H. Etika penelitian.....	47
1. Tanpa nama (<i>anonymity</i>).....	48
2. Kerahasiaan (<i>confidentiality</i>).....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Hasil.....	49
B. Pembahasan.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 2.2 Penurunan Berat Badan Bayi karena Dehidrasi.....	27
Tabel 2.3 Derajat Dehidrasi	28
Tabel 2.5 Klasifikasi Diare disertai Dehidrasi	34
Tabel 2.6 Pedoman Tata Laksana Diare Akut berdasarkan derajat dehidrasi	34
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Mengenai Pemberian Rehidrasi Oral pada Bayi yang Terkena Diare di Beberapa Rumah Sakit Rujukan Tahun 2012.....	53
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Gambaran Sikap Ibu Mengenai Pemberian Rehidrasi Oral pada Bayi yang Terkena Diare di Beberapa Rumah Sakit Rujukan Tahun 2012.....	54
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Gambaran Tindakan Ibu Mengenai Pemberian Rehidrasi Oral pada Bayi yang Terkena Diare di Beberapa Rumah Sakit Rujukan Tahun 2012.....	55

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Organ Pencernaan Manusia.....	22
Gambar 2.4 Langkah-Langkah pembuatan Cairan Rehidrasi Oral.....	31



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GRAFIK

Nomor Grafik	Halaman
Grafik 4.1 Grafik Gambaran Pengetahuan Ibu Mengenai Pemberian Rehidrasi Oral pada Bayi yang Terkena Diare di Beberapa Rumah Sakit Rujukan Tahun 2012.....	49
Grafik 4.2 Grafik Gambaran Sikap Ibu Mengenai Pemberian Rehidrasi Oral pada Bayi yang Terkena Diare di Beberapa Rumah Sakit Rujukan Tahun 2012.....	50
Grafik 4.3 Grafik Gambaran Tindakan Ibu Mengenai Pemberian Rehidrasi Oral pada Bayi yang Terkena Diare di Beberapa Rumah Sakit Rujukan Tahun 2012.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Lembar Kegiatan Konsultasi.
- Lampiran II : Lembar Persetujuan Responden (*Informed Consent*).
- Lampiran III : Lembar Kuesioner Gambaran Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Ibu Mengenai Pemberian Rehidrasi Oral pada Bayi yang Terkena Diare di Beberapa Rumah Sakit Rujukan Tahun 2012.
- Lampiran IV : Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Awal dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada Kepala Dinas Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Gowa.
- Lampiran V : Surat Permohonan Izin Pengambilan Data Awal dari Kepala Dinas Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Gowa kepada Kepala Rumah Sakit Syekh Yusuf.
- Lampiran VI : Surat Permohonan Izin Penelitian dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Kepala Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan).
- Lampiran VII : Surat Izin/Rekomendasi Penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan/Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bupati Gowa.

- Lampiran VII : Surat Izin Penelitian dari Kepala Dinas Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Gowa kepada Kepala Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa.
- Lampiran IX : Surat Izin/Rekomendasi Penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan/Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kepala Rumah Sakit Haji Makassar.
- Lampiran X : Surat Izin/Rekomendasi Penelitian dari Gubernur Sulawesi Selatan/Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan kepada Kepala Rumah Sakit Labuang Baji Makassar.
- Lampiran XI : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa.
- Lampiran XII : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Rumah Sakit Haji Makassar.
- Lampiran XIII : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Rumah Sakit Labuang Baji Makassar.
- Lampiran XIV : Master Tabel Penelitian
- Lampiran XV : Daftar riwayat hidup

ABSTRAK

Nama : Mawar Handayani
NIM : 70400009018
Judul KTI : **Gambaran Pengetahuan Sikap dan Tindakan Ibu Mengenai Pemberian Rehidrasi Oral pada Bayi yang Terkena Diare di Beberapa Rumah Sakit Rujukan Tahun 2012**
Pembimbing : dr. Nadyah, S.Ked., M.Kes.

Adanya kesepakatan Internasional untuk menurunkan angka kematian anak akibat diare menggunakan *Oral Rehydration Salts (ORS)*, merupakan solusi yang efektif dan harga terjangkau. Saat ini hanya 39% anak-anak dengan diare di negara berkembang yang menerima *ORS*, diteruskan dengan tetap mendapatkan asupan ASI/makanan. Walaupun lebih dari 90% ibu mengetahui tentang paket oralit, hanya satu dari tiga anak yang menderita diare diberi oralit, hasil tersebut sama dengan temuan SDKI 2002-2003.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan ibu mengenai pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare di beberapa rumah sakit rujukan tahun 2012, dengan jenis penelitian deskriptif. Besar populasi dari penelitian ini adalah 78 orang dengan sampel 65 orang dengan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*.

Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa dari 65 responden terdapat 57 responden (88%) yang tahu tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dan 8 responden (12%) yang tidak tahu tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare. Sedangkan dari segi sikap, dari 65 responden terdapat 32 responden yang memiliki sikap positif terhadap pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dan 33 responden (51%) yang memiliki sikap negatif terhadap pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare, kemudian dari segi tindakan, dari 65 responden terdapat 23 responden (35%) yang memiliki tindakan baik terhadap pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dan 42 responden (65%) yang memiliki sikap kurang baik terhadap pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare.

Dengan demikian diharapkan bagi ibu untuk lebih banyak mencari informasi baik dengan membaca, mengikuti penyuluhan, atau diskusi dengan petugas kesehatan agar mampu mengaplikasikan pengetahuannya tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare.

Daftar pustaka : 38 Literatur (2000-2012)

Kata kunci: pengetahuan, sikap, tindakan, rehidrasi oral, diare

ABSTRAC

Name : Mawar Handayani
Reg. Number : 70400009018
Title : **To describe the knowledge, attitudes and actions mother about giving oral rehydration in infants with diarrhea in several recomended hospitals in 2012**
Consultant : dr. Nadyah, S.Ked., M.Kes.

The existence of the International agreement to reduce child mortality from diarrhea using oral rehydration Salts (ORS), is an effective solution and affordable prices. Currently only 39% of children with diarrhea in developing countries who received ORS, continued to keep getting the intake of milk/food. Although more than 90% of mothers know about ORS packets, only one in three children with diarrhea were given ORS, these results are similar to findings IDHS 2002-2003.

The purpose of this study was to describe the knowledge, attitudes and actions mother about giving oral rehydration in infants with diarrhea in several recomended hospitals in 2012, with a descriptive research. The population of the study sample was 78 people with 65 people with the purposive sampling technique of sampling.

The results of this study found that of the 65 respondents are 57 respondents (88%) who knows about the administration of oral rehydration in infants with diarrhea and 8 respondents (12%) did not know about the provision of oral rehydration in infants with diarrhea . In terms of attitude, of the 65 respondents there were 32 respondents who had a positive attitude towards the provision of oral rehydration in infants with diarrhea and 33 respondents (51%) who had a negative attitude towards the provision of oral rehydration in infants with diarrhea, and in terms of action, of the 65 respondents there were 23 respondents (35%) who had good action on the provision of oral rehydration in infants with diarrhea and 42 respondents (65%) who had a poor attitude towards the provision of oral rehydration in infants with diarrhea.

The hope for the mother to see more information by reading, following counseling, or discussions with health workers to be able to apply his knowledge of the administration of oral rehydration in infants with diarrhea.

Bibliography : 38 literature (2000-2012)

Keywords: knowledge, attitudes, actions, oral rehydration, diarrhea

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakekat pembangunan nasional adalah membangun manusia seutuhnya dan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan di bidang kesehatan merupakan bagian dari program Pembangunan nasional dengan tujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal salah satunya adalah kesehatan pada balita.

Salah satu penyakit yang menyebabkan tingginya angka kematian pada anak adalah diare. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah menjadikan target dalam *MDG's (Millenium Development Goals)* ke-4 yaitu menurunkan angka kematian anak dari tahun 1990 menjadi 2/3 bagian sampai tahun 2015. Salah satu upaya menurunkannya adalah menekan kematian akibat diare. Selain itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam menurunkan angka kematian dan angka kesakitan karena diare, diantaranya adalah melaksanakan tatalaksana penderita diare sesuai standar, baik di sarana kesehatan maupun dalam rumah tangga, melaksanakan surveilans epidemiologi dan pengendalian kejadian luar biasa, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam pengelolaan program yang meliputi aspek manajerial dan teknis medis, dan melaksanakan evaluasi sebagai dasar perencanaan selanjutnya (Kemenkes RI, 2011).

Penyakit diare masih menjadi masalah besar kesehatan di seluruh dunia dan merupakan masalah utama kesehatan masyarakat yang menyebabkan tingginya

kesakitan dan kematian bayi dan balita. Penyakit ini berdampak negatif pada bayi dan balita diantaranya dehidrasi dan juga menghambat proses tumbuh kembang anak yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas hidup anak. Penyakit diare sering menyerang bayi dan balita, bila tidak diatasi lebih lanjut akan menyebabkan dehidrasi yang bisa mengakibatkan kematian.

Diare adalah buang air besar (defekasi) dengan jumlah tinja yang lebih banyak dari biasanya (normal 100-200 ml per jam tinja), dengan tinja berbentuk cairan atau setengah cair (setengah padat) dapat pula disertai frekuensi defekasi yang meningkat. Menurut *WHO (World Health Organization)* diare adalah buang air besar encer atau cair lebih dari 3 kali sehari.

Kurangnya pengetahuan bisa mempengaruhi perilaku seseorang termasuk perilaku di bidang kesehatan sehingga bisa menjadi penyebab tingginya angka penyebaran suatu penyakit termasuk penyakit diare yang mempunyai resiko penularan dan penyebaran cukup tinggi. Penyakit diare yang merupakan penyakit berbasis lingkungan juga dipengaruhi oleh keadaan kebersihan baik perorangan (*personal hygiene*) maupun kebersihan lingkungan perumahan, sanitasi yang baik dan memenuhi syarat kesehatan serta didukung oleh *personal hygiene* yang baik akan bisa mengurangi resiko munculnya suatu penyakit termasuk diantaranya penyakit diare. *Personal hygiene* dan sanitasi lingkungan perumahan yang baik bisa terwujud apabila didukung oleh perilaku masyarakat yang baik atau perilaku yang mendukung terhadap program-program pembangunan kesehatan termasuk program pemberantasan dan program penanggulangan penyakit diare (Sanusi, 2011).

Tindakan dalam pencegahan diare ini antara lain dengan perbaikan keadaan lingkungan, seperti penyediaan sumber air minum yang bersih, penggunaan jamban, pembuangan sampah pada tempatnya, sanitasi perumahan dan penyediaan tempat pembuangan air limbah yang layak. Perbaikan perilaku ibu terhadap balita seperti pemberian ASI sampai anak berumur 2 tahun, perbaikan cara menyapih, kebiasaan mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, membuang tinja anak pada tempat yang tepat, memberikan imunisasi morbilitas. Masyarakat dapat terhindar dari penyakit asalkan pengetahuan tentang kesehatan dapat ditingkatkan, sehingga perilaku dan keadaan lingkungan sosialnya menjadi sehat (Sudarianto, 2011).

Adanya kesepakatan Internasional untuk menurunkan angka kematian anak akibat diare menggunakan *Oral Rehydration Salts (ORS)*, merupakan solusi yang efektif dan harga terjangkau. Saat ini hanya 39% anak-anak dengan diare di negara berkembang yang menerima *ORS*, diteruskan dengan tetap mendapatkan asupan ASI/makanan. Walaupun lebih dari 90% ibu mengetahui tentang paket oralit, hanya satu dari tiga anak yang menderita diare diberi oralit, hasil tersebut sama dengan temuan SDKI 2002-2003. Pada 30% anak yang diare diberi minuman lebih banyak, 22% diberi Larutan Gula Garam (LGG), dan 61% diberi sirup/pil, sementara 14% diberi obat tradisional atau lainnya. Sedangkan 17% anak yang menderita diare tidak mendapatkan pengobatan sama sekali (Kemenkes RI, 2011).

Meskipun pemerintah dan petugas kesehatan sudah mencanangkan tatalaksana diare sesuai perkembangan terbaru, praktek di lapangan ternyata masih jauh dari harapan. Sebuah survey menunjukkan bahwa lebih dari setengah populasi anak dengan diare justru tidak diberi oralit, dan hanya sebagian kecil diberikan cairan dengan jumlah yang lebih dari biasanya. Bahkan proporsi yang diberi cairan dan makanan dengan jumlah sama seperti sebelum sakit tidak mencapai setengah. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian cairan dan makanan dalam penanganan diare masih merupakan permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara tuntas.

Setiap tahun diperkirakan lebih dari satu milyar kasus diare dengan 3,3 juta kasus kematian di seluruh dunia. Diperkirakan angka kejadian di negara berkembang berkisar 3,5–7 episode per anak pertahun dalam 2 tahun pertama kehidupan dan 2–5 episode per anak per tahun dalam 5 tahun pertama kehidupan. Pada orang dewasa, diperkirakan setiap tahunnya mengalami diare akut atau gastroenteritis akut sebanyak 99.000.000 kasus.

Data dari *United Nation's children Fund (UNICEF)* dan *World Health Organization (WHO)* pada tahun 2009, diare merupakan penyebab kematian nomor 2 pada balita di dunia. Data *UNICEF* memberitakan bahwa 1,5 juta anak meninggal dunia setiap tahunnya karena diare (Raulito, 2010).

Di Amerika Serikat, diperkirakan 8.000.000 pasien berobat ke dokter dan lebih dari 250.000 pasien dirawat di Rumah Sakit tiap tahun yang disebabkan karena diare atau gastroenteritis. Kematian yang terjadi, kebanyakan berhubungan dengan kejadian diare pada anak-anak atau lansia, dimana kesehatan pada usia pasien tersebut rentan terhadap dehidrasi sedang sampai berat.

Data dari Morbiditas Diare Kementerian Kesehatan tahun 2010 dalam Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, kejadian diare juga mempunyai *trend* yang semakin naik pada periode tahun 1996-2006. Sedangkan dari tahun 2006 sampai 2010, terjadi sedikit penurunan angka kesakitan, yaitu dari 423 menjadi 411 per 1000 penduduk. Dari data tersebut proporsi untuk penderita diare pada bayi dan balita masih menempati proporsi terbesar yaitu 179 orang (Depkes, 2009).

Hasil survei yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan, diperoleh angka kesakitan diare tahun 2000 sebesar 301 per 1000 penduduk angka ini meningkat bila dibanding survei pada tahun 1996 sebesar 280 per 1000 penduduk. Diare masih merupakan penyebab utama kematian bayi dan balita. Diare pada anak merupakan penyakit yang mahal yang berhubungan secara langsung atau tidak terdapat pembiayaan dalam masyarakat (Putra, 2010). Di Indonesia sekitar 162 ribu balita meninggal setiap tahun atau sekitar 460 balita meninggal setiap harinya akibat diare (Raulito, 2010).

Data dari Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), diare menempati kisaran urutan ke-2 dan ke-3 berbagai penyebab kematian bayi di Indonesia. Sebagian besar diare akut disebabkan oleh infeksi. Banyak dampak yang terjadi karena infeksi saluran cerna antara lain pengeluaran toksin yang dapat menimbulkan gangguan sekresi dan reabsorpsi cairan dan elektrolit dengan akibat dehidrasi, gangguan keseimbangan elektrolit dan keseimbangan asam basa. Invasi dan destruksi sel epitel, penetrasi ke lamina propria serta kerusakan mikrovili dapat menimbulkan keadaan maldiges dan malabsorpsi. Bila tidak mendapatkan penanganan yang adekuat pada akhirnya dapat mengalami invasi sistemik. Hingga

tahun 2008, angka kematian bayi atau *Infant Mortality Rate (IMR)* di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 31,04/1000 kelahiran hidup artinya terdapat 31,04 bayi meninggal dalam setiap 1.000 kelahiran (Ulfah, 2009).

Profil Kesehatan Sulawesi Selatan tahun 2007, data yang diperoleh dari Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Makassar mengenai angka kesakitan masyarakat kota Makassar dilihat dari gambaran 10 penyakit utama untuk semua golongan umur, penyakit diare berada di urutan ke-4 yang memiliki penderita terbanyak yaitu 46.024 ribu penderita, tahun 2008 terdiri dari 45.929 kasus, 2009 45.014 kasus (Dinkes Sulsel, 2008). Tahun 2010, kota Makassar masih memiliki kasus diare tertinggi dengan jumlah kasus 56.625 kasus. Hingga saat ini jumlah pasien dengan penyakit diare pada tempat pelayanan kesehatan masih menduduki jumlah yang tinggi (Depkes, 2009).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Joko Irianto *et al* (analisis lanjut data SDKI, 1994) bahwa apabila pendidikan ibu lebih tinggi maka kejadian diare akan cenderung menurun, oleh Marisa Apriyanti *et al* (2009) menyatakan bahwa bayi yang cenderung diberikan ASI eksklusif maka semakin kecil kemungkinan bayi tersebut terkena diare, oleh Amiruddin *et al* (2007) menyatakan bahwa Sekitar 80% kematian diare terjadi pada anak dibawah usia 2 tahun. Diare merupakan salah satu penyebab kematian kedua terbesar pada balita, ketiga pada bayi serta kelima bagi semua umur.

Dengan melihat data-data tersebut di atas, dimana penderita diare lebih banyak dialami oleh bayi dan balita dan hingga saat ini masih memiliki angka kesakitan yang masih tinggi, serta adanya dukungan dari pemerintah tentang pemberian rehidrasi oral untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi dan balita dan hingga saat ini masih kurang diaplikasikan oleh masyarakat secara umum, maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Gambaran Sikap, Pengetahuan dan Tindakan Ibu Mengenai Pemberian Rehidrasi Oral pada Bayi yang Terkena Diare”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah peneliti adalah: bagaimana gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan ibu mengenai pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare di beberapa rumah sakit rujukan tahun 2012.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan ibu mengenai pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare di beberapa rumah sakit rujukan tahun 2012.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu mengenai pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare di beberapa rumah sakit rujukan.

- b. Untuk mengetahui gambaran sikap ibu mengenai pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare di beberapa rumah sakit rujukan.
- c. Untuk mengetahui gambaran tindakan ibu mengenai pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare di beberapa rumah sakit rujukan.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman untuk penulisan karya tulis selanjutnya khususnya jurusan kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Sebagai bahan bacaan dan sumber informasi bagi masyarakat pembaca mengenai pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare khususnya di beberapa rumah sakit rujukan.
3. Menambah wawasan dan keterampilan peneliti di bidang kesehatan khususnya tentang diare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan

1. Defenisi pengetahuan

Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan ini terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku seseorang (Notoatmodjo, 2005).

Dalam perspektif Islam, pengetahuan agama atau ilmu agama ialah pengetahuan yang diwahyukan, yaitu pengetahuan tentang Al-Quran dan hadits serta semua pengetahuan tentang isinya yang biasanya dikembangkan dalam tradisi Islam (Agustia, 2010).

2. Tingkat pengetahuan

a. Tahu (Know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dari keseluruhan bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu, tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata

kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya.

b. Memahami (Comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.

c. Aplikasi (Application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi disini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

d. Analisis (Analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.

e. *Sintesis (Shinthesis)*

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya, dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkas, dapat menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.

f. *Evaluasi (Evaluation)*

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian ini didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

B. Tinjauan Umum Tentang Sikap

1. *Definisi Sikap (Attitude)*

Kesiapan atau kesediaan seseorang untuk bertingkah laku atau memberi respons sesuatu, baik terhadap rangsangan positif ataupun rangsangan negatif dari suatu obyek rangsangan.

2. *Tingkat Sikap (Attitude)*

Tingkatan sikap (*Attitude*) terdiri dari beberapa bagian yaitu:

a. *Menerima (Receiving)*

Mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan

b. *Menanggapi (Responding)*

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan

c. *Menghargai (Valuing)*

Mengajak orang lain mengerjakan atau mendiskusikan masalah

d. *Bertanggung Jawab (Responsible)*

Mempunyai tanggung jawab terhadap sesuatu yang dipilihnya dengan segala resiko

C. Tinjauan Umum Tentang Tindakan

1. *Defenisi Tindakan atau Praktik (Practice)*

Tindakan adalah suatu perwujudan sikap dari informasi atau pengetahuan yang diterima

2. *Tingkatan Tindakan (Practice)*

a. *Persepsi (Perseption)*

Mengenal dan memilih berbagai obyek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil

b. *Praktik Terpimpin (Guided Response)*

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai dengan contoh

c. *Praktik Secara Mekanis (Mechanism)*

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan.

d. *Adopsi (Adoption)*

Suatu praktek atau tindakan yang sudah berkembang dengan baik

D. Tinjauan Umum tentang Diare

1. *Pengertian Diare*

- a. *World Health Organization (WHO)* mendefinisikan diare sebagai kejadian buang air besar dengan konsistensi lebih cair dari biasanya, dengan frekuensi 3 kali atau lebih selama 1 hari atau lebih (Soenarto, 2011).
- b. Diare adalah suatu kondisi dimana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering (biasanya tiga kali atau lebih) dalam satu hari (Aditama, 2011).
- c. Diare adalah defekasi encer lebih dari tiga kali sehari dengan atau tanpa darah dan lendir dalam tinja (Mansjoer, 2000).
- d. Diare adalah suatu penyakit dengan tanda-tanda adanya perubahan bentuk dan konsistensi dari tinja yang melembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi berak lebih dari biasanya (3 kali atau lebih dalam 1 hari) (Sudariato, 2011).
- e. Hipocrates mendefinisikan diare sebagai pengeluaran tinja yang tidak normal dan cair (Hassan, 2007).

2. *Klasifikasi Diare*

1. *Diare Akut*

Diare akut adalah diare yang berlangsung kurang dari 14 hari, sementara diare persisten atau diare kronis adalah diare yang berlangsung lebih dari 14 hari (Aditama, 2011).

Diare akut menurut Cohen adalah keluarnya buang air besar sekali atau lebih yang berbentuk cair dalam satu hari dan berlangsung kurang dari 14 hari. Menurut Noerasid diare akut ialah diare yang terjadi secara mendadak pada bayi dan anak yang sebelumnya sehat. Sedangkan *American Academy of Pediatrics (AAP)* mendefinisikan diare dengan karakteristik peningkatan frekuensi dan perubahan konsistensi, dapat disertai atau tanpa gejala dan tanda seperti mual, muntah, demam atau sakit perut yang berlangsung selama 3–7 hari (Putra, 2010).

Diare akut dapat ditandai dimana pada awalnya mendadak dan berlangsung singkat dalam beberapa jam atau hari dan berlangsung dalam waktu kurang dari dua minggu, dan disebut diare persisten bila berlangsung selama 2 sampai dengan 4 minggu. Bila berlangsung lebih dari 4 minggu disebut sebagai diare kronik.

2. *Diare Kronik*

Diare kronik adalah diare yang berlangsung lebih dari 15 hari. Diare persisten merupakan istilah yang dipakai di luar negeri yang menyatakan diare yang berlangsung 15-30 hari yang merupakan kelanjutan dari diare akut (peralihan antara diare akut dan kronik,

dimana lama diare kronik yaitu yang berlangsung lebih dari 30 hari). diare kronik dapat berakibat dari kondisi yang bermacam-macam termasuk infeksi, pengobatan, penyakit kronis, sindrom malabsorpsi, stress dan sindrom iritasi usus.

3. *Diare persisten*

Diare persisten adalah diare akut dengan atau tanpa disertai darah dan berlanjut sampai 14 hari atau lebih. Jika terdapat dehidrasi sedang atau berat, diare persisten diklasifikasikan berat. Jadi diare persisten adalah bagian dari diare kronik yang disebabkan oleh berbagai penyebab.

Menurut *WHO (World Health Organization)*, Diare persisten adalah diare yang berlangsung lebih dari 14 hari dimana infeksi adalah sebagai penyebabnya atau diare kronik yang disebabkan oleh infeksi (Putra, 2010).

Titik sentral patogenesis diare persisten adalah kerusakan mukosa usus yang pada tahap awal disebabkan oleh etiologi diare akut. Berbagai faktor resiko melalui interaksi timbal balik menyebabkan rehabilitasi kerusakan mukosa terhambat dan memperberat kerusakan. Faktor resiko tersebut adalah usia penderita, karena diare persisten ini umumnya terjadi pada tahun pertama kehidupan dimana pada saat itu pertumbuhan dan penambahan berat badan bayi berlangsung cepat. Berlanjutnya paparan etiologi diare akut seperti infeksi *Giardia* yang tidak terdeteksi dan infeksi *shigella* yang resisten ganda terhadap antibiotik dan infeksi sekunder karena munculnya *C. Defficile* akibat

terapi antibiotika. Infeksi oleh mikro organisme tertentu dapat menimbulkan bakteri tumbuh lampau yang menyebabkan kerusakan mukosa usus karena hasil metaboliknya yang bersifat toksik, sehingga terjadi gangguan penyerapan dan bakteri itu sendiri berkompetisi mendapatkan mikronutrien. Gangguan gizi yang terjadi sebelum sakit akan bertambah berat karena berkurangnya masukan selama diare dan bertambahnya kebutuhan serta kehilangan nutrien melalui usus. Gangguan gizi tidak hanya mencakup makronutrien tetapi juga mikronutrien seperti defisiensi Vitamin A dan *Zinc*. Faktor resiko lain berupa pemberian jenis makanan baru dan menghentikan pemberian makanan selama diare akut, menghentikan atau tidak memberikan ASI sebelum dan selama diare akut.

4. *Etiologi Diare*

Lebih dari 90% diare Akut disebabkan oleh infeksi. sedangkan 10% lainnya disebabkan oleh obat-obatan, bahan-bahan toksik, iskemik dan lainnya. Penyebab diare dapat digolongkan ke dalam beberapa faktor yaitu:

a. Faktor Infeksi

Diare dengan faktor infeksi biasanya akut dan disebabkan oleh virus. Diare yang terjadi pada bayi biasanya disebabkan oleh Rotavirus. Sebagian kejadian luar biasa disebabkan serotipe tertentu dari *Eschericia coli* dimana sebagian besar masyarakat tidak memiliki kekebalan terhadap bakteri tersebut. Dari faktor infeksi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- (1). Infeksi enteral yaitu infeksi saluran pencernaan yang merupakan penyebab utama diare pada anak. Infeksi enteral ini meliputi:
- (a). Infeksi bakteri: *Vibrio*, *E.coli*, *Salmonella*, *Shigella*, *Campylobacter*, *Yersinia*, *Aeromonas*.
 - (b). Infeksi virus: *Enterovirus* (*virus ECHO*, *Coxsackie*, *poliomyelitis*), *Adenovirus*, *Rotavirus*, *Astrovirus*.
 - (c). Infestasi parasit: Cacing, *Protozoa*, Jamur.
- (2). Infeksi parenteral yaitu infeksi dibagian tubuh lain di luar alat pencernaan, seperti Otitis Media Akut (OMA), *Tonsilofaringitis*, *Bronkopneumonia*, *Ensefalitis*. Keadaan ini terdapat terutama pada bayi dibawah 2 tahun.
- b. Faktor Malabsorpsi: Malabsorpsi karbohidrat (intoleransi laktosa), lemak, dan protein.
 - c. Faktor Makanan: makanan basi, beracun, alergi terhadap makanan.
 - d. Faktor Psikologi: rasa takut dan cemas.

5. Patofisiologi

Proses pencernaan dalam tubuh manusia merupakan suatu proses yang kompleks. Bahan makanan yang telah mengalami penguraian sebagian di dalam mulut, melalui tenggorokan (esofagus) masuk ke dalam lambung. Di sini kerja enzim amilase dalam air ludah dihentikan dengan adanya asam klorida yang dikeluarkan oleh lambung. Dalam keadaan normal bahan makanan tinggal untuk beberapa jam di dalam lambung, sementara asam klorida dan pepsin menguraikan protein dan karbohidrat yang terkandung

dalam zat makanan tersebut menjadi oligopeptida dan oligosakarida. Berbeda dari amilase dan enzim lainnya, pepsin bekerja dalam suasana sangat asam, pH 1,0-2,5 sesuai dengan kondisi asam dalam cairan lambung (Sujatmika, 2009).

Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan alat-alat pencernaan makanan. Alat-alat pencernaan makanan pada manusia adalah organ-organ tubuh yang berfungsi mencerna makanan yang kita makan. Alat pencernaan makanan dibedakan atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan.

1. Mulut

Makanan masuk ke dalam tubuh pertama kali melewati rongga mulut. Pada rongga mulut terdapat beberapa bagian yang berperan dalam proses pencernaan yakni gigi, lidah, dan kelenjar ludah.

2. Kerongkongan

Setelah makanan kita kunyah dalam mulut, makanan akan masuk menuju kerongkongan. Sebelum ke kerongkongan, pada pangkal tenggorokan (laring) terdapat bagian yang memiliki katup dinamakan epiglotis. Epiglotis berfungsi mengatur masuknya makanan dan udara ke dalam tubuh. Saat kita menelan makanan, laring bergerak ke atas sehingga tertutup oleh epiglotis dan tidak ada makanan yang masuk ke dalam batang tenggorokan (trakea). Namun, terkadang partikel kecil makanan atau air dapat masuk ke dalam laring atau trakea. Akibatnya, secara otomatis kita akan mengalami batuk atau tersedak.

Kerongkongan merupakan organ yang berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju lambung. Panjangnya sekitar 25 cm dan berbentuk tabung dengan diameter 2 cm. Dinding kerongkongan tersusun atas epitelium berlapis pipih. Selain itu, pada kerongkongan terdapat pula beberapa otot, yakni otot melingkar dan otot longitudinal. Apabila otot tersebut berkontraksi, kerongkongan akan bergerak. Gerakan demikian disebut gerak peristaltik. Gerak peristaltik pada kerongkongan ialah gerakan mendorong dan meremas-remas makanan menuju lambung. Gerakan ini terdiri atas fase kontraksi dan relaksasi.

3. Lambung

Makanan dari kerongkongan terdorong ke dalam lambung, akibat gerakan peristaltik seperti yang sudah dijelaskan di atas. Lambung diibaratkan seperti lambung yang bertugas untuk menyimpan makanan yang telah ditelan untuk sementara waktu. Otot-otot lambung bekerja dengan cara berkontraksi sehingga dapat menekan dan memeras makanan dalam lambung dan mencampurnya dengan getah pencernaan dalam lambung. Semakin lumat makanan yang masuk lambung, maka semakin cepat melintasi lambung. Jenis makanan lemak dan sayuran hijau akan lebih lama berada di dalam lambung sehingga orang akan merasa kenyang lebih lama. Makanan yang masuk pada lambung bertahan selama 2-5 jam. Makanan dalam lambung mengalami serangkaian proses kimiawi oleh getah lambung, sekitar 1–2 liter yang dihasilkan oleh 35 juta kelenjar,

antara lain HCl, enzim pepsin, enzim renin, lipase, mukus (lendir), dan faktor intrinsik.

4. Hati

Hati adalah alat yang besar, terletak di bawah sekat rongga badan dan mengisi sebagian besar bagian atas rongga perut sebelah kanan. Hati membuat empedu yang terkumpul dalam kantung empedu. Empedu tersebut menjadi kental karena airnya diserap kembali oleh dinding kantung empedu. Pada waktu tertentu, empedu dipompakan ke dalam usus dua belas jari melalui pipa empedu.

5. Kelenjar pankreas

Pankreas berada dalam lipatan duodenum, berbentuk huruf U yang rebah. Pada pankreas terdapat dua macam kelenjar, yaitu kelenjar endokrin menghasilkan hormon insulin, sedangkan kelenjar eksokrin menghasilkan getah pankreas (duktus pankreatikus) 1,5 liter per hari melalui dua saluran, yaitu duktus pankreatikus utama dan tambahan. Kedua saluran ini bermuara ke duodenum.

6. Usus halus

Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu:

- a. Duodenum (usus 12 jari) karena panjangnya sekitar 12 jari orang dewasa yang disejajarkan.
- b. Jejunum (usus kosong) karena pada orang yang telah meninggal bagian usus tersebut kosong.

- c. Ileum (usus penyerapan) karena pada bagian inilah zat-zat makanan diserap oleh tubuh.

Pencernaan di dalam intestinum juga dibantu oleh pankreas. Organ ini dapat berperan sebagai kelenjar endokrin dengan menghasilkan hormon insulin dan sebagai kelenjar eksokrin dengan menghasilkan getah pencernaan berupa tripsin, amilase, dan lipase


7. Usus besar

Usus besar pada umumnya terdiri atas usus besar *ascending* (menaik), *transvers* (melintang), *descending* (menurun), dan berakhir pada *rektum*, yaitu bagian berotot yang mengeluarkan kotoran melalui anus. Usus besar tidak memiliki villi sehingga tidak terjadi penyerapan sari-sari makanan, tetapi terjadi penyerapan air sehingga feses menjadi lebih padat. Pada kolon juga terjadi proses pembusukan sisa pencernaan (yang tidak dapat diserap usus halus) oleh bakteri *Escherichia coli* yang menghasilkan gas H_2S , NH_4 , indole, skatole, dan vitamin K (berperan dalam proses pembekuan darah).

8. Anus

Feses yang terkumpul dalam rektum dikeluarkan melalui saluran pengeluaran yang dinamakan anus. Proses pengeluaran feses lewat anus ini disebut proses defekasi. Pada anus terdapat otot sfingter anus yang berupa otot polos dan otot lurik. Masing-masing otot ini berturut-turut berada di dalam dan bagian luar lubang anus. Saat feses menyentuh dinding rektum, otot lurik terangsang melakukan proses defekasi.

Akibatnya, secara sadar kita akan mengejan (berkontraksi). Tindakan kita ini akan menjadikan otot polos mengendur, sehingga feses keluar dari tubuh (Sujatmika, 2009).



Gambar 2.1 Organ Pencernaan Manusia
(Sumber: Sujatmika, 2010)

Proses terjadinya diare dipengaruhi dua hal pokok, yaitu konsistensi feses dan motilitas usus, umumnya terjadi akibat pengaruh keduanya. Gangguan proses mekanik dan enzimatik, disertai gangguan mukosa yang mempengaruhi pertukaran air dan elektrolit, sehingga mempengaruhi konsistensi feses yang terbentuk. Peristaltik saluran cerna yang teratur akan mengakibatkan proses cerna secara enzimatik berjalan baik. Sedangkan peningkatan motilitas

berakibat terganggunya proses cerna secara enzimatik, yang akan mempengaruhi pola defekasi.

Adapun proses terjadinya peradangan biasanya disebabkan baik oleh virus maupun oleh bakteri pada traktus intestinalis. Pada diare infeksius secara umum terjadi pada usus besar dan pada ujung distal ileum. Dimanapun infeksi terjadi mukosa teriritasi secara luas, dan kecepatan ekskresinya menjadi sangat tinggi. Selain itu motilitas dinding usus biasanya meningkat berlipat ganda, akibatnya sejumlah besar cairan cukup untuk membuat agen infeksi tersapu ke arah anus dan pada saat yang sama gerakan pendorong yang kuat akan mendorong cairan ini ke depan. Ini merupakan mekanisme yang penting untuk membebaskan traktus intestinalis dari infeksi yang mengganggu. Untuk diare psikogenik atau emosional psikogenik, disebabkan oleh stimulasi berlebihan dari sistem saraf parasimpatis yang secara kuat mencetuskan baik motilitas maupun sekresi mukus berlebihan pada kolon distal.

Proses terjadinya diare yang disebabkan oleh infeksi Rotavirus yaitu, Rotavirus yang tidak ternetralkan oleh asam lambung akan masuk ke dalam bagian proksimal usus. Rotavirus kemudian akan masuk ke sel epitel dengan masa inkubasi 18-36 jam, dimana pada saat ini virus akan menghasilkan enterotoksin NSP-4. Enterotoksin ini akan menyebabkan kerusakan permukaan epitel pada vili, menurunkan sekresi enzim pencernaan usus halus, menurunkan aktivitas Na^+ kotransporter serta menstimulasi saraf enterik yang menyebabkan diare (Brooks, 2005).

Secara umum mekanisme dasar timbulnya diare, yaitu sebagai berikut:

a. Diare Osmotik

Diare osmotik disebabkan karena adanya faktor malabsorpsi akibat adanya gangguan absorpsi karbohidrat, lemak, atau protein dan tersering adalah malabsorpsi lemak.

b. Diare Sekretorik

Diare sekretorik disebabkan karena adanya gangguan transport akibat adanya perbedaan osmotik intralumen dengan mukosa yang besar sehingga terjadi penarikan cairan dan elektrolit ke dalam lumen usus dalam jumlah besar. Feses akan seperti air. Diare sekresi terbagi menjadi dua berdasarkan pengaruh puasa terhadap diare. Pertama diare sekresi yang dipengaruhi oleh keadaan puasa berhubungan dengan proses intralumen, dan diakibatkan oleh:

1. Bahan-bahan yang tidak dapat diabsorpsi seperti obat-obatan dengan unsur magnesium tinggi misalnya antasid, multivitamin dan mineral, serta obat-obatan yang bersifat laksatif.
2. Malabsorpsi karbohidrat.
3. Defisiensi laktosa yang mengakibatkan intoleransi laktosa.

Kedua, diare cair yang tidak dipengaruhi oleh keadaan puasa terdapat pada sindrom karsinoid *VIP* (*vasoactive intestinal polypeptide*), karsinoma tiroid medular, adenoma vilosa, dan diare diabetik. Diare yang disebabkan oleh penyakit tersebut dihubungkan dengan proses hormonal dan neurogen yang berpengaruh terhadap motilitas.

c. Diare Inflamasi

Diare inflamasi disebabkan oleh kematian dan kerusakan enterosit disertai peradangan serta feses berdarah. Diare ini paling sering ditemukan. Pada pemeriksaan tinja biasanya didapatkan sel-sel eritrosit dan leukosit.

6. *Gejala Klinis*

Walaupun didefinisikan sebagai peningkatan frekuensi kerja usus, gejala ini sangat subjektif. Mungkin ditemukan BAB, tetapi feses sedikit-sedikit (khas infeksi usus besar) atau feses berjumlah banyak tetapi tidak berulang kali (infeksi usus halus). Feses dapat disertai darah jika terdapat destruksi mukosa usus, atau memiliki konsistensi berlemak dan bau yang menusuk hidung jika terdapat malabsorpsi. Selain itu dapat pula kita melihat secara langsung gejala klinis penderita diare, antara lain:

- a. Terdapat tanda-tanda dehidrasi, turgor kulit jelek (elastisitas kulit menurun), ubun-ubun dan mata cekung, membran mukosa kering
- b. Keram abdominal
- c. Mual dan muntah
- d. Anoreksia
- e. Lemah dan pucat
- f. Perubahan tanda-tanda vital, nadi dan pernafasan cepat
- g. Menurun atau tidak ada pengeluaran urine

Sebagai akibat dari kehilangan cairan dan elektrolit secara mendadak, dapat terjadi berbagai macam komplikasi, seperti:

1. Dehidrasi
2. Renjatan hipovolemik
3. Hipokalemia
4. Hipoglikemia
5. Intoleransi glukosa sekunder sebagai akibat defisiensi enzim laktase karena kerusakan vili mukosa usus halus
6. Kejang, terutama pada dehidrasi hipertonik
7. Malnutrisi energi protein, karena selain diare dan muntah, penderita juga mengalami kelaparan.

C. Tinjauan Umum Diare pada Bayi

1. Diare pada Bayi

Rotavirus merupakan penyebab utama diare dengan dehidrasi berat pada anak dibawah 5 tahun di seluruh dunia. Sebuah studi metanalisis yang dilakukan oleh Parashar *et al* (2009), menunjukkan bahwa infeksi rotavirus dapat menyebabkan 114 juta episode diare, 24 juta kunjungan rawat jalan, 2,4 juta kunjungan rawat inap dan 610.000 kematian balita pada tahun 2004. Diperkirakan 82% kematian akibat diare rotavirus terjadi pada negara berkembang, terutama di Asia dan Afrika, dimana akses kesehatan dan status gizi masih menjadi masalah (Soenarto, 2011).

Rotavirus menginfeksi sel dalam vili usus halus (mukosa lambung dan usus besar). Rotavirus ini berkembang biak dalam sitoplasma sel-sel usus dan merusak mekanisme transportnya. Sel-sel yang rusak terkelupas kemudian masuk ke dalam lumen usus dan melepaskan virus dalam

jumlah yang besar yang dapat tampak di feses. Diare yang disebabkan oleh rotavirus ini bisa terjadi karena kelemahan absorpsi natrium dan glukosa karena kerusakan sel-sel pada vili (Brooks, 2009). Bayi dikatakan diare apabila sudah lebih dari 3 kali buang air besar, sedangkan neonatus dikatakan diare apabila sudah lebih dari 4 kali buang air besar (Dewi, 2010).

2. Gejala Klinis Diare pada Bayi

Gejala klinis diare pada bayi adalah sebagai berikut:

- a. Bayi atau anak menjadi cengeng dan gelisah, suhu badan pun meningkat
- b. Tinja bayi encer, berlendir, atau berdarah
- c. Warna tinja kehijauan akibat bercampur dengan cairan empedu
- d. Anus lecet
- e. Gangguan gizi akibat intake (asupan) makanan yang kurang
- f. Penurunan berat badan

Tabel 2.2 Penurunan Berat Badan Bayi karena Dehidrasi

Tingkat dehidrasi	% kehilangan berat badan	
	Bayi	Anak besar
Dehidrasi ringan	5% (50 ml/kg)	3% (30 ml/kg)
Dehidrasi sedang	5-10% (50-100 ml/kg)	6% (60 ml/kg)
Dehidrasi berat	10-15% (100-150 ml/kg)	9% (90 ml/kg)

**Sumber: Asuhan Keperawatn Bayi dan Anak
(Nursalam 2005, 174)**

- g. Muntah sebelum dan sesudah diare
- h. Hipoglikemia (penurunan kadar gula darah)

i. Dehidrasi (kekurangan cairan)

Tabel 2.3 Derajat Dehidrasi

Gejala & Tanda	Keadaan Umum	Mata	Mulut & Lidah	Rasa Haus	Kulit	% penurunan BB	Estimasi defisiensi cairan
Tanpa Dehidrasi	Baik, Sadar	Normal	Basah	Minum Normal, Tidak Haus	Dicubit kembali cepat	< 5	50 %
Dehidrasi Ringan – Sedang	Gelisah Rewel	Cekung	Kering	Tampak Kehausan	Kembali lambat	5 – 10	50–100 %
Dehidrasi Berat	Letargik, Kesadaran Menurun	Sangat cekung dan kering	Sangat kering	Sulit, tidak bisa minum	Kembali sangat lambat	>10	>100 %

Sumber: Diare Akut pada Anak (Putra, 2010)

Berdasarkan konsentrasi Natrium plasma tipe dehidrasi dibagi 3 yaitu : dehidrasi hiponatremia (150 mEq/L). Pada umumnya dehidrasi yang terjadi adalah tipe iso–natremia (80%) tanpa disertai gangguan osmolalitas cairan tubuh, sisanya 15% adalah diare hipernatremia dan 5% adalah diare hiponatremia. Kehilangan bikarbonat bersama dengan diare dapat menimbulkan asidosis metabolik dengan anion gap yang normal (8-16 mEq/L), biasanya disertai hiperkloremia. Selain penurunan bikarbonat serum terdapat pula penurunan pH darah dan kenaikan pCO₂. Hal ini akan merangsang pusat pernapasan untuk meningkatkan kecepatan pernapasan sebagai upaya meningkatkan eksresi CO₂ melalui paru (pernapasan Kussmaul).

Untuk pemenuhan kebutuhan kalori terjadi pemecahan protein dan lemak yang mengakibatkan meningkatnya produksi asam sehingga menyebabkan

turunnya nafsu makan bayi. Keadaan dehidrasi berat dengan hipoperfusi ginjal serta ekskresi asam yang menurun dan akumulasi anion asam secara bersamaan menyebabkan berlanjutnya keadaan asidosis. Kadar kalium plasma dipengaruhi oleh keseimbangan asam basa, sehingga pada keadaan asidosis metabolik dapat terjadi hipokalemia. Kehilangan kalium juga melalui cairan tinja dan perpindahan K^+ ke dalam sel pada saat koreksi asidosis dapat pula menimbulkan hipokalemia. Kelemahan otot merupakan manifestasi awal dari hipokalemia, pertama kali pada otot anggota badan dan otot pernapasan. Dapat terjadi refleks, paralisis dan kematian karena kegagalan pernapasan. Disfungsi otot harus menimbulkan ileus paralitik, dan dilatasi lambung.

D. Tinjauan Khusus tentang Rehidrasi Oral

1. Pengertian Rehidrasi Oral

Garam Rehidrasi Oral (ORS) adalah minuman khusus yang terdiri dari kombinasi garam kering. Ketika dicampur dengan air matang dengan benar, maka minuman oralit dapat membantu *rehydrate* tubuh ketika kehilangan banyak cairan karena diare (Zareen, 2011).

Cairan Rehidrasi Oral (oralit) adalah campuran yang tepat dari air, garam dan gula. Penanganan awal sangat penting pada anak dengan diare adalah mencegah dan mengatasi keadaan dehidrasi. Pemberian cairan pengganti (cairan rehidrasi) baik yang diberikan secara oral (diminumkan) maupun parenteral (melalui infus) telah berhasil menurunkan angka kematian akibat dehidrasi pada ribuan anak yang menderita diare.

Oralit merupakan cairan rehidrasi oral (CRO) yang mengandung elektrolit (Na, K, Cl, HCO₃) dan glukosa yang telah terbukti dapat mengganti kehilangan cairan secara efektif pada penderita dehidrasi (IDAI, 2009).

2. Cara Pembuatan Rehidrasi Oral

a. Membuat larutan rehidrasi oral dengan bahan yang tersedia di rumah

Pembuatan rehidrasi oral dapat dibuat sendiri dengan resep yaitu:

- 1) 1 sendok teh garam
- 2) 8 sendok teh gula
- 3) 5 gelas air minum

Aduk sampai garam dan gula larut, larutan tersebut sudah selesai dan dapat diberikan pada penderita diare (Koo, 2008).

b. Membuat larutan rehidrasi oral dari paket oralit yang telah tersedia

- (1). Sediakan paket oralit seperti gambar di bawah
- (2). Masukkan isi dari paket oralit ke dalam wadah yang bersih
- (3). Perhatikan pada kemasan tentang jumlah penambahan air yang benar pada paket oralit tersebut. Apabila penambahan air terlalu sedikit maka bisa membuat diare lebih buruk.
- (4). Tambahkan air saja, jangan mencampurkan dengan cairan lainnya seperti jus, susu, sup, dan minuman ringan lainnya.
- (5). Aduk hingga rata kemudian berikan pada penderita diare



Gambar 2.4 Langkah-Langkah Pembuatan Cairan Rehidrasi Oral (Sumber: Zareen, 2011)

3. *Cara Pemberian Rehidrasi Oral*

Secara umum penanganan diare akut ditujukan untuk mencegah atau menanggulangi dehidrasi serta gangguan keseimbangan elektrolit dan asam basa, kemungkinan terjadinya intoleransi, mengobati penyebab diare yang spesifik, mencegah dan menanggulangi gangguan gizi serta mengobati penyakit yang menyertai diare. Untuk melaksanakan terapi diare secara komprehensif, efisien, dan efektif harus dilakukan secara rasional. Pemakaian cairan rehidrasi oral secara umum efektif dalam mengoreksi dehidrasi.

Menurut *WHO (World Health Organization)*, pengobatan dengan oralit merupakan penemuan terbesar pada zaman ini. Tetapi banyak dokter dan pasien tidak sadar untuk memakai obat sederhana ini. Hal ini disebabkan karena oralit tidak langsung dirasakan manfaatnya untuk menghentikan diare dan malah dapat menginduksi muntah. Semua ini terjadi karena *WHO, UNICEF*, dan Departemen Kesehatan tidak memberikan informasi tentang cara pemakaian oralit yang benar. Bila oralit dicampur 1 sachet dalam segelas (200 cc) air dan diteguk sekaligus maka penderita akan mudah untuk muntah dan terasa ingin buang air besar lagi. Cara minum oralit ini adalah salah. Yang benar ialah bahwa larutan oralit harus diteguk sedikit demi sedikit, 2-3 teguk dan berhenti 3 menit untuk memberi kesempatan oralit diserap oleh usus dan menggantikan garam dan cairan yang hilang dalam feses. Prosedur ini harus diulang terus menerus sampai 1 gelas habis. Bila diare masih berlanjut maka minum oralit harus diteruskan sampai beberapa bungkus/gelas (3-8) sehari. Tindakan ini biasanya akan menghentikan diare dengan cepat dan efisien.

Pemberian rehidrasi oral diharapkan dapat menggantikan cairan dan elektrolit yang telah hilang akibat diare dan muntah. Dehidrasi disebabkan oleh hilangnya cairan tubuh, yang terdiri dari air dan garam. Ketika anak sakit diare atau muntah, mereka bisa kehilangan sejumlah besar garam dan air dari tubuh mereka dan dapat menjadi dehidrasi sangat cepat. Dehidrasi bisa sangat berbahaya, terutama pada bayi dan balita. Anak bahkan bisa

meninggal jika tidak ditangani dengan tepat. Tanda dehidrasi pada bayi yaitu:

- a. Frekuensi buang air kecil (kurang dari 4 popok basah dalam 24 jam)
- b. Rasa haus meningkat
- c. tidak ada air mata
- d. kulit, mulut dan lidah kering
- e. jantung berdetak lebih cepat
- f. mata cekung
- g. kulit keabu-abuan
- h. soft spot (fontanel) cekung pada kepala bayi

Jumlah larutan rehidrasi oral yang diberikan kepada bayi atau balita didasarkan pada usia mereka, sebagai berikut:

1. 0 sampai 6 bulan: 30 ml sampai 90 ml setiap jam
2. 6 sampai 24 bulan: 90 ml sampai 125 ml setiap jam
3. 2 tahun dan lebih : 125 ml sampai 250 ml setiap jam

Akan tetapi, harus diketahui bahwa pemberian rehidrasi oral harus pula disesuaikan dengan derajat dehidrasi yang dialami oleh penderita agar pemberian rehidrasi oral sesuai kebutuhannya. Diare dengan dehidrasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.5 Klasifikasi Diare disertai Dehidrasi

Klasifikasi diare disertai dehidrasi	Tanda/gejala yang tampak
Diare dengan dehidrasi berat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Letargis atau tidak sadar 2. Mata cekung 3. Tidak bisa minum atau malas minum 4. Cubitan kulit perut kembalinya sangat lambat
Diare dengan dehidrasi ringan/sedang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gelisah, rewel, dan mudah marah 2. Mata cekung 3. Haus, minum dengan lahap 4. Cubitan kulit perut kembalinya lambat
Diare tanpa dehidrasi	Tidak ada tanda-tanda untuk diklasifikasikan sebagai dehidrasi berat atau sedang/ringan

Sumber: Asuhan Keperawatan Bayi dan Anak (Nursalam 2005, 176)

Tabel 2.6 Pedoman Tata Laksana Diare Akut berdasarkan derajat dehidrasi

Derajat dehidrasi % deficit	Rehidrasi	Penggantian cairan
Tanpa dehidrasi (<5% BB)	Tidak perlu	10 ml/kg tiap diare 2-5 ml/kg tiap muntah
Ringan sedang (5-10% BB)	CRO 75 ml/kg/3 jam	10 ml/kg tiap diare 2-5 ml/kg tiap muntah
Berat (>10% BB)	Cairan intravena <12 bulan: 30 ml/kg/1 jam atau 70 ml/kg/5 jam	10 ml/kg tiap diare 2-5 ml/kg tiap muntah

Ket: BB=berat badan, CRO=cairan rehidrasi oral

(Sumber: Penggunaan Probiotik Sebagai Terapi Diare Akut pada Anak, Dina 2010)

a. Dehidrasi Ringan – Sedang

Rehidrasi pada dehidrasi ringan dan sedang dapat dilakukan dengan pemberian oral sesuai dengan defisit yang terjadi namun jika gagal dapat diberikan secara intravena sebanyak: 75 ml/kg bb/3jam. Pemberian cairan oral dapat dilakukan setelah anak dapat minum sebanyak 5ml/kgbb/jam. Biasanya dapat dilakukan setelah 3-4 jam pada bayi dan 1-2 jam pada anak. Penggantian cairan bila masih ada diare atau muntah dapat diberikan sebanyak 10ml/kgbb setiap diare atau muntah. Secara ringkas kelompok ahli Gastroenterologi dunia memberikan 9 pilar yang perlu diperhatikan dalam penatalaksanaan diare akut dehidrasi ringan sedang pada anak, yaitu:

1. Menggunakan CRO (Cairan rehidrasi oral)
2. Cairan hipotonik
3. Rehidrasi oral cepat 3–4 jam
4. Realiminasi cepat dengan makanan normal
5. Tidak dibenarkan memberikan susu formula khusus
6. Tidak dibenarkan memberikan susu yang diencerkan
7. ASI diteruskan
8. Suplemen dengan CRO (cairan rehidrasi oral rumatan)
9. Anti diare tidak diperlukan

b. Dehidrasi Berat

Penderita dengan dehidrasi berat, yaitu dehidrasi lebih dari 10% untuk bayi dan anak dan menunjukkan gangguan tanda-tanda vital tubuh (somnia-koma, pernafasan Kussmaul, gangguan dinamik sirkulasi) memerlukan pemberian cairan elektrolit parenteral. Penggantian cairan parenteral menurut panduan *WHO* diberikan sebagai berikut:

Usia <12 bln: 30ml/kgbb/1jam, selanjutnya 70ml/kgbb/5jam

Usia >12 bln: 30ml/kgbb/1/2-1jam, selanjutnya 70ml/kgbb/2-2½ jam.

Walaupun pada diare terapi cairan parenteral tidak cukup bagi kebutuhan penderita akan kalori, namun hal ini tidaklah menjadi masalah besar karena hanya menyangkut waktu yang pendek. Apabila penderita telah kembali diberikan diet sebagaimana biasanya. Segala kekurangan tubuh akan karbohidrat, lemak dan protein akan segera dapat dipenuhi. Itulah sebabnya mengapa pada pemberian terapi cairan diusahakan agar penderita bila memungkinkan cepat mendapatkan makanan atau minuman sebagai pengganti cairan yang hilang, bahkan pada dehidrasi ringan-sedang yang tidak memerlukan terapi cairan parenteral makan dan minum tetap dapat dilanjutkan.

E. Tinjauan Islam tentang Diare

Islam merupakan agama yang sempurna karena didalamnya mencakup segala aspek kehidupan. Segala yang diciptakan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* di muka bumi ini memiliki manfaat baik dalam bidang Kesehatan, Pendidikan,

Teknologi, dan lainnya. Kita dapat memanfaatkan ciptaan-Nya sebagai obat untuk mengobati berbagai penyakit. Salah satunya adalah penyakit diare. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam Q.S. An-Nahl/16: 69

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Rabb-mu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Rabb) bagi orang-orang yang memikirkan”.

Sejak zaman Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* penyakit ini sudah ada, sebagaimana dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri *Radhiallahu Anhu*

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ. فَقَالَ: إِسْقِهِ عَسَلًا. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: إِسْقِهِ صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَّبَ بَطْنُ أَخِيكَ، إِسْقِهِ عَسَلًا. : عَسَلًا. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: إِسْقِهِ عَسَلًا. ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: فَعَلْتُ. فَقَالَ فَسَقَاهُ قَبْرًا

*“Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dan berkata: “saudara saya sakit perut dan terkena diare” Rasulullah menjawab: “Beri ia madu!” kemudian orang itu datang lagi untuk kedua kalinya, Rasulullah berkata lagi: “Beri ia madu!”, kemudian orang itu datang lagi untuk ketiga kalinya. Rasul berkata lagi :”Beri ia madu!” kemudian orang itu datang lagi dan berkata, “saya telah melakukannya”. Rasulullah menjawab: “Tuhan benar perut saudaramu yang bohong. Beri ia madu!” setelah itu diberikannya lagi madu kepada saudaranya, dan sembuhlah penyakitnya” (HR. Bukhari).*

Beberapa ahli ilmu kedokteran mengatakan: “di dalam perut manusia terdapat banyak endapan sisa-sisa makanan, setelah diberi asupan madu, yang memang madu itu panas, maka endapan kotoran terlepas dan segera terdorong keluar sehingga hal itu membuat perutnya bertambah sakit. Maka orang itu berpikir

bahwa madu itu hanya akan membahayakannya, padahal itu sangat bermanfaat bagi saudaranya tersebut. kemudian dia memberinya minum untuk kedua kalinya dan sakitnya semakin bertambah dan madu itu mendorong endapan kotoran kemudian dia memberinya madu untuk ketiga kalinya. Ketika madu itu semakin mendorong sisa-sisa makanan yang sudah rusak dan membahayakan bagi badan, perutnya bertahan dan tekanannya pun menjadi normal sehingga semua penyakit terdorong keluar berkat petunjuk Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* yang mendapat wahyu dari Rabb-Nya”(Tafsir Ibnu Katsir).

Hadis di atas adalah benar kenyataannya di zaman ini, sedikit demi sedikit kebenaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah terungkap dan mempunyai korelasi positif terhadap kesehatan manusia. Di dunia Islam, penggunaan madu sebagai obat sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Pada saat itu, madu digunakan untuk mengobati penyakit diare. Madu memang telah diakui dan dari pandangan Islam sendiri ia merupakan penawar berbagai penyakit. Khasiat madu amat berkaitan dengan kandungan gulanya yang tinggi. Yakni fruktosa 41%, glukosa 35%, dan sukrosa 1,9%. Serta unsur kandungan lainnya, seperti tepung sari ditambah berbagai enzim pencernaan. Selain itu madu juga mengandung vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, antibiotika, dan lainnya. Meski sama manisnya, perlakuan tubuh manusia terhadap madu yang manis ini berbeda dibandingkan dengan gula. Madu dapat diproses langsung menjadi glukogen, sedangkan gula harus diproses terlebih dulu oleh enzim pencernaan di usus. Dengan demikian tubuh manusia bisa lebih cepat merasakan manfaat madu dibandingkan dengan gula. Dalam penelitian ini

dilakukan penelitian tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang menderita diare yang bertujuan untuk mengatasi penyakit diare tersebut. Walaupun pada penelitian ini tidak menggunakan madu sebagai obat untuk mengatasi diare tersebut tetapi peneliti ingin mengetahui seberapa besar sumbangsih cairan rehidrasi oral dalam mengatasi diare. Hal ini merupakan bagian dari usaha dalam memanfaatkan ciptaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* untuk dijadikan sebagai penawar penyakit bagi manusia.

F. Kerangka Konsep

1. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian


Penelitian yang dilakukan terdapat dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen merupakan variabel terpengaruh oleh adanya variabel independen. Sedangkan variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah pemberian Rehidrasi Oral dan yang menjadi variabel independen adalah pengetahuan, sikap, dan tindakan ibu mengenai pemberian Rehidrasi Oral.


2. Skema Kerangka Konsep




Keterangan:



: Variabel Dependen



: Variabel Independen



: Variabel yang diteliti

3. *Definisi Operasional dan Kriteria Objektif*

a. *Pengetahuan*

Pengetahuan responden tentang pemberian rehidrasi oral adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden tentang arti pemberian rehidrasi oral berdasarkan pernyataan dalam kuesioner. Pengetahuan responden diukur melalui 8 pernyataan. Responden yang menjawab benar diberi skor 1 sedangkan yang menjawab salah diberi skor 0 sehingga skor tertinggi yang dapat dicapai responden adalah 8.

Kriteria Objektif:

Tahu :Jika responden mengetahui sebagian besar atau seluruhnya tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi. Skor jawaban responden $\geq 60\%$.

Tidak tahu :Jika responden mengetahui sebagian kecil tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi. Skor jawaban responden $< 60\%$.

b. Sikap

Sikap responden tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi adalah tanggapan atau reaksi responden dalam pemberian rehidrasi oral pada bayi berdasarkan pernyataan yang ada dalam kuesioner. Sikap responden diukur melalui 8 pernyataan. Responden yang menjawab benar diberi skor 1 sedangkan yang menjawab salah diberi skor 0 sehingga skor tertinggi yang dapat dicapai oleh responden adalah 8

Kriteria objektif:

Positif :Jika responden memiliki sikap yang baik terhadap sebagian besar atau seluruhnya tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi. Skor jawaban responden $\geq 60\%$.

Negatif :Jika responden memiliki sikap yang baik terhadap sebagian kecil tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi. Skor jawaban responden $< 60\%$.

c. Tindakan

Tindakan responden dalam pemberian rehidrasi oral pada bayi adalah segala sesuatu yang telah dilakukan responden sehubungan dengan pengetahuan dan sikap dalam pemberian rehidrasi oral pada bayi. Tindakan responden diukur melalui 8 pernyataan. Responden yang menjawab benar diberi skor 1 sedangkan yang menjawab salah

diberi skor 0 sehingga skor tertinggi yang dapat dicapai oleh responden adalah 8.

Kriteria Objektif:

Baik :Jika responden telah melakukan tindakan terhadap sebagian besar atau seluruhnya tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi. Skor jawaban responden $\geq 60\%$.

Kurang Baik :Jika responden telah melakukan terhadap sebagian kecil tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi. Skor jawaban responden $< 60\%$.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang pengetahuan, sikap dan tindakan ibu mengenai pemberian Rehidrasi Oral pada bayi yang terkena diare di beberapa rumah sakit rujukan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Gowa, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar, dan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama bulan Juni-Agustus 2012, Sedangkan pengambilan data telah dilakukan selama bulan Februari-Maret 2012.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek yang diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah semua ibu yang memiliki bayi yang menderita diare yang datang ke rumah sakit rujukan yang menjadi lokasi penelitian.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah sejumlah ibu dari bayi yang menderita diare yang ada pada saat

penelitian dan bersedia menjadi responden di Rumah Sakit Syekh Yusuf Gowa.

a. Kriteria inklusi

- (1.) Ibu yang memiliki bayi yang menderita diare
- (2.) Umur anak ibu yang menderita diare adalah 0-12 bulan
- (3.) Ibu yang bersedia menjadi responden dan mengisi kuesioner

b. Kriteria eksklusi

- (1.) Ibu yang tidak bersedia menjadi responden
- (2.) ibu yang memiliki balita diare

3. *Besar Sampel*

Jumlah sampel pada penelitian ini adalah sebagian dari jumlah populasi ibu dari bayi yang menderita diare di beberapa rumah sakit rujukan. Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

keterangan:

N = besar populasi

d = tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan

n = besar sampel (Notoatmodjo 2005,92)

N = 78

d = 0,05 → d² = 0,0025

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

$$n = \frac{78}{1 + 78 (0,0025)}$$

$$n = \frac{78}{1,195}$$

$$n = 65$$

D. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti, berdasarkan ciri atau sifa-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, informasi yang diperlukan didapatkan melalui data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara kunjungan ke lokasi penelitian dengan mewawancarai responden secara langsung untuk mengisi kuesioner. Kuesioner yang dibagikan berupa pernyataan yang menggali pengetahuan, sikap dan tindakan ibu mengenai pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare di beberapa rumah sakit rujukan.

F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Pengolahan data

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data selanjutnya diolah secara manual menggunakan kalkulator dengan rumus sebagai berikut:

$$S = R$$

Keterangan:

S = Skor yang diperoleh

R = Jawaban yang benar

2. Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan dengan cara deskriptif dengan melihat persentase data yang terkumpul dan disajikan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi kemudian dicari besarnya persentase jawaban masing-masing responden dan selanjutnya dilakukan pembahasan dengan menggunakan teori kepastakaan yang ada. Analisis data dilakukan dengan menggunakan rumus distribusi frekuensi sebagai berikut:

$$P = f/n \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase yang dicari

f = Frekuensi faktor variabel

n = Jumlah sampel

3. *Penyajian Data*

Penyajian data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Editing*

Memeriksa kembali kebenaran pengisian dengan tujuan agar data yang masuk dapat diolah secara benar sehingga pengolahan data dikelompokkan dengan menggunakan aspek pengaturan.

2. *Coding*

Pemberian nilai atau kode pada pilihan jawaban yang sudah lengkap, diberi skor (1) untuk jawaban yang benar dan skor (0) untuk jawaban yang salah.

3. *Tabulating*

Pengolahan dan penyajian data dalam bentuk tabel deskriptif sederhana. Bertujuan untuk mempermudah analisa data dan pengolahan data serta pengambilan kesimpulan, data dimasukkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

G. *Etika Penelitian*

Etika dalam penelitian kebidanan merupakan masalah yang sangat penting, mengingat dalam penelitian ini menggunakan manusia sebagai subjek. Dalam penelitian ini, menekankan pada masalah etika yang meliputi:

1. *Tanpa nama (Anonimity)*

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembaran kuesioner yang diisi oleh responden. Lembar tersebut hanya diberi kode tertentu.

2. *Kerahasiaan (Confidentiality)*

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden dijamin kerahasiaannya. Hanya kelompok data tertentu saja yang dilaporkan pada hasil penelitian.



BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa rumah sakit rujukan mulai tanggal 11 Juni-26 Agustus 2012, populasi ibu yang memiliki bayi menderita diare sebanyak 77 orang selama periode penelitian, pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 65 orang, dengan jumlah masing-masing lokasi penelitian yaitu, RSUD. Syekh Yusuf 30 responden, RSUD. Haji 13 orang, dan RSUD. Labuang Baji 22 orang. Adapun hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk grafik dengan hasil sebagai berikut:

Grafik 4.1

Grafik Gambaran Pengetahuan Ibu Mengenai Pemberian Rehidrasi Oral pada Bayi yang Terkena Diare di Beberapa Rumah Sakit Rujukan Tahun 2012




Sumber : Data Kuesioner dan Wawancara

Grafik 4.1 menunjukkan bahwa dari 30 responden di RSUD. Syekh Yusuf terdapat 28 responden (93%) yang tahu tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dan 2 responden (7%) yang tidak tahu tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare. Di RSUD. Haji dari 13

responden terdapat 12 responden (92%) yang tahu tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dan 1 responden (8%) yang tidak tahu tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare. Di RSUD. Labuang Baji dari 22 responden terdapat 17 responden (77%) yang tahu tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dan 5 responden (23%) yang tidak tahu tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare. Dari tiga rumah sakit rujukan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden di RSUD. Syekh Yusuf tahu tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dibandingkan dengan RSUD. Haji dan RSUD. Labuang Baji dan secara umum dari tiga rumah sakit rujukan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden (88%) tahu tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dan sebagian kecil responden (12%) tidak tahu tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare .

Grafik 4.2


Grafik Gambaran Sikap Ibu Mengenai Pemberian Rehidrasi Oral pada Bayi yang Terkena Diare di Beberapa Rumah Sakit Rujukan Tahun 2012



Sumber : Data Kuesioner dan Wawancara

Grafik 4.2 menunjukkan bahwa dari 30 responden di RSUD. Syekh Yusuf terdapat 21 responden (70%) yang memiliki sikap positif tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dan 9 responden (30%) yang memiliki sikap negatif tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare. Di RSUD. Haji dari 13 responden terdapat responden 3 (23%) yang memiliki sikap positif tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dan 10 responden (77%) yang memiliki sikap negatif tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare. Di RSUD. Labuang Baji dari 22 responden terdapat 8 responden (36%) yang memiliki sikap positif tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dan 14 responden (64%) yang memiliki sikap negatif tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden di RSUD. Syekh Yusuf memiliki sikap positif dibandingkan responden di RSUD. Haji dan RSUD. Labuang Baji. Sedangkan dari tiga rumah sakit rujukan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden (51%) masih memiliki sikap negatif tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dan sebagian kecil responden (49%) memiliki sikap positif tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare.

Grafik 4.3
Grafik Gambaran Tindakan Ibu Mengenai Pemberian Rehidrasi Oral pada Bayi yang Terkena Diare di Beberapa Rumah Sakit Rujukan Tahun 2012



Sumber : Data Kuesioner dan Wawancara

Grafik 4.3 menunjukkan bahwa dari 30 responden di RSUD. Syekh Yusuf terdapat 21 responden (70%) yang memiliki tindakan baik tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dan 9 responden (30%) yang memiliki tindakan kurang baik tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare. Di RSUD. Haji terdapat 0 responden (0%) yang memiliki tindakan baik tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dan 13 responden (100%) yang memiliki tindakan kurang baik tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare. Di RSUD. Labuang Baji terdapat 2 responden (9%) yang memiliki tindakan baik tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dan 20 responden (91%) yang memiliki tindakan kurang baik tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa sebagian responden di RSUD. Syekh Yusuf memiliki tindakan baik tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dibandingkan responden di RSUD.

Haji dan RSUD. Labuang Baji dan semua responden di RSUD. Haji memiliki tindakan kurang baik tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare. Sedangkan dari tiga rumah sakit rujukan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden (65%) masih memiliki tindakan kurang baik tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dan sebagian kecil responden (35%) memiliki tindakan baik tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare.

Selain digambarkan dalam bentuk grafik, hasil penelitian ini juga dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut:

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Gambaran Pengetahuan Ibu Mengenai Pemberian Rehidrasi Oral pada Bayi yang Terkena Diare di Beberapa Rumah Sakit Rujukan Tahun 2012

Pengetahuan	RSU. Syekh Yusuf		RSU. Haji		RSU. Labuang Baji		Total	
	f	P (%)	F	P (%)	F	P (%)	f	P (%)
Tahu	28	93	12	92	17	77	57	88
Tidak tahu	2	7	1	8	5	23	8	12
Jumlah (n)	30	100	13	100	22	100	65	100,0

Sumber : Data Kuesioner dan Wawancara

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 30 responden di RSUD. Syekh Yusuf terdapat 28 responden (93%) yang tahu tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dan 2 responden (7%) yang tidak tahu tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare. Di RSUD. Haji dari 13 responden terdapat 12 responden (92%) yang tahu tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dan 1 responden (8%) yang tidak tahu tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare. Di RSUD.

Labuang Baji dari 22 responden terdapat 17 responden (77%) yang tahu tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dan 5 responden (23%) yang tidak tahu tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare.

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Gambaran Sikap Ibu Mengenai Pemberian Rehidrasi Oral pada Bayi yang Terkena Diare di Beberapa Rumah Sakit Rujukan Tahun 2012

Sikap	RSU. Syekh Yusuf		RSU. Haji		RSU. Labuang Baji		Total	
	f	P (%)	f	P (%)	f	P (%)	f	P (%)
Positif	21	70	3	23	8	36	32	49
Negatif	9	30	10	77	14	64	33	51
Jumlah (n)	30	100	13	100	22	100	65	100,0

Sumber : Data Kuesioner dan Wawancara

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 30 responden di RSUD. Syekh Yusuf terdapat 21 responden (70%) yang memiliki sikap positif tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dan 9 responden (30%) yang memiliki sikap negatif tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare. Di RSUD. Haji dari 13 responden terdapat responden 3 (23%) yang memiliki sikap positif tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dan 10 responden (77%) yang memiliki sikap negatif tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare. Di RSUD. Labuang Baji dari 22 responden terdapat 8 responden (36%) yang memiliki sikap positif tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dan 14

responden (64%) yang memiliki sikap negatif tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare.

Tabel 4.6
Frekuensi Gambaran Tindakan Ibu Mengenai Pemberian Rehidrasi Oral pada Bayi yang Terkena Diare di Beberapa Rumah Sakit Rujukan Tahun 2012

Tindakan	RSU. Syekh Yusuf		RSU. Haji		RSU. Labuang Baji		Total	
	f	P (%)	f	P (%)	f	P (%)	f	P (%)
Baik	21	70	0	87	2	9	23	35
Kurang baik	9	30	13	13	20	91	42	65
Jumlah (n)	30	100	13	100	22	100	65	100,0

Sumber : Data Kuesioner dan Wawancara

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 30 responden di RSUD. Syekh Yusuf terdapat 21 responden (70%) yang memiliki tindakan baik tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dan 9 responden (30%) yang memiliki tindakan kurang baik tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare. Di RSUD. Haji terdapat responden 0 (0%) yang memiliki tindakan baik tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dan 13 responden (100%) yang memiliki tindakan kurang baik tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare. Di RSUD. Labuang Baji terdapat 2 responden (9%) yang memiliki tindakan baik tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare dan 20 responden (91%) yang memiliki tindakan kurang baik tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare.

B. Pembahasan

Setelah dilakukan pengolahan dan penyajian data beserta hasilnya, selanjutnya akan dilakukan pembahasan sesuai dengan variabel yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan

Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui. Pengetahuan seseorang dapat diukur melalui beberapa tingkatan, diantaranya tahu, memahami, dan aplikasi. Meskipun tahu merupakan tingkatan pengalaman yang paling rendah, namun pengetahuan atau kognitif berperan penting dalam membentuk sikap/perilaku dan tindakan seseorang (Notoadmodjo, 2005). Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indera atau akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Atau dengan pengertian lain bahwa pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah pendidikan, pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain terhadap suatu hal agar mereka dapat memahami. Tidak dapat dipungkiri bahwa makin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka menerima informasi, dan pada akhirnya makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya, jika seseorang tingkat pendidikannya rendah, akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap penerimaan, informasi dan nilai-nilai yang baru diperkenalkan. Selain pendidikan pengetahuan juga

dipengaruhi oleh informasi, kemudahan memperoleh informasi dapat membantu mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan yang baru (Satria, 2008).

Fungsi pengetahuan ini membantu individu untuk memahami dunia yang membawa keteraturan terhadap bermacam-macam informasi yang perlu diasimilasikan dalam kehidupan sehari-hari. setiap individu memiliki motif untuk ingin tahu, ingin mengerti, dan ingin banyak mendapat pengalaman dan pengetahuan. Pemberian Cairan Rehidrasi Oral pada Bayi yang Terkena Diare adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh bayi saat ia menderita diare, untuk menghindari terjadinya dehidrasi selama ia menderita diare. Pemberian Cairan Rehidrasi Oral merupakan suatu bentuk perilaku ibu dalam menatalaksana anaknya saat terkena diare, dimana pengetahuan juga sangat berpengaruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 65 ibu yang memiliki anak menderita diare, terdapat 57 responden (88%) yang tahu tentang pemberian cairan rehidrasi oral, dan 8 responden (12%) yang tidak tahu tentang pemberian cairan rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare. Hal ini berarti bahwa sebagian besar ibu telah mengetahui tentang segala hal yang berkaitan dengan pemberian cairan rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare. Meskipun demikian, masih ada beberapa ibu yang tidak mengetahui tentang pemberian cairan rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare karena kurangnya penyuluhan kesehatan tentang pemberian rehidrasi oral ini kepada masyarakat.

2. Sikap

Sikap adalah suatu sindroma atau kumpulan gejala dalam merespons stimulus/objek, sehingga sikap melibatkan pikiran, perasaan, keyakinan, emosi dan perhatian. Sikap juga merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Proses pembentukan sikap berlangsung secara bertahap, dimulai dari proses belajar. Proses belajar ini dapat terjadi karena pengalaman-pengalaman pribadi seseorang dengan objek tertentu, seperti orang, benda atau peristiwa, dengan cara menghubungkan objek tersebut dengan pengalaman-pengalaman lain dimana seseorang telah memiliki sikap tertentu terhadap pengalaman itu atau melalui proses belajar sosial dengan orang lain. Beberapa Faktor yang mempengaruhi sikap, yaitu:

1. Pengalaman pribadi, apa yang telah dan sedang kita alami akan ikut membentuk dan mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus sosial. Tanggapan akan menjadi salah satu dasar terbentuknya sikap. Untuk dapat mempunyai tanggapan dan penghayatan, seseorang harus mempunyai pengalaman yang berkaitan dengan obyek psikologis yang akan membentuk sikap positif dan sikap negatif. Pembentukan tanggapan terhadap obyek merupakan proses kompleks dalam diri individu yang melibatkan individu yang bersangkutan, situasi dimana tanggapan itu terbentuk, dan ciri-ciri obyektif yang dimiliki oleh stimulus. Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi haruslah meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan

lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional. Dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan akan pengalaman akan lebih mendalam dan lebih lama berbekas.

2. Pengaruh Orang Lain yang Dianggap Penting, orang lain di sekitar kita merupakan salah satu diantara komponen sosial yang ikut mempengaruhi sikap kita. Seseorang yang kita anggap penting akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap kita terhadap sesuatu. Orang-orang yang biasanya dianggap penting bagi individu adalah orang tua, orang yang status sosialnya lebih tinggi, teman sebaya, teman dekat, guru, teman kerja, istri atau suami, dan lain-lain.
3. Pengaruh Kebudayaan, kebudayaan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita terutama kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan. Kebudayaan telah menanamkan garis pengarah sikap kita terhadap berbagai masalah. Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota masyarakatnya, karena kebudayaan juga yang memberi corak pengalaman-pengalaman individu-individu yang menjadi anggota kelompok masyarakatnya. Hanya kepribadian individu yang telah mapan dan kuat yang dapat memudarkan dominasi kebudayaan dalam pembentukan sikap individual.
4. Media Massa, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Sebagai tugas pokoknya

dalam menyampaikan informasi, media massa membawa pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugestif yang dibawa oleh informasi tersebut, bila cukup kuat, akan memberi dasar afektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuklah sikap. Walaupun pengaruh media massa tidak sebesar pengaruh interaksi individual secara langsung, namun dalam proses pembentukan dan perubahan sikap, peranan media massa tidak kecil artinya. Dalam menentukan sikap, pengetahuan memegang peranan penting, sehingga sikap ibu dalam pemberian cairan rehidrasi oral pada bayi yang diare sangat dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimilikinya (Notoadmodjo 2005).

Hasil penelitian di beberapa rumah sakit rujukan yang digambarkan pada grafik dan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 65 ibu, terdapat 32 responden (49%) yang memiliki sikap positif terhadap pemberian cairan rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare, dan 33 responden (51%) yang memiliki sikap negatif terhadap pemberian cairan rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare.

Hal tersebut berarti bahwa sebagian besar ibu memberikan nilai yang negatif terhadap pernyataan-pernyataan tentang pemberian cairan rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare, dan sebagian kecil ibu menanggapi dengan positif terhadap pernyataan-pernyataan tentang pemberian cairan

rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa cairan rehidrasi oral didapatkan diberikan pada tempat pelayanan kesehatan.

3. Tindakan

Sikap adalah kecenderungan untuk bertindak (praktik). Sikap belum tentu terwujud dalam tindakan, sebab untuk terwujudnya tindakan perlu faktor lain, yaitu antara lain fasilitas atau sarana dan prasarana. Tindakan juga berarti suatu bentuk perilaku yang dilakukan oleh seseorang baik masih menggunakan tuntunan/panduan ataupun perilaku yang dilakukan secara otomatis (Notoadmodjo, 2005).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 65 ibu, terdapat 23 responden (35%) yang memiliki tindakan yang baik terhadap pemberian cairan rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare, dan 42 responden (65%) yang memiliki tindakan yang kurang baik terhadap pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare.

Data di atas menunjukkan bahwa pengetahuan ibu tentang pemberian rehidrasi oral tidak sesuai dengan sikap dan tindakannya dalam mengaplikasikan apa yang telah responden tahu tentang pemberian rehidrasi oral, sebagian besar responden hanya sampai pada tingkat tahu tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare.

Dalam metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti, menurut beberapa responden bahwa:

“Saya membawa anak saya ke Puskesmas akan tetapi kami tidak diberikan oralit, petugas hanya memberikan obat anti muntah dan obat diare”.

Peneliti berpendapat bahwa responden memiliki sikap seperti di atas karena mereka menganggap bahwa obat tersebut didapatkan di tempat pelayanan kesehatan. Walaupun mereka memiliki pengetahuan tentang pemberian oralit tersebut namun responden masih kurang mengaplikasikan apa yang telah diketahuinya.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Askrening, dosen Politeknik Kesehatan Kendari tahun 2007, tentang pemberian rehidrasi oral pada balita diare, didapatkan bahwa tingkat pengetahuan ibu dikategorikan tinggi, begitupun dengan sikap sebagian besar ibu bersikap positif dan tindakan ibu mengenai pemberian rehidrasi oral pada balita diare masih dikategorikan rendah. Hasil penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan di beberapa rumah sakit rujukan bahwa sebagian besar ibu memang tahu tentang rehidrasi oral akan tetapi sebagian besar ibu masih memiliki sikap negatif dan masih memiliki tindakan kurang baik tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan ibu berada pada pengertian “tahu bahwa”. Pengetahuan tahu bahwa adalah pengetahuan tentang informasi tertentu tahu bahwa sesuatu terjadi, tahu bahwa itu memang demikian adanya, bahwa apa yang dikatakan memang benar (Notoadmodjo, 2005).

Memiliki ilmu pengetahuan merupakan hal yang istimewa bagi setiap manusia. Dalam penelitian ini, dimana pengetahuan ibu menjadi variabel penelitian diterangkan dalam Al-Quran bahwa orang yang memiliki ilmu

pengetahuan akan ditambah derajatnya oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Sebagaimana firmanNya dalam QS. Al-Mujadilah: 11

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, dinyatakan bahwa siapapun yang menuntut ilmu meski sedikit, Allah tidak akan menyia-nyiakan hal tersebut, Allah tidak akan mengurangi haknya, hal itu merupakan ketinggian dan memperoleh martabat di sisi-Nya dan akan diberi balasan di dunia dan akhirat. Sesungguhnya orang yang merendahkan diri kepada Allah, maka akan diangkat derajatnya dan dimasyhurkan namanya. Dan Allah maha tahu orang-orang yang berhak mendapatkan hal itu dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya (Tafsir Ibnu Katsir).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengetahuan ibu dikategorikan cukup tahu, yaitu terdapat 57 responden (88%) yang mengetahui tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare.
2. Sikap ibu dikategorikan kurang karena ibu masih kurang memberikan respon positif terhadap pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare (45%).
3. Tindakan ibu masih dalam kategori kurang karena hanya terdapat sebagian kecil ibu yang memiliki tindakan yang baik terhadap pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare. Pengetahuan ibu tidak sejalan dengan sikap dan tindakan yang mereka lakukan karena ternyata masih banyak ibu-ibu yang memiliki sikap negatif dan tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan pengetahuan dan tanggapan yang ia yakini sebelumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. pengetahuan ibu harus tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi dengan banyak menggali sumber informasi baik dari tenaga kesehatan, media cetak ataupun dari lingkungan keluarga.

2. Sikap positif ibu tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare sangat diharapkan sehingga pemahaman ibu semakin bertambah dan dapat menerapkan sikap tersebut dalam tindakan selanjutnya.
3. Kesadaran ibu sangat diharapkan dalam melakukan tindakan atau praktik tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare. Sehingga apa yang dilakukan tidak sekedar rutinitas saja, akan tetapi dengan tindakan tersebut menambah nilai perilaku yang baik dan berkualitas.
4. Untuk meningkatkan kesadaran ibu dalam melakukan tindakan tentang pemberian rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare, diharapkan agar meningkatkan promosi dalam bentuk pelatihan penanganan diare meningkatkan pemahaman tentang keuntungan penggunaan rehidrasi oral pada bayi yang terkena diare kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Tjandra Yoga. 2011. *“Buku Saku Petugas Kesehatan Departemen Kesehatan RI Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan”*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Agustia, Mhr. 2010. *Makalah Konsep Pengetahuan dalam Islam*. (<http://www.mhragustia.blogspot.com>. Diakses tanggal 20 April 2012).
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad. 2009. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 3. Cet. Pertama. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya. Kementerian Agama RI. 2010. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanlema.
- Amiruddin, Ridwan *et al.* 2007. *Current Issue Kematian Anak (Penyakit Diare)*. (<http://www.ridwanamiruddin.com>. Diakses tanggal 26 April 2012).
- Brooks, Geo F, Janet S Butel, dan Stephen A Morse. 2005. *Mikrobiologi Kedokteran*. Edisi pertama. Jakarta: Salemba Medika.
- Bukhari, Al-Imam. 2009. *Terjemahan Hadis Shohih Bukhori*. Jakarta: Klang Book Centre (KBC).
- Dewi, Vivian Nanny Lia. 2010. *Asuhan Neonatus Bayi dan Anak Balita*. Jakarta: Salemba Medika.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. *“Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2009”*. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. (<http://dinkes-sulsel.go.id>. Diakses tanggal 01 April, 2012).
- _____. *“Tatalaksana Penderita Diare”*. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. (<http://dinkes-sulsel.go.id>. Diakses tanggal 29 Maret, 2012).
- Gambaran Penderita Diare di Puskesmas Barombong Tahun 2008-2009* 2011. (<http://www.artikelkedokteran.com>. Diakses tanggal 31-03-2009).
- Gillespie, Stephen dan Kathleen Bamford. 2007. *at a Glance Mikrobiologi Medis dan Infeksi*. Edisi 3. Jakarta: Erlangga.
- Guyton, Athur C dan John E Hall. 2007. *Buku Ajar Fisiologi Kedokteran*. Jakarta: EGC.
- Hassan, Rusepno dan Husein Alatas. 2007. *Buku Kuliah Ilmu Kesehatan Anak UI*, jilid 1, edisi XI. Jakarta: Info Medika.

- Indonesian Children. 2009. *Atasi Diare pada Orang Dewasa, Perlukah Obat?*. (<http://www.koranindonesiasehat.wordpress.com>. Diakses tanggal 11 April 2012).
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. "*Situasi Diare di Indonesia*". Buletin Jendela Pusat Data dan Informasi. (<http://www.depkes.go.id>. Diakses tanggal 01 April, 2012).
- Koo, Ingrid. 2008. *Rehidrasi Oral Therapy (ORT) untuk Penyakit diare.*(<http://infectiousdiseases.about.com/od/treatment/a/ORT.htm>. Diakses tanggal 13 April 2012).
- Malek, Mark A, *et al.* 2006. "*Diarrhea and Rotavirus*". Journal of the American Academy of Pediatrics. (<http://pediatrics.aappublications.org>. Diakses tanggal 12 April 2012).
- Mansjoer, Arif., *et al.* 2000. *Kapita Selekta Kedokteran*, jilid 2, edisi III. Jakarta: Media Aesculapius.
- Mawaddah, Na'imu. 2011. *Gambaran Pengetahuan, Sikap Dan Tindakan Ibu Menyusui Tentang Pemberian Makanan Pendamping Asi (Mp-Asi) Pada Bayi Usia 6-24 Bulan Di Puskesmas Maccini Sawah Makassar*.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2005. *Metode Penelitian Kesehatan*. Cet. 3. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nursalam, Rekawati Susilaningrum, dan Sri Utami. 2005. *Asuhan Keperawatan Bayi dan Anak (Untuk Perawat dan Bidan)*. Edisi pertama. Jakarta: Salemba Medika.
- Putra, Deddy Satria. 2010. *Diare Akut pada Anak: klinik dr. Deddy*. (<http://www.dr-deddy.com/index.php>. Diakses tanggal 01 April 2012).
- Raulito. 2010. *Diare Penyebab Kematian Kedua Balita di Dunia*. (<http://www.gaya-hidup.infogoe.com>. Diakses tanggal 01 April 2012).
- Rubenstein, David, David Waeny, dan John Bradley. 2007. *Lecture Notes Kedokteran Klinis*. Jakarta: Erlangga.
- Santoso, Urip. 2009. *Kewajiban Orang Tua terhadap Anak*: jurnal Urip Santoso. (<http://www.uripsantoso.wordpress.com>. Diakses tanggal 04 April 2012).
- Sanusi, 2011. *Skripsi Diare*. (<http://www.sanusingawi.wordpress.com>. Diakses tanggal 26 Maret 2012).

- Satria, 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan*. (<http://www.shvooong.com>. Diakses tanggal 23 Agustus 2012).
- Soenarto, Srisupar Yati. 2011. *Vaksin Rotavirus untuk Pencegahan Diare*. Buletin Jendela Pusat Data dan Informasi. (<http://www.depkes.go.id>. Diakses tanggal 01 April, 2012).
- Sudariato, 2011. *Kasus Diare di Sulsel Tahun 2010 sebesar 339.871 Kasus: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan*. (<http://www.dinkes-sulsel.go.id>. Diakses tanggal 31 Maret 2012).
- Sudoyo, Aru W, *et al.* 2006. *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*. Jilid III. Edisi IV. Jakarta: FKUI.
- Suharyono. 2008. *Diare Akut Klinik dan Laboratorik*. Cet. 2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujatmika, Sigit. 2009. *Mekanisme Pencernaan pada Manusia: Jendela Sains dan Teknologi Indonesia*. (<http://www.mrsigitblog.wordpress.com>. Diakses tanggal 26 April 2012).
- Ulfah, Nurul. 2009. *Angka Kematian Bayi di Indonesia Masih Tinggi*. (<http://www.detik.com>. Diakses tanggal 26 Maret 2012).
- Varney, Helen, Jan M. Kriebs dan Carolyn L. Gegor. 2006. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan*. Vol. 1. Edisi 4. Jakarta: EGC.
- Viklund, Andreas. 2009. *Sikap dan Kepribadian : Pengertian Sikap dan kepribadian, Pembentukan Sikap, Tipe Sikap dan Faktor Penentu Kepribadian*. (<http://www.jurnal-sdm.blogspot.com>. Diakses tanggal 23 Agustus 2012).
- Zaifbio. 2010. *Sistem Pencernaan Manusia*. (<http://www.zaifbio.wordpress.com>. Diakses tanggal 26 April 2012).
- Zareen, 2011. *Make an Oral Rehydration Salt Drink*. (<http://www.wikihow.com>. Diakses tanggal 06 April 2012).

LEMBAR KUESIONER
GAMBARAN PENGETAHUAN SIKAP DAN TINDAKAN IBU
MENGENAI PEMBERIAN REHIDRASI ORAL PADA BAYI
YANG TERKENA DIARE DI BEBERAPA
RUMAH SAKIT RUJUKAN
TAHUN 2012

Petunjuk:

Isilah identitas diri dengan lengkap!

No. Responden :

Tanggal survey :

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama ibu :

Umur ibu :

Nama anak :

Agama :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

.....

B. ALAT UKUR PENGETAHUAN

Petunjuk:

Di bawah ini ada beberapa pernyataan tentang pengetahuan. Berilah tanda (√) pada kolom jawaban BENAR jika anda menyatakan benar, dan pada kolom jawaban SALAH jika anda menyatakan pernyataan tersebut benar.

NO	PERNYATAAN-PERNYATAAN	BENAR	SALAH	SCORE
1	Nama lain dari cairan rehidrasi oral adalah Oralit			
2	Cairan rehidrasi oral/oralit adalah cairan yang terdiri dari bahan gula, garam dan air			
3	Cairan rehidrasi oral/oralit diberikan kepada orang yang menderita diare untuk menghindari terjadinya kekurangan cairan			
4	Cairan rehidrasi oral/oralit dapat diberikan pada anak yang menderita diare di rumah			
5	Cara pemberian rehidrasi oral/oralit dengan memberikan sedikit-sedikit			
6	Diare dapat menyebabkan kehilangan cairan dari tubuh			
7	Cairan rehidrasi oral/oralit dapat dibuat sendiri di rumah			
8	Pemberian cairan rehidrasi oral/oralit sangat penting bagi orang yang menderita diare			

C. ALAT UKUR SIKAP

Petunjuk:

Di bawah ini ada beberapa pernyataan tentang sikap. Berilah tanda (√) pada jawaban yang paling sesuai dengan diri anda. (S) menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut sedangkan (TS) menyatakan tidak setuju.

NO	PERNYATAAN-PERNYATAAN	S	TS	SCORE
1	Cairan rehidrasi oral sebaiknya selalu tersedia di rumah			
2	Saya sebaiknya mengetahui bahan dari cairan rehidrasi oral			
3	Saya harus mengetahui cara pembuatan cairan rehidrasi oral di rumah			
4	Saya memberikan rehidrasi oral/oralit pada anak saya agar tidak mengalami kekurangan cairan			
5	Cairan rehidrasi oral/oralit sangat dibutuhkan oleh anak yang menderita diare			
6	Pemberian rehidrasi oral/oralit adalah langkah awal penatalaksanaan pada anak yang terkena diare			
7	Pemberian cairan rehidrasi oral/oralit merupakan penanganan yang efektif terhadap penderita diare di rumah			
8	Apabila anak saya diare, saya memberikan cairan rehidrasi oral/oralit sebelum membawanya ke tempat pelayanan kesehatan			

D. ALAT UKUR TINDAKAN

Petunjuk:

Di bawah ini ada beberapa pernyataan tentang tindakan. Berilah tanda (√) pada jawaban yang paling sesuai dengan tindakan anda. (YA) menyatakan anda melakukan pernyataan tersebut sedangkan tidak (TIDAK) menyatakan anda tidak melakukannya.

NO	PERNYATAAN-PERNYATAAN	YA	TIDAK	SCORE
1	Saya selalu menyediakan paket cairan rehidrasi oral/oralit di rumah			
2	Saya mengetahui cara membuat cairan rehidrasi oral/oralit dari paket yang tersedia			
3	Saya memberikan cairan rehidrasi oral/oralit pada anak saya ketika terkena diare			
4	Saya memberikan cairan rehidrasi oral/oralit setiap kali anak saya buang air besar			
5	Saya memberikan cairan rehidrasi oral/oralit pada anak saya dengan cara sedikit-sedikit agar tidak dimuntahkan			
6	Apabila paket oralit tidak tersedia, maka saya membuat cairan rehidrasi oral/oralit dengan bahan yang tersedia di rumah (air, garam, gula)			
7	Apabila diare anak saya tetap berlanjut setelah pemberian cairan rehidrasi oral/oralit, maka pemberian dilanjutkan dan dibawa ke tempat pelayanan kesehatan			
8	Saya memberikan cairan rehidrasi oral/oralit pada anak saya sebelum di bawa ke Rumah Sakit/Puskesmas			

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mawar Handayani (70400009018) lahir di Kolaka Sulawesi Tenggara pada tanggal 07 Juli 1992. Terlahir dari pasangan suami-istri Hasanuddin dan Husnia. Berasal dari suku Makassar dan memiliki satu orang saudara perempuan serta 2 orang saudara laki-laki.

A. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 1998-2003 : Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Ulunggolaka Kel. Ulunggolaka Kec. Latambaga Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara
2. Tahun 2003-2006 : Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Latambaga Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara.
3. Tahun 2006-2009 : Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Pallangga Kab. Gowa Sulawesi Selatan.
4. Tahun 2009-2012 : Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Sulawesi Selatan.