

**EFEKTIVITAS SEDIAAN KRIM FRAKSI ETANOL DARI INFUS DAUN
SENDOK (*Plantago mayor L.*) SEBAGAI TABIR SURYA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Oleh

MAKASSAR

SUDARTINI AL FITRI

70100106 066

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2010

PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 22 Desember 2010

Penulis,

Sudartini Al Fitri

70 100 106 066

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Efektivitas Sediaan Krim Fraksi Etanol Dari Infusa Daun Sendok (*Plantago mayor* L.) Sebagai Tabir Surya” yang disusun oleh Sudartini Al Fitri, NIM: 70100106066, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2010 M, bertepatan dengan 2 Muharram 1432 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 8 Desember 2010 M
2 Muharram 1432 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua : Isriany Ismail, S. Si., M. Si., Apt. (.....)
Sekretaris : Haeria, S. Si. (.....)
Penguji I : Nursalam Hamzah, S.Si, Apt. (.....)
Penguji II : Drs. Muhammad Idris, M. Pd. (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

dr. H. M. Furqaan Naiem, M. Sc., Ph. D
Nip. 19580404 198903 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil'alamin, tiada kata yang pantas diucapkan oleh lisan seorang hamba kecuali rasa syukur kepada Allah SWT, Dialah Dzat yang memberikan kita karunia, rahmat, banyak nikmat yang tak kunjung pudar yang masih bias kita rasakan sampai sekarang ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada manusia terbaik sepanjang sejarah manusia, sang *khatamulanbiya'*, Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang senantiasa berpegang teguh menapaki risalahnya yang paripurna hingga akhir zaman. *Ammaba'du*.

Skripsi dengan judul “Efektivitas Sediaan Krim Fraksi Etanol dari Infusa Daun Sendok (*Plantago mayor* L.) Sebagai Tabir Surya” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa hormat dan terima kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta, Ayahanda M. Said Tarima dan Ibunda Dawalia, yang tak putus – putus atas segala doa restu, kasih sayang, nasehat dan bantuan moril maupun materi selama menempuh pendidikan hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dekan dan Para Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta para staf pada fakultas kesehatan.
4. Ibu Isriany Ismail S.Si, M. Si, Apt. Selaku Pembimbing pertama dan ibu haeriah S.Si. Selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Muhammad Idris, M.Pd. Selaku Penguji Agama dan Bapak Nursalam Hamzah, S.Si, Apt. selaku penguji akademik yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam mengoreksi apa - apa yang perlu diperbaiki pada skripsi penulis.
6. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, Apt. sebagai pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan.
7. Ibu Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar, Bapak, Ibu Dosen, serta Seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi, melaksanakan pendidikan hingga selesainya skripsi ini.
8. Teman – teman seperjuangan angkatan 2006, Kakak - kakak jurusan farmasi angkatan maupun adik - adik, atas segala bantuan dan kerjasamanya selama penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga saran dan kritik yang membangun sangatlah diperlukan, mudah – mudahan skripsi ini bias bermanfaat bagi


pembaca, pengembangan ilmu pengetahuan dan bisa bernilai ibadah disisi Allah SWT.

Amin, ya Robbal Alamin!

Makassar, 22 Desember 2010

Wassalam,

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
<i>A. Latar Belakang</i>	1
<i>B. Rumusan Masalah</i>	4
<i>C. Tujuan Penelitian</i>	4
<i>D. Manfaat Penelitian</i>	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
<i>A. Kulit</i>	6
1. Lapisan Epidermis.....	7
2. Lapisn Dermis.....	9
3. Lapisan Subkutan.....	10
<i>B. Kosmetik</i>	10
<i>C. Krim</i>	11
<i>D. Tabir Surya</i>	16
<i>E. Tumbuhan Daun Sendok</i>	26
1. Klasifikasi.....	26
2. Nama Daerah.....	26
3. Morfologi.....	26
4. Kandungan Kimia.....	27
5. Kegunaan.....	28

F. <i>Infusa</i>	29
G. <i>Spektrofotometer UV-Vis</i>	30
H. <i>Tinjauan Islam Mengenai Penelitian Tanaman Obat</i>	35
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. <i>Alat dan Bahan</i>	41
B. <i>Prosedur Kerja</i>	41
1. <i>Pengambilan Sampel</i>	41
2. <i>Pengolahan Sampel</i>	42
3. <i>Formulasi Krim</i>	42
4. <i>Penentuan Efektivitas Sediaan</i>	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. <i>Hasil</i>	45
B. <i>Pembahasan</i>	45
BAB V PENUTUP	48
A. <i>Kesimpulan</i>	48
B. <i>Saran</i>	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Rancangan Formula Krim.....	42
2. Hasil Perhitungan nilai SPF.....	45
3. Hasil Perhitungan HLB Butuh.....	56
4. Data Hasil Pengukuran Replikasi Serapan Formula I(3%)....	59
5. Data Hasil Pengukuran Replikasi Serapan Formula II(6%)...	59
6. Data Hasil Pengukuran Replikasi Serapan Formula III(12%)	59
7. Contoh Nilai Perhitungan SPF.....	61
8. Analisis Statistik Nilai SPF Tiap Formula Dengan RAL.....	63
9. Tabel ANAVA.....	63

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Struktur Kulit.....	7
2. Unsur – unsur Spektrofotometer.....	31
3. Skema Kerja Infusa Daun Sendok.....	52
4. Skema Kerja Pembuatan Krim Fraksi Etanol.....	53
5. Skema Kerja Penentuan Efektivitas Sediaan Krim.....	54
6. Tanaman Daun Sendok (<i>Plantago mayor L.</i>).....	56
7. Formula Krim Fraksi Etanol.....	57
8. Spektrum Serapan Sediaan Krim Fraksi Etanol.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Skema Kerja Infusa Daun Sendok (<i>Plantago mayor</i> L.).....	57
2. Skema Kerja Pembuatan Krim Fraksi Etanol Daun Sendok.....	58
3. Skema Kerja Penentuan Efektivitas Sediaan Krim.....	59
2. Perhitungan HLB Butuh.....	60
3. Tanaman Daun Sendok (<i>Plantago mayor</i> L.).....	61
6. Sediaan Krim Fraksi Etanol Daun Sendok.....	62
7. Spektrum Serapan Sediaan Krim.....	64
8. Hasil Pengukuran Serapan Krim Fraksi.....	66
9. Contoh Perhitungan Nilai SPF.....	67
10. Analisis Statistik Nilai SPF Tiap Formula Dengan RAL.....	68

ABSTRAK

Nama Penyusun : Sudartini Al Fitri
NIM : 70100106066
Judul Skripsi : “Efektivitas Sediaan Krim Fraksi Etanol dari Infusa Daun Sendok (*Plantago mayor* L.) Sebagai Tabir Surya”

Beberapa tahun terakhir, efek buruk matahari lebih berbahaya dibanding tahun – tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan berkurangnya lapisan ozon pada atmosfer bumi. Sinar matahari merupakan sumber energy yang penting bagi seluruh kehidupan di bumi. Namun, radiasi matahari yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada kulit.

Pada dasarnya kulit manusia sudah mempunyai sistem perlindungan dari radiasi matahari secara alamiah. Namun, jika kontakannya dengan sinar matahari terlalu berlebihan maka sistem perlindungan alami itu saja tidak cukup. Oleh karena itu, diperlukan pelindung tambahan baik secara fisik maupun kimiawi. Diketahui bahwa fraksi etanol daun sendok (*Plantago mayor* L.) mengandung flavonoid. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa akumulasi flavonoid oleh tanaman menyediakan mekanisme pertahanan terhadap radiasi UV B. Penambahan fraksi etanol daun *Plantago mayor* L. menurunkan nilai persen transmisi eritema setelah perlakuan pemaparan dengan cahaya matahari selama 5 jam.

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai *sun protection factor* (SPF) dari krim yang berkhasiat tabir surya sehingga dapat mencegah terjadinya penuaan dini, Kemerahan, pigmentasi yang berlebihan, penebalan sel tanduk dan kanker kulit. Pengukuran nilai *sun protection factor* (SPF) dilakukan secara *in vitro* menggunakan metode spektrofotometri pada panjang gelombang 290 – 360 nm. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa sediaan krim fraksi etanol daun sendok (*Plantago mayor* L.) tidak efektif sebagai tabir surya.

Kata kunci : Fraksi etanol daun sendok, krim, tabir surya, uji efektivitas, spektrofotometer

ABSTRACT

Name : Sudartini Al fitri
NIM : 70100106066
Tittle of Script : “The effectiveness of preparations from infusa Ethanol Fraction Cream *Plantago Major (Plantago mayor L.)* As Sunscreen”

In recent years, the ill effects of the sun is more dangerous than the previous year. This is due to reduction in the ozone layer in Earth's atmosphere. Sunlight is an important source of energy for all life on earth. However, excessive sun radiation can cause damage to the skin.

Basically human skin already has a system of radiation protection from the sun naturally. However, if contacts with the sun too much natural protection system that was not enough. Therefore, it needs more protection both physically and chemically. It is known that the ethanol fraction *Plantago major (Plantago major L.)* contain flavonoids. Numerous studies have shown that the accumulation of flavonoids by the plant provides a defense mechanism against UV-B radiation The addition of ethanol fraction of leaves of *Plantago major L.* lowering the value of percent transmission of erythema after treatment for exposure to sunlight for 5 hours.

This study aims to determine the value of sun protection factor (SPF) which merit darikrim sunscreen that can prevent premature aging, redness, excessive pigmentation, thickening of the horn cells and skin cancer. Measuring the value of sun protection factor (SPF) conducted in vitro using spectrophotometric method at a wavelength of 290-360 nm. The results showed that the cream fraction of ethanol *Plantago major (Plantago major L.)* was not effective as a sunscreen.

Keywords : *Plantago major* fraction of ethanol, creams, sunscreens, Test Effectiveness, Spectrophotometer

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang beriklim tropis dengan paparan sinar matahari sepanjang musim. Sebagian penduduknya bekerja di luar ruangan sehingga mendapat paparan sinar matahari bahkan pada saat matahari sedang terik. Radiasi sinar matahari dapat mempengaruhi kesehatan kulit semua individu. Untuk mencegah efek buruk paparan sinar matahari dapat dilakukan dengan cara menghindari paparan berlebihan sinar surya, yaitu memakai pelindung fisik seperti pakaian tertutup, payung, caping, dan memakai tabir surya topikal apabila kegiatan mengharuskan berada di bawah terik matahari (Perwitasari dkk., 1999).

Beberapa tahun terakhir, efek buruk akibat paparan sinar matahari lebih berbahaya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan berkurangnya lapisan ozon pada atmosfer bumi. Kita ketahui bahwa lapisan ini berfungsi sebagai '*protective filter*' untuk melindungi kita dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Manfaat sinar matahari bagi kehidupan sangat banyak, namun sinar matahari juga mempunyai efek yang sangat merugikan bagi kulit, terutama spektrum sinar ultravioletnya yang dapat menyebabkan eritema (kemerahan) pada kulit, pigmentasi yang berlebihan, penebalan sel tanduk, dan *aging* (penuaan kulit). Sengatan matahari yang berlebihan juga dapat menyebabkan kelainan kulit mulai dari dermatitis ringan sampai kanker kulit. Cahaya UV dapat memacu pembentukan sejumlah senyawa reaktif atau

radikal bebas pada kulit. Penyinaran lama akan menyebabkan perubahan degeneratif pada jaringan ikat. Keadaan tersebut menyebabkan kulit menebal, kehilangan kekenyalan sehingga kulit kelihatan keriput, ini disebabkan karena kulit kehilangan kapasitas ikat-air (Anonim, 1985; Harry, 1952).

Solusi pencegahan terjadinya gangguan kulit akibat pancaran sinar matahari dan menanggulangi bahaya ultraviolet (UV) bagi kulit adalah menggunakan senyawa tabir surya guna menyaring sinar UV berbahaya sebelum menembus kulit. Sediaan tabir surya adalah sediaan kosmetika yang digunakan dengan maksud membaurkan atau menyerap emisi gelombang ultraviolet dan inframerah, sehingga dapat mencegah terjadinya gangguan kulit karena cahaya matahari. Berdasarkan klasifikasi, sinar radiasi UV digolongkan menjadi tiga bagian, sehingga kekuatan tabir surya juga dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu senyawa tabir surya tipe A (menyerap sinar UV pada panjang gelombang 315 - 400 nm), tipe B (menyerap sinar UV pada panjang gelombang 290 - 315 nm), tipe C (menyerap sinar UV pada panjang gelombang 200 - 290 nm) (Harry, 1952; Anonim, 1985).

Berdasarkan penelitian Diffey (2001) dan Green dkk (1999) menyatakan bahwa penggunaan tabir surya setiap hari ternyata dapat menurunkan resiko terjadinya kanker kulit. Penelitian Sugihartini dkk (2005) menyatakan bahwa penambahan fraksi etanol daun *Plantago mayor* L. menurunkan nilai persen transmisi eritema setelah perlakuan pemaparan dengan cahaya matahari selama 5 jam. Fraksi etanol tersebut juga menurunkan secara bermakna persen transmisi pigmentasi baik sebelum atau sesudah pemaparan dengan cahaya matahari. Tabir surya dapat dibuat dalam berbagai

bentuk sediaan, misalnya bentuk larutan dalam air atau alcohol, emulsi, krim dan semipadat, yang merupakan sediaan lipid non-air, gel dan aerosol (Ansel,1989; Lachman, 1994).

Sediaan krim tabir surya perlu pengkajian mengenai efesiensinya sebagai tabir surya. Untuk mengetahui efektivitas bahan tabir surya dilakukan pengujian daya absorpsi terhadap kadar, kepekaan larutan, dan panjang gelombang (Anonim, 1985).

Ajaran agama untuk menggali ilmu pengetahuan telah mendorong muslim untuk mengenal banyak ilmu. Segala upaya mereka kerahkan untuk menekuni sebuah ilmu, bahkan beragam ilmu. Termasuk ilmu pengobatan yang menggunakan tumbuhan. Ketertarikan pada tumbuhan tak hanya melahirkan ahli pengobatan herbal. Namun, juga melahirkan perkembangan menakjubkan di bidang pertanian, termasuk teknik baru dalam mengembangkan tanaman. Dari berbagai penelitian yang dilakukan ilmuwan muslim soal tanaman ini, kemudian lahir ilmu tentang pengobatan herbal. Dalam banyak literatur Islam di abad pertengahan, kehidupan tumbuh-tumbuhan erat kaitannya dengan ilmu kedokteran dan agronomi.

Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al Syuara : 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ طِينًا مِنْهَا مِنْ كُلِّ ذَرْوٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh – tumbuhan yang baik ?

Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan. Tumbuhan yang bermacam – macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat untuk berbagai penyakit, dan ini merupakan anugerah Allah SWT. Ayat tersebut mengisyaratkan agar kita mencari dan mempelajari berbagai tumbuhan yang menjadi rezeki yaitu yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan menjadi rezeki bagi makhluk hidup karena merupakan bahan pangan, bahan sandang, papan dan obat – obatan (Savitri, 2008).

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dilakukan penelitian mengenai efektivitas sediaan krim tabir surya yang mengandung fraksi etanol infusa daun sendok (*Plantago mayor L.*).

B. Rumusan masalah

Bagaimana efektivitas sediaan krim fraksi etanol dari infusa daun sendok (*plantago mayor L.*) sebagai tabir surya.

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sediaan krim fraksi etanol dari infusa daun sendok (*Plantago mayor L.*) sebagai tabir surya yang dilakukan secara *in vitro* dengan metode spektrofotometri.

D. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang nilai SPF dari krim tabir surya yang mengandung fraksi etanol dari infusa daun sendok (*Plantago major* L.) dan sebagai data ilmiah bagi peneliti lainnya dan rujukan untuk penelitian selanjutnya.



BAB II


TINJAUAN PUSTAKA

A. Kulit

Kulit merupakan lapisan pelindung tubuh yang sempurna terhadap pengaruh luar, baik pengaruh fisik maupun pengaruh kimia. Kulit merupakan sawar fisiologik yang penting karena mampu menahan penembusan bahan gas, cair, maupun padat baik yang berasal dari lingkungan luar tubuh, maupun dari komponen organisme. Meskipun kulit relatif permeabel terhadap senyawa – senyawa kimia, namun dalam keadaan tertentu kulit dapat ditembus oleh senyawa obat atau bahan berbahaya yang dapat menimbulkan efek terapeutik atau efek toksik, baik yang bersifat setempat maupun sistemik (Hermann, 1993).

Kulit merupakan anggota tubuh yang paling pertama menerima stimulus dari luar, mulai dari merasakan dingin, panas, merasa tersentuh, merasakan tekanan dan sakit. Kulit merupakan pemberian tuhan yang luar biasa. Mempunyai struktur yang bagus dan sekaligus membuktikan keagungan sang pencipta. Kulit seseorang memiliki sekitar 2,5 juta kelenjar keringat, yang mempunyai peran besar dalam pengontrolan panas tubuh pada musim panas. Satu meter kubik dari jarak bagian atas tubuh meliputi sekitar 3 juta sel, 3 ribu sel saraf terutama untuk pancaindra, 100 kelenjar keringat, 10 saluran kapiler, dan 1 meter saluran pembuluh darah. Kulit mengandung sel-sel kromosom yang dapat menentukan warna tubuh dan menjaganya dari sinar berbahaya (Hisham Thalbah, 2009).

Lapisan kulit terbagi ke dalam 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis dan jaringan subcutaneous. Turunan epidermis meliputi rambut, kuku, kelenjar sebaceous dan kelenjar keringat. Di bawah dermis terdapat hipodermis atau jaringan subkutan (Kelley, 1997).



Gambar 1. Struktur Kulit (Pearce, 2007)

1. Lapisan epidermis (Kelley, 1997)

Lapisan epidermis terdiri dari epitel berlapis gepeng, merupakan lapisan terluar dari kulit. Ketebalan lapisan tergantung lokasinya, tebalnya berkisar antara 0,05-1,5 mm.

a) Stratum korneum

Lapisan ini terdiri dari atas 15 – 20 lapis sel berkeratin tanpa inti gepeng yang sitoplasmanya dipenuhi keratin. Setelah dikeratinisasi, sel-sel hanya terdiri atas protein amorf, fibril dan membran plasma yang menebal, sel-sel tersebut disebut sel tanduk. Enzim hidrolitik lisosom berperan dalam menghilangnya organel sitoplasma. Sel-sel terus menerus dilepaskan pada permukaan stratum korneum.

b) Stratum lusidum

Pada bagian ini tampak jelas pada kulit tebal, bersifat translusen dan terdiri atas selapis tipis sel eusinofilik yang sangat gepeng. Organel dan inti tidak tampak lagi dan sitoplasma terutama terdiri dari filamen padat yang berhimpun dalam matriks kedap elektron.

c) Stratum granulosum

Memiliki struktur yang khas yang dapat dilihat dengan mikroskop elektron yang merupakan granula berlamel, yaitu sebuah struktur lonjong atau mirip dengan batang kecil (0,1 - 0,3 μ m) yang mengandung cakram – cakram berlamel yang dibentuk oleh lapisan ganda lipid. Granul-granul ini menyatu dengan membran sel dan mencurahkan isinya ke dalam ruang intrasel dari stratum granulosum.

d) Stratum spinosum

Sel-sel pada stratum spinosum saling mengikat dengan kuat. Melalui duri sitoplasma terisi filamen dan desmosom, sehingga memberikan permukaan sel ini corak berduri. Berkas tonofilamen ini yang tampak dengan mikroskop cahaya disebut tonofibril. Filamen ini berperan penting mempertahankan koheisi antar sel dan dalam melawan akibat abrasi.

e) Stratum germinativum (basale)

Pada stratum basale terdapat banyak aktivitas mitosis dan bertanggung jawab bersama – sama dengan bagian awal lapis berikutnya terhadap pembaruan atau diferensiasi sel – sel epidermis secara berkesinambungan. Dengan kata lain pada bagian stratum basale ini,

berfungsi sebagai tempat proliferasi. Epidermis manusia mengalami pergantian sekitar 42 hari dan waktu tersebut tergantung pada faktor usia, bagian tubuh dan faktor – faktor lain yang mempengaruhinya. Semua sel basale mengandung filamen.

2. Lapisan Dermis (Kelley, 1997; Hermann, 1993)

Lapisan dermis terdiri atas jaringan ikat yang menunjang epidermis dan mengikatnya pada lapisan dibawahnya, yaitu jaringan subkutan (hipodermis). Ketebalannya bervariasi tergantung pada daerah tubuh. Permukaan dermis tidak teratur dan memiliki banyak tonjolan (papilla dermis) yang saling mengunci dengan juluran – juluran epidermis. Papilla dermis ini berfungsi untuk menahan tekanan, struktur tersebut diyakini dapat meningkatkan dan menguatkan batas antara dermis dengan epidermis.

Dermis terdiri dari 2 lapisan dengan batas yang tidak nyata yaitu stratum papilar di sebelah luar dan stratum retikular yang lebih dalam. Stratum papilar tipis terdiri dari jaringan longgar, fibroblas dan sel jaringan ikat lainnya. Terdapat juga leukosit yang keluar dari pembuluh.

Dermis kaya akan jaring – jaring pembuluh darah dan limfe, dimana memiliki peran penting dalam pengaturan suhu tubuh dan tekanan darah. Jaringan kapiler yang luas dalam stratum papilar berfungsi untuk mengatur suhu tubuh dan memberi makan epidermis di atasnya yang tidak memiliki pembuluh darah sendiri.

3. Subkutan (Kelley, 1997)

Lapisan ini terdiri dari jaringan ikat longgar yang mengikat kulit secara longgar pada organ – organ di bawahnya, yang memungkinkan kulit bergeser di atasnya. Hipodermis biasanya mengandung sel-sel lemak yang bervariasi jumlah sesuai daerah tubuh dan ukurannya sesuai dengan status gizi yang bersangkutan. Lapisan ini juga disebut fase superfisial sedangkan lapisan yang tidak tebal disebut panikulus adiposus.

B. Kosmetik

Kosmetika berasal dari bahasa Yunani “kosmetikos” yang berarti keterampilan menghias, mengatur. Bahan yang digunakan dalam kosmetika dapat menggunakan bahan alam maupun sintetik selama digunakan secara aman. Pengertian kosmetika adalah Sediaan/paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit (Tranggono, 2007).

Pengertian kosmetika dewasa ini telah mengalami pergeseran dengan berkembangnya produk yang mengandung bahan obat. Dahulu tujuan penggunaan kosmetika adalah untuk melindungi tubuh dari alam (panas, sinar matahari, dingin, kekeringan, iritasi, dan gigitan nyamuk). Saat ini kosmetika semakin berkembang dimana penggunaannya untuk meningkatkan daya tarik (*make up*), meningkatkan kepercayaan diri dan ketenangan, melindungi kulit

dan rambut dari sinar UV yang merusak, polutan dan faktor lingkungan lain dan menghindari penuaan dini (Tranggono, 2007).

Klasifikasi kosmetik berdasarkan tujuan pemberiannya pada kulit digolongkan menjadi 3 jenis kosmetik yaitu *skin care cosmetics*, *make up cosmetics*, dan *body cosmetics*. *Skin care cosmetics* terdiri dari kosmetik pembersih (krim dan busa pembersih), kosmetik kondisioner (losion dan krim masage), dan kosmetik pelindung (krim dan losion pelembab). *Make up cosmetics* terdiri dari kosmetik dasar (*foundation* dan bedak). *Make up* (lipstik, *blusher*, *eyeshadow* dan *eyeliner*) dan perawatan kuku (cat kuku, pembersih dan lain – lain). *Body cosmetics* terdiri dari beberapa jenis antara lain sabun mandi padat/cair, *sunscreen*, *sun oil*, deodoran, *insect repellent* dan lain-lain (Tranggono, 2007).

C. *Krim*

Krim adalah sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan yang sesuai, dimaksudkan untuk pemakaian luar. Krim adalah emulsi kental mengandung air tidak kurang dari 60%, merupakan suatu sistem emulsi yang tidak stabil secara termodinamika dimana mengandung paling sedikit dua fase yang tidak saling bercampur. Salah satu fase bersifat polar (air) dan fase yang lainnya bersifat nonpolar (minyak). Krim dapat dibuat dengan beberapa jenis yaitu emulsi air dalam minyak, emulsi minyak dalam air (Anonim, 1978; Ansel, 1989).

Secara garis besar krim terdiri dari 3 komponen yaitu bahan aktif, bahan dasar dan bahan pembantu.

Emulgator atau surfaktan dalam sediaan krim berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan antara kedua fase yang tidak saling bercampur tersebut yang bekerja dengan mengurangi gaya tarik menarik antar molekul dari kedua fase, sehingga fungsi emulgator tersebut berkenaan dengan peningkatan stabilitas emulsi. Selain itu untuk meningkatkan stabilitas suatu sediaan krim biasanya mengandung bahan-bahan tambahan lain seperti pengawet, pengkhelet, pengental, pelembab (humektan), pewarna dan pewangi serta bahan-bahan lain yang dapat ditambahkan untuk memperoleh suatu sediaan krim yang baik (Ansel, 1989).

Dalam membuat formulasi suatu sediaan krim yang baik perlu diperhatikan adalah kesesuaian sifat bahan-bahan yang dipilih, yaitu kesesuaian sifat antara bahan aktif dengan pembawanya (basis). Agar diperoleh suatu basis krim yang baik maka pemakaian bahan pengemulsi sangat menentukan (Ansel, 1989).

Adapun bahan pembawa (basis) yang digunakan adalah vanishing krim. Basis yang dapat dicuci dengan air adalah emulsi minyak di dalam air, basis vanishing cream termasuk dalam golongan ini. Basis krim (vanishing cream) disukai pada penggunaan sehari-hari karena memiliki keuntungan yaitu setelah pemakaian tidak menimbulkan bekas, memberikan efek dingin pada kulit, tidak berminyak serta memiliki kemampuan penyebaran yang baik. Vanishing cream mengandung air dalam persentase yang besar dan asam stearat. Setelah pemakaian krim, air menguap meninggalkan sisa berupa selaput asam stearat yang tipis (Ansel, 1989; Lachman, 1994).

Humektan (gliserin, propylenglikol, sorbitol 70%) sering ditambahkan pada vanishing cream dan emulsi minyak dalam air untuk mengurangi penguapan air dari permukaan basis (Banker, 1792).

1. Bahan pengemulsi

- a) Asam stearat (anonim, 1986; Lachman, 1994)

Rumus molekul : $C_{18}H_{36}O_2$

Asam stearat dalam sediaan topikal digunakan sebagai bahan pengemulsi. Dalam pembuatan basis krim netral nonionik dinetralisasi dengan penambahan alkali. Mudah larut dalam benzen, karbon tetra klorida, kloroform dan eter. Larut dalam etanol, heksan dan propilenglikol, praktis tidak larut dalam air. Umumnya tidak menyebabkan toksik ataupun iritasi. Titik leleh $> 54^{\circ}C$. Konsentrasi yang umumnya digunakan dalam sediaan krim sebesar 1 – 20 %.

- b) Tween 60 (Polysorbat 60) (Anonim, 1986; Anonim, 1979)

Rumus molekul : $C_{64}H_{126}O_{26}$

Polisorbat 60 adalah hasil kondensasi oleat dari sorbitol dan anhidranya dengan etilenoksida. Tiap molekul sorbitol dan anhidranya berkondensasi dengan lebih kurang 20 molekul etilenoksida. Pemerian cairan kental, buram, kuning; bau agak harum atau bau minyak. Kelarutan larut dalam air, praktis tidak larut dalam air mineral. Tween digunakan sebagai *emulsifying agent*, nonionik surfaktan, *suspending agent*. Digunakan dalam pembuatab kosmetik, makanan, sediaan oral, parenteral dan formulasi topikal. Tween 60 dapat larut dalam air, dan tidak larut dalam minyak sayur dan minyak mineral.

Tween digunakan dalam kombinasi emulgator hidrofilik dalam emulsi minyak dalam air dengan konsentrasi 1 – 10 %.

- c) Span 60 (Anonim, 1986; Anonim, 1979)

Rumus molekul : $C_{7}H_{13}O_{3}$

Span adalah senyawa derivat sorbitan, yang digunakan sebagai emulgator, nonionik surfaktan, pensuspensi dan pembasah. Biasanya digunakan dalam kosmetik, produk makanan dan formulasi farmasetik sebagai lipofilik nonionik surfaktan. Span merupakan bahan yang tidak toksik dan tidak mengiritasi. Pemerian serbuk hablur licin, putih, bau khas. Sukar larut dalam air, larut dalam etanol (95 %) P dan dalam eter P.

- d) Setil alkohol (Lachman, 1994; Anonim, 1986)

Rumus molekul : $C_{16}H_{34}O$

Setil alkohol dalam krim digunakan sebagai pengemulsi dan bahan peras dalam sediaan topikal (krim). Setil alkohol dapat meningkatkan viskositas krim dan dapat meningkatkan kestabilan sediaan. Sebagai bahan pengeras konsentrasi umum yang digunakan 2 – 10 % dan sebagai bahan pengemulsi digunakan 2 – 5 %. Kelarutannya sangat mudah larut dalam etanol 95 % dan eter. Kelarutannya akan meningkat jika suhu dinaikkan. Titik lelehnya 45 – 52 ° C.

2. Bahan humektan

- Gliserin (Anonim, 1986; Anonim, 1979)

Rumus molekul : $C_{3}H_{8}O_{3}$

Gliserin bersifat higroskopis. Dalam formulasi farmasetika dalam berbagai sediaan, gliserin biasanya ditambahkan. Dalam sediaan formulasi topikal dan kosmetik, gliserin biasanya digunakan sebagai emolien, humektan dan juga bahan pengawet. Fungsi gliserin sebagai humektan adalah untuk mempertahankan tingkat kandungan air dalam produk, dengan mengurangi penguapan air selama pemakaian sehingga krim lebih mudah menyerap dan pembentukan dalam wadah yang dikemas dapat dihindari. Kelarutannya sedikit larut dalam aseton; praktis tidak larut dalam benzen dan kloroform; dapat bercampur etanol dan metanol; praktis tidak larut dalam minyak.

3. Bahan Emolien

Parafin cair (Anonim, 1986)

Parafin dalam sediaan topikal digunakan untuk ,meningkatkan titik leleh atau meningkatkan pengerasan (bahan pengeras). Kelarutan larut dalam kloroform, eter campuran minyak, sedikit larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam etanol 95 %, aseton dan air. Parafin tidak menyebabkan toksik maupun iritasi.

4. Bahan pengawet

a) Propil paraben (Anonim, 1986)

Rumus molekul : $C_{10}H_{12}O_3$

Propil paraben digunakan sebagai bahan pengawet. Aktivitas antimikroba ditunjukkan pada pH antara 4 – 8. Secara luas digunakan digunakan sebagai bahan pengawet dalam kosmetik, makanan dan produk farmasetika. Penggunaan kombinasi paraben dapat

meningkatkan aktivitas antimikroba. Kelarutannya sangat larut dalam aseton dan eter, mudah larut dalam etanol dan metanol, sangat sedikit larut dalam air. Titik didih 295 ° C.

b) Metil paraben (Anonim, 1986)

Rumus molekul : $C_8H_8O_3$

Metil paraben dalam formulasi farmasetika, produk makanan, dan terutama dalam kosmetik biasanya digunakan dalam pengawet. Dapat digunakan sendiri maupun dikombinasikan dengan jenis paraben lain. Efektivitas pengawet ini memiliki rentang pH 4 – 8. Dalam sediaan topikal konsentrasi yang umum digunakan 0,02 - 0,3 %. Kelarutan yaitu larut dalam etanol 95 % (1:3), eter (1:10) dan metanol.

4. Aquades (air suling) (Anonim, 1979; Anonim, 1986)

Rumus molekul : H_2O

Aquades adalah air murni yang diperoleh dengan cara penyulingan. Air murni dapat diperoleh dengan cara penyulingan, pertukaran ion asmosisi terbalik atau dengan cara yang sesuai. Air murni lebih bebas kotoran maupun mikroba. Air murni digunakan dalam sediaan – sediaan yang membutuhkan air terkecuali untuk parenteral, aquades tidak dapat digunakan.

D. Tabir surya

Sinar matahari terdiri dari berbagai spektrum dengan panjang gelombang yang berbeda, dari inframerah yang terlihat hingga spektrum

ultraviolet. Panjang gelombang sinar ultraviolet dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu (Anonim, 1985) :

1. Ultraviolet A (UV A) yaitu sinar dengan panjang gelombang antara 400 – 315 nm dengan efektivitas tertinggi pada 340 nm, dapat menyebabkan warna coklat pada kulit tanpa menimbulkan kemerahan dalam bentuk leuko yang terdapat pada lapisan atas.
2. Ultraviolet B (UV B) yaitu sinar dengan panjang gelombang antara 315 – 280 nm dengan efektivitas tertinggi pada 297,6 nm, merupakan daerah eritemogenik, dapat menimbulkan sengatan surya dan terjadi reaksi pembentukan melanin awal.
3. Ultraviolet C (UV C) yaitu sinar dengan panjang gelombang di bawah 280 nm, dapat merusak jaringan kulit, tetapi sebagian besar telah tersaring oleh lapisan ozon dalam atmosfer.

Secara alami, kulit sudah berusaha melindungi dirinya beserta organ-organ dibawahnya dari bahaya sinar UV matahari, antara lain dengan membentuk butir-butir pigmen kulit (melanin) yang sedikit banyak memantulkan kembali sinar matahari. Jika kulit terpapar sinar matahari, misalnya ketika seseorang berjemur, maka timbul 2 tipe reaksi melanin (Tranggono, 2007) :

1. Penambahan melanin dengan cepat ke permukaan kulit.
2. Pembentukan tambahan melanin baru.

Terbukti secara ilmiah bahwa sinar matahari secara langsung dapat menyebabkan berbagai macam penyakit kulit yang berbahaya bagi manusia, diantaranya adalah (Baswedan 2007; Anonim, 1985) :

1. *Sunburn* (terbakar sinar matahari)

Sunburn terjadi akibat sengatan matahari yang kadarnya melebihi daya tahan kulit terhadap UV, seperti luka bakar karena api baik gejala maupun tingkatannya. *Sunburn* terjadi pada orang berkulit cerah setelah terkena terik matahari kurang dari seperempat jam. Sedangkan orang berkulit coklat (gelap) mampu bertahan di bawah terik matahari yang sama selama 3 – 9 jam. Gejala *sunburn* tidak nampak seketika setelah terkena sinar matahari, akan tetapi setelah beberapa waktu. Gejalanya bermula dari rasa perih dan muncul warna merah. Rasa perih akan mencapai puncaknya setelah 6 – 48 jam tersengat matahari. Umumnya terjadi pembengkakan kulit terutama kulit kaki, biasanya terik matahari diiringi hembusan hawa panas dan hal ini kadang mengakibatkan demam.

2. *Solar keratoses* (Peradangan kulit luar karena matahari)

Bentuknya seperti sisik – sisik kasar yang nampak pada bagian kulit yang terbakar. Keadaan ini dapat berkembang menjadi kanker kulit yang menyerang sel gepeng (*squamous cell*). Radang juga sering dijumpai pada tempat – tempat yang berulang kali terkena sengatan matahari, terutama punggung tangan dan wajah. Bagian wajah yang sering radang adalah hidung, tonjolan pipi, bibir atas dan dahi. Penyakit ini lebih sering terjadi pada orang yang bekerja di area terbuka dalam jangka waktu lama. Pencegahan dapat dilakukan dengan melindungi kulit dari radiasi UV.

3. *Solar Urticaria* (gatal – gatal karena matahari)

Penyakit ini terjadi pada laki – laki maupun perempuan, namun jarang terjadi. Kebanyakan kasus terjadi sebelum usia 40 tahun. Gejalanya

langsung nampak seketika setelah terkena sengatan matahari. Penyakit ini biasa menyerang wajah dan punggung tangan. Kondisi ini akan semakin parah seiring dengan makin lamanya seseorang terkena sengatan matahari.

4. *Photosensitivity* (kulit sensitive terhadap matahari)

Sifat sensitif pada cahaya terjadi akibat reaksi tak wajar, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, antara kulit dan cahaya. Yang paling umum didapati ialah reaksi antara sinar UV jenis B dengan sel – sel kulit. Efek yang timbul ialah kudis berwarna merah yang membengkak dan menimbulkan rasa nyeri. Hal ini dapat berlangsung dalam beberapa hari hingga berminggu – minggu.

5. Kanker kulit

Semua jenis kanker kulit adalah akibat dari terkena sinar matahari, terutama saat terik matahari dari pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore. Para ilmuwan meyakini bahwa sinar UV dapat merusak DNA dalam sel – sel kulit dan mengubahnya menjadi tumor kanker. Adapun daerah yang paling potensial terkena kanker kulit ialah wajah, telapak tangan, lengan dan betis. Kulit – kulit yang terkena *sunburn* lebih potensial terkena kanker kulit. Seperti mereka yang menjemur tubuhnya dalam keadaan telanjang secara berkala (*sunbath*). Sinar – sinar tersebut dapat merusak atau minimal melemahkan sel – sel antibodi yang tersebar di permukaan kulit. Akibatnya, pertumbuhan tumor kanker pun semakin ganas. Sinar – sinar tersebut juga berpengaruh pada kesehatan kulit dan kecantikannya.

6. *Squamous cell carcinoma* (kanker sel gepeng/sel squamo)

Penyakit ini tergolong kanker kulit yang paling luas penyebarannya. Penderitanya kebanyakan orang yang sensitif terhadap matahari. Penyakit ini dimulai dari peradangan kulit akibat terkena sinar matahari. Penyakit ini di mulai dari timbulnya sisi – sisi kecil yang muncul di wajah, telinga, dan tangan orang kulit putih, yang selama bertahun – tahun berjemur sambil telanjang di bawah sinar matahari.

7. *In Situ squamous cell carcinoma* (kanker sel gepeng yang terlokalisir)

Juga dikenal dengan nama Bonz. Sel – sel kankernya berkonsentrasi pada bagian luar kulit saja, luasnya berkisar antara satu hingga beberapa sentimeter. Penyebab utama dari kanker parsial ini adalah terkena sinar matahari yang mengandung UV.

8. *Melanoma*

Penyakit kanker yang berbahaya yang dapat diobati jika diketahui sejak dini. Ia merupakan pertumbuhan sel – sel kromatin pada lapisan luar kulit dan lapisan di bawahnya secara tak terkendali. Seperti halnya kanker lainnya, jenis ini mulanya seperti penyakit kulit, kemudian menyebar ke tempat – tempat lainnya seperti mata, mulut, dan otak. Penyakit ini dapat menjangkiti semua umur, namun kebanyakan yang berumur 50 – 70 tahun. Korban yang meninggal dunia karenanya mencapai ratusan tiap tahun. Penyebab utama penyakit ini karena sering terkena sinar matahari ketika kanak – kanak.

Semakin meningkatnya kasus kanker kulit yang diakibatkan oleh sengatan sinar ultraviolet dari matahari memerlukan usaha pencegahan

yang tidak saja dilakukan secara umum (melalui program kesehatan), tetapi juga secara khusus oleh masing – masing individu.

Secara artifisial, ada dua cara perlindungan kulit, yaitu (Tranggono, 2007) :

1. Perlindungan secara fisik

Misalnya memakai payung, topi lebar, baju lengan panjang, celana panjang, serta pemakaian bahan-bahan kimia yang melindungi kulit dengan cara memantulkan sinar yang mengenai kulit, misalnya titanium dioksida, zink oksida, kaolin, kalsium karbonat, magnesium karbonat, talcum, silisium dioksida, dan bahan-bahan lainnya.

2. Perlindungan secara kimiawi dengan memakai bahan kimia

a) Bahan yang menimbulkan dan mempercepat proses penggelapan kulit (tanning). Misalnya dioxy acetone dan 8-methoxy psoralen yang dikonsumsi 2 jam sebelum berjemur. Bahan ini mempercepat pembentukan pigmen melanin dipermukaan kulit. Bahan-bahan tersebut mengabsorpsi radiasi sinar UVB sekurang-kurangnya 85 % pada panjang gelombang 290 – 320 nm tetapi meneruskan sinar UV A pada panjang gelombang lebih dari 320 nm dan menyebabkan sedikit warna coklat sementara pada kulit.

b) Bahan yang menyerap UV B tetapi meneruskan UV A ke dalam kulit. Misalnya *para amino benzoic acid* (PABA) dan derivatnya, *derivat cinnamates, anthranilates, benzophenon, digalloyl triolate* dan *petrolatum*, veteriner merah. Tapi perlu diingat dan sejumlah bahan tersebut bersifat photosensitizer yaitu jika terkena terik matahari seperti halnya di negara tropis Indonesia dapat menimbulkan berbagai

reaksi negatif pada kulit, seperti *photoallergy*, *photo toxic*, disamping pencoklatan kulit tannin yang tidak disukai oleh orang asia yang menyukai kulit putih.

c) Bahan pencegah efek terbakar sinar matahari (*sunburn*)

Didefinisikan sebagai *sunscreen* yang mengabsorpsi radiasi sinar UV B 95 % atau lebih pada panjang gelombang 290 – 329 nm. Dalam beberapa hal tabir surya yang sama dapat bekerja pada proses *suntannin* dan mencegah efek *sunburn* sekaligus tetapi pada konsentrasi yang berbeda (konsentrasi pada produk *suntan* lebih rendah).

Penentuan aktivitas tabir surya dilakukan dengan cara menghitung nilai SPF dari sediaan. Pada penelitian ini, untuk menghitung nilai SPF tersebut dilakukan pengujian secara *in vitro* menggunakan metode spektrofotometri.

Pathak membagi tingkat kemampuan tabir surya sebagai berikut

(Wasitaatmadja, 1997) :

1. Minimal, bila SPF antara 2 – 4, contoh salisilat, antranilat
2. Sedang, bila SPF antara 4 – 6, contoh sinamat, bensofenon
3. Ekstra, bila SPF antara 6 – 8, contoh derivate PABA
4. Maksimal, bila SPF antara 8 – 15, contoh PABA
5. Ultra, bila SPF lebih dari 15, contoh kombinasi PABA, non PABA dan fisik.

Sun protection factor (SPF) didefinisikan sebagai suatu perbandingan antara pajanan UV yang dibutuhkan untuk menghasilkan eritema minimal (MED) pada kulit yang dilindungi dan pajanan yang dapat menghasilkan

eritema yang sama pada kulit yang tidak dilindungi. Metode SPF merupakan metode resmi Amerika Serikat. *Food Drug Administration* (FDA) mensyaratkan produk tabir surya harus mencantumkan nilai SPF-nya, untuk memberikan arahan pada konsumen mengenai kekuatan relatif dari produk tersebut (Shaath, 1990; Purwanti, 2004).

Daya tahan kulit terhadap sinar matahari dinyatakan MED (*minimum erythema dose*) yaitu keadaan kulit di bawah sinar matahari (tanpa tabir surya) sebelum mengalami tanda kemerahan (Purwanti, 2004).

MED (*minimum erythema dose*) berdasarkan warna kulit (Purwanti, 2004) :

1. Tipe 1 : Blondi, rambut pirang kemerahan, mata biru/hijau, bertahan 10 – 20 menit.
2. Tipe 2 : Kulit putih, rambut pirang kekuningan, mata biru/coklat, bertahan 15 – 30 menit.
3. Tipe 3 : Kulit kuning langsung, rambut coklat, mata coklat, dapat bertahan 20 – 40 menit.
4. Tipe 4 : Kulit coklat muda, rambut hitam, mata coklat tua, dapat bertahan 25 – 50 menit.
5. Tipe 5 : Kulit sawo matang, rambut hitam, mata coklat tua, dapat bertahan 30 – 60 menit.
6. Tipe 6 : Kulit hitam, rambut hitam, mata hitam, bertahan 40 – 75 menit.

Sun protection factor (SPF) yang tercantum dalam tabir surya menunjukkan kemampuan tabir surya melindungi kulit. Tabir surya dengan SPF menyatakan lamanya kulit seseorang berada di bawah sinar matahari tanpa mengalami luka bakar. Sedangkan angka SPF menyatakan berapa kali

daya tahan alami kulit seseorang dilipat gandakan sehingga aman dibawah sinar matahari tanpa terkena luka bakar. Faktor protektif sinar (SPF) menunjukkan kelipatan peningkatan toleransi terhadap kontak dengan sinar matahari dengan penggunaan produk ini tanpa menimbulkan eritema. Dengan perkataan lain, SPF 8 akan mengizinkan orang yang biasa menderita eritema setelah berkontak 20 menit untuk bertahan 160 menit terhadap sinar matahari. (Landow K, 1984;Purwanti, 2004).

Syarat – syarat bagi preparat kosmetik tabir surya yaitu (Tranggono, 2007) :

1. Enak dan mudah dipakai.
2. Jumlah yang menempel mencukupi kebutuhan.
3. bahan aktif dan bahan dasar mudah bercampur.
4. Bahan dasar harus dapat mempertahankan kelembutan dan kelembaban kulit.

Syarat – syarat bahan aktif untuk preparat tabir surya yaitu (Tranggono, 2007):

1. Efektif menyerap radiasi UV B tanpa perubahan kimiawi, karena jika tidak demikian, akan mengurangi efesiensi bahkan menjadi toksik atau menimbulkan iritasi.
2. Meneruskan UV A untuk mendapatkan tannin.
3. Stabil, yaitu tahan keringat dan tidak menguap.
4. Mempunyai daya larut yang cukup untuk mempermudah formulasinya.
5. Tidak berbau atau boleh berbau ringan.
6. Tidak toksik, tidak mengiritasi, dan tidak menyebabkan sensitisasi.

Tabir surya (*sunscreen* atau *sunblock*) atau UV filter, memiliki 2 mekanisme utama yaitu (Draelos, 2006; Salvador, 2007) :

1. Menghamburkan dan memantulkan energi sinar UV
2. Mengabsorpsi energi sinar UV

Sangat banyak tabir surya mengandung bahan – bahan yang bekerja dengan mekanisme ini yang dikenal dengan istilah *UV protection*. Pada awalnya tabir surya didesain untuk melindungi pemakainya pada saat ke pantai. Saat ini, produk yang sama digunakan pula oleh mereka yang melakukan olahraga salju, sejak sinar matahari menunjukkan efek terhadap kulit yang dapat dilihat pada pantulan dipermukaan salju. Sekarang ini UV filter digunakan bersama dengan produk yang digunakan sehari – hari, seperti krim pelembab dan produk perawatan rambut, produk *aftershave*, lipstik atau produk *make up*.

Dalam beberapa hal tabir surya yang sama dapat bekerja pada proses *suntanning* dan mencegah efek *sunburn* sekaligus tetapi pada konsentrasi yang berbeda (konsentrasi pada produk *suntan* lebih rendah). Meski sebenarnya tubuh telah dilengkapi dengan sistem pertahanan seperti lapisan tanduk, melanin, dan antioksidan tapi pada tingkat radiasi tinggi, mekanisme proteksi ini dapat dilampaui, sehingga perlu ditambahkan pelindung dari luar. Selain pakaian, sistem pertahanan buatan dari luar yang efektif ialah tabir surya (Tranggono, 2007).

Karakteristik yang harus dimiliki oleh senyawa tabir surya antara lain adalah senyawa tabir surya harus mempunyai absorpsi pada ultraviolet berkisar 280 – 360 nm, dapat mengabsorpsi radiasi UV secara maksimum, tidak larut atau kelarutannya kecil di dalam air, tidak toksik, tidak fototoksik, dan tidak mensensitasi. Senyawa tabir surya harus dapat tercampurkan dengan pembawa kosmetik, mudah digunakan, dan tidak mahal (Shaath, 1990).

E. Uraian Tumbuhan Daun sendok (*Plantago mayor L.*)

1. Klasifikasi (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991; Wijayakusuma, 1994)

Dunia	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Kelas	: Dicotyledoneae
Bangsa	: Plantaginales
Suku	: Plantaginaceae
Marga	: Plantago
Jenis	: <i>Plantago mayor L.</i>

2. Nama Asing dan Daerah (Anonim, 2008; Wijayakusuma, 1994)

Indonesia	: Daun sendok, Ki urat, ceuli, ceuli uncal (sunda); meloh, kiloh, otot-otot, sangkabuah, sangkuah, sembung otot, suri pandak (jawa); daun urat, daun urat-urat, ekor angin, kuping menjanggan (sumatera); torongoat (minahasa); raungsinru' (Makassar).
Inggris	: Common Plantain, broad-leaved plantain
Melayu	: Ekor anjing, ekor angin
Pilipina	: Lanting
Cina	: Che qian cao

3. Morfologi (Anonim, 2008; Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991)

Tumbuhan daun sendok (*Plantago mayor L.*) adalah tumbuhan yang berasal dari daratan Asia dan Eropa, dapat ditemukan di dataran rendah sampai ketinggian 3.300 m di atas permukaan laut. Tumbuhan obat

ini tersebar luas di dunia dan telah dikenal sejak dahulu kala serta merupakan salah satu dari 9 tumbuhan obat yang dianggap sakral di Anglo Saxon. Tumbuhan ini merupakan gulma di perkebunan teh dan karet, atau tumbuh liar di hutan, ladang, dan halaman berumput yang agak lembap, kadang di tanam dalam pot sebagai tumbuhan obat. Merupakan terna tahunan, tumbuh tegak, semusim, tinggi 6 – 50 cm. Batangnya pendek, bulat, berwarna coklat. Daun tunggal, bertangkai Panjang, tersusun dalam roset akar, berbentuk bundar telur sampai lanset melebar, tepi rata Atau bergerigi kasar tidak teratur, permukaan licin atau sedikit berambut, pertulangan melengkung, panjang 5-10 cm, lebar 4-9 cm, dan berwarna hijau. Bunga majemuk, tersusun dalam bulir yang panjangnya sekitar 30 cm, ukuran kecil, dan berwarna putih. Buah berbentuk lonjong atau bulat telur, berisi 2 – 4 biji, keriput dan berwarna hitam.

4. **Kandungan Kimia (Anonim, 2008; Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991; Samuelsen, 2000)**

Tanaman *Plantago mayor* mengandung senyawa – senyawa bioaktif seperti polisakarida, lipid, turunan asam kafein, flavonoid, glikosida iridoid, dan terpenoid. Alkaloid dan beberapa asam organik juga terdeteksi. Kandungan kimia utama tanaman ini adalah saponin, flavonoid dan polifenol. Herba mengandung plantagin, aukubin, asam ursolik, beta-sitosterol, n-hentriakontan dan plantagluside yang terdiri atas methyl D-galakturonat, D-galaktosa, L-arabinosa, dan L-rhamnosa. Juga mengandung tanin, kalium dan vitamin (B1, C dan A). Biji daun sendok mengandung asam planterolik, plantasan (dengan komposisi xylosa,

arabinosa, asam galakturonat dan rhamnosa), protein, *mucilago, aucubin, asam suksinat, adenin, kolin, katalpol, syringin, asam lemak (palmitat, stearat, arakidat, oleat, linoleat dan lenoleat)*, serta *flavanon, glikosida*. Bagian akar mengandung *naphazolin*.

5. Kegunaan (Anonim, 2008; Pangemanan, 1999)

Tanaman *Plantago major* dimanfaatkan untuk memelihara metabolisme air (diuretik), memperbaiki gangguan saluran kemih, Kalium yang terkandung dalam herba daun sendok bersifat peluruh kencing dan melarutkan endapan garam kalsium yang terdapat dalam ginjal dan kandung kencing. Zat aktif *aukubin* selain berkhasiat melindungi hati dari pengaruh zat racun yang dapat merusak sel-sel hati (*hepatoprotektor*).

Tanaman ini juga berkhasiat untuk mengobati luka akibat gigitan serangga dan ular. Perakarannya bermanfaat untuk mengatasi batuk. Rebusan daunnya dapat mengobati panas, luka memar, sariawan, gonorrhoea, obat tetes mata, obat kumur untuk gusi bengkak, menurunkan panas, menjernihkan mata, membersihkan paru – paru, mengencerkan dahak, mengobati luka, peluruh air seni dan keringat, serta mengobati malaria dan sakit telinga. Bijinya berguna untuk mengobati disentri dan diare (Michaelsen dkk, 2000; Sudarsono dkk, 2002).

Ekstrak *Plantago major* memiliki beberapa aktivitas biologi seperti antiinflamasi, antimikrobia (antibiotik) dan antikanker hingga obat luka dan analgesik. Termasuk pennyakit yang berhubungan dengan radang kulit, organ pernafasan, organ pencernaan, organ reproduksi, dan peredaran darah, dan melawan infeksi. Kemampuan ekstrak tanaman ini

untuk meningkatkan daya tahan tubuh (*Immunitas*) secara klinis berpotensi untuk mengobati penyakit akibat infeksi virus, *tuberculosis*, AIDS, dan kanker (Karvilovskaia dkk, 1989; Lithander, 1992; Gomez-Flores, 2000).

F. *Infusa*

Ekstraksi adalah pemisahan suatu zat dari campurannya dengan pembagian sebuah zat terlarut antara dua pelarut yang tidak dapat tercampur untuk mengambil zat terlarut tersebut dari satu pelarut ke pelarut yang lain. Seringkali campuran bahan padat dan cair (misalnya bahan alami) tidak dapat atau sukar sekali dipisahkan dengan metode pemisahan mekanis atau termis. Misalnya saja, karena komponennya saling bercampur secara sangat erat, peka terhadap panas, beda sifat-sifat fisiknya terlalu kecil, atau tersedia dalam konsentrasi yang terlalu rendah. Dalam hal semacam itu, seringkali ekstraksi adalah satu – satunya proses yang dapat digunakan atau yang mungkin paling ekonomis (Anonim 1986, Anonim 1979).

Infundasi adalah proses penyarian yang umumnya digunakan untuk menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan nabati. Penyarian adalah peristiwa memindahkan massa zat aktif yang semula berada di dalam sel ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif larut dalam cairan penyari. Penyarian dengan cara ini menghasilkan sari yang tidak stabil dan mudah tercemar oleh kuman dan kapang. Oleh sebab itu, sari yang diperoleh dengan cara ini tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam. Faktor yang mempengaruhi kecepatan penyarian adalah kecepatan difusi zat yang larut melalui lapisan – lapisan batas antara cairan penyari dengan bahan yang mengandung zat tersebut (Anonim, 1986; Anonim, 1979; Ansel, 1989).

Sistem pelarut yang digunakan dalam ekstraksi harus dipilih berdasarkan kemampuannya dalam melarutkan jumlah maksimal zat aktif dan

seminimal mungkin zat yang tidak digunakan. Farmakope Indonesia menetapkan untuk proses penyarian sebagai cairan penyari digunakan air, etanol-air, eter. Penyarian pada pembuatan obat di Indonesia masih terbatas pada penggunaan cairan penyari air, etanol atau etanol air (Anonim, 1979).


Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia nabati dengan air pada suhu 90°C selama 15 menit. Simplisia dengan derajat halus yang cocok dalam panci dengan air secukupnya, yang dipanaskan di atas tangas air selama 15 menit terhitung mulai suhu mencapai 90°C . Simplisia ialah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga kecuali dinyatakan lain, berupa bahan yang telah dikeringkan. Infusa dibuat dengan cara membasahi bahan bakunya, biasanya dengan air dua kali bobot bahannya. Penyaringan dilakukan pada saat cairan masih panas dengan kain flanel, kecuali bahan yang mudah menguap (Anonim, 1986; Anonim, 1979).

G. *Spektrofotometer UV-Vis*

Pengukuran dan pengujian aktivitas senyawa-senyawa tabir surya dapat dilakukan dengan banyak cara yakni pengujian secara *in vitro* dan *in vivo*. Pengujian aktivitas serapan sinar UV secara *in vitro* dapat dilakukan dengan teknik spektroskopi UV yang diukur pada rentang panjang gelombang sinar UV (200 - 400 nm). Pengukuran lain yang langsung diujikan pada sel biologis adalah teknik analisis *in vivo* yang dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan pengamatan eritema akibat terkena paparan sinar UV dan dibandingkan dengan suatu kontrol.

Spektrofotometer adalah alat untuk mengukur transmittansi atau serapan suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Alat ini terdiri dari spektrometer yang menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu dan fotometer sebagai alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsi (Khopkar, 1990; Day and Underwood, 1981).

Unsur-unsur suatu spektrofotometer ditunjukkan secara skematik dalam gambar berikut:



Gambar 2. Unsur – unsur spektrofotometer

Berikut ini adalah uraian bagian-bagian spektrofotometer (Khopkar, 1990; Rohman, 2007; Day and Underwood, 1981):

1. Sumber-sumber lampu, lampu deuterium digunakan untuk daerah UV pada panjang gelombang dari 190 – 350 nm, sementara lampu halogen kuarsa atau lampu tungsten digunakan untuk daerah visibel (pada panjang gelombang antara 350 – 900 nm).

2. Monokromator, digunakan untuk memperoleh sumber sinar yang monokromatis. Alatnya dapat berupa prisma ataupun grating. Untuk mengarahkan sinar monokromatis yang diinginkan dari hasil penguraian.
3. Kuvet, pada pengukuran di daerah tampak, kuvet kaca atau kuvet kaca corex dapat digunakan, tetapi untuk pengukuran pada daerah UV kita harus menggunakan sel kuarsa karena gelas tidak tembus cahaya pada daerah ini. Umumnya tebal kuvet adalah 10 mm, tetapi yang lebih kecil ataupun yang lebih besar dapat digunakan. Sel yang biasa digunakan berbentuk persegi, tetapi bentuk silinder juga dapat digunakan. Kuvet yang bertutup digunakan untuk pelarut organik. Sel yang baik adalah kuarsa atau gelas hasil leburan yang homogen.
4. Detektor, peranan detektor penerima adalah memberikan respon terhadap cahaya pada berbagai panjang gelombang.
5. Suatu amplifier (penguat) dan rangkaian yang berkaitan yang membuat isyarat listrik dapat untuk diamati.
6. Sistem pembacaan yang memperlihatkan besarnya isyarat listrik.

Spektrofotometri merupakan metode analisis yang didasarkan pada absorpsi radiasi elektromagnet. Cahaya terdiri dari radiasi terhadap mana mata manusia peka, gelombang dengan panjang berlainan akan menimbulkan cahaya yang berlainan sedangkan campuran cahaya dengan panjang-panjang ini akan menyusun cahaya putih. Cahaya putih meliputi seluruh spektrum nampak 400 – 760 mm. Keuntungan utama pemilihan metode

spektrofotometri bahwa metode ini memberikan metode sangat sederhana untuk menetapkan kuantitas zat yang sangat kecil (Anonim, 1979).

Spektrum UV-Vis merupakan hasil interaksi antara radiasi elektromagnetik (REM) dengan molekul. REM merupakan bentuk energi radiasi yang mempunyai sifat gelombang dan partikel (foton). Karena sifat sebagai gelombang maka beberapa parameter perlu diketahui antara lain panjang gelombang, frekuensi (f), bilangan gelombang (nm), dan serapan (A). Penggunaan spektrofotometer UV-Vis digunakan terutama untuk analisa kuantitatif tetapi dapat juga untuk analisa kualitatif. Secara garis besar daerah spektrum dibagi dalam daerah ultraviolet (190 nm – 380 nm), daerah cahaya tampak (380 nm – 780 nm), daerah inframerah dekat (780 nm – 3000 nm) dan daerah inframerah (2,5 nm – 40 nm). Spektrum cahaya ultraviolet dan cahaya tampak suatu zat pada umumnya tidak mempunyai derajat spesifikasi tinggi, walaupun demikian spektrum tersebut sesuai untuk pemeriksaan kuantitatif dan untuk berbagai zat spektrum tersebut bermanfaat sebagai tambahan untuk identifikasi (Anonim, 1979).

Penetapan kadar secara kuantitatif dilakukan dengan mengukur serapan larutan zat dalam suatu pelarut pada panjang gelombang tertentu. Pengukuran serapan biasanya dilakukan pada panjang gelombang serapan maksimum. Oleh karena serapan dapat berbeda jika digunakan alat yang berbeda, maka sebaiknya pengukuran dilakukan pada panjang gelombang serapan maksimum yang diperoleh dengan alat yang digunakan. Syaratnya panjang gelombang yang diperoleh dengan alat tidak berbeda lebih dari $\pm 0,5$ nm pada daerah pengukuran 240 – 280 nm, tidak lebih dari ± 1 nm pada daerah pengukuran

280 – 320 nm serta tidak lebih dari ± 3 nm pada daerah pengukuran diatas 320 nm dari panjang gelombang yang ditentukan. Jika perbedaannya melebihi batas tersebut maka alat harus dikalibrasi. Pada pengukuran serapan suatu larutan hampir semua digunakan blanko untuk spektrofotometer agar panjang gelombang pengukuran mempunyai serapan nol. Blanko dapat berupa pelarut yang sama seperti yang digunakan untuk melarutkan zat atau blanko pereaksi menyiapkan larutan zat (Anonim, 1995).

Hukum Lambert – Beer menyatakan bahwa intensitas yang diteruskan oleh larutan zat penyerap berbanding lurus dengan tebal dan konsentrasi larutan dan berbanding terbalik dengan transmitan. Hukum tersebut dituliskan dengan (Day, 2002):

$$A = abc = \log 1/T$$

Keterangan : A = absorbans

a = koefisien ekstingsi

b = tebal sel (cm)

c = konsentrasi analit

Pada spektrofotometri sinar tampak, pengamatan mata terhadap warna timbul dari penyerapan selektif panjang gelombang tertentu dari sinar masuk oleh objek yang berwarna (Vogel, 1994).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam analisis dengan spektrofotometri ultraviolet dan cahaya tampak terutama untuk senyawa yang tidak berwarna yang akan dianalisis yaitu (Khopkar, 2002) :

1. Pembentukan molekul yang dapat menyerap sinar UV-Vis Cara yang digunakan adalah dengan merubahnya menjadi senyawa lain atau

direaksikan dengan pereaksi tertentu sehingga dapat menyerap sinar UV-Vis.

2. Waktu kerja (operating time)

Tujuannya ialah untuk mengetahui waktu pengukuran yang stabil. Waktu kerja ditentukan dengan mengukur hubungan antara waktu pengukuran dengan absorbansi larutan.

3. Pemilihan panjang gelombang

Panjang gelombang yang digunakan untuk analisis kuantitatif adalah panjang gelombang yang mempunyai absorbansi maksimal.

4. Pembuatan kurva baku

Dilakukan dengan membuat seri larutan baku dalam berbagai konsentrasi kemudian absorbansi tiap konsentrasi diukur lalu dibuat kurva yang merupakan hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi.

5. Pembacaan absorbansi sampel

Absorbansi yang terbaca pada spektrofotometer hendaknya antara 0,2 sampai 0,6.

H. Tinjauan Islam mengenai Penelitian Tanaman obat

Agama Islam mengajarkan umatnya untuk selalu hidup bersih dan sehat. Sehingga para sarjana farmasi dan ilmuwan muslim terdorong untuk menghasilkan berbagai macam kosmetika. Pengembangan produk kosmetika di dunia Islam begitu gencar dilakukan seorang dokter dan ahli bedah muslim di Andalusia, Al-Zahrawi (936 M - 1013 M) pada abad ke-10 M. Al-Zahrawi menggunakan zat minyak yang disebut Adhan untuk pengobatan dan

kecantikan. Sebagai seorang ilmuwan muslim, Al-Zahrawi menjelaskan cara perawatan dan kecantikan rambut, kulit, gigi, dan seluruh bagian tubuh dalam batas-batas ajaran Islam. Selain Al-Zahrawi, dokter muslim lainnya yang berkontribusi dalam bidang kecantikan adalah Ibnu Sina (980 M - 1037 M).

Peradaban Islam dikenal sebagai perintis dalam bidang farmasi. Para ilmuwan muslim di masa kejayaan Islam sudah berhasil menguasai riset ilmiah mengenai komposisi, dosis, penggunaan dan efek dari obat-obatan sederhana dan campuran. Selain menguasai bidang farmasi, masyarakat muslim pun tercatat sebagai peradaban pertama yang memiliki apotek atau toko obat.

Dari berbagai penelitian yang dilakukan ilmuwan muslim mengenai tanaman, kemudian lahirlah tentang pengobatan herbal. Dalam banyak literatur islam, pada abad pertengahan, kehidupan tumbuh – tumbuhan erat kaitannya dengan ilmu kedokteran dan agronomi. Adapun ilmuwan muslim yang termahsyur saat ini, seperti Abu Zakariah Yuhannah bin Masawaih (243 H/857 M), Hunain bin Ishaq (259 H/873 M), Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razzi (dilatinkan menjadi Rhazes, 311 H/1037 M) Ali bin Al Abbas Al Majusi yang dikenal dengan Ali Abbas (380 H/982 M), Abu Ali Al Husain bin Abdullah bin Sina (dilatinkan menjadi Avicenna, 428 H/1037 M), Abul Qasim Az-Zahrawi (Albucalis, 936 M), Abu Marwan Abdul Malik bin Zuhr atau Abu Zuhr (dilatinkan menjadi Avenzoor, 1092 – 1162 M), Abul Walid Muhammad bin Rusyd atau Ibnu Rusyd (dilatinkan menjadi Averroes, 1126 – 1198 M), Muhammad Abdullah bin Al Baythar, dikenal dengan Al

Bator (1197 – 1294 M). Mereka banyak menghasilkan karya – karya dalam bidang pengobatan maupun kedokteran (Sunardi, 2008).

Kesehatan merupakan sumber daya yang paling berharga, serta kekayaan yang paling mahal harganya. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa agama tidak memiliki kepedulian terhadap kesehatan manusia. Anggapan semacam ini didasari oleh pandangan bahwa agama hanya memperhatikan aspek-aspek rohaniah belaka tanpa mengindahkan aspek jasmaniah. Agama hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat ukhrawi dan lalai terhadap segala sesuatu yang bersifat duniawi. Anggapan seperti ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Sebab pada kenyataannya Islam merupakan agama yang memperhatikan dua sisi kebaikan yaitu kebaikan duniawi dan ukhrawi.

Para ahli dalam bidang ini mengetahui formula obat-obatan, karakteristik dan cara penggunaannya. Diiringi dengan keyakinan mereka bahwa obat itu hanya penyebab perantara kesembuhan saja. Dan Allah lah yang menjadikan penyebab itu semua. Oleh karena itu, hukumnya boleh mempelajari ilmu pengobatan ini dan berobatlah dengannya (Ar-Rumaikhon, 2008).

Sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً أَنْزَلَ لَهُ

()

Artinya :

Dari Abu Hurairah Ra. dari Nabi Saw. bersabda; Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia Juga menurunkan obatnya. (HR. Al-Bukhari)

Selain itu, terdapat pula hadis yang diriwayatkan pula oleh Muslim dari Jabir ra. bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءٌ

()

Artinya :

Dari Jabir dari Rasulullah Saw. bersabda: Setiap penyakit ada obatnya, maka apabila didapati obat yang cocok untuk menyembuhkan sesuatu penyakit itu akan hilang dengan seizin Allah ‘Azza wajallah. (HR. Muslim)

Hadits – hadits nabi tentang pengobatan dipakai sebagai dasar pijakan untuk melakukan berbagai macam pengobatan penyakit dan pentingnya Penemuan obat – obat yang belum ditemukan serta perintah untuk memikirkan tubuh manusia (Sunardi, 2008).

Dalam pandangan Islam dijelaskan bahwa segala ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia termasuk tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam yang memerlukan penelitian.

Allah berfirman dalam QS. Thaha, ayat 53 :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَوَّاهُ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ ثَمَرَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

Terjemahnya :

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan – jalan, dan yang menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan dengan air hujan itu berjenis – jenis dari tumbuh – tumbuhan yang bermacam – macam.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa banyak jenis tumbuhan yang mampu tumbuh di bumi ini dengan adanya air hujan, banyak jenis tumbuhan yang dikemukakan sebelumnya, ada tumbuhan yang tergolong ke dalam tumbuhan tingkat rendah yaitu tumbuhan yang tidak jelas bagian akar, batang dan daunnya. Golongan selanjutnya lebih mengalami perkembangan adalah tumbuhan tingkat tinggi yaitu tumbuhan yang bisa dibedakan secara jelas bagian daun, batang dan akarnya. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah bagian daun, batang, akar, rimpang, buah dan bijinya.

Sebagaimana firman Allah dalam QS Luqman ayat 10 :

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَآلْفَىٰ فِي الْأَرْضِ رِوَامِي ۚ أَن تَمِيدَ
بِكُمْ وَتَنَّتْ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَخْرَجْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ
شَيْءٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

Artinya :

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di Permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala yang diciptakan di bumi ini termasuk tumbuh – tumbuhan ada manfaatnya, tugas manusia mencari dan meneliti manfaat dari tumbuhan tersebut. Dari ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh – tumbuhan, hewan maupun mineral. Dimana ketiganya telah dijelaskan di dalam Al Quran mengandung suatu zat/obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan manusia dari penyakit. Meskipun tidak semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah SWT di bumi dapat menyembuhkan penyakit tertentu (Savitri, 2008).



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Alat dan Bahan Penelitian

1. Alat

Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari gelas piala (Pyrex), Timbangan analitik (Adam AFA – 210 LC), Vortex, Termometer, Sentrifugator (Kubota 2500), Spektrofotometer UV-Vis (Janway 6505), penangas air, Rotary Evaporator, mixer, panci infusa.

2. Bahan

Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Sampel daun sendok, asam stearat, setil alkohol, Parafin cair, tween 60, span 60, gliserin, metil paraben, propil paraben, air suling, etanol, penyaring Whatman.

B. Prosedur Penelitian

1. Pengambilan Sampel

Sampel penelitian berupa daun sendok yang diambil di gunung Bonto Jonga, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng. Pengambilan daun sendok dilakukan secara manual. Waktu pengambilan sampel pada pagi hari.

2. Pengolahan Sampel (Sugihartini, 2005)

Sampel penelitian yang telah diambil dibersihkan dari kotoran kemudian dicuci dengan air mengalir kemudian dikeringkan di udara terbuka tanpa terkena cahaya matahari langsung, Kemudian diserbukkan.

Ditimbang Serbuk simplisia 10 g dan tambahkan air hingga 100 ml, dimasukkan dalam panci. kemudian dipanaskan hingga mencapai 90 ° C di atas tangas air selama 15 menit, sambil sekali – sekali diaduk. Diserkai selagi panas melalui kain flanel.

Filtrat yang diperoleh, diuapkan di atas penangas air sampai kental kemudian ditambahkan etanol berkali-kali sehingga larutan etanol terakhir tidak berwarna lagi kemudian disentrifugasi. Filtrat dievaporasi sampai hampir kering (selanjutnya disebut fraksi etanol).

6. Formulasi krim

a) Rancangan formula krim

Tabel 1. Rancangan formula krim

No.	Bahan	Konsentrasi (%)		
		3	6	12
1	Fraksi etanol daun sendok	3	6	12
2	Asam stearat	14	14	14
3	Setil alcohol	2	2	2
4	Parafin cair	5	5	5
5	Tween 60	3	3	3
6	Span 60			
7	Gliserin	12	12	12
8	Propil Paraben	0,05	0,05	0,05
9	Metil Paraben	0,1	0,1	0,1
10	Air Suling hingga	70	70	70

b) Pembuatan Krim

Bahan yang merupakan fase minyak yaitu asam stearat, setil alkohol, span 60 dan paraffin cair dimasukkan dalam cawan porselen di atas penangas air pada suhu 70 ° C sambil diaduk sampai homogen. Propil paraben dimasukkan ke dalam leburan fase minyak. Suhu dipertahankan 70 ° C, Kemudian bahan yang merupakan fase air yaitu gliserin, tween 60 dilarutkan pada air panas sambil diaduk hingga homogen. Kemudian metil paraben dilarutkan dalam air panas, aduk hingga larut, lalu dicampurkan pada fase air yang telah homogen. Dicampur fase minyak dan fase air, aduk dengan pengaduk mekanik hingga terbentuk corpus emulsi. Kemudian dimasukkan fraksi etanol daun sendok, diaduk hingga homogen lalu didinginkan.

4. Penentuan Efektifitas Sediaan

Penentuan efektivitas sediaan tabir surya dilakukan dengan menentukan nilai SPF secara *in vitro* dengan metode spektrofotometri. Prosedur dilakukan terhadap fraksi etanol daun sendok (dibuat pengenceran hingga kadar dalam kuvet 10mg/l).

Ditimbang dengan seksama kurang lebih 125 mg sediaan, ditambahkan etanol 90 % hingga 10 ml, sonikasi 15 menit. Diencerkan 1 ml suspensi dengan etanol hingga 10 ml (enceran 1). Diencerkan 1 ml enceran 1 dengan etanol 90 % hingga 10 ml. Disaring dengan kertas Whatman, ambil filtrate (larutan uji 1).

Dibuat kurva serapan larutan uji dalam kuvet 1 cm antara 290 dan 360 nm, digunakan etanol 90% sebagai blangko. Ditetapkan serapan rata-ratanya. Dihitung serapan rata-rata larutan uji dengan rumus :

Area dibawah kurva = Luas trapezium

$$= \frac{\text{Serapan pada } n + \text{Serapan pada } n+1}{2} \times (n+1 - n)$$

$$\text{AUC} = L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6 + L_7$$

$$\text{Log SPF} = \frac{\text{AUC}}{\text{max} - \text{min}} \times 2$$

$$\text{SPF} = \text{Arc. Log SPF}$$



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil penelitian penentuan efektivitas sediaan krim yang mengandung fraksi etanol dari infusa daun sendok (*Plantago major* L.) adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil perhitungan nilai SPF

Formula / konsentrasi fraksi etanol	Nilai SPF Replikasi			Rata – rata
	I	II	III	
	F I / 3 %	1,710	1,603	
F II / 6 %	1,570	1,667	1,630	1,6223
F III / 12 %	1,700	1,641	1,644	1,6617

Hasil Perhitungan nilai SPF tiap sediaan dapat dilihat selengkapnya pada tabel 4, 5, 6 dan spektrum serapan pada gambar 8 serta contoh perhitungan nilai SPF pada lampiran 9.

B. Pembahasan

Penentuan efektivitas sediaan tabir surya dilakukan dengan menentukan nilai SPF secara *in vitro* dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Penentuan nilai SPF dilakukan dengan mengukur serapan sediaan dengan panjang gelombang 290 – 360 nm. Panjang gelombang ini mewakili panjang gelombang sinar matahari sinar UV A (320 – 400 nm) maupun UV B (290 – 320 nm) (Anonim, 1985). Penentuan absorbansi dilakukan pada konsentrasi 3 %, 6%, 12%. Pelarut yang digunakan adalah etanol karena

relatif tidak memberikan gangguan serapan terhadap senyawa yang dilarutkan.

Dari data spektrum UV – Vis sediaan, menyatakan bahwa sediaan krim dengan fraksi etanol 3 % dapat menyerap panjang gelombang antara 290 – 340 nm dan memiliki serapan maksimal pada 290 nm, dengan intensitas serapan 0,161 yang merupakan wilayah serapan UV B. Untuk sediaan krim 6 % dapat menyerap pada panjang gelombang antara 290 – 310 nm dan memiliki serapan maksimal pada 290 nm, dengan intensitas 0,159 yang merupakan wilayah serapan UV B. Sedangkan pada sediaan krim 12 % menyerap panjang gelombang antara 290 – 320 nm dan memiliki serapan maksimal pada 290 nm, dengan intensitas 0,163 yang merupakan wilayah serapan UV B. Dengan demikian sediaan krim fraksi etanol dari infusa daun sendok (*Plantago mayor L.*) memiliki aktivitas penyerapan sinar UV pada wilayah UV B. Adapun dampak UV B terhadap kulit adalah *sunburn* (terbakar sinar matahari). *Sunburn* terjadi akibat sengatan matahari yang kadarnya melebihi daya tahan kulit terhadap UV.

Pengukuran SPF dapat dilakukan dengan menghitung nilai log yang merupakan nilai rata – rata dari serapan fraksi etanol dan selanjutnya ditentukan jenis proteksinya untuk masing – masing konsentrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai SPF yang diperoleh yaitu untuk sediaan krim 3 % adalah 1,6290, krim 6 % adalah 1,6223, dan 12 % adalah 1,6617. Nilai SPF dari sediaan krim fraksi etanol tidak efektif sebagai tabir surya karena berada dibawah nilai SPF minimal. Dimana diketahui bahwa jenis perlindungan minimal adalah dengan nilai SPF 2 (Wasitaatmadja, 1997).

Untuk sediaan krim yang mengandung fraksi etanol dari infusa daun sendok (*Plantago major* L.) dari berbagai konsentrasi, belum efektif digunakan sebagai pelindung terhadap UV B. Kemungkinan fraksi ini masih bisa digunakan sebagai tabir surya tapi harus dikombinasikan dengan bahan lain yang mengabsorpsi UV A dan B. Berdasarkan analisis statistik, rancangan acap lengkap diperoleh F hitung < F tabel 5% dan 1%. Berarti perlakuan tidak berpengaruh nyata, artinya analisis statistik rancangan acap lengkap terhadap nilai SPF pada tiap replikasi menyatakan kenaikan konsentrasi fraksi etanol dari infusa daun sendok tidak memberi pengaruh (tidak berbeda) terhadap kenaikan SPF-nya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian aktivitas krim tabir surya yang mengandung fraksi etanol dari infusa daun sendok (*Plantago major* L.) dapat disimpulkan bahwa :

1. Krim dapat mengabsorpsi sinar UV B dengan nilai SPF 1,6223
2. Krim fraksi etanol dari infusa daun sendok (*Plantago major* L.) tidak efektif sebagai tabir surya.

B. Saran

Perlu dilakukan formulasi krim tabir surya dengan dikombinasikan dengan bahan yang dapat mengabsorpsi UV A,UV B, dan ekstrak heksan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1996, *Al-Qur'anul Al Karim dan Terjemahnya*, Semarang, PT. Karya Toha Putra.
- _____, 1985, *Formularium Kosmetika Indonesia*, Jakarta, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- _____, 2008, *Buku Pintar Tanaman Obat*, Jakarta, Agromedia.
- _____, 1986, *Sediaan Galenik*, Jakarta, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- _____, 1979, *Farmakope Indonesia Edisi III*, Jakarta, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- _____, 1995, *Farmakope Indonesia Edisi IV*, Jakarta, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- _____, 1978, *Formularium Nasional Edisi II*, Jakarta, Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- _____, 1986, *Handbook Of Pharmaceutical Exipient 2nd Edition*, Washington, American Pharmaceutical Association.
- Ansel, H. C., 1989, *Pengantar Bentuk sediaan Farmasi Edisi IV*, Jakarta, Universitas Indonesia - Press.
- Banker, G. S., and Rhodes C. T., 1996, *Modern Pharmaceutics Third Edition*, New York, Revised and Expanded, Marcel Dekker.
- Baswedan, Sufyan bin Fuad, 2007, *Lautan Mukjizat di Balik Balutan Jilbab*, Klaten, Wafa Press.
- Bieza K. dan R. Louis, 2001, *An Arabidopsis mutant tolerant to lethal levels shows contitutively elevated accumulation of B ultraviolet contitutively flavonoids and other phenolics*, plant physiol 126: 1105 – 1115.
- Black, H.S., 1990, *Antioxidant and Carotenoids as Potential Photoprotectants*, h.267-273, New York, Marcel Dekker inc.
- Diffey, B., 2001, *Sunscreen isn't Enough*, h 64, 105-108, J. Photochem.Photobiol.
- Draelos, Zoe Diana, Lauren A, Thaman, 2006, *Cosmetic Formulation of Skin Care product*, New York, Taylor dan Prancis Group.

- Gomez-Flores, R., C.L. Calderon, L.W. Scheibel, P. Tamez-Guerra, C.Rodriguez-Padilla, R. Tamez-Guerra, and R.J. Weber. 2000. *Immunoenhancing properties of Plantago major leaf extract*. *Phytotherapy Research* 14 (8): 617-622.
- Green, A., Williams, G. And Neale, R., 1999, *Does Daily Use Of Sunscreen Or S-Carotene Supplements Prevent Skin Cancerin Healthy Adults?*, h.354, 723-729, Lancet.
- Halliwell B, Gutteridge. 1999. *Free Radicals in Biology anMedicine.3rd ed. Radikal Bebas di Biologi dan Medicine.3rd ed.* 1999. London: Oxford University Press.
- Harber, L. C., Deleo, V. A., and prystowsky, J. H., 1990, *Intrinsic and Extrinsic Photoprotection Against UV B and UV A Radiation* dalam Lowe N. J., and Shaath, N. A., *Sunscreens Development Evaluation and Regulatory Aspects*, 367, New York, Marcel Dekker, Inc.
- Harry Ralph G., 1952, *Modern Cosmeticology Volume One*, New York, Chemical Publishing co.inc.
- Hermann, Guyot, J.M. Aiache, 1993, *Biofarmasi II*, Surabaya, Airlangga.
- Hertiani, T., 2000, *Isolasi dan Identifikasi Senyawa Flavonoid Antioksidan dari Daun Plantago mayor L.*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.
- Jumaruddin dan Endang Sulystyowati, 2008, *Pelatihan Metode Pengobatan Islam*, Yogyakarta, Diva Press.
- Junguera, L. C. dan O. R. Kelley, 1997, *Histologi Dasar*, Terjemahan dari *Basic Histology*, oleh Jan Tamboyang, Jakarta, EGC.
- Kikuzaki, H. And Nakatani N., 1993, *Antioxidant Effect Of Some Ginger Contituent*, h.1407-1408, *J.Food Sci.*
- Karpilovskaia, E.D., G.P. Gorban, M.B. Pliss, L.N. Zakharenko, and M.P. Gulich. 1989. *Inhibiting effect of the polyphenolic complex from Plantago major (plantastine) on the carcinogenic effect of endogenously synthesized Nitrosodimethylamine*, *Farmakol Toksikol* 52 (4): 64-67.
- Lachman, L.1994. *Teori dan Praktek Farmasi Industri*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Lithander, A. 1992. *Intracellular fluid of waybread (Plantago major) as a prophylactic for mammary cancer in mice*, *Tumour Biology* 13 (3): 138-141.

- Michaelsen, T.E., A. Gilje, A.B. Samuelsen, K. Hogasen, and B.S. Paulsen, 2000, *Interaction between human complement and a pectin type polysaccharide fraction, PMII, from the leaves of Plantago major L.* Scandinavian Journal of Immunology 52 (5): 483-490.
- Nofianty, Tri, 2008. *Pengaruh Formulasi Sediaan losio Terhadap Efektivitas Minyak Buah Merah Sebagai Tabir Surya dibandingkan Sediaan Tabir Surya yang Mengandung Oksinoksat*, Depok, Universitas Indonesia.
- Pangemanan, L., 1999, *Plantago L.* In: de Padua, L.S., N. Bunyapraphat-sara, and R.H.M.J. Lemmens (eds.), Plant Resources of South-East Asia No. 12 (1); Medicinal and Poisonous Plants 1, Bogor, Prosea.
- Pearce, Evelyn C., 2006, *Anatomi dan Fisiologi untuk Paramedis*, Jakarta Pusat, PT. Gramedia.
- Perwitasari, I, Chandra, D.K., Etnawati dan suyoto, 1999, Peran tabir surya kombinasi sinamat dan banzophenon pada perubahan warna kulit konstitutif akibat pajanan UV-B, Yogyakarta, FKU-UGM.
- Purwanti, T., dan Soeratri, W., 2004, *Pengaruh Penambahan Asam Glikolat Terhadap Efektivitas Sediaan Tabir Surya Kombinasi Anti UV A dan AntiUV B dalam basis Gel*, Majalah Airlangga, Vol 4 No.3
- Ar – Rumaikhon, Sulaiman bin A., 2008, *Fiqih Pengobatan Islam : Kajian Komprehensif Seputar Berbagai Aspek Pengobatan dalam Prespektif Islam*, Penerjemah Tim Al Qowam, Solo, Al Qowam.
- Al Saikhan, M.S., Howard, L.R. and Miller jr., J.C., 1995, *Antioxidant Activity and Total Phenolics in different Genotypes Of Potato (Solanum tuberosum L.)*, h.341-342, J. Food sci.
- Salvador, Amparo, Albert Chisvert, 2007, *Analysis of Cosmetic Product*, Oxford, Elsevier.
- Savitri, Evika Sandi, 2008, *Tumbuhan berkhasiat Obat Perspektif islam*, Malang, UIN Malang Press.
- Samuelsen, A.B., 2000, *The traditional uses, chemical constituents and biological activities of Plantago major L. A review*, Journal of Ethnopharmacology 71 (1-2): 1-21.
- Sudarsono, D. Gunawan, S. Wahyono, I.A. Donatus, dan Purnomo, 2002, *Tumbuhan Obat II*. Yogyakarta: Pusat Studi Obat Tradisional UGM.
- Sugihartini, Nining, 2003, *Pengaruh Penambahan Fraksi Etanol Daun Plantago mayor L., Terhadap Fotostabilitas dan Efektivitas Oktil Metoksisinamat Sebagai Bahan Aktif Tabir Surya*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada.

Sunardi, 2008, *Resep Nabi atau Resep Dokter ?*, Solo, Aqwamedika.

Syamsuhidayat, S.S. dan Hutapea, J.R., 1991, *Inventaris Tanaman Obat Indonesia Jilid 1*. Jakarta, Pusat Penelitian Farmasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Depkes RI.

Syamsuni H., 2005, *Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi*, Jakarta, EGC.

Tranggono, R.I.S, F. Latifah dan J. Djajadistra, 2007, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.


Underwood A.L., R.A. Day, JR., 1999. *Analisis Kimia Kuantitatif*, Jakarta, Erlangga.

Voight, R., 1984, *Buku Pelajaran Teknologi Industri*, Diterjemahkan oleh S.N. soewandi, edisi V, Yogyakarta, Universitas Gajah mada Press.

Wijayakusuma, H., 1994, *Tanaman Berkhasiat Obat Jilid 1*, Jakarta, Pustaka Kartini.




Lampiran 1. Skema Kerja Infusa Daun Sendok (*Plantago mayor L.*)




Gambar 3. Skema Kerja Infusa Daun Sendok (*Plantago mayor L.*)

Lampiran 2. Skema Kerja Pembuatan krim Fraksi Etanol Daun Sendok



Gambar 4. Skema Kerja Pembuatan krim Fraksi Etanol Daun Sendok

Lampiran 3. Skema Kerja Penentuan Efektivitas Sediaan Krim




Gambar 5. Skema Kerja Penentuan Efektivitas Sediaan Krim

Lampiran 4. Perhitungan HLB Butuh

Tabel 3. Perhitungan HLB Butuh

Fase minyak	A (Gram)	HLB Butuh	A x B	A x B
				Jumlah A + B
Asam Stearat	9	15	135	5,63
Cetil Alkohol	2	15	30	1,76
Parafin Cair	5	12	60	3,53
	16			10,92



Konsentrasi emulgator 3 %

3 M A K A S S A R


$$\frac{10,92}{100} \times 70 \text{ g} = 7,644 \text{ g}$$

100

$$\text{Tween 60} \quad \frac{6,22}{10,2} \times 7,644 \text{ g} = 4,61 \text{ g}$$

$$\text{Span 60} \quad \frac{3,98}{10,2} \times 7,644 \text{ g} = 2,93 \text{ g}$$

Lampiran 5. Tanaman Daun Sendok (*Plantago mayor L.*)




Gambar 6. Tanaman Daun Sendok (*Plantago mayor L.*)

Keterangan :

1 = Bunga dan biji

2 = Daun

Lampiran 6. Sediaan Krim Fraksi Etanol Daun Sendok



Gambar 7. Formula krim fraksi etanol


Keterangan :

I = F I mengandung 3 % fraksi etanol

II = F II mengandung 6 % fraksi etanol

III = F III mengandung 12 % fraksi etanol

Lampiran 7. Spektrum Serapan Sediaan Krim



Gambar 8. Spektrum Serapan Sediaan Krim Fraksi Etanol

Keterangan :

- I = Spektrum Serapan krim Formula 1
- II = Spektrum Serapan krim Formula 2
- III = Spektrum Serapan krim Formula 3

Lampiran 8. Hasil Pengukuran Serapan Krim Fraksi Etanol

Tabel 4. Data Hasil Pengukuran Replikasi Serapan Formula I (3%)

Panjang gelombang	Pengulanganserapan		
	1	2	3
290	0,161	0,118	0,109
300	0,153	0,110	0,110
310	0,130	0,127	0,104
320	0,110	0,105	0,097
330	0,100	0,093	0,094
340	0,095	0,094	0,109
350	0,099	0,076	0,081
360	0,087	0,108	0,082
Nilai SPF	1,710	1,603	1,574

Tabel 5. Data Hasil Pengukuran Replikasi Serapan Formula II (6%)

Panjanggelombang	Pengulanganserapan		
	1	2	3
290	0,159	0,122	0,110
300	0,129	0,112	0,133
310	0,098	0,115	0,122
320	0,099	0,118	0,106
330	0,085	0,114	0,095
340	0,088	0,124	0,104
350	0,068	0,088	0,095
360	0,078	0,089	0,070
Nilai SPF	1,570	1,667	1,630

Tabel 6. Data Hasil Pengukuran Replikasi Serapan Formula III (12%)

Panjanggelombang	Pengulanganserapan		
	1	2	3
290	0,163	0,127	0,131
300	0,151	0,118	0,125
310	0,127	0,128	0,131
320	0,114	0,115	0,105
330	0,106	0,097	0,105
340	0,108	0,084	0,096
350	0,083	0,097	0,089
360	0,077	0,098	0,076
Nilai SPF	1,7	1,641	1,644

Lampiran 9. Contoh Perhitungan Nilai SPF

Tabel 7. Contoh Perhitungan Nilai SPF

Panjang gelombang (nm)	Serapan
290	0,161
300	0,153
310	0,130
320	0,110
330	0,100
340	0,095
350	0,099
360	0,087

Rumus :

$$\begin{aligned} \text{Area dibawah kurva} &= \text{Luas trapezium} \\ &= \frac{\text{Serapan pada } n + \text{Serapan pada } n+1}{2} \times (n+1 - n) \end{aligned}$$

$$L_1 = \frac{0,16 + 0,153}{2} \times (300-290) = 1,57$$

$$L_2 = \frac{0,153 + 0,130}{2} \times (310-300) = 1,415$$

$$L_3 = \frac{0,130 + 0,110}{2} \times (320-310) = 1,2$$

$$L_4 = \frac{0,110 + 0,100}{2} \times (330-320) = 1,05$$

$$L_5 = \frac{0,100 + 0,095}{2} \times (340-310) = 0,975$$

$$L_6 = \frac{0,095 + 0,099}{2} \times (350-340) = 0,97$$

$$L_7 = \frac{0,099 + 0,087}{2} \times (360-350) = 0,93$$

$$\begin{aligned} \text{AUC} &= L_1 + L_2 + L_3 + L_4 + L_5 + L_6 + L_7 \\ &= 8,11 \end{aligned}$$

$$\text{Log SPF} = \frac{\text{AUC}}{\text{max} - \text{min}} \times 2$$

$$\begin{aligned} \text{Log SPF} &= \frac{8,11}{360 - 290} \times 2 \\ &= 0,232 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{SPF} &= \text{Arc.}0,232 \\ &= 1,71 \end{aligned}$$



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 10. Analisis Statistik Nilai SPF Tiap Formula dengan Rancangan Acap Lengkap (RAL)

Tabel 8. Analisis Statistik Nilai SPF Tiap Formula dengan Rancangan Acap Lengkap (RAL)

Kelompok	Pengulangan			Total	Rata-rata
	1	2	3		
3%	1.710	1.603	1.574	4.887	1.6290
6%	1.570	1.667	1.630	4.867	1.6223
12%	1.700	1.641	1.644	4.985	1.6617
TOTAL	4.9800	4.9110	4.8480	14.739	

FK = 24.137569

JK Total = 0.019922

JK Kelompok (Formula) = 0.0026587

JK Galat = 0.0172633

Tabel 9. Tabel ANAVA

SK	DB	JK	KT	F HITUNG	F TABEL	
					5%	1%
KELOMPOK	2	0.0026587	0.0013293	0.46202	5.14	10.92
GALAT	6	0.0172633	0.0028772			
TOTAL	8	0.019922				

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Sudartini Al Fitri dilahirkan di Kelurahan Mallilingi Kecamatan Bantaeng, Kabupataen Bantaeng 16 Oktober 1988 dan merupakan anak Pertama dari pasangan suami istri M. Said Tarima dan Dawalia.

Pendidikan formal yang telah dilalui adalah Taman Kanak – kanak (TK) Idhata kemudian sekolah dasar di SD Inpres Jagong Kabupaten Bantaeng pada tahun 1993 – 1999. Setelah itu dilanjutkan ke sekolah menengah pertama yaitu SMP Negeri 1 Bantaeng pada tahun 1999 – 2002. Setelah itu dilanjutkan kesekolah menengah atas yaitu SMA Negeri 2 Bantaeng pada tahun 2003 – 2006. Pada tahun 2006 penulis mendaftar keperguruan tinggi dan diterima di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Farmasi. Pengalaman organisasi penulis pernah aktif di organisasi KAMMI dan sekarang aktif tarbiyah pada lembaga dakwah. Penulis tahu betapa pentingnya menuntut ilmu agama karena menuntut ilmu itu wajib bagi tiap – tiap muslim.