

SKRIPSI

**FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KANKER
PAYUDARA DI RSUP DR.**

WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR



NAMA : SRI YULIANTI AS.

NIM : 70300106059

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

PRODI KEPERAWATAN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN

MAKASSAR

2010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 27 Agustus 2010

Penyusun,

Sri Yulianti AS

NIM. 70300106059

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kanker Payudara di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar” yang disusun oleh Sri Yulianti AS, NIM. 70300106059, mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, yang telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 27 Agustus 2010 M, bertepatan dengan 17 Ramadhan 1431 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Kesehatan pada Jurusan Keperawatan.

27 Agustus 2010 M

Makassar,

17 Ramadhan 1431 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua : Alfi Syahar, S.Kp, M.Kes (.....)

Sekretaris : Hasnah, S.SiT, M.Kes (.....)

Penguji I : Drs. Wahyuddin Halim, MA (.....)

Penguji II : Mukhtar Sa’na, S.Kep, Ns., M.Kes (.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

dr. M. Furqaan Naiem, M.Sc, Ph.D

NIP. 133 857 062

ABSTRAK

Nama : Sri Yulianti. AS
Nim : 70300106059
Jurusan : Keperawatan
Judul : Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kanker Payudara di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar
Pembimbing : Alfi Syahar dan Hasnah

Kanker merupakan buah dari perubahan sel yang mengalami pertumbuhan tidak normal dan tidak terkontrol. Kanker payudara termasuk diantara penyakit kanker yang paling banyak diperbincangkan karena keganasannya yang seringkali berakhir dengan kematian dan merupakan insidens tertinggi kedua di Indonesia dan terdapat kecenderungan dari tahun ke tahun insiden ini meningkat. Tujuan penelitian adalah diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Kanker Payudara.


Metode penelitian : jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah *cross sectional*. Populasi data peneliti berjumlah 50 responden. Sampel adalah *total sampling*. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Analisis data dengan uji *Chi Square*.

Hasil penelitian ada hubungan antara pengetahuan tentang gizi dengan kanker payudara dengan nilai $p = 0,031$. Ada hubungan antara pendidikan dengan kanker payudara dengan nilai $p = 0,019$. Ada hubungan antara pendapatan dengan kanker payudara dengan nilai $p = 0,019$.

Kesimpulan : ada hubungan antara pengetahuan tentang gizi, pendidikan, dan pendapatan terhadap kanker payudara.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka perlu adanya usaha untuk memasyarakatkan program SADARI (pemeriksaan payudara sendiri) sebagai suatu langkah preventif atau usaha deteksi dini kanker payudara.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti diberikan kepada hambanya. Salam dan shalawat tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang sekaligus menjadi syarat untuk menyelesaikan studi di Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Kupersembahkan skripsi ini terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Drs. H. Muh. Amin Siga, MM dan Dra. Hj. Farida Abbas serta saudara tersayang Djunaedi Abbas dan Sri Yuli Windayani. Terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, kasih sayang, dukungan, semangat, dan do'a restu di setiap langkah ini, yang tak ternilai hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Negeri Alauddin Makassar, kiranya amanah yang diberikan pada penulis tidak sia-sia. Melalui kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Azhar Arsyad, M.A selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf akademik atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan.
2. Bapak dr. Furqaan Naiem, M.Sc,P.h.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf akademik yang telah membantu selama penulis mengikuti pendidikan.

3. Ibu Nur Hidayah, S.Kep. Ns. MARS selaku Ketua Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf akademik yang telah membantu selama penulis mengikuti pendidikan.
4. Bapak Alfi Syaar, S.Kp., M.Kes selaku Pembimbing I dan Ibu Hasnah, S.SiT., M.Kes selaku pembimbing II, serta tim penguji Bapak Wahyuddin Halim, MA dan Bapak Muhtar So'na, S.Kep.Ns., M.Kes yang telah banyak memberikan masukan guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Abdul Kadir, Ph.D,SpTHT-KL (K)L.C., M.Kes selaku Direktur RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
6. Bapak Ka. Ruang Keperawatan Lontara II bagian Bedah Tumor yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam melakukan penelitian dan pengambilan data.
7. Responden yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk melaksanakan penelitian.
8. Kakanda Fathulu Muin Suaib yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman Fakultas Ilmu Kesehatan dan teman-teman Jurusan Keperawatan pada khususnya yang telah membantu terlaksananya penulisan skripsi ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
10. Anak-anak KKN Angk. 45 Desa Buu Suka Kab. Jenepono : Mila, Ahmad, Syarif, Mala, Erni, Lela, Salam dan Fauzi terima kasih atas kebersamaan dan persahabatannya selama ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis memohon doa dan berharap semoga ilmu yang telah diperoleh dan dititipkan dapat bermanfaat bagi orang serta menjadi salah satu bentuk pengabdian dimasyarakat nantinya. Insya Allah, Amin.

Makassar, 16 Agustus 2010

Sri Yulianti SA



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN MENGIKUTI SEMINAR TUTUP	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR DIAGRAM.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Kanker Payudara	8
B. Tinjauan Umum Tentang Faktor Kanker Payudara	29
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL	45
A. Dasar pemikiran variabel penelitian	45

B. Kerangka konseptual	46
C. Variabel yang diteliti	47
D. Definisi operasional	47
E. Hipotesis.....	48
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Populasi, sampel, besar sampel dan teknik pengambilan sampel, kriteria inklusif (kriteria pemilihan)	
C. Instrumen Penelitian	50
D. Prosedur pengumpulan data	51
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Hasil Penelitian	54
B. Pembahasan	54
C. Keterbatasan.....	60
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 : Distribusi Responden Berdasarkan Pengetahuan Tentang Gizi	53
Tabel 4.2 : Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan	54
Tabel 4.3 : Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan	55
Tabel 4.4 : Distribusi Responden Berdasarkan terjadinya Kanker Payudara	56
Tabel 4.5 : Hubungan Pengetahuan Tentang Gizi Terhadap Faktor Kejadian Kanker Payudara	57
Tabel 4.6 : Hubungan Pendidikan Terhadap Faktor Kejadian Kanker Payudara	57
Tabel 4.7 : Hubungan Pendapatan Terhadap Faktor Kejadian Kanker Payudara	58

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lembar permohonan menjadi responden
2. Lembar persetujuan menjadi responden
3. Kuesioner penelitian
4. Master tabel
5. Tabel frekuensi
6. Tabel *crosstabs*
7. Surat rekomendasi penelitian dari Dekan FIK UIN Alauddin Makassar
8. Surat rekomendasi penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Sulawesi Selatan
9. Surat rekomendasi penelitian dari DIREKTUR RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar
10. Surat keterangan selesai melaksanakan penelitian dari DIREKTUR RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar
11. Daftar riwayat hidup



DAFTAR DIAGRAM

Halaman

Diagram 4.1 : Responden Berdasarkan Pengetahuan Tentang Gizi	54
Diagram 4.2 : Responden Berdasarkan Pendidikan	55
Diagram 4.3 : Responden Berdasarkan Pendapatan	56
Diagram 4.4 : Distribusi Responden Berdasarkan Terjadinya Kanker Payudara	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kanker merupakan buah dari perubahan sel yang mengalami pertumbuhan tidak normal dan tidak terkontrol, peningkatan jumlah sel tidak normal umumnya membentuk benjolan di sebut tumor/kanker, namun tidak semua tumor bersifat kanker, tumor yang bersifat kanker di sebut tumor ganas, sedangkan yang bukan kanker disebut tumor jinak. Tumor jinak biasanya merupakan gumpalan lemak yang terbentuk dalam satu wadah yang menyerupai kantong, sel tumor jinak tak menyebar ke bagian lain tubuh penderita.

Kanker payudara bukan penyakit menular, tetapi merupakan salah satu penyakit “menakutkan” bagi kaum wanita masalah infeksi akibat kanker merupakan masalah utama dan penderita cenderung meningkat. Kanker payudara termasuk kanker yang paling banyak diperbincangkan karena keganasannya yang sering kali berakhir dengan kematian. Kanker payudara akan memperlihatkan kekhasannya dalam menyerang penderitanya, keganasan kanker ini ditunjukkannya dengan menyerang sel – sel normal sekitarnya terutama sel – sel yang lemah. Untuk menurunkan angka penderita kanker payudara, diperlukan kerja sama terkait antara departemen kesehatan atau yayasan – yayasan yang bergerak di bidang kesehatan untuk menanggulangi kanker payudara, antara lain: Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta (YKPJ) dengan rumah sakit kanker Dermais. (Eni Setiati, 2009 : 41).

Menurut WHO delapan sampai dengan sembilan persen wanita akan mengalami kanker payudara. Ini menjadikan kanker payudara sebagai jenis kanker yang paling banyak ditemui pada wanita. Setiap tahun lebih dari 250.000 kasus baru kanker payudara terdiagnosa di Eropa dan kurang lebih 175.000 di Amerika serikat. Masih menurut WHO, tahun 2000 di perkirakan 1.2 juta wanita terdiagnosis kanker payudara dan lebih dari 700.000 meninggal karenanya. Belum ada data

statistik yang akurat di Indonesia namun data yang terkumpul di RS menunjukkan penyebab utama kematian pada wanita akibat kanker.

Kanker payudara merupakan kanker dengan insiden tertinggi kedua di Indonesia dan terdapat kecenderungan dari tahun ke tahun insiden ini meningkat. Dari data tahun 2006, disebutkan dua penyakit kanker tertinggi di Indonesia adalah kanker payudara (8.328 kasus) dan kanker leher rahim (4.649 kasus). Berdasarkan "*Pathological Based Registration*" kanker payudara mempunyai insiden relatif 11.5 persen diperkirakan di Indonesia mempunyai insiden minimal. 20.000 kasus baru pertahun dengan kenyataan bahwa lebih dari 50 persen kasus berada dalam stadium lanjut (SIRS, 2007 Ditjen Yamedik Depkes).

Untuk melaksanakan program penapisan kanker leher rahim dan kanker payudara di Indonesia, departemen kesehatan bersama profesi terkait pada akhir 2006 telah menyelenggarakan pilot proyek deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara di enam kabupaten yaitu: Deli serdang (Sumatera utara), Gresik (Jawa timur), Kebumen (Jawa tengah), Gunung kidul (DI Yogyakarta), Karawang (Jawa barat), dan Gowa (Sulawesi selatan) (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2009).

Jumlah penderita kanker payudara di RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO Makassar, pada tahun 2009 sebesar 375 kasus, kasus baru terdiri dari 128 sedangkan kasus lama terdiri dari 247, yang terdiri dari 373 orang pasien perempuan sedangkan dua orang laki – laki yang sedang rawat jalan. Sedangkan rawat inap sebesar 532 kasus, kasus baru terdiri dari 92 sedangkan kasus lama 440 yang terdiri dari 528 orang pasien perempuan sedangkan tiga orang laki-laki. Hal ini meningkat dari jumlah pasien rawat jalan pada tahun 2008 sedangkan rawat inap menurun dari jumlah pasien rawat inap pada tahun 2008 . Di mana pada tahun 2008 jumlah pasien rawat jalan sebesar 1.355 kasus, kasus baru terdiri dari 94 sedangkan kasus lama terdiri dari 1261, yang terdiri dari 1.351 orang pasien perempuan sedangkan empat orang pasien laki – laki. Sementara jumlah pasien rawat inap pada tahun 2008 sebesar 383 kasus, kasus baru terdiri dari 141 sedangkan kasus

lama terdiri dari 243, yang terdiri dari 383 orang wanita sedangkan satu orang laki – laki total 384 orang pasien rawat inap, sementara di tahun 2009 jumlah pasien rawat inap meningkat dari 532 orang pasien pada tahun 2008 menurun menjadi 384 orang yang terdiri dari 383 orang pasien perempuan sedangkan satu orang laki-laki.

Payudara bukan penyakit menular tetapi merupakan salah satu penyakit “menakutkan” bagi kaum wanita masalah infeksi akibat kanker merupakan masalah utama dan penderitanya cenderung meningkat. Untuk menurunkan angka penderita kanker payudara. Diperlukan kerjasama terkait antara departemen kesehatan ataupun yayasan yang bergerak di bidang kesehatan untuk menanggulangi masalah kanker payudara. Faktor penyebab dari tumor ganas umumnya belum diketahui secara pasti. Khusus untuk kanker payudara di duga kemungkinan disebabkan oleh faktor genetik dan hormonal (endogen dan eksogen), virus dan bakteri, sedangkan gaya hidup biasanya di sebabkan oleh pengetahuan tentang gizi, pendidikan, serta pendapatan.

Mengacu dari uraian terdahulu gaya hidup merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kanker payudara seperti pengetahuan tentang gizi, pendidikan, serta pendapatan, sebagaimana dalam Hadist Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi :

ما رآه المسلمون حسنا فهو عندا الله حسن

Artinya:

“Apa yang dianggap baik oleh orang-orang islam, maka hal itu baik pula di sisi Allah.”
(Djazuli dan Aen, 1997 : 119)

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah; karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan tadi, maka akan menimbulkan kesulitan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا

يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۳۱﴾

Terjemahannya:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. al. A'raaf/7 : 31)

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita dituntut untuk menggunakan pakaian yang bagus serta rapi dalam menjalankan ibadah serta aktivitas sehari-hari. Di samping itu, kita juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman secara tidak berlebih-lebihan sebab dengan mengkonsumsi makanan yang berlebihan kita adalah bahagian orang yang tidak mensyukuri apa yang kita miliki.

Seiring dengan bertambah usia resiko terjadinya kanker payudara juga akan meningkat. Resiko terjadinya kanker payudara pada wanita berumur kurang dari 30 tahun, cenderung lebih rendah di bandingkan pada usia lebih dari 40 tahun. Tetapi apabila kurang dari 40 tahun menderita kanker payudara tingkat keganasannya cenderung lebih tinggi dibandingkan penderita kanker payudara lebih dari 40 tahun. Riwayat keluarga yang menderita kanker payudara. Keluarga itu/ayah akan memiliki resiko yang sama. Hal ini di sebabkan karena setengah gen berasal dari ibu dan setengah gen berasal dari ayah. Tetapi seorang laki-laki dengan abnormalitas gen, kanker payudara kemungkinan kurang untuk mengembangkan dibandingkan dengan wanita yang memiliki gen yang mirip. Pada usia menarke (mensturasi pertama) sebelum usia 12 tahun dan pada usia menopause setelah usia 55 tahun serta kehamilan pertama. Setelah usia 30 tahun atau belum pernah hamil, mempunyai resiko lebih besar untuk menderita kanker payudara (Depkes, 2009).

Mengingat kenyataan lebih dari 50 persen kasus berada dalam stadium lanjut. Maka diperlukan upaya untuk mengetahui tatacara untuk penanganan kanker payudara itu sendiri mulai

dari deteksi dini, diagnostik terapi dan rehabilitasi serta *follow up*, serta yang tidak kalah penting adalah mengetahui hubungan gaya hidup dengan resiko kanker payudara. (Susukolostrum, 2008).

Berdasarkan data di atas maka peneliti terdorong untuk menjadi lebih jauh meneliti faktor – faktor yang berhubungan dengan kejadian kanker payudara di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan terjadinya kanker payudara di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar ”?

C. Tujuan penelitian

1. Tujuan umum

Diketuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kanker payudara.

2. Tujuan khusus

- a. Diketuinya hubungan pengetahuan tentang gizi dengan kejadian kanker payudara.
- b. Diketuinya hubungan pendidikan dengan kejadian kanker payudara.
- c. Diketuinya hubungan pendapatan dengan kejadian kanker payudara.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat penelitian diharapkan menjadi sumber informasi mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kanker payudara.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan serta menjadi acuan bagi peneliti berikutnya.
3. Bagi peneliti sendiri merupakan pengalaman berharga dalam rangka menyeberluas wawasan pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kanker Payudara

1. Defenisi

Kanker adalah penyakit umum, satu dari tiga orang bisa diduga terdiagnosa salah satu jenis kanker semasa hidupnya kanker payudara adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam jaringan payudara. Kanker bisa mulai tumbuh di dalam kelenjar susu, saluran susu, jaringan lemak maupun jaringan ikat pada payudara (Jackie, Lincoln-Wilensky, 2008).

Karsinoma mamma atau Kanker Payudara adalah keganasan yang berasal dari parenkim. Penyakit ini oleh WHO dimasukkan dalam *International Classification Of Disease(ICD)* (Manjoer, A. dkk, 2000).

Kanker payudara mempunyai andil terbesar dalam kematian wanita di Indonesia karena kanker-kanker maligna. Insidensi karsinoma payudara di kebanyakan Negara berkembang 11,5 persen tiap tahun, sehingga mulai tahun 2006 kira-kira 20.000 penderita baru tiap tahun. Setiap wanita Indonesia, selama hidupnya mendapat kanker payudara . Kematian karena karsinoma payudara berkat perbaikan diagnostic dan terapi, meskipun insidennya meningkat, tetap tidak berubah. Tetapi untuk wanita pada umur 35 sampai dengan 50 tahun kanker payudara merupakan penyebab kematian yang terpenting. Terobosan terakhir dalam penelitian molecular genetik memungkinkan sekarang wanita dalam risiko genetik yang meningkat dapat diidentifikasi baru dengan kemungkinan penyembuhan dengan pasti. Diagnostik dini dengan skirining mamografik membantu pengenalan penyakit ini pada stadium dini. Perkembangan dala kemoterapi dan radioterapi, kebanyakan dalam kombinasi dengan pembedahan, merupakan terapi baru dengan kemungkinan penyembuhan yang lebih besar (C. J. H. Van De Velde. dkk, 2006).

Terminologi karsinoma/kanker payudara berimplikasi pada karsinoma yang tumbuh di dalam struktur saluran dan kelenjar payudara. Saat ini, sekitar satu sampai sepuluh wanita menderita kanker payudara selama masa haidnya, dan kanker payudara menyebabkan kematian akibat kanker sebesar 20 persen pada wanita (Stanley L. Robins, Ramzi S. Cotran, Vinay Kumar, 1999).

Penyebab pasti kanker payudara tidak diketahui meskipun demikian, riset mengidentifikasi sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko pada individu tertentu: Umur penderita, usia makin bertambah, keluarga yang memiliki riwayat penyakit serupa (Stanley L. Robins, Ramzi S. Cotran, Vinay Kumar, 1999).

Payudara terletak antara kosta III - VII serta terbentang dari linea parasternalis sampai linea aksilaris anterior dan media. Payudara terbentuk dari komponen muskularis dan lemak. Bagian masenkim payudara terutama menempati fascia pektoralis dan serratus anterior. Setiap kelenjar payudara terdiri dari 15 sampai dengan 20 lobus, dimana setiap lobus terbagi menjadi dua lobuli dan acini. Dari tiap lobus, dimana setiap lobus terbagi menjadi dua lobuli dan acini. Dari tiap lobus terdapat satu ductus yang berjalan melalui jaringan payudara dan selanjutnya bermuara ke dalam sinus laktiferus yang berakhir pada papilla mamma (Sjamsudihajat, R. dRR, 1997).

2. Jenis-Jenis Kanker Payudara

Beberapa jenis kanker payudara (Smeltzer, Suzanne, 2001) yaitu: Karsinoma in situ
Karsinoma in situ artinya adalah kanker yang masih berada pada tempatnya, merupakan kanker dini yang belum menyebar atau menyusup keluar dari tempat asalnya.

a. Karsinoma duktal

Karsinoma duktal berasal dari sel-sel yang melapisi saluran yang menuju ke puting susu. Sekitar 90 persen kanker payudara merupakan karsinoma duktal. Kanker ini bisa terjadi sebelum maupun sesudah masa menopause. Kadang kanker ini dapat diraba dan pada

pemeriksaan mammogram, Kanker ini tampak sebagai bintik-bintik kecil dari endapan kalsium (mikrokalsifikasi). Kanker ini biasanya terbatas pada daerah tertentu di payudara dan bisa diangkat secara keseluruhan melalui pembedahan. Sekitar 25 sampai dengan 35 persen penderita karsinoma duktal akan menderita Kanker invasif (biasanya pada payudara yang sama).

b. Karsinoma lobuler

Karsinoma lobuler mulai tumbuh di dalam kelenjar susu, biasanya terjadi setelah menopause. Kanker ini tidak dapat diraba dan tidak terlihat pada mammogram, tetapi biasanya ditemukan secara tidak sengaja pada mamografi yang dilakukan untuk keperluan lain. Sekitar 25 sampai dengan 30 persen penderita karsinoma lobuler pada akhirnya akan menderita kanker invasif (pada payudara yang sama atau payudara lainnya atau pada kedua payudara).

c. Kanker invasif

Kanker invasif adalah kanker yang telah menyebar dan merusak jaringan lainnya, bisa terlokalisir (terbatas pada payudara) maupun metastatik (menyebar ke bagian tubuh lainnya). Sekitar 80 persen kanker payudara invasif adalah kanker duktal dan sepuluh persen adalah kanker lobuler.

d. Karsinoma meduler

Kanker ini berasal dari kelenjar susu.

e. Karsinoma tubuler

Kanker ini berasal dari kelenjar susu.

3. Penyebab

Penyebabnya tidak diketahui, tetapi ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan seorang wanita menjadi lebih mungkin menderita kanker payudara misalnya : usia, riwayat

keluarga, gaya hidup, lingkungan, pengetahuan tentang gizi, pendidikan dan pendapatan.

(Smeltzer, Suzanne, 2001).

4. Gejala

Gejala awal berupa sebuah benjolan yang biasanya dirasakan berbeda dari jaringan payudara di sekitarnya, tidak menimbulkan nyeri dan biasanya memiliki pinggiran yang tidak teratur. (<http://www.medicastore.com> 2008.html).

Pada stadium awal, jika didorong oleh jari tangan, benjolan bisa digerakkan dengan mudah di bawah kulit. Pada stadium lanjut, benjolan biasanya melekat pada dinding dada atau kulit di sekitarnya. Pada kanker stadium lanjut, bisa terbentuk benjolan yang membengkak atau borok di kulit payudara. Kadang kulit diatas benjolan mengkerut dan tampak seperti kulit jeruk (<http://www.medicastore.com> 2008.html).

Gejala lainnya yang mungkin ditemukan (Jackie, Lincoln-Wilensky, 2008) yaitu:

- a. Benjolan atau massa di ketiak
- b. Perubahan ukuran atau bentuk payudara
- c. Keluar cairan yang abnormal dari puting susu (biasanya berdarah atau berwarna kuning sampai hijau, mungkin juga bernanah)
- d. Perubahan pada warna atau tekstur kulit pada payudara, puting susu maupun *areola* (daerah berwarna coklat tua di sekeliling puting susu) Payudara tampak kemerahan
- e. Kulit di sekitar puting susu bersisik
- f. Puting susu tertarik ke dalam atau terasa gatal
- g. Nyeri payudara atau pembengkakan salah satu payudara.

Pada stadium lanjut bisa timbul nyeri tulang, penurunan berat badan, pembengkakan lengan atau *ulserasi* kulit.

5. Pemeriksaan

Program pemeriksaan payudara yang dilakukan oleh *National Health Service* (NHS) di Inggris (semacam pusat pelayanan kesehatan nasional di Inggris) memberikan pemeriksaan mammografi setiap tiga tahun bagi semua wanita yang berusia antara 50 dan 70 tahun. Setelah usia 70 tahun, wanita tersebut bisa menjalani pemeriksaan mammografi kembali atas permintaan sendiri ketika seorang wanita mencapai usianya yang ke 60, dia akan diminta untuk menjalani mammografi pada salah satu unit mammografi yang bisa di pindah-pindahkan atau yang bersifat permanen. Film-film mammografi di baca oleh *dua* orang ahli radiologi guna mengecek kemungkinan adanya kelainan. Wanita tersebut diminta kembali untuk dikaji secara mendalam di unit pemeriksaan payudara rumah sakit jika terdapat temuan pada mammografi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Sekitar lima persen dari wanita yang menjalani pemeriksaan mammografi diminta kembali untuk pemeriksaan kembali. Sekitar satu dalam delapan orang wanita yang diminta kembali untuk pemeriksaan terkait dengan dugaan adanya kanker payudara (Jackie, Lincoln-Wilensky, 2008).

Tidak ada cara untuk meramal siapa yang bisa terkena kanker payudara. Karena itulah, wanita hendaknya menyadari penyakit tersebut dan memberikan kesempatan terbaik bagi mereka untuk tetap bertahan melalui pendeteksian dini dengan menggunakan fasilitas pemeriksaan mammografi. Program pemeriksaan payudara NHS Inggris menurut (Jackie, Lincoln- Wilensky, 2008) di kenal sebagai salah satu program pemeriksaan payudara yang terbaik di dunia.

a. Mamografi payudara

Mamografi merupakan salah satu cara pemeriksaan payudara dengan menggunakan sinar-X. Jaringan payudara didapatkan (dipencet hingga Kempis) pada dua posisi dan gambar sinar-X diambil pada setiap posisi. Sebagian wanita mungkin mendapati cara ini tidak nyaman dan bahkan cenderung terasa sakit, terutama persis sebelum menstruasi tiba.

Pemampatan (kompresi) penting sekali dilakukan kacap kali diperlukan guna melihat bagian-bagian tertentu secara lebih detil.

Mamografi digunakan pada wanita berusia diatas 35 tahun yang mengalami keluhan pada payudara seperti adanya gumpalan, nyeri, keluarnya, putting mengkerut kedalam atau sebagai bagian dari program pemeriksaan payudara NHS. Wanita yang sudah mengidap kanker payudara akan menjalani mamografi secara lebih rutin karena mereka memerlukan monitoring yang cermat.

Melalui mamografi, jaringan payudara terlihat putih dan jaringan lemak tampak hitam. Penampakan kanker payudara yang paling lazim pada mamografi yakni adanya bagian yang berbentuk bintang (spikulata) yang boleh jadi memiliki beberapa kepingan kapur (mikrokalsifikasi, proses pengerasan menjadi kapur-kapur kecil) yang berhubungan dengannya sehingga tampak seperti bintik-bintik putih. Patut diketahui bahwa sebagian besar (80 persen) mikro-klasifikasi tidak mengkhawatirkan karena biasanya mereka hanya tumor jinak. Kendatipun demikian, proporsinya yang kecil bisa diwaspadai sebagai ductus carcinoma in situ (DKIS).

b. *Fine Needle Aspirate* (FNA)

FNA merupakan pemeriksaan cepat yang hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Sebuah jarum tajam dimasukkan kedalam gumpalan atau bagian yang bersangkutan. Persis seperti melakukan tes darah, hanya jarum yang diarahkan dibawah kulit dan beberapa kali mencapai kedalam gumpalan. Kadang-kadang dilakukan pembiusan local lebih nyaman ketimbang tes itu sendiri. Cairan dan sel ditarik kembali kedalam syringe dan jarum diletakkan di kaca mikroskop yang sudah ditetesi dengan celupan tertentu. Sitopatologis (dokter spesialis dalam mendiagnosa jaringan dan sel melihat pada kaca mikroskop dan pada dasarnya akan bisa menjelaskan jika terdapat sel-sel yang ganas pada gumpalan tersebut. Adanya sel-sel ganas memberikan keganasan tentang adanya kanker payudara.

Adalah tidak mungkin dari tes ini menegaskan apakah kanker tersebut bersifat menyerang atau tidak menyerang. Hasil negative tidak dianggap sebagai tempat untuk berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah dokter mungkin belum mau memasukkan jarum kedalam tumor. Jika ini yang terjadi, mungkin perlu mengulangi FNA atau melakukan biopsy inti). Biopsi inti akan menegaskan apakah tumor tersebut bersifat menyerang atau tidak menyerang. Langkah ini sangat membantu di saat merencanakan operasi! selama operasi aksilla (sekitar area ketiak hanya diperlukan karena adanya kanker yang bersifat menyerang).

c. Biopsi inti

Biopsi inti dilakukan dengan peralatan yang dipegang dengan tangan, berisikan jarum pegas yang lebih besar daripada jarum yang digunakan pada FNA. Suntikan bius local diarahkan pada kulit; sebuah irisan kecil kemudian dibuat guna memasukkan jarum kedalam payudara. Peralatan ini biasanya menimbulkan suara klik yang cukup keras dan ini penting bagi pasien untuk terjaga sementara prosedur dijalankan. Kadang-kadang biopsy inti di lakukan dalam hubungan dengan pengambilan gambar, seperti ultrasound atau mamografi, guna lebih memperjelas bahwa bagian yang tepat sedang diopsi. Sebagian wanita mungkin mendapati bahwa hal ini tidak menyenangkan ketika payudara mereka diremas-remas dengan menggunakan petunjuk sinar-X stereotaktik.

Di saat menggunakan petunjuk stereotaktik untuk mendapatkan jaringan bagi dilakukannya diagnose, wanita didudukkan atau diletakkan dalam posisi terbaring dengan payudaranya ditempatkan pada mesin mamografi yang sudah dimodifikasi secara khusus. Payudara diposisikan dalam cara yang sama seperti ketika gambar-gambar mamografi diambil. Suntikan bius local digunakan untuk membuat bagian tertentu mati rasa sebelum dilakukan sedotan cairan dengan jarum tajam atau biopsy inti. Biopsi inti merupakan prosedur yang relative cepat yang memberikan petunjuk penting guna menjamin bahwa bagian yang tepat untuk dibiopsi.

Potongan-potongan jaringan kecil yang diambil disimpan pada larutan formalin (pengawet jaringan), lalu dikirim ke laboratorium patologi untuk diproses, diiris, diberi zat warna lalu diperiksa di bawah mikroskop oleh seorang patologis. Patologis tersebut akan mempelajari arsitektur jaringan dari gumpalan payudara atau bagian yang bersangkutan dan jenis-jenis sel yang ada guna memberikan diagnosa.

d. Biopsi Bedah

Ini melibatkan operasi dimana dilakukan sayatan untuk mendapatkan akses ke gumpalan tersebut, dan gumpalan dibuang (biopsy penghilang), atau potongan kecil dari gumpalan tersebut diambil untuk pemeriksaan histology (*biopsy sayatan*).

6. Pengobatan

Menurut (Jackie, Lincoln-Wilensky, 2008) ada beberapa cara untuk pengobatan kanker payudara yaitu :

a. Pengobatan Terhadap Ductus Carcinoma In Situ(DKIS)

Tujuan pengobatan DKIS adalah untuk pengendalian local (pencegahan dari penyebaran lebih lanjut) dengan menggunakan pembedahan dan radioterapi. Ini karena, sesuai pengertiannya, DKIS terkurung pada pipa saluran payudara dan belum menyerang di sekitar jaringan payudara atau menyebar ke seluruh payudara. Ia diduga sebagai kanker pra-menyerang karena memerlukan waktu, dan jika dibiarkan tidak terobati, sebagian besar pada akhirnya akan bersifat menyerang.

Pengobatan dengan cara operasi mencakup pembedahan untuk menyelamatkan payudara atau mastektomi. Pembedahan untuk menyelamatkan payudara kemudian diikuti dengan *radioterapi* sekunder pasca-operasi. Sebagian besar wanita yang terkena tumor yang masih sangat kecil dan berkadar rendah mungkin saja perlu radioterapi, dan ini sedang diteliti dalam berbagai percobaan klinis Mastektomi terhadap DKS menyebabkan risiko terulangnya kembali yang sangat rendah. Jika DKIS berulang kembali atau kambuh setelah

terapi utama, separuh dari kambuhnya ini diketahui mengandung kanker yang bersifat menyerang.

Tamoxifen sebagai terapi sistemik sekunder bagi DKIS setelah operasi dan radioterapi diketahui belum bermanfaat dalam mengurangi tingkat kambuhan local pada payudara yang diobati. Kendatipun demikian, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa tamoxifen mengurangi risiko kanker payudara yang timbul pada payudara lainnya.

b. Mastektomi

Mastektomi mencakup pengangkatan seluruh payudara. Tujuan dari Mastektomi adalah membuang seluruh jaringan payudara sehingga risiko kambuh local berkurang. Dalam praktiknya tidaklah mungkin untuk membuang 100 persen jaringan payudara, dan pada kenyataan ada sejumlah kecil jaringan payudara yang dibirkan tersisa.

Kadang-kadang wanita lebih suka menjalankan mastektomi ketimbang operasi untuk menyelamatkan payudara (*breast conserving surgery*) dan radioterapi. Pertimbangannya ialah mereka lebih suka bekas luka ketimbang apa yang mungkin tampak sebagai payudara cacat yang hiking keindahannya, atau mereka boleh jadi menjalani radioterapi.

Manakala mastektomi dikombinasikan dengan pembuangan bintil-bintil getah bening dari aksila, ia diistilahkan sebagai "*modified radical* (radikal termodifikasi) atau mastektomi "*patey*". Ketika, pektoralis-pektoralis mayor atau otot-otot minor juga ikut disebut sebagai "*Hoisted mastectomy*" (mastektomi halsted). Mastektomi radikal saat ini jarang dilakukan. Rekonstruksi payudara dimungkinkan bagi sebagian besar wanita menjalani mastektomi. Sekitar separuh dari wanita yang ditawarkan rekonstruksi. Wanita yang menderita penyakit-penyakit lain atau yang memerlukan radioterapi sekunder boleh jadi disarankan untuk tidak menjalani rekonstruksi payudara saat itu juga, namun mungkin saja rekonstruksi itu dijalankan pada waktu berikutnya.

Berbagai kulit payudara dibuang pada waktu mastektomi. Jika dilakukan rekonstruksi

payudara langsung saat itu juga, lebih banyak kulit yang bisa dilindungi dan penutup kulit bisa diisi langsung. Tindakan ini biasanya meninggalkan bekas luka yang lebih kecil. Jika rekonstruksi tidak dilakukan langsung saat itu, dokter bedah boleh jadi membuang lebih banyak kulit payudara guna membuat bekas luka tampak rata dan rapi.

c. Mastektomi di bawah kulit atau mastektomi untuk menghemat kulit.

Mastektomi di bawah kulit mencakup pembuangan jaringan payudara di mana kulit payudara dan *nipple-aerola complex* (puting susu yang kompleks) diawetkan. Kemungkinan ini dilakukan bagi wanita yang memiliki resiko rendah terkena tumor sisa pada bagian itu, bersama dengan tumor yang berdekatan dengan tumor yang bersifat tidak menyerang dan kadang dimana tumor tidak berdekatan dengan puting susu. Mastektomi untuk menghemat kulit mencakup pembuangan semua jaringan susu dan puting susu yang kompleks.

d. Operasi Aksilari

Salah satu dari tempat-tempat di mana kanker payudara pertama kali menyebar adalah bintil-bintil getah bening(kelenjar-kelenjar) pada aksilar (ketiak) atau tidak terlalu umum, lingkaran kelenjar susu bagian dalam (bintil-bintil getah bening di belakang tepi tulang dada). Ada sekitar 20 sampai dengan 35 bintil-bintil getah bening di bawah lengan. Dibuangnya beberapa bintil-bintil getah bening dari ketiak memberikan informasi ini digunakan untuk menentukan stadium kanker dan mengarahkan rekomendasi-rekomendasi bagi pengobatan sekunder. Jika terdapat bintil-bintil getah bening yang kemungkinan besar sangat luas terlibat pada tumor, maka operasi pembersihan bintil-bintil getah bening pada ketiak akan menghulangkan tumor dari tempat itu.

7. Pengambilan Tindakan

Menurut (Jackie, Lincoln-Wilensky, 2008) ada beberapa cara pengambilan tindakan pada penyakit kanker payudara yaitu :

a. Operasi

Bagian tentang operasi menjelaskan opsi-opsi operasi bagi penghilang kanker payudara dan rekonstruksi. Disini kita akan menengok prosedur-prosedur rumah sakit dan hal-hal praktis guna membantu anda hubungan dengan kenyataan setiap hari.

b. Kemoterapi

Diperlukan adanya diskusi yang serius dengan dokter onkologi tentang mamfaat dan risiko kemoterapi dan jenis-jenis obat yang disediakan bagi masing-masing pasien. Manakala pengobatan disetujui, maka diikuti dengan penjelasan prosedur hingga penandatanganan formulir persetujuan. Sebagian pasien mungkin memerlukan kateter yang dipasang secara sentral untuk pengiriman obat-obat (sebagai contoh, kateter PICC, *Portacath* atau *Groshong*). Aturan kemoterapi kombinasi umumnya diberikan pada siklus yang berlangsung tiga hingga empat minggu dan diberikan enam hingga delapan kali siklus. Tes darah diambil sebelum berlangsungnya setiap siklus kemoterapi guna memeriksa jumlah darah bagi kemungkinan anemia atau tanda-tanda menurunnya penolakan terhadap daya tahan tubuh, fungsi ginjal maupun fungsi hati. Para pasien boleh jadi dianjurkan untuk menjalani pengobatan anti rasa mual atau steroid sebelum dimulainya kemoterapi. Obat-obat biasanya diberikan melalui infuse intravena (diteteskan melalui vena) yang berlangsung beberapa menit hingga beberapa jam. Mereka biasanya diberikan berdasarkan kejadian di hari itu (pasien tidak harus perlu semalam di rumah sakit). Para perawat kemoterapi spesialis sangat trampil dalam memberikan obat-obat tersebut.

c. Radioterapi

Menyusul operasi, adalah sesuatu yang lazim untuk digunakan. Konsultasi dengan dokter onkologi di klinik merupakan langkah pertama. Ada kalanya radioterapi digunakan sebagai pengganti operasi sebagai pengobatan utama. Rangkaian pengobatan radioterapi dijelaskan dan formulir persetujuan ditanda tangani. Tanggal bagi perencanaan kemoterapi

diberikan selama beberapa minggu setelah operasi. Adalah sangat berguna untuk memiliki tingkat gerakan kembali pada bahu dan lengan karena sesi perencanaan radioterapi mencakup pasien terbaring di atas mesin simulator selama beberapa saat dengan lengan sehingga untuk mendapatkan dukungan. Ina memang demikian agar gambar payudara bisa diambil dan lokasi tumor dan payudara (atau dinding dada) bisa diarahkan tanpa lengan masuk ke sana. Tanda-tanda tayo kadang-kadang dibuat pada kulit dinding dada guna memungkinkan penentuan posisi yang akurat pada setiap seri radioterapi.

Ketika pengobatan dimulai, biasanya ini berarti mendatangi unit radioterapi setiap hari dalam seminggu selama sekitar lima atau enam minggu. Pengobatan berlangsung hanya beberapa menit setiap kali. Pasien diposisikan dengan tepat di atas mesin pengobatan sebelum pengobatan dimulai. Radiografer mengontrol penyebaran radioterapi jarak jauh dengan menggunakan kendali-kendali di luar ruang pengobatan.

8. Prognosis

Prognosis pasien ditentukan oleh tingkat penyebaran dan potensi metastasis. Bila tidak diobati ketahanan hidup lima tahun adalah 16 sampai dengan 22 persen . Sedangkan ketahanan hidup sepuluh tahun adalah satu sampai dengan lima persen. Ketahanan hidup bergantung pada tingkat penyakit saat mulai pengobatan, gambaran histopatologik, dan uji reseptor estrogen yang bila positif lebih baik (Smeltzer, Suzanne, 2001).

Stadium klinis dari kanker payudara merupakan indikator terbaik untuk menentukan prognosis penyakit ini. Angka kelangsungan hidup lima tahun pada penderita kanker payudara yang telah menjalani pengobatan yang sesuai mendekati (Smeltzer, Suzanne, 2001):

1. 95 persen untuk stadium 0
2. 88 persen untuk stadium I
3. 66 persen untuk stadium II
4. 36 persen untuk stadium III

5. 7 persen untuk stadium IV.

Harapan hidup dengan adanya metastasis mencapai dua sampai 3,5 tahun, walaupun beberapa pasien (25 persen sampai dengan 35 persen) dapat hidup selama lima tahun, dan lainnya (sepuluh persen) dapat hidup lebih dari sepuluh tahun. Pasien yang mengalami metastasis lama setelah didiagnosa awal atau yang mengalami metastasis ke tulang atau jaringan lunak memiliki prognosis yang lebih baik (Smeltzer, Suzanne, 2001).

9. Pencegahan

Banyak faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan. Beberapa ahli diet dan ahli kanker percaya bahwa perubahan diet dan gaya hidup secara umum bisa mengurangi angka kejadian kanker. Diusahakan untuk melakukan diagnosis dini karena kanker payudara lebih mudah diobati dan bisa disembuhkan jika masih pada stadium dini (Jackie, Lincoln-Wilensky, 2008).

Periksa payudara sendiri (sadari) pemeriksaan payudara secara klinis dan mammografi sebagai prosedur penyaringan merupakan tiga alat untuk mendeteksi kanker secara dini. Penelitian terakhir telah menyebutkan dua macam obat yang terbukti bisa mengurangi resiko kanker payudara, yaitu tamoksifen dan raloksifen. Keduanya adalah anti estrogen di dalam jaringan payudara. Tamoksifen telah banyak digunakan untuk mencegah kekambuhan pada penderita yang telah menjalani pengobatan untuk kanker payudara (Jackie, Lincoln-Wilensky, 2008).

Obat ini bisa digunakan pada wanita yang memiliki resiko sangat tinggi. Mastektomi pencegahan adalah pembedahan untuk mengangkat salah satu atau kedua payudara dan merupakan pilihan untuk mencegah kanker payudara pada wanita yang memiliki resiko sangat tinggi (misalnya wanita yang salah satu payudaranya telah diangkat karena kanker, wanita yang memiliki riwayat keluarga yang menderita kanker payudara dan wanita yang memiliki gen p53, BRCA1 atau BRCA 2) (Jackie, Lincoln-Wilensky, 2008).

10. Bentuk Sistem Perawatan Kesehatan

Bentuk system kesehatan pada penyakit kanker payudara (Jackie, Lincoln-Wilensky, 2008) yaitu :

a. Dokter bedah konsultan (payudara)

Konsultan ini seorang dokter spesialis untuk operasi payudara dan biasanya memiliki keahlian dasar dalam hal operasi umum. Pada klinik rawat jalan, peran konsultan bedah adalah memberikan konsultasi kepada pasien dan mengambil catatan riwayat penyakit, melakukan pemeriksaan klinis, mengadakan penyelidikan secara mendalam yang diperlukan dan melakukan diagnose. Jika diperlukan diagnose jaringan, dia akan melakukan FNA atau merujuk pasien ke ahli radiologi jika itu memang perlu dilakukan dengan petunjuk gambar. Dokter bedah akan memberikan hasil-hasil penyelidikan dan menjelaskan rencana penanganan yang dianjurkan. Dokter bedah biasanya merupakan ketua tim payudara yang memfasilitasi dan mengkoordinasi operasional unit payudara. Dia akan melakukan operasi dan memberikan perawatan tindak lanjut kepada para pasien.

b. Dokter bedah konsultan payudara onkoplastik

Konsultan ini juga seorang dokter spesialis dalam operasi dan rekonstruksi payudara, umumnya dengan keahlian dasar di bidang operasi umum, namun tidak lazim dengan keahlian dasar dalam bidang operasi plastic. Peranannya sama seperti konsultan dokter bedah. Selain itu, mereka bisa melakukan prosedur rekonstruksi payudara, dan beberapa pelatihan terhadap prosedur payudara indah.

c. Dokter payudara

Dokter ini mengkhususkan diri dalam diagnosa dan pengobatan medis penyakit payudara.

d. Dokter genetika klinis

Dokter genetika klinis ini mengkhususkan diri dalam hal penyakit keturunan. Bagi

para pasien kanker payudara, dokter genetika klinis ini akan bisa memperhitungkan resiko wanita yang terkena kanker payudara dan melakukan pemeriksaan genetika jika diperlukan.

e. Dokter anggota tim spesialis

Dokter ini mengkhususkan diri dalam diagnose dan operasi payudara, namun belum mengambil program keahlian formal sebagaimana yang ditetapkan oleh Royal College dan menerima *Certificate of Completion Of Specialist Training (CCST)*-Sertifikat mengikuti pendidikan Spesialis. Peranannya sama dengan konsultan dokter bedah memiliki tanggung jawab keseluruhan terhadap dokter anggota tim spesialis tersebut.

Dokter ini belum mengambil program pendidikan formal dalam bidang operasi payudara. Peranannya adalah membantu konsultan dokter bedah atau dokter payudara yang bertanggung jawab secara keseluruhan, sebagian besar pekerjaan asisten klinis di klinik rawat jalan.

f. Panitera spesialis

Dokter ini sedang mengikuti pendidikan tentang program sertifikasi yang ditetapkan oleh Royal College dengan tujuan mendapatkan sertifikat CCST. Peranannya mencakup berbagai tugas konsultan yang mengawasi pekerjaan mereka.

g. Fellow in surgery

Fellow in surgery (pendamping dalam operasi) ini mengkhususkan diri dalam cabang operasi tertentu pada akhir atau menjelang akhir program pendidikan khusus dalam dalam bidang operasi payudara onkoplastik yang ditujukan bagi para dokter bedah dalam dua tahun terakhir dari program pendidikan mereka. Peranan mereka sama sebagai konsultan dokter bedah yang mengawasi pekerjaan mereka.

h. Konsultan Radiolog

Dokter mengkhususkan diri dalam pengambilan gambar untuk maksud-maksud diagnose. Sebagai contoh, seorang radiolog akan membaca hasil mamografi, menjalankan

biopsy atau FNA yang dipandu oleh gambar (dengan menggunakan ultrasound atau momografi), memasukkan kawat atau kumparan yang dipandu oleh gambar untuk lokalisasi tumor yang tidak bisa dirasakan, dan menjalankan ultrasound bersamaan dengan pemeriksaan-pemeriksaan hasil gambar lainnya.

i. Konsultan hispatolog/sitolog

Dokter ini mengkhususkan diri dalam pemeriksaan jaringan atau sel-sel untuk diagnose penyakit. Para dokter ini adalah anggota utama tim multi-disiplin dan pasti memiliki pengalaman spesialis yang berhubungan dengan patologi atau sitologi payudara. Peranannya adalah melakukan diagnose jaringan atau sel sehingga pengobatan dapat dilakukan pada masing-masing pasien. Mereka mempelajari contoh-contoh jaringan yang diambil pada saat operasi.

j. Konsultan onkolog

Konsultan onkolog mengkhususkan diri pada pengobatan kanker. Para klinik memberikan keahlian dalam radioterapi dan kemoterapi sedangkan onkolog medis memberikan kemoterapi namun tidak menjalankan radioterapi. Mereka menetapkan pengobatan dan memberikan perawatan tindak lanjut bagi para pasien.

k. Petugas perawatan payudara

Setiap unit payudara biasanya memiliki paling sedikit seorang perawat yang dilatih secara khusus dalam penanganan kanker payudara dalam penyediaan informasi dan anjuran. Para perawat tersebut memiliki keterampilan konseling dan memberikan dukungan emosional dan psikologis, seringkali bertindak sebagai penasehat pasien. Mereka juga berfungsi memberikan layanan payudara yang terkoordinir dan efektif. Pada beberapa unit pelayanan diagnose payudara dan menjalankan klinik yang mengarah kepada perawatan tertentu.

l. Spesialis perawan kemoterapi

Ini adalah perawat terlatih yang khusus memberikan kemoterapi.

m. Radiografer diagnostic

Radiografer diagnostic dilate untuk menggunakan sinar-X dan memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam bidang mamografi.

n. Ultrasonografer

Ini adalah orang yang sudah terlatih dan berpengalaman dalam menjalankan ultrasound diagnostik.

o. Perawat klinik

Para perawat yang mengkoordinasikan dan menjalankan klinik payudara.

Ada beragam faktor yang membuat wanita berada pada resiko lebih tinggi bahkan menurunkan resiko terkena kanker payudara. Dari beberapa faktor ada yang tidak bias diubah misalnya, menuanya usia dan menjadi wanita. Namun, kaum wanita bisa menerapkan pola hidup sehat dan mengurangi faktor-faktor resiko yang sudah mereka ketahui. Wanita juga harus 'sadari payudara' dan rutin memeriksa sendiri payudara mereka, setiap bulannya, jadi mereka akan tahu apabila terjadi perubahan pada payudaranya.

Mereka juga bisa melakukan pemeriksaan mamografi secara teratur melalui program pemeriksaan payudara di rumah sakit setempat (Jackie, Lincoln-wilensky, 2008).

B. Tinjauan umum faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian kanker payudara.

l. Pengetahuan tentang gizi

Menurut Irianto, Kus dan Kusno Waluyo (2004 : 16). Kata gizi berasal dari bahasa Arab, “gizza” yang artinya zat makanan sehat. Untuk jadi sehat setiap orang mempunyai kebutuhan gizi yang berbeda-beda tergantung pada usia dan kondisi tubuhnya.

Gizi disebut juga nutrisi merupakan ilmu yang mempelajari perihal makanan serta hubungannya

dengan kesehatan. Ilmu pengetahuan tentang gizi (Nutrisi) membahas sifat-sifat nutrien (zat-zat gizi) yang terkandung dalam makanan, pengaruh metaboliknya serta akibat yang timbul bila terdapat kekurangan (ketidak cukupan) zat gizi. Zat-zat gizi tidak lain adalah senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam makanan yang pada gilirannya diserap dan digunakan untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita (Paath, Erna Francin dkk,2004 : 4). Hal ini juga di jelaskan dalam firman Allah SWT


كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨١﴾

Terjemahnya:

Makanlah di antara rezki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, Maka Sesungguhnya binasalah ia. (Q.S. Thaahaa/20 : 81)

Makanan dan minuman dalam Islam tidak semata hanya untuk menjaga kesehatan jasmani, melainkan dapat bertahan dalam menjalankan ibadah dan berbagai aktifitas kemanusiaan dan sosial yang memang memerlukan ketahanan jasmani di samping dapat membawa manusia dekat dengan Allah sambil bersyukur. Demikian pentingnya menjaga jasmani (tubuh) dengan mengkonsumsi makanan yang enak dan bergizi dan harus seimbang.

Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variable tertentu, sebagaimana penyajian kerangka gaya hidup perilaku makan dengan beberapa hal pokok Pelto (1981) sebagai berikut :



Gambar: model perilaku konsumsi pangan (Pelto, 1981)

- ➔ Faktor-faktor gaya hidup yang terdiri atas proses di tingkat makro dan proses politik yang berpengaruh pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat.
- ➔ Variabel-variabel yang membentuk gaya hidup termasuk pendapatan, pekerjaan, pendidikan, suku, lokasi, agama, pengetahuan gizi dan kesehatan dan karakteristik psikologis.
- ➔ Kedua variabel sosial dan biologis mempunyai keterkaitan yang kuat.
- ➔ Pada model ini rumah tangga merupakan pusat pengaruh dari berbagai variabel.

Gaya hidup merupakan hasil pengaruh beragam variabel bebas yang terjadi di dalam keluarga atau rumah tangga. Berbagai faktor saling berkaitan dan berpengaruh terhadap individu dalam keluarga, misalnya dalam upaya pengambilan keputusan dan tuntutan pemenuhan kebutuhan serta penyalur-an aspirasi keluarga. Dapat dikatakan bahwa keluarga

atau rumah tangga merupakan faktor utama dalam pembentukan pola perilaku makan dan juga dalam pembinaan kesehatan keluarga. Beberapa variabel yang kuat dalam peramalan kesehatan dan perilaku makan dalam keluarga atau rumah tangga, meliputi unsur-unsur pekerjaan kepala keluarga, jumlah anak, pendidikan dan sebagainya.

Kemampuan dalam proses memilih dan mengambil keputusan di rumah tangga banyak memanfaatkan faktor-faktor eksternal, misalnya pendapatan dan tipe masyarakat. Karena tidak ada keluarga atau rumah tangga yang mempunyai identitas dan nilai-nilai yang sama, maka masing-masing akan mempunyai gaya hidup dan keunikan tersendiri. Namun demikian masih terlihat adanya kesamaan dalam cara hidup yang berhubungan dengan kebiasaan makan dan perilaku kesehatan. Faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya kanker payudara, misalnya: pengetahuan tentang gizi, pendidikan serta pendapatan.

Setiap orang untuk hidup dan meningkatkan kualitas hidupnya memerlukan lima komponen zat gizi dalam jumlah yang cukup tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Disamping itu manusia memerlukan air dan serat untuk memperlancar berbagai proses faal dalam tubuh. Apabila konsumsi makanan sehari-hari kurang beranekaragam, maka akan timbul ketidak seimbangan antara masukan dan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk hidup sehat dan produktif. Dengan mengkonsumsi makanan sehari-hari yang beranekaragam, kekurangan zat gizi pada jenis makanan yang satu akan dilengkapi oleh keunggulan susunan zat gizi jenis makanan yang lain sehingga diperoleh susunan gizi yang seimbang (Paath, Erna Francin dkk, 2004 : 33.) Lima komponen zat gizi yang dimaksud adalah:

a. Karbohidrat

Karbohidrat sebagai zat gizi merupakan kelompok zat-zat organik yang mempunyai struktur molekul yang berbeda-beda, meski terdapat persamaan dari sudut dan fungsinya.

Karbohidrat yang terkandung dalam makanan pada umumnya hanya ada tiga jenis yaitu:

Polisakarida, Disakarida, dan Monosakarida (Soegeng Santoso dan Anne Lies, 2004 : 108).

b. Protein

Protein merupakan zat gizi yang sangat penting karena yang paling erat hubungannya dengan kehidupan. Protein mengandung unsur C, H, O dan unsur khusus yang tidak terdapat pada karbohidrat maupun lemak yaitu nitrogen. Protein nabati dapat diperoleh dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan protein hewani didapat dari hewan.

c. Lemak

Merupakan senyawa organik yang majemuk, terdiri dari unsur-unsur C, H, O yang membentuk senyawa asam lemak dan gliserol, apabila bergabung dengan zat lain akan membentuk lipoid, fosfolipoid dan sterol.

d. Vitamin

Vitamin berasal dari kata Vitamine oleh Vladimin Funk karena disangka suatu ikatan organik amine dan merupakan zat vitamin yang dibutuhkan untuk kehidupan. Ternyata zat ini bukan merupakan amine, sehingga diubah menjadi vitamin.

e. Mineral

Mineral merupakan zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit.

Mengacu dari uraian di atas konsep makanan bergizi menurut Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

Orang yang mau mendalami ayat-ayat Al-Qur'an akan menyadari bahwa Allah sudah merentangkan segala penjelasan di dalam Kitab-Nya dan menunjukkan kepada manusia cara-cara untuk memudahkan hidup baik di dunia ini maupun di alam berikutnya. Subjek lain yang menarik perhatian manusia yang memahami adalah yang diutarakan Al-Qur'an tentang makanan-makanan khas yang baik untuk kesehatan manusia.

Al-Qur'an menyebutkan sejumlah buah-buahan yang oleh ilmu pengetahuan modern ditegaskan memiliki khasiat untuk mencegah beberapa jenis penyakit. Buah-buahan yang memberikan manfaat pada tubuh manusia dalam berbagai cara, juga enak rasanya. Di dalam ayat-ayat Al-

Qur'an, Allah menyuruh manusia supaya memperhatikan keberagaman dan keindahan disertai seruan agar merenungkan ciptaan-ciptaan-Nya yang amat menakjubkan,

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ
خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا كَثِيرًا وَمِمَّا كَسَبُوا مِنَ النَّخْلِ مِنْ تَلْعَاهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ
مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَيَنْعِمَ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahannya:

"Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuhan-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan Kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pula) kematangannya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman. (Q.S. al An'aam/6 : 99)

2. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha manusia untuk membina kepribadian sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Istilah pendidikan atau *paedagogie* berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa serta dapat mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi. Sebagaimana dikemukakan oleh John Dewey. Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia.

Pendidikan secara umum adalah segala upaya di rencanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu maupun masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang di harapkan oleh pelaku pendidikan. Dari batasan di atas tersirat unsur-unsur pendidikan yakni input, proses dan output.

Sedangkan pendidikan kesehatan adalah aplikasi atau penerapan pendidikan dalam bidang kesehatan (Notoatmodjo, 2003 dalam : Verawati 2008 : 14)

Pendidikan dapat ditempuh melalui tiga jenis pendidikan yaitu pendidikan informal, pendidikan non formal, dan pendidikan formal, baik secara terpisah maupun gabungan diantara dua atau tiga jenis pendidikan tersebut.

a. Pendidikan Informal

Jenis pendidikan ini meliputi keterampilan, pengetahuan, sikap, nilai dan cara hidup pada umumnya, berlangsung sepanjang umur dan cara berlangsungnya paling wajar. Berlangsung tidak terikat jam, hari, bulan dan tahun tetapi bisa terjadi setiap saat pada insan yang berinteraksi secara sadar dan bermakna. Jenis pendidikan ini memang tidak diatur dalam suatu organisasi secara struktural dan sama sekali tidak mengenal perjenjangan secara kronologis menurut tingkatan umur maupun tingkatan ketrampilan dan pengetahuan. Adapun suasananya tidak hanya kategori sosial tertentu dari kelompok tertentu, tetapi semua kategori sosial dan kelompok usia (R. Tillar dan Sardin Pabbadja, 1979: 6-7 dalam: Dewi Andarwati, 2007).

b. Pendidikan Non Formal

Tujuan dari pendidikan ini selalu berorientasikan langsung pada hal-hal yang penting bagi kehidupan, tergantung pada taraf hidup orang yang bersangkutan secara ekonomis, keadaan budaya, maka ditentukan pada kebutuhankebutuhan praktis ekonomis sesuai dengan keadaan social budaya serta lingkungan sekitar. Pendidikan jenis ini perlu diorganisasikan dan isi pendidikan diprogram secara khusus, misalnya praktek kerja lapangan atau magang.

c. Pendidikan Formal

Ciri pendidikan formal yang sampai saat ini tidak dimiliki oleh pendidikan non formal dan informal adalah adanya penjenjangan kronologis yang ketat untuk tingkattingkat umur populasi sarasanya dan menurut tingkat pengetahuan dan ketrampilan. Hal ini jelas

tercermin pada penjenjangan yang mengatur sistem penyampaian dari taman kanak-kanak sampai sarjana di perguruan tinggi. Yang masing-masing jenjang menerima kelompok umur tertentu dan memberikan pengetahuan serta ketrampilan tertentu. Ciri lain yang membedakan secara menyolok yaitu ada pengorganisasian lebih ketat, program lebih formal, perurutan lebih sistematis, adanya sanksi legal dan berlaku untuk semua bidang pada semua lembaga.

Survei Demografi di 40 negara (Engendering Development, Bank Dunia, 2001) memperlihatkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan mengalami kemajuan dalam menegakkan diagnosis dengan cepat dan tepat. Keadaan ini tak akan mungkin di capai tanpa di tunjang dengan sarana yang memadai yaitu dengan ditemukannya alat-alat canggih serta kemampuan dalam menggunakannya, penatalaksanaan keganasan payudara akan mengalami kemajuan yang sangat pesat akan tetapi angka kematian dan angka kejadian keganasan payudara masih tetap tinggi. Hal ini di sebabkan penderita pada stadium lanjut, oleh karena itu deteksi dini dan diagnosa keganasan payudara memegang peranan yang sangat penting. Apabila keganasan payudara dapat terdeteksi secara dini dan mendapat penanganan yang secepatnya maka akan memberikan harapan kesembuhan dan harapan hidup yang lebih baik. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ

Artinya : *“Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan”*.
(Hasbullah, 2009 : 259)

Hadis tersebut mencerminkan bahwa di dalam Islam terdapat demokrasi pendidikan, di mana Islam tidak membeda-bedakan antara muslim laki-laki maupun perempuan dalam hal kewajiban dan hak menuntut ilmu. Oleh karena itu, pendidikan harus di sebarluaskan ke segenap lapisan masyarakat secara adil dan merata sesuai dengan disparitas yang ada atau sesuai kondisi jumlah penduduk yang harus di layani. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَئِن لَّمْ يَكُن لِّي رَحِيمٌ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
كَلَّا لَأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ



Terjemahannya :

Maka tatkala isteri 'Imran melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, Sesungguhnya Aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya Aku Telah menamai dia Maryam dan Aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk." (Q.S. Ali Imran/3 : 36)

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menuntut ilmu, bahkan sejak kita lahir di muka bumi. Kita sudah dituntut untuk menuntut ilmu, sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

أَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى التَّحْدِ

Artinya:

“Tuntutlah ilmu dari buaian sampai meninggal dunia” (Hasbullah, 2009 : 64)

Konsep tersebut menjadi aktual kembali terutama dengan terbitnya buku An Introduction to Lifelong Education, pada tahun 1970 karya Paul Lengrand yang dikembangkan lebih lanjut oleh UNESCO.

3. Pendapatan

Umumnya jika pendapatan naik jumlah dan jenis makanan cenderung ikut membaik juga. Akan tetapi, mutu makanan tidak selalu membaik kalau di terapkan tanaman perdagangan. Tanaman perdagangan menggantikan produksi pangan untuk rumah tangga dan pendapatan yang di peroleh dari tanaman perdagangan itu atau upaya peningkatan pendapatan yang lain tidak di canangkan untuk membeli pangan atau bahan-bahan pangan berkualitas gizi tinggi (Suhardjo, 1986 : 25 dalam : Dewi

Andar Wati, 2007).

Tingkat penghasilan ikut menentukan jenis pangan apa yang akan dibeli dengan adanya tambahan uang. Semakin tinggi penghasilan, semakin besar pula persentase dari penghasilan tersebut dipergunakan untuk membeli buah, sayur mayur dan berbagai jenis bahan pangan lainnya. Jadi penghasilan merupakan faktor penting bagi kuantitas dan kualitas. Antara penghasilan dan resiko kejadian kanker payudara, jelas ada hubungan yang menguntungkan. Pengaruh peningkatan penghasilan terhadap perbaikan kesehatan dan kondisi keluarga lain yang mengadakan interaksi dengan status gizi yang berlawanan hampir universal (Achmad Djaeni Sediaoetama 2004 : 50).

Ahli ekonomi berpendapat bahwa dengan perbaikan taraf ekonomi maka tingkat resiko kejadian kanker payudara akan berkurang. Namun ahli gizi dapat menerima dengan catatan, bila hanya faktor ekonomi saja yang merupakan penentu status gizi. Kenyataannya masalah gizi bersifat multikompleks karena tidak hanya faktor ekonomi yang berperan tetapi faktor-faktor lain ikut menentukan. Oleh karena itu perbaikan gizi dapat dianggap sebagai alat maupun sebagai sasaran daripada pembangunan sehingga kita dituntut untuk membuat skala prioritas, tidak menghambur-hamburkan penghasilan yang kita dapat.

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ أَمْوَالَكُم مِّمَّا كَسَبْتُمْ مِنْ حَيْثُ مَكَانًا سَاءًا فَتَتَّبِعُوا بِهِنَّ أَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١٧﴾
الْمُبْذَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِمْ كَفُورًا ﴿١٨﴾

Terjemahannya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S. Al Israa/17 : 26-27)

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk memberikan sebagian harta yang kita miliki, kepada orang-orang yang membutuhkannya seperti : fakir miskin, anak-anak terlantar, atau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh seperti musafir, tetapi kita dilarang untuk tidak menghambur-hamburkan harta yang kita miliki pada suatu yang kurang bermanfaat karena sesungguhnya sifat boros adalah bagian dari saudara-saudara syetan yang tidak bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Campur tangan pemerintah memang diperlukan, ditinjau dari pihak pengusaha dipandang layak, karena bertujuan untuk melindungi pihak yang lemah, yang dalam hal ini adalah buruh, agar tercapai keseimbangan yang mendekatkan masyarakat kita pada tujuan Negara, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi kemanusiaan untuk tiap-tiap negara. Sebagaimana penerapan standar upah minimum regional (UMR) di Sulawesi Selatan, standar upah minimum regional (UMR) pada tahun 2010 sebesar Rp. 1.150.000,- meningkat dari tahun 2009 dimana pada tahun 2009 sebesar Rp. 950.000,-.

Ketentuan tersebut di atas, antara lain disebabkan pemerintah memegang teguh tujuan melindungi siapa saja yang lemah, agar dapat tercapai suatu keseimbangan yang mendekatkan masyarakat kita kepada suatu tujuan negara.

4. Faktor Genetik dan Hormonal (endogen dan eksogen)

Telah ditemukan dua varian gen yang tampaknya berperan dalam terjadinya kanker payudara, yaitu BRCA1 dan BRCA2. Jika seorang wanita memiliki salah satu dari gen tersebut, maka kemungkinan menderita kanker payudara sangat besar. Gen lainnya yang juga diduga berperan dalam terjadinya kanker payudara adalah p53, BARD1, BRCA3 dan Noey2.

Kenyataan ini menimbulkan dugaan bahwa kanker payudara disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel yang secara genetik mengalami kerusakan

Faktor hormonal juga penting karena hormon memicu pertumbuhan sel. Kadar hormon yang tinggi selama masa reproduktif wanita, terutama jika tidak diselingi oleh perubahan

hormonal karena kehamilan, tampaknya meningkatkan peluang tumbuhnya sel-sel yang secara genetik telah mengalami kerusakan dan menyebabkan kanker.

5. Virus dan Bakteri

Virus (misal Human papillomavirus penyebab kanker mulut rahim), zat kimia (misal asap rokok menyebabkan kanker paru), sinar radiasi (radiasi ultraviolet pada saat terik dapat menyebabkan kanker kulit).

Virus dan bakteri :

- 1) Human papillomavirus (HPV) : merupakan penyebab utama kanker mulut rahim, dan juga merupakan faktor risiko untuk kanker lainnya.
- 2) Virus Hepatitis B dan C : dapat menyebabkan kanker hati beberapa tahun setelah terinfeksi virus ini.
- 3) Human T-Cell Leukemia/Lymphoma Virus : orang yang terinfeksi virus ini akan meningkatkan risiko terkena limfoma atau leukemia (keganasan darah)
- 4) Human Immunodeficiency Virus (HIV) : infeksi HIV menyebabkan penyakit AIDS. Orang yang terinfeksi HIV memiliki risiko tinggi kanker tertentu, misalnya limfoma dan yang lebih jarang, sarkoma Kaposi.
- 5) Epstein-Barr virus (EBV) : infeksi EBV dikaitkan dengan peningkatan kejadian limfoma
- 6) Human Herpes virus 8 (HHV8) : infeksi virus ini meningkatkan kejadian sarkoma Kaposi.
- 7) Helicobacter pylori : infeksi bakteri ini menyebabkan luka di lambung dan dapat meningkatkan risiko terkena kanker lambung dan limfoma di sekitar lambung.

6. Penyinaran

Pemaparan terhadap penyinaran (terutama penyinaran pada dada), pada masa kanak-kanak bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker payudara (Smeltzer, Suzanne, 2001).

7. Lingkungan

Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai:

- a. Daerah di mana sesuatu makhluk hidup berada.
- b. Keadaan/kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup.
- c. Keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup, terutama:
 - 1) Kombinasi dari berbagai kondisi fisik di luar makhluk hidup yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan dan kemampuan makhluk hidup untuk bertahan hidup.
 - 2) Gabungan dari kondisi sosial and budaya yang berpengaruh pada keadaan suatu individu makhluk hidup atau suatu perkumpulan/komunitas makhluk hidup.

BAB III

KERANGKA KONSEP


A. Dasar pemikiran variabel penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana faktor – faktor yang berhubungan dengan kejadian kanker payudara di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar.

Faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya kanker payudara, misalnya : pengetahuan tentang gizi, di mana pengetahuan tentang gizi yang seimbang akan dapat mencegah masalah psikososial melalui perilaku dari orang tua, ibu atau pengasuh dalam keluarga untuk selalu menyediakan makanan dengan gizi seimbang pada anggota keluarganya. Perlu di ketahui yang di maksud dengan gizi seimbang adalah makanan yang di konsumsi individu dalam satu hari, yang beranekaragam dan mengandung zat tenaga, zat pembangun serta zat pengatur sesuai kebutuhan tubuh.

Sedangkan pendidikan adalah ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan dengan prinsip dan metode serta pengawasan dan bimbingan terhadap orang lain, dalam arti luas kemampuan dalam pengobatan serta keberhasilan dalam menemukan alat deteksi dini dari serangan kanker payudara serta dapat memberikan prospek masa depan yang cerah dalam penanggulangan penderita kanker payudara serta bagaimana menyadarkan masyarakat agar jauh-jauh hari sebelum penyakit ini menjadi manifest dalam tubuhnya agar segera memeriksakan diri secara berkala dengan di tunjang penghasilan yang baik. Di mana pendapatan adalah tingkat penghasilan yang di terima dalam menentukan jenis pangan apa yang di konsumsi dalam peningkatan kesehatan dan kondisi keluarga lainnya.

B. Kerangka konsep



C. Variabel yang di teliti

Variabel penelitian:

1. Variabel dependen (terikat)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pencegahan serta pengobatan pasien kanker payudara di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Dalam hal ini dapat dilihat seberapa besar pengaruh tingkat kesembuhan pasien.

2. Variabel independen (bebas)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat resiko yang di alami oleh pasien kanker payudara di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar 2010.

D. Defenisi operasional

1. Kanker Payudara

Kanker payudara adalah sebuah benjolan yang terdapat pada jaringan payudara di sekitarnya, pada saat dilakukan penelitian menurut hasil pemeriksaan mammografi dengan kriteria objektif.

- a. Berisiko : yang terdiagnosa pada stadium III dan IV
- b. Tidak berisiko : yang terdiagnosa pada stadium I dan II

2. Pengetahuan tentang gizi

Yang di maksud pengetahuan gizi adalah pengetahuan tentang nutrisi yang membahas tentang sifat-sifat nutrient (zat gizi) yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi setiap hari. Kriteria objektif:

- a. Kurang : dapat menjawab dengan benar ≥ 50 persen pertanyaan
- b. Baik : tidak dapat menjawab dengan benar < 50 persen pertanyaan

3. Pendidikan

Yang di maksud tingkat pendidikan dalam penelitian ini adalah : proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional melalui jenjang pendidikan formal terakhir yang pernah di ikuti dan di ukur dengan menggunakan skala ordinal dengan Kriteria objektif.

- a. Rendah : bila jenjang pendidikan terakhir pasien adalah SD atau SMP
- b. Tinggi : bila jenjang pendidikan terakhir pasien minimal SMA

4. Pendapatan

Pendapatan adalah segala bentuk penghasilan atau penerimaan anggota keluarga dalam bentuk rupiah yang di terima setiap bulannya, berdasarkan standar upah minimum regional (UMR) dengan Kriteria objektif

- a. Tinggi : pendapatan \geq Rp.1.150.000.
- b. Rendah : pendapatan $<$ Rp.1.150.000

E. Hipotesis

1. Hipotesis Alternatif

- a. Ada hubungan antara pengetahuan tentang gizi dengan kejadian kanker payudara .
- b. Ada hubungan antara pendidikan dengan kejadian kanker payudara .
- c. Ada hubungan antara pendapatan dengan kejadian kanker payudara.

2. Hipotesis Nol

- a. Tidak ada hubungan antara pengetahuan tentang gizi dengan kejadian kanker payudara .
- b. Tidak ada hubungan antara pendidikan dengan kejadian kanker payudara .
- c. Tidak ada hubungan antara pendapatan dengan kejadian kanker payudara.

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian non eksperimen dengan menggunakan metode pendekatan *deskriptif analitik* dengan menggunakan rancangan *cross sectional*.

B. Populasi, sampel, besarnya sampel dan teknik pengambilan sampel, kriteria inklusif dan kriteria eksklusif (kriteria pemilihan).

1. Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah semua pasien yang sedang di rawat di ruang Perawatan Lontara II bagian Bedah Tumor dan Poliklinik Bedah Tumor. Jumlah populasi 50 orang.

2. Sampel

Sampel pada penelitian adalah pasien yang terdiagnosa kanker payudara yang dirawat di ruang Lontara II dan Poliklinik Bedah Tumor dan tercatat di registrasi RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar.

Kelola adalah responden yang tidak menderita kanker payudara metode pengambilan sampel menggunakan *total sampling*, dimana pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 50 orang sesuai dengan kriteria yang dibedakan ke dalam dua kriteria, yaitu:

1. Kriteria inklusif
 - a. Pasien yang di diagnosa kanker payudara
 - b. Pasien yang sementara di rawat di ruang perawatan
 - c. Pasien yang bersedia menjadi responden
2. Kriteria eksklusif
 - a. Pasien kanker payudara yang tidak sadar
 - b. Pasien kanker payudara rawat jalan
 - c. Pasien yang tidak mau menjadi responden. Pasien yang tidak didampingi keluarga.

C. Instrumen penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian dengan teknik pengisian kuesioner oleh responden. Pendidikan tinggi kuesioner diisi langsung oleh responden sedangkan pendidikan rendah dibantu oleh peneliti untuk mengisi kuesioner.

D. Prosedur pengumpulan data

- a. Seleksi (selected)

Seleksi merupakan pemilihan untuk Mengklasifikasi data menurut kategori

- b. Penyuntingan data (edited)

Setelah data terkumpul, peneliti akan mengadakan seleksi dan edited yakni memeriksa setiap kuesioner yang telah di isi mengenai kebenaran data yang sesuai dengan variabel

c. Pengekodaan (Code)

Mengklasifikasi jawaban –jawaban responden ke dalam bentuk nilai dilakukan dengan memberi tanda/kode pada masing-masing jawaban.

d. Kabulasi data (Kabulatined)

Membuat tabel untuk data yang telah di kelompokkan selanjutnya data diolah dengan memberikan skor pada setiap jawaban responden dengan menggunakan pada skala likker. Setelah data diolah dengan menggunakan teknik tersebut diatas, maka data akan dianalisa dengan menggunakan tabel distribusi yang di konfirmasi dalam bentuk prosentase dan narasi.

e. Prosedur pengambilan/pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

1. Data primer yaitu suatu teknik pengumpulan data yang membuat pertanyaan-pertanyaan secara tertulis hal-hal yang berkaitan dengan variabel penelitian dan diperoleh melalui responden.
2. Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung penelitian yang sedang di lakukan. Data ini di peroleh dari pihak rumah sakit di mana merupakan suatu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui bahan-bahan tertentu bersifat teknis yang perlukan.

f. Analisis data

1. Analisa univariate

Analisa unifariate dilakukan pada tiap-tiap variabel penelitian terutama untuk melihat variabel independen dan dependen dalam menghasilkan persentase pada tiap

variabel yang diteliti.

2. Analisa bivariate

Analisa bifariate dilakukan untuk melihat hubungan tiap-tiap variabel dengan menggunakan visi statistik untuk penilaian hubungan serta hidup yang berhubungan dengan resiko kejadian kanker payudara dengan melihat signifikan $\alpha \leq 0.05$ uji yang digunakan adalah uji chi Square menggunakan komputer program spss 16.0 (Hidayat, A.Azis Aumol, 2007)



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di ruang perawatan Lontara II bagian Bedah Tumor RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Pengumpulan data dimulai dari tanggal 29 Juli sampai dengan 11 agustus 2010 dengan total sampel sebanyak 50 orang. Pengumpulan data dilakukan secara langsung terhadap responden. Selanjutnya peneliti mengadakan pendekatan kepada responden kemudian memberikan penjelasan sesuai dengan etika penelitian. Apabila responden bersedia maka dipersilahkan menandatangani lembar kuesioner untuk diisi atau dijawab pada saat itu juga kemudian diolah dengan menggunakan SPSS 16,0. Hasil penelitian dan pengolahan data dapat dilihat sebagai berikut :

1. Hasil Univariat

Analisis dilakukan terhadap tiap variabel penelitian yang variabel independent (pengetahuan tentang gizi, pendidikan, dan pendapatan) variabel independen.

a) Pengetahuan tentang gizi

Tabel 1


Distribusi Responden berdasarkan pengetahuan tentang gizi di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2010

No	Pengetahuan tentang gizi	Frekuensi	Persen (%)
1	Kurang	22	44
2	Cukup	28	56
	Total	50	100

Sumber : Analisis data primer, 2010

Diagram 1

Kelompok Responden Berdasarkan Pengetahuan tentang Gizi



Berdasarkan tabel dan diagram di atas menunjukkan bahwa dari 50 responden diperoleh hasil bahwa 28 orang (56%) berisiko, sedangkan 22 orang (44%) tidak berisiko.

b) Pendidikan

Tabel 2


Distribusi Responden berdasarkan pendidikan di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo Makassar Tahun 2010

No	Pendidikan	Frekuensi	Persen (%)
1	Rendah	12	24
2	Tinggi	38	76
	Total	50	100

Sumber : Analisis data primer, 2010

Diagram 2

Kelompok Responden Berdasarkan pendidikan



Berdasarkan tabel dan diagram di atas menunjukkan bahwa dari 50 responden yang masuk dalam kategori berpendidikan tinggi berisiko, sejumlah 38 orang (76%), sedangkan responden yang berpendidikan rendah dan tidak berisiko dalam penelitian ini berjumlah 12 orang (24 %) tidak berisiko

c) Pendapatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tabel 3

Distribusi Responden berdasarkan pendapatan di RSUP DR. Wahidin Sudirohusodo


Makassar Tahun 2010

No	Pendidikan	Frekuensi	Persen (%)
1.	Rendah	19	38
2.	Tinggi	31	62
	Total	50	100

Sumber : Analisis data primer, 2010

Diagram 3

Kelompok Responden Berdasarkan pendapatan



Berdasarkan tabel pendapatan dan diagram di atas menunjukkan bahwa dari 50 responden mempunyai pendapatan tinggi dan berisiko sejumlah 31 orang (62%), sedangkan responden yang tidak berisiko pada penelitian ini berjumlah 19 orang (38 %)

2. Analisa Bivariat

Analisa bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau toleransi, dalam hal ini variabel independen pengetahuan tentang gizi, pendidikan dan pendapatan dengan variabel dependen (resiko terjadinya kanker payudara)

- a. Hubungan pengetahuan tentang gizi terhadap faktor yang berhubungan kejadian kanker payudara

Tabel 4

Hubungan pengetahuan tentang gizi terhadap faktor kejadian kanker payudara

Pengetahuan tentang gizi	Resiko kanker payudara				Total	
	Berisiko		Tidak berisiko		N	%
	N	%	N	%		
Kurang	11	22	18	36	29	58
Cukup	11	22	10	20	21	42
Total	22	44	28	56	50	100,0

Sumber : Analisis data primer, 2010

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dari 50 responden diperoleh hasil bahwa yang berpengetahuan gizi kurang sebanyak 11 orang (22%) berisiko menderita kanker payudara sedangkan yang tidak berisiko sebanyak 18 orang (36 %) sementara yang berpengetahuan gizi tinggi sebanyak 11 orang (22 %) berisiko menderita kanker payudara sedangkan yang tidak berisiko sebanyak 10 orang (20%).

Setelah dilakukan uji statistik dengan menggunakan uji *chi – square* diperoleh nilai $p = 0,031 < 0,05$ yang berarti bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan tentang gizi terhadap kejadian kanker payudara.

- b. Hubungan pendidikan terhadap faktor kejadian kanker payudara

Tabel 5

Hubungan pendidikan terhadap faktor kejadian kanker payudara

Pendidikan	Resiko kanker payudara				Total	
	Berisiko		Tidak berisiko		N	%
	N	%	N	%		
Rendah	5	10	24	48	29	58
Cukup	7	14	14	28	21	42
Total	12	24	38	76	50	100,0

Sumber : Analisis data primer, 2010

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dari 50 responden, yang memiliki pendidikan rendah sebanyak 29 orang (58 %) yang berisiko menderita kanker payudara sebanyak 5 orang (10 %) sedangkan yang tidak berisiko menderita sebanyak 24 orang (48 %), sedangkan hasil penelitian yang memiliki pendidikan tinggi dan berisiko menderita kanker payudara sebanyak 7 orang (14%) sementara yang tidak berisiko sebesar 14 orang (28 %).

Setelah dilakukan uji statistik dengan menggunakan uji *chi – square* diperoleh nilai $p = 0,019 < 0,05$ yang berarti bahwa terdapat hubungan antara pendidikan terhadap kejadian kanker payudara.

c. Hubungan pendapatan terhadap faktor kejadian kanker payudara

Tabel 6

Hubungan pendapatan terhadap faktor kejadian kanker payudara

Pendapatan	Resiko kanker payudara				Total	
	Berisiko		Tidak berisiko		N	%
	N	%	N	%		
Kurang	7	14	22	44	29	58
Cukup	12	24	9	18	21	42
Total	19	38	31	62	50	100,0

Sumber : Analisis data primer, 2010

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa dari 50 orang responden, yang berpenghasilan rendah sebanyak 29 orang (58 %) yang berisiko menderita kanker payudara sebanyak 7 orang (14 %) sedangkan yang tidak berisiko sebanyak 22 orang (44 %) sementara yang berpenghasilan tinggi dan berisiko menderita kanker sebanyak 12 orang (24 %) sedangkan yang tidak berisiko sebanyak 14 orang (28%). Dimana yang berpenghasilan tinggi lebih berisiko terkena kanker payudara dibandingkan yang berpenghasilan rendah.

Setelah dilakukan uji statistik dengan menggunakan uji *chi – square* diperoleh nilai $p = 0,019 < 0,05$ yang berarti bahwa terdapat hubungan antara pendapatan terhadap kejadian kanker payudara.

B. Pembahasan

1. Hubungan pengetahuan tentang gizi terhadap faktor resiko kejadian kanker payudara

Dari hasil penelitian dan pengolahan data diperoleh bahwa dari 50 responden yang berpengetahuan tentang gizi yang berisiko berjumlah 22 orang (44 %) dan responden yang tidak berisiko sebanyak 28 orang (56 %).

Berdasarkan pada uji *chi – square* hubungan antara pengetahuan tentang gizi terhadap kejadian kanker payudara didapatkan adanya hubungan antara pengetahuan tentang gizi terhadap kejadian kanker payudara dengan nilai signifikansi $p = 0,031$ di mana nilai $p < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti bahwa hubungan yang antara pengetahuan tentang gizi terhadap kejadian kanker payudara cukup kuat.

Hal ini secara teoritik dapat diterangkan bahwa seiring dengan bertambahnya tingkat pengetahuan akan hal gizi. Kejadian kanker payudara pun akan menurun hal ini dikarenakan pasien menjaga makanan-makanan yang dikonsumsi, apalagi yang berhubungan dengan kejadian kanker payudara, sedangkan pasien yang berhubungan dengan gizi yang rendah secara otomatis pula akan mempengaruhi tingkat kejadian kanker payudara dimana mereka belum bisa mengelompokkan makanan apa yang bisa meningkatkan tingkat resiko kejadian kanker payudara seperti kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji ketidaktahuan efek dari kegemaran mengkonsumsi *Junk Food* makanan berkadar lemak tinggi (Eni Setiati, 2009).

Untuk wanita dengan resiko tinggi, resiko berkembangnya kanker dapat diturunkan menjadi 50 % dengan meminum obat yang disebut *tamoksifen* selama 5 tahun, namun *tamoksifen* memiliki efek samping seperti gangguan vaginal, yang berbahaya dan beberapa efek samping yang dapat mengancam nyawa seperti pengumpulan darah, pulmonary embolus, stroke dan kanker uterin.

Namun perlu diingat bahwa *tamoksifen* tidak lazim digunakan sebagai langkah pencegahan, tetapi dapat berguna untuk beberapa kasus data yang menyebutkan bahwa vitamin A, C dan E dapat melindungi anda dari kanker payudara, akan tetapi penelitian lebih lanjut masih dibutuhkan untuk

membuktikan data tersebut (Eni Setriati, 2009).

Meskipun benar bahwa kejadian kanker payudara meningkat dengan semakin bertambahnya tingkat pengetahuan akan gizi di mana satu dari 231 akan mendapatkan kanker payudara ($< 0,5\%$ resiko) dari tingkat pengetahuan paling rendah resiko adalah 1,03 resiko adalah satu dari 50 (dua persen) dari pasien yang tingkat pengetahuan akan gizi yang cukup berisiko. Resiko adalah satu dari dua (sekitar empat persen) dengan asumsi anda menerapkan pola hidup yang sehat sehingga resiko mendapatkan kanker payudara, selama hidup adalah satu dalam empat dengan keseluruhan masa resiko delapan persen.

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang gizi yang baik akan menyebabkan seseorang mampu menyusun menu yang baik untuk dikonsumsi, semakin banyak pengetahuan gizi seseorang, maka ia akan semakin memperhitungkan jenis dan jumlah makanan yang diperolehnya, sehingga kebiasaan mengkonsumsi makanan-makanan yang dapat menyebabkan kejadian kanker payudara dapat dihindari seperti kebiasaan mengkonsumsi makanan berlemak, makanan cepat saji, dan instan yang mengandung zat pewarna dan zat pengawet.

Pengetahuan tentang gizi sudah ada jauh sebelum pengetahuan akan gizi di zaman modern seperti sekarang ini. Hal ini telah tersurat dalam Al-Qur'anul Qarim yang berbunyi :

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ
مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Terjemahannya :

Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang Telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan (Q.S. An-Nahl/16 : 69)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dari berbagai jenis makanan yang ada kita dianjurkan untuk memilih mengkonsumsi makanan yang bergizi dan menyehatkan sebagaimana perumpamaan seperti lebah yang mengkonsumsi makanan yang baik dan menghasilkan pula makanan yang baik dan bergizi tinggi. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan.

Selain mengkonsumsi makanan yang enak dan bergizi tinggi kita juga wajib berpuasa di mana puasa adalah berfungsi sebagai detoksifikasi yang bersifat total dan holistik artinya tujuan pembersihan bukan hanya sebatas fisik saja tetapi juga meliputi pembersihan dan peningkatan energi pada jiwa dan pikiran. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah/2 : 183)

Ayat di atas menjelaskan bahwa diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu sebagaimana bentuk ketakwaan kepada sang pencipta. Sebab puasa adalah karunia Tuhan untuk kebaikan manusia, karena yang memperoleh manfaat dari puasa adalah manusia itu sendiri, bukan Tuhan dan bukan pula orang lain.

2. Hubungan Pendidikan terhadap Faktor Resiko terjadi Kanker Payudara

Dari hasil penelitian dan pengolahan data diperoleh bahwa dari 50 responden dengan pendidikan yang tinggi, beresiko terkena kanker payudara hal ini terlihat pada tabel dengan jumlah 12 orang (24 %), sedangkan responden yang tidak beresiko pada penelitian ini adalah 38 orang (76 %).

Berdasarkan pada uji *chi – square* hubungan antara pendidikan terhadap kajian kanker payudara didapatkan adanya hubungan antara pendidikan terhadap kejadian kanker payudara dengan nilai signifikansi $p = 0,019$ di mana nilai $p = < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti

bahwa hubungan antara pendidikan terhadap kejadian kanker payudara cukup kuat.

Hal ini secara teoritik dapat diterangkan bahwa pendidikan yang tinggi tidak menjamin tingkat terjadinya kanker payudara jika tidak dibarengi pola hidup yang sehat di dalam satu keluarga, karena pendidikan merupakan satu kesatuan hidup (sistem sosial) dan keluarga menyediakan situasi belajar.

Sebagai satu kesatuan hidup bersama (sistem sosial) keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, ikatan kekeluargaan membantu anak mengembangkan sifat persahabatan, cinta kasih, hubungan antar pribadi, kerja sama, disiplin. Tingkah laku yang baik serta pengakuan akan kewibawaan (Hasbullah 1999).

Pola hidup yang sehat dibutuhkan karena walaupun pendidikan kita tinggi jika tidak dibarengi dengan makanan yang kita konsumsi tidak sehat seperti konsumsi makanan-makanan cepat saji, bisa meningkatkan terjadinya kanker payudara.

Dari hasil penelitian membuktikan pendidikan yang tinggi tidak menjamin terbebas dari resiko terserang kanker payudara tanpa diimbangi dengan pola hidup yang sehat sebab resiko terserang kanker payudara dengan pola hidup yang tidak sehat atau pola hidup yang berlebih-lebihan sebesar 25 % pola hidup yang sehat, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Santoso 2005 mengemukakan bahwa soal hidup berlebihan akan memberi resiko terjadinya kanker payudara 3,244 kali lebih besar daripada mereka yang memiliki pola hidup yang sehat hal ini dapat dilihat dari Firman Allah SWT yang mengatakan bahwa peran keluarga dalam pendidikan sangatlah penting, untuk mengurangi tingkat resiko kejadian kanker payudara, seperti yang dinyatakan dalam Surah At-Tahrim : 6

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu

mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim/66 : 6)

Ayat di atas menjelaskan bahwa pendidikan dalam keluarga dapat mengurangi tingkat kejadian kanker payudara. Di samping itu dapat berperan dalam pengembang watak, kepribadian, nilai budaya, nilai keagamaan dan moral, serta keterampilan.

Sementara pendidikan sekolah pada dasarnya merupakan perluasan dari pendidikan dalam keluarga. Pendidikan dalam konteks ini mempunyai arti sebagai proses sosialisasi dan enkulturasi secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mengantarkan anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tangguh, mandiri, inovatif, kreatif, beretos kerja, setia kawan, peduli antar lingkungan, dan banyak lagi sebagaimana dirinci dalam tujuan pendidikan nasional pada GBHN maupun UU Sistem Pendidikan Nasional.

3. Hubungan Pendapatan terhadap Faktor Kejadian Kanker Payudara

Dari hasil penelitian dan pengolahan data diperoleh bahwa dari 50 responden dengan pendapatan, berisiko terkena kanker payudara berjumlah 19 orang (38 %), sedangkan responden yang tidak berisiko pada penelitian ini berjumlah 31 orang (62 %).

Berdasarkan pada uji *chi – square* hubungan antara pendapatan terhadap kejadian kanker payudara didapatkan adanya hubungan antara pendapatan terhadap kejadian kanker payudara dengan nilai signifikansi $p = 0,019$ di mana nilai $p < 0,05$ sehingga H_0 ditolak H_a diterima yang berarti bahwa hubungan yang dibentuk antara pendapatan terhadap kejadian kanker payudara cukup kuat, hal ini secara teoritik dapat diterangkan bahwa pendapatan merupakan komponen yang sangat penting.

Meskipun benar bahwa kejadian kanker payudara meningkat dengan semakin bertambahnya penghasilan, kanker payudara dapat terjadi pada segala penghasilan dari penghasilan paling rendah sampai penghasilan paling tinggi adapun penghasilan atau upah menurut (Mukijat) antara lain sebagai berikut :

- a. Upah yang berlaku sekarang
- b. Kemampuan membayar

- c. Biaya hidup
- d. Produktivitas
- e. Persyaratan pekerjaan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa antara penghasilan dan kejadian kanker payudara jelas ada hubungan yang menguntungkan, pengaruh peningkatan penghasilan terhadap perbaikan kesehatan dan kondisi keluarga lain yang mengadakan interaksi dengan kejadian kanker payudara yang berlawanan hampir universal, ahli ekonomi berpendapat bahwa dengan perbaikan taraf ekonomi maka tingkat kejadian kanker payudara akan berkurang, dengan catatan bila hanya faktor ekonomi saja yang merupakan penentu kejadian kanker payudara. Kenyataannya kejadian kanker payudara bersifat kompleks, karena tidak hanya faktor ekonomi yang berperan tetapi faktor-faktor lain ikut menentukan.

Defenisi atau konsep upah atau pendapatan yang dikemukakan oleh (Mukijat) dapat juga dilihat dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 267

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah/2 : 27)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam hidup ini kita dianjurkan untuk berbagi dari penghasilan-penghasilan yang kita miliki kepada orang lain dalam hal ini orang yang bekerja di dalam mendapatkan penghasilan yang kita dapatkan dari mana saja yang penting bukan dari kejahatan atau riba.

Begitu pentingnya mengeluarkan zakat dalam mengobati penyakit-penyakit batin dan tidak bisa terdiagnosa oleh dokter serta Insya Allah dapat mengobati segala jenis penyakit baik penyakit yang nampak maupun yang tidak. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا
فِيهِ ؕ وَعَلِّمُوا أَنَّهُ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah/2 : 267)

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang mengeluarkan zakatnya semata-mata untuk mencari ridha Allah maka hati dan jiwanya akan tenang serta akan mendapatkan kedamaian yang tidak terhingga, sehingga penyakit-penyakit yang selalu mengintai makhluk hidup di muka bumi akan jauh dari ahli sedekah, seperti tumbuhan yang sedang layu di padang yang tandus dan tiba-tiba mendapat air. Maka niscaya tumbuhan tersebut akan subur kembali seperti sedia kala, sebab Allah maha melihat apa yang kita perbuat.

C. Keterbatasan

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, (Hidayat A. Azis Alimul, 2010) yaitu :

1. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner memungkinkan kurang telitian terhadap pengamatan yang dilakukan peneliti.

2. Desain Sampling

Teknik pemilihan sample dengan menggunakan teknik total sampling, di mana jumlah sampel yang diambil semua pasien yang sementara dirawat di ruang perawatan serta rawat jalan, dan bersedia menjadi responden.

3. Faktor Feasibility

Keterbatasan dana, sarana serta kemampuan peneliti sehingga mempengaruhi perumusan, penyusunan dan pengolahan data.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat hubungan antara pengetahuan tentang gizi terhadap faktor kejadian kanker payudara
2. Terhadap hubungan antara pendidikan terhadap faktor kejadian kanker payudara
3. Terdapat hubungan antara pendapatan terhadap faktor kejadian kanker payudara.

B. Saran

1. Perlu diberikan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan pada masyarakat tentang masalah yang berhubungan dengan faktor-faktor faktor kejadian kanker payudara
2. Perlu adanya usaha untuk memasyarakatkan program SADARI (pemeriksaan payudara sendiri) sebagai suatu langkah preventif atau usaha deteksi dini kanker payudara dengan tujuan untuk menekan angka kematian akibat Kanker Payudara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2008. *Panganan Penuh Hikmah yang disebut dalam "Al-Quran"*. www. Harunyahya.com.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir AL-Qur'an.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2008, *Visi Pembangunan Kesehatan: Indonesia Sehat 2010*. ([http://www. Depkes.go.id/Indonesia.html](http://www.Depkes.go.id/Indonesia.html)).(diakses 15 April 2009)
- Djazuli & Aen, 1997. *Makna Berkah dan Keberkahannya*, Edisi Pertama, Salemba Medika, Jakarta.
- Hasbullah. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hidayat, A. Azis Alimul, 2007. *Pengantar Konsep Dasar Keperawatan*, Edisi pertama, Salemba Medika, Jakarta.
- Hidayat, A. Azis Alimul, 2007. *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*, Edisi kedua, Salemba Medika, Jakarta.
- Hidayat, pertama, Salemba Medika, Jakarta.A. Azis Alimul, 2007. *Pengantar Konsep Dasar Keperawatan*, Edisi
- <http://www.susukolustrum.com.html>. Menggunakan Joomla! Generated: 13 oktober 2008. 20:02.html. (Diakses 18 April 2009)
- <http://www.dinaskesehatanpropinsisulawesiselatan.mnt.html>. (diakses 19 April 2009)
- <http://www.medicaste.com.2008.html>. (diakses 19 April 2009)
- <http://www.pharmaceutical.com.html>. (Diakses 20 April 2009)
- Jackie, Lincoln-wilensky, 2008, *Kanker Payudara Diagnosis dan Solusinya*, cetakan pertama, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Laode, Irwansyah. 2009. *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan status Gizi Balita Di Posyandu Wilayah Kerja Puskesmas Wakorumba Kabupaten Buton Utara Sulawesi Tenggara*.

Mukijat, Drs. 2007. *Penilaian Pekerjaan untuk Menentukan Gaji Dan Upah*, CV. Mandar Maju. Bandung.


Nursalam, & Siti Pariani, 2001. *Metodologi Riset Keperawatan*, CV. Sagang Seto, Jakarta.

Rianto, Kus dan Kusno Waluyo. 2004. *Gizi dan Pola Hidup Sehat*. Jakarta. CV Vrama Widya.

Smeltza, Suzzinne, 2001. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah*. Cetakan 1. Edisi 8, EGC, Jakarta.

Suhardjo. 2003. *Berbagai Cara Pendidikan Gizi*. Edisi kedua. Bumi aksara. Jakarta.

Stanley, Robins, Rarizi S. Catian, Vinay Kumar. 1999. *Buku Saku Dasar Patologi Penyakit*, edisi 5, EGC, Jakarta.



LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Nama saya adalah **SRI YULIANTI. AS**, saya adalah mahasiswa Program Studi S-I Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan Universitas Islam Negeri Makassar yang saat ini sedang melakukan penelitian berjudul :

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KANKER PAYUDARA DI RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR

Untuk maksud diatas, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini.

Adapun hal-hal yang perlu Bapak/Ibu ketahui adalah :

- ❑ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana faktor-faktor yang berhubungan dengan risiko kejadian kanker payudara.
- ❑ Waktu penelitian paling banyak dua puluh menit. Selama masa penelitian Bapak/Ibu diharapkan mengisi lembar kuisioner yang diajukan oleh peneliti.
- ❑ Selama waktu penelitian Bapak/Ibu boleh melakukan aktivitas seperti biasanya.
- ❑ Identitas Bapak/Ibu akan dirahasiakan sepenuhnya oleh peneliti, dan hanya data yang Bapak/Ibu isikan yang akan digunakan demi kepentingan penelitian
- ❑ Penelitian ini tidak akan memungut biaya sedikitpun kepada Bapak/Ibu
- ❑ Jika kemudian Bapak/Ibu berkeberatan untuk meneruskan penelitian ini, Bapak/Ibu boleh keluar dari penelitian
- ❑ Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN Peneliti
M A K A S S A R Sri Yulianti. AS

PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Setelah mendapatkan pengertian secukupnya tentang tujuan penelitian dan pengaruh penelitian bagi diri saya, maka saya menyatakan bersedia untuk menjadi peserta/ responden penelitian yang dilakukan oleh Sri Yulianti. AS dengan judul

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN KANKER PAYUDARA DI RSUP DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR

Persetujuan ini saya buat dengan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun.
Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar,2010

Saksi,

UNIVERSITAS Yang menyetujui,

(.....)

Nama Jelas

ALAUDDIN

M A K A S S A R

(.....)

Nama Jelas

LEMBAR KUESIONER

A. Identitas Responden :

1. Nomor :

2. Nama :

3. Usia :

4. Jenis kelamin :

5. Alamat :

6. Pendidikan : a. Tidak sekolah

b. SD

c. SMP

d. SMU

e. Perguruan Tinggi

f. Lain Lain

7. Status Pekerjaan : a. Tidak bekerja

b. Bekerja

8. Jenis Pekerjaan : a. Tani

b. Swasta / Pedagang

c. PNS

d. TNI / POLRI

e. Nelayan



f. Lain - lain

9. Agama : a. Islam

b. Katolik

c. Protestan

d. Hindu

e. Budha

f. Lain - Lain

B. Daftar Pertanyaan

Berilah tanda cek (√) sesuai dengan kondisi yang anda alami

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Status gizi adalah keadaan kesehatan akibat proses interaksi antara makanan, tubuh manusia dan lingkungan hidup		
2.	Makanan yang bergizi adalah makanan yang enak dan mengenyangkan		
3	Apakah pola makan dapat mempengaruhi status gizi		
4.	Nasi, sayur, lauk pauk, buah-buahan dan susu sudah memenuhi empat sehat lima sempurna		
5.	Apakah ibu sering mengkonsumsi empat sehat lima sempurna		
6.	Minyak, keju serta daging adalah makanan yang mengandung lemak		
7.	Apakah ibu sering mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak		
8.	Zat pengawet, zat pewarna serta makanan-makanan instan seperti <i>past food</i> / makanan cepat saji, misalnya : KFC, Mc.D, CFC, dll adalah makanan yang kurang sehat untuk di konsumsi		
9.	Apakah ibu sering mengkonsumsi makanan instan yang mengandung zat pewarna dan zat pengawet. Serta <i>past food</i> , (makanan cepat saji) bila ya seberapa sering....		
10.	Usia berapakah ibu mengalami menstruasi	<13	>13
11.	Usia berapakah ibu mengalami kanker payudara	<30	>30
12.	Apakah ibu sudah mengalami menopause		
13.	Apakah ibu sudah punya anak, bila (ya) berapa..... orang		
14.	Apakah ibu menyusui, bila (ya) berapa lama....		
15.	Apakah ibu pernah menggunakan alat kontrasepsi bila (ya) jenis		


	apa..... misalnya Pill KB, spiral, IUD, Kondom, Suntik.		
16.	Adakah anggota keluarga ibu yang menderita kanker payudara. Bila (Ya) saudara dari		
17.	Apakah ibu pernah mengkonsumsi rokok, dan alkohol dalam kehidupan sehari-hari bila (ya) berapa banyak..... dalam satu hari		
18.	Apakah ibu pernah mengalami penyinaran terutama pada masa kanak-kanak kalau (ya) berapa sering.....		
19.	Apakah Anda mengkonsumsi obat anti kanker. Misalnya ramokxifon, ralokxifon dll : Bila Ya, apa namanya		

No.	Sumber Pendapatan	Nilai Pendapatan dalam Rupiah/Bulan
	Total	RP

MASTER TABEL

No Resp	L/P	Umur	Pendapatan Keluarga		Pengetahuan Pasien		Pendidikan Pasien		Besar Keluarga
			Nominal	Kategori	Skor	Kategori	Jenjang	Kategori	Jumlah
1.	P	45	2.750.000	Tinggi	12	Cukup	Universitas	Tinggi	2
2.	P	19	2.800.000	Tinggi	13	Cukup	Universitas	Tinggi	-
3.	P	36	3.000.000	Tinggi	9	Kurang	SMU	Tinggi	-
4.	P	38	8.700.000	Tinggi	6	Kurang	SMU	Tinggi	-
5.	P	41	2.000.000	Tinggi	12	Cukup	SMU	Tinggi	2
6.	P	48	900.000	Rendah	7	Kurang	SMU	Tinggi	4
7.	L	22	850.000	Rendah	4	Kurang	SD	Rendah	5
8.	P	34	450.000	Rendah	9	Kurang	SMU	Tinggi	1
9.	P	35	600.000	Rendah	8	Kurang	SD	Rendah	2
10.	P	58	3.000.000	Tinggi	8	Kurang	Universitas	Tinggi	3
11.	P	58	1.150.000	Tinggi	9	Kurang	SMP	Rendah	5
12.	P	72	600.000	Rendah	6	Kurang	Tidak sekolah	Rendah	-
13.	P	52	500.000	Rendah	6	Kurang	Tidak sekolah	Rendah	7
14.	P	43	550.000	Rendah	7	Kurang	Tidak sekolah	Rendah	2
15.	P	41	2.000.000	Tinggi	9	Kurang	Universitas	Tinggi	-
16.	P	47	2.500.000	Tinggi	13	Cukup	Universitas	Tinggi	4
17.	P	34	700.000	Rendah	11	Cukup	SMU	Tinggi	-
18.	P	32	500.000	Rendah	5	Kurang	SD	Rendah	-
19.	P	48	1.800.000	Tinggi	9	Kurang	SMU	Tinggi	3
20.	P	50	1.200.000	Tinggi	11	Cukup	SMU	Tinggi	5
21.	P	58	1.500.000	Tinggi	14	Cukup	SMU	Tinggi	3
22.	P	46	3.000.000	Tinggi	15	Cukup	Universitas	Tinggi	5
23.	P	55	3.000.000	Tinggi	11	Cukup	Universitas	Tinggi	4
24.	P	39	2.000.000	Tinggi	19	Cukup	SMU	Tinggi	3
25.	P	51	1.500.000	Tinggi	18	Cukup	SMU	Tinggi	2
26.	P	42	500.000	Rendah	16	Cukup	SMP	Rendah	3
27.	P	42	700.000	Rendah	10	Cukup	SMU	Tinggi	4
28.	P	55	900.000	Rendah	8	Kurang	SMP	Rendah	5
29.	P	53	3.000.000	Tinggi	9	Kurang	Universitas	Tinggi	3
30.	P	64	2.700.000	Tinggi	10	Cukup	SMU	Tinggi	5
31.	P	37	2.700.000	Tinggi	10	Cukup	SMU	Tinggi	5
32.	P	36	700.000	Rendah	11	Cukup	SMA	Tinggi	1
33.	P	51	700.000	Rendah	13	Cukup	SMA	Tinggi	6
34.	P	33	1.200.000	Tinggi	14	Cukup	SMA	Tinggi	2
35.	P	63	850.000	Rendah	10	Cukup	SD	Rendah	5
36.	P	43	2.000.000	Tinggi	15	Cukup	Universitas	Tinggi	2
37.	P	42	900.000	rendah	18	Cukup	SMP	Rendah	4
38.	P	55	1.500.000	Tinggi	16	Cukup	SMA	Tinggi	3

39.	P	53	4.800.000	Tinggi	19	Cukup	Universitas	Tinggi	3
40.	p	33	700.000	Rendah	9	Kurang	SMA	Tinggi	2
41.	P	66	500.000	Rendah	9	Kurang	Tidak sekolah	Rendah	5
42.	P	41	2.000.000	Tinggi	10	Cukup	SMA	Tinggi	4
43.	P	46	7.500.000	Tinggi	11	Cukup	Universitas	Tinggi	3
44.	P	63	900.000	Rendah	15	Cukup	SMA	Tinggi	-
45.	P	49	4.500.000	Tinggi	12	Cukup	Universitas	-	3
46.	P	53	3.000.000	Tinggi	16	Cukup	Universitas	Tinggi	2
47.	P	50	2.000.000	Tinggi	8	Kurang	SMA	Tinggi	1
48.	P	60	5.000.000	Tinggi	10	Kurang	Universitas	Tinggi	4
49.	P	64	1.500.000	Tinggi	7	Kurang	SMA	Tinggi	5
50.	P	35	1.200.000	Tinggi	7	Kurang	-	-	3



Frequencies

Statistics

		Pengetahuan	Pendidikan	Pendapatan	Besar Keluarga	Kanker Payudara
N	Valid	50	50	50	50	50
	Missing	0	0	0	0	0

Frequency Table

Pengetahuan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kurang	22	44.0	44.0	44.0
	Cukup	28	56.0	56.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	12	24.0	24.0	24.0
	Tinggi	38	76.0	76.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Pendapatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Rendah	19	38.0	38.0	38.0
	Tinggi	31	62.0	62.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Besar Keluarga

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kecil	29	58.0	58.0	58.0
	Besar	21	42.0	42.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Kanker Payudara

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Berisiko	29	58.0	58.0	58.0
	Tidak Berisiko	21	42.0	42.0	100.0
	Total	50	100.0	100.0	

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Kanker Payudara * Pengetahuan	50	100.0%	0	.0%	50	100.0%
Kanker Payudara * Pendidikan	50	100.0%	0	.0%	50	100.0%
Kanker Payudara * Pendapatan	50	100.0%	0	.0%	50	100.0%
Kanker Payudara * Besar Keluarga	50	100.0%	0	.0%	50	100.0%

Kanker Payudara * Pengetahuan

Crosstab

Count

		Pengetahuan		Total
		Kurang	Cukup	
Kanker Payudara	Berisiko	11	18	29
	Tidak Berisiko	11	10	21
Total		22	28	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.032 ^a	1	.310		
Continuity Correction ^b	.529	1	.467		
Likelihood Ratio	1.032	1	.031		
Fisher's Exact Test				.391	.233
Linear-by-Linear Association	1.011	1	.031		
N of Valid Cases	50				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24.

Symmetric Measures


	Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. †	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.142			.310
Interval by Interval Pearson's R	-.144	.141	-1.006	.320 ^c
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation	-.144	.141	-1.006	.320 ^c
N of Valid Cases	50			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Bar Chart



Kanker Payudara * Pendidikan

Crosstab

Count

		Pendidikan		Total
		Rendah	Tinggi	
Kanker Payudara	Berisiko	5	24	29
	Tidak Berisiko	7	14	21
Total		12	38	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.729 ^d	1	.189		
Continuity Correction ^b	.959	1	.327		
Likelihood Ratio	1.712	1	.019		
Fisher's Exact Test				.314	.164
Linear-by-Linear Association	1.695	1	.019		
N of Valid Cases	50				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .04.

Symmetric Measures


	Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig. ^c
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.183			.189
Interval by Interval Pearson's R	-.186	.141	-1.311	.196 ^c
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation	-.186	.141	-1.311	.196 ^c
N of Valid Cases	50			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Bar Chart



Kanker Payudara * Pendapatan

Crosstab

Count		Pendapatan		Total
		Rendah	Tinggi	
Kanker Payudara	Berisiko	7	22	29
	Tidak Berisiko	12	9	21
Total		19	31	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5.632 ^a	1	.018		
Continuity Correction ^b	4.318	1	.038		
Likelihood Ratio	5.670	1	.017		
Fisher's Exact Test				.022	.019
Linear-by-Linear Association	5.519	1	.019		
N of Valid Cases	50				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .98.

Symmetric Measures


	Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. †	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.318			.018
Interval by Interval Pearson's R	-.336	.135	-2.468	.017 ^c
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation	-.336	.135	-2.468	.017 ^c
N of Valid Cases	50			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Bar Chart



Kanker Payudara * Besar Keluarga

Crosstab

Count		Besar Keluarga		Total
		Kecil	Besar	
Kanker Payudara	Berisiko	18	11	29
	Tidak Berisiko	11	10	21
Total		29	21	50

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.469 ^a	1	.493		
Continuity Correction ^b	.156	1	.693		
Likelihood Ratio	.469	1	.049		
Fisher's Exact Test				.568	.346
Linear-by-Linear Association	.460	1	.045		
N of Valid Cases	50				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .82.

Symmetric Measures


	Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. [†]	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.096			.493
Interval by Interval Pearson's R	.097	.141	.674	.503 ^c
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation	.097	.141	.674	.503 ^c
N of Valid Cases	50			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Bar Chart



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sri Yulianti. AS
Tempat, Tanggal Lahir : Jeneponto, 24 Juli 1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. BTN A. Tonro Permai Blok C2 No. 5 Gowa

Riwayat pendidikan :

1. SDN No. 9 Lembang Cina : 1994 – 2000
2. SLTPN 2 Bantaeng : 2000 – 2003
3. SMAN 2 Bantaeng : 2003 – 2006
4. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar : 2006 – sekarang

