

**GAMBARAN KEJADIAN PNEUMONIA PADA BAYI DAN BALITA**

**DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR**

**TAHUN 2009**



**Karya Tulis Ilmiah**

**(KTI)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan**

**Pendidikan Program Diploma III Kebidanan**

**UIN Alauddin Makassar**

**OLEH**

**RUSLAENI**

**70400007042**

**JURUSAN KEBIDANAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**2010**

## HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing institusi untuk diajukan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah Program DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang dilaksanakan pada bulan Juli 2010.

Makassar, September 2010

Pembimbing Institusi

Sitti Saleha, S.SiT., S.KM., M.Keb



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## **PERNYATAAN KEASLIAN KTI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, Agustus 2010

Penyusun

**RUSLAENI**  
**70400007042**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “**Gambaran Kejadian Pneumonia Pada Bayi Dan Balita Di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2009**” yang disusun oleh **Ruslaeni**, NIM: **70400007042**, mahasiswa Prodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 26 Agustus 2010 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 26 Agustus 2010 M.  
16 Ramadhan 1431 H.

### DEWAN PENGUJI

1. Pembimbing : **Sitti Saleha, S.SiT., S.KM., M.Keb.** (.....)
2. Penguji I : **dr. H. M. Furqaan Naiem, M.Sc, Ph.D.**(.....)
3. Penguji II : **Dra. Hj. Noer Huda Noor, M.Ag.** (.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan**  
**Universitas Islam Negeri AlauddinMakassar**

**dr. H. M. Furqaan Naiem, M. Sc., Ph. D.**  
**NIP. 19580404 198903 1 001**

## KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya serta meminta perlindungan kepada-Nya dari kejahatan jiwa dan keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah SWT, maka tak seorang pun yang menyesatkan, barang siapa disesatkan oleh Allah SWT, maka tak seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Kita bersaksi bahwa tiada ilahi (yang hak) kecuali Allah SWT. Satu-satunya tiada sekutu bagi-Nya dan Kita bersaksi bahwa muhammad SAW. Adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amma Ba'du.

Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena atas rahmat-Nya dengan kenikmatan yang tak terhingga dibalik segala ujian yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program DIII Kebidanan pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Secara khusus, lewat kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kepada Orang Tua tercinta Ibunda Hasmia yang senantiasa mengiringi langkahku dengan doa dan kasih sayang yang selalu memberikan dorongan serta nasehat sehingga penulis dapat mewujudkan cita-cita dan harapanku serta kepada seluruh keluargaku yang memberikan dukungan

dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan karya tulis ilmiah ini dengan baik.

2. Bapak Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.
3. Bapak dr. H. M. Furqaan Naiem, M.Sc. Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III dan seluruh Staf Administarasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
4. Ibu Sitti saleha, S.Si.T, SKM. M.Keb selaku ketua Jurusan Kebidanan yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar A.Md.Keb.
5. Ibu Sitti saleha, S.Si.T, SKM. M.Keb, selaku pembimbing karya tulis ilmiah yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
6. Bapak dr. H. M. Furqaan Naiem, M.Sc. Ph.D, selaku penguji karya tulis ilmiah yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.


7. Ibu Dra. Hj. Noer Huda Noor, M.Ag, selaku penguji karya tulis ilmiah yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
8. Para dosen program studi kebidanan yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan selama penulis menimba ilmu di program studi kebidanan.
9. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
10. dr. H. Muh. Thalib Suyuti, M. Kes, selaku direktur RSUD Labuang Baji Makassar beserta seluruh pegawai dan staf Rumah Sakit yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan.
11. Kepada sahabat seperjuangan: Husni, Fitri, Asmi, Wati, Linda, Inha, Chia, Sura, Nura, Dalia, Marni dan semua teman-teman mahasiswa angkatan 2007 Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar yang kesempatan ini tidak bisa penulis tulis satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan motivasinya dalam rangka penyelesaian studi ini.

Terakhir penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang ada didalamnya. Olehnya itu penulis berharap karya tulis Ilmiah ini dapat menjadi acuan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan Karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. Amin....

Asalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 27 September 2010

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KTI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KTI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KTI .....	iv
LEMBAR KONSUL .....	v
ABSTRAK .....	vii
BIODATA PENULIS .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Umum Tentang Pneumonia .....	7
1. Pengertian .....	7
2. Klasifikasi Pneumonia .....	8
3. Etiologi.....	9
4. Epidemiologi.....	10
5. Tanda dan Gejala .....	11
6. Penanganan .....	12
7. Komplikasi.....	13
8. Pencegahan .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Variabel Penelitian .....	15
1. Umur anak.....	15
2. Status Gizi.....	20
3. Faktor Lingkungan.....	22
C. Pandangan Islam Tentang Penyakit Pada Bayi dan Balita .....	23
 BAB III. KERANGKA KONSEP .....	 30
A. Dasar Pemikiran Yang Diteliti.....	30
1. Umur Anak.....	30
2. Status Gizi.....	31

3. Faktor Lingkungan.....	31
B. Kerangka Konsep Penelitian.....	32
C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif .....	33
1. Umur Anak.....	33
2. Status Gizi.....	33
3. Faktor Lingkungan.....	33
<b>BABIV METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi dan Waktu Meneliti.....	34
C. Populasi dan Sampel.....	35
D. Tehnik Pengambilan Sampel .....	35
E. Cara Pengumpulan Data .....	35
F. Pengolahan Data .....	35
G. Analisa Data.....	36
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Hasil Penelitian .....	37
B. Pembahasan.....	39
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>43</b>
A. Kesimpulan .....	43

B. Saran .....45

DAFTAR PUSTAKA .....46

LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 1: Pedoman Perhitungan frekuensi Napas (WHO) .....	18
Tabel 2: Distribusi Kejadian Pneumonia Pada Bayi dan Balita yang menderita ISPA di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2009.....	37
Tabel 3: Distribusi Kejadian pneumonia Pada Bayi dan Balita Berdasarkan Umur Anak di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2009.....	38
Tabel 4: Distribusi Kejadian Pneumonia Pada Bayi dan Balita Berdasarkan Status Gizi Anak di RSUD Labuang Baji makassar Tahun 2009.....	38
Tabel 5: Distribusi Kejadian Pneumonia Pada Bayi dan Balita Berdasarkan Faktor Lingkungan Di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2009 .....	39

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Tabel Hasil Penelitian

Lampiran 2 : Surat Izin Pengambilan Data

Lampiran 3 : Surat permohonan izin penelitian

Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Penelitians



## ABSTRAK

PROGRAM STUDI KEBIDANAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
KARYA TULIS ILMIAH, AGUSTUS 2010

**RUSLAENI, 70400007042**

**Pembimbing : Sitti Saleha,S.SiT.,S.KM.,M.Keb**

**Gambaran Kejadian Pneumonia Pada Bayi dan Balita di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2009**

**Xii + 6 Bab + 46 Halaman + 5 Tabel + 4 Lampiran**

Pneumonia merupakan infeksi yang menyebabkan paru-paru meradang yang terjadi pada masa kanak-anak dan sering terjadi pada masa bayi. Diperkirakan kematian balita akibat pneumonia diseluruh duunia sekitar 19 persen atau berkisar 1,6 – 2,2 juta.di indonesia diperkirakan mencapai 21 % adapun angka kesakitan diperkiakan mencapai 250 hingga 299 per 1000 anak balita setiap tahunnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui gambaran kejadian pneumonia di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2009. Populasi diambil dari semua anak yang mengalami penyakit infeksi saluran pernapasan akut lainnya 332 orang dan sampelnya 141 orang. Tekhik pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan kalkulator.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejadian pneumonia berdasarkan umur bayi 0-2 tahun sebanyak 95 orang (67,37%). Pada umur 2-5 tahun sebanyak 46 orang (32,63%). Pada status gizi cukup sebanyak 78 orang (55,31%), gizi baik sebanyak 34 orang (24,12%) dan Gizi kurang sebanyak 29 orang (20,57%). Pada faktor lingkungan yang padat sebanyak 86 orang (60,99%) dan faktor lingkungan tidak padat sebanyak 55 orang (39,01%).

Diharapkan kepada pada masyarakat tentang pentingnya penyebab dan resiko pneumonia terutama pada masa bayi dengan status gizi yang buruk dan kurang.

Daftar pustaka : 19 (2000-2010)

Kata kunci : Pneumonia, Umur, Status gizi, faktor Lingkungan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan paru-paru meradang. Kantong-kantong udara dalam paru yang disebut alveoli dipenuhi nanah dan cairan sehingga kemampuan menyerap oksigen menjadi kurang. Kekurangan oksigen membuat sel-sel tubuh tidak bisa bekerja. Karena inilah, selain penyebaran infeksi ke seluruh tubuh, penderita pneumonia bisa meninggal. Sebenarnya pneumonia bukanlah penyakit tunggal. Penyebabnya bisa bermacam-macam dan diketahui ada 30 sumber infeksi dengan sumber utama bakteri, virus, mikroplasma, jamur, berbagai senyawa kimia maupun partikel. (<http://creasoft.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 21 April 2010).

Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2005 memperkirakan kematian balita akibat pneumonia diseluruh dunia sekitar 19 persen atau berkisar 1,6 – 2,2 juta . Dimana sekitar 70 persennya terjadi di negara-negara berkembang, terutama Afrika dan Asia Tenggara. Persentase ini terbesar bahkan bila dibandingkan dengan diare (17 persen) dan malaria (8 persen). Di Indonesia, prevalensi pneumonia pada balita cenderung meningkat. Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2001 kematian balita akibat pneumonia meningkat, berkisar 18,5 -38,8 persen. "Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga menjadi persoalan negara berkembang yang kondisi lingkungannya buruk dan malnutrisi. Pneumonia merupakan 'predator ' balita

nomor satu di negara berkembang. (<http://www.majalah-farmaciacom.com>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2010).

Pneumonia merupakan infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli). Selain gambaran umum di atas, pneumonia dapat dikenali berdasarkan pedoman tanda-tanda klinis lainnya dan pemeriksaan penunjang (Rontgen, laboratorium). Pada usia anak-anak, pneumonia merupakan penyebab kematian terbesar terutama di negara berkembang termasuk di Indonesia. Angka kematian pneumonia pada balita di Indonesia diperkirakan mencapai 21 %. Adapun angka kesakitan diperkirakan mencapai 250 hingga 299 per 1000 anak balita setiap tahunnya. (<http://creasoft.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 21 April 2010).

Di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan provinsi dengan angka kematian Balita tertinggi (102/1.000 kelahiran hidup), Angka kejadian pneumonia berat 21 per 100 anak yang di-observasi selama satu tahun. Pneumonia yang dirawat di rumah sakit 83 per 100 anak dan Pneumonia yang secara radiologik menunjukkan 18 per 100 anak yang di-observasi selama satu tahun. Tidak mengherankan kalau di NTB, pneumonia juga merupakan penyebab kesakitan dan kematian terbanyak pada Balita. (<http://community.um.ac.id>. Diakses pada tanggal 10 April 2010).

Pneumonia merupakan peradangan pada parenkim paru yang terjadi pada masa anak-anak dan sering terjadi pada masa bayi. Penyakit ini timbul sebagai penyakit primer dan dapat juga akibat penyakit komplikasi, yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur ataupun benda asing yang ditandai

dengan gejala panas yang tinggi, gelisa, dispne, napas cepat dan dangkal, muntah, diare, batuk kering dan produktif. (A. Aziz Alimul Hidayat, 2006).

Sebagian besar penyebab pneumonia adalah mikroorganisme (virus, bakteri). Dan sebagian kecil oleh penyebab lain seperti hidrokarbon (minyak tanah, bensin atau sejenisnya) dan masuknya makanan, minuman, susu, isi lambung ke dalam saluran pernapasan (aspirasi). Berbagai penyebab pneumonia tersebut dikelompokkan berdasarkan golongan umur, berat ringannya penyakit dan penyulit yang menyertai (komplikasi). Mikroorganisme tersering sebagai penyebab pneumonia adalah virus, terutama Respiratori Syncial Virus (RSV) yang mencapai 40 % sedangkan golongan bakteri yang ikut berperan terutama streptococcus pneumoniae dan haemophilus influenzae type b (Hib). (<http://creasoft.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2010).

Kebijakan Depkes RI (sejak tahun 1995, melalui program Quality Assurance) memberlakukan pedoman penatalaksanaan bagi puskesmas di seluruh Indonesia. Masalah lain dalam hal perawatan penderita pneumonia adalah terbatasnya akses pelayanan karena faktor geografis. Lokasi berjauhan dan belum meratanya akses transportasi tentu menyulitkan perawatan manakala penderita pneumonia memerlukan perawatan lanjut (rujukan). (<http://creasoft.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 21 April 2010).

Infeksi Saluran pernafasan Akut (ISPA) merupakan salah satu penyebab kematian tersering pada anak dinegara sedang berkembang.Saluran pernafasan akut ini menyebabkan empat dari 15 juta perkiraan kematian pada anak berusia

dibawah 5 tahun pada setiap tahunnya, sebanyak dua pertiga kematian tersebut adalah bayi (khususnya bayi muda). Hasil penelitian fungsi paru di negara sedang berkembang menunjukkan bahwa kasus pneumonia berat pada anak disebabkan oleh bakteri, biasanya streptococcus pneumoniae atau haemophilus influenzae (Wijaya, 2003)

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, disebutkan bahwa jumlah penderita pneumonia pada bayi dan balita di Kota Makassar Sulawesi Selatan tahun 2009 sebanyak 13.759 kasus, sedangkan Data yang diperoleh di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji tahun 2009 sebanyak 332 kasus untuk rawat inap dan 129 kasus untuk rawat jalan.

Berdasarkan data diatas maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang “Gambaran Kejadian Pneumonia Pada Bayi dan Balita di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2009”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran pneumonia berdasarkan umur anak di RSUD Labuang Baji Tahun 2009 ?
2. Bagaimana gambaran kejadian pneumonia berdasarkan status gizi di RSUD Labuang Baji Tahun 2009 ?
3. Bagaimana gambaran kejadian pneumonia berdasarkan faktor lingkungan di RSUD Labuang Baji Tahun 2009 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan umum

Untuk mengetahui gambaran kejadian pneumonia pada bayi dan balita di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2009.

#### 2. Tujuan khusus

- a. Mengetahui gambaran kejadian pneumonia berdasarkan umur bayi dan balita di RSUD Labuang Baji Makassar.
- b. Mengetahui gambaran kejadian pneumonia berdasarkan status gizi bayi dan balita di RSUD Labuang Baji Makassar.
- c. Mengetahui gambaran kejadian pneumonia berdasarkan faktor lingkungan bayi dan balita di RSUD Labuang Baji Makassar.

### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian ini dirumuskan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), manfaat kepada masyarakat dan kepada peneliti sendiri:

#### 1. Bagi peneliti

Sebagai pengalaman ilmu yang berharga yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai pneumonia.

#### 2. Bagi pendidikan

Sebagai bahan bacaan dan masukan bagi instansi kesehatan dalam merumuskan dan mengurangi angka kejadian pneumonia.

### 3. Bagi Institusi UIN

Sebagai bahan informasi bagi institusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang angka kejadian pneumonia.

### 4. Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan informasi bagi tenaga medis dan instansi terkait tentang pneumonia.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan umum tentang pneumonia

##### 1. Pengertian

- a. Pneumonia adalah invasi bakteri atau virus ke jaringan paru-paru (Pilliteri, 2002)
- b. Pneumonia adalah inflamasi parenkim paru, biasanya berhubungan dengan pengisian alveoli dengan cairan (Doenges, 2000)
- c. Pneumonia adalah peradangan pada parenkim paru yang terjadi pada masa anak-anak dan sering terjadi pada masa bayi (Hidayat, 2006)
- d. Pneumonia adalah radang parenkim paru. Banyak macam klasifikasi mengenai pneumonia, tetapi klasifikasi ini dianggap kurang memuaskan (Nursalam, 2005)
- e. Pneumonia adalah keadaan akut pada paru yang disebabkan oleh karena infeksi atau iritasi dari bahan kimia sehingga alveoli terisi dengan exudat peradangan (Murwani, 2009)
- f. Pneumonia adalah peradangan parenkim paru dimana alveoli terisi dengan cairan dan sel radang, dengan/tanpa disertai infiltrasi sel radang kedalam dinding alveoli dan rongga interstisium (Alsagoff, 2010)
- g. Pneumonia adalah infeksi yang rumit yang sering sulit dibedakan dengan penyakit paru lainnya, khususnya sindroma distress pernafasan pada orang dewasa, bronkitis, emfisema, dan gagal jantung kongestif (Tietjen, 2004).

- h. Pneumonia, inflamasi parenkim paru, merupakan hal yang umum selama masa kanak-kanak tetapi sering terjadi pada masa bayi dan masa kanak-kanak awal. (Wong, 2004)

## 2. Klasifikasi pneumonia

Pada umumnya pembagian pneumonia dibagi berdasarkan tingkat dan letak anatomi :

- a. Pembagian pneumonia berdasarkan tingkatan adalah :

1. Pneumonia berat atau penyakit sangat berat, apabila terdapat gejala :

- a) Ada tanda bahaya umum, seperti anak tidak bisa minum atau menetek, selalu memuntahkan semuanya, kejang atau anak letargis atau tidak sadar.
- b) Nyeri dada atau nyeri pleuritik dirasakan waktu menarik nafas dalam (*pleuritic pain*)
- c) Terdapat stidor (suara nafas cepat bunyi grok-grok saat inspirasi)

2. Pneumonia, apabila terdapat gejala nafas cepat. Batasan nafas cepat adalah :

- a. Bayi 0 – 5 bulan apabila frekuensi nafas 30 – 50 x/menit atau > 60 x/menit.
- b. Anak usia 2 - 12 bulan apabila frekuensi nafas 25 - 40 x/menit atau > 50 x/menit.
- c. Anak usia 12 bulan – 5 tahun apabila frekuensi nafas 40 x/menit.

3. Batuk bukan pneumonia, apabila tidak ada tanda-tanda pneumonia atau penyakit sangat berat (Nursalam, 2005).

b. Pembagian pneumonia berdasarkan letak anatomi adalah :

1). Pneumonia lobaris

Pneumonia lobaris melibatkan seluruh atau satu bagian besar dari satu atau lebih lobus paru. Bila kedua paru terkena, maka dikenal sebagai pneumonial bilateral atau “ganda”.

2). Pneumonia lobularis (bronkopneumonia)

Bronkopneumonia terjadi pada ujung akhir bronkiolus, yang tersumbat oleh eksudat mukopurulen untuk membentuk bercak konsolidasi dalam lobus yang berada didekatnya.

3). Pneumonia interstisial

Pneumonia interstisial proses implamasi yang terjadi di dalam dinding alveolar (interstisium) dan jaringan peribronkial serta interlobular. (Donna L.Wong, 2004).

### 3. Etiologi

Adapun etiologi pneumonia yaitu :

- a. Jenis bakteri (kokus)
- b. Jenis virus
- c. Jenis jamur
- d. Bahan fiisik/kimia
- e. Merupakan kelanjutan dari penyakit :
  - Ifluensa
  - Morbili

f. Pendukung lain :

- Malnutrisi
- Selesma/Comond cold
- Penyakit berat (syok, koma dan kelumpuhan)
- Aspirasi (tersedak). (Arita Murwani, 2009)

#### 4. Epidemiologi

Pneumonia merupakan infeksi yang rumit yang sering sulit dibedakan dengan penyakit paru lainnya, khususnya sindroma distress pernafasan pada orang dewasa, bronkitis, emfisema, dan gagal jantung kongestif. Kriteria umum yang diterima untuk pneumonia nosokomial termasuk demam, batuk, bunyi pernafasan menurun atau pekak pada daerah khusus paru dan produksi sputum yang purulen (terinfeksi) dengan kombinasi bukti sinar-X adanya densitas baru (infiltrat). (Linda Lietjen, 2004)

Adapun Saluran faktor-faktor resiko terkena pneumonia, antara lain :

1. Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA)
2. Kekurangan nutrisi
3. Umur dibawah 2 bulan
4. Jenis kelamin laki-laki
5. Gizi kurang
6. Berat badan lahir rendah
7. Tidak mendapat ASI memadai
8. Polusi udara

9. Kepadatan tempat tinggal
10. Imunisasi yang tidak memadai
11. Membedong bayi
12. Efisiensi vitamin

(<http://www.scribd.com>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2010).

## 5. Tanda dan gejala

Adapun tanda dan gejala pneumonia adalah :

- a. Tanda dan gejala dari implamasi
  1. Peningkatan frekuensi pernapasan
  2. Panas dan menggigil (tiba-tiba atau tersembunyi)
  3. Batuk produktif
  4. Bunyi napas tidak jelas atau tidak terdengar
  5. Nyeri dada pleuritis
  6. Takikardi
  7. Dispnea yang jelas
  8. Sianosis
- b. Tanda dan gejala infeksi
  1. Demam  $39,4^{\circ}$  C atau lebih
  2. Menggigil
  3. Takikardia
  4. Manifestasi syok : kelelahan atau letargi, bingung, penurunan tekanan darah sistolik.

c. Tanda dan gejala dari syok sepsis

1. Suhu tubuh subnormal
2. Hipotensi
3. Penurunan tingkat kesadaran
4. Nadi cepat dan lemah
5. Pernapasan cepat dan dangkal
6. Kulit dingin dan basah
7. Oliguria. (Lynda Jual Carpenito, 2000)

**6. Penanganan**

Adapun penanganan pneumonia dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Untuk anak dengan pneumonia untuk rawat jalan adalah :

- 1) Pemberian antibiotik yang sesuai selama 5 hari
- 2) Beri pelega tenggorokan dan pereda batuk yang baik
- 3) Berikan nasihat mengenai kapan harus segera kembali
- 4) Melakukan kunjungan setelah 2 hari

b. Untuk anak dengan pneumonia yang dirawat di rumah sakit adalah :

- 1) Inefektivitas pola napas, rencana perawatan yang diperlukan adalah:
  - a. Berikan oksigen yang dilembapkan sesuai taki kardi
  - b. Lakukan fisioterapi dada : kerjakan sesuai jadwal
  - c. Observasi tanda-tanda vital
  - d. Berikan antibiotik dan antipiretik sesuai advis
  - e. Periksa dan catat hasil X-ray dada dan jumlah sel darah putih sesuai indikasi

- f. Lakukan *suction* bila perlu.
  - g. Kaji dan catat pengetahuan serta partisipasi keluarga dalam keperawatan, misalnya : pemberian obat serta pengenalan tanda dan gejala inefektivitas pola napas.
  - h. Ciptakan lingkungan yang nyaman
- 2) Defisi volume cairan, intervensi yang diperlukan adalah :
- a. Berikan cairan sesuai dengan kebutuhan
  - b. Catat secara akurat intake dan output
  - c. Kaji dan catat tanda-tanda vital serta gejala kekurangan cairan
  - d. Periksa dan catat BJ urine tiap 4 jam atau sesuai advis
  - e. Lakukan perawatan mulut sesuai dengan kebutuhan
  - f. Kaji dan catat pengetahuan serta partisipasi keluarga dan minitoring *intake* dan *output* seta dalam mengenali tanda dan gejala kekurangan volume cairan.
  - g. Ciptakan situasi yang nyaman. (Nursalam, 2005)

## 7. Komplikasi

Adapun komplikasi pneumonia adalah :

1. Otitis media akut (OMA) terjadi bila tidak diobati, maka sputum yang berlebihan akan masuk ke dalam tuba eustachius, sehingga menghalangi masuknya udara ke telinga tengah dan mengakibatkan hampa udara, kemudian gendang telinga akan tertarik ke dalam dan timbul efusi.
2. Efusi pleura
3. Emfisema

4. Meningitis
5. Abses otak
6. Endokarditis
7. Osteomielitis.

(<http://mhs.blog.ui.ac.id>. Diakses Pada Tanggal 19 April 2010)

## 8. Pencegahan

Pencegahan penyakit pneumonia dapat dilakukan dengan :

- a. Menghindari bayi (anak) dari paparan asap rokok, populasi udara dan tempat keramaian yang berpotensi penularan.
- b. Menghindari bayi (anak) dari kontak penderita ISPA
- c. Membiasakan pemberian ASI
- d. Segera berobat jika mendapati anak yang mengalami panas, batuk, pilek. Terlebih jika disertai suara serak, sesak napas dan adanya tarikan pada otot diantara rusuk (retraksi).
- e. Periksa kembali jika dalam 2 hari belum menampakkan perbaikan. Dan segera ke RS jika kondisi anak memburuk.
- f. Imunisasi Hib (untuk memberikan kekebalan terhadap *Haemophilus influenzae*, vaksin pneumokokal heptavalen dan vaksin *influenzae* pada anak resiko tinggi, terutama usia 6 -23 bulan)
- g. Menyediakan rumah sehat bagi bayi yang memenuhi persyaratan :
  - 1) Memiliki luas ventilasi sebesar 12 -20 % dari luas lantai
  - 2) Tempat masuknya cahaya yang berupa jendela, pintu atau kaca sebesar 20 %.

- 3) Terletak jauh dari sumber-sumber pencemaran, misalnya pabrik, tempat pembakaran dan tempat penampungan sampah.

(<http://creasoft.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 21 April 2010)

## **B. Tinjauan Umum Tentang Variabel Penelitian**

### **1. Umur anak**

Pneumonia, implamasi parenkim paru, merupakan hal yang umum selama masa kanak-kanak tetapi lebih sering terjadi pada masa bayi dan masa kanak-kanak awal. Secara klinis, pneumonia dapat terjadi baik sebagai penyakit primer atau sebagai komplikasi dari beberapa penyakit lain. Pneumonia Virus lebih sering terjadi dibandingkan pneumonia bakterial terlihat pada anak dari semua kelompok umur yang sering dikaitkan dengan penyakit ISPA. (Donna, 2003).

Pada bayi, pada kelompok usia ini, pneumonia biasanya disebabkan oleh virus. Jika penyebabnya bakteri, berbagai macam bakteri dapat menjadi penyebabnya tetapi jenis yang berbahaya adalah yang disebabkan staphylococcus aureus, yang dapat menyebabkan terbentuknya abses dan empiema. Bayi Nampak lebih sakit dibandingkan dengan pada bronchitis. Bayi cenderung pucat dan kolaps dengan rintihan waktu ekspirasi. Kegelisahan bayi disebabkan oleh hipoksia otak. Pengobatan: bayi harus dirawat dengan oksigen yang dipantau kadarnya secara teratur. Bila penyebabnya tidak diketahui maka kombinasi antibiotika yang dapat digunakan adalah flukloksasilin dan ampicilin. Mungkindiperlukan sedasi dan pemberian minum dengan pipa lambung apabila minum dengan botol

menyebabkan sesak. (<http://mhs.blog.ui.ac.id>. Diakses pada tanggal 19 April 2010)

Pneumonia sering terjadi pada bayi dan anak. Kasus terbanyak terjadi pada anak berusia dibawah 3 tahun dan kematian terbanyak terjadi pada bayi yang berusia kurang dari 2 bulan. Perlu diperhatikan adanya tahipne, dispne, sianosis sirkumoral, pernapasan cuping indung, distensi abdomen, batuk semula nonproduktif menjadi produktif, serta nyeri dada pada waktu menarik napas. Batasan takipnea pada anak 2 bulan-12 bulan adalah 50 kali/menit atau lebih, sementara untuk anak berusia 12 bulan-5 bulan adalah 40 kali/menit atau lebih. Perlu diperhatikan adanya tarikan dinding dada kedalam akan tampak jelas. (Nursalam, 2005).

Pada bayi usia kurang dari dua bulan, terutama pada masa neonatus, pneumonia sukar dibedakan dengan sepsis dan meningitis. Sebab etiologi bakterilogiknya berbeda dengan pneumonia anak usia di atas dua bulan. Di negara maju penyebab terbanyak adalah *Streptococcus* grup B sedangkan di negara berkembang dilaporkan sering disebabkan oleh bakteri gram negatif seperti *Enterobacter sp*, *Klebsilla sp*, dan *Coli sp*.

Di negara maju, vaksin sudah wajib diberikan kepada bayi saat umurnya 2 bulan dan kepada anak maksimal di usia 5 tahun. Bila vaksinasi dilakukan setelah umur 2 bulan, maka si bayi harus disuntik 3 kali. Sedangkan bila vaksinasi dimulai di usia 6 bulan, ia cukup disuntik 2 kali. Sementara bila usianya sudah di atas setahun hanya perlu sekali suntik. (<http://www.scribd.com>. Diakses pada tanggal 28 April 2010)

Pada anak. Sebagian besar kasus pneumonia pada usia lebih dari dua tahun disebabkan pneumokokus, tetapi sebagian disebabkan oleh staph. Aureus atau H.influenzae. Anak nampak pucat dan gelisah dengan rintihan waktu ekspirasi. Dapat juga terjadi nyeri pleura dan bila nyeri pleura dijalarkan ke perut maka dapat menyerupai apendisitis. Pengobatan: antibiotika pilihan pertama ialah benzilpensilin yang mula-mula diberikan dengan suntikan, kemudian dapat digunakan fenoksimetil penisilin. Oksigen sering kali tidak diperlukan. Pneumonia yang disebabkan mycoplasma pneumonia mempunyai gejala yang sama dengan pneumonia yang disebabkan bakteri dan virus. Tes serologis dapat menegakkan diagnosis. Pneumonia yang disebabkan M.pneumoniae responsit dengan eritromisin atau tetrasiklin. (<http://mhs.blog.ui.ac.id>. Diakses pada tanggal 19 April 2010).

Mengapa di bawah 2 tahun (15 bulan) menjadi penting? "Karena pneumonia paling banyak menyerang anak di bawah 2 tahun,". Sementara di Indonesia, vaksinasi jenis ini belum diwajibkan. "Mungkin karena harganya relatif masih mahal," lanjutnya. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan vaksin ini sekitar Rp 200.000 sampai Rp 225.000. (<http://www.scribd.com>. Diakses pada tanggal 28 April 2010)

pada bayi (usia di bawah 1 tahun) tanda-tanda pnemonia tidak spesifik, tidak selalu ditemukan demam dan batuk. Selain tanda-tanda di atas, WHO telah menggunakan penghitungan frekuensi napas per menit berdasarkan golongan umur sebagai salah satu pedoman untuk

memudahkan diagnosa (Setiowulan, 2000). Pneumonia, terutama di institusi pelayanan kesehatan dasar.

Tabel 1  
Pedoman Perhitungan Frekuensi Napas (WHO)

Umur Anak	Napas Normal	Takipnea (Napas cepat)
0 – 2 Bulan	30-50 per menit	sama atau > 60 x per menit
2-12 Bulan	25-40 per menit	sama atau > 50 x per menit

(<http://creasoft.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 21 april 2010)

1. Bayi umur 0- 28 hari (neonatus) atau 1 bulan

Kecepatan napas bayi neonatus tidak boleh mencapai 60 kali tarikan atau lebih per menit. "Orang tua sebaiknya segera membawa si bayi ke dokter untuk dicari penyebabnya.

- 2 . 1 bulan 1 tahun

Anak yang berumur lebih dari sebulan tapi masih belum setahun, batas kecepatan napasnya adalah 50-60 tarikan napas per menit.

3. > 1 tahun

Di atas setahun, batas kecepatan napasnya adalah 40-50 tarikan per menit. Angka ini berbeda dari batas kecepatan napas untuk kalangan dewasa yaitu 20 tarikan napas per menit. "Lebih dari itu biasanya sudah sesak napas." (<http://www.scribd.com>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2010)

Pneumonia berat ditandai dengan adanya batuk atau (juga disertai) kesukaran bernapas, napas sesak atau penarikan dinding dada

sebelah bawah ke dalam pada anak usia 2 bulan sampai kurang dari 5 tahun. Pada kelompok usia ini dikenal juga pneumonia sangat berat dengan gejala batuk, kesukaran bernapas disertai gejala sianosis sentral dan tidak dapat minum. Sementara untuk anak dibawah 2 bulan, pneumonia berat ditandai dengan frekuensi pernapasan sebanyak 60 kali per menit atau lebih atau (juga disertai) penarikan kuat pada dinding dada sebelah bawah ke dalam. (<http://creasoft.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 21 april 2010)

Untuk anak usia 2 bulan sampai 5 tahun demam diatasi dengan memberikan parasetamol atau dengan kompres, bayi dibawah 2 bulan dengan demam harus segera dirujuk. Parasetamol diberikan 4 kali tiap 6 jam untuk waktu 2 hari. Cara pemberiannya, tablet dibagi sesuai dengan dosisnya, kemudian digerus dan diminumkan. Memberikan kompres, dengan menggunakan kain bersih, celupkan pada air (tidak perlu air es). (<http://creasoft.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 21 April 2010)

## 2. Status gizi

Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi juga didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrient. Penelitian status gizi merupakan pengukuran yang didasarkan pada data antropometri serta biokimia dan riwayat diit.

Klasifikasi status gizi pada bayi berdasarkan Kartu Menuju Sehat adalah:

- 1) Gizi Lebih
- 2) Gizi Baik
- 3) Gizi kurang
- 4) Gizi buruk.

Berikan makanan yang cukup gizi, sedikit-sedikit tetapi berulang-ulang yaitu lebih sering dari biasanya, lebih-lebih jika muntah. Pemberian ASI pada bayi yang menyusu tetap diteruskan. Air susu ibu (ASI) adalah sebuah cairan tanpa tanding untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. (<http://creasoft.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 21 April 2010).

Hadirnya penyakit infeksi dalam tubuh anak akan membawa pengaruh terhadap keadaan gizi anak. Sebagai reaksi pertama akibat adanya infeksi adalah menurunnya nafsu makan anak sehingga anak menolak makanan yang diberikan ibunya. Penolakan terhadap makanan berarti berkurangnya pemasukan zat gizi ke dalam tubuh anak. Keadaan akan berangsur memburuk jika infeksi disertai dengan muntah yang mengakibatkan hilangnya zat gizi. Kehilangan zat gizi dan cairan akan menjadi semakin banyak apabila anak juga menderita diare. Kehilangan nafsu makan, adanya muntah dan diare dengan sangat cepat akan mengubah tingkat gizi anak ke arah gizi buruk (Moehji, 2004).

Keseimbangan zat-zat gizi dalam air susu ibu berada pada tingkat terbaik dan air susunya memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang masih muda. Pada saat yang sama, ASI juga sangat kaya akan sari-sari makanan yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf. Makanan-makanan tiruan untuk bayi yang diramu menggunakan teknologi masa kini tidak mampu menandingi keunggulan makanan ajaib ini.

Air susu ibu yang dimiliki bayi prematur mengandung lebih banyak zat lemak, protein, natrium, klorida, dan besi untuk memenuhi kebutuhan bayi. Bahkan telah dibuktikan bahwa fungsi mata bayi berkembang lebih baik pada bayi - bayi prematur yang diberi ASI dan mereka memperlihatkan kecakapan yang lebih baik dalam tes kecerdasan. Selain itu, mereka juga mempunyai banyak sekali kelebihan lainnya. (<http://rm2u.com>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2010).

Penyebab utama pneumonia antara lain status gizi yang merupakan ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi yang didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrient. Bagi anak yang menderita pneumonia harus diberikan makanan yang cukup gizi sedikit-sedikit tetapi berulang-ulang yaitu lebih sering dari biasanya, lebih-lebih jika muntah (Hidayat, 2008).

### 3. Faktor Lingkungan

Mereka yang berbakat alergi sebaiknya menghindari lingkungan yang menjadi seperti debu, bulu binatang maupun mainan, kapuk, asap, dan bau menyengat. pemicunya, Masalahnya, kemunculan alergi akan mempermudah masuknya virus, kuman, dan bakteri penyebab pneumonia.

Kemampuan orang tua dalam menyediakan lingkungan tumbuh yang sehat pada bayi juga sangat mempengaruhi terhadap terjadinya pneumonia. Klasifikasi kesejahteraan keluarga adalah :

- 1) Keluarga sejahtera yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras. dan seimbang antar anggota, serta antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.
- 2) Keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang kondisi ekonominya baru bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya.
- 3) Keluarga pra sejahtera yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, belum mampu melaksanakan ibadah berdasarkan agamanya masing-masing, memenuhi kebutuhan makan minimal dua kali sehari, pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian, memiliki rumah yang bagian lantainya bukan dari tanah, dan belum mampu untuk berobat di sarana kesehatan modern. (<http://creasoft.wordpress.com>. Di akses pada tanggal 21 April 2010).

Lingkungan tumbuh bayi yang mempengaruhi terhadap terjadinya pneumonia adalah kondisi sirkulasi udara dirumah, adanya pencemaran udara di sekitar rumah dan lingkungan perumahan yang padat. Usahakan lingkungan tempat tinggal yang sehat yaitu yang berventilasi cukup dan tidak berasap. ([www.infokes.com](http://www.infokes.com). Diakses pada tanggal 12 Mei 2010).

### C. Pandangan Islam Tentang Penyakit Pneumonia pada Bayi dan Balita

Pneumonia adalah peradangan pada parenkim paru yang terjadi pada masa kanak-kanak dan sering terjadi pada masa bayi. Penyakit ini timbul sebagai penyakit primer dan dapat juga akibat penyakit komplikasi. (Aziz Alimul Hidayat, 2006)

Sebenarnya masa bayi dan masa kanak-kanak adalah masa yang sangat membutuhkan perhatian dari ibu, terutama tentang gizi dan kesehatan anak karena sangat menentukan pertumbuhan anak kedepan. Salah satu perhatian ibu yang terpenting pada bayi adalah pemberian ASI karena ASI selain makanan bayi yang terjamin steril juga mengandung sejumlah manfaat yang tak diragukan. Hal ini juga disebut dalam Al-Qur'an yaitu:

Firman Allah SWT, dalam Q.S Al-Baqarah(2) : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ

نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ  
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٠٧﴾

Terjemahnya :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya. Bayi yang diberi ASI berkemungkinan

lebih kecil mengidap berbagai penyakit. Telah diungkap bahwa keberadaan asam-asam lemak tak jenuh berantai panjang (yang mencegah pengerasan pembuluh arteri), serta fakta bahwa bayi yang diberi ASI menelan sedikit natrium (yang berkaitan erat dengan tekanan darah) yang dengannya tidak mengalami penambahan berat badan berlebihan, merupakan beberapa di antara manfaat ASI bagi jantung.

Al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu, baik ibu kandung maupun bukan, adalah makanan terbaik buat bayi hingga dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu kandung lebih baik dari selainnya. Dengan menyusui pada ibu kandung, anak merasa lebih tenang. Sebab menurut penelitian ilmuan, ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam perut. Detak jantung itu berbeda antara seorang wanita dengan wanita yang lain. Selain itu terjalin kasih sayang dalam menyusui secara psikologis, dan ibu kandung memiliki kasih sayang dan perhatian yang berbeda dengan wanita yang bukan ibu kandung.

Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan. Di sisi lain, bilangan itu juga mengisyaratkan bahwa yang menyusui setelah usia tersebut bukanlah penyusuan yang mempunyai dampak hukum yang mengakibatkan anak yang disusui berstatus sama dalam sejumlah hal dengan anak kandung yang menyusunya.

Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, tetapi bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan, *bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*. Namun demikian, ia adalah anjuran yang sangat ditekankan, seakan-akan ia adalah perintah wajib. Jika ibu bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut, maka tidak mengapa. Tetapi hendaknya jangan berlebih dari dua tahun, karena dua tahun dinilai sempurna oleh Allah. Di sisi lain, penetapan waktu dua tahun itu, adalah untuk menjadi tolok ukur bila terjadi perbedaan pendapat misalnya ibu dan bapak ingin memperpanjang masa penyusuan.

Adapun firman Allah dalam surat Q.S Al-Luqman (31) : 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلُوهُ  
فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Terjemahnya :

Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, Hanya kepada-Kulah kembalimu.

Al Qur'an hampir berpesan kepada ibu bapak untuk berbuat baik kepada anaknya kecuali sangat terbatas, yaitu pada larangan membunuh

anak. Ayat ini mengisyaratkan betapa penyusuan sangat penting dilakukan oleh ibu kandung. Tujuan penyusuan ini bukan sekedar untuk memelihara kelangsungan hidup anak, tetapi juga bahkan lebih-lebih untuk menumbuh kembangkan anak dalam kondisi fisik dan psikis yang prima. Ditegaskan bahwa masa dua tahun adalah bagi siapa yang hendak menyempurnakan penyusuan.

Daftar manfaat ASI bagi bayi selalu bertambah setiap hari. Penelitian menunjukkan, bayi yang diberi ASI secara khusus terlindung dari serangan penyakit sistem pernapasan dan pencernaan. Hal itu disebabkan zat-zat kekebalan tubuh di dalam ASI memberikan perlindungan langsung melawan serangan penyakit. Sifat lain dari ASI yang juga memberikan perlindungan terhadap penyakit adalah penyediaan lingkungan yang ramah bagi bakteri "menguntungkan" yang disebut "flora normal". Keberadaan bakteri ini menghambat perkembangan bakteri, virus dan parasit berbahaya. Tambahan lagi, telah dibuktikan pula bahwa terdapat unsur-unsur di dalam ASI yang dapat membentuk sistem kekebalan melawan penyakit-penyakit menular dan membantunya agar bekerja dengan benar.

Karena telah diramu secara istimewa, ASI merupakan makanan yang paling mudah dicerna bayi. Meskipun sangat kaya akan zat gizi, ASI sangat mudah dicerna sistem pencernaan bayi yang masih rentan. Karena itulah bayi mengeluarkan lebih sedikit energi dalam mencerna

ASI, sehingga ia dapat menggunakan energi selebihnya untuk kegiatan tubuh lainnya, pertumbuhan dan perkembangan organ.


Salah satu hal yang menyebabkan ASI sangat dibutuhkan bagi perkembangan bayi yang baru lahir adalah kandungan minyak omega-3 asam linoleat alfa. Selain sebagai zat penting bagi otak dan retina manusia, minyak tersebut juga sangat penting bagi bayi yang baru lahir. Omega-3 secara khusus sangat penting selama masa kehamilan dan pada tahap-tahap awal usia bayi yang dengannya otak dan sarafnya berkembang secara normal. Para ilmuwan secara khusus menekankan pentingnya ASI sebagai penyedia alami dan sempurna dari omega-3.

Fakta tentang ASI tidak berhenti hanya sampai di sini. Peran penting yang dimainkannya terhadap kesehatan bayi berubah seiring dengan tahapan-tahapan yang dilalui bayi dan jenis zat-zat makanan yang dibutuhkan pada tahapan tertentu. Kandungan ASI berubah guna memenuhi kebutuhan yang sangat khusus ini. ASI, yang selalu siap setiap saat dan selalu berada pada suhu yang paling sesuai, memainkan peran utama dalam perkembangan otak karena gula dan lemak yang dikandungnya. Di samping itu, unsur-unsur seperti kalsium yang dimilikinya berperan besar dalam perkembangan tulang-tulang bayi.

Meskipun disebut sebagai susu, cairan ajaib ini sebenarnya sebagian besarnya tersusun atas air. Ini adalah ciri terpenting, sebab selain makanan, bayi juga membutuhkan cairan dalam bentuk air.

Keadaan yang benar-benar bersih dan sehat mungkin tidak bisa dimunculkan pada air atau bahan makanan, selain pada ASI. Namun ASI sedikitnya 90% adalah air memenuhi kebutuhan bayi akan air dalam cara yang paling bersih dan sehat. ASI dan Kecerdasan.

Maksudnya Selambat-lambat waktu menyapih ialah setelah anak berumur dua tahun. Yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu, dengan baik.



## **BAB III**

### **KERANGKA KONSEP**

#### **A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti**

Pneumonia merupakan peradangan pada parenkim paru yang terjadi pada masa anak-anak dan sering terjadi pada masa bayi. Penyakit ini timbul sebagai penyakit primer dan dapat juga akibat penyakit komplikasi.

##### **1. Umur anak**

Pada bayi, pada kelompok usia ini, pneumonia biasanya disebabkan oleh virus. Jika penyebabnya bakteri, berbagai macam bakteri dapat menjadi penyebabnya tetapi jenis yang berbahaya adalah yang disebabkan staphylococcus aureus, yang dapat menyebabkan terbentuknya abses dan empiema. Bayi Nampak lebih sakit dibandingkan dengan pada bronchitis. Bayi cenderung pucat dan kolaps dengan rintihan waktu ekspirasi. Kegelisahan bayi disebabkan oleh hipoksia otak. Pengobatan: bayi harus dirawat dengan oksigen yang dipantau kadarnya secara teratur. Bila penyebabnya tidak diketahui maka kombinasi antibiotika yang dapat digunakan adalah flukloksasilin dan ampisilin. Mungkindiperlukan sedasi dan pemberian minum dengan pipa lambung apabila minum dengan botol menyebabkan sesak. (<http://mhs.blog.ui.ac.id>. Diakses pada tanggal 19 April 2010)

Sementara pada pneumonia rawat inap diberikan antibiotik beta-laktam intravena atau kombinasi antibiotik beta-laktam dan kloramfenikol intravena . Di Departemen IKA FKUI/RSCM pneumonia berat yang diberikan kombinasi amoksisilin dan kloramfenikol intravena, sejauh ini efektifitasnya cukup memuaskan. Sebagai referensi, suatu penelitian terapi antibiotik pada anak usia 2- 24 bulan dengan pneumonia berat antara penisilin G intravena (25 000 U/kg BB setiap empat jam plus kloramfenikol (15 mg/kg BB setiap 6 jam) dibandingkan dengan seftriakson intravena (50 mg/kg BB setiap 6 jam) yang diberikan selama 10 hari, efektifitasnya ternyata sama.

## 2. Status gizi

Air susu ibu (ASI) adalah sebuah cairan tanpa tanding untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit. Keseimbangan zat-zat gizi dalam air susu ibu berada pada tingkat terbaik dan air susunya memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang masih muda. Pada saat yang sama, ASI juga sangat kaya akan sari-sari makanan yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf. Makanan-makanan tiruan untuk bayi yang diramu menggunakan teknologi masa kini tidak mampu menandingi keunggulan makanan ajaib ini.


## 3. Faktor lingkungan

Pada dasarnya, pneumonia bisa menyerang siapa saja, dari bayi sampai orang tua. Penyakit ini disebabkan infeksi virus, bakteri, maupun

jamur yang dapat menular melalui udara. Namun penularan penyakit ini relatif kecil selama kondisi tubuh orang-orang di sekitar penderita memang bagus. Anak-anak dengan daya tahan tubuh yang kuat juga akan mampu melawan bibit pneumonia yang memapar tubuhnya.

## B. Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan pemikiran yang dirumuskan maka variabel yang diteliti sebagai berikut :



Keterangan gambar :

 : Variabel independen

 : Variabel dependen

 : Variabel yang diteliti

 : Variabel yang tidak diteliti

## C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

### 1. Umur anak

Lamanya seseorang hidup sejak dilahirkan sampai tanggal ke RSUD Labuang Baji dan terdiagnosis pneumonia.

- a. Resiko tinggi : umur 0 – 2 tahun
- b. Resiko rendah : umur > 2 – 5 tahun

### 2. Statu gizi

Status gizi merupakan ukuran kebutuhan makanan dan minuman seseorang. Adapun status gizi yang dimaksud adalah :

- a. Gizi baik : Jika berat badan > 80 %
- b. Gizi cukup : Jika berat badan > 70 %
- c. Gizi kurang : Jika berat badan > 70 %

### 3. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terhadap terjadinya kemunculan alergi yang akan mempermudah masuknya virus, kuman, dan bakteri penyebab pneumonia. Adapun faktor lingkungan yang dimaksud adalah :

- a. Lingkungan padat : Lingkungan yang dapat menyebabkan Anak mudah terjangkit suatu penyakit.
- b. Lingkungan tidak padat : Lingkungan sehat yang dapat menyebabkan anak terhindar dari berbagai penyakit karena kurangnya orang-orang disekitar rumah yang mungkin menderita suatu penyakit.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui angka kejadian pneumonia di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2009.

#### **B. Lokasi dan Waktu Meneliti**

##### **1. Lokasi**

Lokasi penelitian yang dipilih adalah RSUD Labuang Baji Makassar, terletak di Jl. Dr. Ratulangi No. 81 Kelurahan Labuang Baji Kec. Mamajang, Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan jalan landak
- b. Sebelah timur berbatasan dengan jalan tupai
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan gereja toraja
- d. Sebelah barat berbatasan dengan jalan Dr. Ratulangi

##### **2. Waktu penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2010

### **C. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Semua bayi dan balita yang mengalami penyakit infeksi gangguan pernafasan akut lainnya di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2009, sebanyak 332 orang.

#### **2. Sampel**

Semua bayi dan balita yang mengalami pneumonia dengan umur 0 - 5 tahun di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2009 sebanyak 141 orang.

### **D. Tehnik Pengambilan Sampel**

Pengambilan sampel secara purposive sampling yaitu didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya yaitu kelengkapan data sesuai dengan variabel penelitian.

### **E. Cara Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diambil dari rekam medik pada anak umur 0 – 5 tahun yang sakit dengan pneumonia yang pernah dirawat di RSUD Labuang Baji Makassar 2009.

### **F. Pengolahan Data**

Data yang diperoleh diolah secara manual dengan menggunakan kalkulator kemudian dianalisa secara deksriptif. Penyajian data ini dalam bentuk tabel distribusi prekuensi disertai penjelasan.

## G. Analisis Data


Data dianalisis dalam bentuk presentase dengan menggunakan rumus distribusi frekuensi sebagai berikut :

$$P = \frac{f}{n} \times 100 \%$$

Keterangan : p : persentase yang dicari

f : frekuensi

n : jumlah sampel



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian mengenai gambaran kejadian pneumonia pada bayi dan balita di RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2008, seluruh anak umur 0-5 tahun menderita penyakit infeksi saluran pernafasan akut di RSUD Labuang Baji Makassar sebanyak 332 orang dari anak yang menderita pneumonia sebanyak 141 orang.

Hasil pengelolaan data yang dilakukan disajikan sebagai berikut :

Tabel 2  
Distribusi Jumlah Bayi dan Balita yang Menderita ISPA  
Di RSUD Labuang Baji Makassar  
Tahun 2009

Infeksi Pernafasan Akut	Frekuensi	Presentase
Penderita Pneumonia	141	42,46 %
Penderita Infeksi Pernafasan Akut Lainnya	191	57,54 %
Total	332	100

Sumber : Data Sekunder

Tabel 1 menunjukkan bahwa penderita pneumonia sebanyak 141 orang (42,46%) dan penderita infeksi pernafasan akut lainnya sebanyak 191 orang (57,54%).

Tabel 3  
Distribusi Kejadian Pneumonia Pada Bayi dan Balita Berdasarkan  
Umur Anak Di RSUD Labuang Baji Makassar  
Tahun 2009

Umur Anak	Frekuensi	Presentase
0-2 Tahun	95	67,37 %
>2-5 Tahun	46	32,63 %
Total	141	100

Sumber : Data Sekunder

Tabel 2 Menunjukkan bahwa pneumonia yang terjadi pada umur 0-2 tahun sebanyak 95 orang (67,37%) dan pada umur > 2-5 tahun sebanyak 46 orang (32,63%).

Tabel 4  
Distribusi Kejadian Pneumonia Pada Bayi dan Balita Berdasarkan  
Status Gizi Anak di RSUD Labuang Baji Makassar  
Tahun 2009

Status Gizi	Frekuensi	Presentase
Cukup	29	20,57 %
Baik	34	24,12 %
Kurang	78	55,31 %
Total	141	100

Sumber : Data Sekunder

Tabel 3 Menunjukkan bahwa pneumonia pada bayi dan balita terbanyak pada status gizi cukup yaitu 29 orang (20,57%) dan paling sedikit pada anak dengan status gizi kurang yaitu 78 orang (55,31%).

Tabel 5  
Distribusi Kejadian Pneumonia Pada Bayi dan balita Berdasarkan  
Faktor Lingkungan Di RSUD Labuang Baji Makassar  
Tahun 2009

Faktor Lingkungan	Frekuensi	Presentase
Lingkungan Padat	86	60,99 %
Lingkungan Tidak padat	55	39,01 %
Total	141	100

Sumber : Data Sekunder

Tabel 4 menunjukkan bahwa Pneumoni yang terjadi pada Bayi dan Balita terbanyak pada faktor lingkungan yang padat yaitu 86 orang (60,99%) dan Paling sedikit Pada faktor lingkungan tidak padat yaitu 55 orang (39,01%).

## B. Pembahasan

Setelah melakukan penelitian mengenai gambaran kejadian pneumonia pada bayi dan balita di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2009 dan telah dilakukan pengelolaan dan penyajian data serta hasil yang diperoleh, maka berikut ini akan dilakukan pembahasan hasil penelitian sesuai dengan Variabel yang diteliti :

### 1. Pneumonia

Hasil penelitian dari 332 anak yang mengalami infeksi pernafasan akut, anak yang menderita pneumonia sebanyak 141 orang (42,46%) dan

anak yang menderita infeksi pernafasan akut lainnya sebanyak 191 orang (57,54%).

Pneumonia merupakan peradangan pada parenkim paru yang terjadi pada masa anak-anak dan sering terjadi pada masa bayi. Penyakit ini timbul sebagai penyakit primer dan dapat juga akibat penyakit komplikasi, yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur ataupun benda asing yang ditandai dengan gejala panas yang tinggi, gelisa, dispne, napas cepat dan dangkal, muntah, diare, batuk kering dan produktif. (A. Aziz Alimul Hidayat, 2006).

## 2. Umur Anak

Hasil penelitian dari 141 anak yang mengalami pneumonia terbanyak pada umur 0 – 2 tahun yaitu 95 orang (67,37%) dan umur > 2 – 5 tahun sebanyak 46 orang (32,63%).

Pneumonia sering terjadi pada bayi dan anak. Kasus terbanyak terjadi pada anak berusia dibawah 3 tahun dan kematian terbanyak terjadi pada bayi berusia yang berusia kurang dari 2 bulan. Perlu diperhatikan adanya tahapne, dispne, sianosis sirkumoral, pernapasan cuping indung, distensi abdomen, batuk semula nonproduktif menjadi produktif, serta nyeri dada pada waktu menarik napas. Batasan takipnea pada anak 2 bulan-12 bulan adalah 50 kali/menit atau lebih, sementara untuk anak berusia 12 bulan-5 bulan adalah 40 kali/menit atau lebih. Perlu diperhatikan adanya tarikan dinding dada kedalam akan tampak jelas. (Nursalam, 2005).

### 3. Status Gizi

Hasil penelitian dari 141 anak yang mengalami pneumonia terbanyak terjadi pada anak yang status gizi cukup yaitu 29 orang (20,57%), status gizi baik yaitu 34 orang (24,12%) dan paling sedikit terjadi pada anak dengan gizi kurang yaitu 78 orang (55,31%).

Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi juga didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrient. Penelitian status gizi merupakan pengukuran yang didasarkan pada data antropometri serta biokimia dan riwayat diit.

Hadirnya penyakit infeksi dalam tubuh anak akan membawa pengaruh terhadap keadaan gizi anak. Sebagai reaksi pertama akibat adanya infeksi adalah menurunnya nafsu makan anak sehingga anak menolak makanan yang diberikan ibunya. Penolakan terhadap makanan berarti berkurangnya pemasukan zat gizi ke dalam tubuh anak. Keadaan akan berangsur memburuk jika infeksi disertai dengan muntah yang mengakibatkan hilangnya zat gizi.

### 4. Faktor Lingkungan

Lingkungan tumbuh bayi yang mempengaruhi terhadap terjadinya pneumonia adalah kondisi sirkulasi udara dirumah, adanya pencemaran udara di sekitar rumah dan lingkungan perumahan yang padat. Usahakan

lingkungan tempat tinggal yang sehat yaitu yang berventilasi cukup dan tidak berasap. Kemampuan orang tua dalam menyediakan lingkungan tumbuh yang sehat pada bayi juga sangat mempengaruhi terhadap terjadinya pneumonia.



## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan yang dilakukan secara sistematis terhadap gambaran kejadian pneumonia pada bayi dan balita di RSUD Labuang Baji Makassar Tahun 2009, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah anak yang menderita pneumonia adalah 141 orang dan terbanyak pada umur 0 – 2 tahun yaitu 95 orang (67,37%) karena pada umur 0 – 2 tahun ini biasanya sistem kekebalan tubuh anak belum berfungsi dengan baik karena imunisasinya belum lengkap dan biasanya disebabkan oleh bakteri atau virus pada saat anak-anak sedang bermain dengan memasukkan benda-benda asing kedalam mulutnya yang dapat menyebabkan timbulnya bakteri, virus maupun senyawa kimia lainnya sehingga kemungkinan terjadi infeksi pada paru-paru dan sberkelanjutan pada penyakit pneumonia dan umur > 2 – 5 tahun yaitu 46 orang (32,63%). Pada umur ini anak-anak biasanya sudah mendapat imunisasi yang sudah lengkap sehingga sistem kekebalan tubuhnya kuat dan dapat terhindar dari berbagai macam penyakit terutama penyakit pneumonia.
2. Angka kejadian pneumonia dengan status gizi cukup yaitu 29 orang (20,57%) lebih sedikit, hal ini di sebabkan karena keberhasilan dan pemenuhan nutrisi pada anak menandakan anak mendapat gizi yang cukup sehingga melindunginya dalam melawan kemungkinan serangan penyakit,

gizi baik yaitu 34 orang (24,12%), jumlah anak penderita pneumonia pada status gizi baik tidak banyak terjadi disebabkan karena keseimbangan gizi yang cukup yang dapat diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi yang diindikasikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrient dan status gizi kurang yaitu 78 orang (55,31%) lebih banyak disebabkan karena hadirnya penyakit infeksi dalam tubuh anak akan membawa pengaruh terhadap keadaan gizi anak. sebagai reaksi pertama akibat adanya infeksi adalah menurunnya nafsu makan anak sehingga anak menolak makanan yang diberi ibunya. Penolakan terhadap makanan berarti berkurangnya pemasukan zat gizi ke dalam tubuh anak.

3. Angka kejadian pneumonia dengan faktor lingkungan padat yaitu 86 orang (60,99%) lebih banyak terjadi di sebabkan karena kondisi sirkulasi udara di sekitar rumah menjadi kurang, adanya pencemaran udara di sekitar rumah dan lingkungan tempat tinggal yang kotor sehingga mudah terjangkit penyakit dan faktor lingkungan tidak padat yaitu 55 orang (39,01%) lebih sedikit karena kondisi sirkulasi udaranya lebih berfungsi dengan baik sehingga kurangnya bakteri dan virus masuk ke dalam rumah.

## B. Saran

1. Diupayakan kepada masyarakat agar mengetahui tanda-tanda pneumonia sehingga memudahkan kegiatan penyuluhan dan penyebaran informasi tentang faktor resiko terjadinya pneumonia.
2. Disarankan kepada orang tua agar segera memeriksakan anaknya ke tenaga kesehatan bila sudah ada tanda-tanda penyakit untuk mengantisipasi komplikasi pada pneumonia.
3. Diharapkan kepada orang tua untuk memberikan makanan yang bergizi agar kebutuhan gizi anaknya dapat terpenuhi.
4. Diharapkan kepada orang tua agar menghindari lingkungan yang kotor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit terutama penyakit pneumonia.
5. Masyarakat diharapkan untuk menghindari faktor resiko pneumonia pada anak diantaranya ialah pencegahan lewat imunisasi BCG, DPT cukup esensial untuk menyiapkan balita menghadapi lingkungan yang tidak selalu bisa dijamin kebersihannya selain itu, asupan makana yang kaya gizi tentu akan mempertahankan stamina balita sendiri.
6. Memberikan penyuluhan secara rutin kepada ibu-ibu tentang bahaya pneumonia pada anak agar ibu mengetahui sejak dini bahaya dan dampak yang kemungkinan akan terjadi apabila tidak diobati sejak awal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahannya. 2005. Departemen Agama RI. Bandung CV, Penerbit.J-ART
- Alsagaff Hood, 2010, *Dasar-Dasar ilmu penyakit paru*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Aziz, Alimul A, 2006, Aspirasi pneumonia (<http://www.scribd.com>), Diakses pada tanggal 28 Maret 2010.
- Beck, 2000, Pneumonia pada bayi dengan status gizi ([www.infokes.com](http://www.infokes.com)). Diakses pada tanggal 12 Mei 2010.
- Chapman vicky, 2006, *Asuhan kebidanan Persalinan dan Kelahiran*, EGC, Jakarta.
- Djelantik IGG, dr, info penyakit Penyakit Pneumonia dan pencegahannya, (<http://community.um.ac.id>), diakses pada tanggal 2010
- Donges Marilinn E, 2000, *Rencana asuhan keperawatan*, EGC, Jakarta.
- Hidayat Aziz AA, 2006, *Pengantar Ilmu Keperawatan Anak*, Salemba Medika, Jakarta.
- Murwani Arita, 2009, *Perawatan Pasien Penyakit Dalam*, Mitra Cendikia Press, Jogjakarta.
- Nursalam, dkk, 2005, *Asuhan Keperawatan Bayi dan Anak*, Salemba Medika, Jakarta.
- Pillitteri Adele, 2002, *Buku Saku Asuhan Ibu dan Anak*, EGC, Jakarta.
- Rasmillah, 2004, Pneumonia Pada Bayi (<http://rm2u.com>). Diakses pada tanggal 18 Maret 2010.
- Said, Mardjanie Dr, 2006, Sayang Sibuah Hati, Kenali Pneumonia ([Http://www.majalah-farmacia.com](http://www.majalah-farmacia.com)), diakses pada tanggal 30 Mei 2010.
- Setiani R, 2010, Pneumonia pada anak (<http://mhs.blog.ui.ac.id>), diakses pada tanggal 19 April 2010

Shihab, M.Quraish, 2002, Tafsir Al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an, Lantera Hati, Jakarta

Tambayong Jan, 2000, *Patofisiologi Untuk Keperawatan*, EGC, Jakarta.

Titjen Linda, dkk, 2004, *Panduan Pencegahan Infeksi untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Sumber Daya Terbatas*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta.

Widjaya A, 2003, *Penanganan ISPA pada Anak di Rumah Sakit Kecil di Negara Berkembang*, EGC, Jakarta.

Wong Donna L, 2003, *Pedoman Klinis Keperawatan Pediatrik*, EGC, Jakarta.

Yahya, Harun, 2010, Kebaikan susu ibu mengikuti pandangan saintis islam s(<http://rm2u.com>), diakses pada tanggal 21 April 2010.



**DAFTAR PENDERITA PNEUMONIA PADA BAYI DAN BALITA  
DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR  
TAHUN 2009**

No	Medical record	Nama Anak	Umur	BB (Kg)	Faktor Lingkungan
1	123072	An "A"	2 thn 1 bln	9,0	Jl. Manuruki II Lor.1
2	157239	An "A"	4 thn 2 bln	11,5	Jl. Kakatua III No.35
3	156895	An "R"	2 thn 4 bln	8,5	Jl. Bonto Lanta 2
4	157281	An "S"	1 thn 8 bln	9,2	Jl. Sultan Alauddin Lor.6 B
5	157205	An "M"	4 bln	5,5	Jl. Kakatua II Lor.03
6	157158	An "M"	2 thn 10 bln	10,6	Jl. M. Yamin Lor.8/2B
7	157393	An "R"	5 bln	5,9	Jl. M. Yusuf Bauti
8	156903	An "W"	8 bln	8,8	Jl. Patturungan Limbung
9	157690	An "U"	6 bln	5,0	Jl. Seroja No. 17
10	157886	An "R"	2 thn 3 bln	7,5	Jl. Mamoalorong 1 A/8
11	157999	An "A"	1 thn 1 bln	11,9	Jl. Monumen Emmy Selang
12	157987	An "R"	8 bln	5,5	Jl.Sultan Alauddin No. 13
13	158339	An "F"	2 thn 4 bln	9,5	Jl. Landak Baru lor. 3/35
14	152842	An "R"	1 thn 6 bln	10,5	Jl. Sunu Lor. 2A/8
15	158301	An "R"	2 thn 5 bln	8,9	Jl. Baji Maccini
16	099447	An "M"	2 thn 8 bln	10,0	Jl. Dahlia Lor. 312/50
17	158731	An "J"	5 thn	17,5	Jl. Kandealor. 2B/27
18	158209	An "I"	1 thn 1 bln	6,9	Jl. Danau Tanjung Bunga
19	155085	An "T"	1 thn 1 bln	7,0	Jl. Nuri baru Lor. 312
20	155085	An "S"	4 thn 8 bln	14,0	Jl. Ablam Lor. 10 No. 14 A
21	159056	An "D"	1 thn 1 bln	7,5	Jl. Petta Punggawa
22	159111	An "M"	1 thn	7,5	Jl. Bara-Baraya Timur
23	159744	An "N"	3 thn	4,5	Jl. Andi Mangerangi No. 21
24	159306	An "I"	1 thn 1 bln	6,5	Jl. Toddopuli 2 STP 2/57
25	159390	An "R"	1 thn	7,0	Jl. Sabutung Baru 3
26	160116	An "F"	5 thn	16,9	Jl. Kelapa Tiga
27	159167	An "M"	1 thn 6 bln	10,2	Jl. Kancil Utara No 55 C
28	160238	An "L"	2 thn 2 bln	8,2	Jl. Dr. Ratulangi No 53
29	159935	An "A"	2 thn	8,7	Jl. Andi Tonro
30	159955	An "F"	3 bln	10,4	Jl. Kandealor. 3
31	160463	An "D"	3 mgg	4,2	Jl. Landak Baru
32	126229	An "N"	1 thn 1 bln	8,2	Jl. BTN Jane Tallasang Gowa
33	160452	An "N"	3 thn 3 bln	10,7	Jl. Toddopuli 3 No 277
34	160231	An "S"	1 thn 5 bln	8,5	Jl. Sungai Saddang baru
35	160830	An "M"	7 bln	6,0	Jl. Sungai Sanddang

36	160550	An "N"	3 bln	5,0	Jl. Tidung Mariolo Lor. 6/5C
37	146611	An "A"	2 thn 3 bln	7,3	Jl. Sumanna
38	160561	An "M"	2 thn 3 bln	8,5	Jl. Datu Ribandang
39	155505	An "M"	1 thn 4 bln	9,7	Jl. Veteran Selatan
40	160658	An "S"	3 thn	9,0	Jl. Maccini Raya
41	160535	An "N"	1 thn	7,3	Jl. Wijaya Kesuma
42	161300	An "H"	5 bln	14,6	Jl. Barukan Utara
43	158087	An "R"	6 bln	5,6	Jl. Mallengkeri 4B/12
44	160935	An "N"	3 thn 1 bln	8,9	Jl. Pammolo
45	160748	An "F"	9 bln	6,6	Jl. Gantang Raya No.121
46	160838	An "S"	1 thn	8,5	Jl. Sungai Saddang Baru
47	161200	An "A"	3 thn 8 bln	3,8	Jl. BTN Pelita Asri
48	161049	An "R"	3 thn 8 bln	3,8	Jl. Melati
49	141343	An "N"	7 bln	4,5	Jl. Mongosidi baru lor. 1/1A
50	161420	An "S"	2 thn 1 bln	10,8	Jl. Kelapa 3 No. 4
51	161559	An "S"	2 thn 1 bln	11,0	Jl. Mappaoddang No.56
52	161252	An "M"	3 thn 8 bln	13,9	Jl. H. Kalla II
53	161527	An "M"	11 bln	7,0	Jl. Makassar
54	161704	An "M"	4 thn 5 bln	13,5	Jl. Arif Rahman Hakim
55	161593	An "R"	9 bln	6,5	Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 9
56	161457	An "O"	1 bln	4,3	Jl. Lombong No. 12
57	161817	An "M"	1 thn 6 bln	8,5	Jl. Bonto Duri 7/5
58	159840	An "M"	1 thn 4 bln	10,0	Jl. Sultan Alauddin
59	162419	An "N"	3 thn 8 bln	14,5	Jl. Sibula Dalam No. 17 A
60	158229	An "M"	4 bln 26 hr	4,0	Jl. Pattarungan Gowa
61	162130	An "S"	10 bln	6,0	Jl. Adipura
62	162577	An "Y"	1 thn 2 bln	9,4	Jl. Bontoa
63	162553	An "S"	1 thn 1 bln	7,5	Jl. Boddia
64	162107	An "M"	4 bln	4,6	Jl. Balang Baru
65	162468	An "M"	1 thn 2 bln	11,5	Jl. Urip Sumoharjo
66	162862	An "M"	1 thn 6 bln	10,0	Jl. Maccini Gusung No. 26
67	162294	An "S"	2 thn 2 bln	8,0	Jl. Parapa Takalar
68	170170	An "N"	1 thn	7,6	Jl. Bontonompo
69	154030	An "M"	1 thn	7,0	Jl. M. Emmy Seilan No. 27 B
70	170447	An "N"	1 thn 9 bln	8,0	Jl. Maggarupi No. 5
71	170172	An "M"	1 thn 1 bln	7,6	Jl. Monumen Emmy Seilan
72	170907	An "M"	3 thn 1 bln	7,0	Jl. Sembilan
73	170803	An "M"	2 bln	8,0	Jl. Galangan Kapal Belakang
74	170487	An "S"	11 bln	7,5	Jl. Badak
75	171504	An "M"	9 bln	15,0	Jl.Sungguminasa Gowa
76	170574	An "K"	5 bln	3,9	Jl. Pelita 4 RT 3 RW 5

77	171247	An "A"	2 bln	7,3	Jl. Rappokalling
78	171496	An "M"	6 bln	6,6	Jl. Maccini Tengah
79	171387	An "A"	7 bln	5,0	Jl. Minasa Induk
80	167247	An "S"	1 thn 4 bln	3,0	Jl. Barombong
81	165367	An "R"	2 thn 9 bln	7,6	Jl. Karunrung
82	172171	An "A"	7 bln	5,0	Jl. Veterann Selatan
83	171919	An "N"	1 thn	7,5	Jl. Serigala No. 165
84	172112	An "M"	5 bln	7,8	Jl. Andi Tonro
85	172250	An "A"	2 thn	8,5	Jl. Masale
86	056664	An "N"	3 thn 11 bln	15,0	Jl. Takalar
87	172245	An "D"	4 thn 3 bln	15,6	Jl. Sukaria 4 No. 35 A
88	172330	An "R"	3 bln	9,0	Jl. Bonto Minasa 2
89	172662	An "Y"	1 thn 4 bln	10,5	Jl. Pasar Kalimbu
90	124959	An "S"	2 thn	9,5	Jl. Bonto Lonro Lor.4 No.19 M
91	173185	An "J"	11 bln	7,0	Jl. Mawas No. 1
92	172477	An "A"	11 bln	7,5	Jl. Rajawali
93	173624	An "M"	19 hr	3,2	Jl. Kesempatan
94	157987	An "R"	1 thn 2 bln	7,5	Jl. Sultan Alauddi No. 13
95	173522	An "I"	2 thn 9 bln	10,5	Jl. Kumala 2 Lor. 2 No. 9
96	173587	An "F"	2 bln	4,0	Jl. Mawas 3 No. 493
97	158074	An "M"	2 thn	9,0	Jl. Naja Dg. Nai No. 10
98	173705	An "N"	11 bln	7,8	Jl. Landak Baru Lor. 1
99	171997	An "M"	6 bln	5,5	Jl. Rajawali Lor. 13 B
100	174514	An "M"	2 thn 2 bln	7,8	Jl. Al- Ashar Batanka Luko
101	174669	An "P"	2 bln	5,5	Jl. Andi Tonro Lor. 6/16 B
102	047335	An "A"	2 thn 7 bln	7,8	Jl. BungaEja Beru No. 10
103	174472	An "L"	1 thn 6 bln	8,5	Jl. Dr. Ratulangi
104	174846	An "N"	1 thn 5 bln	9,5	Jl. Kumala 2 No. 15
105	174579	An "A"	3 bln	10,0	Jl. Malino
106	056664	An "N"	4 thn	10,2	Jl. Bonto lanra Takalar
107	145355	An "S"	1 thn	4,5	Jl. Ablam 3 Lor. 3 No. 13
108	150626	An "H"	1 thn 10 bln	14,5	Jl. Bung No. 6
109	168949	An "H"	2 bln	7,0	Jl. Barombong
110	173012	An "D"	10 bln	10,5	Jl. Orde Baru Galesong Baru
111	174794	An "F"	1 thn 3 bln	5,5	Jl. Sunu
112	158074	An "M"	2 thn 4 bln	7,0	Jl. Naja Dg. Nai Lor 5 No. 10
113	174478	An "F"	4 thn 11 bln	9,4	Jl. Sungai Saddang Baru
114	174870	An "M"	3 thn 5 bln	9,0	Jl. Muhammad Yamin
115	175504	An "A"	1 thn	16,5	Jl. Tambolo Gowa
116	175577	An "R"	8 bln	10,0	Jl. Karama
117	175533	An "Y"	4 thn	7,0	Jl. Bji Gau 2 Lor. 1/ 35 F

118	175500	An "M"	1 thn 2 bln	8,6	Jl. Kandeia 3 Lor. 6 No. 6
119	175932	An "A"	3 thn	15,0	Jl. Dg. Ngirate Blok 21
120	175798	An "A"	9 bln	6,5	Jl. Maccini Raya
121	175480	An "K"	1 thn 6 bln	8,5	Jl. Vetran Selatan No. 293
122	164514	An "M"	7 bln	6,0	Jl. Balana II STP 2 No.5
123	631539	An "A"	4 thn 1 bln	11,0	Jl. Panti Arham Annur
124	174671	An "M"	1 thn 1bln	7,5	Jl. Sultan Alauddin
125	175077	An "Y"	1 thn	7,5	Jl. Syek Yusuf No.42
126	175974	An "S"	1 thn	7,0	Jl. G. Bulu Saraung Lor.124
127	175731	An "N"	1 thn 6 bln	8,6	Jl. Sultan Alauddin IV No.16
128	167330	An "M"	5 bln	5,5	Jl. Vettarani 8 Lor.3 No. 1
129	175769	An "Z"	4 bln	6,7	Jl. Ablam 17 No.47
130	176027	An "R"	2 thn 6 bln	9,0	Jl. Kandeia III Lor.2 No.45
131	176433	An "D"	1 thn 4 bln	9,2	Jl. Kandeia Lor.118 B No.22 A
132	176058	An "I"	11 bln	7,5	Jl.M. Gusung STP 3 No.18
133	149538	An "R"	1 thn 2 bln	7,9	Jl. Laya 253 No.13
134	176302	An "H"	6 bln	6,5	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo
135	176338	An "F"	7 bln	6,5	Jl. Banta-Bantaeng
136	176325	An "H"	2 thn 3 bln	7,8	Jl. Teuku Umar XI no. 10
137	169041	An "F"	5 bln	8,0	Jl.Sungai Saddang B Lor.10
138	176585	An "S"	2 thn 7 bln	9,5	Jl. Teuku Umar No. 15
139	176549	An "A"	27 hr	5,0	Jl. Andi tonro 4 No.14
140	176854	An "N"	4 thn 5 bln	14,9	Jl. Dg Tata Belakang
141	176851	An "R"	1 thn 1 bln	11,5	Jl.Urip Sumoharjo RT.01

## BIODATA PENULIS



### A. IDENTITAS

NAMA : RUSLAENI  
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR : KANANG, 22 APRIL 1989  
AGAMA : ISLAM  
ASAL : POLMAN, SULAWESI BARAT  
ALAMAT : JL. SALEMBA NO. 7B

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK RAODATUL ATFAL TAHUN 1995
2. SDN INPRES RAPPOANG, TAHUN 2001
3. MTs DDI KANANG, TAHUN 2004
4. MADRASAH ALIYAH DDI KANANG, TAHUN 2007
5. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,  
TAHUN 2010