



**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN SYNDROME ASTHENOPIA  
PADA USAHA PENGETIKAN DI KELURAHAN MANGASA KECAMATAN  
TAMALATE KOTA MAKASSAR TAHUN 2010**



Skripsi  
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat  
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**NANA KUDRAWATI**  
**NIM. 70200106038**  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2010**



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 11 Januari 2011

Penyusun,

**NANA KUDRAWATI**

**NIM: 70200106038**






## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang melimpahkan karunia pengetahuan kepada makhluk-makhluk-Nya. Yang mana setiap tutur kata yang tertulis dalam susunan kalimat-kalimat ini adalah setitik ilmu yang dianugerahkan, dan kita patut mensyukurinya. Sebab tanpa itu, hidup ini ibarat berjalan di dalam gelap gulita tanpa cahaya, dan ilmu pengetahuan itulah cahaya yang dikaruniakan Allah pada kita.

*Allahumma shalli 'alaa sayyidina muhammadin wa 'alaa aalii sayyidina Muhammad*, shalawat dan salam atas junjungan dan suri tauladan terbaik Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, sang ilmuwan peradaban.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua orang-orang yang telah banyak membantu dalam penyelesaian proposal penelitian ini:

1. Ayahanda Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Ayahanda dr. H. M. Furqaan Naiem, MSc., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan sebagai penguji I.
3. Bapak DR. drg. Andi Zulkifli, MS. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Fatmawaty Mallapiang SKM., M.Kes. selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.




5. Bapak Prof. DR. Darussalam, M.Ag. yang telah bersedia menjadi penguji serta telah banyak memberikan saran dan arahan yang sangat bermanfaat.
6. Kepala pemerintah kelurahan mangasa yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di Kelurahan Mangasa.
7. Buat orang tuaku tercinta, ayahanda Suparta dan ibunda Syamsyarifah, terima kasih atas bantuan dan semangat yang senantiasa kalian berikan padaku.
8. Adik-adikku tercinta,
9. Rekan-rekan mahasiswa yang telah banyak membantu, khususnya saudara-saudaraku.
10. Pengelola dan staf administrasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memperlancar urusan administrasi selama penulis menempuh pendidikan.

Dengan segala kerendahan hati, tulisan ini kami persembahkan, semoga dapat memberi manfaat bagi pembaca.

Makassar, 10 Oktober 2010

**Nana Kudrawati**  
Penulis



**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....ii

HALAMAN PENGESAHAN .....iii

KATA PENGANTAR .....iv

DAFTAR ISI .....v

ABSTRAK.....vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

    A. Latar Belakang ..... 1

    B. Rumusan Masalah.....8

    C. Tujuan Penelitian ..... 8

    D. Manfaat Penelitian ..... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 11

    A. Tinjauan Umum tentang Mata ..... 11

    B. Tinjauan Umum tentang *Asthenopi* ..... 17

    C. Tinjauan Umum tentang Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan *Syndrome Asthenopia*..... 17

        1. Umur..... 17

        2. Masa Kerja ..... 18

        3. Lama Kerja..... 19

        4. Jarak Pandang ke Layar Monitor Komputer..... 22

        5. Pencahayaan..... 25

        6. Posisi Duduk..... 29


        7. Sikap Duduk..... 30

    D. Pandangan Islam tentang *Asthenopia* ..... 33



BAB III KERANGKA KONSEP .....	37
A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti .....	37
B. Kerangka Konsep.....	40
C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektivitas .....	41
D. Hipotesis.....	44
BAB IV METODE PENELITIAN .....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	46
C. Populasi dan Sampel.....	46
D. Pengumpulan Data.....	47
E. Metode Pengolahan Data.....	47
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
B. Hasil Penelitian .....	48
C. Pembahasan.....	58
BAB VI PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	75
C. Keterbatasan Penelitian .....	75

DAFTAR PUSTAKA




## DAFTAR AYAT-AYAT AL-QUR'AN

I. Q.S. An-Nahl/ 16 Ayat: 78.....	35
II. Q.S. Al-Isra'/ 15 Ayat: 36 .....	36



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



## LAMPIRAN

Lampiran I Master Tabel

Lampiran II Out Put Master Tabel

Lampiran III Lembar Observasi

Lampiran IV Koesioner Penelitian

Lampiran V Surat izin Penelitian

Lampiran VI Surat Keterangan Telah Meneliti

Lampiran VII Dokumentasi penelitian







## ABSTRAK

NAMA PENYUSUN : NANA KUDRAWATI

NIM : 70200106038

JUDUL SKRIPSI : FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN  
*SYNDROM ASTHENOPIA* PADA USAHA PENGETIKAN DI  
KELURAHAN MANGASA KECAMATAN TAMALATE KOTA  
MAKASSAR TAHUN 2010

---

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan *syndrome asthenopia* pada usaha pengetikan di kelurahan Mangasa kecamatan Tamalate kota Makassar pada tahun 2010. Jenis penelitian ini adalah observasional *analitik* dengan rancangan *cross sectional study*. Sampel diambil secara *accidental sampling* dan didapatkan 35 sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner dan observasi langsung di lapangan, dan dianalisis dengan menggunakan uji Chi-Square.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara umur dengan *syndrome asthenopia* pada  $p=0,007$  ( $p<\alpha$  0,05), Terdapat hubungan antara masa kerja dengan *syndrome asthenopia* pada  $p=0,000$  ( $p<\alpha$  0,05), dan Ada hubungan antara lama kerja dengan *syndrome asthenopia* pada  $p= 0,008$  ( $p<\alpha$  0,05). Hasil penelitian juga menunjukkan tidak ada hubungan antara jarak pandang ke layar monitor dengan *syndrome asthenopia* pada  $p=1,000$  ( $p>\alpha$  0,05), ada hubungan antara pencahayaan dengan *syndrome asthenopia* pada  $p=0,001$  ( $p<\alpha$  0,05), ada hubungan antara posisi duduk dengan *syndrome asthenopia* pada  $p=0,016$  ( $p<\alpha$  0,05) dan ada hubungan antara sikap duduk dengan *syndrome asthenopia* pada  $p=0,001$  ( $p<\alpha$  0,05).

Diharapkan pemerintah memberikan sosialisasi kepada pengusaha pengetikan tentang resiko penggunaan komputer dan tata cara penggunaan komputer yang baik dan aman. Pemerintah setempat, khususnya pemerintah kota Makassar diharapkan mengeluarkan aturan yang mengatur tentang izin usaha pengetikan/penggunaan komputer dengan mengacu pada keselamatan dan kesehatan. Pengusaha pengetikan/pengguna komputer diharapkan memiliki kesadaran tentang potensi bahaya penggunaan komputer yang tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan.

Kata Kunci: Faktor-faktor, *Syndrome Asthenopia*.




## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang ini, tenaga kerja diarahkan pada pembentukan tenaga kerja yang profesional, mandiri, beretos kerja tinggi, dan merupakan upaya menyeluruh yang ditunjukkan pada peningkatan, pembentukan dan pengembangan pekerja yang berkualitas, efektif dan efisien sehingga mampu mengisi, menciptakan, dan memperluas lapangan kerja, serta kesempatan usaha. Di lingkungan kerja, baik industri, perkantoran maupun sektor informal, sebenarnya tenaga kerja berisiko untuk mendapatkan gangguan kesehatan atau penyakit yang ditimbulkan oleh pekerjaan tersebut. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, proses maupun lingkungan kerja. Menurut Cherry (1999) *“An occupational disease may be defined simply as one that is caused, or made worse, by exposure at work”* (Anies, 2005:1).

Penyakit akibat kerja di lingkungan kerja, merupakan problema bagi para pekerja di berbagai sektor. Sebagian orang menyadari bahwa penyakit yang diderita besar kemungkinan karena pekerjaannya. Tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa pekerjaan yang ditekuninya sehari-hari sebagai penyebab penyakit tertentu.



Kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja merupakan tiga komponen utama dalam kesehatan kerja, di mana hubungan interaktif dan serasi antar ketiga komponen tersebut akan menghasilkan kesehatan kerja yang baik dan optimal. Kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja yang baik seperti status kesehatan kerja dan gizi kerja yang baik serta kemampuan fisik yang prima diperlukan agar seorang pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Kondisi atau tingkat kesehatan pekerja sebagai awal seseorang untuk melakukan pekerjaan harus pula mendapat perhatian.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan dari setiap orang hidup secara produktif, secara sosial dan ekonomi. Untuk itu upaya kesehatan bagi tiap individu perlu perhatian di manapun individu itu berada tak terkecuali di tempat kerja. Menurut UU Tenaga Kerja tahun 2003, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Fitrayani, 2006:2).

Banyaknya jumlah angkatan kerja per tahun tidak sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia untuk sektor formal, menyebabkan sebagian tenaga kerja melakukan usaha pada sektor informal. Menurut Fikry Effendi yang dimaksud dengan industri informal adalah kegiatan ekonomi tradisional, usaha-usaha di luar sektor modern/ formal yang mempunyai ciri-ciri yaitu sederhana, skala usaha relatif kecil dan umumnya belum terorganisir secara baik. Menurut M. Mikhew gambaran umum sektor informal mempunyai ciri-ciri yaitu,



timbulnya resiko bahaya pekerjaan yang tinggi, keterbatasan sumber daya dalam mengubah lingkungan kerja dan menentukan tentang pelayanan kesehatan kerja yang adekuat, rendahnya kesadaran terhadap faktor-faktor resiko kesehatan kerja, kondisi pekerjaan yang tidak ergonomi, kerja fisik yang berat dan jumlah kerja yang panjang, pembagian kerja distruktur yang beranekaragam dan rendahnya pengawasan manajemen serta pencegahan bahaya-bahaya pekerjaan, anggota keluarga sering sekali terpajan bahaya-bahaya akibat pekerjaan, masalah perlindungan tidak terpecahkan dengan baik, kurangnya pemeliharaan kesehatan, jaminan keamanan, sosial (asuransi kesehatan) dan fasilitas kesejahteraan (<http://www.kalbe.cdk136.com>, ISSN: 0125-193X.co.id)

Perkembangan pengetahuan dan teknologi yang semakin maju seperti sekarang ini memudahkan seseorang dalam mencapai keinginannya, misalnya munculnya seperangkat komputer. Pemakaian komputer saat ini sudah semakin luas, hampir setiap kegiatan manusia tidak terlepas dari pemakaian komputer. Komputer sebagai alat bantu yang banyak digunakan manusia, ternyata juga menimbulkan penyakit akibat kerja seperti halnya pemakaian mesin pada industri. Ditinjau dari energi radiasi dapat dikatakan radiasi komputer, yaitu sinar x, tidak menimbulkan efek berbahaya bagi manusia. Namun, harus diperhatikan lamanya radiasi menyinari tubuh, khususnya mata. Intensitas yang rendah tapi dalam waktu yang lama bisa menimbulkan gangguan fisiologis (E Batubara, 2002).

Pengguna komputer dalam waktu lama berisiko terkena mata lelah atau *Asthenopia* (Affandi: 2002). *Asthenopia* adalah kelelahan *okular* atau ketegangan pada organ *visual* di mana terjadi gangguan pada mata dan sakit kepala




sehubungan dengan penggunaan mata secara intensif. Keletihan *visual* menggambarkan seluruh gejala-gejala yang terjadi sesudah stress berlebih terhadap setiap fungsi mata, diantaranya adalah tegang otot *siliaris* yang berakomodasi saat memandangi obyek yang sangat kecil dalam jarak yang sangat dekat (Roestijawati, 2007: 30).

*Asthenopia* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, umur, Masa kerja yang digunakan dalam tahun, Lama kerja yang digunakan dalam jam, jarak pandang layar monitor dengan pengetik, Pencahayaan yang di gunakan oleh pengetik, Posisi dan sikap duduk pengetik.

Dalam kehidupan manusia, mata merupakan bagian dari panca indera yang sangat penting dibanding indera lainnya. Para ahli mengatakan, jalur utama informasi 80 % melalui mata. Maka dari itu, mata seringkali disebut jendela karena bisa menjadi faktor penyebab kebutaan (Gemari 2002). Berdasarkan data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), saat ini di seluruh dunia, ada sekitar 135 juta penduduk dunia memiliki penglihatan lemah dan 45 juta orang (3%) menderita kebutaan. Dari jumlah itu, 90% diantaranya berada di negara berkembang dan sepertiganya berada di Asia Tenggara. Jika sebagian dari pengetik merupakan salah satu yang memiliki penglihatan lemah maka tentu saja pengetik akan lebih mudah untuk terkena *Asthenopia* (<http://kbi.gemari.or.id/>).

Survei yang dilakukan oleh *American Optometric Association* (AOA) tahun 2004 membuktikan bahwa 61% masyarakat Amerika mengalami permasalahan yang serius terjadi seperti, kelelahan mata akibat bekerja dengan




komputer dalam waktu lama. Data organisasi kesehatan dunia (WHO) menunjukkan angka kejadian *Asthenopia* berkisar antara 40-90% (Hanum, 2008:3).

Penelitian tentang resiko kesehatan dan kerusakan penglihatan pada pekerja surat kabar yang terpapar dengan layar monitor, menemukan bahwa penyakit yang paling sering dialami adalah *Asthenopia* (kelelahan mata) dengan prevalensi 85% lebih banyak dari pekerja lain (Martinez, Escapita, Rodriguez, Bello, 2009:2).

Penelitian mengenai dampak pemakaian komputer dalam Sutjana, yang dilakukan oleh Max Shall menemukan bahwa hampir 50% operator komputer mengalami keluhan pada mata seperti rasa perih, di sekitar mata terasa *neck*, penglihatan kabur, penglihatan ganda dan sebagainya. Rose and Oxemburgh menemukan adanya keluhan otot punggung, bahu dan leher pada operator-operator komputer. Hubinger menemukan bahwa adanya peningkatan kompesasi untuk biaya pengobatan yang menyangkut keluhan yang berhubungan dengan pemakaian komputer (Fitriyani, 2006: 4).

Penelitian Tri Sejati (1989) terhadap 40 orang operator komputer ternyata 34 orang yang mengalami kelelahan mata. Dari jumlah tersebut ternyata 20% bekerja secara efektif antara 2-4 jam, sedang 65% bekerja secara efektif antara 5-8 jam. Penelitian Muhdahani (1994) pada 57 operator komputer yang mengoperasikan komputer minimal 4 jam sehari ternyata 88,5% mengalami *Asthenopia* akomodatif atau kelelahan (Murtopo dan Sarimurni, 2005:156).




Berdasarkan hasil penelitian, 77% para pemakai monitor akan mengalami kelelahan pada mata, mulai dari rasa pegal dan nyeri pada mata, mata merah, mata berair, sampai pada iritasi mata. Bahkan ada kemungkinan terjadinya katarak pada mata. (Anies, 2005:114).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap suatu perusahaan yang banyak menggunakan komputer diperoleh data keluhan nyeri otot akibat pemakaian komputer, 25% karyawan mengeluh nyeri pada bahu, 19% karyawan menderita nyeri pergelangan tangan, 15% karyawan mengalami nyeri tengkuk dan 14% karyawan mengeluh nyeri punggung (Anies, 2005:111). Hasil lain diperoleh pada biro pariwisata yang banyak menggunakan komputer, yaitu data keluhan nyeri otot sebanyak 54% karyawan keluhan nyeri pada bahu, 32% karyawan merasakan nyeri pada pinggang bagian bawah, 24% karyawan mengalami nyeri tungkai, 18% karyawan menderita nyeri tengkuk dan 6% karyawan mengatakan nyeri kepala, lengan dan pergelangan tangan (Anies, 2005:111).

Menurut Wood dan Phillis terjadinya keluhan pada otot bahu dan leher pada operator komputer sebagai akibat tinggi meja komputer terutama tinggi monitor tidak bisa diatur, sedang tinggi tubuh operator tidak sama, sehingga ada yang sudah pas, ada yang ketinggian dan ada pula yang kerendahan (Fitrayani, 2006: 4).

Tempat duduk atau kursi yang dipakai bekerja dengan komputer juga sangat menentukan kenyamanan, produktifitas kerja serta timbulnya keluhan pemakai komputer. Kursi yang tidak memenuhi syarat, menimbulkan sikap paksa




dan dalam waktu jangka tertentu akan diikuti rasa lelah maupun beberapa keluhan rasa sakit otot. Dengan penyesuaian tinggi monitor komputer (tinggi tepi atas monitor disesuaikan dengan tinggi mata operator waktu duduk sehingga lapangan pandang setinggi mata ke bawah) ternyata dapat menurunkan keluhan subyektif 24,0%, dan yang menyolok adalah penurunan keluhan pada leher 71,4 %, keluhan pada bahu kiri 57,1 % dan keluhan pada bahu kanan 75% (Fitrayani, 2006: 6).

Hasil penelitian pada PT. PLN (Persero) Pikitring Sulawesi yang dilakukan oleh Titin Hayati pada tahun 1998 mendapatkan bahwa keluhan *Asthenopia* adalah 76,6% untuk jarak pandang <60cm sebesar 63,3 % 13,3% pada jarak pandang  $\geq 60$  cm untuk lama kontak dengan komputer, *Asthenopia* ditemukan pada lama kontak 2-4 jam sebesar 53,3 % dan > 4 jam sebesar 23,3% (Fitrayani, 2006:6).

Operator komputer pada usaha pengetikan komputer memiliki resiko yang besar untuk menderita penyakit akibat kerja baik yang disebabkan oleh alat kerja maupun oleh proses dan lingkungan kerjanya. Di mana usaha komputer tersebut merupakan industri informal yang tidak terikat oleh aturan-aturan yang diterapkan oleh atasan. Oleh karena itu dengan melihat latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan *Syndrome asthenopia* pada usaha pengetikan di kelurahan Mangasa kecamatan Tamalate kota Makassar.





## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas maka penelitian ini dirumuskan pada faktor-faktor yang berhubungan dengan *syndrome asthenopia* pada usaha pengetikan di kelurahan Mangasa kecamatan Tamalate kota Makassar.


## C. Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan umum

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan *Syndrome asthenopia* pada usaha pengetikan di kelurahan Mangasa kecamatan Tamalate kota Makassar.

### 2. Tujuan khusus


- a) Untuk mengetahui hubungan antara umur dengan *syndrome asthenopia* pada usaha pengetikan di kelurahan Mangasa kecamatan Tamalate kota Makassar
- b) Untuk mengetahui hubungan antara lama kerja dengan *Syndrome asthenopia* pada usaha pengetikan di kelurahan Mangasa kecamatan Tamalate kota Makassar.
- c) Untuk mengetahui hubungan masa kerja dengan *Syndrome asthenopia* pada usaha pengetikan di kelurahan Mangasa kecamatan Tamalate kota Makassar.



- d) Untuk mengetahui hubungan jarak pandang ke layar monitor dengan *Syndrome asthenopia* pada usaha pengetikan di kelurahan Mangasa kecamatan Tamalate kota Makassar.
- e) Untuk mengetahui hubungan pencahayaan dengan *Syndrome asthenopia* pada usaha pengetikan di kelurahan Mangasa, kecamatan Tamalate, kota Makassar.
- f) Untuk mengetahui hubungan posisi duduk dengan *syndrome asthenopia* pada usaha pengetikan di kelurahan Mangasa, kecamatan Tamalate, kota Makassar.
- g) Untuk mengetahui hubungan sikap duduk dengan *Syndrome asthenopia* pada usaha pengetikan di kelurahan Mangasa kecamatan Tamalate kota Makassar.

#### **D. Manfaat Penelitian**


1. Bagi Peneliti:  
Sebagai wahana bagi peneliti untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuan dibidang kesehatan.
2. Bagi Institusi:  
Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pustaka bagi institusi UIN Alauddin Makassar.
3. Bagi Masyarakat:  
Penelitian diharapkan menjadi sumber informasi tentang penggunaan komputer.



4. Bagi Pengusaha pengetikan:

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi mengenai penggunaan komputer.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA


#### A. Tinjauan Umum Tentang Mata

Mata merupakan indra pengelihatan pada manusia. Mata dibentuk untuk menerima rangsangan berkas-berkas cahaya pada retina, selanjutnya dengan perantaraan serabut-serabut nervus optikus, mengalihkan rangsangan ini ke pusat penglihatan pada otak untuk ditafsirkan (Cahyono, 2005:6).

Mata merupakan salah satu organ tubuh yang amat vital bagi manusia. Karena nilai kepentingannya yang besar bagi manusia maka harus selalu dijaga dan dicegah dari hal-hal yang dapat merusaknya. Otot siliaris dan lensa mata yang merupakan bagian dari organ mata memegang peranan penting dalam sistem akomodasi mata. Gangguan pada sistem akomodasi mata dapat menurunkan kemampuan akomodasi mata. Penurunan kemampuan akomodasi dipengaruhi oleh kelelahan pada mata oleh radiasi yang diserap oleh mata.

##### 1. Anatomi mata

Mata diproteksi oleh tulang rongga mata, alis dan bulu mata, kelopak mata, refleks mengedip, sel-sel pada permukaan kornea dan konjungtiva (selaput lendir yang melapisi permukaan dalam kelopak mata) serta air mata. Air mata berfungsi memperbaiki tajam penglihatan, membersihkan kotoran yang masuk ke mata, *lubrikasi* (pelumasan), media transpor bagi oksigen dari atmosfer, nutrisi



(glukosa, elektrolit, enzim protein), serta mengandung antibakteri dan antibodi.

Menurut Ilyas (2009: 1) mata terdiri atas enam bagian, yaitu:


a. Kelopak mata (*palpebra*)

Kelopak mata berfungsi untuk melindungi bola mata terhadap trauma sinar dan proses mengeringnya bola mata akibat kurang berkedip. Kelopak mata juga berperan dalam mengeluarkan sekresi kelenjarnya yang membentuk lapisan air mata di dalam kornea.

b. Bola mata dengan saraf optik (*nervus optikus*)

Bola mata berbentuk bulat bengan panjang maksimal 24 mm. bola mata di bagian depan (kornea) mempunyai kelengkungan yang lebih tajam sehingga terdapat bentuk dengan dua lengkungan yang berbeda. Bola mata dibungkus oleh tiga jaringan, yaitu:

- 1) Sklera merupakan jaringan ikat yang kenyal dan memberikan bentuk pada mata, merupakan bagian terluar yang melindungi bola mata.
- 2) Jaringan *uvea* merupakan jaringan *vascular*. Jaringan *uvea* terdiri atas iris, badan siliar, dan koroid. Pada iris didapatkan pupil yang oleh tiga susunan otot dapat mengatur jumlah sinar masuk kedalam bola mata. Otot dilatator dipersarafi oleh parasimpatis, sedang *flicker* iris dan otot siliar di persarafi oleh parasimpatis. Otot siliar yang terletak di badan siliar mengatur bentuk lensa kebutuhan akomodasi.




- 3) Retina yang terletak paling dalam. Retina merupakan lapisan saraf pada mata, yang terdiri dari sejumlah lapisan serabut, yaitu sel-sel saraf
- c. Rongga *orbitae* (*cavum orbitae*)  
Rongga orbitae adalah rongga yang berisi bola mata yang dibatasi dinding tulang dan berbentk seperti piramida bersisi empat dengan puncak menuju kearah foromen optik. Masin-masing sisi tulang orbitae berbentuk lengkuk seperti buah peer yang megucup kearah apeks dan kanan optik.
- d. Sistem sekresi air mata (Sistem *Lacrimal*)  
Sistem sekresi air mata menjaga agar kornea tetap bersih, lembab dan bebas kuman.
- e. *Conjungtiva*, adalah membran yang menutupi *sclera* dan kelopak mata bagian belakang.
- f. Otot penggerak yang berguna untuk menggerakkan mata.

Ada beberapa fungsi mata yaitu:

- a. Menerima cahaya/ sensasi cahaya.
- b. Membedakan bentuk.
- c. Menerima warna.

## **B. Tinjauan Umum Tentang *Asthenopia***

*Asthenopia* adalah kelelahan *okular* atau ketegangan pada organ *visual* di mana terjadi gangguan pada mata dan sakit kepala sehubungan dengan penggunaan mata secara intensif. Keletihan *visual* menggambarkan seluruh





gejala-gejala yang terjadi sesudah stress berlebih terhadap setiap fungsi mata, diantaranya adalah tegang otot *siliaris* yang berakomodasi saat memandang obyek yang sangat kecil dalam jarak yang sangat dekat (Roestijawati, 2007: 30).

Menurut dr Edi Supiandi Affandi SpM dari Bagian Ilmu Penyakit Mata FKUI mengatakan bahwa *Astenopia* adalah gejala yang diakibatkan oleh upaya berlebihan dari sistem penglihatan yang berada dalam kondisi kurang sempurna untuk memperoleh ketajaman penglihatan. Keluhan penderita antara lain mata terasa kering, mata tak nyaman (kabur, berpasir), iritasi (mata pedih, merah dan mengeluarkan air mata), terasa panas saat dikedipkan, saat membaca di komputer mata terasa cepat lelah (ada perasaan mengantuk), Penglihatan mata terasa buram, ganda, dan kemampuan melihat warna menurun. Gejala itu diikuti sakit kepala, bahu, punggung dan pinggang terasa nyeri (Cahyono, 2005: 11).

Menurut Affandi *asthenopia* atau Kelelahan mata dapat terjadi jika mata fokus kepada objek berjarak dekat, dalam waktu lama. Hal ini disebabkan karena otot-otot mata harus bekerja lebih keras untuk melihat objek yang berjarak sangat dekat, terutama disertai dengan pencahayaan yang menyilaukan dan juga terjadi pada pencahayaan yang kurang dari 300 *lux* (Cahyono, 2005: 11).

Terdapat beberapa gejala *Asthenopia* antara lain (Affandy, 2005: 297-278):

1. Gejala *ocular*, sekitar mata terasa sakit, panas, cepat lelah, mata merah dan teras kering.
2. Gejala *visual*, yaitu gangguan untuk memfokuskan bayangan pada retina. Mata menjadi sensitif terhadap cahaya. Kelelahan ini akan




menyebabkan penglihatan ganda atau kabur dan kemampuan untuk melihat warna menurun.

3. Gejala umum lainnya yang sering dikeluhkan akibat kelelahan mata adalah rasa sakit pada kepala, leher terasa tegang, sakit punggung, dan terasa nyeri pada pinggang.

*Asthenopia* dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan atas faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik.


- a. Faktor intrinsik merupakan faktor yang berasal dari tubuh yang terdiri atas:
  - 1) Faktor okular yaitu kelainan mata berupa *Ametropia* dan *Heteroforia*. *Ametropia* adalah kelainan refraksi terhadap mata kiri dan kanan akan tetapi tidak dikoreksi. *Heteroforia* merupakan kelainan di mana sumbu penglihatan dua mata tidak sejajar sehingga kontraksi otot mata untuk mempertahankan koordinasi bayangan yang diterima dua mata menjadi satu bayangan, lebih sulit. Apabila hal tersebut berlangsung lama, akan terjadi kelelahan mata.
  - 2) Faktor konstitusi adalah faktor yang disebabkan oleh keadaan umum seperti tidak sehat atau kurang tidur.
- b. Faktor ekstrinsik yaitu faktor yang disebabkan oleh lingkungan kerja terdiri atas:
  - 1) Kuantitas iluminasi, cahaya yang berlebih dapat menimbulkan silau, pandangan terganggu, dan menurunnya sensitifitas retina.





- 2) Kualitas iluminasi, meliputi kontraks, sifat cahaya (*flicker*), dan warna. Kontras berlebihan atau kurang, cahaya berkedip atau menimbulkan *flicker*, dan warna-warna terang, akan menyebabkan mata menjadi cepat lelah.
- 3) Ukuran objek yang dilihat, objek yang berukuran kecil memerlukan penglihatan dekat, sehingga membutuhkan kemampuan akomodasi yang lebih besar. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka mata menjadi cepat lelah.
- 4) Waktu kerja yang lama untuk melihat secara terus-menerus pada suatu objek, dapat menimbulkan *Asthenopia* atau kelelahan mata.

Pada penggunaan komputer, *Asthenopia* terjadi akibat mata selalu memusatkan pandangan pada komputer di mana obyek yang dilihat terlalu kecil, kurang terang dan bergerak. Sehingga mata berkonsentrasi kurang berkedip, dan akan menyebabkan penguapan air mata meningkat sehingga mata menjadi kering. Penguapan air mata terjadi karena proses difusi, efek thermal dan konveksi. Proses tersebut tergantung pada uap air di sekitar mata. Pada suhu ruangan 22°C dengan kelembaban 50% terjadi penguapan air mata sebanyak 230 mg/mata/16 jam dari 600 mg/mata/16 jam air mata yang dihasilkan. Pada pekerja pengetikan refleks mengedip berkurang 66% yaitu sekitar 3,6 kali/menit dibanding saat tidak melakukan pekerjaan di depan komputer. Pada keadaan normal mata berkedip 15-20 kali/menit. Penelitian Tsubota et al pada reporter televisi di Jepang menunjukkan adanya penurunan frekuensi mengedip pada reporter televisi karena



aktivitas membaca. Pola mengedip pada reporter ini juga dipengaruhi oleh keadaan studio yang terang dan kering (Cermin Dunia Kedokteran No. 154, ISSN: 0125-913X:32 ).


Penelitian Toda dkk mendapatkan hubungan kuat antara kelelahan mata dengan *dry eye*. Di kelompok dengan keluhan kelelahan mata 51,4% menderita *dry eye*, sedangkan di kelompok *dry eye* 71,3% mengeluh kelelahan pada mata (Cermin Dunia Kedokteran No. 154, ISSN: 0125-913X:32).

### **C. Tinjauan Umum Tentang Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan *Syndrome asthenopia***

#### **1. Umur**

Dengan meningkatnya umur, elastisitas lensa mata akan semakin berkurang sehingga daya akomodasi makin berkurang dan otot-otot semakin sulit dalam menebalkan dan menipiskan mata. Hal ini disebabkan setiap tahun lensa semakin berkurang kelenturannya dan kehilangan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Sebaiknya semakin muda seseorang, kebutuhan cahaya akan lebih sedikit dibandingkan dengan umur yang lebih tua dan kecenderungan mengalami kelelahan mata lebih sedikit. Menurut Guyton (1991:425) menyebutkan bahwa daya akomodasi menurun pada umur 26-36 tahun (Aryanti, 2006:22).

Penurunan kemampuan akomodasi dipengaruhi oleh kelelahan pada mata dan radiasi yang diserap oleh mata. Penurunan kemampuan akomodasi pada mata dapat memperlemah mata memfokuskan bayangan pada retina. Kemampuan akomodasi menurut Helmholtz (1989) dalam




Murtopo dan Sarimurni (2005:154) adalah: “Lensa mata bersifat elastis. Lensa mata bila dalam keadaan normal bentuknya agak pipih dan kaku oleh karena pengaruh dari *ligamentum suspensorium lentis* (*zonula zin*). Bila terjadi akomodasi maka otot siliaris akan berkontraksi sehingga *zonula zin* kendor, lensa bertambah tebal, diameter lensa berkurang serta lensa bertambah cembung” (Murtopo dan Sarimurni, 2005:154).

Menurut Borish Irvin (1970) dalam Murtopo dan Sarimurni (2005:154), Kemampuan akomodasi semakin menurun seiring dengan bertambahnya umur. Dengan pertambahan umur maka akan terbentuk serabut-serabut lamel secara terus menerus sehingga lensa bertambah besar dan berkurang elastisitasnya. Hal ini menyebabkan sifat kecembungan lensa semakin menurun pula. Penurunan kecembungan lensa menyebabkan berkurangnya ketegangan pada *zonula zin* yang diakibatkan oleh kontraksi otot siliar yang terdapat dibadan siliar semakin lemah. Kontraksi otot siliar yang semakin lemah berarti kemampuan akomodasi juga semakin menurun. (Murtopo dan Sarimurni, 2005:154).

## 2. Masa Kerja

Masa kerja adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu kegiatan yang bertujuan mendapatkan hasil. Aktifitas pekerjaan yang memaksa pekerja untuk berposisi menetap dalam jangka waktu yang lama yang dihitung dalam tahun, baik posisi duduk atau berdiri dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Tetapi seringkali orang mengabaikan tentang pentingnya menciptakan kondisi lingkungan kerja dan



posisi pekerja selama melakukan aktifitas pekerjaannya agar kondusif sehingga dapat menghindari atau memperkecil timbulnya penyakit akibat pekerjaan (Roestijawati, 2007: 32)..

Bekerja dengan Jarak pandang ke layar monitor, intensitas pencahayaan, posisi dan sikap duduk yang tidak memenuhi syarat dalam jangka waktu yang lama sewaktu melakukan pekerjaan akan berpotensi menimbulkan suatu kelainan atau penyakit. Salah satu penyakit yang timbul berhubungan dengan pekerjaan adalah *Asthenopia*. *Asthenopia* yang terjadi terus menerus setiap hari dalam kurun waktu bertahun-tahun akan berakibat buruk.

Silau akibat cahaya yang dipancarkan dari komputer atau merupakan pantulan dari pencahayaan sekitar tempat kerja yang berlangsung terus menerus dalam waktu yang lama dapat menimbulkan mata kering. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sommer dkk, untuk mengetahui mekanisme adaptasi air mata pada pengguna komputer di mana prevalensi *dry eye* meningkat hingga 48% dan terjadi penurunan *break up time* (BUT) 17,5% pada pekerja dengan masa kerja 2-4 tahun dibanding pekerja dengan masa kerja di bawah dua tahun dan di atas empat tahun. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara faktor masa kerja di lingkungan yang sama dengan *dry eye* dan hasil pemeriksaan BUT. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana mata kering merupakan gejala dari *Asthenopia* (Roestijawati, 2007: 32).




### 3. Lama Kerja

Pengaturan jam kerja pada tenaga kerja sangat penting diperhatikan. Di Indonesia telah ditentukan jam kerja selama 8 jam per hari, adalah kerja ideal bagi tenaga kerja. Melampaui dari 8 jam sudah di katakan sebagai kerja lembur. Banyak tenaga kerja yang bekerja lembur untuk mengejar target dari setiap produsen. Beberapa penelitian pada pekerja lembur ditemukan bahwa kerja lembur dapat menurunkan efisiensi dan produktivitas kerja serta meningkatkan angka kecelakaan dan sakit. Waktu kerja bagi seorang tenaga kerja menentukan efisiensi dan produktivitasnya (Anies,2005: 18).

Hal-hal terpenting bagi persoalan waktu kerja meliputi (Aryanti, 2006:25):

- a. Lamanya seseorang mampu kerja secara baik,
- b. Hubungan diantara waktu kerja dan istirahat,
- c. Waktu diantara sehari menurut periode yang meliputi siang dan malam

Secara lebih luas, pembagian waktu kerja dan istirahat lazimnya adalah bekerja pada waktu siang dan istirahat di malam harinya. Setelah pada siang harinya bekerja selama kurang lebih delapan jam individu akan mengalami kepenatan, maka pada malam harinya diupayakan untuk melakukan pemulihan tenaga agar keesokan harinya dapat bekerja kembali secara bugar. Seperti yang telah terjadi, pada tenaga kerja pengetikan menggunakan waktu kerja yang tidak sesuai seperti yang telah dijelaskan.




Lamanya tenaga kerja bekerja sehari secara baik umumnya 8 jam dan sisanya dipergunakan untuk kehidupan dalam keluarga dan masyarakat, istirahat, tidur dan lain-lain. Memperpanjang waktu kerja lebih dari kemampuan tersebut biasanya disertai efisiensi yang tinggi, bahkan biasanya terlihat penurunan produktivitas yang tinggi, bahkan biasanya terlihat penurunan produktivitas serta kecenderungan untuk timbul kelelahan, penyakit dan kecelakaan kerja.

Berbagai gejala yang timbul pada pekerja komputer yang bekerja dalam waktu lama sehingga intensitas berkedip pada mata pengguna komputer lebih sedikit dibandingkan pada saat tidak menggunakan komputer (dalam keadaan normal).

Menurut Myers (1956) waktu istirahat memiliki efek yang positif pada pekerjaan yang bersifat berulang dan monoton serta pekerjaan yang memerlukan sikap duduk atau berdiri dalam waktu lama. Istirahat yang tepat dapat dilakukan selama 10 menit pada pagi dan sore hari. Pada pekerjaan yang membutuhkan kemampuan mental misalnya, istirahat dapat dilakukan selama dua menit setelah 40 menit bekerja untuk pekerjaan yang membutuhkan waktu satu jam atau lima menit istirahat setelah 80 menit bekerja untuk pekerjaan yang membutuhkan waktu dua jam (Zuhriyah, 2007:29).

Penggunaan energi harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan energi (untuk bekerja) dengan penggantian kembali sejumlah energi yang telah digunakan (istirahat). Kedua proses tersebut merupakan




suatu bagian integral dari kerja otot, kerja jantung dan keseluruhan fungsi biologis tubuh. Dengan demikian jelas bahwa untuk memelihara performansi dan efisiensi kerja, waktu istirahat harus diberikan secukupnya, baik diantara waktu kerja maupun di luar jam kerja (istirahat pada malam hari).

#### **4. Jarak pandang ke Layar Monitor Komputer**

Seperti halnya dengan layar televisi, monitor komputer juga berpengaruh terhadap kesehatan penglihatan. Disebabkan oleh dekatnya jarak antara mata dengan layar monitor komputer, dapat dikatakan bahwa bahaya radiasi terhadap mata lebih besar jika dibandingkan dengan layar televisi. Hal ini dapat dimengerti karena pada umumnya jarak mata dengan layar televisi biasanya lebih jauh jika dibandingkan dengan jarak mata seorang yang bekerja dengan layar monitor komputer.

Radiasi yang timbul pada layar monitor komputer sebagai efek penembakan elektron pada tabung hampa udara mempunyai dampak yang besar terhadap penglihatan kita. Ini dikarenakan oleh elektron yang keluar dari monitor dapat menimbulkan medan magnet dan medan listrik dan dapat mengganggu prosedur kerja syaraf. Karena sebagai mana yang kita ketahui bahwa tidak semua elektron-elektron itu dapat ditahan oleh lapisan fosfor pada monitor komputer.

Menurut Jeffrey Anshell dalam skripsi Hanum (2008:14), karakteristik/layar monitor komputer (VDT) dan kebutuhan bekerja dengan menggunakan komputer dapat memicu timbulnya masalah mata dan




penglihatan antara lain mata terasa kering, mata terasa tak nyaman, iritasi, mata terasa panas, mata sakit, cepat lelah, saat membaca di komputer mata terasa cepat mengantuk. Selain itu, mata akan mengalami penguapan berlebihan sehingga kering jika digunakan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama untuk menatap monitor komputer, menatap televisi atau membaca dengan frekuensi mengedip rendah. Apalagi disertai dengan Pemakaian *Air condition* (AC), udara panas dan kering serta asap rokok saat melakukan pekerjaan dengan menggunakan komputer juga menjadi pemicu untuk terjadinya mata kering. Kekurangan air mata menyebabkan mata kekurangan nutrisi dan oksigen. Sehingga lama kelamaan terjadi gangguan penglihatan yang menetap (Anies, 2005:115).

Penguapan air mata lebih banyak terjadi pada keadaan mata melihat lurus ke depan dibanding dengan keadaan melihat ke bawah. Hal ini disebabkan permukaan mata lebih luas pada saat melihat ke depan. Pengguna VDT lebih banyak menggunakan mata untuk melihat ke depan ke layar *monitor* sehingga lebih banyak terjadi penguapan air mata (Roestijawati, 2007:33).

Air mata merupakan salah satu proteksi mata atau daya pertahanan mata disamping tulang rongga mata, alis dan bula mata, kelopak mata, reflex mengedip, dan adanya sel-sel pada permukaan kornea dan konjungtiva sebagai salah satu alat proteksi.






Terdapat beberapa fungsi air mata, yaitu:

- a. Mempertahankan integritas kornea dan konjungtiva dengan meniadakan ketidakaturan pada sel epitel permukaan guna mempertahankan permukaan kornea agar tetap licin dan rata.
- b. Memasahi dan melindungi permukaan epitel kornea dan konjungtiva yang lembut atau lubrikasi agar gerakan bola mata serta mengedip terasa nyaman dan membersihkan kotoran yang masuk kedalam mata.
- c. Menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan mencegah kemungkinan infeksi karena mengandung anti bakteri termasuk laktoferin, immunoglobulin, lisozim dan betalysin.
- d. Memberi kornea substansi nutrient dan sebagai media ransport produk mikroorganisme ke dan dari sel-sel epitel kornea dan konjungtiva terutama oksigen dan karbon oksida.

Merasa tegang saat membaca di layar monitor akan memicu sakit kepala dan berakibat pada produktifitas kerja. Oleh karena itu posisi monitor sangat penting, jarak pandang minimum antara layar monitor dan kepala tidak kurang dari 40 sampai 70 cm dengan letak bagian tengah layar 10-20 derajat dibawah garis pandang mata (Anies, 2005:116).


Semakin lama mata terpapar dengan radiasi layar komputer maka kemampuan akomodasi mata semakin menurun. Radiasi yang dikeluarkan oleh layar komputer memancarkan radiasi yang dapat diserap oleh mata saat menggunakan komputer. Jumlah dosis radiasi yang diserap oleh mata



tergantung pada lama terpapar radiasi tersebut. Makin lama terpapar radiasi layar komputer maka dosis yang diserap oleh lensa mata akan menyebabkan kekeruhan pada lensa mata dan menurunkan kemampuan akomodasi. Dengan demikian kemampuan akomodasi mata akan semakin menurun bila jumlah tahun dan jumlah jam terpapar radiasi layar komputer per hari semakin besar. Hal tersebut menyebabkan mata menjadi lelah. Jika operator komputer menggunakan lensa kontak, kelelahan mata akan lebih cepat terasa. Karena mata yang dalam keadaan memfokuskan kelayar monitor akan jarang berkedip, sehingga bola mata cepat menjadi kering. Bola mata yang kering menyebabkan timbulnya gesekan antara lensa dan kelopak mata.

Silau akibat cahaya yang dipancarkan dari komputer ataupun merupakan pantulan dari pencahayaan sekitar tempat kerja, sering kali tidak disadari oleh pekerja komputer dan dapat berakibat tidak baik terhadap kesehatan mata. Silau menyebabkan otot-otot mata untuk terus-menerus fokus terhadap tampilan yang ada di monitor komputer. Untuk menghindari silau, selain dengan pengaturan pencahayaan ruangan, dapat digunakan *anti glare screen* (*screen* anti silau).

*Anti glare screen* atau *screen* anti silau, merupakan suatu alat yang dipasang pada monitor untuk mengurangi cahaya yang masuk ke dalam bola mata. *Anti glare screen* dapat mengurangi gejala-gejala yang timbul pada *syndrome asthenopia*. Meskipun *screen* ini belum keseluruhan dapat mencegah *syndrome asthenopia*, pemakaian monitor komputer yang low




radiation juga adalah salah satu cara untuk mengurangi radiasi yang di timbulkan oleh monitor komputer.

## 5. Pencehayaan

Pencehayaan merupakan salah satu faktor penting untuk mendapatkan keadaan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, serta mempunyai kaitan yang sangat erat dengan meningkatnya produktivitas. Untuk dapat melihat dengan baik dan teliti intensitas cahaya yang cukup (Aryanti, 2006:2).

Menurut Peraturan Menteri Perburuhan No.7 tahun 1964 tentang syarat-syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja, yaitu setiap tempat kerja harus mendapatkan penerangan yang cukup untuk melakukan pekerjaan. Selain dari cahaya yang berasal dari layar monitor yang dapat menambah beban pada mata, ada juga cahaya dari sumber lain seperti jendela dan lampu penerangan ruangan yang dapat menimbulkan kesilauan, sehingga akan menambah beban mata. Pada setiap sumber cahaya memiliki fluk cahaya yang dipancarkan ke segala arah. Jika suatu permukaan mendapatkan cahaya, maka dapat dikatakan permukaan itu mendapatkan penerangan (illuminasi) (Suma'mur PK, 1995: 98).

Cahaya yang terlalu terang pada ruang kerja akan membuat silau dan mengganggu penglihatan, dan jika redup bisa merusak mata karena akan sepenuhnya membuat mata bekerja keras untuk melihat lebih jelas benda yang ada didalam layar komputer. Cahaya dari layar monitor juga




dapat menimbulkan kesilauan, selain itu cahaya dari sumber lain seperti jendela akan menambah beban mata.

Intensitas penerangan yang tidak memenuhi standar sesuai dengan peraturan menteri perburuhan (PMP) Nomor 7 Tahun 1964 dapat menimbulkan potensi bahaya pada kesehatan mata. Pencahayaan tempat kerja yang memadai, baik yang alami maupun buatan, memegang peranan yang cukup penting dalam upaya peningkatan kesehatan.

Penerangan untuk membaca dokumen lebih tinggi dari pada penerangan untuk melihat komputer, karena tingkat penerangan yang dianjurkan untuk pekerja dengan komputer tidak dapat berdasarkan satu nilai dan sampai saat ini masih kontroversial. Dalam Peraturan Menteri Perburuhan No.7 tahun 1964 tentang syarat-syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja, dikatakan bahwa dalam ruangan kantor, pencahayaan yang dibutuhkan adalah pencahayaan yang mempunyai kekuatan 300 *lux* (Suma'mur PK, 1995: 100).

Intensitas penerangan merupakan suatu aspek lingkungan fisik yang penting untuk keselamatan kerja. Di tempat kerja diperlukan intensitas penerangan yang cukup untuk dapat melihat dengan baik dan teliti. Intensitas penerangan yang baik ditentukan oleh sifat dan jenis pekerjaan di mana pekerjaan yang teliti memerlukan intensitas penerangan yang lebih besar (Suma'mur PK, 1993:48).


Menurut Suma'mur, Penerangan yang baik memungkinkan tenaga kerja melihat obyek yang dikerjakannya secara jelas, cepat, dan tanpa upaya



yang tidak perlu. Lebih dari itu penerangan yang memadai memberikan kesan pemandangan yang lebih baik dan keadaan yang menyegarkan. Sebaliknya jika lingkungan kerja memiliki penerangan yang buruk dapat berakibat sebagai berikut : kelelahan mata dengan berkurangnya daya dan efisiensi kerja, kelelahan mental, keluhan pegal-pegal di daerah mata, dan sakit kepala di sekitar mata, kerusakan alat penglihatan dan meningkatnya kecelakaan (Aryanti, 2006: 14)

Banyak faktor risiko di lingkungan kerja yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja salah satunya adalah pencahayaan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No.1405 tahun 2002, pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Tingkat pencahayaan lingkungan kerja sebagai berikut (KEPMENKES RI No.1405/Menkes/ SK/XI/02):


- a. Jenis Pekerjaan kasar dan tidak terus – menerus seperti: Ruang penyimpanan & ruang peralatan/instalasi yang memerlukan pekerjaan yang kontinyu memerlukan pencahayaan minimal 100 *lux*.
- b. Jenis Pekerjaan kasar dan terus–menerus seperti: Pekerjaan dengan mesin dan perakitan kasar memerlukan pencahayaan minimal 200 *lux*.
- c. Pekerjaan rutin seperti: Ruang administrasi, ruang kontrol, pekerjaan mesin & perakitan/penyusun memerlukan pencahayaan minimal 300 *lux*.



- d. Pekerjaan agak halus seperti : Pembuatan gambar atau bekerja dengan mesin kantor, pekerjaan pemeriksaan atau pekerjaan dengan mesin memerlukan pencahayaan minimal 500 *lux*.
- e. Pekerjaan halus seperti : Pemilihan warna, pemrosesan teksti, pekerjaan mesin halus & perakitan halus memerlukan pencahayaan minimal 1000 *lux*.
- f. Pekerjaan amat halus seperti : Mengukir dengan tangan, pemeriksaan pekerjaan mesin dan perakitan yang sangat halus memerlukan pencahayaan minimal 1500 *lux* dan tidak menimbulkan bayangan.
- g. Pekerjaan terinci seperti: Pemeriksaan pekerjaan, perakitan sangat halus memerlukan pencahayaan minimal 3000 *lux* dan tidak menimbulkan bayangan.

Keselamatan dan produktivitas tenaga kerja, di tentukan oleh baik tidaknya pencahayaan di lingkungan kerja, yaitu ditentukan oleh kualitas atau tingkat iluminasi yang menyebabkan objek dan sekitarnya terlihat jelas, tetapi juga oleh kualitas dari pencahayaan tersebut diantaranya menyangkut arah dan penyebaran atau distribusi tipe cahaya dan tingkat kesilauan.

Hal tersebut dapat menyebabkan kelelahan pada mata, di mana kelelahan mata tersebut menggambarkan seluruh gejala-gejala yang terjadi sesudah stress berlebih terhadap setiap fungsi mata, diantaranya adalah tegang otot siliaris yang berakomodasi saat memandang objek yang sangat kecil dalam jarak dekat.





Penerangan ruang kerja yang kurang dapat mengakibatkan kelelahan mata, akan tetapi penerangan yang terlalu kuat dapat menyebabkan kesilauan. Penerangan yang memadai bisa mencegah terjadinya *Asthenopia* (kelelahan mata) dan mempertinggi kecepatan dan efisien membaca. Penerangan yang kurang bukannya menyebabkan penyakit mata tetapi menimbulkan kelelahan mata (Aryanti, 2006: 36).

## 6. Posisi Duduk

Penyesuaian kerja pada manusia berarti penyesuaian alat dengan lingkungan kerja terhadap manusia atau dalam ilmu keselamatan dan kesehatan kerja disebut dengan ergonomi. Dalam banyak hal, teknologi baru telah menyiapkan alat kerja secara sempurna, untuk menggantikan pekerjaan manusia. Akan tetapi, teknologi baru tersebut juga membawa suatu integrasi yang lebih baik antara manusia dan mesin, misalnya, display digital dan grafik yang lebih mudah dipahami serta kontrol-kontrol yang membutuhkan lebih sedikit usaha daripada sebelumnya (Nurmianto, 2003:65).

Menurut Kroemer (2001), pada posisi duduk berat badan seseorang secara parsial dipotong oleh tempat duduk, tetapi konsumsi energi dan ketegangan saat posisi duduk lebih tinggi dibandingkan posisi berbaring, karena tangan dapat bergerak dengan bebas tetapi ruang gerak sangat terbatas oleh luas tempat duduk. Pada posisi duduk santai lumbar akan dibengkokkan pada batasnya sehingga beban dari trunk (bagian tubuh yang terdiri dari kepala, tangan, dan kaki) akan ditopang oleh ikat sendi (ligamen)




bukan oleh otot. Sedangkan pada saat posisi duduk tegak kinerja otot lebih dibutuhkan untuk mengatasi ketegangan pada urat lutut dan menyokong beban dari trunk. Sehingga pada posisi ini ligamen tidak berada di bawah tegangan. Anderson (1974) menemukan bahwa saat seseorang duduk santai, tekanan pada cakram intervertebralis adalah sekitar 40% lebih tinggi dibandingkan pada saat seseorang berdiri. Sehingga posisi duduk santai kinerja otot akan berkurang, tetapi meningkatkan tekanan pada cakram (<http://www.gunadarma.ac.id/>).

Meja dan kursi komputer adalah alat penunjang kerja yang sangat berpengaruh terhadap kenyamanan kerja operator komputer. Kelelahan kerja akan cepat terjadi bila meja dan kursi tidak ergonomi. Meja komputer yang baik adalah meja yang dilengkapi dengan alat sandaran kaki (*foot rest*) dan dibawah meja memberikan ruang gerak bebas bagi kaki. Tinggi meja komputer yang baik adalah sekitar 55-75cm (d disesuaikan dengan ukuran kursinya dan juga disesuaikan dengan tinggi operatornya) (Anies, 2005: 116).

Kursi yang baik digunakan untuk melakukan pekerjaan hendaknya memakai sandaran punggung dan pinggang (Grandjean, 1988). Sebuah kursi yang baik dapat mendukung pekerja dengan posisi kerja yang nyaman dan mempermudah perubahan posisi tubuh yang sering terjadi (OSH, 1998). Menurut Suma' mur (1987), ukuran-ukuran kursi adalah (Sukadewi, 2007).

- a. Tinggi kursi 40 cm – 48 cm (sedikit lebih pendek dari tinggi *poplitea*)
- b. Kedalaman kursi 40 cm (lebih pendek dari jarak *poplitea* – pantat)






- c. Lebar kursi 40 cm – 44 cm (lebih lebar dari lebar pinggul)

## 7. Sikap Duduk

Penyesuaian kerja pada manusia berarti penyesuaian alat dengan lingkungan kerja terhadap manusia atau dalam ilmu keselamatan dan kesehatan kerja disebut dengan ergonomi. Dalam banyak hal, teknologi baru telah menyiapkan alat kerja secara sempurna, untuk menggantikan pekerjaan manusia. Akan tetapi, teknologi baru tersebut juga membawa suatu integrasi yang lebih baik antara manusia dan mesin, misalnya, display digital dan grafik yang lebih mudah dipahami serta kontrol-kontrol yang membutuhkan lebih sedikit usaha daripada sebelumnya (Nurmianto, 2003:65).

Ergonomi memberikan peranan penting dalam meningkatkan faktor keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam melakukan suatu pekerjaan, tenaga kerja memerlukan keselarasan antara kemampuan tubuh dan pekerjaan. Sikap tubuh dalam melakukan pekerjaan sangat dipengaruhi bentuk, susunan, ukuran dan tata letak peralatan, penempatan alat petunjuk, cara memperlakukan peralatan seperti macam gerak, arah dan kekuatan.

Dampak penyesuaian dan penyesuaian alat-alat kerja dan lingkungan kerja pada kesanggupan dan kemampuan tenaga kerja, akan menimbulkan suasana kerja yang nyaman, lebih cepat letih, produktifitas meningkatkan secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebaliknya, tata kerja yang tidak ergonomi akan menimbulkan kelelahan lebih cepat, menurunkan



daya konsentrasi tenaga kerja dan memperburuk koordinasi gerakan-gerakan, menimbulkan gemetar dan menurunkan kekuatan otot.

Menurut Kroemer dan Grandjean (1997), mengatakan bahwa dari sudut otot, sikap duduk yang paling baik adalah sedikit membungkuk. Namun dari sudut pandang tulang lebih baik tegak, agar punggung tidak bungkuk dan otot perut tidak lemas. Untuk itu, dalam melakukan suatu pekerjaan dianjurkan memiliki sikap duduk yang tegak, diselingi istirahat dengan sedikit membungkuk (<http://www.gunadarma.ac.id>). Arah penglihatan untuk pekerja yang berdiri adalah  $23 - 37^{\circ}$  ke bawah, sedangkan untuk pekerja duduk  $32 - 44^{\circ}$  ke bawah. Arah penglihatan ini sesuai dengan sikap kepala yang istirahat, sehingga tidak mudah lelah (Anies, 2005:16).

Kursi yang baik adalah kursi yang dapat mengikuti lekuk punggung dan sandarannya (*back rest*) serta tingginya dapat diatur. Mengoperasikan komputer dalam waktu lama dengan tidak memperhatikan ergonomi akan menyebabkan kelelahan pada punggung, pinggang dan vertigo.


Duduk memerlukan lebih sedikit energi dari pada berdiri, karena hal itu dapat mengurangi banyaknya beban otot statis pada kaki. Seorang operator yang bekerja sambil duduk memerlukan sedikit istirahat dan secara potensial lebih produktif. Disamping itu operator juga lebih kuat bekerja oleh karena itu lebih cekatan mahir (Nurmianto, 2003:60).


Sikap tubuh dalam bekerja berhubungan dengan tempat duduk, meja kerja, dan luas pandangan. Untuk merencanakan tempat kerja dan perlengkapannya diperlukan ukuran-ukuran tubuh yang menjamin sikap

tubuh paling alamiah dan memungkinkan dilakukannya gerakan-gerakan yang dibutuhkan.

Sikap duduk dalam bekerja sangatlah mempengaruhi kemampuan kita untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jangan duduk, berdiri, membungkuk, dan jongkok terus menerus karena kurang baik bagi kesehatan. Saat duduk usahakan agar tulang punggung tidak melengkung, sehingga dada tidak terlipat. Gunakan kursi yang paling tepat tingginya dengan meja kerja bila bekerja lama (Astrini, 2004).

Berikut adalah posisi dan sikap duduk pada stasiun kerja yang ergonomi untuk bekerja di depan komputer dan pencahayaan diatur agar tidak menimbulkan efek silau pada mata maupun layar monitor





#### D. Pandangan Islam Mengenai *Asthenopia*

Mata merupakan bagian dari panca indera yang sangat penting dibandingkan indera lain. Para ahli mengatakan, jalur utama informasi 80% melalui mata. oleh sebab itu dikatakan mata sangat penting untuk dijaga. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl/16:78


وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ  
وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

#### Terjemahnya:

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

Ayat di atas memaparkan ketika Allah mengeluarkan manusia dari perut ibu-ibunya, manusia dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun yang ada disekeliling manusia dan memberikan manusia penglihatan, pendengaran, dan mata hati sebagai bekal dan alat-alat untuk meraih pengetahuan agar kita sebagai manusia dapat bersyukur dengan menggunakan alat-alat tersebut sesuai dengan tujuan Allah menganugerahkan kepada kita.

Ayat di atas sangat jelas bahwa kita sebagai manusia ciptaan Allah harus bersyukur dengan panca indera yang kita punya dalam hal ini mata. Mata sangat penting bagi manusia, karena tanpa mata manusia tidak akan dapat melihat ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Allah menciptakan mata dan panca indera yang lain, agar manusia dapat bersyukur.



Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Isra'/15: 36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ  
مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

### Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.


Ayat ini termasuk sendi budi pekerti muslim yang hendak menegakkan peribadinya. Kita dilarang Allah menurut saja. “Nurut” menurut bahasa jawa, dengan tidak menyelidiki sebab dan musabab.

Qatadah menafsirkan kelemahan pribadi pak Turut itu demikian: “jangan engkau katakana aku lihat, padahal engkau tak melihatnya. Aku dengar, padahal tak pernah engkau dengar. saya tahu, padahal engkau tak tahu.”

Di awal ayat ini tersebut “*wa laa taqfu*”: kata-kata *taqfu* ialah dari mengikuti *jejak*. Ke mana orang pergi ke sana *awak* pergi. Ke mana tujuan orang itu *awak* tak tahu.

Di ujung ayat ditegaskan: “sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati, tiap-tiap satu dari padanya itu akan ditanya.” (ujung ayat 36).

Terang disini bahwa orang yang hanya menuruti saja jejak langkah orang lain, baik nenek-moyangnya karena kebiasaan, adat-istiadat dan tradisi yang diterima, atau keputusan dan *ta'ashshub* pada golongan membuat orang tidak lagi mempergunakan pertimbangan sendiri. Padahal dia diberi Allah alat-alat penting agar dia berhubungan dengan alam yang ada di sekelilingnya. Dia diberi hati, atau akal, atau fikiran untuk menimbang buruk dan baik. Sedang pendengaran dan




penglihatan adalah penghubung diantara diri, atau diantara hati sanubari kita dengan segala sesuatu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan mudharat dan manfaatnya, atau buruk dan baiknya.

Dalam hidup beragama amat diperlukan penggunaan pendengaran, penglihatan dan hati bagi menimbang. Sebab kadang-kadang dipercampuradukkan orang amalan yang *sunnah* dengan yang *bid'ah*. Bahkan kerap kali kejadian perkara yang sunnah tertimbun dan yang bid'ah muncul dan lebih masyur. Maka wajiblah kita beragama dengan berilmu.



Memang, orang yang masih belum banyak peralatan tentu akan menurut saja kepada yang lebih pandai. Tetapi sekedar pokok-pokok dalam agama mestilah dipelajari dan ditanyakan kepada yang lebih pandai.

Allah memberi manusia alat-alat indera, agar manusia bisa berhubungan dengan alam dan seisinya. Mata adalah salah satu alat penghubung di antara diri manusia, atau di antara hati sanubari manusia dengan segala sesuatu untuk diperhatikan dan dipertibangkan mudharat dan manfaatnya, atau buruk dan baiknya.

Manusia ketika hilang matanya, maka hilanglah jendela dunianya, dan manusia pun hidup dalam kegelapan sepanjang waktu, tidak bisa melihat apa-apa. Pandangan Islam tentang *Asthenopia* pada tenaga kerja yang menggunakan komputer dengan pandangan kedokteran adalah tidak baik, sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa sesungguhnya tubuh mempunyai hak yang harus dijaga, dan sesungguhnya mata pun demikian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



## BAB III

### KERANGKA KONSEP

#### A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti

Menurut dr. Edi Supiandi Affandi Sp.M. dari Bagian Ilmu Penyakit Mata FKUI mengatakan bahwa *Astenopia* adalah gejala yang diakibatkan oleh upaya berlebihan dari sistem penglihatan yang berada dalam kondisi kurang sempurna untuk memperoleh ketajaman penglihatan (Cahyono, 2005: 11).

*Astenopia* yang dialami oleh operator komputer dipengaruhi oleh faktor jarak layar monitor, lama kerja, posisi dan sikap (ergonomi) operator dan pencahayaan ruang kerja. Masing-masing variabel tersebut diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Umur

Semakin tua seseorang, lensa semakin kehilangan kekenyalan sehingga daya akomodasi makin berkurang dan otot-otot semakin sulit dalam menebalkan dan menipiskan mata. Hal ini disebabkan setiap tahun lensa semakin berkurang kelenturannya dan kehilangan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Sebaiknya semakin muda seseorang, kebutuhan cahaya akan lebih sedikit dibandingkan dengan umur yang lebih tua dan kecenderungan mengalami kelelahan mata lebih sedikit. Menurut Guyton





(1991:425) menyebutkan bahwa daya akomodasi menurun pada umur 30 tahun (Aryanti, 2006:22).

## 2. Masa kerja

Masa kerja juga mempengaruhi kejadian *Asthenopia*. Lamanya seorang pengetik melakukan pekerjaannya secara berulang-ulang dan dalam waktu bertahun-tahun akan menyebabkan kelelahan cepat terjadi.

## 3. Lama kerja

Lamanya seseorang bekerja dalam sehari yang dianggap ideal adalah 8 jam perhari atau 40 jam perminggu. Semakin lama seorang terpapar dengan komputer maka akan menambah resiko terjadinya gangguan kesehatan. Operator komputer yang bekerja 8 jam perhari terus menerus tetap aman terhadap kemungkinan bahaya radiasi sinar X yang mungkin timbul dari tabung layar monitor. Namun akan terjadi bahaya sekitar 30.000 kali penggantian arah pandangan kelopak mata. Memperpanjang waktu kerja lebih dari 8 jam dan tidak disertai dengan efisiensi yang tinggi, akan dapat meningkatkan potensi bahaya pada mata. Pandangan yang kaku pada lembaran kaca dapat mengurangi keseringan kedipan mata dan akan berakibat terkena sicca- syndrome, yakni selaput tanduk mengering hingga mencapai kebutaan.

## 4. Jarak pandang ke layar monitor

Jarak ideal antara mata dengan layar monitor adalah jarak yang memungkinkan mata terhindar dari risiko *syndrome asthenopia*. Jarak ideal



mata dengan layar monitor 40-70 cm, dengan letak bagian tengah layar 10-20 derajat (5-6 inci) di bawah garis pandang mata. Hal tersebut disebabkan jika mata sangat dekat dengan layar monitor, dimungkinkan jumlah kedipan akan berkurang sehingga mata menjadi kering dan lelah.

#### 5. Pencahayaan ruang kerja


Banyak faktor risiko di lingkungan kerja yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja salah satunya adalah pencahayaan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No.1405 tahun 2002, pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Pada ruang administrasi, ruang kontrol, pekerjaan mesin dan praktikan/ penyusunan Tingkat pencahayaan pada lingkungan kerja yang jenis pekerjaannya rutin dilakukan yaitu 300 *lux* (KEPMENKES RI. No. 1405/MENKES/SK/XI/02).

#### 6. Posisi Duduk

Posisi duduk yang tidak sesuai dan menetap dalam jangka waktu yang lama sewaktu melakukan pekerjaan akan berpotensi menimbulkan suatu kelainan atau penyakit.

#### 7. Sikap Duduk


Sikap duduk dalam bekerja sangat mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan. Duduk memerlukan lebih sedikit energi dari pada berdiri, karena dapat mengurangi beban otot statis pada kaki. Sikap duduk




yang keliru akan menyebabkan masalah seperti ada tekanan terhadap urat dan saraf tangan, pergelangan tangan, lengan dan pundak, serta leher terasa tekangang. Posisi monitor komputer ditempatkan sedemikian rupa sehingga pekerja mencapai posisi ergonomis yang baik. Disarankan Postur tubuh harus baik untuk menghindari nyeri otot leher, punggung, bahu, dan kepala. Tinggi ideal meja komputer adalah 55-75 cm yang telah disesuaikan dengan ukuran kursi dan tinggi operator komputer.

### B. Kerangka Konsep

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:




Keterangan:



Variabel independent



Variabel dependent



### C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

#### 1. Gejala-gejala *Asthenopia* (*Syndrome asthenopia*)

Menurut dr. Edi Supiandi Affandi, Sp. M. dari Bagian Ilmu Penyakit Mata FKUI, menyatakan bahwa *Asthenopia* adalah gejala yang diakibatkan oleh upaya berlebihan dari sistem penglihatan yang berada dalam kondisi kurang sempurna untuk memperoleh ketajaman penglihatan (Cahyono, 2005: 11).

Kriteria Objektif:

- a. Mengalami *syndrome asthenopia* sekitar mata terasa sakit, panas, cepat lelah, perubahan persepsi warna, mata terasa kering, penglihatan ganda dan kabur, serta sakit kepala.

apabila:

- b. Tidak mengalami *syndrome asthenopia* Tidak merasakan lebih dari 3 gejala diantara keseluruhan gejala di atas.

apabila:

*asthenopia*

apabila:

#### 2. Umur

Umur adalah rentan umur responden terkena *Sindrom Asthenopia*. Umur digolongkan menjadi:

- 19-25 tahun
- 26-36 tahun



### 3. Masa kerja

Masa kerja adalah waktu pertama kali responden melakukan pengetikan sampai pada waktu penelitian ini dilakukan yang terhitung dalam bilangan tahun.

Kriteria Objektif:

- a. Baru : < 2 Tahun
- b. Lama : 2 Tahun (Roestijawati, 2007: 32).

### 4. Lama kerja

Lama kerja adalah waktu kerja yang digunakan oleh responden dalam sehari yang dinyatakan dalam jam.

Kriteria Objektif:


- a. Memenuhi syarat bila: Jam kerja tenaga kerja 8 jam perhari atau 40 jam perminggu (Anies, 2005:18).
- b. Tidak memenuhi syarat bila: tenaga kerja bekerja melampaui 8 jam perhari.

### 5. Jarak pandang ke layar monitor

Jarak pandang ke layar monitor adalah jarak mata dengan layar monitor operator komputer pada saat bekerja.

Kriteria Objektif:

- a. Memenuhi syarat Jarak mata dengan layar pandang ke layar apabila: monitor 40-75 cm, dengan letak bagian tengah layar 10-20 derajat (atau 5-6 inci) di bawah



garis pandang mata (Anies, 2005:116).

- b. Tidak memenuhi Jarak mata dengan layar jarak pandang ke layar syarat bila: monitor tidak memenuhi syarat jarak di atas.

## 6. Pencahayaan

Pencahayaan adalah pencahayaan ruang kerja yang digunakan operator pada saat melakukan pengetikan.

Kriteria Objektif:


- a. Memenuhi syarat bila: Pencahayaan ruangan tempat kerja yang memenuhi standar adalah 300 *lux* (Suma'mur 1995: 100).
- b. Tidak memenuhi syarat bila: Pencahayaan ruangan tempat kerja yang tidak memenuhi standar adalah kurang atau lebih dari 300 *lux*.

## 7. Posisi Duduk

Posisi duduk adalah posisi duduk responden ketika bekerja dengan melihat ukuran meja dan kursi meja yang sesuai dengan ukuran tubuh responden.

Kriteria Objektif

- a. Memenuhi syarat bila: Tinggi meja komputer adalah 40-70 cm yang telah disesuaikan dengan ukuran kursi dan tinggi responden (Anies, 2005:116).
- b. Tidak memenuhi syarat bila : tinggi meja komputer tidak mencapai 55-75 cm dan tidak disesuaikan dengan tinggi responden



## 8. Sikap Duduk

Sikap tubuh adalah gambaran posisi tubuh operator dalam melaksanakan pekerjaannya.

Kriteria Objektif:

- a. Memenuhi syarat bila : Sikap duduk dalam melakukan suatu pekerjaan dianjurkan memiliki sikap yang tegak, diselingi istirahat dengan sedikit membungkuk (Nurmianto, 2003: 63).
- b. Tidak memenuhi syarat bila:
- 1). Sikap duduk dalam melakukan suatu pekerjaan memiliki sikap yang membungkuk secara monoton sampai selesai mengetik.

### D. Hipotesis

Berdasarkan masalah yang diajukan dan teori - teori serta kerangka konseptual yang telah diuraikan di depan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

#### 1. Hipotesis Penelitian ( Ha)

Ada hubungan antara umur, masa kerja, lama kerja, jarak pandang ke layar monitor, pencahayaan, posisi duduk dan sikap duduk dengan *syndrome asthenopia* pada pada usaha pengetikan di kelurahan mangasa kecamatan tamalate kota Makassar.



## 2. Hipotesis penelitian (Ho)

Tidak ada hubungan antara umur, masa kerja, lama kerja, jarak pandang ke layar monitor, pencahayaan, posisi duduk, dan sikap duduk dengan *syndrome asthenopia* pada pada usaha pengetikan di kelurahan Mangasa, kecamatan Tamalate, kota Makassar.







## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional *Analitik* dengan rancangan *Cross Sectional study* yaitu suatu rancangan yang mengkaji dinamika asosiasi antara variabel independen (jarak layar monitor, lama kerja, pencahayaan di ruang kerja dan ergonomi) dengan variabel dependen (*Syndrome asthenopia*) dalam waktu yang bersamaan (point time approach) pada usaha pengetikan di kelurahan Mangasa, kecamatan Tamalate, kota Makassar Tahun 2010.

#### B. Waktu dan Lokasi Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-Oktober 2010.


##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kelurahan Mangasa, kecamatan Tamalate, kota Makassar.

#### C. Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua tenaga usaha pengetikan di kelurahan Mangasa kecamatan Tamalate kota Makassar.



## 2. Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah 35 orang pengetik yang berlokasi di kelurahan Mangasa. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *Accidental Sampling* yaitu pengambilan sampel pada responden berdasarkan banyaknya populasi yang ditemukan di tempat oleh peneliti.

### **D. Pengumpulan Data**

#### 1. Data Primer

Diperoleh melalui wawancara, dan observasional langsung pada responden dengan menggunakan kuesioner yang diisi langsung oleh responden, serta pengamatan langsung di Kelurahan Mangasa Makassar Tahun 2010.

#### 2. Data sekunder

Diperoleh dengan melakukan kajian pustaka atau referensi.

### **E. Metode Pengolahan Data**

Data yang terkumpul diolah secara manual dan menggunakan komputer, kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik disertai dengan narasi untuk mendiskripsikan.



## BAB V


### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

Kelurahan Mangasa termasuk dalam wilayah kecamatan Tamalate yang mempunyai luas wilayah 206. 98 ha/m<sup>2</sup> dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 8.675 jiwa dan jumlah penduduk wanita sebanyak 8.798 jiwa dan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 4.123. Adapun batas wilayah kelurahan Mangasa adalah (Monografi kelurahan mangasa, 2010).

1. Sebelah Utara : Kelurahan Gunung Sari
2. Sebelah Timur : Kabupaten Gowa
3. Sebelah Selatan : Kelurahan Gunung Sari
4. Sebelah Barat : Kelurahan Manuruki

Perincian secara umum tenaga kerja yang terdapat pada kelurahan mangasa menurut umur adalah jumlah penduduk laki-laki umur 18-56 tahun sebanyak 3.195 jiwa dan wanita sebanyak 4239 jiwa, jumlah penduduk laki-laki umur 56 tahun keatas sebanyak 826 jiwa dan wanita sebanyak 942 jiwa.



## B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung di lapangan, didapatkan data sebagai berikut:

### 1. Analisis Univariat

#### a. umur

Tabel 5.1  
Frekuensi umur responden

No	Umur (tahun)	Frekuensi	Persentase
1.	19-25	23	65,7
2.	26-36	12	34,4
total		35	100

Sumber: Data primer, 2010

Berdasarkan kategori umur diatas, frekuensi terbanyak terdapat pada umur 19-25 yaitu 23 responden dengan persentase 65,7%, sedangkan frekuensi pada umur 26-36 adalah berjumlah 12 responden dengan persentase 34,4%.


#### b. Masa kerja

Tabel 5.2  
Frekuensi masa kerja responden

No.	Masa kerja (tahun)	Frekuensi	Persentase
1.	<2 tahun	14	40,0
2.	>2 tahun	21	60,0
Total		35	100

Sumber: Data primer, 2010

Berdasarkan kategori masa kerja diatas, frekuensi terbanyak terdapat pada masa kerja >2 tahun yaitu 21 responden dengan persentase 60,0%,



sedangkan frekuensi pada masa kerja <2 tahun adalah berjumlah 14 responden dengan persentase 40,0%.


c. Lama kerja

Tabel 5.3  
Frekuensi lama kerja

No.	Lama kerja (jam)	Frekuensi	Persentase
1.	<8 jam	15	42,9
2.	>8 jam	20	57,1
Total		35	100

Sumber: Data primer, 2010

Berdasarkan kategori lama kerja diatas, frekuensi terbanyak terdapat pada lama kerja >8 jam yaitu 20 responden dengan persentase 42,9%, sedangkan frekuensi pada lama kerja <8 jam adalah berjumlah 15 responden dengan persentase 42,9%.



## 2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dalam penelitian ini meliputi analisa deskriptif data karakteristik responden yang meliputi umur, masa kerja dan lama kerja.

### a. Umur


Tabel 5.1  
Hubungan Umur Responden dengan *Syndrom Asthenopia* pada Usaha Pengetikan di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2010

Umur (tahun)	<i>Syndrome asthenopia</i>				Total		P
	Tidak mengalami		Mengalami gejala		n	%	
	n	%	n	%			
19-25	10	43,5	13	56,5	23	100	0,007
26-36	0	0	12	100	12	100	
Total	10	28,6	25	71,4	35	100	

Sumber: Data primer, 2010

Tabel 5.9 menunjukkan hubungan umur responden dengan *syndrome asthenopia*. Di mana perbandingan umur terhadap kejadian *syndrome asthenopia* menunjukkan bahwa pada umur 26-36 tahun lebih besar proporsi kejadian *syndrome asthenopia* (100%) dibandingkan dengan pada umur 19-25 tahun (56,5%).

Berdasarkan uji chi-square pada taraf signifikan 0,05 diperoleh nilai p sebesar 0,007, di mana nilai  $p < \alpha$  0,05 yang berarti  $H_0$  ditolak. Yang artinya ada hubungan signifikan antara umur dengan *syndrome asthenopia*.



## b. Masa kerja

Tabel 5.2  
 Hubungan Masa Kerja Responden dengan *Syndrom Asthenopia* pada Usaha Pengetikan di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2010

Masa kerja (tahun)	<i>Syndrome asthenopia</i>				Total		P
	Tidak mengalami		Mengalami gejala				
	n	%	n	%	n	%	
Baru (<2 tahun)	10	71,4	4	28,6	14	100	0,000
lama (>2 tahun)	0	0	21	100	21	100	
Total	10	28,6	25	71,4	35	100	

Sumber: Data primer, 2010

Tabel 5.8 menunjukkan hubungan masa kerja dengan *syndrome asthenopia*. Di mana perbandingan masa kerja terhadap *syndrome asthenopia* menunjukkan bahwa pada masa kerja yang sudah lama (<2 tahun) lebih besar proporsi kejadian *syndrome asthenopia* (100%) dibandingkan dengan pada masa kerja yang masih baru (>2 tahun) (28,6%).

Berdasarkan uji *Chi-square* pada taraf signifikan 0,05 diperoleh nilai p sebesar 0,000 di mana nilai  $p < \alpha$  0,05 yang berarti  $H_0$  ditolak. Yang artinya ada hubungan signifikan antara masa kerja dengan *syndrome asthenopia*.



## c. Lama kerja

Tabel 5.3  
 Hubungan Lama Kerja Responden dengan *Syndrom Asthenopia* pada Usaha Pengetikan di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2010


Lama kerja (jam)	<i>Syndrome asthenopia</i>				Total		P
	Tidak mengalami		Mengalami gejala				
	n	%	n	%	n	%	
Memenuhi syarat	8	53,3	7	46,7	15	100	0,008
Tidak memenuhi syarat	2	10,0	18	90,0	20	100	
Total	10	28,6	25	71,4	35	100%	

Sumber: Data primer, 2010

Tabel 5.7 menunjukkan hubungan lama kerja dengan *syndrome asthenopia*. Di mana perbandingan lama kerja terhadap kejadian *syndrome asthenopia* menunjukkan bahwa pada masa kerja yang tidak memenuhi syarat (>8 jam) lebih besar proporsi kejadian *syndrome asthenopia* (90,0%) dibandingkan dengan pada lama kerja yang memenuhi syarat (46,7%).

Berdasarkan uji chi-square pada taraf signifikan 0,05 diperoleh nilai p sebesar 0,008 di mana nilai  $p < \alpha$  0,05 yang berarti  $H_0$  ditolak. Yang artinya ada hubungan signifikan antara lama kerja terhadap *syndrome asthenopia*.





## d. Jarak Pandang ke Layar Monitor

Tabel. 5.4


Hubungan Jarak Pandang ke Layar Monitor Responden dengan *Syndrome asthenopia* pada Usaha Pengetikan di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2010

Jarak pandang ke layar monitor (cm)	<i>Syndrome asthenopia</i>				Total		P
	Tidak mengalami		Mengalami gejala				
	n	%	n	%	n	%	
Memenuhi syarat	9	30,0	21	70,0	30	100	1,000
Tidak memenuhi syarat	1	20,0	4	80,0	5	100	
Total	10	28,6	25	71,4	35	100	

Sumber: Data primer, 2010

Tabel 5.1 menunjukkan hubungan jarak pandang ke layar monitor dengan *syndrome asthenopia*. Di mana perbandingan jarak pandang ke layar monitor terhadap kejadian *syndrome asthenopia* menunjukkan bahwa pada jarak pandang ke layar monitor yang tidak memenuhi syarat lebih besar proporsi kejadian *syndrome asthenopia* (80,0%) dibandingkan dengan pada jarak pandan ke layar monitor yang memenuhi syarat (70,0%).

Berdasarkan uji *Chi-square* pada taraf signifikan 0,05 diperoleh nilai p sebesar 1,000 di mana nilai  $p > \alpha$  0,05 yang berarti  $H_0$  diterima. Yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara jarak pandang ke layar monitor terhadap *syndrome asthenopia*.



## e. Pencahayaan


Tabel. 5.5  
 Hubungan Pencahayaan pada Malam Hari Responden dengan *Syndrom Asthenopia* pada Usaha Pengetikan di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2010

Pencahayaan malam ( <i>lux</i> )	<i>Syndrome asthenopia</i>				Total		P
	Tidak mengalami		Mengalami gejala				
	n	%	n	%	n	%	
Memenuhi syarat (<300 <i>lux</i> )	5	100	0	0	5	100	0,001
Tidak memenuhi syarat (300 <i>lux</i> )	5	16,7	25	83,3	30	100	
Total	10	28,6	25	71,4	35	100	

Sumber: Data primer, 2010

Tabel 5.2. menunjukkan hubungan pencahayaan pada malam hari dengan *syndrome asthenopia*. Di mana perbandingan intensitas pencahayaan yang digunakan responden pada malam hari terhadap kejadian *syndrome asthenopia* menunjukkan bahwa pada intensitas pencahayaan yang digunakan responden pada malam hari yang tidak memenuhi syarat pencahayaan yaitu <300 *lux* lebih besar proporsi kejadian *syndrome asthenopia* (83,3%) dibandingkan dengan pada intensitas pencahayaan yang digunakan yang memenuhi syarat yaitu 300 *lux* dan tidak ada yang mengalami *syndrome asthenopia*

Berdasarkan uji *Chi-square* pada taraf signifikan 0,05 diperoleh nilai p sebesar 0,001, di mana nilai  $p < \alpha$  0,05 yang berarti  $H_0$  ditolak. Yang



artinya ada hubungan yang signifikan antara pencahayaan malam terhadap *syndrome asthenopia*.

Tabel 5.6  
Hubungan Pencahayaan Pagi Responden dengan *Syndrom Asthenopia* pada Usaha Pengetikan di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar Tahun 2010

Pencahayaan pagi ( <i>lux</i> )	<i>Syndrome asthenopia</i>				Total		P
	Tidak mengalami		Mengalami gejala				
	n	%	n	%	n	%	
Memenuhi syarat (>300 <i>lux</i> )	4	100	0	0	4	100	0,004
Tidak memenuhi syarat (300 <i>lux</i> )	6	19,4	25	80,6	31	100	
Total	10	28,6	25	71,4	35	100	

Sumber: Data primer, 2010

Tabel 5.3 menunjukkan hubungan pencahayaan pada pagi hari dengan *syndrome asthenopia*. Di mana perbandingan pencahayaan terhadap kejadian *syndrome asthenopia* menunjukkan bahwa pada intensitas pencahayaan yang digunakan pada pagi hari yang tidak memenuhi syarat yaitu >300 *lux* lebih besar proporsi kejadian *syndrome asthenopia* (80,6%) dibandingkan dengan pada intensitas pencahayaan yang memenuhi syarat yaitu >300 *lux* dan tidak ada yang mengalami *syndrome asthenopia*

Berdasarkan uji chi-square pada taraf signifikan 0,05 diperoleh nilai p sebesar 0,004, di mana nilai  $p < \alpha$  0,05 yang berarti  $H_0$  ditolak. Yang artinya ada hubungan yang signifikan antara pencahayaan pagi terhadap *syndrome asthenopia*.

Tabel 5.7  
 Hubungan Pencahayaan Siang Responden dengan *Syndrom Asthenopia* pada  
 Usaha Pengetikan di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota  
 Makassar Tahun 2010

Pencahayaan siang ( <i>lux</i> )	<i>Syndrome asthenopia</i>				Total		P
	Tidak mengalami		Mengalami gejala				
	n	%	n	%	n	%	
Memenuhi syarat ( $>300\ lux$ )	3	100	0	0	3	100	0,018
Tidak memenuhi syarat ( $300\ lux$ )	7	21,9	25	78,1	32	100	
Total	10	28,6	25	71,4	35	100	

Sumber: Data primer, 2010

Tabel 5.4 menunjukkan hubungan pencahayaan pada siang hari dengan *syndrome asthenopia*. Di mana perbandingan intensitas pencahayaan pada siang hari terhadap kejadian *syndrome asthenopia* menunjukkan bahwa letak intensitas pencahayaan yang digunakan pada siang hari yang memenuhi tidak syarat pencahayaan yaitu  $>300\ lux$  lebih besar proporsi kejadian *syndrome asthenopia* (78,1%) dibandingkan dengan pada intensitas pencahayaan yang tidak memenuhi syarat yaitu  $300\ lux$  dan tidak ada yang mengaami *syndrome asthenopia*.

Berdasarkan uji *Chi-square* pada taraf signifikan 0,05 diperoleh nilai p sebesar 0,018, di mana nilai  $p < \alpha 0,05$  yang berarti  $H_0$  ditolak. Yang artinya ada hubungan yang signifikan antara pencahayaan siang terhadap *syndrome asthenopia*.



## f. Posisi duduk


Tabel 5.5  
Hubungan Posisi Duduk Responden dengan *Syndrom Asthenopia* pada  
Usaha Pengetikan di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota  
Makassar Tahun 2010

Posisi duduk	<i>Syndrome asthenopia</i>				Total		P
	Tidak mengalami		Mengalami gejala				
	n	%	n	%	n	%	
Memenuhi syarat	6	60,0	4	40,0	10	100	0,016
Tidak memenuhi syarat	4	16,0	21	84,0	25	100	
Total	10	28,6	25	71,4	35	100	

Sumber: Data primer, 2010

Tabel 5.5 menunjukkan distribusi responden berdasarkan hubungan posisi duduk dengan *syndrome asthenopia*. Di mana perbandingan posisi duduk terhadap kejadian *syndrome asthenopia* menunjukkan bahwa pada posisi duduk responden saat melakukan pengetikan yang tidak memenuhi syarat lebih besar proporsi kejadian *syndrome asthenopia* (84,0%) dibandingkan dengan pada posisi duduk yang memenuhi syarat (40,0%).

Berdasarkan uji chi-square pada taraf signifikan 0,05 diperoleh nilai p sebesar 0,016 di mana nilai  $p < \alpha$  0,05 yang berarti  $H_0$  diterima. Yang artinya ada hubungan yang signifikan antara posisi duduk terhadap *syndrome asthenopia*.



## g. Sikap Duduk


Tabel 5.6  
Hubungan Sikap Duduk Responden dengan *Syndrom Asthenopia* pada  
Usaha Pengetikan di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota  
Makassar Tahun 2010

Sikap duduk	<i>Syndrome asthenopia</i>				Total		P
	Tidak mengalami		Mengalami gejala				
	n	%	n	%	n	%	
Memenuhi syarat	7	77,8	2	22,2	9	100	0,001
Tidak memenuhi syarat	3	11,5	23	88,5	26	100	
Total	10	28,6	25	71,4	35	100	

Sumber: Data primer, 2010

Tabel 5.6 menunjukkan hubungan sikap duduk dengan *syndrome asthenopia*. Di mana perbandingan sikap duduk responden terhadap kejadian *syndrome asthenopia* menunjukkan bahwa pada sikap duduk yang tidak memenuhi syarat lebih besar proporsi kejadian *syndrome asthenopia* (88,5%) dibandingkan dengan pada sikap duduk yang memenuhi syarat (22,2%).

Berdasarkan uji *chi-square* pada taraf signifikan 0,05 diperoleh nilai p sebesar 0,001 di mana nilai  $p < \alpha$  0,05 yang berarti  $H_0$  ditolak. Yang artinya ada hubungan yang signifikan antara sikap duduk terhadap *syndrome asthenopia*.




## C. PEMBAHASAN

Setelah dilakukan proses pengkajian data dengan berbagai tahap, dan peninjauan terhadap teori-teori yang berkenaan dengan *syndrome asthenopia*, diharapkan dapat ditarik kesimpulan yang mampu menjawab hubungan antara faktor-faktor penyebab terhadap kejadian *syndrome asthenopia*.

### 1. Umur

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa kejadian *syndrome asthenopia* lebih tinggi terdapat pada kelompok umur 26-36 tahun yaitu sebesar 100%. Hasil analisa statistik dengan uji Chi-Square diperoleh nilai  $p = 0,007$  di mana nilai  $p < \alpha 0,05$  yang berarti bahwa ada hubungan yang signifikan antara umur dengan *syndrome asthenopia*.

Menurut Borish Irvin (1970) dalam Murtopo dan Sarimurni (2005:154), Kemampuan akomodasi semakin menurun seiringan dengan bertambahnya umur. Dengan pertambahan umur maka akan terbentuk serabut-serabut lamel secara terus menerus sehingga lensa bertambah besar dan berkurang elastisitasnya. Hal ini menyebabkan sifat kecembungan lensa semakin menurun pula dan disebabkan setiap tahun lensa semakin berkurang kelenturannya dan kehilangan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Hal tersebut dapat menyebabkan lemahnya kemampuan mata untuk memfokuskan bayangan pada retina, karena pada saat berada di depan komputer mata berkonsentrasi kurang berkedip untuk melihat benda yang ada dilayar monitor. Sehingga menyebabkan mata mengalami penguapan air mata yang berlebih dan mata menjadi kering.



Dari analisa ini dapat diketahui bahwa semakin tinggi umur seseorang maka semakin tinggi resiko mengalami *syndrome asthenopia*. Hal ini sesuai dengan penelitian Fityani (2006) didapatkan bahwa umur merupakan faktor yang paling mempengaruhi terjadinya gangguan mata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia >50 lebih berisiko menderita gangguan mata (*asthenopia*) dibanding mereka yang lebih muda. Dan penelitian Mahwati (2006) mengatakan bahwa, besar hubungan antara umur dengan kelelahan mata adalah 0,385 ( $r=0.385$ ).

## 2. Masa kerja

Setelah dilakukan observasi dan wawancara didapatkan bahwa kejadian *syndrome asthenopia* lebih tinggi terdapat pada masa kerja >2 tahun yaitu sebesar 100%. Hasil analisis statistik dengan uji Chi-Square diperoleh nilai  $p=0,000$  di mana  $p < \alpha 0,05$  yang berarti ada hubungan yang signifikan antara masa kerja dengan *syndrome asthenopia*.

Hasil ini dihitung berdasarkan lamanya seorang telah bekerja sebagai pengetik sampai dengan saat penelitian dilakukan. Hal ini bisa menyebabkan masa kerja pengetik hanya dilihat kapan ia mulai melakukan pekerjaan ini sampai dengan saat penelitian tanpa melihat waktu antara sebelum penelitian dilaksanakan. Sehingga terdapat kemungkinan adanya pengetik (responden) yang pernah berhenti dari pekerjaannya yang kemudian bekerja kembali.

Masa kerja adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu kegiatan yang bertujuan mendapatkan hasil. Dari analisa ini dapat






diketahui bahwa aktifitas pekerjaan yang tidak memenuhi standar yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama yang dihitung dalam tahun akan berpotensi menimbulkan suatu kelainan atau penyakit. Salah satu penyakit yang timbul berhubungan dengan pekerjaan ini adalah *Asthenopia*.

Teori Anies (2005:115) yang mengatakan bahwa mata akan mengalami penguapan berlebihan sehingga kering jika digunakan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama (bertahun-tahun) untuk menatap monitor komputer, menatap televisi atau membaca dengan frekuensi kedip rendah. Apalagi disertai dengan pemakaian *Air conditioner* (AC), udara panas dan kering serta asap rokok saat melakukan pekerjaan dengan menggunakan komputer juga menjadi pemicu untuk terjadinya mata kering. Kekurangan air mata menyebabkan mata kekurangan nutrisi dan oksigen. Sehingga lama kelamaan terjadi gangguan penglihatan yang menetap.

Penelitian yang dilakukan oleh Sommer dkk, untuk mengetahui mekanisme adaptasi air mata pada iklim kerja mendapatkan prevalensi *dry eye* meningkat hingga 48% dan terjadi penurunan BUT 17,5% pada pekerja dengan masa kerja 2-4 tahun dibanding pekerja dengan masa kerja di bawah dua tahun dan di atas empat tahun. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara faktor masa kerja di lingkungan yang sama dengan *dry eye* dan hasil pemeriksaan BUT. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *Dry eye* atau mata kering merupakan gejala dari *Asthenopia* (Roestijawati, 2007: 32).




Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahwati (2006) yang mengatakan bahwa, besar hubungan antara masa kerja dengan kelelahan mata adalah 0,0290 ( $r=0,290$ ). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani pada tahun 2005 didapatkan bahwa masa kerja juga merupakan faktor-faktor yang berhubungan kelelahan mata (*asthenopia*) dengan menunjukkan bahwa masa kerja  $>2-4$  tahun lebih berisiko menderita gangguan mata dibanding mereka yang masa kerjanya  $<2-4$  tahun.

### 3. Lama kerja


Setelah dilakukan observasi dan wawancara didapatkan bahwa kejadian bahwa kejadian *syndrome asthenopia* lebih tinggi terjadi pada lama kerja  $>8$  jam yaitu sebesar 90,0%. Hasil analisis statistik dengan uji Chi-Square diperoleh nilai  $p=0,008$  di mana  $p<\alpha 0,05$  yang berarti ada hubungan yang signifikan antara masa kerja dengan *syndrome asthenopia*.

Pada penelitian ini, pada saat dilakukan observasi dan wawancara kepada sejumlah responden rata-rata dari responden melakukan pekerjaannya di atas 8 jam. Selain itu juga terdapat pula responden yang memberikan jawaban lama kerja mereka  $<8$  jam. Hal tersebut dikarenakan usaha pengetikan bagi responden hanya pekerjaan sampingan untuk mengisi waktu luang. Karena sebagian responden juga melakukan aktifitas kuliah. Selain itu ada juga sebagian dari responden masih baru dalam menjalankan usaha pengetikan.



Hasil ini didukung oleh teori Anies (2005) yang mengatakan bahwa lamanya tenaga kerja bekerja sehari secara baik umumnya 8 jam. Memperpanjang waktu kerja lebih dari 8 jam yang disertai dengan efisiensi yang tinggi akan menyebabkan penurunan produktivitas yang tinggi serta kecenderungan untuk timbulnya kelelahan, penyakit dan kecelakaan kerja. Menurut Myers (1956) waktu istirahat memiliki efek yang positif pada pekerjaan yang bersifat berulang dan monoton serta pekerjaan yang memerlukan sikap duduk atau berdiri dalam waktu lama. Istirahat yang tepat dapat dilakukan selama 10 menit pada pagi dan sore hari. Pada pekerjaan yang membutuhkan kemampuan mental misalnya, istirahat dapat dilakukan selama dua menit setelah 40 menit bekerja untuk pekerjaan yang membutuhkan waktu satu jam atau lima menit istirahat setelah 80 menit bekerja untuk pekerjaan yang membutuhkan waktu dua jam (Zuhriyah, 2007:29).

hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Sejati terhadap 40 orang operator komputer di kantor Cabang Perum Pelabuhan III Tanjung Perak Surabaya tahun 2000 ternyata 34 operator mengalami kelelahan mata. Dari 34 operator komputer yang mengalami kelelahan mata itu ternyata 20% bekerja secara aktif antara 2-4 jam sehari sedang 65% bekerja efektif antara 5-8 jam sehari di depan layar komputer.




#### 4. Jarak Pandang ke Layar Monitor

Setelah dilakukan observasi dan wawancara didapatkan bahwa kejadian bahwa kejadian *syndrome asthenopia* lebih tinggi terjadi pada jarak pandang ke layar monitor yang tidak memenuhi syarat yaitu sebesar 80,0%. Hasil analisa statistik dengan uji Chi-Square diperoleh nilai  $p=1,000$  di mana  $p>\alpha 0,05$  yang berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara jarak pandang ke layar monitor dengan *syndrome asthenopia*.

Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan pengukuran pada jarak pandang ke layar komputer saja dan tidak dilakukan pemeriksaan terhadap resolusi monitor yang digunakan oleh pengetik, sedangkan komputer yang digunakan di lokasi penelitian tidak satu jenis dan satu merek dagang. Selain itu pada saat dilakukannya penelitian ini aktivitas responden sebelum bekerja tidak diperhitungkan, seperti perjalanan karyawan dari rumah ke kantor sehingga mempengaruhi pengukuran *syndrome asthenopia*.

Menurut teori Anies (2005) yang mengatakan bahwa, jarak minimum antara layar monitor dan kepala tidak kurang dari 40 sampai 70 cm. karena jarak pandang ke layar monitor yang tidak baik akan menyebabkan bahu terasa tegang saat membaca di layar monitor dan akan memicu sakit kepala serta berakibat pada produktifitas kerja. Oleh karena itu posisi monitor sangat penting. Menurut teori Jeffrey Anshell dalam skripsi Hanum (2008:14), karakteristik/layar monitor komputer (VDT) dan kebutuhan bekerja dengan menggunakan komputer dapat memicu timbulnya masalah mata dan penglihatan antara lain mata terasa kering, mata terasa tak



nyaman, iritasi, mata terasa panas, mata sakit, cepat lelah saat membaca di komputer dan mata terasa cepat mengantuk.


Mata akan mengalami penguapan berlebihan sehingga kering jika digunakan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama untuk menatap monitor komputer, menatap televisi atau membaca dengan frekuensi mengedip rendah. Apalagi disertai dengan Pemakaian *Air condition* (AC), udara panas dan kering serta asap rokok saat melakukan pekerjaan dengan menggunakan komputer juga menjadi pemicu untuk terjadinya mata kering. Kekurangan air mata menyebabkan mata kekurangan nutrisi dan oksigen. Sehingga lama kelamaan terjadi gangguan penglihatan yang menetap.

Penelitian yang dilakukan oleh Herry Putut Cahyono yang mengatakan bahwa setelah dilakukan uji regresi dan diperoleh hasil rata – rata jarak pandang ke monitor komputer para operator 53,24 centimeter. Angka ini masih dalam *range* normal jarak pandang komputer yang baik yaitu 40-70 cm. Dan hubungan antara variabel jarak pandang dan kelelahan mata menunjukkan hubungan yang sangat erat, arah hubungan yang positif menunjukkan akan membuat tingkat kelelahan mata semakin kecil. Dari uji statistik diperoleh kesimpulan variabel kelelahan mata dapat dipengaruhi oleh variabel jarak pandang sebesar 40,9 %.

## 5. Pencahayaan

### a. Cahaya malam

Setelah dilakukan observasi dan wawancara didapatkan bahwa kejadian bahwa kejadian syndrome asthenopia lebih tinggi terjadi



pada intensitas pencahayaan yang tidak memenuhi syarat ( $<300 \text{ lux}$ ) yaitu sebesar 83,3%. Hasil analisis statistik dengan uji Chi-Square diperoleh nilai  $p$  0,001 di mana  $p < \alpha$  0,05 yang berarti ada hubungan yang signifikan antara penggunaan intensitas pencahayaan pada malam hari dengan *syndrome asthenopia*.


b. Cahaya pagi

Setelah dilakukan observasi dan wawancara didapatkan bahwa kejadian bahwa kejadian *syndrome asthenopia* lebih tinggi terjadi pada intensitas pencahayaan yang tidak memenuhi syarat ( $>300 \text{ lux}$ ) yaitu sebesar 80,6%. Hasil analisis statistik dengan uji Chi-Square diperoleh nilai  $p$  0,004 di mana  $p < \alpha$  0,05 yang berarti ada hubungan yang signifikan antara penggunaan intensitas pencahayaan pada pagi hari dengan *syndrome asthenopia*.

c. Cahaya siang


Setelah dilakukan observasi dan wawancara didapatkan bahwa kejadian bahwa kejadian *syndrome asthenopia* lebih tinggi terjadi pada intensitas pencahayaan yang tidak memenuhi syarat ( $>300 \text{ lux}$ ) yaitu sebesar 78,1%. Hasil analisis statistik dengan uji Chi-Square diperoleh nilai  $p$  0,018 di mana  $p < \alpha$  0,05 yang berarti ada hubungan yang signifikan antara penggunaan intensitas pencahayaan pada siang hari dengan *syndrome asthenopia*.

Dari hasil observasi dan pengukuran intensitas pencahayaan yang dilakukan pada tiga waktu dengan menggunakan *lux meter*, didapatkan



bahwa ruangan yang digunakan oleh pengetik di kelurahan Mangasa rata-rata mempunyai karakteristik yang hampir sama, yaitu rata-rata berukuran 3x2 m, sebagian berbentuk ruko-ruko yang berdinding tembok dengan cat berwarna putih, sebagian berdinding kayu dan dalam satu tempat pengetikan dihuni rata-rata 2 orang pengetik. Penataan lampu sebagai sumber pencahayaan buatan tidak rata penempatannya dan rata-rata hanya menggunakan 1 buah lampu sehingga pada saat melakukan pengetikan tidak semua disinari cahaya lampu sehingga pada saat dilakukan pengukuran menyebabkan intensitas pencahayaan yang digunakan dibawah standar pencahayaan yang sudah ditetapkan. Pencahayaan yang berasal dari lampu digunakan hanya pada malam hari. Pada pagi dan siang hari pengetik menggunakan cahaya alami yang berasal dari luar. Pada saat pagi dan siang hari, pencahayaan juga tidak merata dan intensitas pencahayaan melebihi standar pencahayaan yang sudah ditentukan.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No.1405 tahun 2002, pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Dalam Peraturan Menteri Perburuhan No.7 tahun 1964 tentang syarat-syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja, dikatakan bahwa dalam ruangan kantor, pencahayaan yang dibutuhkan adalah pencahayaan yang mempunyai kekuatan 300 *lux* (Suma'mur PK, 1995: 100). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengukuran intensitas pencahayaan dengan menggunakan *lux* meter. Intensitas pencahayaan yang diukur




meliputi intensitas pencahayaan umum dan intensitas pencahayaan lokal. Pengukuran intensitas pencahayaan umum dilakukan dengan cara membagi ruang kerja menjadi beberapa jarak titik satu dengan yang lain sekitar 1 meter yang telah disesuaikan dengan luas ruangan pengetik.

Hasil ini mendukung teori Siswanto (1993:30) yang menyatakan bahwa penerangan yang baik mendukung kesehatan kerja dan memungkinkan tenaga kerja dapat bekerja lebih aman dan nyaman serta memberikan kesan pemandangan yang lebih baik dan lingkungan yang menyegarkan. Apabila penerangan ditempat kerja tidak memadai misalnya pada intensitas penerangan yang jelek (tidak memenuhi standar), maka akan terjadi stress pada alat penglihatan yang intensif pada fungsi tunggal mata. Akibat dari stress yang terus menerus ini akan mengakibatkan terjadinya *syndrome asthenopia*.

Kelelahan mata timbul akibat stress pada otot-otot akomodasi yaitu saat seseorang mengamati subyek berukuran kecil pada jarak dekat, serta dalam waktu yang lama. Dalam kondisi penerangan yang buruk, mata berusaha untuk lebih dekat pada obyek yang diamati. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan usaha akomodasi mata yaitu upaya untuk menambah daya bias lensa dengan kontras otot-otot siliar, menyebabkan penambahan tebal dan kecembungan lensa sehingga bayangan benda pada jarak pada jarak yang berbeda-beda akan terfokus di retina. Pada kondisi demikian otot-otot mata akan bekerja secara terus menerus dan lebih






dipaksakan, ketegangan pada otot akomodasi atau otot siliar makin besar sehingga terjadi kelelahan mata (Siswanto, 1993:27-28).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Aryanti pada tahun 2006 mengatakan bahwa Kelelahan Kerja Berat dengan intensitas cahaya yang tidak sesuai dengan standar banyak mengalami kelelahan mata (*asthenopia*). Mahwati (2006) mengatakan bahwa, besar hubungan antara intensitas pencahayaan dengan kelelahan mata adalah  $-0,44$  ( $r = -0,44$ ).

## 6. Posisi duduk

Setelah dilakukan observasi dan wawancara didapatkan bahwa kejadian bahwa kejadian *syndrome asthenopia* lebih tinggi terjadi pada posisi duduk yang tidak memenuhi syarat (menggunakan tinggi meja komputer  $>40-70$  cm yang tidak disesuaikan ukuran kursi dan tinggi pengetik) yaitu sebesar 84,0%. Hasil analisis statistik dengan uji Chi-Square di peroleh  $p= 0,016$  di mana  $p<\alpha 0,05$  yang berarti ada hubungan yang signifikan antara posisi duduk dengan *syndrome asthenopia*.

Hasil penelitian ini diperoleh berdasarkan pengukuran posisi duduk responden dengan tinggi meja yang digunakan yang telah disesuaikan dengan tinggi pengetik, di mana alat ukur yang digunakan adalah meteran. Pada penelitian ini diketahui bahwa rata-rata kursi yang digunakan responden adalah kursi plastik yang tidak mempunyai sandaran dan lebar tempat duduknya tidak mencapai 40cm serta tinggi kursi tidak disesuaikan dengan tinggi responden.




Menurut Kroemer (2001), pada posisi duduk, berat badan seseorang secara parsial dipotong oleh tempat duduk, tetapi konsumsi energi dan ketegangan saat posisi duduk lebih tinggi dibandingkan posisi berbaring, karena tangan dapat bergerak dengan bebas tetapi ruang gerak sangat terbatas oleh luas tempat duduk. Pada posisi duduk santai lumbar akan dibengkokkan pada batasnya sehingga beban dari *trunk* (bagian tubuh yang terdiri dari kepala, tangan, dan kaki) akan ditopang oleh ikat sendi (ligamen) bukan oleh otot.

Menurut Suma' mur (1987), ukuran-ukuran kursi ditinjau dari aspek posisi duduk yang baik saat melakukan pengetikan adalah disesuaikan dengan tinggi meja komputer, yakni sekitar 40-70 cm (Sukadewi, 2007).

Menurut Grandjean (1988) mengatakan bahwa Kursi yang baik digunakan untuk melakukan pekerjaan hendaknya memakai sandaran punggung dan pinggang. Sebuah kursi yang baik dapat mendukung pekerja dengan posisi kerja yang nyaman dan mempermudah perubahan posisi tubuh yang sering terjadi (OSH, 1998).

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh wulan (2006) yang mengatakan bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap 120 orang sebagai operator di rumah sakit umum lampung tengah menunjukkan hasil pada posisi duduk baik 27/65 (41,5%) mengalami *syndrome asthenopia*, sedangkan pada posisi tidak baik 11/12 (91,7%), dengan  $p=0,011$  dan risiko 15,481 kali.




## 7. Sikap duduk

Setelah dilakukan observasi dan wawancara didapatkan bahwa kejadian bahwa kejadian *syndrome asthenopia* lebih tinggi terjadi pada sikap duduk yang tidak memenuhi syarat (membungkuk terus menerus sampai selesai melakukan pengetikan) yaitu sebesar 88,5. Hasil analisis statistik dengan uji Chi-Square di peroleh nilai  $p= 0,001$  di mana  $p<\alpha 0,05$  yang berarti ada hubungan yang signifikan antara duduk dengan *syndrome asthenopia*.


Menurut teori Kroemer dan Grandjean (1997), yang mengatakan bahwa dari sudut otot, sikap duduk yang paling baik adalah sedikit membungkuk. Namun dari sudut pandang tulang, sikap duduk lebih baik tegak agar punggung tidak bungkuk dan otot perut tidak lemas. Untuk itu dalam melakukan suatu pekerjaan dianjurkan memiliki sikap duduk yang tegak, diselingi istirahat dengan sedikit membungkuk (<http://www.Gunadarma.ac.id>).

Penelitian ini mendukung Penelitian yang dilakukan oleh Setyaningsih (2002) yang mengatakan bahwa setelah dilakukan penelitian sebanyak 32 sampel didapatkan ada hubungan yang bermakna antara *syndrome asthenopia* dengan sikap duduk dengan nilai  $p=0,018$ .



### **Keterbatasan Peneliti**

1. Aktivitas responden sebelum bekerja tidak diperhitungkan, seperti perjalanan karyawan dari rumah ke kantor, sehingga mempengaruhi pengukuran *syndrome asthenopia*.
2. Tidak dilakukannya pemeriksaan terhadap resolusi monitor yang digunakan oleh pengetik, sedangkan komputer yang digunakan di lokasi penelitian tidak satu jenis dan satu merek dagang.
3. Tidak dilakukannya pemeriksaan medis terhadap kesehatan pengetik sebelum penelitian ini dilakukan, sehingga tidak diketahui adanya penyakit mata yang diderita responden yang bukan merupakan *syndrome asthenopia*.




## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian data yang diperoleh di lapangan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada hubungan antara umur dengan *syndrome asthenopia* pada usaha pengetikan di kelurahan Mangasa kecamatan Tamalate kota Makassar pada  $p=0,007$  ( $p < \alpha 0,05$ ).
2. Ada hubungan antara masa kerja dengan *syndrome asthenopia* pada usaha pengetikan di kelurahan Mangasa kecamatan Tamalate kota Makassar pada  $p=0,000$  ( $p < \alpha 0,05$ ).
3. Ada hubungan antara lama kerja dengan *syndrome asthenopia* pada usaha pengetikan di kelurahan Mangasa kecamatan Tamalate kota Makassar pada  $p=0,008$  ( $p < \alpha 0,05$ ).
4. Tidak ada hubungan antara jarak pandang ke layar monitor dengan *syndrome asthenopia* pada usaha pengetikan di kelurahan Mangasa kecamatan Tamalate kota Makassar pada  $p=1,000$  ( $p > \alpha 0,05$ ).
5. Ada hubungan antara pencahayaan dengan *syndrome asthenopia* pada usaha pengetikan di kelurahan Mangasa kecamatan Tamalate kota Makassar pada malam hari  $p=0,001$ , pagi hari  $p=0,004$  dan siang hari  $p=0,018$  ( $p < \alpha 0,05$ ).




6. Ada hubungan antara posisi duduk dengan *syndrome asthenopia* pada usaha pengetikan di kelurahan Mangasa kecamatan Tamalate kota Makassar pada  $p=0,016$  ( $p < \alpha 0,05$ ).
7. Ada hubungan antara sikap duduk dengan *syndrome asthenopia* pada usaha pengetikan di kelurahan Mangasa kecamatan Tamalate kota Makassar pada  $p=0,001$  ( $p < \alpha 0,05$ ).

## B. Saran

Berdasarkan hasil studi, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan instansi pemerintah dapat memberikan sosialisasi kepada pengusaha pengetikan tentang penggunaan komputer yang aman.
2. Pemerintah setempat, khususnya pemerintah kota Makassar diharapkan adanya regulasi tentang izin usaha yang mengacu pada keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Pengusaha pengetikan/pengguna komputer diharapkan memiliki kesadaran tentang potensi bahaya penggunaan komputer yang tidak memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja.



## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Edi S Sindrom Penglihatan Komputer (*Computer Vision Syndrome*) <http://mki.idionline.org>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2010.
- Anis. 2005. *Penyakit Akibat Kerja*. Jakarta. PT Elex Media Komputindo.
- Aryanti, Riski Cahya, 2006. *Hubungan Antara Intensitas Penerangan dan Suhu Udara dengan Kelelahan Mata Karyawan Pada Bagian Administrasi di PT. Utama karya Wilayah IV Semarang*. <http://digilib.unnes.ac.id>. Diakses pada Tanggal 30 Mei 2010.
- Cahyono, Herry Putut, 2005. *Hubungan Penerangan dan Jarak Pandang ke Layar Monitor Komputer dengan Tingkat Kelelahan Mata Petugas Operator Komputer Sistem Informasi RSO Prof. Dr. R Soeharso Surakarta Tahun 2005*. <http://digilib.unnes.ac.id>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2010.
- Divjak Matjaz, Eye blink based fatigue detection for prevention of Computer Vision Syndrome <http://www.mva-org>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2010.
- Effendi, Fikri. 2002. *Ergonomi Bagi Pekerja Sektor Informal*, cdk 136, ISSN: 0125-193X.
- Effendi, Fikri. 2007. *Ergonomi Bagi Pekerja Sektor Informal*, cdk 154, ISSN: 0125-193X.
- Fauzi, *Penyakit Akibat Kerja Karena Penggunaan Komputer* <http://digilib.unila.ac.id> Diakses pada tanggal 1 juli 2010.
- Fityani. 2006. “*Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Gejala Gangguan-Gangguan Mata Pada Pekerja Bengkel Pengelasan Listrik Di Kota Watampone*”. Skripsi Sarjana, Fakultas Kesehatan masyarakat UNHAS Makassar.
- Fitrayana. 2005. “*Studi Posisi Kerja Operator Komputer Pada Beberapa Usaha Penglihatan Di kec. Tamalanrea Makassar*”. Skripsi Sarjana, Fakultas Kesehatan Masyarakat UNHAS Makassar.
- Hamka. *Tafsir Al-azhar juz 15*. Singapura. Pustaka Nasional PTE LTD.
- Hanum, Iiz Faiza, 2008. *Efektifitas Penggunaan Screen pada Monitor Komputer Untuk Mengurangi Kelelahan Mata Pekerja Call Centre di PT Indosat NSR* <http://repository.usu.ac.id>. Diakses pada tanggal 14 juli 2010.
- Humaidi, Syamsul, 2005. *Dampak Radiasi Monitor Komputer* <http://library.usu.ac.id/download/fmipa/fisika-syaharul2.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2010.



- Humaidi, Syahrul, 2004. *Radiasi Layar Monitor Komputer Pribadi*.  
<http://library.usu.ac.id/download/fmipa/fisika-syahrul.pdf> Diakses pada tanggal 20 juni 2010.
- Ilyas, sidarta ,dkk, 2002. *Ilmu penyakit mata untuk dokter umum dan mahasiswa kedokteran ed: 2*. Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Ilyas, sidarta, 2007. *Ilmu penyakit mata ed: 3*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Ilyas, sidarta, 2004. *Ilmu perawatan mata*. Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Juarsa, Lis Nawati, *Pengaruh Posisi Pengoperasian Komputer Terhadap Konsumsi Energi*. [http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/industrial-technology/2010/Artikel\\_30402538.pdf](http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/industrial-technology/2010/Artikel_30402538.pdf) Diakses pada tanggal 20 juni 2010.
- Komputer dan masyarakat Komputer <http://sika.t35.com/book/komputer-dan-masyarakat.pdf>. Diakses pada tanggal 30 mei 2010.
- Mahwati, Yeni, 2001. *Hubungan Antara Umur, Masa Kerja dan Intensitas Pencahayaan Dengan Kelelahan Mata Pada Tenaga Kerja Bagian Nating di PT. Yuro Mustika Purbalingga*.<http://eprints.undip.ac.id/8602/1/1113.pdf>. Diakses pada Tanggal 30 mei 2010.
- Maria, Rosa dkk, 2009. *Categorization of factors causing asthenopia in Research professors at the itcj by reading with vdt: a Shared experience* <http://www.sem.ac.org.mx/archivos/congreso11/SALUD2.pdf>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2010
- Mashud, 2008. *Official Web Site Mgmp Tik Sma Dki Jakarta Rubrik : Artikel dan Materi Tik Sma* [http://arsipegianto.tripod.com/komputer dan kesehatan kerja.pdf](http://arsipegianto.tripod.com/komputer_dan_kesehatan_kerja.pdf). Diakses pada tanggal 20 Juni 2010.
- Murtopo, Ichwan dan Sarimurni, 2005. *Pengaruh Radiasi Layar Komputer Terhadap Kemampuan Daya Akomodasi Mata Mahasiswa Pengguna Komputer di Universitas Muhamadiyah Surakarta* [http://eprints.ums.ac.id/503/1/6.\\_ICHWAN\\_MURTOPO.pdf](http://eprints.ums.ac.id/503/1/6._ICHWAN_MURTOPO.pdf) Diakses pada tanggal 26 juni 2010.
- Nurmianto, Eko. 2003. *Ergonomi: Konsep Dasar dan Aplikasinya, Ed. Pertama*.
- Ridley, John. 2008. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta: Erlangga.
- Roestijawati, Nendyah.2007. *Sindrom Dry Eye pada Pengguna Visual Display Terminal (VDT)*, cdk No. 154, ISSN:0125-193X.





Shihab, Quraish, 2007, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran vol 7*, Lentera Hati, Jakarta.

Sloane, ethel. 2004. *Anatomi dan Fisiologi untuk pemula*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.

Stuedeli Thomas, dan Marino Menozzi, *Effect Of Subjective and Objective Workload on Asthenopia at VDU Workplaces*

<http://www.velowochen.ch/stuedelithomas/Publi/Stuedeli-JOSE>

[RiskPreventionAtVDU-4-2003.pdf](http://www.velowochen.ch/stuedelithomas/Publi/Stuedeli-JOSE). Diakses pada tanggal 30 Mei 2010

Sulistomo, Astrid. 2002. *Pendidikan Formal Sumber daya Manusia Kesehatan Kerja*, cdk, No.136, ISSN:0125-193X.

Suma'mur. 1995. *Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

Symptoms in Heterophoria and Heterotropia and the Psychological Effects of Strabismus. <http://www.cybersight.org>. Diakses pada Tanggal 30 Mei 2010.

Trisnawati, Asih. 2006. *Beberapa Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadia Katarak Di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Makassar tahun 2005*


Whicaksana, Aryana. 2002. *Peran Ergonomi Dalam Pencegahan Sindrom Carpal*

*Tunnel Akibat kerja*, cdk No.136, ISSN: 0125-193X,



LAMPIRAN

Dokumentasi kegiatan pengambilan sampel di lapangan








LAMPIRAN

Dokumentasi kegiatan pengambilan sampel di lapangan






No. Responden	Nama	Umur	pnddkn trkhr	Lm Krj/Hari	Masa kerja
1	Andi Hasrah H	19-25	SMA/SMK	>8 jam	>2 Lama
2	Kasdianto	19-25	SMA/SMK	>8 jam	>2 Lama
3	Edi Suhardi Rahmar	19-25	PT	>8 jam	>2 Lama
4	Bahri	19-25	SMA/SMK	<8 jam	<2 Baru
5	Syahrudin	26-36	PT	>8 jam	>2 Lama
6	M Zainal abidin	19-25	PT	>8 jam	>2 Lama
7	Taufand	19-25	SMA/SMK	>8 jam	>2 Lama
8	Abdul Zakur	19-25	SMA/SMK	<8 jam	<2 Baru
9	Andi Agustiadi	19-25	SMA/SMK	<8 jam	<2 Baru
10	Nunu	19-25	SMA/SMK	<8 jam	<2 Baru
11	Yani	19-25	PT	>8 jam	<2 Baru
12	ilham	19-25	SMA/SMK	>8 jam	>2 Lama
13	Ahmad Irham	19-25	SMA/SMK	>8 jam	<2 Baru
14	Muh Saddam	19-25	PT	<8 jam	<2 Baru
15	Hamka	26-36	SMA/SMK	<8 jam	>2 Lama
16	Irham	19-25	PT	<8 jam	>2 Lama
17	Khomsiyah	26-36	PT	<8 jam	>2 Lama
18	Muslimin	26-36	PT	>8 jam	>2 Lama
19	Irsan	19-25	SMA/SMK	>8 jam	>2 Lama
20	Bambang	26-36	PT	>8 jam	>2 Lama
21	Eman	19-25	PT	>8 jam	>2 Lama
22	Renal	19-25	SMA/SMK	<8 jam	>2 Lama
23	Yuyu	19-25	SMA/SMK	<8 jam	<2 Baru
24	Yusril	26-36	PT	<8 jam	>2 Lama
25	Yeyen	26-36	SMA/SMK	>8 jam	>2 Lama
26	Ahmad	26-36	SMA/SMK	<8 jam	<2 Baru
27	Muh Arul	26-36	PT	>8 jam	>2 Lama
28	Faiz	19-25	SMA/SMK	<8 jam	<2 Baru
29	Tatang	26-36	PT	>8 jam	>2 Lama
30	Wahyu	19-25	SMA/SMK	>8 jam	<2 Baru
31	Erwin	19-25	SMA/SMK	<8 jam	<2 Baru
32	Eto	19-25	SMA/SMK	>8 jam	>2 Lama
33	Muchlis	26-36	PT	>8 jam	>2 Lama
34	Mursal	26-36	SMA/SMK	>8 jam	<2 Baru
35	Salim	19-25	SMA/SMK	<8 jam	<2 Baru



P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7
Kadng2	Tidak	Kadng2	Kadng2	Tidak	Kadng2	Kadng2
Kadng2	Tidak	Kadng2	Kadng2	Tidak	Kadng2	Kadng2
Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Selalu	Kadng2
Tidak	Selalu	Tidak	Tidak	Tidak	Kadng2	Kadng2
Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Selalu	Selalu
Kadng2	Selalu	Selalu	Tidak	Tidak	Selalu	Kadng2
Kadng2	Kadng2	Kadng2	Tidak	Kadng2	Selalu	Selalu
Kadng2	Kadng2	Tidak	Tidak	Tidak	Kadng2	Tidak
Tidak	Kadng2	Tidak	Kadng2	Tidak	Kadng2	Tidak
Kadng2	Tidak	Kadng2	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Kadng2	Tidak	Tidak	Selalu	Tidak	Tidak	Tidak
Kadng2	Selalu	Kadng2	Selalu	Tidak	Selalu	Kadng2
Kadng2	Kadng2	Kadng2	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Kadng2	Selalu	Kadng2	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Kadng2	Selalu	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Tidak	Tidak
Kadng2	Kadng2	Kadng2	Selalu	Kadng2	Kadng2	Kadng2
Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Tidak	Kadng2	Tidak
Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Tidak	Selalu	Selalu
Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Selalu	Selalu
Selalu	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Selalu	Kadng2
Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Tidak	Kadng2	Kadng2
Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Selalu	Selalu
Tidak	Kadng2	Tidak	Kadng2	Tidak	Tidak	Tidak
Kadng2	Selalu	Selalu	Selalu	Kadng2	Kadng2	Kadng2
Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Selalu	Selalu
Kadng2	Selalu	Kadng2	Selalu	Kadng2	Kadng2	Kadng2
Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2
Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2
Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2
Kadng2	Kadng2	Selalu	Selalu	Selalu	Selalu	Kadng2
Kadng2	Kadng2	Kadng2	Selalu	Selalu	Selalu	Selalu
Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2
Kadng2	Selalu	Selalu	Selalu	Selalu	Selalu	Selalu
Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2	Kadng2
Kadng2	Kadng2	Tidak	Kadng2	Tidak	Tidak	Tidak







Jenis Monitor	Cahaya Pg	Cahaya Malam	Cahaya siang
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Menggnkn fiter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Menggnkn fiter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	300 lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	300 Lux	>300 Lux
Menggnkn fiter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	300 lux	300 Lux	300 Lux
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Menggnkn fiter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	300 Lux	300 Lux	300 lux
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	>300 Lux	>300 Lux
Tidak mengnkn filter	<300 Lux	>300 Lux	300 Lux







**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN SYNDROME ASTHENOPIA  
PADA USAHA PENGETIKAN DI KELURAHAN MANGASA KECAMATAN  
TAMALATE KOTA MAKASSAR TAHUN 2010**

**IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nomor Responden :
2. Nama :
3. Umur :..... Tahun
4. Pendidikan Terakhir :
5. Lama Kerja Perhari :..... Jam
6. Masa kerja :..... Hari/Bulan/Tahun

**DAFTAR PERTANYAAN**

1. Apakah mata anda terasa nyeri saat melakukan pengetikan?
  - a. Selalu
  - b. kadang-kadang
  - c. tidak
2. Apakah mata anda terasa kering saat melakukan pengetikan?
  - a. Selalu
  - b. kadang-kadang
  - c. tidak
3. Apakah kepala anda terasa sakit saat melakukan pengetikan?
  - a. Selalu
  - b. kadang-kadang
  - c. tidak
4. Apakah penglihatan anda kabur saat melakukan pengetikan?
  - a. Selalu
  - b. kadang-kadang
  - c. tidak
5. Apakah anda biasa mengalami perubahan persepsi warna setelah melakukan pengetikan?
  - a. Selalu
  - b. kadang-kadang
  - c. tidak



6. Apakah punggung anda terasa nyeri saat melakukan pengetikan?
- a. Selalu            b. kadang-kadang    c. tidak
7. Apakah pinggang anda terasa nyeri saat melakukan pengetikan?
- a. Selalu            b. kadang-kadang    c. tidak



*Terima kasih atas kerjasama dan partisipasi anda*





### LEMBAR OBSERVASI

KONDISI	Ya	Tidak
A. Jarak layar monitor 1. 40- 75 cm 2. < 40 cm		
B. Pencahayaan 1. 300 lux. 2. < 300 lux. 3. >300 lux.		
C. Posisi Duduk 1. Tinggi meja komputer 40-70 cm yang telah disesuaikan dengan ukuran kursi dan tinggi responden komputer. 2. Tinggi meja >40-70 cm		
D. Sikap Duduk 1. Sikap duduk dalam melakukan suatu pekerjaan dianjurkan memiliki sikap tubuh yang tegak, diselingi istirahat dengan sedikit membungkuk selama beberapa menit. 2. Melakukan sikap duduk yang membungkuk secara terus menerus sampai selesai melakukan pekerjaan menetik.		
E. Jenis monitor 1. Low Radiation 2. Menggunakan filter		



# 1. Analisis Univariat

## Frequencies

### Statistics

Umur

N	Valid	35
	Missing	0
Mean		1.34
Minimum		1
Maximum		2
Percentiles	25	1.00
	50	1.00
	75	2.00





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

### Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	19-25	23	65.7	65.7	65.7
	26-36	12	34.3	34.3	100.0
	Total	35	100.0	100.0	





### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Umur	35	1	2	1.34	.482
Valid N (listwise)	35				

### Statistics

Masa kerja

N	Valid	35
	Missing	0
Mean		1.60
Minimum		1
Maximum		2
Percentiles	25	1.00
	50	2.00
	75	2.00





**Masa kerja**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid <2 baru	14	40.0	40.0	40.0
>2 lama	21	60.0	60.0	100.0
Total	35	100.0	100.0	

**Statistics**

Lama kerja per hari

N	Valid	35
	Missing	0
Mean		1.57
Minimum		1
Maximum		2
Percentiles	25	1.00
	50	2.00
	75	2.00



Lama kerja per hari



		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<8 jam	15	42.9	42.9	42.9
	>8 jam	20	57.1	57.1	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

2. Analisis Bivariat

Statistics

		Umur	Masa kerja	Lama kerja per hari	jarak.layar.m onitor	pencahaya. malam	pencahaya. pagi	pencahaya. siang	posisi.duduk	sikap.duduk	Syndrome Asthenopia
N	Valid	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Percent	25	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00
iles	50	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	1.00
	75	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00

Tabel Frekuensi



**Umur**



		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	19-25	23	65.7	65.7	65.7
	26-36	12	34.3	34.3	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**Masa kerja**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<2 baru	14	40.0	40.0	40.0
	>2 lama	21	60.0	60.0	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR







**Lama kerja per hari**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<8 jam	15	42.9	42.9	42.9
	>8 jam	20	57.1	57.1	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**jarak.layar.monitor**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	40-70 cm	30	85.7	85.7	85.7
	<40 cm	5	14.3	14.3	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR



**pencahayaan.malam**



	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 300 lux	5	14.3	14.3	14.3
< 300 lux	30	85.7	85.7	100.0
Total	35	100.0	100.0	

**pencahayaan.pagi**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 300 lux	4	11.4	11.4	11.4
>300 lux	31	88.6	88.6	100.0
Total	35	100.0	100.0	



**pencahayaan.siang**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 300 lux	3	8.6	8.6	8.6
>300 lux	32	91.4	91.4	100.0
Total	35	100.0	100.0	



posisi.duduk

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid tinggi meja kmputr 40-70 cm dan disesuaikan dgn ukurn kursi n tgg rspndn	10	28.6	28.6	28.6
tinggi meja kmputr >40-70 cm dan tdk dssuakn dgnukurn kurs dan tgg rspndn	25	71.4	71.4	100.0
Total	35	100.0	100.0	





**sikap.duduk**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	sikp du2k tgak n diselingi istirht dgn sdikit mbungkuk slma brapa menit	9	25.7	25.7	25.7
	sikp du2k yg mbungkuk scra terus menerus smp mengetik	26	74.3	74.3	100.0
	Total	35	100.0	100.0	

**syndromeAsthenopia**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	mengalami gejala	25	71.4	71.4	71.4
	tidak mengalami gejala	10	28.6	28.6	100.0
	Total	35	100.0	100.0	







## Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Umur * syndromeAsthenopia	35	100.0%	0	.0%	35	100.0%

Umur \* syndromeAsthenopia Crosstabulation

			syndromeAsthenopia		Total
			mengalami gejala	tidak mengalami gejala	
Umur	19-25	Count	13	10	23
		% within Umur	56.5%	43.5%	100.0%
	26-36	Count	12	0	12
		% within Umur	100.0%	.0%	100.0%
Total		Count	25	10	35
		% within Umur	71.4%	28.6%	100.0%





### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7.304 <sup>a</sup>	1	.007		
Continuity Correction <sup>b</sup>	5.329	1	.021		
Likelihood Ratio	10.387	1	.001		
Fisher's Exact Test				.007	.006
Linear-by-Linear Association	7.096	1	.008		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	35				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,43.

b. Computed only for a 2x2 table





## Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Masa kerja * syndromeAsthenopia	35	100.0%	0	.0%	35	100.0%

Masa kerja \* syndromeAsthenopia Crosstabulation

		syndromeAsthenopia		Total
		mengalami gejala	tidak mengalami gejala	
Masa kerja <2 baru	Count	4	10	14
	% within Masa kerja	28.6%	71.4%	100.0%
>2 lama	Count	21	0	21
	% within Masa kerja	100.0%	.0%	100.0%
Total	Count	25	10	35
	% within Masa kerja	71.4%	28.6%	100.0%





### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	21.000 <sup>a</sup>	1	.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	17.646	1	.000		
Likelihood Ratio	25.127	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	20.400	1	.000		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	35				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,00.

b. Computed only for a 2x2 table







## Crosstabs

### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Lama kerja per hari * syndromeAstenopia	35	100.0%	0	.0%	35	100.0%

### Lama kerja per hari \* syndromeAstenopia Crosstabulation

			syndromeAstenopia		Total
			mengalami gejala	tidak mengalami gejala	
Lama kerja per hari <8 jam	Count	7	8	15	
	% within Lama kerja per hari	46.7%	53.3%	100.0%	
>8 jam	Count	18	2	20	
	% within Lama kerja per hari	90.0%	10.0%	100.0%	
Total	Count	25	10	35	
	% within Lama kerja per hari	71.4%	28.6%	100.0%	





### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7.887 <sup>a</sup>	1	.005		
Continuity Correction <sup>b</sup>	5.906	1	.015		
Likelihood Ratio	8.148	1	.004		
Fisher's Exact Test				.008	.007
Linear-by-Linear Association	7.661	1	.006		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	35				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,29.

b. Computed only for a 2x2 table





## Crosstabs

### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
jarak.layar.monitor * syndromeAsthenopia	35	100.0%	0	.0%	35	100.0%

### jarak.layar.monitor \* syndromeAsthenopia Crosstabulation

			syndromeAsthenopia		Total
			mengalami gejala	tidak mengalami gejala	
jarak.layar.monitor	40-70 cm	Count	21	9	30
		% within jarak.layar.monitor	70.0%	30.0%	100.0%
	<40 cm	Count	4	1	5
		% within jarak.layar.monitor	80.0%	20.0%	100.0%
Total		Count	25	10	35
		% within jarak.layar.monitor	71.4%	28.6%	100.0%





### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.210 <sup>a</sup>	1	.647		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.223	1	.637		
Fisher's Exact Test				1.000	.553
Linear-by-Linear Association	.204	1	.652		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	35				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,43.

b. Computed only for a 2x2 table





### Crosstabs

#### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
pencahayaannya.malam * syndromeAsthenopia	35	100.0%	0	.0%	35	100.0%

#### pencahayaannya.malam \* syndromeAsthenopia Crosstabulation

			syndromeAsthenopia		Total
			mengalami gejala	tidak mengalami gejala	
pencahayaannya.malam	300 lux	Count	0	5	5
		% within pencahayaannya.malam	.0%	100.0%	100.0%
< 300 lux	Count	25	5	30	
	% within pencahayaannya.malam	83.3%	16.7%	100.0%	
Total	Count	25	10	35	
	% within pencahayaannya.malam	71.4%	28.6%	100.0%	





### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	14.583 <sup>a</sup>	1	.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	10.786	1	.001		
Likelihood Ratio	14.845	1	.000		
Fisher's Exact Test				.001	.001
Linear-by-Linear Association	14.167	1	.000		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	35				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,43.

b. Computed only for a 2x2 table





### Crosstabs

#### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
pencahaya.aan.pagi * syndromeAsthenopia	35	100.0%	0	.0%	35	100.0%

#### pencahaya.aan.pagi \* syndromeAsthenopia Crosstabulation

			syndromeAsthenopia		Total
			mengalami gejala	tidak mengalami gejala	
pencahaya.aan.pagi	300 lux	Count	0	4	4
		% within pencahaya.aan.pagi	.0%	100.0%	100.0%
	>300 lux	Count	25	6	31
		% within pencahaya.aan.pagi	80.6%	19.4%	100.0%
Total		Count	25	10	35
		% within pencahaya.aan.pagi	71.4%	28.6%	100.0%





### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11.290 <sup>a</sup>	1	.001		
Continuity Correction <sup>b</sup>	7.684	1	.006		
Likelihood Ratio	11.417	1	.001		
Fisher's Exact Test				.004	.004
Linear-by-Linear Association	10.968	1	.001		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	35				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,14.

b. Computed only for a 2x2 table







### Crosstabs

#### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
pencahayaan.siang * syndromeAsthenopia	35	100.0%	0	.0%	35	100.0%

#### pencahayaan.siang \* syndromeAsthenopia Crosstabulation

			syndromeAsthenopia		Total
			mengalami gejala	tidak mengalami gejala	
pencahayaan.siang	300 lux	Count	0	3	3
		% within pencahayaan.siang	.0%	100.0%	100.0%
	>300 lux	Count	25	7	32
		% within pencahayaan.siang	78.1%	21.9%	100.0%
Total		Count	25	10	35
		% within pencahayaan.siang	71.4%	28.6%	100.0%





### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8.203 <sup>a</sup>	1	.004		
Continuity Correction <sup>b</sup>	4.822	1	.028		
Likelihood Ratio	8.258	1	.004		
Fisher's Exact Test				.018	.018
Linear-by-Linear Association	7.969	1	.005		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	35				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,86.

b. Computed only for a 2x2 table





### Crosstabs

#### Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
posisi.duduk * syndromeAsthenopia	35	100.0%	0	.0%	35	100.0%

#### posisi.duduk \* syndromeAsthenopia Crosstabulation

		syndromeAsthenopia		Total
		mengalami gejala	tidak mengalami gejala	
posisi.duduk	tinggi meja kmputr 40-70 cm dan dssuaikn dgn ukurn kursi n tgg rspondn	Count 4 40.0%	Count 6 60.0%	Count 10 100.0%
	tinggi meja kmputr >40-70 cm dan tdk dssuakn dgn ukurn kurs dan tgg rspondn	Count 21 84.0%	Count 4 16.0%	Count 25 100.0%
Total		Count 25 71.4%	Count 10 28.6%	Count 35 100.0%





### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.776 <sup>a</sup>	1	.009		
Continuity Correction <sup>b</sup>	4.792	1	.029		
Likelihood Ratio	6.435	1	.011		
Fisher's Exact Test				.016	.016
Linear-by-Linear Association	6.582	1	.010		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	35				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,86.

b. Computed only for a 2x2 table





### Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
sikap.duduk * syndromeAsthenopia	35	100.0%	0	.0%	35	100.0%

sikap.duduk \* syndromeAsthenopia Crosstabulation

			syndromeAsthenopia		Total
			mengalami gejala	tidak mengalami gejala	
sikap.duduk	sikp du2k tgak n diselingi	Count	2	7	9
	istirht dgn sdikit mbungkuk slma brapa menit	% within sikap.duduk	22.2%	77.8%	100.0%
sikap.duduk	sikp du2k yg mbungkuk scra terus menerus smp mengetik	Count	23	3	26
		% within sikap.duduk	88.5%	11.5%	100.0%
Total		Count	25	10	35
		% within sikap.duduk	71.4%	28.6%	100.0%




### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	14.374 <sup>a</sup>	1	.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	11.311	1	.001		
Likelihood Ratio	13.748	1	.000		
Fisher's Exact Test				.001	.001
Linear-by-Linear Association	13.963	1	.000		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	35				

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,57.

b. Computed only for a 2x2 table



## BIODATA PENULIS



NANA KUDRAWATI lahir di Lambarese, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juli tahun 1988. NANA lahir dari pasangan Suparta dan Syamsarifa ini adalah anak pertama (ke 1) dari enam bersaudara. Pendidikan sekolah dasarnya diselesaikan di Sekolah Dasar Negeri 134 Mulyorejo Luwuk Utara pada tahun 2000, kemudian dilanjutkan di Pesantren Datok Sulaiman dan selesai pada tahun 2003. Usai menamatkan sekolah di Madrasah Tsanawiyah, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN), dan berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 2006.

Pada tahun 2006 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pada Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat Jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 2010.

