

**TELAAH HUBUNGAN KUANTITATIF STRUKTUR-
AKTIVITAS SENYAWA TURUNAN 1,10-FENANTROLIN
SEBAGAI ANTIMALARIA MENGGUNAKAN PARAMETER
MOLEKULAR BERDASARKAN PERHITUNGAN KIMIA
KOMPUTASI**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi Pada Fakultas Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh

BUDHY SENTOSA PUTRA
70100106004

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1-4
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5-44
A. Analisis HKSA	5
B. Malaria.....	20
C. Halofantrin.....	30
D. Tinjauan Islam Terhadap Kesehatan, Ilmu Kimia dan Pengobatan.....	32-43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44-46
A. Alat dan Bahan	44
B. Prosedur Penelitian	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47-64
A. Hasil Penelitian.....	47
B. Pembahasan	48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65-66
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel	1	Parameter untuk prediktor yang sering digunakan untuk analisis Hansch	12
Tabel	1	Data struktur turunan 1,10-Fenantrolin dan aktifitas biologisnya.....	32
Tabel	3	Model persamaan terpilih hasil analisis regresi multilinier.....	51
Tabel	4	Nilai PRESS, SD, dan R^2_{cv} dari 15 persamaan terpilih.....	54
Tabel	5	Data Struktur baru senyawa turunan 1,10-Fenantrolin dan aktifitas biologisnya.....	58
Tabel	6	Data nilai Parameter Molekular.....	71
Tabel	7	Hasil analisis regresi multilinear	72



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Skema kerja	70
Lampiran 2	Nilai dari setiap Parameter Molekular yang digunakan	71
Lampiran 3	Hasil Analisis regresi Multilinear Model persamaan terbaik menggunakan Program SPSS	72
Lampiran 4	Senyawa turunan baru hasil rancangan dengan persamaan terbaik hasil regresi Multilinear.....	74



ABSTRAK

Nama : Budhy Sentosa Putra
NIM : 70100106004
JudulSkripsi : Telaah Hubungan Kuantitatif Struktur-Aktivitas senyawa turunan 1,10-Fenantrolin sebagai Antimalaria menggunakan Parameter Molekular berdasarkan perhitungan Kimia Komputasi.

Studi hubungan kuantitatif struktur-aktivitas (HKSA) telah dilakukan terhadap 13 senyawa turunan 1,10-Fenantrolin sebagai antimalaria menggunakan parameter sifat fisika kimia hasil perhitungan kimia kuantum sebagai variabel bebas dan aktivitas biologis ($\log 1/IC_{50}$) sebagai variabel tak bebas. Studi ini menggunakan program Hyperchem[®] 7.5 dan berdasarkan metode semiempirik AM1 untuk menghitung nilai-nilai parameter tersebut. Penentuan model persamaan terbaik didasarkan pada kriteria statistik dari analisis regresi dan validasi silang *leave-one-out*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model persamaan HKSA terbaik mengikuti persamaan:

$$\log (1/IC_{50}) = (-2,859 \pm 3,158) + (0,178 \pm 0,039) E \text{ Hidrasi} - (0,391 \pm 0,198) E \text{ Homo} - (0,041 \pm 0,024) \text{Polarisabilitas}$$

Persamaan signifikan pada tingkat kepercayaan 95% dengan parameter statistik: $n = 13$, $m = 3$, $R^2 = 0,811$, $F = 12,882$, $SE = 0,326$, $PRESS = 2,327$ dan $r_{cv}^2 = 0,821$.

Kata kunci: HKSA, validasi silang *leave-one-out*, 1,10-Fenantrolin, antimalaria.

ABSTRACT

Name : Budhy Sentosa Putra
NIM : 70100106004
Title of Thesis : Quantitative Structure-Activity Relationships (QSAR) study of 1,10-Fenantrolin derivatives as Antimalarial agents using Molecular parameters based on calculation of Computational Chemistry.

The quantitative structure-activity relationship (QSAR) study had been conducted on 13 synthetic 1,10-Fenantrolin as antimalarial agents using physico chemical parameters which derived from the quantum chemical calculations as independent variable and biology activity ($\log 1/EC_{50}$) as dependent variable. The study used Hyperchem[®] 7.5 program based on AM1 semiempiric method to calculate their parameter values. Determining of the best equation model was based on multilinear regression analysis and *leave-one-out* cross validation statistical criteria. The result showed that the best QSAR equation model was :

$$\log (1/IC_{50}) = (-2,859 \pm 3,158) + (0,178 \pm 0,039) \textit{ hydration energy} - (0,391 \pm 0,198) \textit{ E Homo} - (0,041 \pm 0,024) \textit{ Polarizibility}$$

The equation was significant at 95% with statistical parameters: $n = 13$, $m = 3$, $r^2 = 0.811$, $F = 12.882$, $SE = 0.326$, $PRESS = 2,321$, and $R^2_{cv} = 0,827$.

Key words: QSAR, AM1, *leave-one-out* cross validation, 1,10-Fenantrolin, antimalarial

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Malaria merupakan penyakit infeksi dengan demam berkala yang disebabkan oleh parasit *plasmodium* dan ditularkan oleh sejenis nyamuk tertentu (*Anopheles sp*). Malaria adalah penyakit infeksi yang mematikan nomor satu dan menjadi prioritas utama penyakit tropis di dunia. Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang merupakan salah satu daerah endemis dari malaria, ada sekitar 45% penduduk Indonesia yang berdomisili didaerah beresiko tertular malaria. Pada tahun 2008 Prevalensi malaria di Indonesia diperkirakan sebanyak 1,624 juta orang yang mengidap penyakit ini. (WHO, 2006; Kurnia, 2007; Fadilah, 2009).

Resistensi merupakan akibat pemakaian obat yang tidak tepat. Diantara keempat spesies Plasmodia manusia, kasus malaria *P. falciparum* tampaknya lebih dominan dan juga merupakan penyebab malaria berat yang banyak menimbulkan kematian. Penyebaran parasit yang resisten terhadap antimalaria, utamanya klorokuin yang begitu cepat dan luas dihampir seluruh daerah endemik malaria, mendorong perlunya usaha untuk menemukan obat antimalaria baru (Tjitra E, dkk, 1989; Sekartuti, dkk, 1990; RS-ITCI, 1989; Mustofa, 2002).

Perkembangan komputasi yang sangat pesat dimulai pada tahun 1950- telah mengubah diskripsi suatu sistem kimia dengan masuknya unsur baru

diantara eksperimen dan teori yaitu eksperimen komputer (*Computer Experiment*). Perkembangan eksperimen komputer mengubah secara substansial hubungan tradisional antara teori dan eksperimen, Penelitian kimia dengan alat komputer dimulai dengan kajian hubungan struktur kimia dengan aktivitas fisiologi dari senyawa (Dwi Pranowo Harno, 2010).

Kimia komputasi telah berkembang pesat terutama berkaitan dengan perhitungan kimia kuantum dan berbagai terapan untuk berbagai bidang ilmu lainnya. Salah satu bidang yang banyak menggunakan aplikasi kimia komputasi berupa HKSA (*Hubungan Kuantitatif Struktur–Aktivitas*) atau QSAR (*Quantitative Structure–Activity Relationship*) adalah kimia medisinal. HKSA ini yang kemudian dapat membantu peneliti dalam mensintesis senyawa obat. Kimia komputasi dapat menghasilkan gambaran struktur molekul dalam berbagai model dan mempunyai aktifitas yang sama dengan penyamaan kuantum dari fisika klasik. Asumsi mendasar dari HKSA adalah bahwa terdapat hubungan kuantitatif antara mikroskopis (struktur molekul) dan sifat makroskopis / empiris (aktivitas biologis) dari suatu molekul (Istyastono,E.,P.,dkk, 2003; Kubinyi, 1993).

Salah satu usaha menemukan antimalaria baru dapat dilakukan melalui farmakomodulasi senyawa antimalaria yang sudah dikenal aktivitasnya. Halofantrin merupakan antimalaria baru yang dikembangkan dari golongan fenantren. Halofantrin aktif melawan *plasmodium* yang resisten terhadap klorokuin, Namun demikian karena ketersediaan hayatinya yang rendah profil kinetiknya bervariasi, dan efek sampingnya pada jantung yang cukup

membahayakan maka penggunaan halofantrin terbatas di negara tertentu utamanya di Afrika (Mustofa, 2002).

Untuk memperoleh suatu antimalaria baru golongan fenantren yang lebih potensial dan aman, Yapi *et al* dan Mustofa berhasil melakukan modifikasi struktur senyawa tersebut dengan memasukkan atom nitrogen pada kerangka fenantren. Dari 5 turunan diaza analog fenantren yang dievaluasi, golongan fenantrolin-1,10 mempunyai aktivitas antiplasmodial paling baik dengan nilai IC50 (*Inhibitory Concentration 50%*) berkisar 2 μ M terhadap strain *Plasmodium falciparum* yang resisten klorokuin (strain FcB1) maupun yang sensitif klorokuin (strain Nigerian). Kemudian ada sekitar 13 senyawa baru turunan fenantrolin-1,10 telah berhasil disintesis dan diuji aktivitas antimalariannya. Namun demikian bagaimana Hubungan Kuantitatif Struktur-Aktivitas (HKSA) dari antimalaria baru turunan 1,10-fenantrolin tersebut belum pernah dikaji (Mustofa, 2002).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian di atas maka permasalahan yang timbul yaitu:

Bagaimana menjelaskan HKSA turunan 1,10-Fenantrolin dengan pendekatan semiempirik dengan menggunakan beberapa parameter Hidrofobik, elektronik maupun sterik ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menentukan model persamaan matematis Hubungan kuantitatif Struktur-Aktivitas dari senyawa turunan 1,10-Fenantrolin.
2. Mengusulkan senyawa baru turunan 1,10-Fenantrolin dan prediksi aktivitasnya.

D. Kegunaan Penelitian

Mendesain senyawa turunan 1,10-fenantrolin yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang senyawa baru yang mempunyai aktivitas antimalaria yang lebih aktif secara teoritis menggunakan persamaan terbaik hasil analisis regresi multilinier yang divalidasi dengan metode validasi silang *leave-one-out*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis HKSA

Perkembangan dibidang ilmu kimia medisinal terutama pada perancangan obat baru yang menggunakan disiplin ilmu yang dikenal sebagai Hubungan Kuantitatif Struktur Aktivitas (HKSA) dimulai pada tahun 1964 (Lee *et al*, 1993).

Tujuan utama upaya desain suatu obat dalam ilmu kimia medisinal adalah supaya dapat menemukan suatu molekul yang akan menghasilkan efek biologis yang bermanfaat tanpa berakibat efek biologis yang merugikan (Purcell, 1974).

Batasan kimia medisinal menurut Taylor dan Kennewell (1981) adalah studi kimiawi senyawa atau obat yang dapat memberikan efek menguntungkan dalam sistem kehidupan, dan melibatkan studi hubungan struktur kimia senyawa dengan aktivitas biologis serta mekanisme cara kerja senyawa pada sistem biologis, dalam usaha mendapatkan efek pengobatan yang maksimal dan memperkecil efek samping yang tidak menguntungkan. Ruang lingkup bidang kimia medisinal menurut Burger (1980) adalah: (Siswandono dan Soekardjo, 2000).

1. Isolasi dan identifikasi senyawa aktif dalam tanaman yang secara empirik telah digunakan untuk pengobatan.
2. Sintesis struktur analog dari bentuk dasar senyawa yang mempunyai aktivitas pengobatan potensial.
3. Mencari struktur induk baru dengan cara sintesis senyawa organik, dengan ataupun tanpa berhubungan dengan zat aktif alamiah.
4. Menghubungkan struktur kimia obat dengan cara kerjanya.
5. Mengembangkan rancangan obat.
6. Mengembangkan hubungan struktur kimia dan aktivitas biologis melalui sifat kimia fisika dengan bantuan statistik.

Langkah 6 di atas dikenal sebagai bagian kimia medisinal dengan istilah HKSA. Kajian HKSA berkembang karena sangat membantu para ahli dalam hal desain obat terutama dalam hal mengkaji alternatif riset eksperimental yang relatif lebih efisien serta dapat melakukan penghematan dana dan waktu riset eksperimental. Untuk mendesain senyawa obat baru, terdapat sejumlah besar kemungkinan senyawa yang dapat dipilih untuk program sintesis dan belum tentu memberikan hasil yang diinginkan. Penggunaan HKSA dapat dilakukan sebagai pendekatan awal untuk penyeleksian kemungkinan molekul dengan prediksi yang terbaik (Widiyantoro, 1997).

1. Aneka Model Pendekatan Analisis Dalam HKSA

Ada beberapa model pendekatan hubungan kuantitatif struktur-aktivitas, antara lain adalah pendekatan HKSA Free-Wilson, pendekatan HKSA Hansch, pendekatan kuantum, dan pendekatan konektivitas molekul (Siswandono dan Soekardjo, 2000).

Analisis Hubungan Kuantitatif Struktur-Aktivitas (HKSA) merupakan salah satu aplikasi dari kimia komputasi dan juga bagian yang dipelajari dalam bidang kimia medisinal. Dengan metoda analisis HKSA, senyawa yang akan disintesis dapat didesain terlebih dahulu berdasarkan hubungan antara sifat-sifat kimia serta fisik molekul dengan aktivitas biologisnya. Dengan menggunakan hubungan tersebut, aktivitas teoritik suatu senyawa baru dapat diprediksi, dan dengan demikian fokus riset dapat dipersempit, biaya dan waktu pun dapat dihemat. Saat ini telah dikenal tiga metoda analisis HKSA yakni metoda HKSA Free-Wilson, metoda Hansch dan metoda HKSA tiga dimensi (Kubinyi, 1993).

a. Analisis HKSA Model Free-Wilson

Free dan Wilson (1964), mengembangkan suatu konsep hubungan struktur dan aktivitas biologis obat, yang dinamakan model *de novo* atau model matematik Free-Wilson. Mereka mengemukakan bahwa respons biologis merupakan sumbangan aktivitas dari gugus-gugus substituen terhadap aktivitas biologis senyawa induk, yang dinyatakan melalui persamaan berikut:

$$\log 1/C = \Sigma S + \mu$$

$\log 1/C$: logaritma aktivitas biologis

ΣS : total sumbangan substituen terhadap aktivitas biologis senyawa induk

μ : aktivitas biologis senyawa induk

Pada substitusi bermacam-macam gugus pada daerah atau zona yang berbeda dalam struktur senyawa induk, maka:

$$\log 1/C = \sum A_n \cdot B_n + \mu$$

$\sum A_n \cdot B_n$: total sumbangan aktivitas dari n substituen dalam n zona terhadap aktivitas senyawa induk jumlah senyawa yang disintesis merupakan hasil kali jumlah substituen pada tiap-tiap zona dari senyawa induk (Siswandono dan Soekardjo, 2000).

Penyelesaian model Free-Wilson menggunakan matriks dan analisis multiregresi linier. Pada matriks itu substituen mendapat nilai indikator 1 jika terdapat dalam molekul dan mendapat nilai indikator 0 jika tidak terdapat dalam molekul sebagai parameter bebas dan aktivitas biologis sebagai variabel tergantung (Sardjoko, 1993).

Model *de novo* ini kurang berkembang karena tidak dapat digunakan bila efek substituen bersifat tidak linier atau bila ada interaksi antarsubstituen. Selain itu model ini memerlukan banyak senyawa dengan kombinasi substituen yang bervariasi untuk dapat menarik kesimpulan yang benar. Meskipun demikian model ini juga mempunyai keuntungan karena dapat menghubungkan secara kuantitatif antara struktur kimia dan aktivitas biologis dari turunan senyawa dengan bermacam-macam gugus substitusi pada berbagai zona. Model ini digunakan bila tidak ada data tetapan kimia fisika dari senyawa-senyawa yang diteliti dan uji aktivitas lebih lambat dibanding dengan sintesis turunan senyawa (Siswandono, 1998).

Kelemahan metode Free-Wilson yaitu: (Sardjoko, 1993)

1. Penggunaan model Free-Wilson akan menghasilkan model persamaan yang hanya dapat memprediksikan turunan baru dalam jumlah terbatas.
2. Tidak dapat digunakan untuk memprediksi gugus lain yang berbeda dari jenis gugus yang digunakan dalam analisis.

b. Analisis HKSA Model Hansch

Hansch (1963), mengemukakan suatu konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis ($\log 1/C$) suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter sifat kimia fisika dari substituen yaitu parameter hidrofobik (π), elektronik (σ), dan sterik (E_s). Model pendekatan ini disebut pula model hubungan energi bebas linier (*linear free energy relationships* = LFER) atau pendekatan ekstratermodinamik. Pendekatan ini menggunakan dasar persamaan Hammett yang didapat dari kecepatan hidrolisis turunan asam benzoat, sebagai berikut:

$$\log (k_x/k_h) = \rho \cdot \sigma$$

- k_x dan k_h : tetapan keseimbangan reaksi dari senyawa tersubstitusi dan senyawa induk
- ρ : tetapan yang tergantung pada tipe dan kondisi reaksi serta jenis senyawa
- σ : tetapan yang tergantung pada jenis dan kedudukan substituent

Penjabaran lebih lanjut dari persamaan di atas didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$\log k_x = \rho \cdot \sigma + \log k_h$$

Persamaan ini dapat menjelaskan adanya hubungan linier antara tetapan substituen σ dan logaritma reaktivitas senyawa ($\log k_x$). Pendekatan hubungan struktur- aktivitas melalui parameter sifat kimia fisika oleh Hansch dinyatakan melalui persamaan regresi linier di bawah ini: (Siswandono dan Soekardjo, 2000).

$$\log 1/C = a \Sigma \pi + b \Sigma \sigma + c \Sigma E_s + d$$

C : kadar untuk respons biologis baku

$\Sigma \pi$, $\Sigma \sigma$, dan ΣE_s : sumbangan sifat-sifat lipofilik, elektronik, dan sterik dari gugus-gugus terhadap sifat-sifat senyawa induk yang berhubungan dengan aktivitas biologis

a, b, c, dan d : bilangan (tetapan) yang didapat dari perhitungan analisis regresi linier

Kelemahan dari metode ini adalah: (Silverman, 1992).

- 1) Harus terdapat nilai parameter untuk tiap-tiap substituen dalam kumpulan data.
- 2) Senyawa dalam jumlah yang besar harus dimasukkan dalam analisis agar diperoleh persamaan yang dapat dipercaya.
- 3) Diperlukan keahlian statistik dan komputer.
- 4) Interaksi molekul yang kecil merupakan bentuk yang tidak sempurna untuk sistem biologi.
- 5) Seperti hubungan empiris lainnya, perhitungan yang sering akan menghasilkan prediksi palsu.

Parameter sifat kimia fisika yang sering digunakan dalam HKSA model Hansch adalah parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Pada proses distribusi atau pengangkutan obat, penembusan membran biologis sangat dipengaruhi oleh sifat kelarutan obat dalam lemak/air, suasana pH, dan derajat ionisasi (pK_a) sehingga dalam hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas, parameter sifat kimia fisika yang sering dilibatkan adalah parameter hidrofobik dan elektronik. Proses interaksi obat-reseptor sangat dipengaruhi oleh ikatan kimia, kerapatan elektron, ukuran molekul, dan efek stereokimia. Dalam hubungan struktur dan aktivitas, ketiga parameter sifat kimia fisika di atas ikut dilibatkan, terutama parameter elektronik dan sterik (Siswandono dan Soekardjo, 2000).

Tabel 1. Parameter untuk prediktor yang sering digunakan untuk analisis Hansch (Kubinyi, 1993)

Parameter	Simbol
Parameter Hirofobik:	
Koefisien partisi	$\log P$, CLOGP
Konstanta substituen	Π
Konstanta hidrofobik fragmental	f, f'
Koefisien distribusi	$\log D$
Koefisien partisi (pada pH tertentu)	$\log p$, $\log p_{app}$
Faktor kapasitas pada HPLC	$\log k$, $\log kw$
Parameter solubilitas	S
Parameter Elektronik:	
Konstanta Hammet	σ , σ^- , σ^+
Konstanta induksi Taft's (polar)	σ^* , σ_1
Parameter medan Swain dan Lupton	F
Parameter resonansi Swain dan Lupton	R
Konstanta ionisasi	pKa, Δ pKa
Pergeseran kimia (^{13}C dan ^1H)	Δ
Parameter Teoritik:	
Muatan netto atom	q^σ , q^π
Superdelokalisabilitas	S^N , S^E , S^R
Energi orbital molekul terisi tertinggi	E_{HOMO}
Energi orbital molekul tak terisi terendah	E_{LUMO}
Potensial elektrostatik	$V(r)$
Parameter Sterik:	
Parameter sterik Taft	E_s , E^C
Volume Molar	MV
Berat molekul	MW
Jari-jari van der Waals	R
Volume van der Waals	V_w
Indeks refraktivitas molar	MR
Parameter Parachor	P_r
Parameter Sterimol	L, B_1 , B_2 , B_3 , B_4

c. Metode HKSA-3D

Kajian HKSA berkembang cukup pesat dengan berdasarkan peninjauan aspek struktur kimia secara tiga dimensional (3D). Analisis HKSA 3D berawal dari permasalahan analisis Hansch untuk senyawa-senyawa enantiomer yang memiliki kuantitas sifat dan kimiawi yang sama tetapi memiliki aktivitas biologis yang berbeda. Ternyata diketahui bahwa efek stereokimia berperan pada harga aktivitas biologis obat. Hal ini tidak bisa dikaji secara akurat dengan model analisis Hansch konvensional sehingga kemudian dikembangkan model analisis HKSA baru secara 3D (Linn *et al.*, 2005).

Dasar kajian ini adalah perbandingan molekul-molekul yang disandingkan satu sama lain pada suatu ruang yang dipetakan dengan sejumlah kisi-kisi 3D. Untuk tiap kisi ditentukan kontribusi sterik dan kontribusi elektronik yang dihasilkan pada tiap senyawa. Selanjutnya dikorelasikan dengan harga aktivitas biologis senyawa dengan menggunakan teknik analisis multivariat. Analisis HKSA 3D ini sering disebut sebagai analisis perbandingan medan molekular (*Comparative Molekular Field Analysis = CoMFA*) (Franke, 1984).

D. Pendekatan Mekanika Kuantum

Mekanika kuantum atau mekanika gelombang memberi pengertian semua teori tentang materi yang didasarkan pada fenomena alam. Materi terdiri atas molekul dan atom, yang masing-masing tersusun dari partikel yaitu proton, neutron dan elektron. Mekanika kuantum harus secara penuh dapat menguraikan sifat-sifat dasar partikel. Bagi para pakar dibidang obat, elektron merupakan partikel yang sangat penting karena obat terlibat dalam perubahan kimia yang merupakan fenomena dasar molekul obat. Mekanika kuantum menurunkan sejumlah persamaan yang mengindikasikan kemungkinan kedudukan dan energi partikel dalam atom molekul. Persamaan ini kompleks dan sulit penyelesaiannya, kecuali untuk molekul yang paling sederhana. Penyusunan persamaan mudah dikerjakan pada kasus molekul yang lebih besar dengan menyederhanakan penalaran. Elektron dalam molekul dapat diperkirakan untuk dihubungkan dengan cakupan orbital keseluruhan molekul, hal ini diketahui sebagai teori orbital molekul (Lee *et al*, 1993).

Teori orbital molekul dapat digunakan untuk menghitung kemungkinan letak elektron dan energi. Energi ini dikaitkan dengan fungsi gelombang dari orbital molekul dengan persamaan Schrodinger. Penggunaan komputer dapat digunakan secara baik untuk memperkirakan sifat molekul yang besar seperti obat. Perkiraan ini tergantung pada metode yang digunakan. Penghitungan orbital molekul pada molekul obat dapat memberikan indikasi numerik yang menggambarkan struktur

elektron. Perubahan tertentu dari indikasi numerik ini dapat menggambarkan perubahan struktur yang memberikan variasi aktivitas biologis. Informasi ini bermanfaat pada HKSA bagi para pakar obat untuk merancang obat baru (Lee *et al*, 1993).

1. Metode Semiempirik

Model perhitungan molekul dengan menggunakan dasar-dasar mekanika kuantum secara ringkas dapat digolongkan dalam metode semiempirik dan metode *ab initio*. Perhitungan semiempirik sebagian masih menggunakan parameter empirik yang dimasukkan untuk dapat menyelesaikan persamaan Schroedinger, sedangkan perhitungan *ab initio* murni menyelesaikan semua bentuk integral yang ada dengan penggunaan *basis set* secara menyeluruh. Perhitungan semiempirik mempunyai kelebihan dalam hal keakuratan hasil cukup dalam mendekati harga eksperimental sementara operasional perhitungan tidak memakan waktu yang cukup lama. Beberapa metode semiempirik yang dapat digunakan untuk molekul-molekul organik adalah CNDO (*Complete Neglect of Differential Overlap*), INDO (*Intermediate Neglect of Differential Overlap*), MNDO (*Modified Neglect of Differential Overlap*), AM1 (*Austin Model 1*), dan PM3 (*Parameterized Number 3*) (Widiyantoro, 1997).

Metode semiempiris dikembangkan dalam kerangka matematis dan teori orbital molekul, tetapi melakukan penyederhanaan dan pendekatan terhadap prosedur komputasi. Dalam menyelesaikan persamaan

Schroedinger, metode semiempiris hanya melibatkan elektron valensi saja. Elektron dalam (*core*) dihitung sebagai fungsi tolakan *core-core* bersama-sama dengan tolakan inti. Metode PM3 merupakan parameterisasi dari metode MNDO. Fungsi Gaussian pada PM3 mempunyai elemen yang mirip dengan AM1. Perbedaannya terletak pada proses parameterisasi pada setiap unsur. (Sulistyo, 2002).

2. Analisis Statistik Dalam HKSA

Pada kajian HKSA, banyak metode statistik multivariat yang dapat digunakan dan memberikan hasil analisis yang memuaskan. Metode dasar yang paling populer adalah analisis regresi, yaitu metode yang mengkorelasikan beberapa variabel bebas X dengan variabel tidak bebas. Meskipun hubungan linier sudah cukup akurat, beberapa penulis melaporkan juga adanya hubungan nonlinear pada beberapa kasus kajian HKSA. Hubungan nonlinear ini dapat berupa hubungan logaritmik, model parabolik, atau model bilinear (Kubinyi, 1993).

A. Analisis Regresi Multilinier

Analisis regresi multilinier dalam HKSA menghubungkan variabel bebas x (berupa parameter kimia fisika pada metode Hansch atau nilai variabel indikator pada metode Free-Wilson) dengan suatu variabel tidak bebas y (parameter aktivitas biologis) (Kubinyi, 1993).

Menurut Daniel dan Wood hubungan tersebut untuk m variabel bebas dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$y = k_0 + k_1x_1 + k_2x_2 + k_3x_3 + \dots + k_mx_m + \varepsilon$$

dengan notasi k menyatakan parameter regresi dan m adalah jumlah variabel (Daniel dan Wood, 1980).

Keabsahan persamaan yang diperoleh dan arti perbedaan parameter yang digunakan dalam hubungan struktur-aktivitas model Hansch, dapat dilihat dengan beberapa kriteria statistik, seperti r , r^2 , F , t , dan s . Arti kriteria statistik: (Siswandono dan Soekardjo, 2000).

- a. Nilai r (koefisien korelasi) menunjukkan tingkat hubungan antara data aktivitas biologis pengamatan percobaan dengan data hasil perhitungan berdasarkan persamaan yang diperoleh dari analisis regresi. Koefisien korelasi adalah angka yang bervariasi mulai dari 0 sampai 1. Semakin tinggi nilainya semakin baik hubungannya. Untuk mendapatkan nilai koefisien korelasi yang dapat diterima tergantung jumlah data penelitian. Semakin banyak jumlah data penelitian semakin rendah koefisien korelasi atau nilai r yang dapat diterima. Dalam penelitian hubungan struktur-aktivitas dicoba dicapai suatu nilai r yang lebih besar dari 0,9.
- b. Nilai r^2 menunjukkan berapa % aktivitas biologis yang dapat dijelaskan hubungannya dengan parameter sifat kimia fisika yang digunakan. Contoh: suatu hubungan yang mempunyai koefisien korelasi (r) = 0,990 berarti dapat menjelaskan $(0,990)^2 \times 100 \% = 98\%$ dari variasi antardata.
- c. Nilai F menunjukkan kemaknaan hubungan bila dibandingkan dengan tabel F . Makin besar nilai F makin besar derajat kemaknaan hubungan. Nilai F adalah indikator bilangan untuk menunjukkan bahwa hubungan, yang dinyatakan oleh persamaan yang didapat,

adalah benar atau merupakan kejadian kebetulan. Semakin tinggi nilai F semakin kecil kemungkinan hubungan tersebut adalah karena kebetulan.

- d. Nilai t menunjukkan perbedaan koefisien regresi a, b, c, dan d dari persamaan regresi bila dibandingkan dengan table t.
- e. Nilai s (simpangan baku) menunjukkan nilai variasi kesalahan dalam percobaan.

B. Metode Validasi Silang

Untuk menguji validitas dari prediksi yang dihasilkan oleh model regresi, diperlukan sejumlah data uji diluar data yang digunakan dalam fitting regresi. Namun jika sejumlah data terbatas, ada metode yang disebut metode validasi silang (*cross validation*) (Sembiring, 1995).

Ada 2 metode validasi silang yang bisa dikembangkan yaitu metode *Leave-one-out Cross Validation* (LOO-CV) atau validasi silang kurang satu dan *Leave-two-out Cross Validation* (LTO-CV) atau validasi silang kurang dua. Metode LOO-CV akan menyisakan satu molekul sebanyak (n-1) buah untuk fitting dan kemudian persamaan yang diperoleh diuji dengan data uji tersebut. Proses berulang sampai tiap molekul telah diprediksi satu kali. Dari parameter jumlah simpangan kuadrat (PRESS) maka akan dapat diketahui keakuratan tiap-tiap model untuk penentuan model yang terbaik (Sembiring, 1995).


Pada metode validasi silang kita menggunakan parameter PRESS dan SD_{PRESS} yang didefinisikan menurut Dean (1995) sebagai berikut:

$$PRESS = \sum_{i=1}^n (Y_{pred} - Y_{obs})^2$$

$$SD = \sqrt{PRESS/(n-2)}$$

$$r_{cv}^2 = \frac{(SD - PRESS)}{SD}$$

Pada LOO-CV, PRESS didefinisikan sebagai jumlah kuadrat dari perbedaan prediksi untuk $i = 1$ sampai $i = n$ (Tahir *et al*, 1997).



Gambar 1. Prosedur Validasi Silang *leave-one-out* (Kubinyi, 1993)

B. Malaria

Malaria merupakan suatu penyakit akut maupun kronik yang disebabkan oleh protozoa genus plasmodium dengan manifestasi klinis berupa demam, anemia dan pembesaran limpa. Penyakit infeksi ini disebabkan oleh infeksi protozoa yang ditularkan dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Penularan malaria dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor parasit (plasmodium), faktor manusia (host), faktor nyamuk Anopheles (vektor), dan faktor lingkungan. (Setyaningrum, 2008; Aswad, M., 2009).

Penyebaran parasit yang resisten terhadap antimalaria, utamanya klorokuin, yang begitu cepat dan luas di hampir seluruh daerah endemik malaria, mendorong perlunya usaha untuk menemukan obat antimalaria baru. Malaria masih merupakan penyakit di masyarakat Indonesia terutama di daerah yang masih belum berkembang. Diperkirakan 60 % penduduk Indonesia tinggal di daerah endemik malaria yang tingkat endemisitasnya beragam (Tjitra, E, 2004).

Gejala yang tipikal adalah berganti-gantinya panas-dingin, disebabkan panas yang tinggi dan terdiri dari tiga gejala, yaitu menggigil (stadium frigris), panas (stadium caloris), berkeringat (stadium sudoris). Bagi awam, gejala ini hampir sama untuk ke empat jenis Malaria, maka konfirmasinya seringkali dilakukan atas dasar pemeriksaan darah. Malaria disebabkan oleh protozoa, yaitu, plasmosium Malariae yang terdiri atas empat spesies (Cut Irsanya, 2005).

1. *P. vivax* menyebabkan Malaria tertiana,
2. *P. Malariae* menyebabkan Malaria quartana,
3. *P. falciparum* menyebabkan Malaria tropica, dan
4. *P. ovale* menyebabkan Malaria ovale

Kecuali Malaria tropica, yang sering menyebabkan kematian malaria yang lainnya dianggap jinak. Angka kematian berkisar antara 10% dan lebih. Ketiga malaria ini membuat penderita menjadi lemah, kurang darah karena sering kambuh. Demikian Malaria sangat menurunkan produktivitas dan memudahkan orang terkena penyakit lain. Selain itu penderita, sedemikian menjadi reservoir yang baik (tahunan) bagi empat plasmodium. Selain penderita, kerapun dapat menjadi reservoir bagi Malaria manusia. Pengobatan Malaria sampai saat ini belum dapat tuntas, sering menimbulkan efek sampingan, vaksinasipun belum dapat dilaksanakan (Cut Irsanya, 2005).

Gejala-gejala awal malaria non spesifik dan mirip dengan gejala-gejala suatu penyakit infeksi sistemik virus, seperti sakit kepala, kelesuan, kelelahan, rasa tidak enak pada bagian perut dan otot yang disertai sakit, diikuti dengan demam, menggigil, berkeringat, anoreksia, muntah dan rasa tidak enak badan yang semakin memburuk. Gambaran karakteristik lainnya dari malaria ialah demam periodik, anemia, trombositopeni dan splenomegali. Berat ringannya manifestasi malaria tergantung jenis plasmodium yang menyebabkan infeksi dan imunitas penderita (Aswad, M., 2009).

a. Siklus hidup *Plasmodium* malaria

Dalam siklus hidupnya Plasmodium mempunyai 2 hospes yaitu pada manusia dan nyamuk. Siklus aseksual yang berlangsung pada malaria disebut skizogoni dan siklus seksual yang membentuk *sporozoit* di dalam nyamuk disebut sporogoni (Zein, U, 2005).


1. Siklus aseksual

Sporozoit infeksius dari kelenjar ludah nyamuk anopheles betina dimasukkan dalam darah manusia melalui tusukan nyamuk tersebut. Dalam waktu 30 menit, jasad tersebut memasuki sel-sel parenkim hati dan dimulai stadium eksoeritrositik dari daur hidupnya. Di dalam sel hati parasit tumbuh menjadi skizon dan berkembang menjadi merozoit. Sel hati yang mengandung parasit pecah dan merozoit keluar dengan bebas, sebagian di fagosit. Oleh karena prosesnya terjadi sebelum memasuki eritrosit maka disebut stadium preeritrositik atau eksoeritrositik. Siklus eritrositik dimulai saat merozoit memasuki sel-sel darah merah. Parasit tampak sebagai kromatin kecil, dikelilingi oleh sitoplasma yang membesar, bentuk tidak teratur dan membentuk tropozoit, tropozoit berkembang menjadi skizon muda, kemudian berkembang menjadi skizon matang dan membelah banyak menjadi merozit. Dengan selesainya pembelahan tersebut sel darah merah pecah dan merozoit, pigmen dan sisa sel keluar dan memasuki plasma darah. Parasit memasuki sel darah merah lainnya untuk mengulangi siklus skizogoni. Beberapa merozoit memasuki eritrosit dan


membentuk skizon dan lainnya membentuk gametosit yaitu bentuk seksual (Zein, U, 2005).

2. Siklus seksual

Terjadi dalam tubuh nyamuk. Gametosit yang bersama darah tidak dicerna oleh sel-sel lain. Pada makrogamet (jantan) kromatin membagi 6 – 8 inti yang bergerak kepinggir parasit. Di pinggir ini beberapa filament dibentuk menjadi cambuk dan bergerak aktif disebut mikrogamet. Pembuahan terjadi karena masuknya mikrogamet ke dalam makrogamet untuk membentuk zigot. Zigot berubah membentuk cacing pendek disebut ookinet yang dapat menembus lapisan epitel dan membrane basal dinding lambung. Di tempat ini, ookinet membesar membentuk ookista. Di dalam ookista dibentuk ribuan sporozoit dan beberapa sporozoit menembus kelenjar nyamuk dan bila nyamuk menggigit/menusuk manusia maka sporozoit masuk ke dalam darah dan mulailah siklus preeritrositik (Zein, U, 2005).



Gambar 2. Skema siklus hidup *Plasmodium falciparum*.



Gambar 3. Skema siklus hidup *Plasmodium falciparum*
(Taylor, T.E.dkk, 2000)

b. Obat-obat antimalaria

Berdasarkan rumus kimianya, obat-obat antimalaria dapat digolongkan sebagai berikut

1. Alkaloida chinchona : kina, kinidin.
2. 4-aminokuinolin : klorokuin, amodiakuin.
3. 8-aminokuinolin : primakuin, kinosid.
4. Diaminopirimidin : pirimetamin, trimetoprim.

5. Sulfanamida : sulfadoksin, sulfadiazin, sulfalen. Sulfon dapsone.
6. 9-aminoakridin : meflokin.
7. Biguanida : proguanil, klorproguanil, sikloguanil.
8. Tetrasiklin : tetrasiklin, doksisisiklin, minosiklin.
9. Antibiotik lain : klindamisin, eritromisin
10. 4-metanolkuinolin : meflokin.
11. Penantren metanol : halofantrin.
12. Seskuiterpen lakton : qinghaosu. Seskuiterpen peroksid : yingzhaosu.
13. Pironaridin
14. Lain-lain.

Berdasarkan efek atau kerja obat pada stadia parasit, obat-obat antimalaria dapat digolongkan sebagai berikut

1. Schizotonsida jaringan primer (pre-eritrositer): Digunakan untuk profilaksis kausal, obat kelompok ini menghancurkan bentuk jaringan primer plasmodia dan merozoit di hati, dimulai dari tahap infeksi eritrositik, kemudian mencegah invasi eritrosit dan lain-lain. Penyebaran infeksi nyamuk *Anopheles*. contoh: 4-aminokuinolin, diazepam, biguanida, sulfanamida, dan tetrasiklin.
2. Schizotonsida jaringan sekunder (ekso eritrositer) : Digunakan untuk mencegah relaps, obat kelompok ini bekerja pada bentuk schizont di

jaringan laten, jaringan sekunder atau hipnozoit dari *Plasmodium vivax* dan *Plasmodium ovale* di sel hati, contoh : 8-aminokuinolin.

3. Schizontosida darah (eritrosit): Digunakan untuk penyembuhan klinis atau supresi, obat kelompok ini bekerja terhadap merozoit pada fase eritrositik aseksual dari parasit malaria dan mengganggu schizogoni eritrositik. Berdasarkan masa kerjanya kelompok ini dibagi menjadi dua, yaitu

- a. Schizontosida yang bekerja secara cepat
- b. Schizontosida yang bekerja secara lambat

Contoh : alkaloida chinchona, 4-aminokuinolin, sulfanamida, sulfon, dan 9-aminoakridin.

4. Gametositosida : Digunakan untuk membunuh bentuk seksual parasit malaria sehingga mencegah penyebaran plasmodia nyamuk *Anopheles*. Contoh : alkaloida chinchona, 4-aminokuinolin, dan 8-aminokuinolin.
5. Sporontosida. Digunakan untuk mencegah pembentukan ookist dan sporozoit dalam tubuh nyamuk : diaminopirimidin, sulfanamida, dan biguanida.
6. Sporozoitosida. Obat kelompok ini mampu membunuh sporozoit segera setelah masuk dalam darah sesudah gigitan nyamuk. Waktu untuk bekerja obat sangat singkat oleh karena sporozoit secara cepat masuk ke sel hati sehingga banyak obat antimalaria kurang efektif

terhadap sporozoit tersebut : klorguanid, primetamin, dan primakuin
(Tjitra, E, 1993; Aswad, M., 2009).

c. Mekanisme kerja obat antimalaria

1. Berinteraksi dengan DNA (asam deoksiribonukleotida)

Turunan 9-aminoakridin, 4-aminokuinolin, 8-aminokuinolin dan kuinoluinometanol menunjukkan efek schizotonsid yang cepat dengan cara berinteraksi dengan DNA parasit. Turunan diatas mempunyai sistim cincin dasar, dapat mengadakan interkalasi dengan pasangan basa dobel heliks DNA.

Kuinin, dapat mengikat DNA melalui tiga jalur, yaitu :

- a. Cincin kuinolin berinterkalasi di antara pasangan basa dobel heliks DNA, membentuk kompleks alih muatan.
- b. Gugus hidroksil alkohol membentuk ikatan hidrogen dengan salah satu pasangan basa.
- c. Gugus kompleks kuinuklidin terproyeksi pada salah satu alur DNA, dan gugus amin alifatik tersier yang terprotonisasi membentuk ikatan ion dengan gugus fosfat dobel heliks DNA yang bermuatan negatif.

Pembentukan kompleks akan menurunkan keefektifan DNA parasit untuk bekerja sebagai *template* enzim DNA dan RNA (asam ribonukleotida) polimerase sehingga terjadi pemblokkan sintesis DNA dan RNA (Purnomo Hadi.,2007, Aswad, M., 2009).

Turunan aminokuinolin, membentuk kompleks dengan DNA melalui dua jalur, yaitu :

- a. Gugus amin alifatik tersier rantai samping yang terprotonisasi, membentuk ikatan ion dengan gugus fosfat double heliks DNA yang bermuatan negatif, melalui celah minor.
- b. Alih muatan yang lebih khas atau interaksi hidrofob yang melibatkan cincin aromatik dan pasangan basa guanin-sitosin DNA.

Klorokuin dan amidokuin, membentuk kompleks dengan DNA melalui dua jalur, yaitu ;

- a. Gugus amin alifatik tersier rantai samping yang terprotonisasi membentuk ikatan ion dengan gugus fosfat double heliks DNA yang bermuatan negatif.
- b. Gugus 7-Cl dapat membentuk ikatan elektrostatik dengan gugus 2-amino guanine yang bersifat khas (Siswandono & Soekardjo, B., 2000).

2. Menghambat enzim dihidrofolat reduktase

Turunan biguanida dan diaminopirimidin, mempunyai aktivitas antimalaria karena menghambat secara selektif enzim dihidrofolat menjadi asam tetrahidrofolat pada parasit. Penghambatan ini mempengaruhi biosintesis plasmodia terutama pembentukan basa purin, pirimidin dan DNA. Meskipun turunan ini tidak bekerja secara selektif terhadap enzim parasit, tetapi dapat mengikat enzim dihidrofolat reduktase plasmodia lebih kuat dibanding isoenzim pada tuan rumah. Efek pemblokiran ini tidak berbahaya bagi tuan rumah karena asam folinat yang diperlukan dipasok dari luar melalui makanan (Purnomo Hadi.,2007, Aswad, M., 2009).

3. Menghambat enzim dihidropteroat sintetase

Turunan sulfonamide dan sulfon bekerja sebagai antimalaria karena dapat menghambat secara selektif enzim dihidropteroat sintetase, yang mengkatalisis kondensasi ester pirofosfat dari 2-amino-4-okso-6-hidroksimetildihidropteridin dengan asam p-aminobenzoat dengan asam dihidropteroat. Hambatan ini dapat menyebabkan kematian parasit (Purnomo Hadi.,2007, Aswad, M., 2009).

4. Menghambat sintesis protein

Tetrasiklin, eritromisin, makrolida dan seskuiterpen lakton bekerja sebagai antimalaria terutama dengan menghambat sintesis protein parasit (Aswad, M., 2009).

5. Mekanisme kerja lain-lain


Klorokuin, sinkonin, kuinidin dan kuinin dapat mengikat dengan afinitas yang tinggi feriprotoporfirin IX, suatu gugus prostetik dan hemoglobin, mioglobin dan enzim tertentu, membentuk kompleks koordinasi, menyebabkan kerusakan dan lisisnya membrane parasit malaria. Klorokuin juga menghambat ornitin dekarboksilase, suatu enzim yang membatasi kecepatan reaksi biosintesis poliami (Purnomo Hadi.,2007, Aswad, M, 2009).

C. Halofantrin

Merupakan obat antimalaria golongan fenantren metanol. Obat ini belum terdaftar dan beredar di Indonesia. Dibeberapa negara (Perancis dan negara-negara Afrika Barat) obat ini dalam waktu dekat akan dipakai. Di Indonesia obat ini sedang diteliti. Adapun kerja obat ini adalah sisontosida darah untuk keempat spesies plasmodium manusia. Dikemas dalam bentuk 250 mg/tablet, 500 mg/kapsul, dan 100 atau 250 mg/5 mL suspensi. Diberikan secara oral dengan dosis untuk anak-anak 810 mg/kgbb, tiap 6 jam, dengan dosis total 24 mg/kgbb. Untuk orang dewasa (> 12 tahun) diberikan 500 mg tiap 6 jam, dengan dosis total 1500 mg. Tidak diberikan pada wanita hamil dan menyusui karena mempunyai efek fetotoksik pada binatang percobaan. Waktu paruh halofantrin adalah 12 hari, dan konsentrasi dalam plasma mencapai puncaknya dalam 6 jam. Belum ditemukan kasus resistensi silang dengan obat-obat antimalaria lainnya (Kline, S, 1989 ; Tjitra, E, 2004).

Efikasi obat ini baik, dengan angka penyembuhan mendekati 100%, waktu bebas demam 13 hari, dan bebas parasit 23 hari. Efek samping obat ini ringan dan sementara yaitu gangguan saluran pencernaan : mual, sakit perut, dan diare (Kline, S, 1989 ; Tjitra, E, 2004).

Salah satu usaha menemukan antimalaria baru dapat dilakukan melalui farmakomodulasi senyawa antimalaria yang sudah dikenal aktivitasnya. Halofantrin merupakan antimalaria baru yang dikembangkan dari golongan fenantren. Halofantrin aktif melawan plasmodium yang resisten terhadap klorokuin . Namun demikian karena ketersediaan hayatinya yang rendah, profil kinetiknya bervariasi, dan efek sampingnya pada jantung yang cukup membahayakan maka penggunaan halofantrin terbatas di negara tertentu utamanya di Afrika (Mustofa, 2002).



Gambar 4. Struktur senyawa 1,10-fenantrolin tersubstitusi dan penomoran atom penyusun kerangka utama (Mustofa, 2002).

Tabel 2.Data struktur turunan fenantrolin-1,10 dan aktivitas antiplasmodialnya (IC₅₀ dalam μM) pada strain Nigerian setelah 24 jam inkubasi (Mustofa, 2002).

No.	Substituen					IC ₅₀ (μM)
	R'	R''	R ₁	R ₂	R ₃	
1.	H	H	H	H	H	1,28
2.	H	NO ₂	H	H	H	1,37
3.	H	H	CH ₃	C ₂ H ₄ Cl	Cl	2,32
4.	CH ₃	H	CH ₃	C ₂ H ₄ Cl	Cl	0,16
5.	C ₂ H ₅	H	CH ₃	C ₂ H ₄ Cl	Cl	0,16
6.	C ₂ H ₄ OH	H	CH ₃	C ₂ H ₄ Cl	Cl	1,06
7.	C ₃ H ₇	H	CH ₃	C ₂ H ₄ Cl	Cl	0,15
8.	C ₇ H ₁₅	H	CH ₃	C ₂ H ₄ Cl	Cl	0,37
9.	H	H	CH ₃	C ₂ H ₄ Cl	Cl	0,71
10.	H	H	CH ₃	C ₂ H ₃	Cl	3,29
11.	CH ₃	H	CH ₃	C ₂ H ₃	Cl	0,35
12.	H	H	CH ₃	C ₂ H ₃	OH	6,08
13.	H	H	CH ₃			19,84

F. Tinjauan Islam Terhadap Kesehatan, Ilmu Kimia dan pengobatan


1. Islam Terhadap Kesehatan

Islam memiliki perbedaan yang nyata dengan agama-agama lain di muka bumi ini. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Sang Khalik-Nya dan alam syurga, namun Islam memiliki aturan dan tuntutan yang bersifat komprehensif, harmonis, jelas

dan logis. Salah satu kelebihan Islam yang akan dibahas adalah perihal perspektif Islam dalam mengajarkan kesehatan individu maupun masyarakat (Widyaswara, 2009).

Dalam Islam, kesehatan termasuk hal utama. Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa banyak ayat Al-Qur'an dan hadist yang berkaitan dengan kesehatan. Sejak Islam pertama kali diterimakan kepada Nabi Muhammad SAW., yakni pada ayat kedua surat Al 'Alaq sudah terkandung masalah ilmu kedokteran, yakni masalah kejadian manusia yang menjadi dasar ilmu kedokteran (Suryo, 2010).

Sebagaimana pada QS. Al Alaq (96): 2



Terjemahnya:

“Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah”

Kemudian berkembang menjadi ilmu mudighah (embriologi), ilmu faal (fisiologi), ilmu urai (anatomi), ilmu jaringan (histologi) dan seterusnya. Wahyu kedua yang dibawakan Jibril adalah Ayat 1-5 Surat Al Mudatstsir, wahyu tersebut belum mengenai shalat, puasa dan zakat tetapi perintah untuk berdakwah dan mengenai kesucian (kebersihan) dan menjauhi kekotoran (Suryo, 2010).

Sebagaimana dalam QS Al Mudatstsir (74): 1-5

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ ١ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝ ٢ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ۝ ٣
وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ ۝ ٤ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ ٥

Terjemahnya:

“Hai orang yang berselimut, bangkitlah lalu beri peringatan!, Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu sucikanlah dan tinggalkanlah segala macam kekotoran / dosa”

Pada ayat di atas tampak bahwa kebersihan yang menjadi pangkal kesehatanlah yang disinggung dalam wahyu kedua yang diturunkan kepada Nabi. Tidak heran kalau kebersihan umumnya merupakan salah satu kewajiban yang selalu diperintahkan Nabi Muhammad SAW dan dijadikan sendi dasar dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kesehatan moderen tetap masih berpendirian bahwa kebersihan merupakan pangkal kesehatan. Kebersihan yang menjadi pangkal kesehatan, hal kedua yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an. Tidaklah heran kalau kebersihan umumnya merupakan salah satu kewajiban yang selalu diperintahkan Nabi Muhammad SAW kepada para pengikutnya (Suryo, 2010).

Selain ayat terdahulu di atas, masalah kesehatan, khususnya tentang kebersihan juga disebutkan dalam QS AL-Baqarah : 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا ۗ وَالنِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ
حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝ ٢٢٢

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri”.

Aturan mengenai kebersihan cukup lengkap terdapat dalam Al-Qur’an, misalnya setiap berwudhu saat akan melakukan shalat. Al-Qur’an mewajibkan umat Islam mandi pada waktu tertentu, misal pada keadaan junub. Al-Qur’an juga mengharamkan minuman dan makanan yang kotor dan berbahaya (QS Al-A’raaf: 157 dan Al A’laa:14) (Suryo, 2010).

Demikian banyaknya perintah yang sangat terkait dengan kesehatan dengan ini dapat disimpulkan bahwa kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, Maka Islam menegaskan perlunya Istiqomah memantapkan dirinya dengan menegakkan ajaran Islam. Satu-satunya jalan dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Allah berfirman dalam Q.s Yunus 57 :

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي
 الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh-penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada)

dalam dada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orangnya yang beriman" (QS:Yunus 57).

2. Islam Terhadap Ilmu Kimia

Ilmu Kimia juga mendapatkan perhatian dan dorongan dari Al-Qur'an untuk dikembangkan. Manusia dan seluruh lingkungan hidupnya terbentuk dari elemen-elemen dan substansi-substansi yang tergabung menjadi sebuah ikatan kimia menurut hukum Allah. Manusia sendiri tercipta dari tanah liat kemungkinan melalui sebuah proses kimia interaktif antara berbagai unsur dalam tanah yang bekerja menurut hukum-hukum Allah melalui proses perubahan dan kombinasi tertentu. Penciptaan langit dan bumi dalam enam "periode" dan penciptaan alam semesta dari air juga terjadi menurut hukum kombinasi dan perubahan yang diciptakan Allah Swt. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menuturkan bagaimana Tuhan menciptakan langit, bumi, manusia, dan sebagainya, memberikan petunjuk yang kuat kepada para ilmuwan tentang membuat substansi baru dengan menggabungkan berbagai unsur dan tentang kemungkinan mempelajari reaksi kimia dari penggabungan unsur-unsur itu dengan berbagai proporsinya. Ayat berikut mengemukakan kekuatan "pewarnaan" yang dilakukan Tuhan dan memberikan inspirasi kepada para ilmuwan untuk melakukan proses kimiawi dengan mencampurkan berbagai unsur kimia dengan proporsi tertentu untuk membuat hal yang mirip dengan itu (Afzalur;2008).

ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah”.

Ayat-ayat tersebut mengundang perhatian kearah proses penciptaan manusia terutama berhubungan dengan terjadinya reaksi kimiawi dari substansi-substansi yang menjadi bahan baku penciptaannya dan pengaruhnya terhadap perilakunya sebagai makhluk hidup (Afzalur;2008).

Kemudian pada Q.S Fushshilat (41): 11-12

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا
 قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾
 فَقَضَيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزِينَا
 السَّمَاءَ الَّتِي بَيْنَ مَصْبِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

“Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi:”Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa.” Keduanya menjawab:”Kami datang dengan suka hati.” Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusan-Nya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami menjadikannya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang”.

Dan pada Q.S Ya Sin (36): 36

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ
 اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Ayat-ayat diatas dan ayat-ayat lain yang serupa dalam Al-Qur'an mengajak manusia memikirkan dan merenungkan proses penciptaan yang dilakukan Allah dengan berbagai konteksnya dan mendorong manusia mengadakan eksperimen tentang interaksi antarberbagai substansi yang berbeda, serta mengadakan studi tentang perubahan-perubahan kimiawi yang memunculkan substansi baru dan seterusnya. Bagaimana reaksi kimiawi benda-benda yang tidak bernyawa dapat menghasilkan makhluk hidup yang bernama manusia dan Komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam tanah menjadi bahan dasar penciptaan manusia. Kemudian reaksi dari unsur-unsur apa saja yang menghasilkan makhluk yang mulia itu? Pertanyaan-pertanyaan ini dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang serupa dengan itu menggerakkan minat para ilmuwan berabad-abad lamanya untuk mengadakan eksperimen-eksperimen yang mencoba mengungkap rahasia bagaimana makhluk hidup terbentuk dari berbagai unsur. (Afzalur;2008). Ayat-ayat berikut memberikan inspirasi lebih jauh untuk melakukan penelitian lebih lanjut

Pada Q.S Al-an'am (6) ;95

﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ
مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴾ ٩٥

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan, Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. (Yang memiliki sifat-sifat) demikian ialah Allah, maka mengapa kamu masih berpaling?

Pada Q.S yunus (10): 31

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ
وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ
فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَعَلًا نَّنُقُونُ ﴾ ٣١

Terjemahnya:

Katakanlah:”Siapakah yang member rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?” Maka mereka akan menjawab:”Allah.” Maka katakanlah:”Mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?”

Ayat-ayat seperti itu tentu saja menunjuk pada kemungkinan ditemukannya substansi yang lebih unggul dan lebih bermanfaat lewat percampuran berbagai unsur, dan bahkan kemungkinan menemukan sebuah bentuk kehidupan yang merupakan hasil interaksi kimiawi dari beberapa komponen yang beranekaragam. Singkatnya, ayat-ayat tersebut jelas-jelas menggugah manusia agar melakukan penelitian lebih jauh dan lebih mendalam (Afzalur;2008).

Al-Qur'an bukanlah kitab ilmu pengetahuan atau kitab kimia dalam pengertian harfiahnya. Akan tetapi, Al-Qur'an adalah kitab petunjuk bagi umat manusia. Dalam berbagai konteks, Al-Qur'an memberikan petunjuk mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi manusia dan sekaligus menjadi gudang ilmu pengetahuan serta menjadi pintu pembuka untuk melakukan penelitian tentang berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, dalam Al-Qur'an di sana-sini kita temukan ayat-ayat yang mendorong pembacanya untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk ilmu kimia (Afzalur;2008).

C. Islam Terhadap Pengobatan

Istilah yang populer tentang obat dalam berbagai teks keagamaan ialah *dawa'* (bentuk tunggal) atau *adwiyah* (bentuk jamak). Sedangkan kata *da'* yang seakar dengan istilah di atas adalah penyakit.

Secara umum dapat ditemukan dalilnya pada hadis Nabi yang berbicara tentang penyakit dan obat sebagai berikut:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ

دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Terjemahnya:

“Setiap penyakit pasti ada obatnya. Apabila didapatkan obat yang cocok untuk menyembuhkan suatu penyakit maka penyakit itu akan hilang seizin Allah azza wa jalla (HR. Muslim).”

Ungkapan, “Setiap penyakit ada obatnya,” artinya bisa bersifat umum, Sehingga termasuk di dalamnya penyakit-penyakit mematikan dan berbagai penyakit yang tidak bisa di sembuhkan oleh para dokter. Allah sendiri telah menjadikan untuk penyakit tersebut obat-obatan yang dapat menyembuhkannya. Akan tetapi ilmu tersebut tidak ditempatkan Allah kepada umat manusia, dan mereka tidak diperkenangkan oleh Allah untuk menggapainya. Oleh sebab itu, kesembuhan terhadap penyakit dikaitkan oleh Rasulullah dengan proses “kecocokan” obat dengan penyakit yang diobati.

Setiap ciptaan Allah itu pasti ada anti penawarnya. Maka setiap penyakit pasti ada obatnya yang menjadi anti penawarnya agar penyakit itu sembuh. Itu merupakan poin lebih dari hanya sekedar keberadaan obat itu. Karena kalau obat itu diberikan dengan cara yang kurang tepat, dengan diberikan dosis yang berlebih dari stadium penyakit dalam pemakaiannya atau jumlah dan kuantitasnya lebih dari yang seharusnya, justru itu bisa menyebabkan munculnya penyakit lain. Namun kalau dosisnya kurang, juga tidak bisa

mengobati dan pengobatan seperti ini tidaklah sempurna. Ketika orang yang diobati tidak menerima obat itu, atau obatnya tidak mengenai penyakitnya, maka tidak akan sembuh.

Kemudian dalam firman Allah SWT pada Q.S. an-Nahl (16) : 69

ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا
شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

Terjemahnya :

“Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang Telah dimudahkan (bagimu). dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.”

Ayat tersebut menjelaskan tentang manfaat sari buah dan kisah lebah yang mengeluarkan minuman yang berfungsi sebagai obat. Di dalam madu terdapat sari tumbuh-tumbuhan yang baik menghasilkan obat untuk kehidupan manusia.. Keduanya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah untuk manusia yang berfikir. Berfikir yang dimaksud adalah orang selalu meneliti secara ilmiah tentang kandungan yang terdapat pada tanaman dan lebah tersebut.

Soal penyakit adalah salah satu bentuk dinamika kehidupan yang diciptakan Allah swt. Ketika seseorang jatuh sakit, sesuatu yang amat

didambakan adalah nikmatnya kesehatan. Obat penawar setiap penyakit sudah disediakan Allah swt. Dan inilah tugas para ilmuwan (dokter, paramedis dan farmasis) untuk meneliti, melakukan diagnosa dan merancang formula obat yang lebih baik dan cocok.

Hal inilah sehingga pengobatan yang diperoleh dengan penelitian melalui mencari saripati yang ada dipermukaan bumi sebagai bentuk upaya pencarian fungsi dan pendayagunaan dari makhluk yang diciptakan Allah SWT.



BAB. III

METODE PENELITIAN

A. Alat dan Bahan

1. Alat-alat yang digunakan

Perangkat yang digunakan pada penelitian ini adalah perangkat keras berupa satu set komputer yang mampu melakukan perhitungan kimia komputasi dengan spesifikasi: Processor tipe AMD Turion (tm) Dual core Mobile M500 2,20GHz , RAM 2,00 GB, dan harddisk 231 GB serta perangkat lunak sistem operasi WindowsTM XP Professional, HyperChem[®] Release 7.5, dan SPSS 16.0 *for Windows*.

2. Data- data yang digunakan

Pada penelitian ini digunakan data base struktur molekul dan aktivitas antiplasmodial (IC₅₀) dari tiga belas senyawa turunan 1,10-fenantrolin tersubstitusi hasil penelitian penulis sebelumnya (Mustofa, 2002) . Senyawa-senyawa tersebut selengkapnya disajikan dalam Tabel 2 dan strukturnya disajikan dalam Gambar 4.

B. *Prosedur Penelitian*

1. *Optimasi Geometri dan Perhitungan Prediktor*

Setiap senyawa dibuat model struktur dua dimensinya menggunakan paket program HyperChem[®] 7.5 kemudian dilakukan penambahan atom H untuk melengkapi strukturnya lalu dibentuk menjadi struktur tiga dimensi. Struktur yang telah terbentuk dioptimasi geometri (minimasi energi) untuk memperoleh konformasi struktur yang paling stabil menggunakan metode semiempirik AM1 dengan batas konvergensi 0.001 kkal/(Å.mol) berdasarkan algoritma Polak–Ribiere. Proses selanjutnya adalah melakukan *start log* kemudian melakukan perhitungan *single point* untuk memperoleh nilai prediktor-prediktor. Terakhir dilakukan *stop log* untuk mengakhiri proses perekaman hasil perhitungan (*output* tersimpan sebagai *file.log*).

2. *Penentuan besaran prediktor*

Prediktor atau deskriptor ditentukan besarannya dengan menggunakan sub program prediktor pada program HyperChem[®] yaitu *QSAR Properties* dan data *file.log* hasil perhitungan *single point*. Hasil perhitungan prediktor disusun dalam suatu data base. Parameter-parameter yang digunakan pada penelitian ini adalah Parameter sterik, hidrofobik, elektronik.

3. Pengumpulan dan Analisa Data

Analisis Statistik

Dengan program SPSS 16.0 *for windows* dilakukan analisis regresi multilinier dimana parameter hidrofobik, elektronik dan sterik sebagai variabel bebas dan $\log IC_{50}$ sebagai variabel tak bebas.

Pemilihan model persamaan terbaik hasil analisis regresi multilinier dilakukan dengan mempertimbangkan parameter statistik F, R, R^2 , dan SE. Model persamaan yang terpilih kemudian divalidasi keakuratan prediksinya menggunakan metode *leave-one-out cross validation* (validasi silang kurang satu) dengan mempertimbangkan parameter statistik PRESS, SD, dan r^2_{cv} . Model persamaan terbaik hasil validasi silang yang diperolehlah yang digunakan untuk memprediksi harga aktivitas antimalaria teoritif setiap senyawa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini diperoleh hasil berupa model persamaan terbaik berdasarkan analisis Regresi multilinear dan rancangan struktur senyawa baru dari persamaan terbaik regresi multilinear yaitu;

1. $\text{Log}(1/\text{IC}_{50}) = (-2,859 \pm 3,158) + (0,178 \pm 0,039) E \text{ Hidrasi} - (0,391 \pm 0,198) E \text{ Homo} - (0,041 \pm 0,024) \text{ Polarisabilitas}$
2. Gambar Struktur Senyawa turunan baru dengan nilai IC_{50} sebesar **0,144** (μM)



Gambar 5. Struktur senyawa turunan baru hasil rancangan dengan nilai IC_{50} sebesar **0,144** (μM).

B. Pembahasan

a. HKSA Senyawa turunan 1,10-Fenantrolin

Halofantrin merupakan antimalaria baru yang dikembangkan dari golongan fenantren, Halofantrin merupakan senyawa yang aktif terhadap Plasmodium yang resisten terhadap klorokuin. Namun dengan berbagai efek samping yang sangat besar maka dikembangkan suatu senyawa antimalaria golongan fenantren dengan modifikasi struktur senyawa yaitu penambahan atom nitrogen dari kerangka fenantren. Setelah evaluasi, Senyawa 1,10-Fenantrolin merupakan senyawa dengan aktifitas antispasmodial yang paling baik dengan nilai IC_{50} (*Inhibitory Concentration 50%*) berkisar 2 μ M terhadap strain *Plasmodium falciparum* yang resisten klorokuin (strain FcB1) maupun yang sensitif klorokuin (strain Nigerian). Disamping itu dengan asumsi bahwa terdapat hubungan kuantitatif antara struktur dan aktifitas biologis dari suatu molekul maka pengembangan senyawa antimalaria yang lebih potensial dan aman dapat dilakukan dengan metode analisis Hubungan kuantitatif struktur-aktifitas (Mustofa,2002).

1. Perhitungan Nilai Deskriptor Menggunakan Metode Semiempirik AM1.

Data struktur dan aktivitas biologis yang digunakan berjumlah 13 senyawa turunan. Setiap senyawa yang telah dibentuk dalam program Hyperchem kemudian dioptimasi geometri agar didapatkan konformasi

struktur molekul terstabil menggunakan metode semiempirik AM1. Metode semiempiris AM1 dipilih karena metode ini merupakan pengembangan dan perbaikan dari metode semiempiris sebelumnya seperti MNDO, dapat memprediksi senyawa-senyawa yang memiliki valensi banyak dengan ketepatan lebih baik dan juga karena keterbatasan kemampuan komputer. Batas konvergensi ditentukan setelah mencapai batas gradient perubahan energi per perubahan posisi sebesar $0,001 \text{ kkal}/(\text{Å}\cdot\text{mol})$ berdasarkan metode optimisasi algoritma Polak–Ribiere. Setelah itu dilakukan perhitungan *single poin* pada subprogram analisis yang ada pada Hyperchem. Nilai dari setiap prediktor dilihat pada file rekaman berekstensi *file.log* berupa hasil perhitungan dari setiap senyawa yang teroptimasi kemudian diambil beberapa hasil perhitungan berupa Energi Elektronik, Energi Total, Energi Ikat dan Momen Dipol yang kemudian digunakan sebagai prediktor. Kemudian prediktor-prediktor yang lain diperoleh dengan perhitungan langsung dari subprogram *QSAR Properties* berupa log P, Hidrasi energi, Polarisibilitas, Refraktifitas, Massa, dan Volume, dan nilai prediktor E_{HOMO} dan E_{LUMO} yang diperoleh setelah dilakukan perhitungan *the force matrix*. Nilai dari setiap parameter dapat dilihat pada lampiran.

2. Hasil Analisis Regresi Multilinier

Analisis regresi multilinier dilakukan terhadap 13 turunan 1,10-Fenantrolin dimana parameter molekular yaitu Energi Total, Energi Ikat, Energi Elektronik, Log P, Polarisibilitas, Refraktifitas, Hidrasi Energi,

Massa, Volume, μ , E_{HOMO} , dan E_{LUMO} sebagai variabel bebas dan aktivitas antimalaria (Log IC_{50}) sebagai variabel tak bebas menggunakan metode *enter*.

Metode *enter* atau biasa disebut dengan metode *Forced entry* merupakan salah satu metode regresi linear berganda yang terdapat dalam program SPSS dimana prinsip dari metode ini yaitu memasukkan semua variabel independen atau disebut prediktor secara simultan ke dalam model regresi tanpa melewati kriteria kemaknaan statistik tertentu, berbeda dengan metode seleksi lainnya yang mempunyai kriteria statistik tertentu seperti *Backward*, *Forward* dan *Stepwise* (Waufal, 2003).

Model persamaan terpilih hasil analisis regresi multilinier disajikan pada tabel 3 Model terpilih berjumlah 15 persamaan yang melibatkan 2-5 prediktor atau deskriptor.

Tabel 3. Model persamaan terpilih hasil analisis regresi multilinier

NO.	DESKRIPTOR	N	M	R	R ²	SE	F	F t	F/Ft
1	E Hidrasi, E ikat	13	2	0.868	0.754	0.353	15.305	4.1	3.723
2	E Hidrasi, E Homo	13	2	0.865	0.749	0.357	14.898	4.1	3.633
3	E Hidrasi, Polarisibilitas	13	2	0.854	0.73	0.37	14.486	4.1	3.289
4	E Hidrasi, Refraktifitas	13	2	0.853	0.728	0.371	13.397	4.1	3.267
5	E Hidrasi, E Homo, Massa	13	3	0.895	0.801	0.335	12.086	3.86	3.131
6	E Hidrasi, E Homo, Polarisibilitas	13	3	0.901	0.811	0.326	12.882	3.86	3.337
7	E Hidrasi, E Homo, volume	13	3	0.902	0.813	0.324	13.06	3.86	3.383
8	E Hidrasi, Refraktifitas, E Total	13	3	0.903	0.816	0.322	13.269	3.86	3.437
9	E Hidrasi, E Ikat, E Total, Momen dipole	13	4	0.921	0.848	0.31	11.171	3.84	2.909
10	E Hidrasi, Massa, Polarisibilitas, Momendipol	13	4	0.915	0.837	0.322	10.241	3.84	2.666
11	E Hidrasi, Polarisibilitas, E Total, E Elektronik	13	4	0.912	0.832	0.326	9.899	3.84	2.577
12	E Hidrasi, Refraktifitas, E Total, E Elektronik.	13	4	0.911	0.83	0.328	9.792	3.84	2.550
13	E Ikat, E Hidrasi, E Total, E Elektronik, Polarisibilitas.	13	5	0.964	0.929	0.227	18.219	3.97	4.589
14	E Ikat, E Hidrasi, E Total, E Elektronik, Refractifitas	13	5	0.949	0.901	0.267	12.789	3.97	3.221
15	E Hidrasi, massa, Log p, Refraktifitas, E Total	13	5	0.95	0.903	0.264	13.098	3.97	3.299

Keterangan: n= jumlah data; m = jumlah variabel yang masuk dalam persamaan; R dan R² koefisien korelasi; SE = standar Error; F = kriteria Fisher hasil analisis ANOVA.

Dari tabel 3 terlihat bahwa penggunaan metode AM1 menghasilkan 15 model terpilih dimana deskriptor yang digunakan berkisar antara 2-5 deskriptor. Semua model persamaan yang ada pada tabel adalah model persamaan terpilih sebab berdasarkan kriteria statistik nilai koefisien

regresi (R) semua model persamaan terpilih memiliki nilai yang sangat baik yaitu mendekati nilai 1, Ini menunjukkan tingkat hubungan yang cukup tinggi antara variabel dependen dengan variabel independen. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) semua model tersebut lebih besar dari 0,868 artinya lebih dari $0,868 \times 100\% = 86,8\%$ aktivitas biologis yang dapat dijelaskan oleh setiap persamaan. Kesalahan baku (SE) yang sangat kecil dari setiap persamaan menandakan bahwa derajat kemaknaan hubungan sangat tinggi. Serta nilai F yang lebih besar daripada F_{TABEL} $\alpha_{0,05}$, maka ada pengaruh secara signifikan antara variable terikat dan tak terikat.

3. Hasil Metode Validasi Silang *Leave-One-Out*

Analisis regresi multilinier dapat menentukan beberapa persamaan terpilih tetapi tidak dapat menentukan mana persamaan terbaik jika semua persamaan yang terpilih tersebut memiliki selisih nilai parameter statistik yang cukup kecil. Maka untuk menguji validitas dan keakuratan prediksi yang dihasilkan oleh analisis regresi multilinier diperlukan sejumlah data uji di luar data yang digunakan dalam fitting regresi. Namun jika jumlah data terbatas, ada metode yang disebut metode validasi silang (Sembiring, 1995).

Salah satu jenis dari metode validasi silang adalah metode validasi silang *leave-one-out* yang dikenal juga sebagai metode validasi silang kurang satu. Pada metode ini digunakan senyawa sebanyak $(n-1)$ buah untuk fitting dan kemudian persamaan yang diperoleh diuji dengan data uji yang dikeluarkan tersebut. Proses ini berulang terus hingga setiap senyawa terprediksi satu kali. Parameter yang digunakan untuk memperoleh model persamaan terbaik meliputi nilai PRESS, SD_{PRESS} , dan r^2_{cv} (Sembiring, 1995).

Penelitian ini menggunakan 13 buah senyawa dengan model persamaan terpilih sebanyak 15 buah artinya ketika melakukan validasi silang akan dihasilkan 195 persamaan baru. Dengan persamaan-persamaan baru tersebut kemudian dihitung nilai PRESS, SD_{PRESS} , dan r^2_{cv} dari setiap model terpilih atau yang memenuhi kriteria.


Berdasarkan hasil validasi silang yang dilakukan terhadap 15 persamaan yang terpilih maka diperoleh nilai PRESS, SD_{PRESS} , dan r^2_{cv} . Model yang mempunyai nilai PRESS terkecil, r^2_{cv} yang terbesar (mendekati 1), SD yang terkecil dan merupakan model yang terbaik yang diuraikan pada tabel 5.

Tabel 4. Nilai PRESS, SD_{PRESS} , dan r^2_{cv} dari 15 persamaan terpilih

No.	PRESS	SD_{press}	r^2_{cv}
1.	2,6630	0,4922	0,7951
2.	2.6047	0,4866	0,7996
3.	2,9663	0,5192	0,7718
4.	3,0411	0,5257	0,7660
5.	2,5068	0,4773	0,8071
6.	2,3269	0,4599	0,8210
7.	4,9547	0,6611	0,6188
8.	2,8699	0,5109	0,7792
9.	2.5498	0,4814	0,8038
10.	3.0323	0,5250	0,7667
11.	7,5266	0,8271	0,4210
12.	6.7991	0,7861	0,4769
13.	3,0244	0,5243	0,7673
14.	8,6557	0,8870	0,3341
15.	4,2714	0,6231	0,6714

Nilai parameter yang tercetak tebal merupakan model Terbaik berdasarkan metode validasi silang *Leave-One-Out* dibandingkan model-model lain. Diperoleh model 6 sebagai model terbaik dengan harga PRESS sebesar 2,3269, R^2_{cv} sebesar 0,8210, dan SD_{press} sebesar 0,4599.

Kemudian dari persamaan terbaik itu dilakukan pengujian untuk melihat secara matematis seberapa baik persamaan model 6 tersebut dapat memprediksi harga aktifitas farmakologi dengan cara membuat grafik linier antara nilai $\text{Log}(1/IC_{50})$ eksperimen dengan $\text{Log}(1/IC_{50})$ prediksi.



Gambar 6. Grafik $\text{Log}(1/IC_{50})$ eksperimen (x) versus $\text{Log}(1/IC_{50})$ prediksi (y).

Dari hasil gambar tersebut maka dapat diketahui bahwa model persamaan yang ke 6 mampu memprediksi dengan cukup baik aktifitas farmakologi dari seri senyawa turunan 1,10-Fenantrolin walaupun masih ada beberapa nilai aktifitas prediksi yang perbedaannya cukup jauh, namun

hal ini didukung dengan nilai koefisien korelasi (R) yang cukup baik yakni sebesar 0,8111.

B. Desain Senyawa Turunan Baru

Setelah melakukan uji prediksi terhadap model persamaan yang terpilih selanjutnya maka dibuat sebuah persamaan regresi berdasarkan rumus yang dijabarkan dalam analisis hubungan kuantitatif struktur-aktifitas model Hansch.

Model persamaan terbaik adalah mengikuti model persamaan regresi multiliner yang ke-6 yaitu:

$$\text{Log}(1/\text{IC}_{50}) = (-2,859 \pm 3,158) + (0,178 \pm 0,039) E \text{ Hidrasi} - (0,391 \pm 0,198) E \text{ Homo} - (0,041 \pm 0,024) \text{ Polarisabilitas}$$

Dari model persamaan terbaik diatas didapatkan bahwa ada 3 buah prediktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan model senyawa yang didasarkan pada perhitungan pengaruh aktifitas biologis, dan dengan persamaan tersebut senyawa antimalaria turunan 1,10-Fenantrolin dikatakan menguntungkan apabila harga variabel tidak bebas berupa $\text{Log}(1/\text{IC}_{50})$ semakin tinggi sehingga nantinya nilai IC_{50} memberikan nilai semakin rendah. Bilangan yang berada di depan tanda (\pm) merupakan tetapan untuk setiap variabel sedangkan bilangan yang berada di belakang tanda (\pm) menggambarkan kesalahan baku koefisien yang berarti apabila percobaan tersebut diulang maka nilai dari koefisien akan terletak antara kedua bilangan tersebut, semakin tinggi kesalahan baku koefisien maka semakin kecil koefisien tersebut dapat dipercaya dan semakin kecil pula kemungkinan variabel tersebut dapat

dihubungkan dengan aktifitas biologis. Variabel yang menunjukkan nilai negatif akan menurunkan besaran aktifitas biologis sedangkan yang menunjukkan nilai positif akan menaikkan besaran aktifitas biologis.

Pada persamaan diatas terdapat 3 buah prediktor yang mempengaruhi besaran aktifitas biologis berdasarkan analisis regresi, Prediktor - prediktor tersebut merupakan parameter molekular yang digunakan dalam penelitian ini, dimana ketiga prediktor tersebut merupakan parameter elektronik yaitu energi Hidrasi, Polarisabilitas (α) dan energi Homo.

Energi orbital tertinggi yang terisi elektron (*Highest Occupied Molekular Orbital, HOMO*) dan energi orbital terendah yang tak terisi elektron (*Lowest Unoccupied Molekular Orbital*) adalah prediktor kimia kuantum yang bertanggung jawab dalam pembentukan kompleks perpindahan muatan. Menurut teori orbital molekular terdepan (*Frontier Molekular Orbital Theory*). Interaksi antara sebuah orbital kosong dan sebuah pasangan elektron terjadi secara efektif antara sebuah Homo dari suatu spesies dan sebuah Lumo dari spesies yang lain. Energi Homo dikaitkan dengan potensial ionisasi dan memberikan sifat kerentanan molekul terhadap serangan elektrofil, yang berarti dengan energi Homo yang rendah akan memiliki nilai energi ionisasi yang besar, dengan energi ionisasi yang besar akan meningkatkan pula kinerja dari senyawa turunan 1,10-Fenantrolin, Ini disebabkan karena mekanisme kerja dari 1,10-Fenantrolin yaitu membentuk suatu ikatan kompleks atau khelat dengan senyawa feriprotopofirin IX, dimana pembentukan khelat ini merupakan reaksi

ikatan antar ion antara ligan dari senyawa dan unsur besi di dalam senyawa feriprotopofirin yang nantinya akan membentuk khelat dan nantinya bersifat toksik serta dapat mematikan schizont (Leach, 1996; Anonim, 2010).

Polarisabilitas adalah kemampuan untuk melakukan polarisasi, atau menuju sifat kepolaran yang tinggi, di dalam persamaan hasil regresi menandakan bahwa sifat kepolaran yang tinggi akan menurunkan aktifitas biologis dengan senyawa, ini menandakan bahwa kemampuan untuk meningkatkan aktifitas biologis secara teoritif bergantung pada sifat hidrofobitasnya, apabila mempunyai polarisabilitas yang rendah akan meningkatkan aktifitas karena mekanisme kerja dari senyawa 1,10-Fenantrolin berlangsung di sel yang artinya harus mempunyai sifat hidrofobitas yang baik dalam melakukan penetrasi kedalam membran sel. Energi Hidrasi atau biasa disebut dengan entalpi hidrasi adalah jumlah energi yang dilepaskan ketika satu mol ion larut dalam sejumlah pelarut air, dimana energi hidrasi ini tergantung pada jari-jari daripada ion dan sifat elektronegatifan dari elemen. Energi ini berperan dalam interaksi antara ion dan berpengaruh dalam peningkatan aktifitas biologis dari senyawa turunan 1,10-Fenantrolin apabila memiliki nilai yang besar, ini terlihat pada persamaan hasil analisis regresi dimana harga variabel dari energi hidrasi menunjukkan nilai positif yang berarti menaikkan aktifitas biologis, ini disebabkan karena untuk membentuk suatu kompleks yang kuat diperlukan energi ionisasi yang besar sehingga mempunyai energi

hidrasi yang tinggi dan nantinya akan memberikan kemampuan yang baik dalam reaksi antar unsur (Dean, 1995; Siswandono, 1998).

Setelah didapatkan persamaan terbaik hasil regresi multilinear, maka selanjutnya adalah prediksi senyawa turunan baru yang lebih potensial dan aman berdasarkan hasil persamaan terbaik dengan cara menggambar struktur 1,10-Fenantrolin pada program Hyperchem, Kemudian mencoba mengganti 1 atau 2 substituen pada percabangan rantai yang ada pada struktur dasar, dengan mengacu pada 13 senyawa turunan yang telah diketahui aktifitasnya, lalu dilakukan optimasi geometri untuk mendapatkan bentuk konformasi molekul yang paling stabil, Setelah itu dihitung pada senyawa tersebut nilai dari masing- masing prediktor yang berpengaruh sesuai dengan hasil persamaan, Lalu hasil perhitungan prediktor yang dilakukan secara komputasi tersebut kemudian dimasukkan kedalam persamaan regresi untuk selanjutnya dihitung aktifitas biologisnya. Hasil percobaan disajikan pada tabel 5 yang merupakan hasil percobaan senyawa baru berdasarkan perhitungan aktifitas biologis senyawa.

Tabel 5. Data struktur baru senyawa turunan 1,10-Fenantrolin dan aktifitas biologisnya (IC_{50}).

NO.	R'	R''	R ₁	R ₂	R ₃	IC ₅₀ (μM)
1	C ₄ H ₉	H	CH ₃	C ₂ H ₄ CL	CL	0.235
2	C ₅ H ₁₁	H	CH ₃	C ₂ H ₄ CL	CL	0.238
3	C ₃ H ₇	H	CH ₃	C ₂ H ₄ CL	F	0.187
4	C ₃ H ₇	H	CH ₃	C ₂ H ₄ F	CL	0.157
5	C ₃ H ₇	H	CH ₃	C ₂ H ₄ F	F	0.146
6	C₂H₅	H	CH₃	C₂H₄F	F	0.144

Data diatas merupakan hasil dari percobaan penggantian unsur dari substituen tertentu dan hasil diatas mengacu pada substituen turunan senyawa 1,10-Fenantrolin yang mempunyai nilai IC_{50} terbaik yaitu dengan nilai IC_{50} terendah yaitu pada senyawa turunan ke tujuh dengan nilai IC_{50} yaitu **0,15** (μM) yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Variasi struktur mengakibatkan perubahan sifat fisika dan reaktifitas kimia, yang selanjutnya mungkin menyebabkan perubahan distribusi dalam tubuh. Perubahan struktur kimia yang sangat kecil mungkin menemukan efek biologis yang semula tersembunyi atau tertutup oleh efek lain. Gagasan tentang gugus fungsional tertentu dapat memberikan petunjuk aktifitas biologis namun ini tidak dapat digunakan sebagai aturan umum tetapi biasanya dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menentukan uji biologis yang cocok. Dengan demikian prosedur modifikasi molekul dengan pendekatan pada gugus fungsional sering dilakukan . Data diatas merupakan hasil dari percobaan modifikasi struktur yang dilakukan dengan mencoba beberapa sistematika modifikasi, yang

pertama adalah mencoba melakukan percabangan rantai. Pengaruh sifat fisika, kimia dan biologis akan berubah seiring dengan perpanjangan rantai hidrokarbon, ini merupakan modifikasi molekul yang paling sederhana, banyak penelitian yang membenarkan bahwa kenaikan panjang rantai paralel dengan kenaikan aktifitas, ini yang coba kami lakukan pada turunan 1,10-Fenantrolin dengan mengacu pada turunan terbaik yaitu mencoba perpanjangan rantai pada atom N_1 (R') dan atom C_{10} (R_2) yang menurut penelitian sebelumnya merupakan substituen yang yang menyumbangkan aktifitas antimalaria, dengan perpanjangan rantai ini akan mengubah sifat fisika kimia dari senyawa seperti kelarutan, volume molekular, koefisien distribusi dan sifat yang lain, dengan perpanjangan rantai hidrokarbon dapat menurunkan nilai kepolaran pada senyawa sehingga memiliki afinitas yang kuat dalam penetrasi kedalam membran sel, namun hubungan ini tidak selalu berbentuk garis lurus, dengan batas perpanjangan tertentu dapat menurunkan aktifitas biologis yang mungkin disebabkan oleh faktor lain seperti berhubungan dengan efek sterik yaitu ketidakcocokan pusat aktif terhadap reseptor akibat meruahannya gugus fungsi, Selanjutnya ialah mencoba memasukkan ikatan rangkap pada rantai alkil, perubahan ini dapat menyebabkan ketegaran rantai karbon dan mengurangi kelenturan rantai, perubahan ini menyebabkan perubahan aktifitas biologis karena terjadinya perubahan pada pusat aktif, namun setelah mencoba memasukkan ikatan rangkap hasilnya tidak menyumbangkan aktifitas yang signifikan namun membuat aktifitas biologisnya semakin menurun dari

senyawa ini kemungkinan disebabkan karena perubahan rantai dapat menyebabkan interaksi antara pusat aktif dan reseptor kurang serasi yang dapat juga menyebabkan jarak antar gugus fungsional yang berubah akibat adanya perubahan rantai alkil yang berdampak pada kemampuan untuk berinteraksi, Kemudian dalam metode modifikasi molekul selanjutnya ialah melakukan perubahan cincin-rantai pada struktur senyawa, namun perubahan ini tidak selalu menghasilkan senyawa dengan aktifitas yang mirip. Dengan alasan ini kami tidak melakukan perubahan cincin-rantai pada percobaan senyawa selanjutnya, ini dibuktikan pada kasus amfetamina dan tranilspromina yang mengalami perubahan cincin-rantai namun keduanya memiliki aktifitas biologis yang berbeda. Metode-metode diatas dilakukan pada senyawa turunan yang terbaik dari 13 senyawa keseluruhan dan tentunya tidak mengubah ataupun mempertahankan topologi struktur senyawa asal, dengan mempertahankan topologi maka jalur aktifitas biologis dapat dikontrol (Sardjoko, 1993; Mustofa, 2002).

Setelah itu kami melakukan perubahan pada substituen R_3 (C_9), dengan mencoba beberapa substituen lain selain ion chlorine kami mencoba memasukkan unsur yang bermuatan lain antara lain bromine, iodine, dan flourine dimana kesemua unsur ini merupakan golongan halogen. Percobaan ini dilakukan dengan dasar konsep isosterisme yang diuraikan oleh Langmuir yang menyatakan bahwa terdapat kesamaan sifat fisika-kimia dengan struktur elektronik pada atom, gugus, radikal dan molekul. Kesamaan ini sering terdapat

pada atom yang terletak pada jalur vertikal sistem periodik, pada atom atom tersebut lapisan elektron terluar identik atau hampir identik , dan dengan substitusi gugus yang didasarkan konsep isosterisme maka akan memberikan pengaturan elektronik maupun sterik yang serupa dengan senyawa induk, setelah memasukkan beberapa unsur bermuatan tersebut, hanya unsur flourin yang mempunyai nilai aktifitas biologis yang lebih baik, ini disebabkan karena unsur flourin mempunyai nilai elektronegatifan yang lebih tinggi dari klorin sehingga lebih kuat dalam menarik pasangan elektron dan berdampak pada kekuatan ikatan yang lebih baik secara teoritif yang kemungkinan pada substituen ini akan memberikan sumbangan aktifitas berdasarkan sifat keelektronegatifannya (Sardjoko,1993; Siswandono,1998).

Keseluruhan data diatas merupakan data potensial yang dapat dimasukkan dalam jajaran turunan senyawa yang cukup baik , karena dari 13 senyawa turunan 1,10-Fenantrolin ada beberapa senyawa turunan yang aktifitasnya tidak lebih baik dari pada hasil diatas sehingga dapat dikatakan bahwa senyawa baru diatas lebih baik dari beberapa turunan sebelumnya, namun tujuan yang kedua dari penelitian ini adalah mencoba menemukan senyawa baru yang lebih potensial dari pada senyawa turunan sebelumnya sehingga dapat dihasilkan senyawa selain senyawa itu baru juga aktifitas biologisnya lebih baik dari pada 13 senyawa turunan yang sebelumnya. Turunan model yang ke enam pada tabel 5 merupakan hasil rancangan terbaik karena memiliki nilai IC_{50} sebesar **0,14** (μM) yang berarti lebih baik daripada nilai IC_{50} terbaik turunan sebelumnya

yaitu 0,15 (μM). Dengan ini maka implementasi dari hasil persamaan yang telah dihasilkan dapat direalisasikan dengan mencoba merancang senyawa baru yang lebih potensial dan aman.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya, 1998, Departemen Agama RI, CV. As Syifa, Semarang .
- Anonim, 1989, *Laporan penderita malaria RS ITCI Balikpapan*, Balikpapan.
- Anonim, 2010, *Orbital Molekul dan reaksi Kimia*.
- Aswad, M., 2009, "Telaah Hubungan kuantitatif struktur-aktivitas senyawa diterpen dari Bagore (*Caesalpinia crista* Linn) sebagai antimalaria dan interaksinya dengan enzim protease dari *Plasmodium falciparum* secara *in silico*", ITB, Bandung.
- Daniel, C., Wood, F.S, 1980, *Fitting Equation to Data*, Edisi II. New York: John Wiley dan Sons.
- Dean, M.J.S., 1995, *Molecular Similarity in Drug Design*, Blackie Academic & Professional, Glasgow.
- Dwi Harno, 2010 *Pengantar Kimia Komputasi*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Fadillah, St., 2009, *Pidato Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada peringatan hari Malaria yang ke dua tanggal 25 april 2009*; Depkes RI; Jakarta.
- Franke, R., 1984, *Theoretical Drug Design Methods*, Elsevier, Amsterdam.
- Irsanya Nilam Cut, 2005, *Pengaruh Lingkungan terhadap perkembangan malaria dan DBD*, IPB, Bogor.
- Istyastono E,P, Martono., 2003, *Hubungan Kuantitatif Struktur – Aktivitas Kurkumin dan Turunannya sebagai Inhibitor GST berdasarkan perhitungan kimia komputasi* ,Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Kubinyi, H., 1993, *QSAR: Hansh Analysis and Related Approaches*. Weiheim: VCH Verlagsgesellschaft.
- Kurnia Fitri, 2007, *Tinjauan interaksi obat pada pengobatan Malaria pasien dewasa rawat inap di RSUD ABEPURA kota Jayapura Propinsi Papua*, Universitas muhammadiyah, Surakarta.
- Linn *et all*, 2005, *Cassane and Norcassane Type DiTerpenes from Caesalpinia crista of Indenesia and Their Antimalarial Activity against the Growth of Plasmodium falciparum*. Journal of Natural Product.

- Lee, K. W., 1996, Quantitative Structure-Activity Relationships (QSAR) Study on C-7 Substituted Quinolone. *Bull, Korean Chem Soc.* 17.
- Leach, A.R., 1996, *Molecular Modelling: Principles and Application*, Longman, Singapura.
- Mustofa, 2002, *Kajian QSAR Senyawa Antimalaria Turunan 1,10-Fenantrolin Menggunakan Deskriptor Elektronik Hasil Perhitungan Metoda Semiempirik AM1*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Purcell, W.P., 1974, *Quantitative Structure-Activity Relationships*. in Bergmann. E.D., Pullman B. *Molecular and Quantum Pharmacology*. Dordrecht, Reidel Publishing Company.
- Purnomo Hari, 2007, *Antimalaria*, Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Richon, A.B dan Young, S.S. 2000. *An Introduction to QSAR Methodology, Network Science*, <http://www.netsci.org/Science/Compchem/feature19.html>, Diakses 13 Februari.
- Rahman, Afzalur., 2007, *Eksiklopedi Ilmu Dalam Al-Qur'an*. Bandung, Mizan.
- Sardjoko., 1993, *Rancangan Obat*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sembiring, R.,K, 1995, *Analisis Regresi*, Penerbit Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Sekartuti, 1989, *Masalah obat antimalaria*, Depkes RI, Jakarta.
- Setyaningrum Endah, 2008, *Studi Ekologi Perindukan Vektor Malaria di desa Way Muli, Kec. Rajabasa Lampung*, Universitas Lampung , Lampung Selatan.
- Siswandono dan Soekardjo, 1995, *Kimia Medisinal*. Surabaya: Airlangga University Press, Surabaya.
- Siswandono., 1998, *Prinsip-prinsip Rancangan Obat*. Surabaya, Airlangga University Press, Surabaya.
- Suryo, Dirwan.,2010, *Petunjuk Kesehatan dalam Al-quran dan As-Sunnah*, Yogyakarta.
- Silverman, R, B., 1993, *The Organic Chemistry of Drug Design and Drug Action*, Academic Press Inc, New York.

- Smith Kline and French, 1989, *Halofantrine in the treatment of multidrug of resistant Malaria*, Parasitology Today.
- Sulistyo, B. , 2002, *Analisis Hubungan Kuantitatif Struktur-Aktivitas Seri Senyawa Analog Kurkumin sebagai Antioksidan menggunakan Deskriptor Kimia Kuantum*, Universitas Gajah Mada; Yogyakarta.
- Sowunmi, A., Falade, C. O., Oduola, A. M., Ogundahunsi, O. A., Fehintola, F. A., Gbotosho, G. O., Larcier, P., and Salako, L. A., 1998, *Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg.*
- Tahir, I., 2000, *Analisis Hubungan Kuantitatif Struktur dan Karakter Aroma Senyawa Nitrobenzena*, Makalah Seminar Jurnal Nusantara Kimia - UNNES, Semarang.
- Taylor, J, B, 1993, *Modern Medical Chemistry*, Ellis Horwood, new York.
- Tjitra, E, 2000, *Obat-obat Antimalaria*, dalam : Harijanto, P.N, (Editor), *Malaria, Epidemiologi, Patogenesis, Manifestasi klinis dan Penanganan*, Buku Kedokteran ECG, Jakarta.
- Tjitra E, Harun S, Dewi MR dkk, 1989, *Tes IFA pada penelitian malaria di Kepulauan Seribu. Seminar Ilmiah dan Kongres Nasional Biologi ke IX*, Padang.
- Tjitra E, Sekartuti, Renny M dkk, 2000, *Sensitivitas P. falciparum terhadap beberapa obat antimalaria di desa Pekandangan, Jawa Tengah. Seminar Parasitologi Nasional VI dan Kongres P4I V, 23-25 Juni* , Pandaan. Jawa Timur.
- Widiyantoro, P., 1997, *Hubungan Kuantitatif Antara Struktur Aktivitas pada N,N-Dimetil-2-Bromo-Fenelitamin Tersubstitusi menggunakan metode semiempiris AMI*. Yogyakarta: FMIPA UGM, Yogyakarta.
- Widyaiswara, 2009, Bakhruddin., *Filosofi Olahraga dan Islam*, Aceh.
- World Health Organization , 2006, *Guidelines for the Treatment of Malaria* , WHO Press, Switzerland .
- World Health Organization, 1988, *Chemotherapy of Malaria. 2nd edition*, WHO Geneva, Switzerland.
- Zein, U, 2005, *Penanganan Terkini Malaria Falcifarum*, e-USU Reppository, Medan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Budhy Sentosa Putra, dilahirkan di Makassar pada tanggal 8 Juli 1989 merupakan Buah hati kedua dari pasangan suami istri Drs.Khaeril Akhmad dan Nurhaeri. Pendidikan formal yang telah dilalui adalah sekolah dasar di SD Negeri 262 di Bone dan SD Inpres Kassi-Kassi Makassar pada tahun 1994-2000. Setelah itu dilanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di SMP Negeri 3 di kota Makassar pada tahun 2000-2003, setelah itu melanjutkan Pendidikan menengah atasnya di kota yang sama yaitu di SMF Yamasi Makassar pada tahun 2003-2006 dan memperoleh gelar Asisten Apoteker. Pada tahun 2006 penulis diterima di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar fakultas Ilmu Kesehatan program studi Farmasi. Adapun kegiatan Organisasi yang penulis geluti selama berada di kampus hijau antara lain anggota HMJ Farmasi tahun 2008, anggota ISMAFARSI Komisariat UIN 2006-2008, anggota BEM FIKES tahun 2009, dan FOSKER 2009-2011 dan penulis cukup aktif dalam kegiatan yang dilakukan didalam dan diluar kampus. Penulis merupakan mahasiswa yang biasa saja dan belum pernah mengecap prestasi yang membanggakan selama berada di kampus UIN, namun penulis mempunyai cita-cita menjadi seorang farmasis yang profesional dan seorang pengusaha yang berakhlak mulia yang berlandaskan kepada ajaran Agama Islam.