

**PERBANDINGAN TINGKAT KEJADIAN
PREEKLAMPSIA ANTARA IBU PRIMIGRAVIDA DAN
MULTIGRAVIDA PADA TRIMESTER III DI RSIA SITI FATIMAH
MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan Pada Fakultas Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh

YULIA SULASTRI PRATIWI
70300106020

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 23 Agustus 2010

Penyusun,

Yulia Sulastris Pratiwi
NIM: 70300106020



ABSTRAK

YULIA SULASTRI PRATIWI, NIM : 70300106020

JUDUL PENELITIAN : "PERBANDINGAN TINGKAT KEJADIAN PREEKLAMPSIA ANTARA IBU PRIMIGRAVIDA DAN MULTIGRAVIDA PADA TRIMESTER III DI RSIA SITI FATIMAH MAKASSAR".

PEMBIMBING : Hj.Halwatiah S.Kep.Ns. M,Kes dan Hasnah S.SiT. M,Kes

Setiap menit perempuan di dunia meninggal karena komplikasi yang terkait dengan kehamilan dan persalinan, dengan kata lain 1400 perempuan meninggal setiap harinya atau lebih kurang 500.000 perempuan meninggal setiap tahunnya karena kehamilan dan persalinan. Salah satu penyebab morbiditas dan mortalitas ibu dan janin adalah preeklampsia. Preeklampsia merupakan salah satu sindrom yang dijumpai pada ibu hamil yang terdiri dari hipertensi dan proteinuria dengan atau tanpa edema.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan tingkat kejadian preeklampsia antara ibu primigravida dan multigravida pada trimester III di RSIA Siti Fatimah Makassar. Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 8 sampai dengan 31 juli 2010.

Penelitian ini adalah penelitian *komparatif* dengan pendekatan *cross sectional* dengan sampel berjumlah 61 responden dan metode pengambilan sampel secara *total sampling*. Data diambil dengan menggunakan lembar observasi. Data yang terkumpul dianalisis *univariat* dan *bivariat* dengan menggunakan program SPSS 15.


Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan kejadian preeklampsia lebih banyak dialami oleh Ibu dengan primigravida (65,6%) daripada multigravida (34,4%) pada trimester III kehamilan.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbandingan tingkat kejadian preeklampsia antara ibu primigravida dan multigravida pada trimester III di RSIA Siti Fatimah Makassar.

Disarankan bagi Ibu hamil agar tetap melaksanakan perawatan *antenatal care* selama masa kehamilan pada pelayanan kesehatan agar gejala preeklampsia dapat dideteksi secara dini.

Kata kunci : Preeklampsia, gravida, trimester III.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufiq hidayah dan Inayah-Nya sehingga skripsi dengan judul :

“Perbandingan Tingkat Kejadian Preeklampsia Antara Ibu Primigravida dan Multigravida Pada Trimester III di RSIA Siti Fatimah Makassar“ dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh ujian akhir pada pendidikan Strata satu (SI), Jurusan keperawatan Fakultas ilmu kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Teristimewa, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta sujud sembah kepada kedua orang tua tercinta Drs H.Abd Hamid dan Dra Hj.Yustati atas segala pengorbanan yang tidak terkira, telah memberikan dukungan moril dan doa tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan. Adikku Febrina Paramita Isminarti dan Meinarti Arini Pusparani serta keluarga besarku yang juga memberiku dukungan dan doa restu.

Dengan segala kerendahan hati, melalui kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Dr. H. M.Furqaan Naiem, M.Sc, Ph.D, Selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan.

3. Nur Hidayah S. Kep, Ns, M.Kes selaku ketua prodi Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan serta sebagai Ibu yang selalu memberikan motivasi, dorongan dan pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Hj.Halwatiah S. Kep, Ns, M.Kes dan Hasnah S. SiT, M.Kes sebagai pembimbing yang memberikan motivasi dan dorongan serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan.
5. DR. H. Salehuddin Yasin M.A dan Risnah S.KM, S. Kep, Ns. M.Kes selaku Penguji I dan II yang telah memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan Skripsi ini.
6. dr. H.Leo Prawirodihardjo Sp.OG(K), M.Kes, M.M, Ph D, selaku Kepala UPTD RSIA Siti Fatimah beserta staf yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan atas segala kemudahan dan keleluasaan yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian.
7. Responden penelitian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diteliti dan menjadi bagian terpenting dalam penelitian ini.
8. Sahabat terbaikku yang terus memberikan motivasi, ide, kritik, saran, serta literatur dalam menyelesaikan Skripsi ini, Nurul Fadhillah, A.Adriana, Syur Hasriati dan A.Khusnul Hatimah.
9. Para sahabatku “*anak tenggo*” selama empat tahun terakhir menjalani pendidikan di UIN, Ana, Chu’, Dhila, Unnu, Adilah, Ita, Cully, Liska, Lia, Aka, Lela, Edi dan Lena, kita bersama berbagi ilmu dan pengalaman, suka duka dan keceriaan. *I Love you all*, serta semua teman-teman Jurusan keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

10. *Special thanks to you* Abd.Hakim yang memberikan motivasi, semangat, dan dukungan serta tak bosan-bosannya mendengarkan keluh kesah penulis sampai Skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. *Your are is the best forever.*
11. Teman-teman KKN UIN Alaunddin angkatan 45 Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros.

Penulis menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam Skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran untuk kesempurnaan Skripsi ini sangat di harapkan.

Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, baik itu bagi Penulis pribadi, Dunia Keperawatan, Dunia Pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Amiin.

Wabillahitaufiq walhidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, Agustus 2010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum Preeklampsia	6
B. Tinjauan Umum Primigravida dan Multigravida	19
C. Tinjauan Preeklampsia Pada Primigravida dan Multigravida	27
BAB III KERANGKA KONSEP	30
A. Kerangka Penelitian	30
B. Kerangka Kerja	31

C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif	32
D. Hipotesis	32
BAB IV METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Populasi dan Sampel	33
C. Teknik Sampling	34
D. Pengumpulan Data	34
E. Pengolahan dan Analisis Data	35
F. Penyajian Data	37
G. Jadwal Penelitian	37
H. Etika Penelitian	37
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
B. Pembahasan	50
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kerangka Konseptual Penelitian	30
Gambar 3.2	Kerangka Kerja Penelitian	31



DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Distribusi Responden Berdasarkan Umur	40
Tabel 5.2	Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan.	41
Tabel 5.3	Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan	42
Tabel 5.4	Distribusi Responden Berdasarkan Usia Kehamilan	43
Tabel 5.5	Distribusi Responden Berdasarkan Usia Pernikahan	44
Tabel 5.6	Distribusi Responden Berdasarkan Berat Badan.	45
Tabel 5.7	Distribusi Responden Berdasarkan Tekanan Darah	46
Tabel 5.8	Distribusi Responden Berdasarkan Proteinuria	47
Tabel 5.9	Distribusi Responden Berdasarkan Udema	48
Tabel 5.10	Perbandingan Preeklampsia antara Ibu Primigravida dan Multigravida	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan kesehatan nasional yang bertujuan terciptanya kemampuan untuk hidup sehat setiap penduduk agar mewujudkan kesehatan masyarakat yang optimal. Salah satunya adalah mengupayakan pelayanan kesehatan ibu hamil agar dapat menyelesaikan kehamilannya dengan sebaik-baiknya dan melahirkan bayi yang sehat (Saifuddin, 2002).

Di perkirakan setiap menit perempuan di dunia meninggal karena komplikasi yang terkait dengan kehamilan dan persalinan, dengan kata lain 1400 perempuan meninggal setiap harinya atau lebih kurang 500.000 perempuan meninggal setiap tahunnya karena kehamilan dan persalinan (Sarjito, 2009).

Salah satu penyebab morbiditas dan mortalitas ibu dan janin adalah preeklampsia yang menurut WHO angka kejadiannya berkisar 0,51 persen sampai 34,4 persen (WHO, 2001).

Di negara maju angka kejadian preeklampsia berkisar 6 sampai dengan 7 persen dan eklampsia 0,1 sampai dengan 0,7 persen sedangkan angka kematian ibu yang diakibatkan preeklampsia dan eklampsia dinegara berkembang masih tinggi. (Amelda, 2009).

Preeklampsia adalah salah satu sindrom yang dijumpai pada ibu hamil yang terdiri dari hipertensi dan proteinuria dengan atau tanpa edema. Gejala tersebut timbul setelah usia kehamilan 20 minggu dan akan menjadi nyata

pada kehamilan trimester III sampai saat melahirkan. (Wibowo dan Rachimhadi, 2006)

Preeklampsia atau sering disebut hipertensi dalam kehamilan merupakan problema yang paling sering terjadi pada kehamilan. Bahkan kelainan ini dapat beresiko terhadap kematian janin dan ibu. Deteksi dini terhadap hipertensi pada ibu hamil diperlukan agar tidak menimbulkan kelainan serius dan mengganggu kehidupan serta kesehatan janin dalam rahim. (Hamilton, 2003).

Islam senantiasa menganjurkan kepada umat manusia khususnya ibu hamil untuk menjaga kesehatan dan janinnya serta harus yakin terhadap adanya Allah SWT yang maha mengatur termasuk mengatur kehamilan. Sebagaimana firman Allah swt dalam Qur'an surah Ar.Rad/13 ayat 8 yang berbunyi:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزِدَادُ^ط وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾

Terjemahan :

Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya (Al Qur'an dan Terjemahannya, 2006)

Preeklampsia merupakan penyakit yang angka kejadiannya di setiap negara berbeda-beda. Angka kejadian lebih banyak dinegara berkembang dibanding dinegara maju. Hal ini disebabkan oleh karena dinegara maju perawatan prenatalnya lebih baik. Kehamilan dengan preeklampsia bisa terjadi pada primigravida dan juga pada multigravida. (Baktiyani, 2005)

Pada kehamilan primigravida preeklampsia dapat terjadi karena ibu pertama kali hamil sering mengalami stres dalam menghadapi persalinan, dan

pada multigravida preeklampsia dapat juga terjadi karena berhubungan dengan penyakit kronis, diabetes militus dan penyakit ginjal. (Baktiyani, 2005)

Departemen kesehatan menargetkan tahun 2010 angka kematian ibu turun menjadi 125 per 100.000 kelahiran hidup. Dari jumlah kematian ibu prevalensi paling besar adalah preeklampsia dan eklampsia sebesar 12,9 persen dari keseluruhan kematian ibu (Saifuddin, 2002).

Untuk melihat kecendrungan AKI di Indonesia secara konsisten digunakan data hasil SKRT. Menurut SKRT, AKI menurun dari 307 per 100.000 pada tahun 2002 sampai 2003 pada kelahiran hidup, kemudian menjadi 248 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan AKI terus menurun. Tetapi apabila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai secara nasional pada tahun 2010, yaitu 125 per 100.000 kelahiran hidup, maka apabila penurunannya masih seperti tahun-tahun sebelumnya, diperkirakan target tersebut dimasa mendatang sulit dicapai. (DinKes Prov SULSEL 2009).

Angka kematian Ibu (AKI) diperoleh dari berbagai survey yang dilakukan secara khusus di Rumah Sakit dan beberapa survey di masyarakat dengan cakupan wilayah yang terbatas. Dengan dilaksanakannya Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) dan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) maka cakupan wilayah penelitian AKI menjadi lebih luas dibanding survey-survey sebelumnya. (DinKes prov SULSEL 2009).

Jumlah kematian ibu hamil, melahirkan dan setelah melahirkan yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 sebanyak 121 orang atau 85,17 per 100.000 kelahiran hidup. Disamping karena perdarahan, infeksi, preeklampsia dan eklampsia yang merupakan penyebab kematian ibu. (DinKes Prov SULSEL 2009).

Data yang diperoleh di RSIA Siti Fatimah tahun 2007, jumlah ibu hamil dengan preeklampsia 135 orang, kemudian data pada tahun 2008, yaitu jumlah ibu hamil sebanyak 1891, dan jumlah ibu hamil dengan preeklampsia sebanyak 147 orang. Pada tahun 2009 jumlah ibu hamil bertambah menjadi 2123 dan ibu hamil yang terdiagnosa preeklampsia sebanyak 168 orang. (RSIA Siti Fatimah 2009).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Perbandingan Tingkat Kejadian Preeklampsia Antara Ibu Primigravida dan Multigravida Pada Trimester III di RSIA Siti Fatimah Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Apakah ada perbandingan tingkat kejadian preeklampsia antara ibu primigravida dan multigravida pada trimester III di RSIA Siti Fatimah Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui perbandingan tingkat kejadian preeklampsia antara ibu primigravida dan multigravida pada trimester III di RSIA Siti Fatimah Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui tingkat kejadian preeklampsia ibu primigravida pada trimester III.
- b. Diketahui tingkat kejadian preeklampsia ibu multigravida pada trimester III.

- c. Diketahui perbandingan tingkat kejadian preeklampsia antara ibu primigravida dan multigravida pada trimester III.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi

Sebagai referensi perpustakaan institusi dan merupakan masukan bagi mahasiswa yang sedang mempelajari tentang hubungan primigravida dan multigravida dengan kejadian preeklampsia.

2. Bagi Tenaga Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan pada bidang keperawatan maternitas dan sebagai sumber data untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Profesi

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan usaha pencegahan dan mengatasi preeklampsia agar tidak menjadi berat.

4. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan dan bahan masukan khususnya bagi ibu hamil yang menderita preeklampsia agar bisa menjaga kesehatan dan janinnya sehingga tidak terjadi sesuatu yang diharapkan.

5. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini sebagai pengalaman awal dan menambah wawasan peneliti dalam bidang keperawatan maternitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Preeklampsia

1. Defenisi Preeklampsia

Preeklampsia dan eklampsia merupakan kesatuan penyakit yang langsung disebabkan oleh kehamilan. Preeklampsia adalah hipertensi disertai proteinuria dan edema akibat kehamilan setelah usia kehamilan 20 minggu atau segera setelah persalinan. Gejala ini dapat timbul sebelum 20 minggu bila terjadi penyakit trofoblastik (Wibowo dan Rachimhadi, 2006).

Preeklampsia merupakan suatu sindrom spesifik kehamilan dengan penurunan perfusi pada organ-organ akibat vasospasme dan aktivitas endotel. Proteinuria adalah tanda-tanda yang penting dari preeklampsia (William, 2005).

Preeklampsia adalah keadaan dimana hipertensi sebagai gejala mayor disertai dengan proteinuria, edema atau keduanya sebagai gejala mayor, yang terjadi akibat kehamilan setelah minggu ke-20, atau kadang-kadang timbul lebih awal bila terdapat perubahan hidatidiformis yang luas pada pada vili khorialis (Cunningham., F.Gary, 2005).

Preeklampsia dapat juga disebut sebagai hipertensi yang diinduksi oleh kehamilan atau penyakit hipertensi akut pada kehamilan. (Hacker, Moore 2001)

Preeklampsia dan eklampsia merupakan kumpulan gejala yang timbul pada ibu hamil, bersalin dan dalam masa nifas yang terdiri dari trias yaitu: hipertensi, proteinuria dan uedema; yang kadang-kadang disertai kejang sampai koma yang timbul bukan akibat kelainan neurologi. (Arief, 2001).

2. Manifestasi Klinis Preeklampsia dan eklampsia

Preeklampsia mempunyai gejala-gejala sebagai berikut (Wibowo dan Rachimhadi, 2006):

a. Gejala Preeklampsia

Biasanya tanda-tanda preeklampsia timbul dalam urutan: penambahan berat badan yang berlebihan, diikuti edema, hipertensi, dan akhirnya proteinuria. Pada preeklampsia ringan tidak ditemukan gejala-gejala subjektif. Pada preeklampsia berat gejalanya adalah:

- 1). Tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg
- 2). Tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg
- 3). Peningkatan kadar enzim hati/ ikterus
- 4). Trombosit $< 100.000/mm$
- 5). Oliguria < 400 ml/24 jam
- 6). Proteinuria > 3 g/liter
- 7). Nyeri epigastrium
- 8). Skotoma dan gangguan visus lain atau nyeri frontal yang berat
- 9). Perdarahan retina
- 10). Edema pulmonal
- 11). Koma

b. Gejala eklampsia

Pada umumnya kejang didahului oleh makin memburuknya preeklampsia dan terjadinya gejala-gejala nyeri kepala di daerah frontal, gangguan penglihatan, mual, nyeri di epigastrium dan hiperrefleksia. Bila keadaan ini tidak dikenali dan tidak segera diobati, akan timbul kejang terutama pada persalinan.

3. Etiologi Preeklampsia

Sampai saat ini belum diketahui dengan pasti etiologi preeklampsia. Banyak teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli namun belum ada yang memberikan jawaban yang memuaskan. Teori yang dewasa ini banyak dikemukakan adalah iskemia plasenta. Namun teori ini tidak dapat menerangkan semua hal yang berkaitan dengan kondisi ini. Hal ini disebabkan karena banyaknya faktor yang menyebabkan terjadinya preeklampsia/ eklampsia (Wibowo dan Rachimhadi, 2006).

Faktor predisposisi, genetik dan imunologis diduga melatarbelakangi keadaan ini. Peningkatan zat gizi apa yang menyebabkan belum diketahui pasti. Namun kepada pasien biasanya dianjurkan untuk menjalankan diet seimbang dengan makanan tinggi protein tinggi kalori (TPTK) sebesar 75 sampai dengan 80 protein sehari, disertai kalsium yang tinggi pula.

Seperti halnya Allah memerintahkan seluruh makhluknya untuk memperhatikan apa yang mereka makan dan Allah telah menciptakan segala macam makanan dari segala jenis buah-buahan dan sayur-sayuran untuk dimakan oleh manusia untuk memperbaiki dan mempertahankan

kesehatan termasuk ibu hamil dan janinnya. Sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surah Abasa ayat 24-31 yang berbunyi:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعَيْنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَيْكِهَةً وَآبًا ﴿٣١﴾

Terjemahan:

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar mencurahkan air (dari langit). Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. (Al Qur'an dan Terjemahannya, 2006)

Adapun petunjuk Nabi Muhammad SAW agar jangan terlalu banyak makan dan minum. Diterangkan bahwa wadah yang paling buruk diisi ialah perut yang tidak berlebih-lebihan ialah mengisi perutnya sepertiga saja dengan makanannya, sepertiga lagi dengan minuman sedangkan sepertiga lagi untuk nafas. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

Tidak ada satu wadah pun yang diisi oleh Bani Adam, lebih buruk daripada perutnya, cukuplah baginya beberapa suap, untuk memperkokoh tulang belakangnya agar dapat tegak. Apabila tidak dapat dihindari, baiklah sepertiga makanan, sepertiga lagi untuk minumannya dan sepertiga untuk nafas (H.R tirmidzi)

Ada beberapa teori mencoba menjelaskan perkiraan etiologi dari kelainan tersebut di atas, sehingga kelainan ini sering dikenal sebagai *the diseases of theory* (Sudhabrata K, 2001). Adapun teori-teori tersebut antara lain:

a. Peran Protasiklin dan Tromboksen

Pada preeklampsia dan eklampsia didapatkan kerusakan pada endotel vaskuler, sehingga terjadi penurunan produksi prostasiklin (PGI₂) yang pada kehamilan normal meningkat, aktivasi penggumpalan dan fibrinolisis, yang akan mengkomsumsi antitrombin III sehingga terjadi defosit fibrin. Aktivasi trombosit menyebabkan pelepasan tromboksan (TxA₂) dan serotonin, sehingga terjadi vasospasme dan kerusakan endotel.

b. Peran Faktor Immunologis

Preeklampsia biasanya terjadi pada kehamilan pertama, karena pada kehamilan pertama pembentukan *blocking antibodies* terhadap antigen plasenta tidak sempurna. Pada preeklampsia terjadi kompleks imun humoral dan aktivasi komplemen. Hal ini dapat diikuti dengan terjadinya proteinuria.

c. Peran Faktor Genetik

Beberapa bukti yang menunjukkan peran faktor genetik pada kejadian preeklampsia/ eklampsia antara lain:

- 1). Preeklampsia/ eklampsia hanya terjadi pada manusia.
- 2). Terdapat kecenderungan meningkatnya frekuensi preeklampsia/ eklampsia pada anak-anak dari ibu yang menderita preeklampsia/ eklampsia.
- 3). Kecenderungan meningkatnya frekuensi preeklampsia/ eklampsia pada anak dan cucu ibu hamil dengan riwayat preeklampsia/ eklampsia dan bukan pada ipar mereka.
- 4). Peran Renin-Angiotensin-Aldosteron System (RAAS).

5. Faktor Resiko Preeklampsia/ eklampsia

Faktor resiko preeklampsia meliputi kondisi medis yang berpotensi menyebabkan kelainan mikrovaskuler, seperti diabetes melitus, hipertensi kronis dan kelainan vaskular serta jaringan ikat, sindrom antibodi fosfolipid dan nefropati. Faktor resiko lain berhubungan dengan kehamilan itu sendiri atau dapat spesifik terhadap ibu dan ayah dari janin (Sunaryo R, 2008).

Berbagai faktor resiko preeklampsia yaitu:

- a. Faktor yang berhubungan dengan kehamilan
 - 1). Kelainan kromosom
 - 2). Mola hydatidosa
 - 3). Hydrops fetalis
 - 4). Kehamilan multifetus
 - 5). Inseminasi donor atau donor oosit
 - 6). Kelainan struktur kongenital
- b. Faktor spesifik maternal
 - 1). Primigravida
 - 2). Usia > 35 tahun
 - 3). Usia < 20 tahun
 - 4). Ras kulit hitam
 - 5). Riwayat preeklampsia pada keluarga
 - 6). Nullipara
 - 7). Preeklampsia pada kehamilan sebelumnya
 - 8). Kondisi medis khusus : diabetes gestational, diabetes tipe 1, obesitas, hipertensi kronis, penyakit ginjal.
 - 9). Stress.

6. Patofisiologi Preeklampsia

Menurut Castro, C.L (2004) kelainan patofisiologi yang mendasari preeklampsia/ eklampsia pada umumnya karena vasospasme. Peningkatan tekanan darah dapat ditimbulkan oleh peningkatan cardiac output dan resistensi sistem pembuluh darah. Cardiac output pada pasien dengan preeklampsia/ eklampsia tidak terlalu berbeda pada kehamilan normal di trimester terakhir kehamilan yang disesuaikan dari usia kehamilan. bagaimanapun juga resistensi sistem pembuluh darah pada umumnya diperbaiki. Aliran darah renal dan angka filtrasi glomerulus (GFR) pada pasien preeklampsia/ eklampsia lebih rendah dibandingkan pada pasien dengan kehamilan normal dengan usia kehamilan yang sama. Penurunan aliran darah renal diakibatkan oleh konstriksi di pembuluh darah afferen yang dapat mengakibatkan kerusakan membran glomerulus dan kemudian meningkatkan permeabilitas terhadap protein yang diakibatkan proteinuria. Oliguria yang diakibatkan karena vasokonstriksi renal dan penurunan GFR. Resistensi vaskular cerebral selalu tinggi pada pasien preeklampsia/ eklampsia, Pada pasien hipertensi tanpa kejang, aliran darah cerebral mungkin bertahan sampai batas normal sebagai hasil fenomena autoregulasi. Pada pasien dengan kejang, aliran darah cerebral dan konsumsi oksigen lebih sedikit dibandingkan dengan wanita hamil biasa dan terdapat penurunan aliran darah dan peningkatan vaskuler pada sirkulasi uteroplasental pada pasien preeklampsia/ eklampsia.

7. Gambaran Klinik Preeklampsia

Adapun gambaran klinik preeklampsia yaitu (Sunaryo, 2008) :

- a. Hipertensi

Gejala yang terlebih dahulu timbul ialah hipertensi yang terjadi secara tiba-tiba, sebagai batas diambil tekanan darah sistolik 140 mmHg dan diastolik 90 mmHg, tapi juga kenaikan sistolik 30 mmHg atau diastolik 15 mmHg diatas tekanan yang biasa merupakan pertanda. Tekanan darah sistolik dapat mencapai 180 mmHg dan diastolik 110 mmHg, tetapi jarang mencapai 200 mmHg. Jika tekanan darah melebihi 200 mmHg maka sebabnya biasanya hipertensi asensial. Hipertensi merupakan masalah yang paling sering terjadi pada kehamilan. Kelainan hipertensi pada kehamilan beresiko terhadap kematian janin dan ibu, karena itu deteksi dini kehamilan ibu agar tidak menimbulkan kelainan dan mengganggu kehidupan janin

Seperti halnya ibu hamil harus menjaga kesehatan dirinya dan juga janin kandungannya serta yakin terhadap adanya Allah swt yang maha mengatur termasuk mengatur kehamilan ibu hamil. Sebagaimana Al-Quran juga menganjurkan dalam Qur'an surah Ar.Rad/13 ayat 8 yang berbunyi:

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾

Terjemahan:

Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya ((Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, 1996)

b. Udema

Timbulnya udema didahului oleh penambahan berat badan yang berlebihan. Pertambahan berat 0,5 kg pada seseorang yang hamil dianggap normal, tetapi jika mencapai 1 kg per minggu atau 3 kg dalam

satu bulan, maka dapat dicurigai preeklampsia. Udem ini tidak akan hilang dengan istirahat.

c. Proteinuria

Proteinuria didefinisikan sebagai konsentrasi protein sebesar 0.19 L (> positif 2 dengan cara dipstik) atau lebih dalam sekurang-kurangnya dua kali spesimen urin yang dikumpulkan sekurang-kurangnya dengan jarak 6 jam. Pada spesimen urin 24 jam. Proteinuria didefinisikan sebagai suatu konsentrasi protein 0,3 per 24 jam.

8. Klasifikasi Preeklampsia

Pembagian preeklampsia sendiri dibagi dalam golongan ringan dan berat. Berikut ini adalah klasifikasinya (Rahma N, 2008) :

a. Preeklampsia ringan

Dikatakan preeklampsia ringan bila :

- 1). Tekanan darah sistolik antara 140 sampai dengan 160 mmHg dan tekanan diastolik 90 sampai dengan 110 mmHg
- 2). Proteinuria minimal (2g/L/24 jam)
- 3). Tidak disertai gangguan fungsi organ

b. Preeklampsia berat

Dikatakan preeklampsia berat bila :

- 1). Tekanan darah sistolik > 160 mmHg atau tekanan darah diastolik > 110 mmHg.
- 2). Proteinuria (> 5 g/L/24 jam) atau positif 3 atau 4 pada pemeriksaan kuantitatif.

Bisa disertai dengan :

- 1). Oliguria (urine \leq 400 mL/24jam)

- 2). Keluhan serebral, gangguan penglihatan
 - 3). Nyeri abdomen pada kuadran kanan atas atau daerah epigastrium
 - 4). Gangguan fungsi hati dengan hiperbilirubinemia
 - 5). Edema pulmonal, sianosis
 - 6). Gangguan perkembangan intrauterine
 - 7). Microangiopathik hemolitik anemia, trombositopenia
- c. Jika terjadi tanda-tanda preeklampsia yang lebih berat dan disertai dengan adanya kejang, maka dapat digolongkan ke dalam eklampsia.

9. Penatalaksanaan Preeklampsia

Konsep pengobatan harus dapat mematahkan mata rantai iskemia regio uteroplasenter sehingga gejala hipertensi dalam kehamilan dapat diturunkan (Manuaba, 2007).

Tujuan dasar penatalaksanaan untuk setiap kehamilan dengan penyulit preeklampsia adalah (Cunningham, 2006) :

- a. Terminasi kehamilan dengan trauma sekecil mungkin bagi ibu dan janinnya
- b. Lahirnya bayi yang kemudian dapat berkembang
- c. Pemulihan sempurna kesehatan ibu

Penanganan preeklampsia/ eklampsia menurut Saifuddin (2002) yaitu:

- a. Preeklampsia ringan
 - 1). Kehamilan kurang dari 37 minggu
 - a). Pantau tekanan darah, urine (untuk proteinuria), reflex dan kondisi janin.
 - b). Konseling pasien dengan keluarganya tentang tanda-tanda bahaya preeklampsia dan eklampsia.

- c). Lebih banyak istirahat
 - d). Diet biasa
 - e). Tidak perlu diberi obat-obatan
 - f). Jika rawat jalan tidak mungkin, rawat di rumah sakit:
 - (1). Diet biasa.
 - (2). Pantau tekanan darah 2 kali sehari, dan urine (untuk proteinuria) sehari sekali.
 - (3). Tidak perlu obat-obatan
 - (4). Tidak perlu diuretik, kecuali jika terdapat edema paru, dekompensasi kardis atau gagal ginjal akut.
 - (5). Jika tekanan diastolik turun sampai normal pasien dapat dipulangkan.
 - (6). Jika tidak ada tanda perbaikan, tetap dirawat. Lanjutkan penanganan dan observasi kesehatan janin.
 - (7) Jika terdapat tanda pertumbuhan janin terhambat, pertimbangan terminasi kehamilan. Jika tidak, rawat sampai aterm.
 - (8) Jika proteinuria meningkat, tangani sebagai preeklampsia berat.
- 2). Kehamilan lebih dari 37 minggu
- a). Jika serviks matang, pecahkan ketuban dan induksi persalinan dengan oksitoksin atau prostaglandin.
 - b). Jika serviks belum matang, lakukan pematangan dengan prostaglandin atau kateter folley atau lakukan seksio sesaria.
- b. Preeklampsia berat

1. Pasien datang dengan preeklampsia berat maka diberi sedativa yang kuat untuk mencegah kejang.
2. Jika oliguria beri glukosa 20% IV.
3. Diuretik tidak rutin, hanya bila retensi air banyak.

Untuk penderita preeklampsia diperlukan analgetik dan sedativa lebih banyak dalam persalinan. Pada kala II, pada penderita dengan hipertensi. Bahaya Pendarahan dalam otak lebih besar, sehingga syarat-syarat telah dipenuhi, hendaknya persalinan diakhiri dengan cunam atau ekstraktor vakum dengan memberikan narkosis umum untuk menghindarkan rangsangan pada susunan saraf pusat. Anastesi lokal dapat diberikan bila tekanan darah tidak terlalu tinggi dan penderita masih somnolen karena pengaruh obat. Pemberian obat penenang diteruskan sampai 48 jam post partum, karena ada kemungkinan setelah persalinan berakhir, tekanan darah naik dan eklampsia timbul. Selanjutnya obat tersebut dikurangi secara bertahap dalam 3 sampai dengan 4 hari. (Taber, 2004).

10. Pencegahan Preeklampsia

Pemeriksaan antenatal yang teratur dan teliti dapat menemukan tanda-tanda dini preeklampsia. Adanya faktor predisposisi harus diwaspadai. Walaupun timbulnya preeklampsia tidak dapat dicegah, namun dapat dikurangi dengan pemberian penanganan secukupnya dan pelaksanaan pengawasan yang baik pada wanita hamil. Pengaturan diet dan manfaat istirahat perlu ditekankan. (Prawiroharjo, 2002).

11. Komplikasi Preeklampsia

Komplikasi terberat preeklampsia adalah kematian ibu dan janin. Usaha utama ialah melahirkan bayi hidup dari ibu yang menderita

preeklampsia dan eklampsia. Komplikasi dibawah ini yang biasa terjadi pada preeklampsia berat dan eklampsia (Wibowo dan Rachimhadi, 2006):

a. Solusio plasenta

Komplikasi ini terjadi pada ibu yang menderita hipertensi akut dan lebih sering terjadi pada preeklampsia.

b. Hipofibrinogenemia

Biasanya terjadi pada preeklampsia berat. Oleh karena itu dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan fibrinogen secara berkala.

c. Hemolisis

Penderita dengan preeklampsia berat kadang-kadang menunjukkan gejala klinis hemolisis yang dikenal dengan ikterus. belum diketahui secara pasti apakah ini merupakan kerusakan sel hati atau destruksi sel darah merah. Nekrosis periportal hati yang sering ditemukan pada autopsy penderita eklampsia dapat menerangkan ikterus tersebut.

d. Perdarahan otak

Komplikasi ini merupakan penyebab utama kematian maternal penderita eklampsia.

e. Kelainan mata

Kehilangan penglihatan untuk sementara, yang langsung berlangsung sampai seminggu, dapat terjadi. Perdarahan kadang-kadang terjadi pada retina. Hal ini merupakan tanda gawat akan terjadinya apopleksia serebri.

f. Nekrosis hati

Nekrosis periportal hati pada preeklampsia/ eklampsia merupakan akibat vasospasme arteriole umum. Kelainan ini diduga khas untuk

eklampsia, tetapi ternyata juga dapat ditemukan pada penyakit lain. Kerusakan sel-sel hati dapat diketahui dengan pemeriksaan faal hati, terutama penentuan enzim-enzimnya.

g. Edema paru-paru

Paru-paru menunjukkan berbagai tingkat edema dan perubahan karena bronkopneumonia sebagai akibat aspirasi. Kadang-kadang ditemukan abses paru-paru.

h. Sindroma HELLP yaitu *haemolysis, elevated liver enzymes dan low platelet*

Merupakan sindroma kumpulan gejala klinis berupa gangguan fungsi hati, hepatoseluler (peningkatan enzim hati [SGPT,SGOT], gejala subjektif [cepat lelah, mual, muntah, nyeri epigastrium]), hemolisis akibat kerusakan membrane eritrosit oleh radikal bebas asam lemak jenuh dan tak jenuh. Trombositopenia (<150.000/cc), agregasi (adhesi trombosit di dinding vaskuler), kerusakan tromboksan (vasokonstriksitor kuat), lisosom (Manuaba, 2007).

i. Kelainan ginjal

Kelainan ini berupa endoteliosis glomerulus yaitu pembengkakan sitoplasma sel endotel tubulus ginjal tanpa kelainan struktur yang lainnya. Kelainan lain yang dapat timbul ialah anuria sampai gagal ginjal.

j. Komplikasi lain

Lidah tergigit, trauma dan fraktur karena jatuh akibat kejang-kejang pneumonia aspirasi dan DIC (*disseminated intravascular cogulation*).

k. Prematuritas, dismaturitas dan kematian janin intra-uterin.

B. Tinjauan Umum Primigravida dan Multigravida

1. Primigravida

Primigravida adalah seorang wanita yang hamil untuk pertama kali. Wanita yang pertama kali hamil sedangkan umurnya dibawah 20 tahun disebut primigravida muda. Usia terbaik untuk seorang wanita hamil antara 20 tahun hingga 35 tahun. Sedangkan wanita yang pertama hamil pada usia diatas 35 tahun disebut primigravida tua. Primigravida muda termasuk didalam kehamilan resiko tinggi (KRT) dimana jiwa dan kesehatan ibu dan atau bayi dapat terancam. Resiko Kematian maternal pada primigravida muda jarang dijumpai dari pada primigravida tua. Dikarenakan pada primigravida muda dianggap kekuatannya masih baik. Sedangkan pada primigravida tua resiko kehamilan meningkat bagi sang ibu yang dapat terkena preeklampsia/ eklampsia (Manuaba, 2007).

2. Multigravida

Adalah wanita yang hamil lebih dari satu kali dan telah melahirkan tanpa melihat bayi hidup atau meninggal (Manuaba, 2007).

Hampir seluruh tubuh ibu hamil mengalami perubahan terutama pada alat kandungan, dan juga organ lain, Adapun perubahan fisiologi pada kehamilan adalah sebagai berikut : (Ida bagus, 2001).

a. Payudara

Payudara mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai persiapan memberikan ASI pada saat laktasi, dimana perubahan payudara ini adalah tanda kemungkinan kehamilan karena adanya pengaruh estrogen, progesterone dan tomammatropin.

Fungsi hormon yang mempersiapkan payudara untuk pemberian ASI, yaitu :

- 1). Estrogen berfungsi :
 - a). Menimbulkan hipertropi sistem saluran payudara
 - b). Menimbulkan penimbunan lemak dan air serta garam sehingga payudara tambah semakin besar
 - c). Tekanan saraf akibat penimbunan lemak, air dan garam menyebabkan rasa sakit pada payudara.
- 2). Progesteron berfungsi :
 - a). Mempersiapkan asinus sehingga dapat berfungsi
 - b). Menambah jumlah sel asinus
- 3). Somatomammotropin berfungsi :
 - a). Mempengaruhi sel asinus untuk membuat kasein, laktalbumin, dan laktoglobulin.
 - b). Merangsang pengeluaran kolostrum

b. Rahim atau uterus

Pertumbuhan uterus yang fenomenal pada trimester pertama berlanjut sebagai respons terhadap stimulus kadar hormon estrogen dan progesteron. Dimana rahim yang semula besar sejempol atau beratnya 30 gram akan mengalami hipertropi dan hiperplasia sehingga menjadi seberat 1000 gram saat akhir kehamilan. Pada minggu ke- 7 sebesar telur ayam negeri, pada minggu ke- 10 uterus mencapai ukuran buah jeruk, pada minggu ke- 12 uterus mencapai ukuran buah grapefruit (jeruk asam yang berwarna kuning yang besarnya sekitar dua kali jeruk biasa), dan pada minggu ke- 40 gestasi. Selain bertambah besar, uterus juga mengalami perubahan berat, dan posisi. Dinding-dinding otot menguat dan menjadi

lebih elastis. Selama trimester kedua bentuk uterus bulat, karena janin kemudian memanjang, uterus menjadi lebih besar, lebih lonjong, dan membesar keluar rongga panggul menuju rongga abdomen.

c. Vagina

Hormon kehamilan mempersiapkan vagina supaya distensi selama persalinan dengan memproduksi kehamilan mukosa vagina yang tebal. Peningkatan vaskularisasi menimbulkan warna kebiru-biruan yang disebut tanda Chadwicks suatu tanda kehamilan, dapat muncul pada minggu ke-8 kehamilan.

d. Sirkulasi darah

Peredaran darah yang dipengaruhi beberapa faktor, antara lain :

- 1). Meningkatnya kebutuhan sirkulasi darah sehingga dapat memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim.
- 2). Terjadi hubungan langsung antara arteri dan vena pada sirkulasi retro-plasenter.
- 3). Pengaruh hormon estrogen dan progesteron yang makin meningkat.

Akibat dari faktor tersebut dijumpai beberapa perubahan peredaran darah :

a). Volume darah

Volume darah semakin meningkat dimana jumlah serum darah lebih besar dari pertumbuhannya sel darah, sehingga terjadi semacam pengenceran darah (hemodilusi), dengan puncaknya pada umur kehamilan 32 minggu. Serum darah (volume darah) bertambah sebesar 25 sampai 30% sedangkan sel darah merah 20%. Curah jantung akan bertambah sekitar 30%. Bertambahnya hemodilusi

darah mulai tampak pada umur kehamilan 16 minggu, sehingga dapat berbahaya bagi ibu hamil.

b). Sistem respirasi

Kehamilan mempengaruhi sistem pernapasan pada volume paru-paru dan ventilasi. Perubahan anatomi dan fisiologi sistem pernafasan selama kehamilan diperlukan untuk memenuhi peningkatan metabolisme dan kebutuhan oksigen bagi tubuh ibu dan janin. Perubahan tersebut terjadi karena hormonal dan biokimia. Relaksasi otot dan kartilagi toraks menjadikan bentuk dada berubah. Diafragma menjadi lebih naik 4 cm dan diameter melintang dada menjadi 2 cm. Perubahan ini menyebabkan perubahan sistem pernafasan yang terjadinya pernafasan perut menjadi pernafasan dada oleh karena itu diperlukan perubahan letak diafragma selama kehamilan. Terjadi perubahan sistem respirasi untuk dapat memenuhi kebutuhan O₂. Disamping itu terjadi desakan diafragma karena dorongan rahim yang membesar pada usia kehamilan 32 minggu.

c). Sistem pencernaan

Pengaruh estrogen menyebabkan asam lambung meningkat yang dapat menyebabkan pengeluaran liur, daerah lambung terasa panas, morning sicknes, emesis gravidarum, dan progesteron menimbulkan gerakan usus makin berkurang dan dapat menyebabkan obstipasi.

d). Sistem traktus urinarius

Karena pengaruh desakan hamil muda dan turunnya kepala bayi pada hamil tua sehingga gangguan miksi dalam bentuk sering kencing. Desakan tersebut menyebabkan kandung kemih cepat

terasa penuh. Terjadinya hemodilusi menyebabkan metabolisme air semakin lancar sehingga pembentukan air seni pun akan bertambah.

e). Perubahan pada kulit

Pada kulit, terjadi pada deposit pigmen dan hiperpigmentasi karena pengaruh melanophore stimulating hormon lobus hipofisis anterior dan pengaruh anterior dan pengaruh kelenjar suprarenalis.

f). Metabolisme

Metabolisme mengalami perubahan yang mendasar dimana kebutuhan nutrisi makin tinggi untuk pertumbuhan janin dan persiapan memberikan ASI. Perubahan metabolisme basal naik sebesar 15% sampai 20%. Dan nampak pada berat badan ibu hamil bertambah.

g). Sistem persyarafan

Fungsi sistem saraf dan otak sangat kompleks dan mencakup semua aktifitas mulai dari refleks dasar sampai perubahan kemampuan kognitif dan emosional. Kinerjanya sangat berpengaruh dan dipengaruhi hormon. Perubahan yang terjadi menyangkut ketidaknyamanan tulang dan otot, gangguan tidur, perubahan sensasi, dan pengalaman terhadap nyeri. Banyak wanita hamil mengeluh bahwa kemampuan kognitif mereka menurun pada saat hamil dengan kesulitan berkonsentrasi, kelemahan menyimpan memori. Penyusutan otak wanita selama hamil dan kembali normal setelah persalinan disebabkan oleh sel perubahan individu bukan karena penurunan jumlah sel. Pola tidur berubah pada masa hamil dan periode postpartum. Wanita hamil yang umur kehamilannya

mencapai 25 minggu mengalami lebih banyak tidur malam. Selama trimester pertama waktu tidur bertambah namun sering terjadi bangun tidur di malam hari karena adanya kelainan atau gangguan seperti nokturia, dipsnoe, dan kecemasan.

h). Sistem Kardiovaskuler

Volume darah yang dipompakan masing-masing vertikal setiap menitnya disebut cardiac output (CO). kadar normal CO pada orang dewasa yang sehat 5L/min namun dapat pula meningkat hingga 20-25L/min. keadaan ini akan berbeda-beda pada masing-masing individu tergantung aktivitas yang dilakukannya.

Selama kehamilan perubahan dramatis terjadi pada sistem kardiovaskuler, perubahan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ibu dan janin selama kehamilan. Sirkulasi uteroplasenta turut mengikuti perubahan transport gas, nutrisi dan hasil buangan ibu dan janin. Volume jantung meningkat dari 70 ml menjadi 80 ml antara trimester I dan trimester III. Perubahan anatomi dan fisiologi normal jantung dapat pula mengakibatkan perubahan suara jantung. Desiran sistolik dan diastolik dapat ditemukan pada usia kehamilan 12-20 minggu. Pada wanita yang tidak hamil, suara desiran diastolik merupakan suatu kelainan, namun pada wanita hamil hal tersebut tidak terlalu signifikan karena peningkatan aliran darah pada katup trikuspidal. Peningkatan Cardiac Output disebabkan oleh peningkatan denyut jantung dan stroke volume. Peningkatan Stroke Volume terjadi secara progresif selama trimester pertama dan kedua berkisar 30% dibandingkan keadaan tidak hamil.

Proses Hemodelusi pada kehamilan dan penurunan kadar Hb sering menyebabkan anemia fisiologis. Preeklampsia dapat terjadi karena berhubungan dengan peranan sistem renin-angiotensin dalam regulasi tekanan darah. Dimana dalam mekanisme terjadi peningkatan tekanan darah karena renin, yang diproduksi oleh ginjal ketika aliran darah keginjal menurun, akibatnya terbentuklah angiotensin II. Angiotensin II meningkatkan tekanan darah dengan mengakibatkan kontraksi langsung arteriol. Secara tidak langsung juga merangsang pelepasan aldosteron, yang mengakibatkan retensi natrium dan air dalam ginjal. Respon tersebut meningkatkan volume cairan ekstraseluler, yang pada gilirannya meningkatkan aliran darah yang kembali ke jantung, sehingga meningkatkan isi kuncup dan curah jantung meningkat. Serta edema kaki dapat juga terjadi. (Brunner, Suddarth, 2001)

i). Sistem muskulosletal

1). Perubahan pada otot:

- a. Peningkatan P dan relaksin menyebabkan pengenduran terhadap jaringan ikat dan otot sehingga mengakibatkan, Peningkatan kapasitas panggul untuk persiapan janin dan hilangnya tonus otot selama trimester III menyebabkan musculus rectus abdominus menjadi terpisah sehingga isi abdomen menonjol pada garis tengahnya, umbilicus menjadi mendatar atau bahkan menonjol.
- b. Peningkatan E akan menyebabkan hiperplasia otot terutama pada rahim untuk menampung isi dari uterus.

2). Perubahan pada sendi

Sendi simfisis pubis menjadi lunak dan sendi sakrokoksigal menjadi kendor sehingga menyebabkan kokgisis bergeser kearah belakang yang akan mengakibatkan, Me meningkat kapasitas rongga panggul yang sangat berfungsi selama kehamilan dan persalinan, rasa tidak nyaman atau nyeri dibawah panggul, pinggang dan mengakibatkan kesulitan berjalan terutama pada akhir kehamilan.

Berdasarkan perubahan anatomik dan fisiologik, dapat dikumpulkan hal-hal yang mungkin bermakna pada pemeriksaan fisis dan penunjang, untuk menuju pada diagnosis kehamilan.

Prawiroharjo (2005) mengatakan adapun gejala dan tanda yang dapat mengarah pada diagnosis suatu kehamilan yaitu:

1. Amenorea atau tidak mendapat mens
2. Perasaan mual dan muntah berulang (*moorning sick*)
3. Anoreksia
4. Pembesaran uterus (tampak disertai pembesaran perut atau pada kehamilan muda disertai dengan palpasi)
5. Adanya kontraksi uterus (perut tegang) pada palpasi
6. Teraba atau terasa adanya gerakan janin pada palpasi
7. Terdengar jantung janin (dengan alat Laennec/ Doppler) atau visual tampak jantung berdenyut pada imaging (*fetal ultrasound echoscopy*)
8. Teraba bagian tubuh janin pada palpasi (Leopold) atau tampak pada imaging (*ultrasonografi*)
9. Kurva suhu badan meningkat
10. Tes urine B-hCG (Pack's test) positif.
11. Perubahan payudara, membesar dan menjadi tegang

12. Poliuria (sering buang air kecil)

Sebagaimana seorang wanita baru dapat dipastikan hamil jika pemeriksaan telah melihat tanda pasti kehamilan. Sebagaimana firman Allah swt dalam Qur'an surah Al Hajj/22 ayat 5 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عُلُقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمَرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

Terjemahan:

Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya kami Telah menjadikan kamu dari tanah, Kemudian dari setetes mani, Kemudian dari segumpal darah, Kemudian dari segumpal daging yang Sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, Kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya Telah diketahuinya. dan kamu lihat bumi Ini kering, Kemudian apabila Telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

Ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya manusia. Mulai dari setetes air mani, berubah menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging yang disimpan dalam rahim. Kemudian keluar sebagai bayi lalu berangsur-angsur menjadi dewasa dan akhirnya wafat.

C. Preeklampsia Pada Primigravida dan Multigravida

Pada primigravida atau ibu yang pertama kali hamil sering mengalami stress dalam menghadapi persalinan. Stress emosi yang terjadi pada primigravida menyebabkan peningkatan pelepasan corticotropic-releasing hormone (CRH) oleh hypothalamus, yang kemudian menyebabkan peningkatan kortisol. Efek kortisol adalah mempersiapkan tubuh untuk berespon terhadap semua stressor dengan meningkatkan respons simpatik, termasuk respon yang ditujukan untuk meningkatkan curah jantung dan mempertahankan tekanan darah (Corwin, 2001).

Hipertensi dalam kehamilan terjadi akibat kombinasi peningkatan curah jantung dan resistensi perifer total. Selama kehamilan normal, volume darah meningkat secara drastis. Pada wanita sehat, peningkatan volume darah diakomodasikan oleh penurunan responsivitas vaskular terhadap hormon-hormon vasoaktif, misalnya angiotensin II. Hal ini menyebabkan resistensi perifer total berkurang pada kehamilan normal dan tekanan darah rendah. Pada wanita dengan preeklampsia/ eklampsia, tidak terjadi penurunan sensitivitas terhadap vasopeptida tersebut, sehingga peningkatan besar volume darah langsung meningkatkan curah jantung dan tekanan darah (Corwin, 2001).

Primigravida dan multigravida adalah salah satu faktor resiko penyebab terjadinya preeklampsia/ eklampsia. Peningkatan yang gradual dari tekanan darah, proteinuria dan edema selama kehamilan merupakan tanda-tanda preeklampsia, terutama pada primigravida. Gejala tersebut akan menjadi nyata pada kehamilan trimester ke III sampai saat melahirkan. Gejala tersebut timbul sampai kehamilan 20 minggu, jika timbul sebelumnya, mungkin terjadi kehamilan Mola hydatidosa atau hamil anggur. Pada primigravida frekuensi preeklampsia/ eklampsia lebih

tinggi bila dibandingkan dengan multigravida, terutama primigravida muda (Wibowa dan Rachimhadi, 2006).

Preeklampsia hampir selalu merupakan penyakit wanita nullipara. Meskipun preeklampsia lebih sering ditemukan pada masa awal dan akhir usia reproduktif, yaitu usia remaja atau usia di atas 35 tahun, namun preeklampsia pada usia 35 tahun biasanya menunjukkan hipertensi yang diperberat oleh kehamilan (Cunningham, F.Gary 2005).




BAB III

KERANGKA KONSEP


A. Kerangka Penelitian

V. Independen


V. Dependen



Ket :




: Variabel yang diteliti



: Variabel dependen

Gambar 3.1 Kerangka konseptual kejadian preeklampsia pada ibu primigravida dan multigravida di trimester III

B. Kerangka Kerja



Gambar 3.2 Kerangka Kerja Penelitian

C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Preeklampsia

Preeklampsia adalah penyakit khusus yang terdapat pada ibu hamil dengan usia kehamilan lebih atau sama dengan 20 minggu .

Kriteria objektif :

- a. Preeklampsia jika pasien mengalami gejala mayor dan salah satu atau semua gejala minor.
- b. Tidak preeklampsia jika pasien hanya mengalami salah satu atau semua gejala minor dan tidak terdapat gejala mayor.

Mayor : TD \geq 140/90 mmHg

Minor : 1. Proteinuria

2. Udema

2. Primigravida adalah sorang wanita yang hamil untuk pertama kali.
3. Multigravida adalah seorang wanita yang hamil lebih dari satu kali.

D. Hipotesis

1. Hipotesis Alternatif (Ha)

Adan perbandingan tingkat kejadian preeklampsia antara ibu primigravida dan multigravida pada trimester III di RSIA Siti Fatimah Makassar.

2. Hipotesis Nol (Ho)

Tidak ada perbandingan tingkat kejadian preeklampsia antara ibu primigravida dan multigravida pada trimester III di RSIA Siti Fatimah Makassar.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Desain yang digunakan adalah penelitian komparatif dengan pendekatan secara *cross sectional study* yaitu melakukan observasi data variabel independen dan variabel dependen hanya satu kali, pada satu saat. (Nursalam, 2008).

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari suatu variabel yang menyangkut masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh wanita hamil yang menderita preeklampsia yang memeriksakan kehamilannya di RSIA Siti Fatimah Makassar selama penelitian berlangsung. Populasi sebesar 74 responden (Nursalam, Pariani, 2002).

2. Sampel

Sampel adalah bagian keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. (Nursalam, Pariani 2002).

Besar sampel penelitian ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

N : besar populasi

n : besar sampel

d : tingkat kepercayaan ketetapan yang diinginkan (0,05)

Jadi besar sampelnya :

$$\begin{aligned}n &= \frac{74}{1+78(0,0025)} \\ &= \frac{74}{1+0,185} \\ &= \frac{74}{1,185} \\ &= 61\end{aligned}$$

Jadi besar sampel penelitian adalah 61 responden

Dalam penelitian ini digunakan kriteria sampel yaitu inklusi dan eksklusi.

C. Teknik Sampling

1. Teknik Sampling

Sampling adalah suatu proses dalam menyeleksi porsi dari populasi untuk dapat mewakili populasi (Nursalam, 2008). Dalam penelitian ini pemilihan sampel dengan jenis *Total sampling* yaitu mengambil responden secara keseluruhan atau semua responden yang ada pada saat penelitian dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. (Sugiyono, 2004).

2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

a. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian dari populasi target dan terjangkau yang akan diteliti (Nursalam, 2008)

1. Wanita hamil yang menderita preeklampsia
2. Wanita hamil yang rajin memeriksakan kehamilan
3. Wanita hamil dengan usia kehamilan > 28 minggu

4. Bersedia diteliti dengan menandatangani surat persetujuan

b. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan/ mengeluarkan subyek yang tidak memenuhi kriteria inklusi dari studi (Nursalam, 2008).

1. Menolak wawancara

2. Menderita penyakit kronis

D. Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari lembar observasi langsung dengan responden pada saat penelitian berlangsung.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bagian Rekam Medik RSIA Siti Fatimah Makassar

3. Instrumen Penelitian

Alat pengumpulan data yang dirancang oleh peneliti sesuai dengan kerangka konsep yang telah dibuat. Instrumen yang digunakan adalah Lembar observasi.

Adapun langkah-langkah pelaksanaan saat penelitian yaitu :

a. Mengajukan permohonan kepada pasien untuk menjadi partisipan serta meminta persetujuan untuk menjadi responden.

b. Memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan.

c. Mengobservasi keadaan responden sesuai dengan yang ada di lembar observasi.

4. Prosedur Pengumpulan Data

- a. Mengurus kelengkapan surat pengantar Kepada RSIA Siti Fatimah Makassar yang di tujukan untuk melaksanakan penelitian.
- b. Mengumpulkan data primer dan sekunder sesuai kriteria inklusi
- c. Melakukan langkah-langkah pengolahan data.

E. Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dari lembar observasi yang ada maka dilakukan pengolahan data. Pengolahan data tersebut dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. Editing

Proses editing dilakukan setelah data terkumpul dan dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data, memeriksa kesinambungan data, dan keseragaman data.

b. Koding

Dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan data, semua jawaban atau data perlu disederhanakan yaitu dengan simbol-simbol tertentu, untuk setiap jawaban (pengkodean). Pengkodean dilakukan dengan memberi nomor halaman, daftar pertanyaan, nomor variabel, nama variabel dan kode.

c. Tabulasi data

Setelah selesai pembuatan kode selanjutnya dengan pengolahan data kedalam satu tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki.

1. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan terhadap setiap variabel dari hasil penelitian. Analisis ini akan menghasilkan distribusi dan

presentase dari tiap variabel yang diteliti dengan menggunakan windows SPSS 15.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk melihat hubungan variabel independen dengan dependen dengan menampilkan tabel-tabel silang untuk mengetahui perbandingan kejadian preeklampsia antara ibu primigravida dan multigravida

F. Penyajian Data

Hasil analisis data ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi disertai dengan penjelasan mengenai data yang dimaksud.

G. Jadwal Penelitian

1. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di RSIA Siti Fatimah Makassar.

2. Waktu

Waktu pelaksanaan penelitian mulai tanggal 8 juli sampai dengan 31 juli 2010.

H. Etika Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengajukan permohonan ijin kepada pengurus RSIA Siti Fatimah Makassar untuk persetujuan. Kemudian peneliti akan melakukan pendekatan kepada ibu hamil yang menderita preeklampsia dan menekankan pada masa etik yang meliputi :

1. Lembar Persetujuan Menjadi Responden

Tujuannya dalah ibu hamil mengetahui maksud dan tujuan penelitian serta dampak yang diteliti selama pengumpulan data. Jika Ibu hamil bersedia diteliti maka harus menandatangani lembar persetujuan dan

jika ibu hamil menolak untuk diteliti maka tidak akan memaksa dan menghargai hak-haknya.

2. Anonimity

Untuk menjaga kerahasiaan identitas ibu hamil, peneliti tidak akan mencantumkan nama pada lembar kuesioner. Lembar tersebut hanya diberi kode nomor pada masing-masing lembar yang dilakukan oleh peneliti sebelum lembar pengumpulan data diberikan kepada responden.

3. Confidentiality

Kerahasiaan informasi partisipan dijamin peneliti, hanya data tertentu yang dilaporkan sebagai hasil penelitian (Maleong, 2002), dalam hal ini data yang berkaitan dengan batas-batas dalam etika atau nilai-nilai pribadi dalam partisipan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara umum Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Makassar terletak di Jalan Gunung Merapi No 75, Kelurahan Pisang, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Sulawesi Selatan.

Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar didirikan diatas area tanah 2.381 mm dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan jalan sungai poso
- b. Sebelah timur berbatasan dengan jalan gunung lokon
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan sungai pareman
- d. Sebelah barat berbatasan dengan jalan gunung merapi

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Komparatif dengan pendekatan desain *Cross Sectional*, Penelitian ini dilaksanakan di RSIA. Siti Fatimah Makassar. Penelitian di laksanakan mulai tanggal 8 sampai dengan 31 juli 2010. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *total sampling* dengan jumlah sampel 61 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan lembar observasi. Setelah data terkumpul lalu disusun dalam master tabel. Data diolah dengan menggunakan komputer program SPSS versi 15.00, data yang diperoleh kemudian dilakukan analisa univariat Berdasarkan hasil pengelolaan data

tersebut, disusunlah hasil-hasil yang diperoleh dan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

1. Hasil Analisis Univariat

Distribusi Karakteristik Umum Responden


a. Distribusi Umur Responden

Tabel 5.1
Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden Berdasarkan Umur di RSIA Siti Fatimah Makassar Periode Juli 2010

No	Umur	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	20 – 25 Tahun	27	44,3
2	26 – 30 Tahun	19	31,1
3	31 – 35 Tahun	15	24,6
Total		61	100

Sumber : Analisis Data Primer, 2010

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari 61 responden, yang berumur 20 sampai dengan 25 tahun sebanyak 27 orang (44,3%). Responden yang berumur 26 sampai dengan 30 tahun sebanyak 19 orang (31,1%) Dan Responden yang berumur 31 sampai dengan 35 tahun sebanyak 15 orang (24,6%).




b. Distribusi Pendidikan Responden

Tabel 5.2
Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan di RSIA Siti Fatimah Makassar Juli 2010

No	Pendidikan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	SMP	9	14,8
2	SMA	31	50,8
3	Sarjana	21	34,4
Total		61	100

Sumber : Analisis Data Primer, 2010

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 61 responden, yang tingkat pendidikan SMP sebanyak 9 orang (14,8). Tingkat pendidikan SMA sebanyak 31 orang (50,8%). Dan Sarjana sebanyak 21 orang (34,4%).




c. Distribusi Pekerjaan Responden

Tabel 5.3
Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden Berdasarkan Pekerjaan di RSIA Siti Fatimah Makassar Juli 2010

No	Pekerjaan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	PNS	6	9,8
2	Wiraswasta	21	34,4
3	IRT	34	55,7
Total		61	100

Sumber : Analisis Data Primer 2010

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 61 responden yang pekerjaannya sebagai PNS sebanyak 6 orang (9,8%). Yang wiraswasta sebanyak 21 orang (24,4%). Dan IRT sebanyak 34 orang (55,7%).




d. Distribusi Usia Kehamilan Responden

Tabel 5.4
Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden Berdasarkan Usia Kehamilan di RSIA Siti Fatimah Makassar Juli 2010

No	Usia Kehamilan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	28 – 32 minggu	20	32,8
2	33 – 37 minggu	27	44,3
3	38 – 42 minggu	14	23,0
Total		61	100

Sumber : Analisis Data Primer, 2010

Berdasarkan Tabel 5.4 menunjukkan bahwa dari 61 responden yang usia kehamilan 28 sampai 32 minggu sebanyak 20 orang (32,8%). Usia kehamilan 33 sampai 37 minggu sebanyak 27 orang (44,3%). Dan yang usia kehamilan 38 sampai 42 minggu sebanyak 14 orang (23,0%)




e. Distribusi Usia Pernikahan Responden

Tabel 5.5
Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden Berdasarkan Usia
Pernikahan di RSIA Siti Fatimah Makassar Juli 2010

No	Usia Pernikahan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	1-2 tahun	36	59,0
2	3-4 tahun	19	31,1
3	> 5 tahun	6	9,8
Total		61	100

Sumber : Analisis Data Primer, 2010

Berdasarkan Tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari 61 responden yang usia pernikahan 1 sampai 2 tahun sebanyak 36 orang (59,0%). Usia pernikahan 3 sampai 4 tahun sebanyak 19 orang (31,1%). Dan yang usia pernikahan lebih dari 5 tahun sebanyak 6 orang (9,8%).




f. Distribusi Berat Badan Responden

Tabel 5.6
Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden Berdasarkan Berat Badan di RSIA Siti Fatimah Makassar Juli 2010

No	Berat badan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	55 - 65 kg	18	29,5
2	66 - 76 kg	35	57,4
3	77 - 87 kg	8	13,1
Total		61	100

Sumber : Analisis Data Primer 2010

Berdasarkan Tabel 5.6 menunjukkan bahwa dari 61 responden yang memiliki berat badan 55 sampai dengan 65 kg sebanyak 18 orang (29,5%). Berat badan 66 sampai dengan 76 kg sebanyak 35 orang (57,4%) Dan yang memiliki berat badan 77 sampai dengan 87 kg sebanyak 8 orang (13,1%).




g. Distribusi Tekanan Darah Responden

Tabel 5.7
Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden Berdasarkan Tekanan Darah di RSIA Siti Fatimah Makassar Juli 2010

No	Tekanan Darah	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	140 mmHg	38	62,3
2	150 mmHg	21	34,4
3	160 mmHg	2	3,3
Total		61	100

Sumber : Analisis Data Primer, 2010

Berdasarkan tabel 5.7 menunjukkan bahwa dari 61 responden yang memiliki tekanan darah 140 mmHg sebanyak 38 orang (62,3%). Responden yang memiliki tekanan darah 150 mmHg sebanyak 21 orang (34,4%). Dan yang memiliki tekanan darah 160 mmHg sebanyak 2 orang (3,3%)




h. Distribusi Proteinuria Responden

Tabel 5.8
Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden Berdasarkan Proteinuria
di RSIA Siti Fatimah Makassar Juli 2010

No	Protenuria	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	Positif	40	65,6
2	Negatif	21	34,4
	Total	61	100

Sumber : Analisis Data Primer, 2010

Berdasarkan Tabel 5.8 menunjukkan bahwa dari 61 responden yang proteinuria positif sebanyak 40 orang (65,6%) dan yang negatif sebanyak 21 orang (34,4%).



i. Distribusi Udema Responden

Tabel 5.9
Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden Berdasarkan Udema
di RSIA Siti Fatimah Makassar Juli 2010

No	Udema	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	Ya	39	63,9
2	Tidak	22	36,1
Total		61	100

Sumber : Analisis Data Primer, 2010

Berdasarkan Tabel 5.9 menunjukkan bahwa dari 61 responden yang mengalami udema sebesar 39 orang (63,9%) dan yang tidak mengalami udema sebesar 22 orang dengan persentase (36,1%).



2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan dengan menggunakan metode tabulasi (crosstab) antara variabel independen yaitu primigravida dan multigravida dengan variabel dependen yaitu preeklampsia.

Tabel 5.9
Perbandingan tingkat kejadian Preeklampsia antara Ibu Primigravida dan Multigravida pada trimester III di RSIA Siti Fatimah Makassar Juli 2010

No	Gravida	Preeklampsia	%
1	Primigravida	40	65,6
2	Multigravida	21	34,4
	Jumlah	61	100

Sumber : Analisis Data Primer, 2010.

Berdasarkan tabel 5.9, diperoleh hasil dari 61 responden preeklampsia, sebanyak 40 responden (65,6%) merupakan primigravida dan sebanyak 21 responden (34,4%) merupakan multigravida.



B. PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan menggunakan lembar observasi. Setelah itu dilakukan pengolahan data dan analisis data maka akan dibahas sebagai berikut:

Berdasarkan data penelitian, diperoleh hasil sebanyak 40 responden (65,6%) yang termasuk dalam primigravida dan 21 responden (34,4%) yang termasuk dalam multigravida. Hasil tersebut menunjukkan angka kejadian preeklampsia lebih tinggi pada responden primigravida dibandingkan dengan responden multigravida. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa preeklampsia lebih sering terjadi pada ibu primigravida. Juga diperkuat oleh hasil penelitian Putri Dyah (2008) yang memperoleh hasil bahwa ibu primigravida memiliki resiko 3 kali untuk terkena preeklampsia/ eklampsia dibandingkan dengan ibu multigravida. Hasil tersebut juga sejalan oleh penelitian Baktiyani dan kawan-kawan (2005) di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang bahwa pada tahun 1997 ibu hamil primigravida dengan preeklampsia/eklampsia sebesar 3,6% dan meningkat pada tahun 1999 menjadi 29% pada primigravida. Artinya bahwa dari 100 kasus preeklampsia 29 kasus terjadi pada primigravida.

Menurut asumsi peneliti bahwa tingginya kejadian preeklampsia pada responden primigravida dibandingkan dengan multigravida disebabkan karena tingkat stres yang dialami oleh ibu primigravida dalam menghadapi persalinannya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan ibu multigravida. Karena persalinan yang akan dihadapi merupakan persalinan pertama dan belum mempunyai pengalaman sebelumnya dan stres yang dialami mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Sebaliknya pada ibu multigravida, mereka sudah memiliki pengalaman sebelumnya sehingga sudah ada

pengalaman dalam menghadapi persalinan dan sudah tahu bagaimana cara menghadapinya. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Corwin (2001) bahwa pada primigravida sering mengalami stres dalam menghadapi persalinan.

Stres dapat berkurang dengan cara beribadah, bersabar dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Qur'an Surah Al Baqarah/2 ayat 153 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٥٣﴾

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman harus menjadikan sholat dan kesabaran sebagai penolong dalam menghadapi cobaan hidup yang dialami.

Tetapi sebaliknya orang yang jiwanya guncang dan jauh dari agama maka dia akan mudah stres dan putus asa. Pendapat ini di perkuat dengan adanya firman Allah swt. dalam Qur'an surah Al Baqarah/2 ayat 38 yang berbunyi:

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۗ فَاِمَّا يٰۤاَتِيْنٰكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٣٨﴾

Terjemahan :

Kami berfirman: "Turunlah kamu semuanya dari surga itu! Kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati".

Ayat ini mengajarkan kepada kita agar mengikuti petunjuk yang bersumber dari Allah swt. serta siapa pun yang mengikuti petunjuk Allah

SWT maka tidak akan merasa takut dan tidak pula merasa sedih sehingga terhindar dari stres.

Hanya berpegang teguh kepada Allah swt sesungguhnya dapat menimbulkan rasa tenang dan aman. Rasa tenang dan aman itu menjernihkan pikiran dan pikiran-pikiran yang jernih akan mampu berpikir positif sehingga kira bisa terjauh dari keadaan stres. Sebagaimana firman Allah swt dalam Qur'an surah Ar.rad/13 ayat 28 yang berbunyi :

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

Terjemahan :

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, Hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.

Ayat diatas menjelaskan bahwa dengan mengingat Allah swt maka hati akan menjadi tentram sehingga akan terhindar pikiran yang dapat menyebabkan stres.

Stres emosi yang dialami oleh ibu dengan primigravida menyebabkan peningkatan *corticotropin-releasing hormone* (CRH) oleh hipotalamus, yang kemudian menyebabkan peningkatan kortisol. Efek kortisol adalah mempersiapkan tubuh untuk berespon terhadap semua stresor dengan meningkatkan respon simpatis, termasuk respon yang ditujukan untuk meningkatkan curah jantung untuk mempertahankan tekanan darah. Pada wanita dengan preeklampsia/ eklampsia, tidak terjadi penurunan sensitivitas terhadap vasopeptida-vasopeptida tersebut, sehingga peningkatan besar volume darah langsung meningkatkan curah jantung dan tekanan darah. (Corwin 2001)

Sedangkan preeklampsia pada multigravida berhubungan dengan penyakit kronis yang di derita wanita hamil seperti diabetes melitus, penyakit ginjal dan hipertensi. (Baktiyani, 2005).

Dalam penelitian ini juga ternyata wanita yang menderita preeklampsia lebih banyak pada usia 20 sampai dengan 25 tahun berbeda yang di kemukakan teori bahwa preeklampsia terjadi pada wanita yang berusia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sudinaya (2003) yang menyatakan bahwa preeklampsia/ eklampsia terbanyak pada usia 20 sampai dengan 25 tahun yang terjadi pada primigravida dan lebih sering terjadi pada usia muda dan nulipara, diduga karena adanya suatu mekanisme imunologi disamping endokrin dan genetik. Pada kehamilan pertama pembentukan blocking antibodies yang belum sempurna, dan akan semakin sempurna pada kehamilan berikutnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSIA Siti Fatimah Makassar, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat kejadian preeklampsia pada ibu primigravida pada trimester III di RSIA Siti Fatimah Makassar sebanyak 40 responden dengan persentase 65,6%.
2. Tingkat kejadian preeklampsia pada ibu multigravida pada trimester III di RSIA Siti Fatimah Makassar sebanyak 21 responden dengan persentase 34,4%.
3. Ada perbandingan tingkat kejadian preeklampsia antara ibu primigravida dan multigravida pada trimester III di RSIA Siti Fatimah Makassar.

B. Saran

1. Bagi ibu hamil tetap melaksanakan perawatan *antenatal care* selama masa kehamilan pada fasilitas kesehatan yang tersedia.
2. Bagi petugas kesehatan memberikan penyuluhan kepada calon ibu tentang pencegahan preeklampsia dan meningkatkan kesadaran dalam melakukan pemeriksaan *antenatal care* secara teratur.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk melanjutkan penelitian ini lebih akurat dan mengembangkan penelitian tentang preeklampsia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan terjemahannya*. Semarang: Toha Putra 2006
- Arief M., *Kapita Selekta Kedokteran*. Edisi 3 Jilid 1 Jakarta: Media Aesculapius 2001
- Badan Pusat Statistik SULSEL. *Profil Kesehatan SULSEL*. Makassar: Dinas Kesehatan SULSEL 2009
- Baktiyani S. C. W., Wahjudi I, *Perbedaan Efektifitas Pemberian Vitamin E 100 IU dengan Aspirin 81 mg untuk Pencegahan Preeklampsia Pada Primigravida*. 2005
- Castro C. L.. Chapter 15. *Hypertensive Disorders of Pregnancy*. In : *Essential of Obstetri and Gynecologi*. 4th Ed. Philadelphia : Elsevier Saunders. 2004
- Corwin, Elizabeth. J.,. *Sistem Kardiovaskuler*. Dalam Buku Saku Patofisiologi. Jakarta. Penerbit Buku Kedokteran EGC 2001
- Cunningham, F. Gary. *Hypertensive Disorders In Pregnancy*. In : *Obstetri*. 22nd Ed. New York : Medical Publishing Division. 2005
- Hacker N. F. *Esensial Obstetri dan Ginekologi*. Jakarta 2001
- Hamilton (2003) <http://www.info.kedokteran.net/forum> 17 mei 2010
- Manuaba, Ida Bagus, Gde. *Pengantar Kuliah Obstetri*. Nursalam. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta EGC : 2007
- Nursalam dan Siti Pariani. *Pedoman Praktis Metodologi Riset Keperawatan*. Jakarta: Sagung Seto 2002
- Prawiroharjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta Bina Pustaka 2005
- Rachma N. *Eklampsia : Preventif dan Rehabilitasi Medik Pre dan Post Partum*, in *Holistic and Comprehensive Management Eklampsia*. Surakarta : FK UNS 2008

- Roeshadi H.R.. *Upaya Menurunkan Angka Kesakitan dan Angka Kematian Ibu pada Penderita Preeklampsia dan eklampsia* disampaikan pada pengukuhan Jabatan Guru Besar tetap dalam bidang ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan. Medan 2006
- Saifuddin, Abdul, *Buku panduan praktis pelayanan kesehatan maternal dan neonatal*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo 2002
- Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta Bina Pustaka 2002
- Sudhabrata K.. *Profil Penderita Preeklampsia-Eklampsia di RSUD Tarakan Kaltim* 2001
- Sunaryo R.. *Diagnosis dan Penatalaksanaan Preeklampsia-Eklampsia*, in : *Holistic and Comprehensive Managemen Eclampsia*. Surakarta : FK UNS, 2008
- Suyono, Y.J, *Dasar-Dasar Obstetri & Ginekologi*, edisi 6, Hipokrates, Jakarta
Tomasulo, P.J. & Lubetkin, D., (2006, March 15 – Review date),
Preeclampsia, Availablefrom 2002
- Taber,. *Preeklampsia dan Eklampsia*, Edisi 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2004
- Wibowo B. Rachimhadi T. *Preeklampsia dan Eklampsia*, dalam : *Ilmu Kebidanan*. Edisi III. Jakarta. Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo 2006
- Wiknjostro, Hanifa. *Ilmu kebidanan*, Edisi 3. Jakarta Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo 2005
- Williams, Obstetri : *Hipertensi Dalam Kehamilan*. Jakarta Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2005

