

**HUBUNGAN USIA KEHAMILAN DENGAN KEJADIAN  
NYERI PINGGANG BAWAH PADA IBU HAMIL  
DI RSIA. SITI FATIMAH MAKASSAR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan Pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh

**MIRNAWATI**

**Nim :70300106032**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2010**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 Agustus 2010

Penyusun

**MIRNAWATI**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI NIM : 70300106032

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

**Nama : MIRNAWATI**

**Nim : 70300106032**

**Judul : Hubungan Usia Kehamilan Dengan Kejadian Nyeri Pinggang Bawah Pada Ibu Hamil di RSIA. Siti Fatimah Makassar**

---

Nyeri pinggang bawah selama kehamilan adalah gangguan muskuloskeletal yang terjadi pada daerah pinggang yang disebabkan oleh ketidakseimbangan kerja otot – otot abdomen dan otot – otot erector spine akibat janin dalam kandungan semakin membesar, sehingga ibu akan berusaha membagi berat badan dan menarik bahu kebelakang. Sikapakan ini akan menambah lordosis lumbal dengan akibat tekanan pada otot menimbulkan rasa nyeri di daerah pinggang bagian bawah. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara usia kehamilan dengan kejadian nyeri pinggang bawah pada ibu hamil di RSIA. Siti Fatimah Makassar. Berdasarkan data dari RSIA. Siti Fatimah Makassar tahun 2009, jumlah ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya sebanyak 2907 orang. Dari 2907 ibu hamil ditemukan sekitar 1010 orang ( 48%) mengalami mengalami nyeri pinggang bawah.

Desain penelitian ini adalah penelitian non eksperimental. Pendekatan yang digunakan adalah desain cross sectional. Populasi penelitian adalah semua ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya di RSIA. Siti Fatimah Makassar. Sampel pada penelitian ini sebesar 60 responden. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *total sampling*. Analisis data adalah analisis *univariat* dan analisis *bivariat* menggunakan *Fisher's Exact Test*.

Hasil penelitian menunjukkan, ada hubungan antara usia kehamilan dengan kejadian nyeri pinggang bawah pada ibu hamil dengan uji *Fisher's Exact Test* di dapatkan nilai  $p$  sebesar 0,011 dengan tingkat kemaknaan  $\alpha < 0,05$ , nilai  $p = 0,011 < 0,05$

Dari hasil penelitian diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa usia kehamilan berpengaruh terhadap nyeri pinggang bawah yang di alami seorang ibu hamil pada saat proses kehamilannya. Sarannya yaitu, untuk mengurangi nyeri pinggang bawah yang sedang dialami ibu hamil dapat diberikan massage secara ringan pada daerah yang mengalami nyeri yang efeknya memberikan rileks pada otot dan memperlancar sirkulasi darah.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SAW karena dengan inayah dan iradah-nya, sehingga penyusunan skripsi ini yang berjudul “ Hubungan Usia Kehamilan dan Kejadian Nyeri Pinggang Bawah Pada Ibu Hamil di RSIA. Siti Fatimah Makassar”, dapat diselesaikan dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kesehatan Jurusan Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan keharibaan junjungan Nabi Muhammad SAW, semulia - mulia nabi dan rasul, demikian juga kepada keluarga dan para sahabatnya yang ikut serta memelihara Al - Quran dari segala perubahan dan penyelewengan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat hambatan mulai dari tahap persiapan sampai pada saat penelitian. Namun Alhamdulillah atas bimbingan, arahan, kerja sama, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof.DR.H.Azhar Arsyad,MA. Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Dr.H. M. Furqan Naiem, M. Sc.,Ph. D selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan dukungan berupa kemudahan izin dalam hal penyusunan skripsi ini.

3. Ibu Nurhidayah, S.kep, Ns, M. Kes. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Kesehatan
4. Ibu Risnah, SKM.S. Kep, Ns. M. Kes. Selaku pembimbing I,yang telah memberikan dukungan, saran dan kritik dalam penyusunan skripsi ini.
5. Arbiansih S.Kep.Ns.M. Kes. Selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan yang tiada terhingga dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr.H.Abd.Rahim Yunus, M.Ag, selaku penguji I dan Ibu Hasnah , S.Sit.M.Kes. selaku penguji II yang telah memberikan dukungan, saran, dan kritikan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staf Akademik/Dosen Program Studi Ilmu Keperawatan yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Staf Administrasi, Tata Usaha Dan Perpustakaan FIK (k'Jannah,K'Fian,k'Fatri) yang senantiasa sabar membantu segala kebutuhan perkuliahan.
9. Kepala Bagian Staf Kesatuan Bangsa Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, yang telah memberikan ruang dan waktu serta kerjasama yang baik selama penelitian.
10. Bapak dr.H.Leo Prawirodihardjo.Sp.OG.M.Kes,M.M,Phd selaku kepala UPTD di RSIA. Siti Fatimah Makassar yang telah bekerjasama dengan baik dalam penyelesaian penelitian ini.

11. Kedua orang tua tercinta, H. Badorra dan Mawati yang telah mengasuh, mendidik, menasehati, mengarahkan dan memberikan bantuan moril dan spiritual. Saudaraku (jabbar, irma dan innho') yang selalu setia menemani dan mengantar penulis. Demikian juga kepada seluruh keluarga yang saya merasa sulit mencari kata dan kalimat untuk mengungkapkan penghargaan dan terima kasih penulis kepada mereka.
12. Sahabat-sahabatku yang senantiasa berbagi cerita, cinta dan kehidupan, selalu setia menemani saya baik dalam suka maupun duka (enhie, Rahma, Inchi, Alya, Etri, Ani, Anti, sry, irna dan nasrah serta teman – teman kuliah angkatan 2006 maupun teman – teman kozt di pondok narsis). Yulia Sulastri Pratiwi yang selalu menemani penulis selama penelitian.
13. Cowo ganteng dari keperawatan A (Dhidit, imran, edhie & galih) yang selalu menghibur penulis dan memberikan motivasi.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Anda sekalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan, kelemahan, dan kekurangan yang dimiliki. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga Allah SWT meridhoi segala usaha yang telah kita lakukan selama ini. Amin.

Makassar, Agustus 2010

Penulis

**MIRNAWATI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTARTABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN .....	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	
A. Tinjauan Tentang Kehamilan .....	7
B. Tinjauan Tentang Nyeri Pinggang Bawah Pada Ibu Hamil .....	27
C. Cara Mengatasi Nyeri Pinggang Saat Hamil .....	32
D. Faktor-faktor Lain yang Mempengaruhi Nyeri Pinggang .....	35
BAB III : KERANGKA KONSEP PENELITIAN .....	
A. Kerangka Konsep .....	37
B. Hipotesis .....	37
C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif .....	38
BAB IV : METODE PENELITIAN .....	
A. Jenis Penelitian .....	40



B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	40
C. Populasi dan Sampel .....	40
D. Pengambilan Sampel .....	42
E. Instrument Penelitian .....	43
F. Prosedur Pengumpulan Data .....	44
G. Pengolahan dan Analisis Data .....	44
H. Etika Penelitian .....	46
<b>BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	
A. Hasil penelitian.....	47
B. Pembahasan.....	53
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	




## DAFTAR TABEL

- TABEL 5.1 Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden Berdasarkan Umur
- TABEL 5.2 Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan
- TABEL 5.3 Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden Berdasarkan Jarak Kehamilan
- TABEL 5.4 Distribusi Responden dan Persentase Berdasarkan Usia Kehamilan
- TABEL 5.5 Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden Berdasarkan Kejadian Nyeri Pinggang Bawah
- TABEL 5.6 Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden Berdasarkan Usia Kehamilan dan Nyeri Pinggang Bawah Pada Ibu Hamil

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Master Tabel Penelitian
- Lampiran 2 Lembar Hasil Analisa Data Program SPSS
- Lampiran 3 Lembar Kuisisioner
- Lampiran 4 Permohonan Kesiediaan Menjadi Responden
- Lampiran 5 Lembar Persetujuan Menjadi Responden
- Lampiran 6 Lembar Izin Pengambilan Data Awal
- Lampiran 7 Lembar Izin Penelitian
- Lampiran 8 Lembar Selesai Meneliti



# BABI

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehamilan merupakan anugerah terindah yang diidamkan oleh setiap wanita. Bagi wanita, mengetahui sedini mungkin bahwa dirinya positif hamil adalah sangat penting karena pada beberapa minggu pertama kehamilan, akan terjadi pembentukan organ-organ tubuh yang vital. Perubahan-perubahan fisik dan emosi pada diri ibu hamil biasanya terjadi setiap trimester selama kehamilan. Setiap trimester mempunyai karakteristik yang harus diketahui oleh ibu hamil.

Kehamilan adalah suatu proses dimana sebuah sel mani membuahi sel telur menjadi satu sel di sepertiga bagian distal saluran telur. Kemudian membelah menjadi beberapa sel yang disebut morula dan selanjutnya sebagai blastokist melakukan implantasi pada dinding rahim dimulai dengan perkembangan dan pertumbuhan mudigah sampai janin cukup bulan yang berlangsung selama 9 bulan (40 minggu). (Arif. M.1999).

Proses pertumbuhan janin tersebut diterangkan oleh Allah dalam Qur'an Surah Al- Hajj Ayat 5 dan Hadits Rasulullah SAW.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ  
ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا  
نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لَتَبَلِّغُوا أَشَدَّكُمْ ۗ وَمِنْكُمْ مَّن

يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا  
 وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ  
 كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

Terjemahannya :

“ Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah” (QS. Al- Hajj:5)

Di ungkapkan pula dalam hadis Rasulullah:

عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال ( إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم علقه مثل ذلك ثم يكون مضغاً مثل ذلك ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربعة برزقه وأجله وشقي أو سعيد فوالله إن أحدكم - أو الرجل - يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ) رواه البخاري ومسلم

Terjemahannya :

“ Dari Abu ‘Abdirahman, ‘Abdullah bin Masu’ud, ia berkata, “ Rasulullah SAW, orang yang benar ( Ash Shadiq ) lagi dibenarkan ( Al Mashduq ), bercerita kepada kami , ‘Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan proses penciptaannya di dalam perut ( rahim ) ibunya selama empat puluh hari dalam bentuk nutfhah. Kemudian menjadi ‘alaqah selama empat puluh hari juga. Kemudian menjadi mudhghah selama empat puluh hari juga. Setelah itu, ada seorang malaikat yang di utus kepadanya, kemudian ia meniupkan ruh kepadanya dan ia diperintah untuk menulis empat perkara baginya: menulis

*rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia akan menjadi orang bahagia atau sengsara.*

*Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak di ibadahi dengan benar selain Dia, sungguh ada di antara kalian orang yang mengamalkan amalan ahli surge hingga jarak antara dirinya dengan surge hanya satu hasta. Akan tetapi, suratan takdir dalam kitab telah mendahuluinya. Kemudian dia mengerjakan amalan ahli neraka, lalu iapun masuk kedalamnya.*

*( sebaliknya ), di antara kalian juga ada orang yang mengerjakan amalan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dengan neraka tinggal satu hasta. Akan tetapi, suratan takdir dalam kitab ternyata telah mendahuluinya. Kemudian ia mengerjakan amalan ahli surge, lalu iapun masuk ke dalamnya “ ( Riwayat Bukhari dan Muslim ).*

Dalam rencana strategi nasional *Making Pregnancy Safer* (MPS), disebutkan bahwa visi rencana pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 adalah kehamilan dan persalinan di Indonesia berlangsung aman serta bayi yang akan dilahirkan hidup sehat, dengan misinya menurunkan kesakitan dan kematian maternal dan neonatal melalui pemantapan sistem kesehatan di dalam menghadapi persalinan yang aman.

*Low back pain* ( LBP) atau nyeri punggung bawah merupakan salah satu gangguan muskuloskeletal yang disebabkan oleh aktivitas tubuh yang kurang baik (Maher, Salmond & Pellino, 2002). Gangguan nyeri pinggang bawah dapat dialami oleh semua orang, tidak memandang tua, muda, wanita atau pria. Sebagian besar nyeri pinggang bawah disebabkan karena otot – otot pada pinggang kurang kuat sehingga pada saat melakukan gerakan yang kurang betul atau berada pada suatu posisi yang cukup lama dapat menimbulkan peregangan otot yang ditandai dengan rasa sakit ( Samara, 2003 ).

Studi pendahuluan yang telah dilakukan ditemukan ibu hamil mengeluh sakit pada daerah pinggangnya. Dari 180 ibu hamil ditemukan

sekitar 87 orang (48 %) mengalami nyeri pinggang bawah. Dari 87 ibu hamil ini, 36 orang diantaranya mempunyai keluhan yang bersifat *referred pain* atau nyeri menjalar pada tungkai dan 18 lainnya mengenai pada kedua tungkai, (suharto, 2001).

Berdasarkan data dari RSIA. Siti Fatimah Makassar tahun 2009, jumlah ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya sebanyak 2907 orang. Dari 2907 ibu hamil ditemukan sekitar 1010 orang (48 %) mengalami nyeri pinggang bawah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “ Hubungan Usia Kehamilan dengan Kejadian Nyeri Pinggang Bawah Pada Ibu Hamil “.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “ apakah ada hubungan antara usia kehamilan ibu dengan kejadian nyeri pinggang bawah pada ibu hamil? “

## **C. Tujuan Penelitian**

### 1. Tujuan umum

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah diketahuinya hubungan usia kehamilan ibu dengan kejadian nyeri pinggang bawah pada ibu hamil di RSIA. Sitti Fatimah Makassar.

### 2. Tujuan khusus

- a. Diketahuinya usia kehamilan pada ibu hamil
- b. Diketahuinya nyeri pinggang pada ibu hamil.

- c. Diketuainya hubungan usia kehamilan dengan kejadian nyeri pinggang bawah pada ibu hamil.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Pendidikan**

Penelitian ini bagi pendidikan berguna sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa keperawatan yang ingin mengetahui tentang hubungan usia kehamilan dengan kejadian nyeri pinggang pada ibu hamil.

##### **2. Bagi Pelayanan Keperawatan**

Penelitian ini bagi pelayanan keperawatan berguna untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan perawat untuk memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif.

##### **3. Bagi Klien**

Penelitian ini bagi klien berguna untuk memberikan masukan pada ibu hamil dan keluarga dalam mengekspresikan hal-hal yang mendukung dalam menghadapi kehamilannya sehingga klien dan keluarga dapat memenuhi hal – hal tersebut dan klien tidak khawatir lagi terhadap kehamilannya.

##### **4. Bagi Peneliti / Penulis**

Penelitian ini bagi penulis berguna untuk memperluas wawasan dan pengetahuan penulis tentang hubungan usia kehamilan ibu dengan kejadian nyeri pinggang pada ibu hamil dan berguna sebagai data dasar untuk penelitian selanjutnya.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan**

##### **1. Defenisi**

Kehamilan adalah suatu proses dimana sebuah sel mani membuahi sel telur menjadi satu sel di sepertiga bagian distal saluran telur. Kemudian membelah menjadi beberapa sel yang disebut morula dan selanjutnya sebagai blasokist melakukan implantasi pada dinding rahim dimulai dengan perkembangan dan pertumbuhan mudigah sampai janin cukup bulan yang berlangsung selama 9 bulan (40 minggu). (Arif. M.1999).

Kehamilan merupakan suatu rangkaian proses mulai dari pembuahan (konsepsi) hingga berakhir dengan permulaan persalinan dengan lama kehamilan 22 - 40 minggu. Kehamilan matur (cukup bulan) berlangsung kira-kira 40 minggu (280 hari) dan tidak lebih dari 42 minggu (300 hari). Kehamilan yang berlangsung antara 28 dan 346 minggu disebut prematur sedangkan kehamilan lebih dari 42 minggu disebut postmatur.

Bagi sebagian ibu hamil, terutama bagi ibu – ibu yang baru pertama kali hamil, mengandung dianggap sebuah “misteri “. Pengalaman ini selama membawa kebahagiaan juga mengundang rasa khawatir. Sangat banyak pertanyaan berkecamuk dalam benak ibu. Salah satu yang sering dikhawatirkan ibu hamil adalah aktivitas fisik sehingga memunculkan kelelahan. Juga seberat apa kegiatan itu sehingga dapat menyebabkan janin gugur atau lahir prematur ( Hasuki, 2007).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, islam membenarkan bahwa ibu hamil mengalami kesulitan dalam menjalani kehamilannya. Olehnya itu, seorang anak harus berbakti kepada kedua orangtuanya

terutama pada ibu, karena ibu bersusah payah mengandung dan menanggung beban yang berat saat hamil. Sebagaimana diterangkan oleh ALLAH dalam Qur'an Surah AL – Ahqaaf ayat 15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ  
وَفَصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ  
أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا  
تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

Terjemahannya:

*Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri" (Qur'an Surah AL – Ahqaaf: 15).*

Ikatan antara ibu dan janin berkembang pada periode trimester ketiga. Kekhawatiran orangtua yang berfokus pada kemampuan mental dan fisik anak yang mungkin bercampur dengan khayalan tentang bayi yang akan lahir. perhatian ibu hamil biasanya mengarah pada keselamatan dirinya dan anaknya (Bobak, dkk.2005).

## 2. Gejala dan Tanda Kehamilan

Menurut Mansjoer, Arief ( 2007 ) mengemukakan tanda – tanda kehamilan:

a. Gejala Kehamilan Tidak pasti

1) Amenore ( tidak mendapat haid )

Amenore dapat muncul akibat gangguan endokrin, kelemahan dan kelelahan dapat merupakan tanda anemia atau infeksi.

2) Mual dan muntah ( *nausea dan vomiting* ) dapat disebabkan oleh gangguan pada saluran cerna atau alergi.

3) Mengidam ( menginginkan makanan atau minuman tertentu )

4) Pingsan dan mudah lelah

5) Anoreksia pada bulan – bulan pertama

6) Sering miksi karena kandung kemih tertekan oleh rahim yang membesar.

b. Tanda Kehamilan Tidak Pasti

1) Pigmentasi kulit, terjadi kira – kira minggu ke- 12 atau lebih. Timbul di pipi, hidung, dan dahi. Terjadi karena pengaruh hormon plasenta yang merangsang melanofus dan lutut.

2) Leukor, secret serviks meningkat karena pengaruh peningkatan hormon progesterone.

3) Perubahan payudara. Payudara menjadi tegang dan membesar karena pengaruh estrogen dan progesterone yang merangsang duktuli dan alveoli payudara. Daerah areola menjadi lebih hitam karena deposit pigmen berlebihan. Terdapat kolostrum bila kehamilan lebih dari 12 minggu.

4) Uterus membesar, terjadi perubahan dalam bentuk besar dan konsistensi dari rahim.

5) Perubahan organ – organ dalam pelvic.

c. Tanda Pasti ( + )

1) Pada Palpasi dirasakan bagian janin dan gerak janin.

2) Pada auskultasi terdengar bunyi jantung janin. Dengan stetoskop Laennec bunyi jantung janin terdengar pada kehamilan 18 – 20 minggu dengan alat dupler terdengar pada kehamilan 12 minggu.

3) Dengan ultrasonografi ( USG) dapat dilihat gambaran janin.

3. Cara Menghitung Usia Kehamilan ( Ida Bagus, 1999 )

a. Hari Pertama Haid Terakhir ( HPHT )

Untuk dapat menghitung usia kehamilan berdasarkan HPHT hanya dapat dilakukan oleh ibu hamil yang memiliki siklus haid normal dan teratur ( 28 – 30 hari ). Untuk usia kehamilan berdasarkan HPHT dapat menggunakan rumus *neagle*, selain dapat digunakan untuk menghitung usia kehamilan, rumus ini juga dapat digunakan untuk menghitung hari perkiraan lahir ( HPL ). Penggunaan rumus ini adalah dengan menambahkan 7 pada tanggal pertama dari haid terakhir, kemudian mengurangi bulan dengan 3 dan menambahkan 1 pada tahunnya. Contoh bila haid terakhir tanggal 16 november 2008, diperkirakan persalinan tanggal 23 agustus 2009.

Jika taksiran waktu kelahiran adalah tanggal 23 agustus 2009, maka usia kehamilan tanggal menghitungnya setiap tanggal 23. Jadi pada saat tanggal 23 desember berarti usia kehamilan menginjak 1 bulan, 23 januari usia kehamilan 2 bulan dan seterusnya.

Catatan :

- 1) Rumus ini hanya bisa diterapkan pada wanita yang daur haidnya teratur, yakni antara 28-30 hari.
- 2) perkiraan tanggal persalinan sering meleset antara 7 hari sebelum atau setelahnya. Hanya sekitar 5% bayi yang akan lahir sesuai perhitungan ini.
- 3) untuk mengurangi kemungkinan terlalu melesetnya perhitungan pada wanita yang daur haidnya pendek, akan ditambahkan beberapa hari dari hari-H. Sedang yang daur haidnya panjang, akan dikurangi beberapa hari.
- 4) untuk bulan yang tidak bisa dikurangi 3, misalnya Januari, Februari, dan Maret, maka bulannya ditambah 9, tapi tahunnya tetap.

b. Tinggi Fundus Uteri ( TFU )

Cara menghitung usia kehamilan dengan metode tinggi fundus uteri adalah dengan meraba puncak rahim yang menonjol di dinding perut.

Di sini usia kehamilan dihitung dengan cara :

- 1) Memakai Satuan Cm
  - a) kalau jarak dari tulang kemaluan sampai puncak rahim sekitar 28 cm, ini berarti usia kehamilan sudah mencapai 28 minggu.
  - b) tinggi maksimal puncak rahim adalah 36 cm, dan ini menunjukkan usia kehamilan 36 minggu.

Catatan: Ukuran ini tidak akan bertambah lagi, meski usia kehamilan mencapai 40 minggu. Kalaupun tingginya bertambah, kemungkinan bayi Anda besar, kembar, atau cairan tubuh Anda berlebih.

## 2) Menggunakan 2 Jari Tangan

- a) jika jarak antara tulang kemaluan dengan puncak rahim masih di bawah pusar, setiap penambahan 2 jari berarti penambahan usia kehamilan sebanyak 2 minggu.
- b) bila jarak tadi sudah di atas pusar, setiap penambahan 2 jari sama dengan bertambahnya usia kehamilan 4 minggu.
- c) membandingkan tinggi puncak rahim dan tinggi pusar.
- d) kalau sama-sama tinggi, ini berarti usia kehamilan mencapai 5 bulan.
- e) tinggi puncak rahim yang melewati pusar dan hampir di tengah-tengah dada menunjukkan usia kehamilan sudah sekitar 7 bulan.
- f) jika tinggi puncak rahim sudah mencapai dada, dapat dipastikan usia kehamilan 9 bulan.

## c. Ultrasonografi ( USG )

USG dapat menentukan usia kehamilan dan memperkirakan waktu kelahiran si kecil berdasarkan “gambar” janin yang muncul pada layar monitor dengan bantuan transducer. USG sering digunakan untuk melengkapi kepastian usia kehamilan. Meski biaya pemeriksaannya agak mahal, tapi tingkat akurasinya tinggi, yakni sekitar 95%.

4. Periode Kehamilan Ditinjau Dari Tuanya Kehamilan (Arief. Mansjoer (2000))

a. Trimester I ( konsepsi 12 minggu kehamilan )



Suatu periode dimana terjadi pembuahan yang tidak tampak selama trimester ini, pada organ-organ tubuh janin misalnya jantung, paru-paru dan otak sudah mulai terbentuk.

Tahap perkembangan bayi pada trimester ini, yaitu :

1). 0 - 4 Minggu

Pada minggu-minggu awal ini, janin Anda memiliki panjang tubuh kurang lebih 2 mm. Perkembangannya juga ditandai dengan munculnya cikal bakal otak, sumsum tulang belakang yang masih sederhana, dan tanda-tanda wajah yang akan terbentuk.

2). 4 - 8 Minggu



Ketika usia kehamilan mulai mencapai usia 6 minggu, jantung janin mulai berdetak, dan semua organ tubuh lainnya mulai terbentuk. Muncul tulang-tulang wajah, mata, jari kaki, dan tangan.

### 3). 8 - 12 Minggu

Memasuki minggu-minggu ini, organ-organ tubuh utama janin telah terbentuk. Kepalanya berukuran lebih besar daripada badannya, sehingga dapat menampung otak yang terus berkembang dengan pesat. Ia juga telah memiliki dagu, hidung, dan kelopak mata yang jelas. Di dalam rahim, janin mulai diliputi cairan ketuban dan dapat melakukan aktifitas seperti menendang dengan lembut. Organ-organ tubuh utama janin kini telah terbentuk.

Pada masa ini terjadi perubahan-perubahan seperti:

- a). Payudara dan puting susu mulai membesar
  - b). Cepat lelah dan letih.
  - c). Emesis Gravidarum atau morning sickness.
  - d). Sering miksi.
  - e). Pertambahan berat badan.
- b. Trimester II (12 minggu - 28 minggu)

Periode dimasa uterus bertambah besar dan mendorong organ sekitarnya dalam rongga perut. Ibu mulai merasakan gerakan janin dan kehamilan bulan ke - 6 sudah dapat dirasakan adanya tendangan-tendangan janin.

Tahap perkembangan janin pada trimester ini, yaitu :

1). 12 - 16 Minggu

Paru-paru janin mulai berkembang dan detak jantungnya dapat didengar melalui alat ultrasonografi (USG). Wajahnya mulai dapat membentuk ekspresi tertentu dan mulai tumbuh alis dan bulu mata. Kini ia dapat memutar kepalanya dan membuka mulut. Rambutnya mulai tumbuh kasar dan berwarna.

2). 16 - 20 Minggu

Ia mulai dapat bereaksi terhadap suara ibunya. Akar-akar gigi tetap telah muncul di belakang gigi susu. Tubuhnya ditutupi rambut halus yang disebut lanugo. Si kecil kini mulai lebih teratur dan terkoordinasi. Ia bisa mengisap jempol dan bereaksi terhadap suara ibunya. Ujung-ujung indera pengecap mulai berkembang dan bisa membedakan rasa manis dan pahit dan sidik jarinya mulai nampak.

3). 20 - 24 Minggu

Di bawah kulit, lemak sudah mulai menumpuk, sedangkan di kulit kepalanya rambut mulai bertumbuhan, kelopak matanya membuka, dan otaknya mulai aktif. Ia dapat mendengar sekarang, baik suara dari dalam maupun dari luar (lingkungan). Ia dapat mengenali suara ibunya dan detak jantungnya bertambah cepat jika ibunya berbicara. Atau boleh dikatakan bahwa pada saat ini merupakan masa-masa bagi sang janin mulai mempersiapkan diri menghadapi hari kelahirannya.

4). 24 - 28 Minggu

Di bawah kulit, lemak sudah mulai menumpuk, sedangkan di kulit kepalanya rambut mulai bertumbuhan, kelopak matanya membuka, dan otaknya mulai aktif. Ia dapat mendengar sekarang, baik suara dari dalam maupun dari luar (lingkungan). Ia dapat mengenali suara ibunya dan detak jantungnya bertambah cepat jika ibunya berbicara. Atau boleh dikatakan bahwa pada saat ini merupakan masa-masa bagi sang janin mulai mempersiapkan diri menghadapi hari kelahirannya.

c. Trimester III (28 - 40 minggu)

Janin tumbuh dengan pesat, berat badan bayi bertambah 200 - 300 gram perminggu dan mencapai panjang kurang lebih 50 cm pada kehamilan cukup bulan. Ibu mengeluh napas menjadi pendek akibat rahim yang mendesak diafragma dan mulai merasakan kontraksi.

Tahap perkembangan janin pada trimester ini yaitu :

1). Minggu ke 29

Posisi bayi saat ini mempersiapkan diri seperti posisi lahir dengan kepala ke arah bawah. Jaringan lemak terus terbentuk.

2). Minggu ke 30

Bayi anda mengisi hampir seluruh ruang di rahim anda. Ketika bayi menendang atau mendorong, anda dapat melihat kaki atau tangannya bergerak dibawah kulit perut anda dan otak berkembang sangat cepat.

3). Minggu ke 31

Bayi makin tumbuh besar, maka ruangan rahim menjadi lebih sedikit, bayi akan berkurang gerakannya. Bayi kemungkinan dalam posisi melengkungkan badan dengan dengkul dilipat, dagu di dadanya dan tangan serta kaki saling bersilang.

4). Minggu ke 32

Bayi berada dalam posisi kepala dibawah sampai nanti lahir. Bayi akan tetap menendang, gerakan rata-rata sehari meningkat 375 perhari, tapi anda tidak akan merasakan semuanya ini, 10 gerakan sehari sudah normal.

5). Minggu ke 33

Anda akan makin merasakan gerakannya karena bayi mengisi hampir seluruh ruang rahim. Gerakan akan menjadi aktif suatu waktu yang membuat anda tak nyaman, terutama ketika kakinya dibawah tulang rusuk. Bayi mempunyai seluruh rambutnya pada minggu ini.

6). Minggu ke 34

Pertumbuhan terutama pada otak dalam minggu – minggu ini. Semua system sudah terbentuk sempurna, walaupun paru – paru masih tetap belum matang. Bayi memberi respon terhadap suara yang familiar.

7). Minggu ke 35

Bayi terus menambah cadangan lemak bawah kulitnya. Kepala bayi sudah mulai memasuki panggul.

8). Minggu ke 36

Mulai dari minggu ini bayi sudah mempunyai ukuran dan kematangan yang siap untuk lahir. Jika bayi lahir pada minggu ini bayi lahir premature tetapi bayi akan baik saja. Pada bulan terakhir kehamilan ini bayi akan mendapat antibody dari ibunya, seperti campak. Lemak akan terus bertambah di bawah kulit bayi setiap hari.

9). Minggu ke 37

Bayi akan terus berlatih untuk menggerakkan paru – parunya, karena bayi akan bernafas setelah dilahirkan. Jika posisi kepala bayi dibawah maka kemungkinan kepala sudah memasuki panggul ibu.

10). Minggu ke 38

Reflek bayi sudah terkoordinasi, bayi sudah dapat mengedipkan mata, menggerakkan kepala, memegang, dan merespon suara, sentuhan, dan cahaya. Bayi sudah dapat membedakan antara terang dan gelap.

11). Minggu ke 39-40

Bayi sudah siap untuk lahir. Bayi sudah terlihat cukup montok, dengan lemak yang terbentuk dibawah kulitnya, akan mampu mengatur suhu tubuhnya saat lahir. Kulit bayi halus dan lembut. Berat bayi sekitar 2,7 kg – 3,2 kg dengan panjang sekitar 50cm.

Pada kehamilan yang berumur lebih dari 6 bulan akan terjadi perubahan pada organ dalam perut dan terjadi perubahan volume yang dihasilkan oleh uterus, darah, dan cairan lainnya

sehingga akan terjadi pula perubahan berat badan dari biasanya dan otot-otot perut juga akan elastis mengikuti perubahan janin dalam kandungan, sehingga mau tidak mau akan terjadi perubahan fisik secara fisiologis pada ibu hamil.

Dengan bertambahnya usia kehamilan maka jelas bahwa penambahan sudut lengkungan tulang belakang yang semakin meningkat yang dikenal dengan nama sway back terjadi gerak pelvis kedepan sehingga menyebabkan jaringan pengikat sendi menegang dan bilamana posisi yang salah tersebut berlangsung lama akan menimbulkan ketegangan pada jaringan ikat sendi dan otot sehingga menimbulkan kelelahan pada otot-otot ( Suharto, 2001).

## 5. Keluhan / Ketidaknyamanan Selama Kehamilan Dan Cara Mengatasinya

### a. Mual Muntah

Mual muntah adalah keluhan yang sering terjadi pada ibu hamil muda, disebut juga *morning sickness*. Biasanya timbul pada minggu ke-6 hingga ke-12 kehamilan, paling berat minggu 9-10 dan biasanya hilang pada minggu ke-16. Keluhan ini disebabkan peningkatan hormon beta hCG pada awal kehamilan, sehingga memicu peningkatan asam lambung dan menyebabkan ibu hamil merasa kembung dan nyeri ulu hati.

Cara Mengatasinya :

- 1). Bangun perlahan pada pagi hari, kemudian konsumsi makanan ringan dan teh manis sebelum benar-benar berdiri dan beraktivitas. Sediakan camilan dekat tempat tidur sehingga mudah meraihnya saat bangun atau merasa lapar dan mual.
- 2). Apabila merasa mual terus menerus usahakan tetap makan apa saja yang mampu dikonsumsi. Jangan berhenti makan walaupun sedikit, setidaknya dua jam sekali dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat sehingga mengalihkan perhatian kita dari rasa mual tersebut.
- 3). Hindari makanan yang pedas, goreng-gorengan, makanan bersantan, dan bau-bauan yang menyebabkan asam lambung meningkat sehingga gejala mual bertambah parah. Ingat, bahwa wanita hamil memiliki penciuman yang lebih sensitif terhadap bau-bauan (contohnya ada yang sangat sensitif dengan bau masakan, bau detergen, bahkan ada yang bau parfum suami).
- 4). Banyak minum, makanan yang mengandung jahe., mengandung vitamin B (biasanya dari buah alpukat, jagung, kacang atau suplemen). Cukup istirahat dan tidur biasanya dapat meringankan gejala mual muntah pada ibu hamil.

b. Kembung

Kembung adalah gejala yang terdapat pada ibu hamil trimester I dan trimester III. Pada awal kehamilan biasanya akibat kerja hormon

kehamilan yang punya efek memperlambat kerja usus. Sedangkan pada trimester III, pembesaran uterus sehingga menekan pergerakan saluran pencernaan juga merupakan penyebab terjadinya gejala tersebut.

Cara mengatasinya :

- 1). Kurangi makanan dan minuman yang mengandung banyak gas seperti kol, kacang- kacangan, minuman bersoda, asparagus.
- 2). Olahraga yang ringan dan teratur dapat membantu proses pencernaan dalam tubuh.
- 3). Hindari hal-hal yang dapat menyebabkan udara tertelan cukup banyak dalam tubuh seperti: jangan minum memakai sedotan, makanlah perlahan-lahan, jangan minum terlalu banyak saat makan, dll.

#### c. Keputihan

Vagina secara normal memang mengeluarkan cairan yang jernih, tidak berbau dan tidak gatal yang berasal dari sekresi kelenjar dinding vagina, leher rahim, dan flora normal vagina. Namun pada saat hamil, cairan tersebut menjadi lebih banyak. Hal ini wajar terjadi akibat adanya perubahan hormonal dan peningkatan sirkulasi pada alat kelaminwanita tersebut. Apabila terjadi perubahan lain misalnya berbau tidak sedap, putih seperti susu, kuning atau kehijauan, nyeri atau bahkan gatal, maka bisa disimpulkan telah terjadi infeksi yang biasa disebabkan jamur atau bakteri. Menjaga kebersihan diri merupakan pencegahan paling utama terhadap penyakit ini.

Cara mengatasinya :



- 1). Tidak perlu pengobatan pada keputihan yang normal.
- 2). Menjaga kebersihan dan kesehatan khususnya kebersihan dan kesehatan daerah alat kelamin misalnya mencuci daerah kemaluan dari depan, jaga kelembaban serta menggunakan pakaian dalam yang tidak terlalu ketat dan terbuat dari katun, menyerap keringat, sehingga tidak lembab.
- 3). Jangan melakukan basuh vagina (*douche*) agar tidak mengganggu keseimbangan flora normal dalam vagina dan dapat meningkatkan risiko infeksi vagina.

d. Sembelit (Susah Buang Air Besar)

Sembelit biasanya terjadi pada trimester I dan trimester III, oleh karena adanya perubahan hormonal dan penekanan usus bagian bawah akibat pembesaran uterus. Hal ini akibat efek pencernaan makanan yang cukup lama. Adanya pemberian zat besi pada ibu hamil juga dapat mengakibatkan sembelit. Namun hal ini tidak berbahaya, apabila tidak ada penyakit lain.

Cara mengatasinya :

- 1) Konsumsi makanan berserat seperti roti gandum, sereal buah, sayuran, buah-buahan dan kacang-kacangan.
- 2) Makanlah sedikit namun sering sehingga pencernaan tetap aktif.
- 3) Banyak minum.
- 4) Olahraga teratur untuk menjaga kekuatan otot dan membuat saluran pencernaan tetap aktif.

e. Rasa Kencang di Perut (kontraksi)

Rasa kencang atau kontraksi yang dirasakan oleh ibu hamil namun tidak mengarah pada persalinan (kontraksi *Braxton Hicks*). Biasanya timbul mulai minggu ke-20 hingga ke-22. Kontraksi makin sering dengan meningkatnya usia persalinan. Hal ini wajar terjadi namun apabila terjadi lebih dari enam kali dalam satu jam, tidak berhenti walaupun sudah istirahat dan minum air, maka dianjurkan agar konsul ke dokter.

Cara mengatasinya:

- 1) Minumlah cairan dalam jumlah yang cukup karena dehidrasi dapat menimbulkan kontraksi.
- 2) Saat terjadi kontraksi, duduk dengan tenang serta tarik napas dalam perlahan. Hal ini dapat meringankan rasa nyeri akibat kontraksi uterus.
- 3) Usahakan relaks dan istirahat yang cukup, dapat mengurangi kejadian kontraksi uterus.

f. Kram Kaki

Kram kaki banyak dikeluhkan ibu hamil, terutama pada triwulan kedua. Bentuk gangguan berupa kejang pada otot betis atau otot telapak kaki. Kram kaki cenderung menyerang pada malam hari selama 1-2 menit. Walau singkat, tapi dapat mengganggu tidur, karena rasa sakit yang menekan betis atau telapak kaki. Hingga kini, penyebab kram belum diketahui pasti. Diduga adanya ketidakseimbangan mineral di dalam tubuh ibu yang memicu gangguan pada system persarafan otot-

otot tubuh. Penyebab lainnya adalah kelelahan yang berkepanjangan, serta tekanan rahim pada beberapa titik persarafan yang berhubungan dengan saraf-saraf kaki.

Cara mengatasinya :

- 1) Meningkatkan konsumsi makanan yang tinggi kandungan kalsium dan magnesium seperti aneka sayuran berdaun serta susu dan produk olahannya. Kalau ini sulit dipenuhi, ibu dapat berkonsultasi kepada bidan/dokter mengenai makanan tinggi kalsium yang mudah diperoleh di daerahnya.
- 2) Senam hamil secara teratur. Senam hamil dapat memperlancar aliran darah dalam tubuh.
- 3) Jika kram menyerang pada malam hari, bangkitlah dari tempat tidur. Lalu berdiri selama beberapa saat. Tetap lakukan meski kaki terasa sakit.
- 4) Dapat juga dilakukan pijatan. Luruskan kaki. Minta bantuan suami untuk menarik telapak kaki ke arah tubuh dengan sebelah tangan, sementara tangan satunya menekan lutut ke bawah. Tahan selama beberapa detik sampai kramnya hilang.

#### g. Bengkak Pada Kaki

Pembengkakan yakni penimbunan cairan akibat kadar garam yang terlalu tinggi dalam tubuh. Garam memang bersifat menahan air. Biasanya, pembengkakan muncul di triwulan ketiga kehamilan. Sebenarnya, pembengkakan dapat terjadi di seluruh tubuh. Tapi bagian

tubuh yang sering jadi sasaran berkumpulnya cairan adalah tangan dan kaki. Itu semua karena air yang selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Pembengkakan dapat merupakan gejala keracunan kehamilan (preeklampsia) dengan timbulnya tekanan darah tinggi, air kemih mengandung protein dan nyeri kepala yang hebat. Jika timbul gejala-gejala tersebut anjurkan ibu untuk segera memeriksakan pada tenaga kesehatan berwenang seperti bidan atau dokter untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Preeklampsia yang tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi eklampsia, yang sangat fatal bagi ibu dan janin.

Cara mengatasinya :

- 1) Mengurangi makanan yang banyak mengandung garam, misalnya telur asin, ikan asin dan lain-lain. Setelah bangun pagi, angkat kaki selama beberapa saat. Ibu juga dapat mengganjal kaki dengan bantal agar aliran darah tidak sempat berkumpul di pergelangan dan telapak kaki.
- 2) Anjurkan ibu untuk sering mengangkat kaki, agar cairan di kaki mengalir ke bagian atas tubuh.
- 3) .Bagi ibu yang bekerja di kantor dan banyak duduk, jaga agar posisi kaki lebih tinggi. Gunakan bangku kecil atau tumpukan buku sebagai penopang kaki.

- 4) Naikkan kaki di atas bangku kecil atau sofa selama duduk. Lakukan sesering mungkin untuk memperkecil kemungkinan terjadinya sumbatan pada aliran darah di kaki. Kalau aliran darah pada kedua kaki lancar-lancar saja, berbagai keluhan akan langsung hilang.
- 5) Jangan menyalangkan kaki ketika duduk tegak, sebab akan menghambat aliran darah di kaki.
- 6) Jika upaya-upaya yang dilakukan diatas tidak berhasil maka segera periksakan diri ibu ke tenaga kesehatan berwenang seperti bidan atau dokter untuk mendapat pemeriksaan dan pengobatan.

## **B. Tinjauan Tentang Nyeri Pinggang Bawah Pada Ibu Hamil**

### **1. Defenisi**

Nyeri adalah Pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang aktual atau potensial. Nyeri pinggang bawah selama kehamilan dapat timbul sebagai akibat ketidakseimbangan antara kerja otot postural dan otot fasis yang terdapat pada daerah lumbalis, sehingga dapat menyebabkan otot lumbalis cenderung memendek disertai hyperlordosis dari lumbal sedang otot abdomen cenderung lentur dan perubahan sikap tubuh dari bertambahnya umur kehamilan karena berat berpindah kedepan akibat janin dalam kandungan semakin membesar dan juga di imbangi dengan adanya

lordosis yang berlebihan pada lumbal. Pertambahan uterus mengarah kedepan menyebabkan ibu akan berusaha membagi berat dengan menarik bahu kebelakang. Sikap demikian akan menambah lordosis lumbal dengan akibat tekanan pada otot menimbulkan rasa nyeri di daerah pinggang bagian bawah ( Thomas sullivan, 2005 )

## 2. Gejala

Menurut Thomas sullivan ( 2005 ) biasanya gejala – gejala nyeri pinggang yang timbul selama kehamilan adalah nyeri yang sifatnya menjalar mulai dari pinggang, paha sampai kaki.

Pembesaran uterus menimbulkan sakit pinggang bagian bawah. Hal ini karena rahim menekan dua saraf sciatic yang berada di punggung bagian bawah hingga kaki, tekanan ini menyebabkan sciatica. Ibu hamil akan merasa kesemutan atau gatal disekitar pantat, pinggul atau paha. Ketika bayi mengubah posisi mendekati waktu kehamilan, nyeri pinggul semakin berkurang ( Ari nugraha, 2007 ).

Menurut Thomas W Hanlon ( 2001 ), lordosis atau tulang pinggang melengkung biasanya terjadi pada masa kehamilan karena adanya pergeseran pada pusat keseimbangan badan yang bergerak maju searah dengan tulang belakang dan karena beban rahim diatas daerah pelvis menyebabkan pelvis bergeser kedepan sehingga pinggang menjadi semakin melengkung akibatnya bahu sering melurut kedepan untuk mengimbangnya. Keadaan ini dapat menyebabkan sakit pinggang dan kejang otot.

Menurut Richard G. Fesler ( 2007 ), nyeri pinggang bagian bawah menggambarkan suatu nyeri yang tiba – tiba tajam, terus - menerus atau tumpul yang dirasakan pada daerah pinggang bawah.

Menurut Pramuji Utomo ( 2006 ), gejala yang tampak pada nyeri pinggang bawah secara umum adalah nyeri yang terasa di daerah pinggang seperti rasa terbakar, teriris atau tertusuk. Nyeri tersebut hilang timbul dan dapat disertai dengan adanya kesemutan dan kelemahan ditungkai dua kaki.

Nyeri pinggang bawah akibat faktor mekanikal ditandai dengan gejala sebagai berikut :

- a. Nyeri terjadi secara intermitten / terputus – putus.
- b. Sifat nyeri tajam dan mendadak, dipengaruhi oleh sikap / gerakan yang bisa meringankan atau memberatkan keluhan.
- c. Nyeri hilang setelah istirahat dalam waktu yang cukup dan nyeri muncul setelah beraktifitas.

### 3. Etiologi

Penyebab nyeri pinggang pada ibu hamil dapat disebabkan oleh berbagai factor seperti perubahan postur tubuh, perubahan hormon, perubahan mekanisme tubuh dan kelelahan otot ( Debora Vasseley, 2006 ).

Menurut Plizer education health ( 2001 ) menyatakan bahwa nyeri pinggang bawah biasanya disebabkan oleh percabangan ligamen tulang belakang yang berlebihan dan nyeri pinggang bawah jauh lebih sering terjadi pada wanita daripada pria.

Pada ibu hamil timbul keluhan nyeri pada pinggang bawah akibat pengaruh hormon yang menimbulkan gangguan pada substansi dasar bagian penyangga dan jaringan penghubung sehingga mengakibatkan menurunnya elastisitas dan fleksibilitas otot. Selain itu, disebabkan karena aktivitas fisik yang berlebihan, seperti; mengangkat benda berat, membungkuk, posisi tubuh yang tidak tepat saat beraktivitas, seperti; naik tangga, duduk dan berdiri dari tempat duduk (seperti masuk dan keluar dari mobil, bak mandi, tempat tidur), memutar badan terlalu keras, membungkukkan badan ke depan, berlari, dan berjalan dengan kecepatan yang berlebihan. Gangguan nyeri pinggang akan terasa lebih parah jika sebelum hamil si ibu telah merasakan kondisi ini.

Ada 2 titik lokasi yang diserang oleh rasa nyeri, yaitu:

- a. Pinggang bagian bawah/lumbal. Biasanya rasa nyeri dirasakan pada bagian atas pinggang di garis tengah tulang belakang. Nyeri ini bisa atau tanpa penjalaran ke tungkai atau kaki. Biasanya nyeri ini timbul bila ibu hamil bekerja dengan posisi duduk atau berdiri terlalu lama, atau melakukan pekerjaan mengangkat barang secara berulang. Otot-otot di sepanjang punggung akan terasa tegang.
- b. Panggul bagian belakang. Nyeri pada bagian ini lebih sering dirasakan oleh ibu hamil dibandingkan nyeri pada pinggang bagian bawah. Rasa nyeri dirasakan sampai garis pinggang di atas tulang ekor. Dan cenderung meluas hingga ke bokong dan belakang paha. Nyeri pada bagian ini kadang juga disertai dengan nyeri tulang kemaluan.



#### 4. Patofisiologi Nyeri Pinggang Bawah Pada Ibu Hamil

Pada kehamilan timbul rasa nyeri pinggang bawah akibat pengaruh hormone yang menimbulkan gangguan pada substansi dasar bagian penyangga dan jaringan penghubung sehingga mengakibatkan menurunnya elastisitas dan fleksibilitas otot. Selain itu juga disebabkan oleh factor mekanika yang mempengaruhi kelengkungan tulang belakang oleh perubahan sikap statis dan penambahan beban pada saat ibu hamil (Suharto, 2001 ).

Pada kehamilan, akan terjadi perubahan pelvis menjadi sedikit berputar kedepan karena pengaruh hormonal dan kelemahan ligament. Pada keadaan hiperekstensi tulang belakang terjadi pergesekan antara kedua facet dan menjadikan tumpuan berat badan, sehingga permukaan sendi tertekan, keadaan ini akan menimbulkan rasa nyeri. Kadang - kadang dapat mengiritasi saraf ischiadicus. Dan apabila terjadi penyempitan pada bantalan tulang belakang, nyeri akan bertambah hebat. Keadaan ini akan menimbulkan ketidakseimbangan antara otot perut dan otot punggung.

Sendi yang akan membentuk tulang belakang dan panggul sebagian merupakan sendi sindesmosis. Sendi sakroiliak berbentuk huruf L, permukaan sendinya tidak simetris, tidak rata dan posisinya hampir dalam bidang sagital serta permukaan tulang sacrum lebih cekung. Gerakan yang terjadi adalah rotasi dalam jarak gerak terbatas yang dikenal dengan nama nutasi dan konter nutasi. Pelvis menerima beban dari tulang belakang dengan distribusi gaya merupakan ring tertutup. Pada

kehamilan gerak sendi ini dapat meningkat karena pengaruh hormonal. Panggul dan sakrum yang bergerak kedepan menyebabkan posisi sendi sakroiliaka juga berubah, dikombinasi dengan adanya laxity akan menyebabkan keluhan-keluhan pada sendi yang lain (Suharto 2001).

### **C. Cara Mengatasi Nyeri Pinggang Saat Hamil**

Untuk mengurangi nyeri pinggang kepada para ibu yang sedang mengandung, maka dilakukan beberapa cara :

- 1) Selalu membiasakan diri sejak kehamilan muda untuk berpostur dan bersikap sehat, yaitu sebelum rahim setinggi pusat, biasakan bersikap tegak jangan bungkuk, bahu ditarik ke belakang dan bawah serta hindari alas kaki bertumit tinggi.
- 2) Pilihlah posisi yang nyaman saat duduk atau sedang berdiri, bila sedang duduk angkat sedikit kaki dan jangan menyilangkan kaki. Cobalah untuk selalu mengubah posisi.
- 3) Hindari mengangkat beban berat, bila sedang mengangkat sesuatu cobalah untuk berdiri perlahan menggunakan penyangga lutut.
- 4) Cobalah menggunakan bahan penghangat untuk mengurangi nyeri belakang ( pinggang), seperti handuk atau kain yang sudah direndam air hangat, pijat atau urut pinggang dengan minyak penghangat.
- 5) Selalu menjaga kebugaran tubuh dengan aktivitas olahraga teratur, seperti misalnya berenang sangat dianjurkan dalam hal ini.

Selain itu, Untuk mengatasi nyeri pinggang ibu hamil, perlu dilakukan beberapa teknik latihan, sebagai berikut :

1. Persiapan latihan

- a. Pakaian pasien sebaiknya menggunakan pakaian latihan.
- b. Posisi pasien diatur sedemikian rupa dengan rileks.

2. Sebelum melakukan latihan perlu dilakukan gerakan-gerakan kecil pemanasan pada pinggang dan tungkai secara pelan dan lembut.

3. Pelaksanaan

Latihan ini dilakukan 5 sampai dengan 7 detik dan diulang 10 kali setiap session latihan. Namun harus juga diperhatikan kemampuan dan daya tahan pasien apabila pasien merasa lelah maka harus diistirahatkan.

4. Tujuan latihan ini adalah:

- a. Untuk mengurangi rasa nyeri pada pinggang bawah
- b. Merileksasikan otot-otot belakang pinggang
- c. Memelihara jarak gerak sendi pelvic dan lumbosacral
- d. Memperkuat otot-otot perut dan dasar panggul dalam membantu proses pendorongan bayi keluar.

1). Latihan 1

Duduklah bersila pada lantai, punggung dilemaskan.

Lakukanlah sikap duduk seperti ini sebanyak mungkin. Posisi ini akan membantu memperkuat otot-otot paha. Bila merasa lelah setelah duduk seperti ini, rentangkan kedua tungkai sebentar, lalu goyang-goyangkan dan kembali bersikap bersila.

2). Latihan 2

Duduklah dilantai dan rapatkan kedua telapak kaki anda satu sama lain, kemudian tariklah kaki / tumit sedekat mungkin dengan badan anda. Letakkan tangan pada masing-masing paha dan lakukanlah penekanan secara perlahan-lahan. Akan terasa otot-otot disebelah dalam paha tertarik.

### 3). Latihan 3

Berbaring telentang, kedua lengan berada disisi tubuh. Lakukan pernapasan bersih dalam-dalam. Kini angkatlah tungkai kanan perlahan-lahan, rapatkanlah jari-jari kaki anda, dan bernapas perlahan-lahan lewat hidung. Perhatikan agar kedua lutut tetap lurus, lalu bengkokkan kaki, turunkan tungkai perlahan-lahan dan bersamaan gerakan ini hembuskan napas lewat mulut dan bibir. Ulangi latihan ini pada tungkai yang kiri. Perhatikan agar gerak pernapasan selaras dengan gerakan mengangkat dan menurunkan tungkai. Rapatkan jari-jari kaki pada saat tungkai diangkat dan bengkokkan kaki pada saat diturunkan. Jagalah agar kedua tungkai selalu dalam sikap lurus.

### 4). Latihan 4

Berbaring telentang, rentangkan kedua lengan tegak lurus terhadap badan. Lakukanlah pernapasan bersih dalam-dalam. Kemudian angkat tungkai kanan,rapatkan jari-jari kaki dan tarik napas lewat hidung. Lanjutkan prosedur ini dengan membengkokkan kaki anda,dan turunkan tungkai kesebelah kanan sementara menghembuskan napas keluar lewat mulut. Rentangkan tungkai sedapat mungkin mendekati

lengan yang telentang. Kemudian rapatkan jari-jari kaki, tarik napas lewat hidung dan angkatlah tungkai, bengkokkan kaki dan turunkan tungkai kelantai sementara menghembuskan napas keluar lewat mulut. Ulangi proses ini pada tungkai kiri. Perhatikan agar bagian panggul yang berlawanan dengan tungkai yang digerekkkan tetap datar dan menempel pada lantai.

#### 5). Latihan 5

Berbaring telentang dan tekuk kedua lutut sehingga telapak kaki melekat rapat pada lantai. Rapatkan punggung termasuk kedua bahu pada lantai. Bersamaan dengan itu, tariklah otot-otot perut sebelah bawah dan biarkan pantat anda sedikit terangkat dari lantai, kemudian lepaskan. Latihan ini harus dilakukan dengan pernapasan yang teratur, mulailah menarik napas, lalu hembuskan keluar perlahan-lahan lewat mulut. Sementara menghembuskan napas rapatkanlah punggung pada lantai, tegangkan otot-otot perut, tarik napas ketika melemaskan punggung dan perut (Suharto 2001).

### **D. Faktor – Faktor Lain Yang Mempengaruhi Nyeri Pinggang**

#### 1. Umur ibu

Dalam hukum reproduksi sehat diikenal bahwa usia aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20 - 30 tahun. Umur ibu berpengaruh dalam suatu persalinan dalam masa reproduksi sehat dianjurkan agar umur seorang ibu melahirkan antara umur 20 - 30 tahun. Jika umur seorang wanita < dari 20 tahun merupakan resiko tinggi karena alat-alat reproduksi

belum siap untuk menerima hasil konsepsi sehingga keluhan-keluhan kemungkinan lebih besar terjadi, jika umur wanita > dari 30 tahun juga beresiko karena alat reproduksi mulai mengalami kemunduran (BKKBN),1990.

## 2. Paritas

Paritas adalah jumlah persalinan yang pernah dialami oleh seorang ibu selama hidupnya. Status paritas yang tinggi dan jumlah anak yang lebih dari 3 orang dapat mempengaruhi status kesehatan ibu. Hal ini diterangkan bahwa setiap kehamilan yang disertai persalinan akan menyebabkan kelainan pada uterus, dalam hal ini terjadi kerusakan pada pembuluh darah dinding uterus yang mempengaruhi sirkulasi nutrisi kejanin.

## 3. Interval atau jarak kehamilan

Mengatur jarak kehamilan membantu melindungi kesehatan anak, seorang bayi lahir setelah 2 tahun dari kehamilan pertama, cenderung lebih bertahan dari seorang bayi yang dikandung lebih dini. Lamanya seorang ibu membutuhkan waktu 2-4 tahun jarak kehamilan agar dapat pulih secara fisiologis dari suatu kehamilan atau persalinan berikutnya (Pritchard at al, 2000).



### BAB III

## KERANGKA KONSEP PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN


MAKASSAR

### A. Kerangka Konsep

Berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas, maka kerangka konsep pada penelitian ini adalah “usia kehamilan dengan kejadian nyeri pinggang bawah pada ibu hamil”

Variabel Independent

Variabel Dependent



Keterangan :

—————→ : Variabel yang diteliti

-----→ : Variabel yang tidak diteliti

## **B. Hipotesis**

### 1. Hipotesis Nol ( $H_0$ )

Tidak Ada hubungan antara usia kehamilan ibu dengan kejadian nyeri pinggang pada ibu hamil.

### 2. Hipotesis alternatif ( $H_a$ )

Ada hubungan antara usia kehamilan ibu dengan kejadian nyeri pinggang pada ibu hamil.

## **C. Defenisi Operasional Dan Kriteria Obyektif**

Defenisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang di amati, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. ( Azis Alimul, 2008 ).

### 1. Usia kehamilan

Usia kehamilan adalah masa dimana janin tumbuh dalam kandungan dan diikuti penambahan berat sehingga mempengaruhi fisik ibu yang mengandung, usia kehamilan dihitung berdasarkan hari pertama haid terakhir ( HPHT ).

Kriteri obyektif :



Trimester II : usia kehamilan 12 – 28 minggu

Trimester III : usia kehamilan 28 – 40 minggu

## 2. Nyeri pinggang bawah pada ibu hamil

Nyeri pinggang pada ibu hamil merupakan pernyataan subyektif kualitas nyeri yang dialami oleh ibu hamil yang meliputi perasaan sakit, ngilu, kesemutan, seperti teriris, tertusuk dan rasa tidak enak yang dirasakan saat hamil yang bersifat nyeri local atau menjalar ke tungkai. Menggunakan kuisisioner dengan skala ordinal terdiri dari 17 pertanyaan dimana responden memilih jawaban “selalu” dan “jarang”. Setiap jawaban “selalu” diberi nilai 1 dan untuk jawaban “jarang” diberi nilai 0.

Kriteria Obyektif :

Selalu : Jika responden menjawab pertanyaan  $\geq 8$ .

Jarang : Jika responden menjawab pertanyaan  $< 8$ .

ALAUDDIN  
M A K A S S A R



## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan pendekatan desain Cross Sectional yaitu rancangan penelitian yang pengukuran atau rancangannya dilakukan secara simultan pada satu saat ( sekali waktu ) yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara usia kehamilan dengan kejadian nyeri pinggang bawah pada ibu hamil di RSIA. Siti Fatimah Makassar. ( Azis Alimul, 2008 )

#### **B. Tempat Dan Waktu Penelitian**

##### 1). Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di RSIA. Siti Fatimah Makassar.

## 2). Waktu Penelitian

Waktu penelitian berlangsung 8 juli sampai 31 juli 2010.

## C. Populasi Dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya ( Sugiyono, 2004 ).

Populasi penelitian adalah semua ibu hamil yang datang memeriksakan kehamilannya di RSIA. Siti Fatimah Makassar.

### 2. Sampel Dan Cara Pengambilan Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan di teliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi ( Sugiyono, 2004 ).

Besar sampel penelitian ditentukan oleh rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + (N(d^2))}$$

N = Besar populasi

n = Besar sampel

d = Tingkat signifikansi yang di inginkan ( 0,05 )

Jadi besar sampelnya :

$$n = \frac{83}{1 + (83(0,0025))}$$

$$= \frac{83}{1+0,2075}$$

$$n = \frac{83}{1,2075}$$

$$n = 68$$

Tehnik sampling dalam penelitian ini adalah total sampling yaitu cara pengambilan sampel secara keseluruhan atau semua responden yang ada pada saat penelitian dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan (Sugiyono, 2004)

Sampel yang diambil adalah seluruh ibu hamil di RSIA. Siti Fatimah Makassar yang berjumlah 60 orang yang menjadi tempat penelitian dan telah memenuhi kriteria inklusi yang ditetapkan oleh peneliti.

1). Kriteria Inklusi

- a. Umur 20 – 35 tahun
- b. Usia kehamilan trimester ke II dan III
- c. Bersedia menjadi responden

2). Kriteria Eksklusi

- a. Umur dibawah 20 tahun dan di atas 35 tahun.
- b. Usia kehamilan trimester I.
- C. Tidak bersedia menjadi responden.

#### **D. Pengambilan Sampel**

Beberapa minggu sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi atau pengamatan awal terlebih dahulu di RSIA. Siti Fatimah Makassar sehubungan dengan judul skripsi yang akan diteliti untuk mengetahui

adanya hubungan usia kehamilan dengan kejadian nyeri pinggang bawah pada ibu hamil. Setelah itu peneliti melakukan permohonan izin penelitian kepada direktur RSIA. Dalam melakukan pengambilan data peneliti menggunakan instrument - instrumen seperti observasi dan quisioner.

Cara pengambilan data dilakukan, pertama dengan melihat data-data pada kartu control responden yang berhubungan dengan keadaan dan kondisi yang dialami ibu hamil dari hasil pemeriksaan dokter dan mencatat, kemudian melakukan wawancara Tanya jawab langsung untuk menanyakan kesediaan ibu hamil untuk menjadi responden. Saat ibu hamil menunggu giliran untuk diperiksa, peneliti memberikan lembaran quisioner yang dilakukan sendiri oleh peneliti dan mendampingi responden pada saat mengisi lembar tersebut. Setelah itu dilakukan proses editing data dan pengkodean data, selanjutnya dilakukan entry data dengan memasukkan kedalam computer dengan menggunakan program SPSS 15.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Data penelitian berasal dari data primer dan sekunder. Data primer di ambil dan di peroleh melalui instrumen penelitian yaitu:

##### 1). Observasi

Instrumen observasi yang di gunakan adalah instrumen observasi dengan melihat data-data pada kartu control dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan ibu hamil dan kondisi yang di alami. Observasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai langkah awal menentukan materi

penelitian. Data yang terkumpul dari observasi ini menjadi dasar dalam latar belakang masalah penelitian.

## 2). Kuesioner

Format kuesioner untuk mendapatkan data pada penelitian ini dibuat oleh peneliti sendiri karena belum adanya format kuesioner yang baku. Selanjutnya kuesioner diberikan kepada seluruh responden untuk diisi dimana sebelumnya telah menjelaskan hal – hal yang berkaitan dengan cara dan maksud pengisian kuesioner.

Penilaian kuesioner :

Jika jawaban “ selalu “ diberi nilai 1 dan jawaban “ jarang “ diberi nilai 0.

Pengolahan data dilakukan setelah seluruh data terkumpul. Data kemudian diolah dengan program SPSS 15.

## **F. Prosedur Pengumpulan Data**

1. Mengurus kelengkapan surat pengantar dari institusi UIN Alauddin Makassar ke kesbang yang ditujukan ke RSIA.Siti Fatimah Makassar untuk melaksanakan penelitian.
2. Setelah mendapat persetujuan, peneliti mengambil data awal.
3. Penjelasan inform consent, tentang penelitian dan tujuannya bagi mereka yang setuju diminta menandatangani infomed consent atau surat pernyataan persetujuan yang telah disiapkan oleh peneliti.
4. Kepada responden dibuatkan lembar untuk kemudian dianalisis.

## **G. Pengolahan Dan Analisa Data**

1. Pengolahan data

a. Penyuntingan Data ( Editing )

Setelah data terkumpul, peneliti mengadakan seleksi dan editing yaitu dengan memeriksa tiap kuisioner yang telah di isi mengenai kebenaran data yang sesuai dengan variabel.

b. Pengkodean ( Coding )

Coding merupakan kegiatan merubah data berbentuk huruf menjadi data berbentuk angka. Tujuannya adalah mempermudah peneliti pada saat analisa data dan juga mempercepat pada saat pemasukan data.

c. Prosesing

Langkah selanjutnya adalah memproses data agar dapat di analisa. Mempermudah data yang di lakukan dengan cara memasukkan data dari kuisioner ke paket program yang umum digunakan yaitu SPSS.

d. Cleaning

Cleaning merupakan kegiatan mengecek kembali data – data yang sudah dimasukkan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan terutama dalam penskoran.

e. Tabulasi

Data dikelompokkan ke dalam suatu tabel menurut sifat-sifat yang dimiliki, kemudian data dianalisa secara statistik.

2. Analisa data

a. Analisa Univariante

Analisa univariate dilakukan terhadap tiap variabel dari hasil penelitian. Analisis ini menghasilkan distribusi dan prosentase dari tiap variabel yang diteliti.

b. Analisa Bivariate

Analisis bivariat dilakukan pada tiap variabel yang diteliti dan dihubungkan dengan kejadian nyeri pinggang pada ibu hamil. Analisis ini digunakan untuk melihat besarnya resiko antara variabel yang diteliti dengan kejadian nyeri pinggang pada ibu hamil di RSIA.Siti Fatimah Makassar 2010 dengan menggunakan *uji Fisher's Exact Test*.

## H. Etika Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti perlu mendapat adanya rekomendasi dari institusinya atas pihak lain dengan mengajukan permohonan izin kepada institusi // lembaga tempat penelitian dan dalam pelaksanaan penelitian tetap memperhatikan masalah etik meliputi :

1. Informed Consent

Lembar persetujuan yang diberikan pada responden yang akan diteliti yang memenuhi kriteria inklusi.

2. Anonimity

Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan mencantumkan nama responden, tetapi lembar tersebut diberikan kode.

3. Confidentiality



Kerahasiaan informasi dari responden dijamin, peneliti hanya melaporkan data tertentu sebagai hasil penelitian.



## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah merupakan salah satu rumah sakit yang melayani pasien-pasien obstetri dan ginekologi. Rumah Sakit ini juga merupakan pusat rujukan pasien obstetri dan ginekologi. rumah sakit dari rumah sakit kabupaten/puskesmas/ dokter , serta dikunjungi oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya yang bermukim di Makassar.

RSIA St.Fatimah terletak di kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Makassar, dengan spesifikasi geografis sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk
- b. Sebelah timur berbatasan dengan jalan Gunung Lokon.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Sungai Pareman.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Gunung Merapi.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non Eksperimental dengan pendekatan desain *Cross Sectional*, Penelitian ini dilaksanakan di RSIA. Siti Fatimah Makassar dari tanggal 8 juli sampai dengan 31 juli 2010. Tehnik sampling dalam penelitian ini adalah *total sampling* dengan jumlah sampel 60 orang ibu hamil. Pengumpulan data dilakukan dengan lembar kuisisioner.

Setelah data terkumpul lalu disusun dalam master tabel. Data diolah dengan menggunakan komputer program SPSS versi 15.00 data yang diperoleh kemudian dilakukan analisa data univariat dan bivariat dengan menggunakan uji *Fisher's Exact Test* dengan tingkat kemaknaan  $\alpha < 0,05$ . Berdasarkan hasil pengelolaan data tersebut, disusunlah hasil-hasil yang diperoleh dan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

## 2. Hasil Analisis Univariat

Distribusi Karakteristik Umum Responden

a) Distribusi Umur Responden

**Tabel 5.1**  
**Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden Berdasarkan Umur di RSIA. Siti Fatimah Makassar**

<b>Umur Ibu</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persen %</b>
<b>20 – 25 tahun</b>	<b>29</b>	<b>48,3%</b>
<b>26 – 30 tahun</b>	<b>23</b>	<b>38,3%</b>
<b>31 – 35 tahun</b>	<b>8</b>	<b>13,4%</b>
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer 2010

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa responden yang berumur 20 – 25 tahun sebanyak 29 orang (48,3%), 26 – 30 tahun sebanyak 23 orang (38,3%) dan yang berumur 31 – 35 tahun sebanyak 8 orang (13,4%).

b) Distribusi Pendidikan Responden

**Tabel 5.2**  
**Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan di RSIA. Siti Fatimah Makassar**

<b>Pendidikan Ibu</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persen %</b>
<b>SD</b>	<b>2</b>	<b>3,3%</b>
<b>SMP</b>	<b>12</b>	<b>20,0%</b>
<b>SMK</b>	<b>8</b>	<b>13,3%</b>
<b>SMA</b>	<b>24</b>	<b>40,0%</b>
<b>Diploma II</b>	<b>1</b>	<b>1,7%</b>
<b>Diploma III</b>	<b>3</b>	<b>5,0%</b>

<b>Sarjana</b>	<b>10</b>	<b>16,7%</b>
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer 2010

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa responden yang pendidikannya tingkat SD sebanyak 2 orang (3,3%), SMP sebanyak 12 orang (20,0%), SMK sebanyak 8 orang (13,3%), SMA sebanyak 24 orang (40,0%), Diploma II sebanyak 1 orang (1,7%), Diploma III sebanyak 3 orang (5,0%) dan Sarjana sebanyak 10 orang (16,7%).

c) Distribusi Jarak Kehamilan Responden

**Tabel 5.3**  
**Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden Berdasarkan Jarak Kehamilan Responden di RSIA. Siti Fatimah Makassar**

<b>Jarak Kehamilan (Tahun)</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persen %</b>
<b>0</b>	<b>29</b>	<b>48,3%</b>
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6,7%</b>
<b>2</b>	<b>14</b>	<b>28,3%</b>
<b>3</b>	<b>6</b>	<b>10,0%</b>

<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1,7%</b>
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>8,3%</b>
<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1,7%</b>
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer 2010

Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa jarak kehamilan responden dengan kehamilan sebelumnya sebanyak 29 orang (48,3%), jarak kehamilan 1 tahun sebanyak 4 orang (6,7%), 2 tahun sebanyak 14 orang (28,3%), 3 tahun sebanyak 6 orang (10,0%), 4 tahun sebanyak 1 orang (1,7%), 5 tahun sebanyak 5 orang (8,3%), dan jarak kehamilan 7 tahun sebanyak 1 orang (1,7%).

#### d) Distribusi Usia Kehamilan Responden

**Tabel 5.4**  
**Distribusi Responden dan Persentase Berdasarkan Usia Kehamilan Responden di RSIA. Siti Fatimah Makassar**

<b>Usia Kehamilan</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persen %</b>
<b>Trimester II</b>	<b>26</b>	<b>43,3%</b>
<b>Trimester III</b>	<b>34</b>	<b>56,7%</b>
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer 2010

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa jumlah Responden yang memasuki usia kehamilan trimester II sebanyak 26 orang (43,3%) dan yang memasuki usia kehamilan trimester III sebanyak 34 orang (56,7%).

e) Distribusi Kejadian Nyeri Pinggang Responden

**Tabel 5.5**  
**Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden Berdasarkan Kejadian Nyeri Pinggang Bawah Responden Di RSIA. Siti Fatimah Makassar**

<b>Nyeri Pinggang</b>	<b>Frekuensi (n)</b>	<b>Persen %</b>
<b>Selalu</b>	<b>49</b>	<b>81,7%</b>
<b>Jarang</b>	<b>11</b>	<b>18,3%</b>
<b>Total</b>	<b>60</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer 2010

Berdasarkan tabel 5.5 menunjukkan bahwa jumlah responden yang selalu merasakan nyeri pinggang sebanyak 49 orang (81,7%) dan jumlah responden yang jarang merasakan nyeri pinggang sebanyak 11 orang (18,3%).

### 3. Analisis Bivariat

Analisa bivariat di lakukan dengan menggunakan metode tabulasi (crosstab) antara variabel independen yaitu usia kehamilan dan variabel dependen yaitu nyeri pinggang bawah. Analisis ini juga menyajikan nilai *uji Fisher's Exact Test*.

**Tabel 5.6**  
**Distribusi Frekuensi dan Persentase Responden Berdasarkan Usia Kehamilan dan Nyeri Pinggang Bawah Pada Ibu Hamil di RSIA. Siti Fatimah Makassar**

Usia Kehamilan	Nyeri Pinggang				Jumlah	%	P
	Selalu		Jarang				
	n	%	n	%			
Trimester II	25	96,2	1	3,8	26	100	0,011
Trimester III	24	70,6	10	29,4	34	100	
Total	49	81,7	11	18,3	60	100	

Sumber : Data Primer 2010

Berdasarkan tabel 5.6 diperoleh hasil bahwa responden yang selalu merasakan nyeri pinggang di usia kehamilan trimester II sebanyak 25 orang (96,2%) sedangkan responden yang jarang merasakan nyeri pinggang sebanyak 1 orang (3,8%) dan responden yang selalu merasakan nyeri pinggang di usia kehamilan trimester III sebanyak 24 orang (70,6%) sedangkan yang jarang merasakan nyeri pinggang sebanyak 10 orang (29,4%). Dari hasil uji fisher's Exact Test yang dilakukan di peroleh dengan nilai  $p = 0,011$  berarti nilai  $p$  lebih kecil dari  $\alpha(0,05)$  yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara usia kehamilan dengan kejadian nyeri pinggang bawah pada ibu hamil.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Usia Kehamilan Pada Ibu

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil bahwa sebagian besar responden berada pada usia kehamilan trimester III yaitu terdapat 34 responden (56,7%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kecenderungan yang besar untuk mengalami nyeri pinggang bawah. Sementara itu, hanya terdapat 26 responden (43,3%) pada usia kehamilan trimester II dengan kisaran

usia kehamilan 16 – 28 minggu. Pada kehamilan yang berumur enam bulan akan terjadi perubahan organ dalam perut dan terjadi perubahan volume yang dihasilkan oleh uterus, darah dan cairan lainnya. Selain itu, terjadi juga perubahan berat badan dan otot-otot perut juga akan elastis mengikuti perubahan janin yang secara fisiologis terjadi pada ibu hamil.

Usia kehamilan ternyata amat menentukan kualitas tumbuh kembang bayi yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan pada usia kehamilan dini dengan berat lahir yang sangat rendah berpotensi terkena berbagai komplikasi yang bisa dibawa hingga menjadi manusia dewasa. Karena itu, memperpanjang kehidupan dalam rahim merupakan jalan terbaik agar bayi dapat bertumbuh kembang secara optimal.

Nyeri pinggang bawah yang dialami ibu hamil sering dikeluhkan terutama menginjak usia kehamilan trimester II dan trimester III karena terjadi peningkatan lordosis atau tulang punggung melengkung. Hal ini menyebabkan pergeseran pada pusat keseimbangan badan yang bergeser maju searah dengan tulang belakang dan karena beban rahim berada di atas daerah pelvis menyebabkan pelvis bergeser kedepan sehingga pinggang menjadi semakin melengkung. Keadaan ini dapat menyebabkan nyeri pinggang. Selain itu, disebabkan karena bertambahnya berat badan sehingga



beban akan semakin berat ditanggung oleh tubuh saat ibu hamil melakukan aktifitas (Botoding, 2008).

## 2. Nyeri Pinggang Pada Ibu Hamil.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil bahwa sebagian besar responden mengalami nyeri pinggang bawah dimana didapat 49 responden (81,7%), jumlah ini cukup besar dan merupakan salah satu gangguan yang sering dialami oleh ibu hamil. Sementara responden yang jarang mengalami nyeri pinggang bawah hanya 11 responden (18,3%).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Debora Malisu Botoding, yang mana menemukan hasil penelitian bahwa usia kehamilan mempunyai hubungan dengan kejadian nyeri pinggang bawah pada ibu hamil.

Hal ini sesuai dengan teori Thomas Sullivan (2005), bahwa nyeri pinggang bawah selama kehamilan dapat timbul karena akibat ketidakseimbangan antara kerja otot postural dan otot fasis yang terdapat pada daerah lumbalis, sehingga dapat menyebabkan otot lumbalis cenderung memendek disertai hyperlordosis dari lumbal. Sedangkan otot abdomen cenderung terulur dan perubahan sikap tubuh dari bertambahnya umur kehamilan karena berat badan berpindah kedepan akibat janin dalam kandungan semakin membesar. Pertambahan uterus mengarah kedepan menyebabkan ibu akan berusaha membagi berat dengan menarik bahu ke belakang, sikap

demikian akan menambah lordosis lumbal akibat tekanan pada otot yang menimbulkan rasa nyeri di daerah pinggang bagian bawah (Botoding, 2008).

Nyeri yang dirasakan oleh seorang ibu hamil merupakan suatu kesulitan yang harus diterima sebagai seorang ibu dalam menjalani proses kehamilannya.

Proses pertumbuhan janin tersebut diterangkan oleh Allah dalam Qur'an Surah Al- Hajj Ayat 5.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تَرَابٍ ثُمَّ  
مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عُلُقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ  
فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا  
أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ  
لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا  
عَلَيْهَا الْمَاءَ أَهْتَرَتْ وَرَبَّتْ وَأُنبِتَتْ مِّن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

Terjemahannya :

“ Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan

menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah” (QS. Al-Hajj:5)

Apabila ibu hamil menerima dengan ikhlas setiap kesulitan yang di alami dalam menjali kehamilannya sampai anaknya lahir, maka Allah akan memberikan ridhaNya. Sebagaimana dalam hadizt diterangkan:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهَا السَّخَطُ (روه احمد و الترمذى وزاد احمد : وَمَنْ جَزَعَ فَلَهُ الْجَزَعُ)

Artinya:

“Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Ia menguji mereka (dengan musibah). Maka barang siapa ridha terhadap musibah itu, maka ia berhak mendapat keridhaan Allah. Dan barang siapa murka (tidak ridha), maka baginya juga kemurkaan Allah.” H.R.Ahmad dan Turmudzi. Dalam riwayat Ahmad ditambahkan: “Dan barang siapa yang merasa susah hati, maka baginya kesusahan hati.”

Menyadari bahwa penyembuhan yang paling utama adalah menyesuaikan diri dengan kehendak Allah, mencintai-Nya, dan ridha terhadap segala ketentuannya. Adalah perbuatan dusta mencintai-Nya jika tidak ridha dengan musibah yang diberikan-Nya. Menyadari bahwa yang memberikan musibah kepada diri seseorang adalah Allah Yang Maha Bijaksana dan Maha Pengasih. Juga menyadari bahwa Allah memberikan musibah itu bukan untuk mencelakakan diri seseorang, bukan untuk menyiksa dan bukan untuk melukai hatinya. Tetapi tujuan yang sebenarnya adalah untuk menguji kesabaran, keikhlasan dan keridhaan seseorang terhadap Tuhan yang menciptakannya dan untuk mendengarkan pengaduannya kepada Allah dengan segala kerendahan hati dan untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah SWT.

### 3. Hubungan Usia Kehamilan Dengan Kejadian Nyeri Pinggang Pada Ibu Hamil

Berdasarkan hasil penelitian analisis uji *Fisher's Exact Test* diketahui ada hubungan antara usia kehamilan dengan kejadian nyeri pinggang bawah yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi  $p = 0,011$  yang lebih kecil dari nilai standar  $\alpha = 0,05$ .

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Debora Malisu Botoding juga mendapatkan ada hubungan antara usia kehamilan dengan kejadian nyeri pinggang bawah pada ibu hamil.

Pada kehamilan, akan terjadi perubahan pelvis menjadi sedikit berputar kedepan karena pengaruh hormonal dan kelemahan ligament. Pada keadaan hiperekstensi tulang belakang terjadi gesekan antara kedua facet dan menjadikan tumpuan berat badan, sehingga permukaan sendi tertekan, keadaan ini akan menimbulkan rasa nyeri. Kadang - kadang dapat mengiritasi saraf ischiadicus. Dan apabila terjadi penyempitan pada bantalan tulang belakang, nyeri akan bertambah hebat. Keadaan ini akan menimbulkan ketidakseimbangan antara otot perut dan otot punggung.

Sendi yang akan membentuk tulang belakang dan panggul sebagian merupakan sendi sindesmosis. Sendi sakroiliak berbentuk huruf L, permukaan sendinya tidak simetris, tidak rata dan posisinya hampir dalam bidang sagital serta permukaan tulang sacrum lebih cekung. Gerakan yang terjadi adalah rotasi dalam jarak gerak terbatas yang dikenal dengan nama nutasi dan konter nutasi. Pelvis menerima

beban dari tulang belakang dengan distribusi gaya merupakan ring tertutup. Pada kehamilan, gerak sendi ini dapat meningkat karena pengaruh hormonal. Panggul dan sakrum yang bergerak kedepan menyebabkan posisi sendi sakroiliaka juga berubah, dikombinasi dengan adanya laxity akan menyebabkan keluhan-keluhan pada sendi yang lain.

Pada kehamilan timbulnya keluhan nyeri pada pinggang bagian bawah disebabkan akibat pengaruh hormon yang menimbulkan gangguan pada substansi dasar bagian penyangga dan jaringan penghubung sehingga mengakibatkan menurunnya elastisitas dan fleksibilitas otot. Selain itu, juga disebabkan oleh faktor mekanika yang mempengaruhi kelengkungan tulang belakang oleh perubahan sikap statis dan penambahan berat badan selama ibu hamil ( Botoding, 2008).

Untuk menghindari masalah selama proses kehamilan atau sebelum terjadi nyeri pinggang saat hamil, ibu hamil harus rajin melakukan latihan – latihan ringan ( senam hamil ). Kegiatan ini sangat baik untuk ibu hamil karena dapat mengurangi rasa nyeri pada pinggang, merileksikan otot – otot belakang dan memperkuat dasar panggul serta memelihara jarak gerak pelvic yang sangat membantu pada saat proses ersalinan. Selain itu, rasa nyeri dapat di atasi dengan massage secara ringan pada daerah yang mengalami nyeri yang efeknya memberikan rileks pada otot dan memperlancar sirkulasi darah.



## **BAB VI**

### **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSIA. Siti Fatimah Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Usia kehamilan bisa menyebabkan nyeri pinggang karena semakin bertambah usia kehamilan, ibu semakin merasakan nyeri pinggang.
2. Ibu hamil merasakan nyeri pinggang pada usia kehamilan trimester II dan III.

3. Ada hubungan antara usia kehamilan dengan kejadian nyeri pinggang bawah pada ibu hamil.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang di lakukan, maka peneliti menyarankan :

1. Untuk menghindari masalah selama proses kehamilan atau sebelum terjadi nyeri pinggang saat hamil, ibu hamil harus rajin melakukan latihan – latihan ringan (senam hamil ). Dengan tujuan mengurangi rasa nyeri pada pinggang, merileksikan otot – otot belakang dan memperkuat otot – otot.
2. Untuk mengurangi nyeri pinggang bawah yang sedang dialami ibu hamil dapat diberikan massage secara ringan pada daerah yang mengalami nyeri yang efeknya memberikan rileks pada otot dan memperlancar sirkulasi darah.
3. Selalu membiasakan diri sejak kehamilan muda untuk berpostur dan bersikap sehat, yaitu sebelum rahim setinggi pusat, biasakan bersikap tegak jangan bungkuk, bahu ditarik ke belakang dan bawah serta hindari alas kaki bertumit tinggi.
4. Pilihlah posisi yang nyaman saat duduk atau sedang berdiri, bila sedang duduk angkat sedikit kaki dan jangan menyilangkan kaki. Cobalah untuk selalu mengubah posisi.



## DAFTAR PUSTAKA

Arief, Mansjoer. 2000. *Kapita Selekta Kedokteran*, Edisi ke 3, cetakan 1, Jakarta: Media Aesculapius.

Bobak, lowdermilk, Jensen ,2004. *Keperawatan Maternitas* , edisi ke 4, Jakarta : penerbit buku kedokteran EGC

Departemen Agama RI, 1996. *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra.

Debora Malisu Botoding. 2008. Skripsi *Usia Kehamilan dan Pertambahan Berat Badan dengan Nyeri Pinggang di Rumah Sakit Pertiwi Makassar*.  
FK-UNHAS



Hanlon, Thomas W. 2001. *Ibu Kuat Bayi Sehat “Pordum Senang Kebugaran Untuk Wanita Hamil “*, edisi ke 2. Jakarta : PT.Rajadrapindo persada

Muchtar Rustam. 1998. *Sinopsis Obstetri dan Obstetri Sosial*. Ed.2. Jakarta : EGC

Nubraha, Ari. 2009. *Tri semester ketiga : Tak perlu Cemas, Lebih Baik Antisipasi*. www. Nyaa. Web. Id/2009. diakses 28 februari 2010.

Nursalam, 2003, *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pedoman skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian*. Salemba Medika: Jakarta.

Depkes RI. Direktorat Pembinaan Kesehatan Masyarakat. 1996. *Pedoman Penanggulangan Ibu Hamil Kekurangan Energi*. Jakarta.

Prawiharjo, 2002. *Ilmu Kebidanan*, Jakarta : Yayasan Bina Pustaka.

Pfizer edoration Health. 2001 *Pelayanan Info Kesehatan Dalam Cedera Olahraga*. Jakarta : Peh Press.

Saifuddin Bari, Dkk. 2006. *Panduan Praktis Pelayanan kesehatan Maternal Dan Neonatal*.Ed.1 Cet.II dan IV. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirihardjo.

Samara, D. 2003. *Duduk Lama Dapat Sebabkan Nyeri Pinggang, Kompas* : Jakarta.

www. Cligiliz. Litbang. Depkes. CD.id, diakses 28 februari 2010.

Sastroasmoro Sudigdo. 1995. *Dasar – Dasar Metodologi Penelitian Klinis*.

Jakarta : Binarupa Akasara

Mubarak, Husnul. *Nyeri Pinggang / Low Back Pain*. www. Centrione.

Blogspot.Com. Di Akses Tanggal 15 Mei.

Stuppard, Miriam, 2009. *Buku Pintar Kehamilan Minggu Perminggu*.

Taber, Ben Zion. 1994. *Kapita Selektu Kedaruratan Obstetri dan Ginekologi*,

Jakarta: EGC

Stephani. Dyanita. *Mengenal Nyeri Pinggang*. Dikutip dari Health – Details.

Php.htm. 2008

Dariyo Adues. 2007. *Psikologi Perkembangan Anak Usia 3 Tahun Pertama*.

Cet.1: Bandung.

NO RSP	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	KODE	JARAK KEHAMILAN	USIA KEHAMILAN DALAM MINGGU	TRIMESTER
1	FA	22	SMK	3	1	24	TRIMESTER II
2	SU	28	SARJANA	7	0	32	TRIMESTER III
3	HA	32	SMK	3	1	38	TRIMESTER III
4	SI	26	SMP	2	0	39	TRIMESTER III
5	NU	27	SARJANA	7	3	14	TRIMESTER II
6	NE	23	SMA	4	0	36	TRIMESTER III

7	RI	20	SMK	3	0	28	TRIMESTER II
8	PH	28	SMA	4	0	34	TRIMESTER III
9	ER	25	SMP	2	2	32	TRIMESTER III
10	NU	30	SARJANA	7	2	24	TRIMESTER II
11	NA	33	SMA	4	0	28	TRIMESTER II
12	MA	23	SMK	3	0	16	TRIMESTER II
13	IR	34	SMA	4	5	24	TRIMESTER II
14	DI	27	SMP	2	7	16	TRIMESTER II
15	NU	25	SMK	3	0	39	TRIMESTER III
16	SU	32	SARJANA	7	3	36	TRIMESTER III
17	NU	23	SMA	4	2	32	TRIMESTER III
18	HA	23	SMA	4	0	36	TRIMESTER III
19	SA	24	SMP	2	0	30	TRIMESTER III
20	WI	26	DIPLOMA III	6	2	28	TRIMESTER II
21	NU	27	SD	1	0	24	TRIMESTER II
22	HE	27	SMK	3	2	28	TRIMESTER II
23	DA	21	SMA	4	0	24	TRIMESTER II
24	SU	21	SMA	4	0	36	TRIMESTER III
25	ST	29	SMA	4	5	36	TRIMESTER III
26	DE	21	SMA	4	0	36	TRIMESTER III
27	RE	21	SMA	4	0	32	TRIMESTER III
28	SA	21	SD	1	0	36	TRIMESTER III
29	RO	31	SMA	4	3	24	TRIMESTER II

30	JU	25	SMK	3	2	32	TRIMESTER III
31	KA	32	SARJANA	7	3	32	TRIMESTER III
32	AS	29	SMP	2	2	36	TRIMESTER III
33	SU	30	DIPLOMA III	6	0	20	TRIMESTER II
34	SA	25	SMA	4	5	24	TRIMESTER II
35	AS	26	SMA	4	2	32	TRIMESTER III
36	MA	20	SMA	4	0	24	TRIMESTER II
37	YU	26	DIPLOMA III	6	0	28	TRIMESTER II
38	HA	23	SMA	4	3	36	TRIMESTER III
39	SA	27	SARJANA	7	0	32	TRIMESTER III
40	SR	28	SMA	4	2	32	TRIMESTER III
41	MA	24	SMA	4	0	34	TRIMESTER III
42	SY	22	SMA	4	0	39	TRIMESTER III
43	HR	22	SMP	2	2	39	TRIMESTER III
44	SY	24	DIPLOMA II	5	0	28	TRIMESTER II
45	ER	26	SMP	2	1	32	TRIMESTER III
46	HA	31	SARJANA	7	3	24	TRIMESTER II
47	YU	20	SMA	4	0	32	TRIMESTER III
48	NA	21	SMA	4	1	24	TRIMESTER II
49	SA	25	SMA	4	0	26	TRIMESTER II
50	HA	24	SMA	4	0	28	TRIMESTER II
51	JU	32	SMP	2	2	28	TRIMESTER II
52	HA	28	SMP	2	2	28	TRIMESTER II

53	RA	29	SARJANA	7	2	32	TRIMESTER III
54	KA	27	SARJANA	7	0	24	TRIMESTER II
55	HA	20	SMA	4	0	32	TRIMESTER III
56	SA	21	SMP	2	4	28	TRIMESTER II
57	PA	28	SARJANA	7	2	32	TRIMESTER III
58	HA	30	SMP	2	5	32	TRIMESTER III
59	HS	26	SMP	2	5	36	TRIMESTER III
60	IN	22	SMK	3	0	32	TRIMESTER III



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

FREQUENCIES

VARIABLES=UMUR PENDIDIKAN JARAKKEHAMILAN USIAKEHAMILAN  
 NYERIPINGGANG  
 /STATISTICS=MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE  
 /ORDER= ANALYSIS .

## Frequencies

[DataSet1] C:\Program  
 Files\SPSS\MIRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.sav

### Statistics

		UMUR	PENDIDIKAN	JARAKKE HAMILAN	USIAKEH AMILAN	NYERIPI NGGANG
N	Valid	60	60	60	60	60
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		25.7167	3.9833	1.4333	1.5667	1.1833
Std. Error of Mean		.49064	.22360	.22595	.06451	.05038
Median		26.0000	4.0000	1.0000	2.0000	1.0000
Mode		21.00	4.00	.00	2.00	1.00
Minimum		20.00	1.00	.00	1.00	1.00
Maximum		34.00	7.00	7.00	2.00	2.00

### Frequency Table

#### UMUR

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	20.00	4	6.7	6.7	6.7
	21.00	7	11.7	11.7	18.3
	22.00	4	6.7	6.7	25.0
	23.00	5	8.3	8.3	33.3
	24.00	4	6.7	6.7	40.0
	25.00	5	8.3	8.3	48.3
	26.00	6	10.0	10.0	58.3
	27.00	6	10.0	10.0	68.3
	28.00	5	8.3	8.3	76.7
	29.00	3	5.0	5.0	81.7
	30.00	3	5.0	5.0	86.7
	31.00	2	3.3	3.3	90.0
	32.00	4	6.7	6.7	96.7
	33.00	1	1.7	1.7	98.3
34.00	1	1.7	1.7	100.0	
Total		60	100.0	100.0	

### PENDIDIKAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	2	3.3	3.3	3.3
	SMP	12	20.0	20.0	23.3
	SMK	8	13.3	13.3	36.7
	SMA	24	40.0	40.0	76.7
	DIPLOMA II	1	1.7	1.7	78.3
	DIPLOMA III	3	5.0	5.0	83.3
	SARJANA	10	16.7	16.7	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

### JARAKKEHAMILAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	.00	29	48.3	48.3	48.3
	1.00	4	6.7	6.7	55.0
	2.00	14	23.3	23.3	78.3
	3.00	6	10.0	10.0	88.3
	4.00	1	1.7	1.7	90.0
	5.00	5	8.3	8.3	98.3
	7.00	1	1.7	1.7	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

### USIAKEHAMILAN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TRIMESTER II	26	43.3	43.3	43.3
	TRIMESTER III	34	56.7	56.7	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

### NYERIPINGGANG

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SELALU	49	81.7	81.7	81.7
	JARANG	11	18.3	18.3	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

```

CROSSTABS
  /TABLES=USIAKEHAMILAN BY NYERIPINGGANG
  /FORMAT= AVALUE TABLES
  /STATISTIC=CHISQ CC PHI LAMBDA UC CORR
  /CELLS= COUNT
  /COUNT ROUND CELL .

```

## Crosstabs

```

[DataSet1] C:\Program
Files\SPSS\MIRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.sav

```

**Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
USIAKEHAMILAN * NYERIPINGGANG	60	100.0%	0	.0%	60	100.0%

```

GET
  FILE='C:\Program
Files\SPSS\MIRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.sav'.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
CROSSTABS
  /TABLES=USIAKEHAMILAN BY NYERIPINGGANG
  /FORMAT= AVALUE TABLES
  /CELLS= COUNT ROW
  /COUNT ROUND CELL .

```

## Crosstabs

```

[DataSet1] C:\Program
Files\SPSS\MIRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.sav

```

**Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
USIAKEHAMILAN * NYERIPINGGANG	60	100.0%	0	.0%	60	100.0%



**USIAKEHAMILAN \* NYERIPINGGANG Crosstabulation**

			NYERIPINGGANG		Total
			SELALU	JARANG	
USIAKEHAMILAN	TRIMESTER II	Count	25	1	26
		% within USIAKEHAMILAN	96.2%	3.8%	100.0%
	TRIMESTER III	Count	24	10	34
		% within USIAKEHAMILAN	70.6%	29.4%	100.0%
Total		Count	49	11	60
		% within USIAKEHAMILAN	81.7%	18.3%	100.0%

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.432 <sup>b</sup>	1	.011		
Continuity Correction <sup>a</sup>	4.838	1	.028		
Likelihood Ratio	7.498	1	.006		
Fisher's Exact Test				.016	.011
Linear-by-Linear Association	6.325	1	.012		
N of Valid Cases	60				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.77.

### Directional Measures

			Value	Asymp. Std. Error <sup>a</sup>	Approx. T <sup>b</sup>	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Lambda	Symmetric	.027	.187	.143	.886
		USIAKEHAMILAN Dependent	.038	.264	.143	.886
		NYERIPINGGANG Dependent	.000	.000	<sup>c</sup>	.
Goodman and Kruskal tau		USIAKEHAMILAN Dependent	.107	.056		.012
		NYERIPINGGANG Dependent	.107	.060		.012
Uncertainty Coefficient		Symmetric	.108	.066	1.582	.006
		USIAKEHAMILAN Dependent	.091	.058	1.582	.006
		NYERIPINGGANG Dependent	.131	.078	1.582	.006

- a. Not assuming the null hypothesis.
- b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
- c. Cannot be computed because the asymptotic standard error equals zero.
- d. Based on chi-square approximation
- e. Likelihood ratio chi-square probability.

### Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error <sup>a</sup>	Approx. T <sup>b</sup>	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Phi	.327			.011
	Cramer's V	.327			.011
	Contingency Coefficient	.311			.011
Interval by Interval	Pearson's R	.327	.093	2.639	.011 <sup>c</sup>
Ordinal by Ordinal	Spearman Correlation	.327	.093	2.639	.011 <sup>c</sup>
N of Valid Cases		60			

- a. Not assuming the null hypothesis.
- b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.
- c. Based on normal approximation.

### Lampiran 3

#### LEMBAR QUISSIONER PENELITIAN

HUBUNGAN USIA KEHAMILAN DENGAN KEJADIAN NYERI PINGGANG  
BAWAH PADA IBU HAMIL DI RSIA. SITI FATIMAH MAKASSAR TAHUN

2010.

No.Register :

Tanggal :


#### A. DEMOGRAFI RESPONDEN

1. Inisial Nama Responden :
2. Umur :
3. Pendidikan :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Alamat :
7. Jarak Kehamilan :
8. Usia Kehamilan :
9. HPHT :
10. TFU :

## B. NYERI PINGGANG

NO	PERTANYAAN	SELALU	JARANG	SKOR
1.	Apakah ibu selalu merasakan nyeri pinggang selama hamil ?			
2.	Apakah ibu selalu merasa bahwa nyeri pinggang yang ibu rasakan karena pengaruh usia kehamilan ibu ?			
3.	Perasaan sakit merupakan kualitas nyeri yang dirasakan saat hamil. Apakah ibu selalu merasakannya?			
4.	Rasa ngilu merupakan kualitas nyeri yang dirasakan saat hamil. Apakah ibu merasakan kualitas nyeri tersebut?			
5.	Rasa teriris/tertusuk merupakan kualitas nyeri yang dirasakan saat hamil. Apakah ibu selalu merasakan kualitas nyeri tersebut?			
6.	Pengaruh usia kehamilan merupakan faktor penyebab nyeri. Apakah ibu selalu merasakannya saat hamil?			
7.	Aktifitas ibu merupakan faktor penyebab nyeri. Apakah ibu selalu merasakan nyeri saat beraktifitas?			
8.	Lamanya ibu duduk merupakan faktor penyebab nyeri. Apakah ibu selalu merasakan nyeri apabila duduk dalam keadaan lama?			
9.	Perut adalah daerah yang sering terkena serangan nyeri pada ibu hamil. Apakah ibu selalu merasakan nyeri di daerah tersebut?			
10.	Bokong adalah daerah yang sering terkena serangan nyeri pada ibu hamil. Apakah ibu selalu merasakan nyeri di daerah tersebut?			
11.	Pinggang adalah daerah yang sering terkena serangan nyeri pada ibu hamil. Apakah ibu selalu merasakan nyeri di daerah tersebut?			
12.	Nyeri ringan merupakan skala nyeri. Apakah ibu selalu merasakan nyeri tersebut saat hamil?			
13.	Nyeri sedang merupakan skala nyeri. Apakah ibu selalu merasakan nyeri tersebut saat hamil?			

14.	Nyeri berat merupakan skala nyeri. Apakah ibu selalu merasakan nyeri tersebut saat hamil?			
15.	Untuk mengurangi rasa nyeri saat hamil, dilakukan dengan cara senam. Apakah ibu selalu melakukan cara tersebut ketika ibu merasakan nyeri?			
16.	Untuk mengurangi rasa nyeri saat hamil, dilakukan dengan tehnik nafas dalam dan mengurut dengan pelan – pelan daerah yang sakit. Apakah ibu selalu melakukan cara tersebut ketika ibu mengalami nyeri?			
17.	Apakah ibu selau merasa bahwa nyeri yang di rasakan karena penambahan berat badan ibu selama hamil?			



## Lampiran 4

### PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth.

Ibu/saudari calon responden

Di

Tempat

Sebagai persyaratan tugas akhir mahasiswi FIK SI keperawatan UIN Alauddin Makassar, saya MIRNAWATI, NIM : 70300106032, akan melakukan penelitian tentang “ Hubungan usia kehamilan dengan kejadian nyeri pinggang bawah pada ibu hamil di RSIA.Siti Fatimah Makassar Tahun 2010”.

Penelitian ini akan melakukan wawancara dan memberikan pertanyaan melalui lembar kausisioner yang berisi tentang data demografi dan pertanyaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan usia kehamilan ibu terhadap nyeri pinggang bawah.

Tidak ada resiko apapun untuk anda jika anda berperan serta dalam penelitian ini. Hasil penelitian akan membantu menambah wawasan dan pengetahuan peneliti, tenaga kesehatan lainnya dan masyarakat pada umumnya.

Atas kesediaan ibu menjadi responden di ucapkan terimakasih.

Makassar, juli 2010

Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## Lampiran 5

### PERNYATAAN PERSETUJUAAN MENJADI RESPONDEN

No Register :

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

### MENYETUJUI

Untuk menjadi responden pada penelitian yang di lakukan oleh saudari MIRNAWATI, Nim : 70300106032 fakultas Ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar. Setelah data yang diperoleh yang berkenan dengan penelitian ini, saya serahkan sepenuhnya untuk diolah/dianalisis dan dijadikan sebagai bahan penelitian skripsi oleh yang bersangkutan.

Demikian persetujuan ini saya berikan, untuk diperlukan sebagaimana mestinya.

Makassar, Juli 2010

RESPONDEN

PENELITI

( )

( )

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Mirawati, dilahirkan di Tangkeballa pada tanggal 16 Mei 1987. Anak ke dua dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan H. Badorra dan Mawati. Penulis mulai masuk ke jenjang pendidikan sekolah dasar di SDI Kampung Parang Kabupaten Gowa Kecamatan Bajeng Barat pada tahun 1994, dan tamat pada tahun 2000.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Bajeng pada tahun 2000 sampai tahun 2003. Pada tahun yang sama (2003), penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bajeng, Kab. Gowa dan tamat pada Tahun 2006.

Setelah menamatkan pendidikan di SMA Negeri 1 Bajeng penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan terdaftar pada fakultas Kesehatan Jurusan Keperawatan pada Tahun 2006 dan menyelesaikan studinya pada tahun 2010.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R