

**SKRINING DAYA HAMBAT EKSTRAK KELOPAK BUNGA ROSELLA
(*Hibiscus sabdariffa* Linn) TERHADAP PERTUMBUHAN BEBERAPA
BAKTERI PATOGEN**



**Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar**

Oleh

MENCY

NIM. 701 001 06 081

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Oktober 2010
Penulis

Mency
NIM. 701 001 06 081

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ Skrining Daya Hambat Ekstrak Kelopak Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) Terhadap Pertumbuhan Beberapa Bakteri Patogen”, yang disusun oleh Mency, NIM: 70100106081, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqa’dah 1431 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Oktober 2010
10 Dzulqa’dah 1431 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Gemy Nastity Handayany, S.Si, M.Si, Apt. (.....)
Sekretaris : Abdul Rahim, S.Si, M.Si, Apt. (.....)
Penguji I : Haeria, S.Si. (.....)
Penguji II : Drs. Supardin. MHI (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

dr. H. M. Furqaan Naiem, M.Ph.D.
Nip. 19580404 198903 1 001

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullah Wabarakaatuh

Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin, Allah Rabbul Izzah atas segala limpahan karunia dan hidayah-Nya, rasa syukur yang tiada hentinya sebagai implementasi terima kasih pada-Nya.

Shalawat serta salam atas baginda Rasulullah SAW, pelopor pemikir Islam, uswatun hasanah bagi sekalian ummatnya.

Suatu kesyukuran atas rampungnya skripsi ini, walaupun tidak luput dari berbagai halangan dan rintangan yang datang silih berganti.

Skripsi ini, penulis persembahkan buat Ibunda tercinta Rahmatia yang telah membesarkan dan mendidik penulis, tak henti-hentinya mencurahkan kasih sayang, iringan doa serta bantuan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi. Serta kepada Ayahanda M.Abduh, terima kasih karena perantaramu lah Aku ada.

Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pembimbing yang telah membimbing penulis selama masa penulisan skripsi:

1. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Farmasi yang telah mengajar dan mendidik penulis selama di bangku kuliah.
2. Ibu Gemy Nastity Handayany, S.Si, M.Si, Apt. selaku pembimbing pertama.
3. Bapak Abdul Rahim, S.Si, Apt. selaku pembimbing kedua.

4. Ibu Haeria, S.Si. dan Bapak Drs. Supardin.MHI selaku penguji.

Selanjutnya ucapan terima kasih kepada :

- ❖ Bapak Prof. Dr. Azhar Arsyad, MA selaku Rektor Universitas Negeri Alauddin Makassar.
- ❖ Bapak dr. M. Furqaan Naiem, M.Sc, Ph.D. selaku Dekan beserta para Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- ❖ Ibu Gemy Nastity Handayani, S.Si, M.Si, Apt. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- ❖ Bapak/Ibu Dosen Jurusan Farmasi yang telah mengajar dan mendidik penulis selama di bangku kuliah.
- ❖ Untuk kakak-kakakku Ansar, Azwar, Azra dan adekku Kisman dan Andriani, serta seluruh keluarga terima kasih atas bantuan dan kasih sayangnya.
- ❖ Senior angkatan 2005 A. Armisman Edy Paturusi, S.Farm, Muh Rusydi, S.Farm, Nur Afianty, S.Farm yang telah sabar membantu penulis selama penelitian dan teman seperjuangan selama penelitian Asmah yahrib, Rusmiati, Fitriana serta seluruh teman farmasi angkatan 2005.
- ❖ Sahabat-sahabatku (Ninie', Sukma, Zahra) yang telah memberiku semangat, dukungan dan dengan setia mendengarkan keluh kesahku, tetap semangat kawan untuk raih S.Farm.
- ❖ Teman-teman di Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu khususnya ranting Malua.

- ❖ Seluruh Adinda Jurusan Farmasi angkatan 2007, 2008, dan 2009 yang tak hentinya memberi semangat kepada penulis.
- ❖ Staf Akademik Fakultas Ilmu Kesehatan atas bantuan dan pelayanannya serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan ke depan dan semoga Allah Rabbul ‘alamiin meridhoinya, amiin.

Wassalaamu ‘alaikum warahmatullah wabarakaatuh

Makassar, Oktober 2010
Penulis

Mency

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1-3
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Uraian Tanaman.....	5
1. Klasifikasi	5
2. Morfologi.....	5
3. Nama Daerah	6
4. Kandungan Kimia	6
5. Khasiat	6
B. Uraian Bakteri Uji.....	7-14
C. Resistensi Mikroba dan Pengendalian Mikroorganisme.....	15-17
D. Ekstraksi	17
1. Pengertian Ekstraksi	17
2. Mekanisme Kerja	18
3. Jenis-jenis Metode Ekstraksi	18-21
E. Metode Pemisahan Secara KLT	21-23
F. KLT Bioautografi	23
G. Tinjauan Agama tentang Kesehatan.....	24-30
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Alat dan Bahan.....	31
B. Prosedur Kerja	31

1. Pengambilan Sampel.....	31-32
2. Pengolahan Sampel.....	32
3. Ekstraksi Sampel.....	32-37
4. Identifikasi Bercak Aktif dengan Beberapa Penampakan Bercak	37-38
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 39
A. Hasil Penelitian	39-41
B. Pembahasan.....	42-47
 BAB V PENUTUP	 48
A. Kesimpulan.....	48
B. Implikasi Penelitian	49
 DAFTAR PUSTAKA	 50
 LAMPIRAN	 52
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	 61

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Hasil ekstraksi kelopak bunga rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L).....	39
Tabel 2 Hasil pengujian skrining skrining daya hambat antibakteri.....	39
Tabel 3 Hasil pengujian KLT-Bioautografi.....	40
Tabel 4 Hasil profil kromatogram identifikasi komponen kimia aktif.....	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Skema kerja skrining daya hambat ekstrak kelopak bunga rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L) terhadap pertumbuhan beberapa bakteri patogen.....	52
Gambar 2 Foto hasil pengujian skrining ekstrak metanol larut n-heksan kelopak bunga rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L).....	53
Gambar 3 Foto hasil pengujian skrining ekstrak metanol tidak larut n-heksan kelopak bunga rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L).....	54
Gambar 4 Foto hasil pengujian KLT-Bioautografi ekstrak metanol tidak larut n-heksan kelopak bunga rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L).....	55
Gambar 9 Foto hasil kromatogram ekstrak metanol tidak larut n-heksan kelopak bunga rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L).....	60
Gambar 11 Foto tanaman rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L).....	61

ABSTRAK

Nama : Mency
NIM : 70100106081
Jurusan : Farmasi
Skripsi : “Skrining Daya Hambat Ekstrak Kelopak Bunga Rosella
(*Hibiscus sabdariffa* L) Terhadap Pertumbuhan Beberapa
Bakteri Patogen”

Telah dilakukan Skrining Daya Hambat Ekstrak Kelopak Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) Terhadap Pertumbuhan Beberapa Bakteri Patogen. Penelitian pendahuluan dilakukan dengan cara kelopak bunga rosella di ekstraksi dengan metanol kemudian dipartisi dengan n-heksan hingga diperoleh ekstrak metanol larut n-heksan dan ekstrak metanol tidak larut n-heksan. Selanjutnya dilakukan uji skrining dengan menggunakan beberapa mikroba uji (*Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella thypi*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermis*, *Streptococcus mutans* dan *Vibrio sp*).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ekstrak metanol tidak larut n-heksan memberikan aktivitas antibakteri yang lebih baik dibanding ekstrak metanol larut n-heksan. Untuk memperkirakan senyawa yang memberikan aktivitas antibakteri pada ekstrak metanol tidak larut n-heksan dilakukan uji KLT-Bioautografi. Hasilnya pengujian menunjukkan bahwa senyawa yang memberikan aktivitas antibakteri adalah senyawa golongan flavanoid.

Kata kunci: Antibakteri, Ekstraksi, Kelopak Bunga Rosella.

ABSTRACT

Name : Mency
Nim : 70100106081
Department : Pharmacy
Skripsi : " Screening power retard of rosella sheath extract (*Hibiscus sabdariffa* L) towards growth of several bacterias patogen"

Screening power retard of rosella sheath extract (*Hibiscus sabdariffa* L) towards growth of several bacterias pathogen was done. Firsth Research was done by exctract rosella sheath with methanol so partitioned by n-hexane to got dissolves methanol extrac n-hexane and insoluble methanol extract n-hexane. furthermore done Screening test by using several microbes test (*Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella thypi*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermis*, *Streptococcus mutans* and *Vibrio sp*).

Testing result shows that insoluble methanol extract hexane gives antibacteri activity better than dissolves methanol extract n-hexane. to estimate compound in insoluble extract hexane that gives activity antibakteri done test KLT-bioautografi. the result in insoluble methanol extract hexane that gives activity antibakteri found in fenol group. Compound

keyword: antibacteri, extraction, sheath of rosella.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia penggunaan ramuan tradisional erat kaitannya dengan pengobatan tradisional yang diwariskan secara turun temurun. Pembuatan dan penjualannya biasanya hanya dilakukan oleh para dukun di desa dan jamu gendongan. Namun keadaan tersebut berubah dengan cepat, ditandai dengan kedatangan tentara Jepang dipulau Jawa pada tahun 1942. Sejak saat itu dipicu oleh menipisnya persediaan obat-obatan paten, dokter-dokter di Indonesia terpaksa mencari alternative obat-obatan baru sebagai penggantinya, terutama yang terdapat dilingkungan sendiri. Sejak saat itu obat-obatan yang berasal dari tanaman asli Indonesia mulai mendapat perhatian yang layak dari dunia ilmu kedokteran di Indonesia (Agromedia, 2005).

Penelitian dan pengembangan tanaman obat baik didalam maupun diluar negeri kian berkembang pesat. Beberapa ahli kesehatan menyarankan agar pemanfaatan tanaman obat lebih digalakkan lagi. Hal ini sesuai dengan program pengobatan yang saat ini sedang menjadi trend yaitu system pengobatan “back to nature” atau kembali ke yang alami, dalam hal ini penggunaan tanaman obat.

Pemanfaatan dan khasiat rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) dalam dunia pengobatan sudah tidak asing lagi, namun demikian di Indonesia belum banyak masyarakat yang memanfaatkan tanaman rosella. Pemanfaatan

kelopak bunga rosella yaitu ekstrak kelopak bunga rosella berguna untuk obat antikejang, mengobati cacingan dan sebagai antibakteri. Kelopak bunga rosella digunakan untuk mengurangi gangguan batuk dan jus rosella dengan tambahan garam, lada dan tetes tebu digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan empedu. Kelopak rosella yang direbus dengan air berkhasiat sebagai peluruh kencing dan dapat menurunkan tekanan darah, mengurangi kekentalan darah dan meningkatkan peristaltik usus. Selain itu kelopak rosella juga dapat digunakan untuk pewarna dan perasa dalam membuat anggur rosella, jeli, sirup, gelatin, minuman segar, puding dan cake. Adapun kelopak kering dapat sebagai teh yang biasa diseduh atau direbus (Hidayat, 2007).

Penggunaan rosella merah sebagai obat oleh masyarakat awalnya bersifat kebetulan dan coba-coba saja. Namun sekarang berbagai penelitian terhadap tanaman rosella telah dilakukan antara lain : bunga rosella merah mempunyai khasiat menurunkan tekanan darah, antikejang, gangguan pernafasan, anticacing (antihelminetik) dan antibakteri. Zat warna dikelopak bunga perdu ini dapat mematikan bakteri *Mycobacterium tuberculosis*, bakteri penyebab penyakit TBC (Sharaf, 1962). Kandungan antioksidan pada teh kelopak rosella jumlahnya 1,7 mmol/prolox, lebih tinggi dibanding kumis kucing yang teruji secara klinis mampu meluruhkan batu ginjal (Nurfarida, 2006). Pengujian efektivitas antosianin rosella untuk menghambat sel kanker darah (leukemia). Ternyata, pigmen alami dari kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) tak hanya menghambat pertumbuhan sel

kanker HL-60 tapi juga memamatkannya. Antosianin yang berpengaruh tersebut diberi nama Delphinidin 3-Sambubioside (Ching Chang, 1962).

Kelopak rosella bersifat hipotensif, antihipertensi, dan antikejut pernapasan. Sifat antihipertensi itu diuji secara klinis sebanyak 54 pasien hipertensi dihitung tekanan diastolic dan sistolik 15 hari sebelum dan sesudah pengujian. Pasien diberi secangkir teh seduhan 3 kuntum rosella. Setelah 12 hari, nilai sistoliknya rata-rata turun 11,2%, tekanan diastolic turun 10,7%. Namun ketika konsumsi rosella dihentikan selama 3 hari, tekanan sistolik naik 7,9% dan diastolic 5.6%. Hal ini membuktikan bahwa rosella memang berkhasiat menurunkan tekanan darah tinggi. (Faraji, 1962).

Berdasarkan hal tersebut, untuk meningkatkan penggunaan tanaman rosella sebagai obat, telah dilakukan penelitian tentang uji daya hambat ekstrak metanol kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) terhadap pertumbuhan *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus epidermis*, *Streptococcus mutans*, *Salmonella typhi* dan *Vibrio sp*. Dimana penelitian tersebut diatas sebelumnya belum pernah dilaporkan.

B. Rumusan masalah

1. Apakah kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) memberikan daya hambat terhadap pertumbuhan beberapa bakteri uji.
2. Senyawa apa yang terdapat pada ekstrak kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) yang memberikan aktivitas terhadap pertumbuhan beberapa bakteri uji.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui daya hambat ekstrak kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) terhadap pertumbuhan beberapa bakteri patogen sehingga penggunaan rosella dalam bidang mikrobiologi dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Uraian Tanaman*

1. **Klasifikasi (Gembong, 1991)**

Domain	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Anak divisi	: Spermatophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Bangsa	: Malvales
Suku	: Malvaceae
Marga	: Hibiscus
Jenis	: <i>Hibiscus sabdariffa</i> Linn

2. **Morfologi tanaman Rosella (Hidayat, 2007).**

Rosella merah (*Hibiscus sabdariffa* L) termasuk dalam genus hibiscus family malvaceae. Tanaman kerabat bunga sepatu ini berasal dari Afrika Barat tetapi ada juga yang mengatakan berasal dari India. Rosella merah mulai dikenal dan ditanam di Asia pada abad ke-17. Ditanam secara besar-besaran di Indonesia pada tahun 1920. Rosella adalah sejenis tanaman herba tahunan yang dapat hidup lama, dapat tumbuh mencapai ketinggian 0,5 - 3 meter, biasanya hidup di daerah beriklim tropis dan subtropis. Sekarang ini tanaman rosella sudah tersebar di seluruh dunia, oleh karena itu tanaman rosella mempunyai nama umum yang berbeda-beda di berbagai Negara.

3. Nama Daerah (Hidayat, 2007)

Sulawesi : Bunga Rosella

Enrekang : Bunga Rosella

4. Kandungan Kimia Rosella (Tarmizi, 2008)

Zat aktif yang paling berperan dalam kelopak bunga rosella meliputi gossypetin, antosianin dan glucosidal hibiscin. Antosianin merupakan pigmen alami yang memberi warna merah pada seduhan kelopak bunga rosella dan bersifat antioksidan yang dapat menghambat radikal bebas. Pigmen alami dari kelopak kering rosella terbukti efektif dalam menghambat dan sekaligus mematikan sel kanker HL-60 (kanker darah dan leukemia) dan berperan dalam proses apoptosis (bunuh diri) sel kanker. Selain itu terdapat pula senyawa flavanoid yang merupakan turunan fenol yang mempunyai kemampuan sebagai antibakteri

4. Kegunaan Rosella (Hidayat, 2007)

Rosella merah (*Hibiscus sabdariffa* L) dulu merupakan penghias pagar rumah atau pekarangan. Saat ini lebih dari 100 varietas rosella tumbuh di Indonesia. Berbagai penyakit dapat diatasi oleh herba tropis ini, seperti batuk, asam urat, kolesterol, hingga hipertensi. Selain itu rosella merah berkhasiat menangkal radikal bebas dan sebagai penyegar. Hal ini bukan isapan jempol semata karena rosella merah mengandung berbagai senyawa berkhasiat seperti antioksidan, asam esensial, beta karoten, potassium, zat besi dan berbagai jenis vitamin.

B. Uraian tentang bakteri

1. *Escherichia coli*

a. Klasifikasi

Domain	: Bacteria
Filum	: Proteobacteria
Kelas	: Gammaproteobacteria
Bangsa	: Enterobacteriales
Suku	: Enterobacteriaceae
Marga	: <i>Escherichia</i>
Jenis	: <i>Escherichia coli</i> (Migula, 1895)

b. Sifat dan morfologi *Escherichia coli*

Escherichia coli merupakan bakteri berbentuk batang, gram negatif dan termasuk dalam family Enterobacteriaceae. *E. coli* merupakan penghuni normal di usus semua jenis hewan, termasuk manusia. Apabila digunakan metode pembiakan secara aerob maka *E. coli* merupakan species dominan yang ditemukan di dalam kotoran. Umumnya *E. coli* berperan positif di dalam tubuh dengan cara menekan pertumbuhan spesies-spesies bakteri yang berbahaya dan membentuk vitamin dalam jumlah yang cukup banyak. Sebagian kecil strain *E. coli* dapat menyebabkan penyakit pada manusia melalui beberapa mekanisme yang berbeda. Diantaranya adalah jenis-jenis penyerang saluran pencernaan *Escherichia Coli* Enteroinvasive (EIEC). Tidak diketahui makanan apa saja yang

mungkin menjadi sumber jenis-jenis EIEC patogenik yang menyebabkan penyakit disentri (Food-Info, 2009).

2. *Staphylococcus aureus*

a. Klasifikasi

Domain : Bacteria
Filum : Firmicutes
Kelas : Bacilli
Bangsa : Bacillales
Suku : Staphylococcaceae
Marga : Staphylococcus
Jenis : *Staphylococcus aureus* (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn 2004).

b. Sifat dan morfologi

Bakteri *Staphylococcus aureus* merupakan salah satu jenis peracunan makanan yang sering terjadi. Sel-sel *Staphylococcus aureus* berbentuk gram positif tersusun dalam tandan khas. *Staphylococcus* dapat tumbuh baik pada kondisi aerobik tetapi umumnya tidak mampu bersaing dengan mikrobia lain yang ada dalam makanan. Strain tertentu dari *Staphylococcus aureus* dapat menyebabkan penyakit yaitu yang menghasilkan enterotoksin. Suatu enterotoksin yang dihasilkan oleh strain bakteri dapat dibentuk satu atau lebih dari lima tipe antigenic yang berbeda dari enterotoksin tersebut. Umumnya penularan oleh *Staphylococcus aureus* tidak di

dalam tubuh tetapi nampak dipermukaan tubuh, biasanya di dalam hidung dan bisul-bisul (Ali, 2005).

3. *Bacillus subtilis*

a. Klasifikasi

Domain : Bacteria

Filum : Firmicutes

Kelas : Bacilli

Bangsa : Bacillales

Suku : Bacillaceae

Marga : Bacillus

Jenis : *Bacillus subtilis* (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn 2004).

b. Sifat dan morfologi.

Bacillus subtilis merupakan bakteri Gram positif memiliki sel batang 0,3 – 2,2 μm x 1,27-7,0 μm . Sebagian besar motil; flagelum khas lateral. Membentuk endospora tidak lebih dari satu dalam sel spongarium. Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi sejati, fermentasi sejati, atau kedua-duanya, yaitu respirasi dan fermentasi. Aerobik sejati atau anerobik fakultatif (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S 2008).

4. Pseudomonas aeruginosa

a. Klasifikasi

Domain : Bacteria

Filum : Proteobacteria

Kelas : Gammaproteobacteria

Bangsa : Pseudomonadales

Suku : Pseudomonadaceae

Marga : Pseudomonas

Jenis : *Pseudomonas aeruginosa* (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn 2004).

b. Sifat dan morfologi.

Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri Gram negatif dengan berbentuk sel tunggal, batang lurus atau melengkung, namun tidak berbentuk heliks. Pada umumnya berukuran 0,5 – 1,0 μm . Motil dengan flagelum polar; monotrikus atau multitrikus. Tidak menghasilkan selongsong prosteka. Tidak dikenal adanya stadium istirahat. Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi, tidak pernah fermentatif. Beberapa merupakan kemolitotrof fakultatif, dapat menggunakan H_2 sebagai sumber energi. Oksigen molekuler merupakan penerima elektron universal, beberapa dapat melakukan denitrifikasi dengan menggunakan nitrat sebagai penerima pilihan (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S 2008).

5. *Staphylococcus epidermidis*

a. Klasifikasi

Domain : Bacteria

Filum : Firmicutes

Kelas : Bacilli

Bangsa : Bacillales

Suku : Staphylococcaceae

Marga : Staphylococcus

Jenis : *Staphylococcus epidermidis* (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn 2004).

b. Sifat dan morfologi.

Staphylococcus epidermidis adalah bakteri Gram positif. Sel-sel berbentuk bola, berdiameter 0,5 – 1,5 μm , terdapat dalam tunggal dan berpasangan dan secara khas membelah diri pada lebih dari satu bidang sehingga membentuk gerombolan yang tak teratur. Anaerob fakultatif, tumbuh lebih cepat dan lebih banyak dalam keadaan aerobik. Suhu optimum 35 – 40⁰C. Terutama berosiasi dengan kulit, dan selaput lendir hewan berdarah panas (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S 2008).

Koloninya berwarna putih atau kuning dan bersifat anaerob fakultatif. Kuman ini tidak mempunyai protein A pada dinding selnya.

Bersifat koagulasa negatif meragi glukosa, dalam keadaan anaerob tidak meragi manitol (Syahracham, Agus, dkk 1994).

6. *Streptococcus mutans*

a. Klasifikasi

Domain : Bacteria

Filum : Firmicutes

Kelas : Bacilli

Bangsa : Lactobacillales

Suku : Streptococcaceae

Marga : Streptococcus

Jenis : *Streptococcus mutans* (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn 2004).

b. Sifat dan morfologi.

Streptococcus mutans termasuk bakteri Gram positif berbentuk bola sampai lonjong, berdiameter 0,5-1,5 μm , koloni bulat cembung dengan permukaan licin atau sedikit kasar dan tepi seluruhnya atau sebagian tidak beraturan. Koloni buram berwarna biru terang, bersifat fakultatif aerob, dapat tumbuh pada suhu 45 $^{\circ}\text{C}$ dan suhu optimumnya. Dinding sel terdiri dari 4 komponen antigenik yaitu peptidoglikan, polisakarida, proten dan asam lipokoat (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S 2008).

7. *Salmonella typhi*

a. Klasifikasi

Domain : Bacteria

Kelas : Gammaproteobacteria

Bangsa : Enterobacteriales

Suku : Enterobacteriaceae

Marga : Salmonella

Jenis : *Salmonella typhi* (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn 2004).

b. Sifat dan morfologi.

Salmonella typhi adalah bakteri Gram negatif bebrbentuk batang lurus dengan ukuran 0,7-1,5 μm , biasanya tunggal dan kadang-kadang membentuk rantai pendek, jenis yang bergerak berflagel peritrik, hidup secara aerobik atau anaerobik fakultatif, meragikan glukosa dengan menghasilkan asam kadang-kadang gas. Tumbuh optimal pada suhu 37 $^{\circ}\text{C}$ dan berkembang baik pada suhu kamar, bakteri ini dapat ditemukan di saluran pencernaan manusia dan hewan. Bakteri ini merupakan penyebab demam tifoid karena adanya infeksi akut pada usus halus manusia dan hewan (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S 2008).

8. *Vibrio sp*

a. Klasifikasi

Domain : Bacteria

Filum : Proteobacteria

Kelas : Gammaproteobacteria

Bangsa : Vibrionales

Suku : Vibrionaceae

Marga : *Vibrio*

Jenis : *Vibrio sp* (Garrity. G. M., Bell. J. A., and Lilburn 2004).

b. Sifat dan morfologi.

Vibrio sp adalah bakteri Gram negatif. Batang pendek, tidak membentuk spora, sumbuhnya melengkung atau lurus, 0,5 μm x 1,5-3,0 μm , terdapat tunggal atau kadang-kadang bersatu dalam bentuk S atau spiral. Motil dengan satu flagelum polar, atau pada beberapa spesies dengan dua atau lebih flagelum dalam satu berkas polar; hanya sesekali non motil. Seringkali mempunyai sferoplas, biasanya dibentuk dalam keadaan lingkungan yang kurang menguntungkan. Tidak tahan asam. Tidak membentuk kapsul. Tumbuh baik dan cepat pada medium nutrisi baku. Kemoorganotrof. Metabolisme dengan respirasi (menggunakan oksigen) dan fermentatif. Anaerobik fakultatif. Suhu optimum berkisar dari 18-37⁰C (Pelczar. Michael J. and Chan. E.C.S 2008).

C. Resistensi Mikroba dan Pengendalian Mikroorganisme

Penggunaan obat antimikroba berperan sangat penting dalam pengobatan penyakit yang ditimbulkan oleh mikroba patogen. Dewasa ini resistensi kuman terhadap antibiotika menjadi hal penting, hal ini disebabkan penggunaannya yang tidak tepat. Dengan meningkat dan bertambah seringnya penggunaan antibiotik, jenis mikroba yang semula peka memperlihatkan peningkatan kejadian resistensi terhadap obat. Peningkatan ini berbanding lurus dengan lama penggunaannya.

Banyak senyawa mengandung sulfur yang secara umum disebut sulfonamide yang mampu bekerja dengan cara yang sama seperti antibiotik. Beberapa antibiotik seperti penisilin yang peka menjadi tidak peka terhadap beberapa strain mikroorganisme. Hal ini terjadi karena adanya enzim β -laktamase (penisilin) yang dihasilkan oleh beberapa bakteri, selain itu penicillin sering menimbulkan reaksi alergi dan diinaktifkan oleh pH asam cairan lambung (Chatim dan Suharto, 1993).

Berdasarkan sifat toksisitas selektif ada bakteriostatik dan ada yang bersifat membunuh mikroba dikenal sebagai bakteriostatik dan ada yang bersifat membunuh mikroba dikenal sebagai aktivitas bakterisid. Pemusnahan mikroba dengan antimikroba yang bersifat bakteriostatik masih tergantung dari kesanggupan reaksi daya tahan tubuh hospes. Peranan lamanya kontak antara mikroba dengan antimikroba dalam kadar efektif juga sangat menentukan untuk mendapatkan efek.

Berdasarkan mekanisme kerjanya, antimikroba dibagi dalam lima kelompok yaitu;

- 1). Yang mengganggu metabolisme sel mikroba
- 2). Menghambat sintesis dinding sel mikroba
- 3). Mengganggu permeabilitas membran sel mikroba
- 4). Menghambat sintesis protein sel mikroba dan
- 5). Menghambat sintesis atau merusak asam nukleat sel mikroba

(Syarif, 1995).

Pada penggunaan antimikroba khususnya antibiotika sering menimbulkan kegagalan dalam terapi. Istilah resistensi itu menunjukkan bahwa suatu mikroorganisme sudah tidak peka terhadap suatu zat atau sediaan antimikroba atau antibiotika, sehingga akan membawa masalah dalam terapi atau bahkan menggagalkan terapi dengan suatu antibiotika terhadap agen penyebab infeksi. Resistensi tersebut dapat berupa resistensi alamiah, resistensi karena adanya faktor R pada sitoplasma atau resistensi karena terjadinya perpindahan gen yang resistensi atau faktor R atau plasmid R atau dapat dikatakan bahwa suatu mikroorganisme dapat resistensi terhadap obat antimikroba karena mekanisme genetic atau non genetik (Djide, 2006).

Faktor-faktor penyebab resistensi kuman yaitu adanya tekanan dalam pemakaian antibiotika, lama pemakaian, dosis yang berlebihan, pemakaian pada penyakit non infeksi. Adanya resistensi biasanya akibat pertumbuhan strain organisme yang sebelumnya resistensi dalam antibiotika akan menghasilkan keturunan yang sifatnya sama. Kemampuan menjadi resistensi

tergantung pada spesies dan agen chemotherapy. Suatu strain yang resisten terhadap antibiotik tertentu dapat membawa suatu faktor transfer yang dapat menyebabkan kemampuan resistensi kepada organisme dari spesies lain (Hare, 1993).

Faktor yang mempengaruhi penghambatan mikroorganisme atau proses antimikrobia antara lain: jumlah dan spesies mikroorganisme, konsentrasi zat anti microbial, suhu dan keasaman (pH). Berdasarkan cara kerja zat antimicrobial dalam menghambat atau mematikan perubahan molekul atau penghambatan sintesis protein dan asan nukleat dan penghambatan kerja enzim. Efektivitas penghambatan zat antimicrobial bersifat sangat spesifik. Dikenal beberapa macam cara pemeriksaan dan pengujian secara biologis terhadap kemampuan antimikroba dari bahan-bahan kemoterapeutika seperti antibiotik, antiseptik dan desinfektan. Uji kepekaan terhadap antibiotic dipergunakan untuk menentukan kepekaan suatu kuman pathogen terhadap antibiotika yang akan dipergunakan untuk pengobatan. (Hadioetomo,1990).

D. Ekstraksi

1. Pengertian ekstraksi

Ekstraksi adalah penyarian zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari bagian tanaman obat, hewan dan beberapa jenis termasuk biota laut. Zat-zat aktif tersebut terdapat di dalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda demikian pula ketebalannya, sehingga diperlukan metode ekstraksi dan pelarut tersebut dalam mengekstraksi (Anonim, 1986).

2. Mekanisme kerja

Proses terekstraksinya zat aktif dalam tanaman adalah pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan terlarut sehingga terjadi perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan pelarut organik di luar sel. Maka larutan terpekat akan berdifusi keluar sel, dan proses ini akan berulang terus sampai terjadi keseimbangan antara konsententrasi zat aktif di dalam dan di luar sel (Alam, 2008).

3. Jenis-jenis metode ekstraksi

Jenis ekstraksi bahan alam yang sering dilakukan adalah ekstraksi secara panas dan dingin. Ekstraksi secara panas dilakukan dengan cara refluks, infudasi, dan destilasi uap air, sedangkan ekstraksi secara dingin dilakukan dengan cara maserasi, perkolasi dan soxhletasi.

a. *Ekstraksi secara infudasi*

Infudasi adalah proses penyarian yang umumnya digunakan untuk menyari zat aktif yang larut dalam air dari bahan nabati, yang dilakukan dengan cara membasahi dengan air. Biasanya dua kali bobot bahan, kemudian ditambah dengan air secukupnya dan dipanaskan dalam tangas air selama 15 menit dengan suhu $90 - 98^{\circ} \text{C}$, sambil sekali-kali diaduk. Untuk mencukupi kekurangan air, ditambahkan melalui ampasnya. Umumnya 100 bagian sari diperlukan 10 bagian bahan.

b. Ekstraksi secara Refluks

Ekstraksi dengan metode refluks digunakan untuk simplisia dengan kandungan zat aktif yang tahan terhadap pemanasan. Alat refluks ini terbuat dari bahan gelas dimana bagian tengahnya dilengkapi dengan lingkaran gelas yang berbentuk spiral atau bola. Untuk mengekstraksi, bahan dimasukkan kedalam labu alas bulat bersama cairan penyari kemudian dipanaskan. Cairan penyari ini akan mendidih, menguap dan berkondensasi pada pendingin tegak, lalu turun kembali pada labu dan sekaligus mengekstraksi kembali. Proses ini berlangsung secara berkesinambungan sampai bahan tersari sempurna. Pengerjaan ini dilakukan sebanyak 3-4 kali selama 3-4 jam.

c. Ekstraksi secara destilasi uap air

Ekstraksi uap air dipertimbangkan menyari serbuk simplisia yang mengandung komponen yang memiliki titik didih tinggi pada tekanan normal. Pada pemanasan biasanya kemungkinan akan terjadi kerusakan zat aktifnya. Untuk mencegah hal tersebut maka penyarian dilakukan dengan destilasi uap air.

d. Ekstraksi secara soxhletasi

Ekstraksi dengan cara ini pada dasarnya adalah penyarian berkesinambungan secara dingin. Alat soxhletasi dibuat dari bahan gelas yang terbagi atas tiga bagian: bagian tengah untuk menampung serbuk simplisia yang akan diekstraksi yang dilengkapi dengan pipa pada bagian kiri dan kanan, satu untuk jalannya uap air dan yang lain untuk jalannya

larutan yang berkondensasi uap menjadi cairan agar cairan penyari yang dipakai tidak terlalu banyak. Sedangkan bagian bawah terdapat labu alas bulat yang berisi cairan penyari dan ekstrak.

e. Ekstraksi secara maserasi

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana, yaitu dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk kedalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan di luar sel, maka larutan terpekat didesak keluar. Peristiwa ini berulang sehingga terjadi kesetimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Simplisia yang akan diekstraksi diserbukkan dengan derajat tertentu lalu dimasukkan ke dalam bejana maserasi. Simplisia tersebut direndam dengan cairan penyari, setelah itu dalam waktu tertentu sesekali diaduk. Perlakuan tersebut dilakukan selama 5 hari.

f. Ekstraksi secara perkolasi

Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Pada metode ini simplisia yang akan diekstraksi ditempatkan dalam suatu bejana silinder yang pada bagian bawahnya diberi sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut. Cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai keadaan jenuh. Gerakan kebawah disebabkan oleh kekuatan beratnya sendiri dan

cairan di atasnya, dukurangi dengan daya kapiler yang cenderung untuk menahannya. (Anonim, 1986).

E. Metode pemisahan secara kromatografi lapis tipis

Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan yang pertamakali dipakai untuk memisahkan zat warna tanaman. Meskipun demikian untuk senyawa-senyawa yang berwarna tak lama dan hamper kebanyakan pemisahan-pemisahan secara kromatografi sekarang diperuntukkan untuk senyawa-senyawa tak berwarna, termasuk gas (Sastroamidjojo 1985).

Pemisahan secara kromatografi dilakukan dengan memperhatikan secara langsung beberapa sifat fisika dari zat yang terlibat adalah:

- a. Kecenderungan molekul untuk melarut dalam cairan
- b. Kecenderungan molekul untuk melekat pada permukaan serbuk halus
- c. Kecenderungan molekul untuk menguap atau berubah kekeadaan uap.

Manfaat dilakukan kromatografi pada hakekatnya adalah dengan tujuan untuk mengetahui senyawa-senyawa apa yang ada (kualitatif), beberapa kadarnya (kuantitatif) dan bagaimana memperoleh komponen yang murni (Gritter 1991).

Kromatografi lapis tipis adalah salah satu cara memisahkan suatu komponen berdasarkan adsorpsi dan partisi. Adsorben yang digunakan berupa bubuk halus dari silika gel yang dibuat serba rata diatas lempeng kaca.

Komponen yang dipisahkan naik mengikuti pelarutnya sesuai kecepatan elusinya masing-masing terjadi pemisahan. Ukuran partikel adsorben harus halus, agar lapisan adsorben pada lempeng kaca terbentuk rata dan homogen, sehingga rembesan dari cairan pengelusi cepat dan rata, dengan demikian komponen dapat terpisah baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga Rf dalam kromatografi lapis tipis :

1. Struktur kimia dari senyawa yang dipisahkan
2. Sifat dari penyerap dan derajat aktivitasnya
3. Tebal dan kerataan dari lapisan penyerap
4. Pelarut dan kemurniannya
5. Derajat kejenuhan dalam bejana pengembangan jumlah cuplikan yang digunakan
6. Jumlah cuplikan yang digunakan
7. Suhu
8. Keseimbangan

Kromatografi Lapis Tipis memiliki beberapa kelebihan yaitu pemisahan senyawa yang amat berbeda seperti senyawa organik alam dan senyawa organik sintetik, kompleks anorganik-organik, dan bahkan ion anorganik, dapat dilakukan dalam beberapa menit dengan alat yang harganya

tidak terlalu mahal. Selain itu pelarut dan cuplikan yang digunakan jumlahnya sedikit (Sastroamidjojo 1985. Gritter 1991).

F. KLT-Bioautografi

Bioautografi berasal dari kata bio = mahluk hidup, autografi = melakukan aktivitas sendiri. Menurut betina (1972), bioautografi adalah suatu metode pendektasian untuk menemukan suatu senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisir aktivitas antimikroba tersebut pada suatu kromatogram. Metode ini memanfaatkan pengertian kromatografi lapis tipis (KLT). Pada bioautografi ini didasarkan atas efek biologi berupa antibakteri, antiprotozoa, antitumor dan lain-lain dari substansi yang diteliti. Ciri khas dari prosedur bioatografi adalah di dasarkan atas teknik difusi agar, dimana senyawa antimikrobanya dipindahkan dari lapisan KLT ke medium agar yang telah diionokulasikan dengan merata bakteri uji yang pea. Dari hasil inkubasi pada suhu dan waktu tertentu akan terlihat zona hambatan di sekeliling dari spot dari KLT yang telah ditempelkan pada media agar. Zona hambatan ditampakkan oleh aktivitas senyawa aktif yang terdapat di dalam bahan yang diperiksa terhadap pertumbuhan mikroorganisme uji.

Bioautografi dapat dipertimbangkan karena paling efisien untuk mendeteksi komponen antimikroba, sebab dapat melokalisir aktivitas meskipun dalam senyawa aktif tersebut terdapat dalam bentuk senyawa kompleks dan dapat pula diisolasi langsung dari komponen yang aktif.

KLT Bioautografi dapat di bagi 3 kelompok yaitu:

1. Bioautografi langsung, yaitu di mana mikroorganismenya tumbuh secara langsung di atas lempeng Kromatografi Lapis Tipis (KLT).
2. Bioautografi kontak, di mana senyawa antimikroba dipindahkan dari lempeng KLT ke medium agar yang telah diinokulasikan bakteri uji yang peka secara merata dan melakukan kontak langsung.
3. Bioautografi pencelupan, di mana medium agar telah diinokulasikan dengan suspensi bakteri dituang di atas lempeng Kromatografi Lapis Tipis (KLT) (Djide 2006, 299-300).

G. Tinjauan Agama Tentang Kesehatan

Agama Islam mengandung tuntunan agar masyarakat khususnya umat Islam memelihara kesehatan dengan melakukan upaya pencegahan terhadap penyakit.

Yang dimaksud kesehatan adalah kesehatan jasmaniah, rohaniyah dan sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah SWT yang wajib disyukuri dengan mengamalkan, memelihara dan mengembangkannya.

Manusia tidak selamanya sehat, manakala jatuh sakit, hendaknya segera berobat. Hal ini sesuai sabda Rasulullah saw:

عَنْ زِيَادِ بْنِ عُلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شُرَيْكٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتِ الْأَعْرَابُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَدَاوِي؟ فَقَالَ نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَنْتَدَاوُونَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ قَالُوا مَا هُوَ؟ قَالَ الْهَرَمُ - وَفِي

لَفِظٍ - إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عِلْمَهُ مَنْ عِلْمَهُ وَجَهْلَهُ
مَنْ جَهْلَهُ (رواه أحمد)

Artinya:

“Dari Ziyad bin ‘Alaaq, dari Usamah bin Syuraik, ia berkata: “Ketika aku sedang bersama Nabi SAW datang serombongan orang Arab yang lalu berkata kepada Nabi SAW: ‘Haruskah kami berobat (dari penyakit)?’ Nabi menjawab: ‘Benar, wahai para hamba Allah. Berobatlah kamu. Sesungguhnya Allah tidak mengadakan suatu penyakit kecuali telah menyediakan pula (obat) penyembuhnya, selain obat untuk suatu penyakit. ‘Mereka bertanya: ‘Penyakit apakah itu?’ ‘Nabi menjawab: ‘Penyakit tua.’ – dalam kalimat lain disebutkan – ‘Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia telah menurunkan (obat) penyembuhnya. Orang yang berilmu dapat mengetahui, sedang orang bodoh tidak akan mengetahuinya’ ” (H.R. Ahmad) (‘Zakki 2007, 17-21).

Selanjutnya pada hadits lain :

عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ فَقَالَ: أَرْسِلُوا إِلَيَّ طَيِّبًا. فَقَالَ قَائِلٌ: وَأَنْتَ تَقُولُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه عمر ابن دينار)

Artinya:

“Dari Hilal bin Yasar, ia berkata: “Rasulullah SAW mengunjungi orang sakit yang telah pernah dibesuknya, lalu beliau berkata: ‘Kirimkan (bawalah) dia (si sakit) kepada dokter’. Maka seseorang berkata: ‘Engkaukah yang mengatakan demikian ya Rasulullah?’ Nabi menjawab: ‘Ya. Sesungguhnya Allah ‘Azza wa Jalla tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Dia menurunkan pula obat penyakit tersebut.’ ” (H.R. Amar bin Dinar).

Penyakit apa saja yang menimpa manusia pasti ada obatnya. Obat setiap penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli dibidang pengobatan, dan

tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Jika obat penyakit itu diketahui oleh semua orang sudah tentu setiap orang akan mengobati dirinya sendiri dan tidak perlu lagi mencari-cari tabib atau dokter. Akan tetapi Allah menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhannya, sesuai sabda Rasulullah saw

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

Artinya:

“Karena setiap penyakit ada obatnya, maka pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya itu akan segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT.” (HR. Muslim). (Al-Ju’aisin 2001, 58-59)

Akan tetapi perlu diingat bahwasanya pengobatan hanyalah washilah.

Sedangkan penggunaan obat bisa menyembuhkan, bisa juga tidak, apabila Allah SWT belum menghendaki atau menunda suatu penyembuhan. (Al-Ju’aisin 2001, 61)

Tumbuhan atau tanaman adalah apotek lengkap yang mengandung zat aktif dan variatif yang telah diciptakan Allah SWT dengan hikmah dan takdir-Nya. Potensi sebagian tumbuhan adalah melawan pengaruh bakteri dan zat perusak . potensi yang lain adalah membantu tubuh terbebas dari bakteri-bakteri dan mempermudah penyerapan bahan-bahan aktif yang terdapat dalam tumbuhan tersebut (Sayyid 2004, 5-11)

Q.S Al-An’am (6) : 99

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ
 شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مَاتِرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ
 طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَبَاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا
 وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَُمْ لآيَاتٍ
 لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

“Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”.

Ayat diatas menjelaskan bagaimana penciptaan tumbuh-tumbuhan dan perkembangannya hingga mencapai kematangan. Tumbuhan tersebut dapat digunakan sebagai tanaman obat sebagaimana pada penelitian yang dilakukan, sampel diperoleh dari tanaman yaitu bagian kelopaknya. Pada kelopak yang sudah matang mengandung komposisi tertentu yang apabila nantinya dikonsumsi oleh manusia dapat memberikan tenaga dan kekuatan untuk melawan berbagai bakteri penyebab penyakit.

Kitab al-Muntakhab fii at-Tafsir yang ditulis oleh sejumlah pakar mengemukakan bahwa: Ayat tentang tumbuh-tumbuhan ini menerangkan proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase, hingga sampai pada fase kematangan. Pada saat mencapai kematangan itu,

suatu jenis buah mengandung komposisi zat gula, minyak, protein, berbagai zat karbohidrat dan zat tepung. Semua itu terbentuk atas bantuan cahaya matahari yang masuk melalui klorofil yang pada umumnya terdapat pada bagian pohon yang berwarna hijau, termasuk pada daun. Daun itu ibarat pabrik yang mengolah komposisi zat-zat tadi untuk didistribusikan ke bagian-bagian pohon yang lain, termasuk biji dan buah.

Kemajuan ilmu pengetahuan telah dapat membuktikan kemahaesaan Allah. Di dunia kedokteran ditemukan bahwa klorofil, ketika diassimilasi oleh tubuh manusia, bercampur dengan sel-sel manusia. Pencampuran itu kemudian memberikan tenaga dan kekuatan melawan bermacam bakteri penyakit. Dengan demikian, ia berfungsi sebagai benteng pertahanan tubuh dari serangan segala macam penyakit.(Shihab 2002, 216-217).

Menurut Prof. Buya Hamka, dengan memperhatikan belahnya buah dan biji, keluarnya yang hidup dari yang mati dan keluarnya yang mati dari yang hidup, sampai kepada belahnya subuh karena terbitnya fajar, kejadian manusia, hujan turun dari langit dan sebagainya, sampai kepada berbagai ragam buah-buahan itu, maka semuanya itu adalah mengajak kita berfikir, untuk menambah ilmu tentang alam dan akhirnya untuk meneguhkan iman kita kepada Allah.(Hamka 1983, 292).

Selanjutnya pada Q.S An-Nahl (16) : 11

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan”.

Ayat ini menyebut beberapa yang paling bermanfaat dan populer dalam masyarakat Arab tempat di mana turunnya Al-Quran, dengan menyatakan bahwa Dia, yakni Allah swt. menumbuhkan bagi kamu dengannya, yakni dengan air hujan itu tanam-tanaman, dari yang paling cepat layu sampai dengan yang paling panjang usianya dan paling banyak manfaatnya. Dia menumbuhkan zaitun, salah satu pohon yang paling panjang usianya, demikian juga kurma, yang dapat dimakan mentah atau matang, mudah dipetik dan sangat bergizi lagi berkalori tinggi, juga anggur yang dapat kamu jadikan makanan yang halal atau minuman yang haram dan dari segala macam atau sebagian buah-buahan, selain yang disebut itu. Sesungguhnya pada yang demikian, yakni pada curahan hujan dan akibat-akibatnya itu benar-benar ada tanda yang sangat jelas bahwa yang mengaturnya seperti itu adalah Maha Esa lagi Maha Kuasa. Tanda itu berguna bagi kaum yang memikirkan. Betapa tidak, sumber airnya sama, tanah tempat tumbuhnya berdempet, tetapi ragam dan rasanya berbeda-beda.

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan para ulama bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu tanpa sia-sia. Air hujan yang diturunkan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang menjadi salah satu sumber makanan bagi makhluk lain termasuk manusia. Di dalam sebuah daun terdapat berbagai macam zat

yang dapat menjadi sumber penyembuhan terhadap penyakit. Manusia disunnahkan untuk berikhtiar, salah satunya dengan melakukan penelitian untuk menemukan obat baru. Dari berbagai penelitian akan mengungkapkan berbagai macam fakta sebagai indikator kebesaran Allah Rabbul Izzah yang kemudian menjadi jembatan untuk meningkatkan iman kepada-Nya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Alat dan Bahan

1. Alat yang digunakan

Autoklaf (Smic model YX-280 B), seperangkat alat maserasi, cawan petri, cawan porselin, chamber (camag), gelas Erlenmeyer (Iwaki Pyrex), Inkubator (Memmert), lampu UV 254 dan 366 nm, magnetik stirrer, neraca O’Haus, oven (Memmert), Ose bulat, penangas air, seperangkat alat kromatografi vakum, timbangan analitik (AND) dan vial.

2. Bahan yang digunakan

Agar, air suling, biakan murni (*Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus epidermis*, *Streptococcus mutans*, *Salmonella typhi* dan *Vibrio sp*), DMSO (Dimetil Sulfoksida), asam asetat, metanol (Teknis), lempeng silica gel F254 (E.Merck), Etanol 70%, Medium Nutrient Agar (NA), sampel kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) larutan fisiologis NaCl 0,9%, aquadest, n-Heksan, Etil Asetat, Alumunium klorida, Besi (III) klorida, H₂SO₄ dan uap amoniak.

B. Cara Kerja

1. Pengambilan sampel

Sampel yang digunakan adalah kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) diperoleh didesa Bule, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang . Pengambilan sampel dilakukan secara manual dengan cara

memetik bunganya dengan menggunakan gunting . Kelopak bunga yang masih segar dipanen saat biji sudah masak. Saat itu mahkota bunga telah gugur, buahnya membuka tetapi bijinya belum mengering. Setelah dipanen biji harus segera dipisahkan dari kelopaknya. Jika tidak segera dipisahkan kapsul penutup biji akan kering dan mengeras sehingga biji akan sukar dipisahkan.

2. Pengolahan sampel

Kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) yang telah dipetik dibersihkan dengan cara dicuci dengan air bersih, lalu dipisahkan semua kotoran-kotoran yang melekat. Kemudian dikering anginkan ditempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Setelah kering kelopak bunga diserbukkan dan sampel siap untuk diekstraksi.

3. Ekstraksi sampel

a. Ekstraksi secara maserasi dengan pelarut metanol

Sampel kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) yang telah diserbukkan, ditimbang sebanyak 200 gram, dimasukkan kedalam wadah maserasi dan ditambahkan metanol hingga serbuk terendam semua, lalu ditutup rapat, dibiarkan selama 24 jam sambil diaduk sekali-kali. Selanjutnya disaring dan dipisahkan ampas dan filtratnya, lalu dimaserasi kembali dengan cairan penyari yang baru. Perlakuan ini dilakukan 3 kali masing-masing dengan interval waktu 1 x 24 jam. Setelah itu ekstrak diuapkan hingga diperoleh ekstrak metanol yang kental.

b. Partisi dengan pelarut n-Heksan

Hasil ekstrak metanol kental yang diperoleh ditimbang dan ditambahkan n-Heksan, kemudian dimasukkan dalam gelas erlenmeyer lalu diaduk dengan magnetik stirer. Selanjutnya disentrifuse, dibiarkan beberapa saat hingga terjadi pemisahan lapisan larut n-Heksan dan tidak larut n-Heksan, dikeluarkan dan ditampung dalam wadah yang berbeda. Ekstrak tidak larut n-Heksan ditambahkan n-Heksan dilakukan seperti semula hingga pelarut n-Heksan bening. Ekstrak n-Heksan dan ekstrak tidak larut n-Heksan yang diperoleh diuapkan dan masing-masing diskroning aktivitas antibakterinya.

c. Sterilisasi alat

Alat-alat yang diperlukan dicuci dengan deterjen, wadah mulut lebar dibersihkan dengan direndam dengan larutan deterjen panas selama 15-30 menit diikuti dengan pembilasan pertama dengan HCl 0,1% dan terakhir dengan air suling. Alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik di udara terbuka setelah kering dibungkus dengan kertas perkamen. Tabung reaksi dan gelas Erlenmeyer terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Alat-alat dari kaca disterilkan di oven pada suhu 180°C selama 2 jam. Alat-alat suntik dan alat-alat plastik lainnya (tidak tahan pemanasan tinggi) disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit dengan tekanan 2 atm. Jarum ose disterilkan dengan pemanasan langsung hingga memijar.

d. Pembuatan medium

1. Medium Nutrien Agar (NA)

Komposisi :

Ekstrak Beef	5,0 gram
Pepton	10,0 gram
Agar	15,0 gram
Air suling hingga	1000 ml

Pembuatan :

Semua bahan dimasukkan kedalam gelas Erlenmeyer dilarutkandalam air suling hingga 800 ml, dipanaskan sampai larut, lalu dicukupkan sampai 1000 ml aquadest, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121⁰C selama 15 menit.

2. Medium Glukosa Nutrien Broth (GNB)

Komposisi :

Ekstrak beef	5,0 gram
Glukosa	10,0 gram
Pepton	10,0 gram
Air suling hingga	1000 ml

Pembuatan :

Semua bahan dimasukkan ke dalam gelas erlenmeyer dilarutkan dalam air suling hingga 800 ml, dipanaskan sampai larut, dicukupkan sampai 1000 ml aquadest, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121⁰C selama 15 menit (Djide, M.N., Sartini 2008).

e. Penyiapan bakteri uji

Bakteri uji yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus mutans*, *Salmonella typhi* dan *Vibrio sp* . Bakteri yang berasal dari Laboratorium mikrobiologi UIN Makassar yang diremajakan dalam medium Nutrien Agar (NA) miring dan diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 37⁰C.

f. Pembuatan Suspensi Bakteri

Kultur bakteri yang berumur 1 x 24 jam yang telah diremajakan dalam medium NA miring disuspensikan dengan NaCl fisiologis (NaCl 0,9%) kemudian diukur kekeruhannya 25% T pada spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 580 nm (Harmita, .Randjani. M.,2005).

g. Skrining Aktivitas Antibakteri

Pada tahap skrining aktivitas, sebanyak 10 mg ekstrak metanol, ekstrak larut heksan dan ekstrak tidak larut heksan dilarutkan dalam 0,2 ml DMSO dengan menggunakan mikropipet, kemudian dicampurkan dengan 9,8 ml media NA yang telah dicairkan dengan konsentrasi 1 mg/ml hingga

volume akhir 10 ml. campuran dituangkan kedalam cawan petri dan digoyang- goyangkan agar rata dan dibiarkan memadat. Biakan mikrobiologi uji yang telah diencerkan diratakan dengan menggunakan metode drygalsky (metode surface plate), kemudian cawan petri diinkubasi pada suhu 37⁰C selama 1 x 24 jam.

h. Identifikasi dengan Kromatografi Lapis Tipis

Lempeng KLT yang akan digunakan terlebih dahulu diaktifkan dengan pemanasan dalam oven pada suhu 110° C selama 30 menit sebelum digunakan. Ditotolkan fraksi nonfolar dan polar pada lempeng KLT ukuran 8 x 2 cm menggunakan pipa kapiler. Kemudian dielusi dengan cairan pengelusi yang sesuai di dalam chamber. Lempeng dikeluarkan dari chamber dan diangin-anginkan hingga cairan pengelusnya menguap. Kemudian kromatografi yang dihasilkan diamati nodanya di bawah sinar UV pada panjang gelombang 254 nm dan 366 nm, serta penampak bercak H₂ SO₄ 10%.

i. Uji KLT-Bioautografi

Hasil identifikasi KLT dengan profil kromatogram yang terbaik dilanjutkan dengan uji KLT-Bioautografi metode kontak, dimana 10 ml media NA dimasukkan kedalam vial dan diinokulasikan 20 µL mikroba uji dihomogenkan, kemudian dituang kedalam cawan petri steril. Lempeng yang telah dielusi dengan eluen yang sesuai diletakkan diatas permukaan medium agar yang telah diinokulasikan mikroba uji dan dibiarkan selama 60 menit setelah itu lempeng tersebut diangkat dan dikeluarkan.

Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam. Kemudian diamati bercak yang memberikan aktivitas penghambatan terhadap pertumbuhan mikroba uji.

4. Identifikasi bercak aktif dengan beberapa penampakan bercak

Kromatogram disemprot dengan menggunakan pereaksi semprot sebagai berikut:

1. Alkaloid

Pereaksi yang digunakan Dragendorff akan dihasilkan warna jingga dengan latarbelakang kuning untuk senyawa golongan alkaloida.

2. Steroid

Pereaksi yang digunakan Liebermann-Burchard. Kromatogram terlebih dahulu dipanaskan, kemudian diamati di lampu UV. Munculnya noda berfluoresensi coklat atau biru menunjukkan adanya triterpen, sedangkan munculnya warna hijau kebiruan menunjukkan adanya steroid.

3. Flavanoid

Pereaksi yang digunakan Aluminium klorida dilampu UV, akan dihasilkan noda berfluoresensi kuning untuk senyawa golongan flavonoid.

4. Fenol

Pereaksi yang digunakan Besi (III) klorida akan dihasilkan warna biru atau hijau untuk senyawa golongan fenol.

5. Penampak bercak H₂SO₄

Kromatogram dipanaskan pada suhu 105⁰C selama 5 menit dan diamati. Kebanyakan senyawa organik memberikan warna kuning, coklat, hitam (Sutrisno,R.B 1993).

Keterangan :

SA : *Staphylococcus aureus* PA : *Pseudomonas aeruginosa*

ST : *Salmonella thypi* BS : *Bacillus subtilis*

EC: *Echerichia coli* SE : *Staphylococcus epidermidis*

V_{SP} : *Vibrio sp* SM : *Streptococcus mutans*

+ : Menghambat pertumbuhan mikroba

- : Tidak menghambat pertumbuhan mikroba

Tabel 3. Hasil Pengujian KLT-Bioautografi ekstrak tidak larut n-heksan kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L).

No	Nilai Rf	Penampak bercak			Bakteri yang dihambat
		UV 254	UV 366	H ₂ SO ₄	
1	0,45	Biru	Ungu	Coklat	<i>BS, SM dan EC</i>
2	0,75	Biru	Ungu	Coklat	<i>SA dan ST</i>

Keterangan :

- Panjang lempeng 7 cm
- Fase gerak : Metanol : Etil asetat (1 : 9) dengan penambahan 2 tetes asam asetat

Tabel 4. Hasil identifikasi ekstrak metanol tidak larut n-heksan kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) menggunakan beberapa pereaksi dengan cairan pengelusi metanol : etil asetat (1: 9) dengan penambahan 2 tetes asam asetat.

No	Rf	Penampak bercak			keterangan
		AlCl ₃	FeCl ₃	Uap amoniak	
1	0,45	Berfluorosensi kuning	Hijau	Coklat	+
2	0,75	Berfluorosensi kuning	Hijau	Coklat	+

Keterangan :

- Fase Gerak menggunakan eluen metanol : etil asetat (1: 9) dengan penambahan 2 tetes asam asetat
- Fase Diam : lempeng silika gel F254

B. *Pembahasan*

Dalam dunia pengobatan pemanfaatan dan khasiat rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) sudah tidak asing lagi. Pemanfaatan kelopak bunga rosella yaitu ekstrak bunga rosella berguna untuk obat antikejang, mengobati cacingan dan sebagai antibakteri. Kelopak bunga rosella digunakan untuk mengurangi gangguan batuk dan jus rosella dengan tambahan garam, lada dan tetes tebu digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang berhubungan dengan empedu. Kelopak rosella yang direbus dengan air berkhasiat sebagai peluruh kencing dan dapat menurunkan tekanan darah, mengurangi kekentalan darah dan meningkatkan peristaltik usus. Selain itu kelopak rosella juga dapat digunakan untuk pewarna dan perasa dalam membuat anggur rosella, jeli, sirup, gelatin, minuman segar, puding dan cake. Adapun kelopak kering dapat diminum sebagai teh yang biasa diseduh atau direbus (Hidayat, 2007).

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah kelopak bunga rosella dimana waktu pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 10.00 karena saat itulah terjadi fotosintesis maksimum. Sebelum dilakukan penyarian, sampel terlebih dahulu diangin-anginkan hingga kadar air berkurang dengan tujuan menghentikan proses enzimatik yang dapat merusak zat aktif, selain itu untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme pada simplisia. Sampel yang telah kering lalu dimaserasi dengan menggunakan pelarut metanol dimana metanol bersifat semipolar sehingga dapat menarik komponen yang bersifat polar dan nonpolar. Metode maserasi

cocok untuk bahan yang tidak keras seperti bunga yang memiliki tekstur yang lunak dan tidak perlu pemanasan yang mungkin dapat merusak senyawa kimia yang terdapat dalam sampel.

Metanol digunakan sebagai cairan penyari karena metanol bersifat semipolar yang dapat menyari senyawa kimia polar maupun nonpolar. Selain itu metanol juga sulit ditumbuhi oleh jamur dan bakteri, mudah diuapkan serta harganya lebih ekonomis (Harbone, 1987)

Setelah diperoleh ekstrak metanol kental kemudian dilanjutkan dengan partisi cair padat menggunakan pelarut n-heksan. Senyawa yang non polar diharapkan larut dalam n-heksan sedangkan yang polar tidak larut n-heksan. Partisi dilakukan agar memudahkan dalam penelusuran senyawa aktif tertentu.

Ekstrak metanol, larut n-heksan dan tidak larut n-heksan yang diperoleh selanjutnya diskriming antibakterinya dengan metode difusi agar. Pengujian dilakukan terhadap bakteri *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus epidermis*, *Streptococcus mutans*, *Salmonella typhi* dan *Vibrio sp.* Adapun pemilihan mikroba uji tersebut karena sifat-sifatnya yang patogenik. *Staphylococcus aureus* bersifat patogenik penyebab infeksi kulit, borok dan keracunan makanan sedangkan *Streptococcus mutans* dapat menyebabkan karies pada gigi. *Escherichia coli* dan *Salmonella thypi* bersifat patogenik penyebab utama diare kronik, tifoid dan infeksi saluran kemih.

Bacillus subtilis bersifat patogenik bisul dan keracunan pada makanan. *Pseudomonas aeruginosa* yang bersifat invasif dan toksigenik penyebab infeksi kulit dan mata. *Vibrio sp* merupakan bakteri penghasil enterotoksin penyebab penyakit kolera. *Staphylococcus epidermidis* dapat menyebabkan infeksi pada kulit, gatal dan jerawat.

Medium yang digunakan adalah medium Nutrien Agar (NA) untuk menumbuhkan biakan bakteri sedangkan Glukosa Nutrien Broth (GNB) merupakan medium untuk stok bakteri. Pada uji skrining antibakteri menunjukkan ekstrak metanol tidak larut n-heksan memiliki hambatan pertumbuhan mikroba yang aktif terhadap *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Bacillus subtilis*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus epidermis*, *Streptococcus mutans*, *Salmonella typhi* dan *Vibrio sp*. Sedangkan ekstrak metanol larut n-heksan tidak menghambat pertumbuhan dari ke delapan bakteri uji yang digunakan. Dengan demikian senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri adalah senyawa tidak larut n-heksan yang bersifat polar.

Tahap selanjutnya dilakukan pengujian secara KLT-Bioautografi terhadap ekstrak metanol tidak larut n-heksan karena dari hasil skrining, ekstrak metanol tidak larut n-heksan yang menunjukkan aktivitas antibakteri yang paling baik dibanding ekstrak metanol larut n-heksan. Pengujian secara KLT-Bioautografi dilakukan terhadap senyawa hasil pemisahan ekstrak metanol tidak larut n-heksan secara kromatografi lapis tipis menggunakan campuran eluen metanol : etil asetat (1:9) dengan penambahan 2 tetes asam

asetat. Kromatografi lapis tipis dapat dilihat pada UV 254 nm, UV 366 nm dan H₂SO₄ 10%. Senyawa antibakteri yang telah berdifusi dari lempeng kromatografi ke dalam media agar akan menghambat pertumbuhan bakteri setelah diinkubasi selama 1x24 jam dalam inkubator pada suhu yang tepat sampai noda yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme uji tampak pada permukaan dengan membentuk zona bening. Terbentuknya zona bening pada permukaan medium disebabkan adanya senyawa antibakteri yang terdapat dalam ekstrak metanol tidak larut n-heksan yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri uji sehingga perlu dilakukan identifikasi komponen kimia pada ekstrak aktif tersebut.

Hasil KLT Bioautografi menunjukkan bahwa ekstrak tidak larut heksan hanya menghambat lima dari delapan bakteri uji yaitu: *Bacillus subtilis*, *Streptococcus mutans*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* dan *Salmonella thypi*, hal ini disebabkan karena konsentrasi ekstrak yang digunakan pada KLT Bioautografi kecil. Masing-masing bercak yang memberikan aktivitas antibakteri terdapat pada nilai R_f 0,45, dan 0,75 dengan menggunakan pereaksi aluminium klorida, uap amoniak dan Besi (III) klorida. Hasilnya dari ke tiga pereaksi yang digunakan menunjukkan hasil positif bahwa sampel yang digunakan termasuk dalam golongan flavanoid.

Khasiat rosella untuk mencegah penyakit, mengobati gangguan berbagai penyakit dengan kandungan gossyptin, anthycyanin dan gluciside hibiscin yang ada di dalamnya. Penyakit apa saja yang menimpa manusia pasti ada obatnya. Jika obat penyakit itu diketahui oleh semua orang sudah

tentu setiap orang akan mengobati dirinya sendiri dan tidak perlu lagi mencari-cari tabib atau dokter. Akan tetapi Allah menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhannya, sesuai sabda Rasulullah saw

عَنْ جَابِرٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ
فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءٌ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه مسلم)

Artinya:

“Karena setiap penyakit ada obatnya, maka pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya itu akan segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT.” (HR. Muslim). (Al-Ju’aisin 2001, 58-5)

Tanaman adalah apotek lengkap yang mengandung zat aktif dan variatif yang telah diciptakan Allah SWT dengan hikmah dan takdir-nya. Potensi sebagian tanaman adalah melawan pengaruh bakteri dan zat perusak, membantu tubuh terbebas dari bakteri-bakteri serta mempermudah penyerapan bahan-bahan aktif yang terdapat dalam tanaman tersebut (Sayyid 2004,5-11).

Kelopak bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) dapat digolongkan sebagai antimikroba berspektrum luas karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Adapun senyawa yang berperan dalam penghambatan ini yaitu senyawa flavanoid yang merupakan turunan fenol yang memiliki kemampuan mendenaturasi protein

dan merusak membran sel. Fenol berikatan dengan protein melalui ikatan hidrogen sehingga mengakibatkan struktur protein menjadi rusak. Sebagian besar struktur dinding sel dan membran sitoplasma bakteri mengandung protein dan lemak. Ketidakstabilan pada dinding sel membran sitoplasma bakteri menyebabkan fungsi permeabilitas selektif, fungsi pengangkutan aktif, pengendalian susunan protein dari sel bakteri menjadi terganggu. Gangguan integritas sitoplasma berakibat pada lolosnya makromolekul dan ion dari sel. Sel bakteri menjadi kehilangan bentuknya dan terjadilah lisis.

Mekanisme kerja antibakteri salah satunya yaitu mendenaturasi protein dan menghambat sintesis protein sel bakteri. Suhu dan konsentrasi tinggi zat kimia dapat mendenaturasi protein yang merupakan komponen esensial bagi berlangsungnya kehidupan sel. Senyawa penghambat sintesis protein juga dapat menyebabkan kesalahan dalam pembacaan kode pada mRNA sehingga protein tidak terbentuk dan sel akan mati. Selain itu juga ada senyawa yang menghambat sintesis asam nukleat dimana akan berikatan dengan enzim atau salah satu komponen yang berperan dalam sintesis asam nukleat sehingga akhir reaksi terhenti karena substrat yang direaksikan dan asam nukleat tidak terbentuk (Jawe *et al*, 1996 dalam Susanti 2004).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Ekstrak metanol tidak larut n-heksan kelopak bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) memberikan daya hambat yang baik terhadap pertumbuhan bakteri *Streptococcus mutans*, *Escherichia coli*, *Bacillus subtilis*, *Salmonella thypi* dan *Staphylococcus aureus*.
2. Senyawa aktif yang memiliki aktivitas antibakteri pada ekstrak metanol tidak larut n-heksan kelopak bunga rosella tidak larut heksan diduga adalah senyawa golongan flavanoid.
3. Setiap penyakit ada obatnya, maka pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Pengobatan yang sesuai dengan penyakitnya itu akan segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Akan tetapi perlu diingat bahwasanya pengobatan hanyalah washilah, penggunaannya bisa menyembuhkan bisa juga tidak apabila Allah SWT belum menghendaki atau menunda suatu penyembuhan.

B. Implikasi Penelitian


- Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai rosella dengan menggunakan bagian tanaman yang lainnya seperti daun dan biji sehingga dapat diketahui apakah bagian tersebut juga memberikan aktivitas antibakteri.
- Dalam berikhtiar untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang diderita, maka pengobatan yang dilakukan sesuai dengan penyakitnya serta jalan yang ditempuh tidak melanggar syariat agama islam.


DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quranul Karim. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Departemen Agama Republik Indonesia, 2008.
- Al-Ju'aisin, Abdullah bin Ali. *Kado untuk Orang Sakit*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Agromedia, 2003. *Ramuan Tradisional Untuk Mengatasi Aneka Penyakit*. PT. Agromedia Pustaka. Jakarta.
- Alam Gemini. 2008. *Penuntun Praktikum Fitokimia*. Laboratorium Farmakognosi-Fitokimia. Fakultas Ilmu Kesehatan. Jurusan Farmasi. UIN Alauddin. Makassar.
- Ali, A. 2005, *Mikrobiologi Dasar Jilid I*. Jurusan Biologi UNM. Makassar.
- Amiruddin. R, 2007. *Current Issue Kematian Anak (Penyakit Diare)*. Jurusan Epidemiologi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Hasanuddin.
- Chatim, A.& Suharto.1993. *Sterilisasi dan Desinfektan*. Mikrobiologi Kedokteran. Binarupa Aksara. Jakarta.
- Djide. M. N, Sartini, Kadir. S.H, *Analisis Mikrobiologi Farmasi*. Makassar : Laboratorium Mikrobiologi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, 2006.
- Djide natsir & Sartini, 2008.*Analisis Mikrobiologi Farmasi*. Laboratorium Mikrobiologi Farmasi. Fakultas Farmasi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Food-Info, 2008. *Escherichia coli*. <http://www.cfsan.fda.gov/mow/intro.html>.
- Gembong, 1991. *Taksonomi Tumbuhan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Gritter, R.J, Schwerting, A.E, *Pengantar Kromatografi*, Edisi kedua, Terjemahan Kosasih Panwawita, Bandung: Penerbit ITB, 1991.
- Garrity.G. M., Bell. J.A. and Lilburn. T.G, *Taxonomic Outline of The Prokaryotes Bergey's Manual of Systematic Bacteriology*, 2th Edition, United States of America, Springer, New York Hendelberg. 2004.

- Hamka. *Tafsir Al-Azhar (juz 7-9)*, Jakarta: PT. PustakaPanjimas, 1983.
- Harmita, Randji. M., *Buku Ajar Analisis Hayati*. Edisi Kedua. Jakarta: Ari Cipta, 2005.
- Hadioetomo, R. S. 1990. *Mikrobiologi Dasar Dalam Praktek*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Hare, R. 1993. *Mikrobiologi dan Imunology*. Yayasan Essentica Medica. Yogyakarta.
- Hidayat. T, 2007. *Budi Daya Tanaman Rosella*. CV. Sinar Cemerlang Abadi. Jakarta.
- Harbone, J.B. *Metode Fitokimia, Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*. Bandung : Penerbit ITB, 1987
- Nuke, 2008. Rosella. Sekolah Farmasi ITB. <http://bahan-alam.fa.itb.ac.id>. Diakses tanggal 12 maret 2009.
- Pelczar dan Chan, 2006, *Dasar-Dasar Mikrobiologi Jilid I*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Sayyid, Abdul B.M. *Rahasia Kesehatan Nabi*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004.
- Shihab, Quraish M. *Tafsir Al-Mishbah "Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran" (volume 7)*. Lentera Hati, 2002.
- Sastroamidjojo , H, *Kromatografi*, Yogyakarta: Liberty. 1985. Sutrisno,R.B., *Pereaksi KLT (Kromatografi Lapis Tipis)*, Jakarta: Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, 1993.
- Syarif amir, 1995. *Farmakologi dan Terapi*. Fakultas Kedokteran UI. Jakarta.
- Syahracham, Agus, dkk, *Mikrobiologi Kedokteran*, Edisi Revisi, Jakarta: Binampa Aksara. 1994.
- Sutrisno, R.B. *Pereaksi KLT (Kromatografi Lapis Tipis)*, Jakarta : Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, 1993.
- Tarmizi. 2008. *Analisis Kandungan Kimia Berkhasiat Kapas Merah*. Universitas Negeri Padang Press. Padang.

Lampiran 1. Skema Kerja






Escherichia coli

Gambar. 4 : Foto hasil pengujian KLT-Bioautografi ekstrak metanol tidak larut n-heksan kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) terhadap bakteri uji *Escherichia coli* dengan cairan pengelusi metanol : etil asetat (9: 1) dengan penambahan 2 tetes asam asetat.

Keterangan :

- A. : Penampang bercak lampu UV 254 nm
- B. : Penampang bercak lampu UV 366 nm
- C. : Penampang bercak H₂SO₄ 10%




Bacillus subtilis

Gambar. 5 : Foto hasil pengujian KLT-Bioautografi ekstrak metanol tidak larut n-heksan kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) terhadap bakteri uji *Bacillus subtilis* dengan cairan pengelusi metanol : etil asetat (9: 1) dengan penambahan 2 tetes asam asetat.

Keterangan :

- A. : Penampang bercak lampu UV 254 nm
- B. : Penampang bercak lampu UV 366 nm
- C. : Penampang bercak H₂SO₄ 10%




Salmonella thyposa

Gambar. 6 : Foto hasil pengujian KLT-Bioautografi ekstrak metanol tidak larut n-heksan kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) terhadap bakteri uji *Salmonella thyposa* dengan cairan pengelusi metanol : etil asetat (9: 1) dengan penambahan 2 tetes asam asetat.

Keterangan :

- A. : Penampang bercak lampu UV 254 nm
- B. : Penampang bercak lampu UV 366 nm
- C. : Penampang bercak H₂SO₄ 10%




Staphylococcus aureus

Gambar. 7 : Foto hasil pengujian KLT-Bioautografi ekstrak metanol tidak larut n-heksan kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) terhadap bakteri uji *Staphylococcus aureus* dengan cairan pengelusi metanol : etil asetat (9: 1) dengan penambahan 2 tetes asam asetat.

Keterangan :

- A. : Penampang bercak lampu UV 254 nm
- B. : Penampang bercak lampu UV 366 nm
- C. : Penampang bercak H₂SO₄ 10%




Streptococcus mutans

Gambar. 8 : Foto hasil pengujian KLT-Bioautografi ekstrak metanol tidak larut n-heksan kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) terhadap bakteri uji *Streptococcus mutans* dengan cairan pengelusi metanol : etil asetat (9: 1) dengan penambahan 2 tetes asam asetat.

Keterangan :

- A. : Penampang bercak lampu UV 254 nm
- B. : Penampang bercak lampu UV 366 nm
- C. : Penampang bercak H₂SO₄ 10%



Gambar. 2 : Foto hasil pengujian skrining ekstrak metanol larut n-heksan kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L).

Keterangan :

PA : *Pseudomonas aeruginosa*

BS : *Bacillus subtilis*

Vsp : *Vibrio sp*


EC : *Escherichia coli*

ST : *Salmonella thypi*

SA : *Staphylococcus aureus*

SE : *Streptococcus epidermidis*

SM : *Streptococcus mutans*



Gambar. 3 : Foto hasil pengujian skrining ekstrak metanol tidak larut n-heksan kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L).

Keterangan :

PA : *Pseudomonas aeruginosa*

ST : *Salmonella thypi*

BS : *Bacillus subtilis*


SA : *Staphylococcus aureus*

Vsp : *Vibrio sp*


SE : *Streptococcus epidermidis*

EC : *Escherichia coli*

SM : *Streptococcus mutans*



Gambar 9: Foto profil kromatogram lapis tipis ekstrak metanol tidak larut n-heksan kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) dengan cairan pengelusi metanol : etil asetat (1: 9) dengan penambahan 2 tetes asam asetat.



Gambar10: Foto profil kromatogram identifikasi komponen kimia ekstrak metanol tidak larut n-heksan kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) dengan cairan pengelusi metanol : etil asetat (1: 9) dengan penambahan 2 tetes asam asetat.



Gambar. 11 : Foto Tanaman Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L)