

**UJI INDEKS GLIKEMIK UMBI TALAS UNGU (*Colocasia esculenta* L)  
DAN UMBI TALAS JEPANG (*Colocasia esculenta* Var *Antiquorum*)  
PADA MENCIT JANTAN (*Mus musculus*)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi  
pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Oleh:

**ANUGRAH AMALIYAH**

**NIM. 70100111009**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anugrah Amaliyah  
NIM : 70100111009  
Tempat/TanggalLahir : Takalar 12 Desember 1993  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi  
Alamat : Samata  
Judul : Uji indeks glikemik umbi talas ungu (*Colocasia esculenta*  
*L*) dan umbi talas jepang (*Colocasia Esculenta Var*  
*Antiquorum*) Pada mencit Jantan (*Mus musculus*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 27 Agustus 2015

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDE**  
M A K A S S A R  
  
**ANUGRAH AMALIYAH**  
NIM. 70100111009

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Uji indeks glikemik umbi talas ungu (*Colocasia esculenta* L) Dan umbi talas jepang (*Colocasia Esculenta Var Antiquorum*) pada mencit jantan (*Mus musculus*)” yang disusun oleh Anugrah Amaliyah, NIM : 70100111009, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 M yang bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.


Gowa, 27 Agustus 2015 M  
12 Dzulqaidah 1436 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.	(.....)
Sekretaris	: Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing II	: Nurlina, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji I	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji II	: Drs. Wahyuddin G. M.Ag	(.....)

Diketahui oleh:

 Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar,

 Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.

NIP. 19550203 198312 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu**

Segala puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad SAW, yang termulia dari para Nabi dan Rasul. Dan semoga pula tercurah atas keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terimakasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Abd. Kadir R dan Ibunda Masnaeni yang tak henti-hentinya memberi do'a dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau, dan buat saudaraku tercinta Reski Adelina dan Nurul Nasywah serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas do'a, kasih sayang dan bimbingannya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Mereka adalah semangat terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kalian.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Fatmawaty Mallapiang, S.K.M., M.Kes. selaku Wakil Dekan I (bidang akademik), Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. selaku Wakil Dekan II (bidang administrasi dan keuangan) dan Bapak Wahyuddin G., M.Ag. selaku Wakil Dekan III (bidang kemahasiswaan) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt. selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar yang telah memberi banyak saran dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Nurlina, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Wahyuddin G. M.Ag selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasa-jasanya mendapatkan balasan dari Allah SWT. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
10. Kepada seluruh Laboran Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.
11. Kepada kakanda Anri Arifin, S.Farm dan Ali Imran S. Farm yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.
12. Kepada teman-teman peneliti (Fadli, Ila, Nur, Ulfa dan lutfi) yang telah banyak memberi bantuan selama penelitian.
13. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu penulis, teman-teman seperjuangan “Effervescent 2011” khususnya kelas Farmasi A.

14. Kepada sahabat-sahabat tercinta (Amel, Dwi, Amrah, Dian, Mia, Icha, Indri, Mardia, Zaky, Utti dan Akbar) yang telah memberi banyak dukungan, semangat, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
15. Kepada kakak-kakak angkatan 2005-2010 dan adik-adik angkatan 2012-2014 Farmasi UIN Alauddin Makassar.
16. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu-persatu, terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan pada penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalammu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R


Gowa, 27 Agustus 2015  
Penyusun

  
**ANUGRAH AMALIYAH**  
NIM. 70100111009

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Defenisi Operasional.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat penelitian.....	8
<b>BAB II     TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Uraian Tanaman.....	9
B. Indeks Glikemik.....	14
C. Glukosa.....	23
D. Hiperglikemik.....	24
E. Diabetes Melitus.....	27
F. Tinjauan Islam.....	39
<b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Metode Pengumpulan Data.....	47
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	49

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian .....	50
	B. Pembahasan.....	51
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	56
	B. Implikasi Penelitian.....	56
KEPUSTAKAAN .....		57
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		74



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Antioksidan aktif dari glikosida flavonoid isolat talas.....	10
2. Kriteria diagnostik gula darah.....	30
3. Penggolongan DM tipe I dengan DM tipe II .....	34
4. Golongan senyawa hipoglikemik oral beserta mekanisme kerjanya.....	39
5. Hasil penelitian.....	50
6. Kadar glukosa darah mencit yang diberi glukosa, Na.CMC, umbi talas ungu dan umbi talas jepang .....	66

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Halaman

1. Skema kerja Pembuatan sampel umbi talas ungu dan umbi talas jepang .....	61
2. Skema kerja Pengujian indeks glikemik .....	62
3. Perhitungan dosis .....	63
4. Volume pemberian .....	64
5. Grafik kadar glukosa darah .....	67
6. Perhitungan AUC dan IG glukosa.....	68
7. Perhitungan AUC dan IG Na. CMC .....	69
8. Perhitungan AUC dan IG talas ungu.....	70
9. Perhitungan AUC dan IG talas jepang .....	71

## ABSTRAK

Nama : Anugrah Amaliyah

NIM : 70100111009

Jurusan : Farmasi

Judul Skripsi : Uji indeks glikemik umbi talas ungu (*Colocasia esculenta* L) dan umbi talas jepang (*Colocasia esculenta var Antiquorum*) pada mencit jantan (*Mus musculus*)

---

Telah dilakukan penelitian tentang uji Indeks glikemik umbi talas ungu (*Colocasia esculenta* L) dan umbi talas jepang (*Colocasia esculenta Var Antiquorum*) pada mencit jantan (*Mus musculus*). Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui indeks glikemik umbi talas ungu (*Colocasia esculenta* L) dan umbi talas jepang (*Colocasia esculenta Var Antiquorum*) pada mencit (*Mus musculus*). Talas ungu dan talas jepang disuspensikan ke dalam Na.CMC 0,1% dengan dosis 2,5 g/kgBB, Kontrol positif berupa glukosa dengan dosis 2,5 g/kgBB. Dilakukan pengambilan sampel darah hewan uji pada jam ke 0, 45; 90 dan 135 menit. Perhitungan IG dilakukan dengan metode AUC (Area Under Curve). Hasil penelitian menunjukkan bahwa umbi talas ungu memiliki nilai indeks glikemik 20 dan umbi talas jepang memiliki nilai indeks glikemik 43 yang menunjukkan bahwa umbi talas ungu dan umbi talas jepang memiliki IG rendah ( $IG < 55$ ).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Kata kunci : indeks glikemik, talas ungu (*Colocasia esculenta* L.), talas jepang (*Colocasia esculenta Var Antiquorum*)

## ABSTRACT

Name : Anugrah Amaliyah  
Reg number : 70100111009  
Department : Pharmacy  
Thesis title : Glycaemic index test of purple taro tuber (*Colocasia esculenta* L) and japanese taro tuber (*Colocasia esculenta var Antiquorum*) of male mice (*Mus musculus*)

---

A research had been done about glycaemic index testing purple taro tuber (*Colocasia esculenta* L) and Japanese taro tuber (*Colocasia esculenta Var Antiquorum*) in male mice (*Mus musculus*). The purpose of this research was to determine the glycaemic index bulbs purple taro (*Colocasia esculenta* L) and Japanese taro tuber (*Colocasia esculenta Var Antiquorum*) in mice (*Mus musculus*). Purple taro and taro Na.CMC Japan were suspended into 0.1% at a dose of 2.5 g / kg, positive control in the form of glucose at a dose of 2.5 g / kg. Removal sample to animals blood test had been done on the clock to 0, 45; 90 and 135 minutes. IG calculations performed by the method of AUC (Area Under the Curve). The results showed that the purple taro tubers has 20 glycaemic index and Japanese taro tuber has 43 glycaemic index value showed that the purple taro tubers and Japanese taro tuber has low IG (IG < 55).

Keywords : glycemic index, purple taro (*Colocasia esculenta* L.), japanese taro (*Colocasia esculenta Var Antiquorum*)

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan alam terutama pada jenis tanaman pangan lokal umbi-umbian, yang sejak dahulu dikonsumsi sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak dan juga mengandung beberapa unsur mineral dan vitamin sehingga dapat dijadikan sebagai bahan obat-obatan. Penggunaan tumbuhan sampai saat ini masih terus dilakukan mengingat di dalamnya terdapat kandungan senyawa-senyawa kimia berkhasiat. Hal ini juga yang menyebabkan banyak orang tertarik untuk menyelidiki kandungan senyawa kimia apa saja yang mungkin terdapat dalam tumbuhan obat tersebut (Wijayakusuma 1998).

Allah swt. menumbuhkan di bumi beraneka ragam tanaman untuk kebutuhan makhluk hidup. Hal ini seiring dengan firman Allah swt. QS as-Sajdah/32: 27.

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ  
وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

Terjemahnya:

*“Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?”*  
(Departemen Agama, 2012: 418).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan tumbuhan untuk kepentingan manusia. Akan Tetapi, manusia tidak dibenarkan hanya menikmati apa yang diciptakan Allah swt kepada mereka begitu saja, tanpa mau berfikir dan berusaha untuk meningkatkan kualitas ciptaanNya dan mengembangkannya menjadi suatu ilmu pengetahuan (Susilowati, 2008).

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa Allah swt menciptakan Beraneka macam tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia. Salah satunya adalah sampel ekstrak talas ungu (*Colocasia esculenta* L) dan talas jepang (*Colocasia Esculenta Var Antiquorum*) sebagai sampel yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian sehingga dapat diketahui manfaat dari tumbuhan sebagai bahan pengobatan.

Dewasa ini dunia kedokteran dan kesehatan banyak membahas tentang penyakit degeneratif yakni Diabetes Melitus yang setiap tahun meningkat pesat. Hal ini terjadi karena Peningkatan konsumsi makanan yang kaya akan karbohidrat seperti beras yang memiliki indeks glikemik tinggi dan ketersediaan pangan serta pola konsumsi yang tidak benar. Salah satu upaya untuk pencegahan penyakit Diabetes Melitus adalah dengan mengatur pola makan dan memilih makanan yang banyak mengandung pati resisten yang banyak ditemukan pada akar umbi, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Menurut Shin et al, 2003 Konsumsi makanan berkadar karbohidrat tinggi seperti nasi dan makanan yang terbuat dari gandum, sebaiknya dibatasi bagi para penderita diabetes. Sebagai gantinya dapat diberikan makanan yang memiliki pati resisten dan berindeks glikemik yang rendah.

Berdasarkan data dari *World Health Organization* (WHO), diabetes mellitus sudah menjadi epidemik atau penyakit yang mewabah di dunia. Diabetes merupakan ancaman kesehatan utama, dan sekitar 3,2 juta kematian diseluruh dunia setiap tahun berhubungan dengan diabetes. Indonesia menempati urutan keempat setelah India, China, dan Amerika Serikat dengan jumlah penderita diabetes terbanyak yakni hampir 8,5 juta orang.

Diabetes mellitus (DM) adalah gangguan metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemia yang berhubungan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak dan protein yang disebabkan oleh penurunan sekresi insulin atau penurunan sensitivitas insulin, atau keduanya dan menyebabkan komplikasi kronis mikrovaskular, makrovaskular dan neuropati (Yulinah, *et al.*, 2008: 26 ).Penderita diabetes mellitus memerlukan sumber energi yang berasal dari karbohidrat kompleks seperti ubi dan serat yang mengurangi kecepatan pelepasan gula ke dalam tubuh.

Salah satu tanaman yang berpotensi sebagai Pengganti makanan fungsional bagi penderita diabetes melitus adalah talas ungu (*Colocasia esculenta* Linn) dan talas jepang (*Colocasia esculenta* Var *Antiquorum*). Talas ungu dan talas jepang ini mengandung kalsium oksalat, serat, mineral, vitamin A, B,C, flavanoid, apigenin, dan atosianin serta memiliki fungsi sebagai antioksidan dan antidiabetes. Pada penelitian sebelumnya (Reski Amalia, 2013) telah dilakukan penelitian tentang uji aktivitas antioksidan ekstrak metanol umbi talas jepang (*Colocasia Esculenta* Var *Antiquorum*) sehingga diketahui bahwa umbi talas jepang memiliki aktivitas antioksidan. Selain itu laporan terdahulu mengemukakan bahwa umbi *Colocasia*

*esculenta L* memiliki aktivitas  $\alpha$ -amilase inhibitor sehingga kemungkinan dapat dijadikan antidiabetes. (Mc.Ewan *et al*, 2010: 224).

Talas ungu (*Colocasia esculenta L*) adalah tanaman yang sudah lama dikenal oleh masyarakat selain dikonsumsi talas ungu ini juga digunakan sebagai tanaman obat seperti asma, artritis, diare, perdarahan, gangguan neurologis, gangguan kulit, jus dari umbi talas ini telah digunakan untuk pengobatan sakit badan, kebotakan, antiinflamasi dan antidiabetes. Sedangkan talas jepang (*Colocasia esculenta Var Antiquorum*) adalah satu tanaman yang masih belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, namun demikian di beberapa daerah seperti kabupaten Bantaeng, menjadikannya sebagai salah satu tanaman komoditi ekspor non migas. Kendati hanya dikenal dan dijadikan sebagai tanaman ekspor, masyarakat setempat kurang mengkonsumsinya karena tidak mengetahui kandungan dan manfaat talas ini yang ternyata dapat dijadikan makanan diet kaya serat yang dapat mencegah penyakit kanker usus dengan kemampuannya mengikat mutagen yang bersifat karsinogenik (Fergusson LR:1992).

Dari penelusuran literatur, sedikit sekali diperoleh informasi ilmiah tentang talas ungu (*Colocasia esculenta L*) dan talas jepang (*Colocasia Esculenta Var Antiquorum*), padahal secara tradisional telah digunakan sebagai bahan obat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui nilai indeks glikemik dari umbi talas ungu (*Colocasia esculenta L*) dan umbi talas jepang (*Colocasia Esculenta Var Antiquorum*) sebagai pengganti makanan fungsional bagi penderita Diabetes Melitus.

## ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana indeks glikemik dari umbi talas ungu (*Colocasia esculenta* L) dan umbi talas jepang (*Colocasia esculenta* var *antiquorum*) ?
2. Berapa nilai indeks glikemik dari umbi talas ungu (*Colocasia esculenta* L) dan umbi talas jepang (*Colocasia esculenta* var *antiquorum*) ?

## ***C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

### ***1. Defenisi Operasional***

Diabetes mellitus (DM) adalah gangguan metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemia yang berhubungan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan oleh penurunan sekresi insulin atau penurunan sensitivitas insulin, atau keduanya dan menyebabkan komplikasi kronis mikrovaskular, makrovaskular, dan neuropati (Yulinah, *et al.*, 2008: 26 ). Hiperglikemia adalah peningkatan glukosa secara abnormal di dalam darah (Yulinah, *et al.*, 2008). Gejala hiperglikemia yaitu kehilangan berat badan, gatal-gatal, mual, dan muntah (Widyati, 2011). Hiperglikemia yang muncul, menghadirkan proses *glucotoxicity* yang seringkali kemudian disertai *lipotoxicity*. Proses kerusakan tersebut telah mulai terjadi pada hiperglikemia ringan, pada tahap awal dari perjalanan penyakit diabetes atau bahkan pada pradiabetes sekalipun, akibat fluktuasi

kadar glukosa darah. Hiperglikemia pada DM2 jarang berdiri sendirian, hampir selalu didampingi oleh beberapa kelainan lain seperti hipertensi, dislipidemia, obesitas dan lain lain. Fenomena ini secara klinis dikenal sebagai sindroma resistensi insulin (Manaf, 2006). Oleh karena itu, Konsumsi makanan berkadar karbohidrat tinggi seperti nasi dan makanan yang terbuat dari gandum, sebaiknya dibatasi bagi para penderita diabetes. Sebagai gantinya dapat diberikan makanan yang memiliki nilai resisten dan berindeks glikemik yang rendah seperti umbi talas ungu dan talas jepang yang mengandung banyak senyawa kimia yang dihasilkan dari metabolisme sekunder seperti alkaloid, glikosida, saponin, minyak esensial, resin, gula, serat dan asam-asam organik yang dapat digunakan sebagai pengganti makanan fungsional.

## 2. Ruang lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah mengetahui indeks glikemik bahan alam umbi talas ungu dan umbi talas jepang pada mencit jantan (*Mus Musculus*) sebagai pengganti makanan fungsional.

### **D. Kajian Pustaka**

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa temuan hasil penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan, dan posisi dari penelitian ini, dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ika Puspita Sari, dkk pada tahun 2013 tentang indeks glikemik uwi, gadung dan talas yang diberikan pada tikus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indeks glikemik (IG) umbi-umbian yang diberikan secara oral pada tikus. Umbi yang diteliti antara lain, uwi (*Dioscorea*

*alata*), gadung (*Dioscorea hispida*) dan talas (*Colocasia esculenta*). Tikus dikelompokkan menjadi 9 kelompok masing-masing terdiri dari 4 ekor. Umbi diberikan dalam bentuk serbuk yang disuspensikan kedalam Na.CMC0,1% dengan dosis 2,5 g/kgBB, kontrol positif berupa glukosa pemberian oral 2,5g/kgBB. Dilakukan pengambilan sampel darah hewan uji pada jam ke 0 (sebelum pemberian senyawa uji atau kontrol), 0,5; 1 dan jam ke 2 setelah pemberian senyawa uji. Serum darah selanjutnya ditetapkan kadar glukosanya menggunakan GOD-PAP kit. Data berupa kadar glukosa darah hewan uji versus waktu dianalisis menjadi area under curve (AUC) kadar glukosa versus waktu (0-2 jam). Perhitungan IG dilakukan dengan membandingkan AUC (0-2 jam) senyawa uji terhadap AUC (0-2 jam) glukosa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga umbi yang diteliti memiliki nilai IG rendah (14-22) . Umbi lokal dapat dikembangkan sebagai sumber karbohidrat yang sehat.

Dalam jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Endang Lukitaningsih, dkk pada tahun 2012 tentang kajian glisemik indeks dan makronutrien dari umbi-umbian dalam upaya pencarian sumber pangan fungsional. Kandungan makronutrien dan kajian glisemik indeks dari umbi ganyong (*Canna edulis kerr*), walur (*Amorphophallus variabilis*), porang (*Amorphophallus oncophillus prain*), suweg (*Amorphophallus Campanulatus BI*) dan uwi (*Dioscorea alata L*). Telah dilakukan pada penelitian ini dan bertujuan untuk memberikan dasar ilmiah pemilihan pangan alternatif terutama bagi penderita diabetes dan obesitas. Pengukuran kandungan makronutrien meliputi kandungan karbohidrat mereduksi dan tidak mereduksi protein dan serat dilakukan mengacu pada metode AOAC (1990), sedangkan glisemik indeks ditetapkan secara in

vivo menggunakan hewan coba tikus wistar. Glisemik indeks sampel umbi-umbian seluruhnya lebih rendah dibandingkan indeks beras (72,8). Harga glisemik indeks sangat dipengaruhi oleh kandungan serat, Sedangkan pengaruh kandungan karbohidrat terhadap harga glisemik indeks tidak dapat diamati. Walur dan porang memiliki kandungan serat yang besar yaitu masing-masing 15,09% dan 11,27%, sedangkan harga glisemik indeks masing-masing sekitar 20,6 dan 16,9.

#### ***T. ujuan dan kegunaan***

##### **1. Tujuan penelitian**

- a. Mengetahui indeks glikemik dari umbi talas ungu (*Colocasia esculenta* L) dan umbi talas jepang(*Colocasia esculenta* Var *antiquorum*).
- b. Mengetahui berapa nilai indeks glikemik umbi talas ungu (*Colocasia esculenta* L) dan umbi talas jepang(*Colocasia esculenta* Var *antiquorum*).

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dalam bidang farmakologi mengenai tumbuhan obat yang terdapat di Indonesia khususnya tentang umbi talas ungu dan umbi talas jepang sebagai makanan yang dapat dikonsumsi bagi penderita diabetes melitus.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### **Uraian Tumbuhan Talas Ungu**

##### **1. Klasifikasi Talas Ungu**


Regnum	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Class	: Monocotyledoneae
Ordo	: Arecales
Family	: Araceae
Genus	: Colocasia
Spesies	: <i>Colocasia esculenta</i> L.(Anonim, 2010)

##### **2. Nama Daerah**

Taumu (Okinawa)( Balai Kota Kin, 1994 ), Ladi (Bone, Sulawesi Selatan), uwi cera' (Bantaeng, Sulawesi Selatan)

##### **3. Morfologi**

Taro (*Colocasia esculenta* L. Schott) merupakan tanaman yang akarnya beronggol dari keluarga *Araceae*. Yang paling sering dimakan dari bagian tanaman adalah umbi dan cormels, yang terbentuk di bawah tanah oleh penebalan pangkal batang. Tumbuh di daerah tropis dan sub-tropis (Simsek sebnem *et al*, 2014 :1).



Gambar 1 : 1. Tanaman talas secara utuh. 2. Umbi talas

Tanaman talas banyak mengandung asam perusai (asam biru atau HCN). Sistem perakaran serabut, liar dan pendek. Umbi dapat mencapai 4 kg atau lebih, berbentuk silinder atau bulat, berukuran 30 cm x 15 cm, berwarna coklat. Daunnya berbentuk perisai atau hati, lembaran daunnya 20-50 cm panjangnya, dengan tangkai mencapai 1 meter panjangnya, warna pelepah bermacam-macam. Perbungaannya terdiri atas tongkol, seludang dan tangkai.

#### 4. Kandungan Kimia


Tabel 1. Antioksidan aktif dari glikosida flavanoid isolat *Colocasia esculenta* ( Cheng-Ning leong, 2009 : 633)

Sample	SC <sub>50</sub> of DPPH radical scavenging activity (mM)	Inhibitory activity of β-carotene bleaching at 1 mM (%)	IC <sub>50</sub> of superoxide radical inhibition activity (mM)
l(+)-Ascorbic acid	–	–	>0.5
Trolox	0.104	–	–
α-Tocopherol	–	81.8	–
Schaftoside	>0.4	18.4	>0.5
Isoschaftoside	>0.4	11.1	>0.5
Orientin	0.038	17.6	0.171
Isovitexin	0.325	3.3	>0.5
Isoorientin	0.031	17.0	0.067
Luteolin 7-O-sophoroside	0.032	52.0	0.037
Vitexin	0.129	2.6	>0.5

Talas mengandung banyak senyawa kimia yang dihasilkan dari metabolisme sekunder seperti alkaloid, glikosida, saponin, minyak esensial, resin, gula dan asam-asam organik. Umbi talas mengandung pati yang mudah dicerna kira-kira sebanyak 8,2 %, sukrosa serta gula reduksinya 1,42 % dan karbohidrat sebesar 23,7 %

### **Uraian Tumbuhan Talas Jepang**

#### **Klasifikasi Talas Jepang**



Regnum	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Class	: Monocotyledoneae
Ordo	: Arecales
Family	: Araceae
Genus	: Colocasia
Spesies	: <i>Colocasia esculenta var antiquorum</i>

#### **Nama Daerah**

Eunpue (Aceh), Keladi (Batak), Gelo (Jawa), Tales (Jawa), Tales (Bali), Ufi lole (Flores), Paco (Makassar), Aladi (Bugis), Bete (Maluku), Komo (Maluku). (Widyaningrum, 2011: 1087)

#### **Morfologi**

Habitus: semak, tinggi 1-1,5. Batang: semu, silindris, batang di dalam tanah membentuk umbi, lunak, coklat muda. Daun: tunggal, lonjong, tepi rata, ujung runcing, pangkal berlekuk, panjang 40-60 cm, lebar 20-30 cm, ltangkai silindris,

panjang 50-60 cm, hijau, pertulangan menyirip, permukaan halus, hijau. Bunga: tunggal, diketiak daun, kelopak lonjong, putih, benang sari dan putik bentuk gada, panjang 4-7 cm, kuning, tangkai silindris, panjang 20-30 cm, mahkota lonjong, satu helai, putih. Buah: buni, bulat, kuning. Biji: Bulat, kecil, beralur, hijau. Akar: serabut, putih kecoklatan. (Widyaningrum, 2011: 1087)

### ***C. Uraian Hewan Coba***

#### ***1. Taksonomi hewan uji***

Kingdom : Animalia  
Filum : Chordata  
Sub Filum : Vertebrata  
Kelas : Mammalia  
Subkelas : Theria  
Ordo : Rodentia  
Famili : Muridae  
Genus : Mus  
Spesies : *Mus musculus Linn.* (Arrington, 1972)



## **2. Karakteristik hewan uji**

- a. Hewan pengerat yang cepat berbiak, mudah dipelihara dalam jumlah banyak, variasi genetik cukup besar.
- b. Berat jantan dewasa 25 – 40 gram, berat betina dewasa 20 – 40 gram.
- c. Glukosa dalam darah 62 – 175 mg/dl
- d. Konsumsi makanan 5 g/25 g/hari
- e. Konsumsi air minum 6,7 ml/25 g/hari

Sifatnya :

- a. Mudah ditangani.
- b. Penakut.
- c. Cenderung berkumpul sesamanya.
- d. Bersembunyi.
- e. Fotofobik (takut cahaya).
- f. Lebih aktif pada malam hari daripada siang hari (Malole, 1989 : 94 - 100).

## **3. Morfologi**

Mencit (*Mus musculus*) adalah hewan pengerat (*Rodentia*) yang cepat berbiak, mudah dipelihara dalam jumlah banyak, variasi genetiknya cukup besar serta sifat anatomis dan fisiologisnya terkarakterisasi dengan baik (Malole, 1989).

## **D. Uraian Farmakologi**

### **1. Indeks Glikemik**

Indeks Glikemik (IG) merupakan gambaran tentang hubungan karbohidrat dalam makanan dengan kadar glukosa dalam darah. Pangan yang dapat menaikkan kadar glukosa darah dengan cepat biasanya memiliki indeks glikemik yang tinggi (Rimbawan & Siagian, 2004). IG juga digunakan untuk standarisasi respon glikemik terhadap adanya karbohidrat (sebagai contoh : gula dan pati) serta makanan yang kaya akan karbohidrat seperti beras, sayur-sayuran, buah-buahan dan produk coklat (Jenkins. dkk, 1984).

Karbohidrat adalah kelompok nutrien yang penting dalam susunan makanan sebagai sumber energi. Senyawa ini mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen dan dihasilkan tanaman melalui proses fotosintesis (Sherrington & Gaman 1992). Karbohidrat banyak terdapat dalam berbagai bahan makanan yang dikonsumsi, terutama pada bahan pangan yang banyak mengandung zat tepung atau pati dan gula. Bahan pangan yang umumnya dikonsumsi masyarakat Indonesia mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, yaitu sekitar 70% sampai 80%, terutama pada sereal (padi-padian) dan umbi-umbian (Kartasapoetra & Marsetyo 2008).

Untuk dapat menggantikan beras sebagai bahan makanan pokok, maka perlu dilakukan pengujian komponen makronutrien. Makronutrien merupakan nutrisi-nutrisi utama yang terdapat didalam produk makanan dalam jumlah yang relatif besar, seperti kandungan karbohidrat mereduksi dan non mereduksi, protein dan serat. Selain sebagai molekul tunggal, monosakarida juga berfungsi sebagai bahan dasar

dalam sintesis karbohidrat kompleks seperti pati atau amilum (Robinson, 1991). Amilum merupakan bentuk polimer karbohidrat yang banyak tersimpan pada bagian umbi dan rimpang dari tanaman. Amilum bersifat tidak larut dalam air dingin, tetapi larut dalam air panas membentuk cairan yang sangat pekat seperti pasta. Peristiwa ini disebut gelatinisasi. Dalam saluran pencernaan, gel dari amilum ini diduga dapat melapisi bagian mukosa dari lambung. Selain mampu memperlambat terjadinya proses difusi asam lambung, keberadaan gel juga meningkatkan pertahanan mukosa dengan cara mengikat senyawa pepsin (Isselbacher, dkk. 2000).

Menurut Waspadji *et al.* (2003), karbohidrat merupakan gugusan yang terdiri dari 2 unsur yaitu karbon dan hidrogen. Berdasarkan jumlah molekul gula sederhana pembentuknya, karbohidrat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Sedangkan gula sederhana umum pembentuk karbohidrat adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Secara tradisional karbohidrat digolongkan menurut struktur kimianya (sederhana dan kompleks). Bentuk karbohidrat sederhana dan kompleks tidak menjelaskan secara memadai bagaimana prosesnya di dalam tubuh. Karbohidrat dalam pangan yang dipecah dengan cepat selama pencernaan memiliki IG tinggi. Respon gula darah terhadap jenis pangan (karbohidrat) ini cepat dan tinggi. Artinya, glukosa dalam aliran darah meningkat dengan cepat. Sebaliknya, karbohidrat yang dipecah dengan lambat memiliki IG rendah (*slow release carbohydrate*) sehingga melepaskan glukosa ke dalam darah dengan lambat (Rimbawan & Siagian 2004).

Indeks glikemik adalah besaran yang membantu kita memperkirakan pengaruh fungsional dari makanan berkarbohidrat yang kita makan. Bagi orang yang menderita diabetes atau memiliki kecenderungan glukosa darah di atas normal, maka indeks glikemik membantu dalam memilih makanan dalam rangka mengendalikan glukosa darah. Memahami angka indeks glikemik tidak hanya penting bagi penderita diabetes tetapi juga bagi semua orang yang ingin meningkatkan derajat kesehatan. Mengonsumsi glukosa berlebihan berarti menerima asupan kalori berlebihan yang cenderung disimpan sebagai lemak tubuh sehingga dapat menyebabkan kelebihan berat badan yang merupakan faktor resiko berbagai penyakit karena gangguan metabolisme.

Pangan yang menaikkan kadar glukosa darah dengan cepat memiliki nilai indeks glikemik tinggi ( $>70$ ). IG dihitung dari kadar glukosa darah bahan dibandingkan dengan kadar glukosa darah setelah pemberian glukosa murni (IG glukosa murni adalah 100). Karbohidrat dengan kandungan IG tinggi menunjukkan bahwa karbohidrat tersebut mengalami pencernaan secara cepat dan absorpsi dalam saluran pencernaan dalam jumlah banyak sehingga tercermin dari kenaikan kadar glukosa darah secara mendadak diikuti oleh kenaikan insulin secara cepat (Campbell, 2010). Makanan digolongkan menjadi 3 kelas yaitu IG tinggi ( $IG > 70$ ), IG sedang ( $IG 70-56$ ) dan IG rendah ( $IG < 55$ ) (Campbell, 2010 ; foster-powel dkk, 2001).

Konsep indeks glikemik dikembangkan untuk memberikan klasifikasi numerik pangan sumber karbohidrat. Makanan yang memiliki nilai indeks glikemik rendah dapat meningkatkan rasa kenyang dan menunda rasa lapar, sedangkan

makanan yang memiliki nilai indeks glikemik tinggi mampu meningkatkan kadar glukosa darah dengan cepat (Aston 2006). Para ahli telah mempelajari faktor-faktor penyebab perbedaan indeks glikemik antara pangan yang satu dengan pangan yang lain.

#### **a. Faktor-faktor Indeks glikemik**

Faktor-faktor yang memengaruhi IG pada pangan antara lain adalah kadar serat, perbandingan amilosa dan amilopektin (Rimbawan dan Siagian 2004), daya cerna pati, kadar lemak dan protein, dan cara pengolahan (Ragnhild *et al.* 2004). Masing-masing komponen bahan pangan memberikan kontribusi dan saling berpengaruh hingga menghasilkan respons glikemik tertentu (Widowati 2009).

##### **1. Kadar Serat Pangan**

Serat pangan merupakan komponen utama penyusun dinding sel tanaman seperti pada buah-buahan, sayuran, sereal, dan aneka umbi. Komponen serat pangan meliputi polisakarida yang tidak dapat dicerna, seperti selulosa, hemiselulosa, oligosakarida, pektin, gum, dan waxes (Englyst dan Cummings 1985; Sardesai 2003; Astawan dan Wresdiyati 2004; Marsono 2004). Keberadaan serat pangan dapat memengaruhi kadar glukosa darah (Fernandes *et al.* 2005). Secara umum, kandungan serat pangan yang tinggi berkontribusi pada nilai IG yang rendah (Trinidad *et al.* 2010). Dalam bentuk utuh, serat dapat bertindak sebagai penghambat fisik pada pencernaan. Serat dapat memperlambat laju makanan pada saluran pencernaan dan menghambat aktivitas enzim sehingga proses pencernaan khususnya pati menjadi

lambat dan respons glukosa darah pun akan lebih rendah. Dengan demikian IGnya cenderung lebih rendah.

Peran serat pangan dalam membantu menurunkan nilai IG diduga berkaitan dengan fungsi fisiologis dari komponen-komponennya. Komponen serat pangan dapat dikelompokkan menjadi serat larut dan tidak larut, atau terfermentasi dan tidak terfermentasi. Serat pangan tidak larut diartikan sebagai serat pangan yang tidak dapat larut dalam air panas maupun air dingin (Muchtadi 2001).

Fungsi utama serat pangan tidak larut yaitu mencegah penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Selulosa dan hemiselulosa merupakan serat pangan tidak larut dan bersifat kaku sehingga berperan dalam pembentukan struktur buah (keragaan fisik buah). Tekstur buah yang lunak dan berjus tinggi cenderung mudah dikunyah, memiliki dinding sel yang tipis dan mudah pecah serta konsentrasi padatan terlarut (osmolality) yang rendah, sehingga mempermudah terlepasnya gula dari sel dan meningkatkan penyerapan (Hoerudin 2012). Dengan demikian, struktur makanan dapat memengaruhi nilai IG. Fungsi serat pangan larut terutama adalah memperlambat pencernaan di dalam usus, memberikan rasakenyang lebih lama, dan memperlambat laju peningkatan glukosa darah sehingga insulin yang dibutuhkan untuk mentransfer glukosa ke dalam sel-sel tubuh dan mengubahnya menjadi energi semakin sedikit. Pektin merupakan salah satu contoh serat pangan yang larut dalam air dan menentukan viskositas serat pangan (Guevarra dan Panlasigui 2000). Oleh karena itu, fungsi serat pangan yang larut tersebut sangat dibutuhkan oleh penderita

DM karena dapat mereduksi absorpsi glukosa pada usus kecil (Prosky dan De Vries 1992; Sardesai 2003).

## 2. Kadar Amilosa dan Amilopektin

Granula pati terdiri atas dua fraksi, yakni amilosa dan amilopektin yang keduanya dapat dipisahkan dengan air panas. Amilosa disebut sebagai fraksi terlarut, sedangkan amilopektin sebagai fraksi tidak larut. Amilosa merupakan polimer rantai lurus glukosa yang dihubungkan oleh ikatan (1,4) glikosidik. Amilopektin merupakan polimer gula sederhana, bercabang dan struktur terbuka (BeMiller dan Whistler 1996). Amilopektin pada dasarnya mirip amilosa, namun memiliki ikatan (1,6) glikosidik pada titik percabangannya. Amilopektin bersifat lebih rapuh (amorphous) dibanding amilosa yang struktur kristalnya cukup dominan. Kandungan amilosa yang lebih tinggi menyebabkan pencernaan menjadi lebih lambat karena amilosa merupakan polimer glukosa yang memiliki struktur tidak bercabang (struktur lebih kristal dengan ikatan hidrogen yang lebih ekstensif). Amilosa juga mempunyai ikatan hidrogen yang lebih kuat dibandingkan dengan amilopektin, sehingga lebih sukar dihidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan (Behall dan Hallfrisch 2002). Struktur yang tidak bercabang ini membuat amilosa terikat lebih kuat sehingga sulit tergelatinisasi dan akibatnya sulit dicerna (Rimbawan dan Siagian 2004). Selain itu, amilosa mudah bergabung dan mengkristal sehingga mudah mengalami retrogradasi yang bersifat sulit untuk dicerna (Meyer 1973).

Amilosa sangat berperan pada proses gelatinisasi dan lebih menentukan karakteristik pasta pati. Kadaramilosa yang tinggi memberikan kontribusi yang

signifikan terhadap perubahan kekuatan ikatan hidrogen sehingga pati membutuhkan energi yang lebih besar untuk gelatinisasi. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa pangan yang memiliki proporsi amilosa lebih tinggi dibanding amilopektin memiliki nilai IG yang lebih rendah, begitu juga sebaliknya.

### 3. Daya Cerna Pati

Daya cerna pati adalah tingkat kemudahan suatu jenis pati untuk dihidrolisis oleh enzim pemecah pati menjadi unit unit yang lebih sederhana (Mercier dan Colonna 1988). Enzim pemecah pati dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu endoamilase dan eksoamilase. Enzim alfaamilase termasuk ke dalam golongan endoamilase yang bekerja memutus ikatan di dalam molekul amilosa dan amilopektin (Tjokroadikoesoemo 1986).

Proses pencernaan pati dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik (Tharanthan dan Mahadevamma 2003). Faktor intrinsik menyebabkan pati dicerna pada usus halus. Faktor intrinsik berkaitan erat dengan sifat alami pati, seperti ukuran granula, keberadaannya pada matrik pangan, serta jumlah dan ukuran pori pada permukaan pati. Ukuran granula pati berkaitan dengan luas penampang permukaan totalnya. Semakin kecil ukuran granula pati, semakin besar luas permukaan total granula pati tersebut. Dengan luas permukaan yang lebih besar, enzim pemecah pati memiliki area yang lebih luas untuk menghidrolisis pati menjadi glukosa. Semakin mudah enzim bekerja, semakin cepat pencernaan dan penyerapan karbohidrat pati.

Faktor ekstrinsik yang memengaruhi pencernaan pati antara lain adalah lamanya waktu pencernaan dalam lambung (transit time), aktivitas amilase pada usus, jumlah pati, dan keberadaan komponen pangan lainnya seperti zat antigizi. Faktor-faktor ekstrinsik tersebut saling berinteraksi sangat kompleks/rumit. Daya cerna pati yang rendah berarti hanya sedikit jumlah pati yang dapat dihidrolisis oleh enzim pencernaan dalam waktu tertentu. Dengan demikian, kadar glukosa dalam darah tidak mengalami kenaikan secara drastis sesaat setelah makanan tersebut dicerna dan dimetabolisme oleh tubuh.

#### 4. Kadar Lemak dan Protein

Lemak merupakan sumber energi bagi tubuh yang lebih efektif dari pada karbohidrat dan protein. Satu gram lemak menghasilkan 9 kkal energi, sedangkan karbohidrat dan protein hanya menghasilkan energi 4 kkal. Protein adalah sumber asam amino yang mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N. Fungsi utama protein adalah untuk membentuk jaringan baru dan mempertahankan jaringan yang telah ada. Protein juga berfungsi sebagai zat pengatur proses metabolisme tubuh.

Pangan dengan kadar lemak yang tinggi cenderung memperlambat laju pengosongan lambung, sehingga laju pencernaan makanan pada usus halus juga lambat. Sementara itu, kadar protein yang tinggi diduga merangsang sekresi insulin (Jenkins *et al.* 1981) sehingga glukosa dalam darah tidak berlebih dan terkendali. Oleh karena itu, pangan dengan kandungan lemak dan protein tinggi cenderung memiliki IG lebih rendah dibandingkan dengan pangan sejenis yang berkadar lemak dan protein rendah (Jenkins *et al.* 1981; Rimbawan dan Siagian 2004).

## 5. Cara Pengolahan

Salah satu faktor yang memengaruhi nilai IG suatu produk pangan adalah cara pengolahan, seperti pemanasan (pengkukusan, perebusan, penggorengan) dan penggilingan (penepungan) untuk memperkecil ukuran partikel. Cara pengolahan dapat mengubah sifat fisikokimia suatu bahan pangan seperti kadar lemak dan protein, daya cerna, serta ukuran pati maupun zat gizi lainnya. Pemanasan pati dengan air berlebihan mengakibatkan pati mengalami gelatinisasi dan perubahan struktur. Pemanasan kembali dan pendinginan pati yang telah mengalami gelatinisasi juga mengubah struktur pati lebih lanjut yang mengarah pada terbentuknya kristal baru yang tidak larut, berupa pati teretrogradasi, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan nilai IG (Haliza *et al.* 2006).

Salah satu faktor yang memengaruhi indeks glikemik pangan adalah cara pengolahan (tingkat gelatinisasi pati dan ukuran partikel). Menurut Jenkins *et al.* (2002), proses pemasakan atau pengolahan membuat karbohidrat lebih mudah dicerna sehingga dapat meningkatkan nilai indeks glikemik, meskipun beberapa metode pengolahan, seperti parboiling, dapat menurunkan nilai indeks glikemik (Larsen *et al.* 2000). Oleh karena itu, penelitian pada beberapa jenis pangan dengan pengolahan berbeda-beda sangat diperlukan terutama pada beberapa jenis pangan lokal yang merupakan sumber karbohidrat yang memiliki potensi untuk diversifikasi pangan dan sebagai pangan fungsional di Indonesia seperti jenis umbi-umbian yaitu umbi talas ungu dan umbi talas jepang.

Kandungan dasar glisemik indeks dalam makanan, sifat fisik dari amilum, kandungan gula, keasaman dan kandungan serat merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konversi karbohidrat menjadi glukosa (kalergis, dkk. 2005). Dengan dilakukannya diet makanan rendah glisemik indeks maka akan memberikan efek positif bagi kesehatan seperti menurunnya kebutuhan insulin (Augustin, et all. 2002).

Indeks glikemik seringkali memberikan hanya satu angka IG per jenis makanan, padahal variasi terhadap kondisi-kondisi makanan seperti kematangan, cara memasak, proses, lama penyimpanan dan sebagainya dapat membuat bahan makanan yang sama memiliki indeks glikemik aktual yang berbeda. Respon glikemik berbeda pada setiap orang dan bahkan pada orang yang sama pada hari yang berbeda, tergantung level glukosa darah, resistensi insulin, dan faktor-faktor lainnya. Kebanyakan nilai indeks glikemik tidak menunjukkan pengaruh terhadap level glukosa setelah dua jam. Beberapa penderita diabetes mengalami kenaikan level glukosa setelah empat jam.

## **2. Glukosa**

Di dalam darah terdapat zat glukosa, glukosa ini gunanya untuk dibakar agar mendapatkan kalori atau energi. Sebagian glukosa yang ada dalam darah adalah hasil penyerapan dari usus dan sebagian lagi dari hasil pemecahan simpanan energi dalam jaringan. Glukosa yang ada di usus bisa berasal dari glukosa yang kita makan atau bisa juga hasil pemecahan zat tepung yang kita makan dari nasi, ubi, jagung, kentang, roti atau dari yang lain (Naby1, 2009).

Glukosa, fruktosa dan galaktosa masuk melalui dinding usus halus kedalam aliran darah. Fruktosa dan galaktosa akan diubah dalam tubuh menjadi glukosa. Glukosa merupakan hasil akhir dari pencernaan dan diabsorpsi secara keseluruhan sebagai karbohidrat. Kadar glukosa dalam darah bervariasi dengan daya penyerapan, akan menjadi lebih tinggi setelah makan dan akan menjadi turun bila tidak ada makanan yang masuk selama beberapa jam. Glikogen dapat lewat dengan bebas keluar dan masuk ke dalam sel dimana glukosa dapat digunakan semata-mata sebagai sumber energi. Glukosa disimpan sebagai glikogen di dalam sel hati oleh insulin (suatu hormon yang disekresi oleh pankreas). Glikogen akan diubah kembali menjadi glukosa oleh aksi dari glukagon (hormon lain yang disekresi oleh pankreas) dan adrenalin yaitu suatu hormon yang disekresi oleh kelenjar adrenalin ( Jan Tambayong, 2001).

### **3. Hiperglikemik**

Hiperglikemia adalah peningkatan glukosa secara abnormal di dalam darah (Yulinah, *et al.*, 2008). Gejala hiperglikemia yaitu kehilangan berat badan, gatal-gatal, mual, dan muntah (Widyati, 2011). Hiperglikemia yang muncul, menghadirkan proses *glucotoxicity* yang seringkali kemudian disertai *lipotoxicity*. Proses kerusakan tersebut telah mulai terjadi pada hiperglikemia ringan, pada tahap awal dari perjalanan penyakit diabetes atau bahkan pada pradiabetes sekalipun, akibat fluktuasi kadar glukosa darah. Hiperglikemia pada DM2 jarang berdiri sendirian, hampir selalu didampingi oleh beberapa kelainan lain seperti hipertensi, dislipidemia, obese dan lain lain. Fenomena ini secara klinis dikenal sebagai sindroma resistensi insulin

(Manaf, 2006). Sudah dibuktikan bahwa hiperglikemia pada diabetes menimbulkan permasalahan derajat hiperglikemia yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu seiring perjalanan penyakit. Proses perburukan ini adalah dampak interaksi kedua faktor etiologi diabetes mellitus type 2 (DMT2) : faktor genetik dan faktor lingkungan. Hiperglikemia yang muncul, menghadirkan proses *glucotoxicity* yang seringkali kemudian disertai *lipotoxicity*. Proses kerusakan tersebut telah mulai terjadi pada hiperglikemia ringan, pada tahap-tahap awal dari perjalanan penyakit diabetes atau bahkan pada pradiabetes sekalipun, akibat fluktuasi kadar glukosa darah. Hiperglikemia pada DMT2 jarang berdiri sendirian, hampir selalu didampingi oleh beberapa kelainan lain seperti hipertensi, dislipidemia, obese dan lain lain. Fenomena ini secara klinis dikenal sebagai sindroma resistensi insulin (Manaf, 2006).

Ada dua bentuk kelainan yang dapat dipantau pada kerusakan sel beta akibat hiperglikemia kronis, yakni penurunan sekresi insulin dan penurunan ekspresi gen insulin ( *insulin gen expression* ). Hal ini setidaknya disebabkan tiga fenomena berbeda: 1. desensitisasi terhadap glukosa, 2. kelelahan ( *exhaustion* ) sel beta, dan 3. *glucose toxicity*. Diantara ketiganya, *glucose toxicity* merupakan efek paling serius karena meskipun terjadi secara bertahap namun bersifat *irreversible*. Bahkan ini dianggap merupakan lanjutan dari tahap *exhaustion* (Manaf, 2006).

Keadaan hiperglikemia akan meningkatkan produksi superoksida pada mitokondria yang berpotensi mengaktifasi *UCP-2* ( *uncoupling protein-2* ) yang memediasi pemborosan ATP menjadi bentuk panas. Hal inilah yang berakibat

menurunnya rasio ATP/ADP, sehingga proses stimulasi sekresi insulin glukosa menurun (Manaf, 2006).

Tidak dapat disangkal lagi, usaha terpenting dan paling rasional yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah glucotoxicity adalah menormalkan kadar glukosa darah seoptimal mungkin. Strategi untuk ini telah memiliki acuan baku, baik secara non farmakologis maupun farmakologis, dengan berbagai nilai tambah dan nilai kurang masing-masingnya. Hiperglikemia akut postprandial perlu mendapat perhatian disamping hiperglikemia kronis. Bahkan semenjak pradiabetes, fenomena *glucotoxicity* akibat lonjakan kadar glukosa plasma yang terjadi berulang-ulang setiap hari tersebut tampaknya sudah harus diatasi. Selanjutnya, pada stadium diabetes, masalah hiperglikemia postprandial menjadi sorotan, dianggap sebagai prediktor bagi berbagai komplikasi. Hasil penelitian mengenai ini cukup banyak dengan *outcome* pencegahan diabetes (*primary prevention*) maupun pencegahan komplikasi (*secondary prevention*). Diantara jenis obat yang sering dikemukakan dalam *primary prevention* adalah acarbose, metformin, glitazone dan golongan *glinide*. *Alpha glucosidase inhibitor* (*Acarbose*) bekerja menghalangi penyerapan glukosa disaluran cerna, berkhasiat dalam mencegah peningkatan glukosa darah berlebihan sehabis makan. Sedangkan metformin dan glitazone berkhasiat dalam menurunkan tingkat resistensi terhadap insulin. Metformin juga mempunyai khasiat dalam mencegah terjadinya kerusakan jaringan endotel dalam keadaan hiperglikemia. Khasiat ini diperoleh tidak saja oleh karena sifat anti hiperglikemia secara farmakologis, tapi juga

efek inhibisi terjadinya kerusakan sel endotel pembuluh darah. Golongan *glinide*, merangsang kerja pankreas memproduksi insulin secara lebih segera (Manaf, 2006).

#### 4. Diabetes Melitus

Diabetes mellitus adalah kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan oleh adanya peningkatan kadar glukosa darah akibat kekurangan insulin baik absolute maupun relative. Diabetes mellitus adalah suatu gangguan kronis yang khususnya menyangkut metabolisme hidrat arang (glukosa) (Tjay, *et al.*, 2003). Penyakit diabetes mellitus (DM) adalah suatu penyakit kelainan metabolisme terutama metabolisme karbohidrat dan lemak. Penyakit ini disebabkan karena pankreas tidak menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup efektif untuk menurunkan kadar glukosa darah. Diabetes sering diperparah dengan terjadinya stres oksidatif terutama bila kapasitas antioksidan endogen tidak cukup kuat untuk meredam serangan radikal bebas (Bartosikova, *et al.*, 2003).

Berbagai dampak negatif dapat ditimbulkan oleh tingginya kadar gula darah. Hiperglikemia dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan. Salah satu komponen penting tubuh yang dapat mengalami kerusakan adalah sel beta pankreas. Sel ini normalnya menghasilkan hormon insulin. Gangguan produksi hormon ini dapat menimbulkan kekacauan metabolisme gula dan lemak. Hiperglikemia kronis dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah, retina, ginjal dan saraf. Bukan hanya hiperglikemia kronis saja yang dapat menyebabkan kerusakan, namun juga hiperglikemia sesaat (Robertson, *et al.*, 2004). Hiperglikemia sesaat dapat menyebabkan perubahan yang permanen pada pembuluh darah. Penelitian ini

dilakukan pada kultur sel pembuluh darah manusia dan tikus yang non-diabetik. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa hiperglikemia sesaat memicu ekspresi permanen gen-gen penyebab *atherosclerosis* (penebalan dinding pembuluh darah) (El-Osta, *et al.*, 2008).

### **Gejala klinik**

Gejala hiperglikemia yaitu kehilangan berat badan, gatal-gatal, mual, dan muntah (Widyati, 2011). Hiperglikemia yang muncul, menghadirkan proses *glucotoxicity* yang seringkali kemudian disertai *lipotoxicity*.

Diabetes seringkali muncul tanpa gejala. Namun demikian ada beberapa gejala yang harus diwaspadai sebagai isyarat kemungkinan diabetes. Gejala tipikal yang sering dirasakan penderita diabetes antara lain poliuria (sering buang air kecil), polidipsia (sering haus) dan polifagia (banyak makan/mudah lapar). Selain itu sering pula muncul keluhan penglihatan kabur, koordinasi gerak anggota tubuh terganggu, kesemutan pada tangan atau kaki, timbul gatal-gatal yang seringkali sangat mengganggu (pruritus), dan berat badan menurun tanpa sebab yang jelas (Muchid, *et al.*, 2005 : 20).

Disamping naiknya kadar gula darah, gejala kencing manis bercirikan adanya gula dalam kemih (*glycosuria*) dan banyak berkemih karena glukosa yang diekskresikan mengikat banyak air. Akibatnya timbul rasa sangat haus, kehilangan energi dan turunnya berat badan serta rasa letih. Tubuh mulai membakar lemak untuk memenuhi kebutuhan energinya, yang disertai pembentukan zat-zat perombakan, antara lain aseton, asam hidroksibutirat dan diasetat, yang membuat darah menjadi

asam. Keadaan ini yang disebut ketoacidosis, amat berbahaya, karena akhirnya dapat menyebabkan kehilangan kesadaran (*coma diabeticum*). Nafas penderita yang sudah menjadi sangat kurus sering kali juga berbau aseton (Tjay, *et al.*, 2003 : 693).

## 1. Diagnosa Diabetes

Penggunaan metode untuk mendiagnosa diabetes didasarkan atas beragam tes kimia dari urin dan darah.

### a) Glukosa urin

Pengujian sederhana atau pengujian laboratorium kuantitatif yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menjelaskan jumlah glukosa yang lolos dalam urin. Pada umumnya glukosa tidak terdeteksi dalam urin pada manusia normal, namun pada penderita diabetes glukosa dalam urinnya akan terdeteksi.

### b) Glukosa darah puasa dan kadar insulin

Kadar normal glukosa darah puasa pada pagi hari adalah 80 sampai 100 mg/100 ml, dan 110 mg/100 ml dianggap lebih tinggi diatas normal. Kadar glukosa darah puasa yang diatas nilai ini sering diindikasikan diabetes melitus atau sedikit tanda resisten insulin. Pada diabetes tipe I, kadar plasma insulin sangat rendah atau tidak terdeteksi selama puasa dan bahkan setelah makan. Pada diabetes tipe II, konsentrasi glukosa darah lebih tinggi diatas normal dan selalu meningkat pada batas terbesar setelah pemberian glukosa selama uji toleransi glukosa.

### c) Uji toleransi glukosa

Secara normal glukosa yang diberikan kepada orang yang puasa sebanyak 1 gram/kg BB akan meningkatkan kadar glukosa dari 90 mg/100 ml sampai 120-140

mg/100 ml dan kembali pada keadaan normal sekitar 2 jam. Sedangkan pada penderita diabetes, kadar glukosa darah puasa hampir selalu di atas 110 mg/100 ml dan sering di atas 140 mg/100 ml.

Berdasarkan uji toleransi glukosa oral, penderita DM Tipe 2 dapat dibagi menjadi 4 kelompok:

1. Kelompok yang hasil uji toleransi glukosanya normal
2. Kelompok yang hasil uji toleransi glukosanya abnormal, disebut juga Diabetes Kimia (*Chemical Diabetes*)
3. Kelompok yang menunjukkan hiperglikemia puasa minimal (kadar glukosa plasma puasa < 140 mg/dl)
4. Kelompok yang menunjukkan hiperglikemia puasa tinggi (kadar glukosa plasma puasa > 140 mg/dl) (Muchid, *et al.*, 2005 : 17).

d) Nafas berbau aseton

Asam asetoasetik yang meningkat di dalam darah penderita diabetes dikonversi menjadi aseton. Hal ini berubah menjadi gas dan keluar melalui pernafasan. Akibatnya, seseorang dapat mendiagnosa diabetes tipe I hanya dengan mencium bau aseton pada nafas penderita.

**Tabel 2. Kriteria diagnostik gula darah (Muchid, *et al.*, 2005 : 21).**

	Glukosaplasma	Glukosa plasma 2 jam setelah makan
Normal	<100 mg/dL	<140 mg/dL
Pra diabetes	100 – 125 mg/dL	-

IFG atau IGT	-	140 – 199 mg/dL
Diabetes	>126 mg/Dl	>200 mg/dL

Keterangan :

IFG : *Impaired Fasting Glucose*

IGT : *Impaired Glucose Tolerance*

## 2. Jenis Diabetes Mellitus

### a. Diabetes mellitus tipe I

Diabetes mellitus tipe I, dulu disebut *insulin-dependent diabetes mellitus* (IDDM, "diabetes yang bergantung pada insulin"), atau diabetes anak-anak, dicirikan dengan hilangnya sel beta penghasil insulin pada pulau-pulau langerhans pankreas sehingga terjadi kekurangan insulin pada tubuh.

Diabetes tipe ini dapat diderita oleh anak-anak maupun orang dewasa. Sampai saat ini diabetes tipe I tidak dapat dicegah. Diet dan olahraga tidak bisa menyembuhkan ataupun mencegah diabetes tipe I. Kebanyakan penderita diabetes tipe I memiliki kesehatan dan berat badan yang baik saat penyakit ini mulai dideritanya. Selain itu, sensitivitas maupun respons tubuh terhadap insulin umumnya normal pada penderita diabetes tipe ini, terutama pada tahap awal. Penyebab terbanyak dari kehilangan sel beta pada diabetes tipe I adalah kesalahan reaksi autoimunitas yang menghancurkan sel beta pankreas. Reaksi autoimunitas tersebut dapat dipicu oleh adanya infeksi pada tubuh. Saat ini, diabetes tipe I hanya dapat diobati dengan menggunakan insulin, dengan pengawasan yang teliti terhadap tingkat

glukosa darah melalui alat monitor pengujian darah. Pengobatan dasar diabetes tipe I, bahkan untuk tahap paling awal sekalipun, adalah penggantian insulin. Tanpa insulin, ketosis dan diabetic ketoacidosis bisa menyebabkan koma bahkan bisa mengakibatkan kematian. Penekanan juga diberikan pada penyesuaian gaya hidup (diet dan olahraga). Terlepas dari pemberian injeksi pada umumnya, juga dimungkinkan pemberian insulin melalui pump, yang memungkinkan untuk pemberian masukan insulin 24 jam sehari pada tingkat dosis yang telah ditentukan, juga dimungkinkan pemberian dosis dari insulin yang dibutuhkan pada saat makan. Serta dimungkinkan juga untuk pemberian masukan insulin melalui *inhaled powder* (Maulana, 2008).

Perawatan diabetes tipe I harus berlanjut terus. Perawatan tidak akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas normal apabila kesadaran yang cukup, perawatan yang tepat, dan kedisiplinan dalam pemeriksaan dan pengobatan dijalankan. Tingkat glukosa rata-rata untuk pasien diabetes tipe I harus sedekat mungkin ke angka normal (80-120 mg/dl, 4-6 mmol/l). Beberapa dokter menyarankan sampai ke 140-150 mg/dl (7-7.5 mmol/l) untuk mereka yang bermasalah dengan angka yang lebih rendah. seperti *frequent hypoglycemic events*. Angka di atas 200 mg/dl (10 mmol/l) seringkali diikuti dengan rasa tidak nyaman dan buang air kecil yang terlalu sering sehingga menyebabkan dehidrasi. Angka di atas 300 mg/dl (15 mmol/l) biasanya membutuhkan perawatan secepatnya dan dapat mengarah ke ketoasidosis. Tingkat glukosa darah yang rendah, yang disebut hipoglikemia, dapat menyebabkan kejang atau seringnya kehilangan kesadaran (Maulana, 2008).

## **b. Diabetes mellitus tipe II**

Diabetes mellitus tipe II, dulu disebut *non-insulin-dependent diabetes mellitus* (NIDDM, "diabetes yang tidak bergantung pada insulin") terjadi karena kombinasi dari kecacatan dalam produksi insulin dan resistensi terhadap insulin atau berkurangnya sensitifitas terhadap insulin (adanya defekasi respon jaringan terhadap insulin) yang melibatkan reseptor insulin di membran sel.

Pada tahap awal abnormalitas yang paling utama adalah berkurangnya sensitifitas terhadap insulin, yang ditandai dengan meningkatnya kadar insulin di dalam darah. Pada tahap ini, hiperglikemia dapat diatasi dengan berbagai cara dan obat anti diabetes yang dapat meningkatkan sensitifitas terhadap insulin atau mengurangi produksi glukosa dari hepar, namun semakin parah penyakit, sekresi insulin pun semakin berkurang, dan terapi dengan insulin kadang dibutuhkan. Ada beberapa teori yang menyebutkan penyebab pasti dan mekanisme terjadinya resistensi ini, namun obesitas sentral diketahui sebagai faktor predisposisi terjadinya resistensi terhadap insulin, mungkin dalam kaitan dengan pengeluaran dari adipokines (suatu kelompok hormon) itu merusak toleransi glukosa. Kegemukan ditemukan kira-kira 90% dari pasien dunia yang didiagnosis menderita diabetes tipe II ini. Faktor lainnya bisa jadi karena faktor sejarah keluarga dan kehamilan, walaupun dalam dekade terakhirnya hal itu terus meningkat dan sudah mulai mempengaruhi remaja dan anak-anak (Maulana, 2008).

**Tabel 3. Perbedaan DM Tipe I dengan DM Tipe II (Muchid, *et al.*, 2005 : 17)**

	DM Tipe I	DM Tipe II
Mula muncul	Umumnya masa kanak-kanak dan remaja, walaupun ada juga pada masa dewasa < 40 tahun	Pada usia tua, umumnya > 40 tahun
Keadaan klinis saat diagnosis	Berat	Ringan
Kadar insulin darah	Rendah, tak ada	Cukup tinggi, normal
Berat badan	Biasanya kurus	Berat atau normal
Pengelolaan yang disarankan	Terapi insulin, diet, Olahraga	Diet, olahraga, hipoglikemik oral

### 3. Insulin

Insulin merupakan protein kecil yang mengandung 2 rantai polipeptida yang dihubungkan oleh ikatan disulfida. Disintesis sebagai protein prekursor (pro-insulin) yang mengalami pemisahan proteolitik untuk membentuk insulin dan peptida C, keduanya disekresi oleh sel  $\beta$  pankreas.

#### a. Sekresi insulin

Sekresi insulin diatur tidak hanya oleh kadar glukosa darah tetapi juga oleh hormon lain dan mediator autonomik. Sekresi insulin umumnya dipacu oleh ambilan glukosa darah yang tinggi dan difosforilasi dalam sel  $\beta$  pankreas. Kadar adenosin trifosfat (ATP) meningkatkan dan menghambat saluran  $K^+$ , menyebabkan

membran sel depolarisasi dan influx  $\text{Ca}^+$ , yang menyebabkan pulsasi eksositosis insulin. (Catatan: glukosa yang diberikan secara suntikan mempunyai efek lebih rendah terhadap sekresi insulin dari pada glukosa yang diberikan per-oral, karena pemberian glukosa per-oral merangsang produksi hormon pencernaan oleh usus, yang kemudian merangsang sekresi insulin oleh pankreas) (Mycek, *et al.*, 2001 : 261).

#### **b. Distribusi dan metabolisme insulin**

Insulin dalam darah beredar sebagai monomer, volume distribusinya hampir sama dengan volume cairan ekstra sel. Pada keadaan puasa sekresi insulin ke vena porta sekitar  $40 \mu\text{g}$  [ 1 unit (U)] per jam, untuk mencapai kadar 2-4 ng/ml (50-100  $\mu\text{U}/\text{mL}$ ) dalam sirkulasi portal dan disirkulasi perifer 0,5 ng/mL (12  $\mu\text{U}/\text{mL}$ ) atau sekitar 0,1 nM. Setelah makan, kadarnya dalam darah portal cepat meningkat tetapi peningkatannya di perifer sedikit lebih rendah. Tujuan terapi insulin untuk mencapai seperti keadaan di atas tetapi ini sukar dicapai dengan penyuntikan subkutan.

Pada orang normal dan pasien DM tanpa komplikasi, masa paruh insulin di plasma sekitar 5-6 menit, pada DM yang mempunyai antibodi antiinsulin nilai tersebut memanjang. Proinsulin masa paruhnya lebih panjang ( $\pm 17$  menit). Insulin dalam peredaran darah didistribusi ke seluruh tubuh melalui cairan ekstrasel.

Degradasinya terjadi di hepar, ginjal dan otak, dan sekitar 50% insulin di hepar akan dirusak dan tidak akan mencapai sirkulasi sistemik. Klirens peptide-C di hepar lebih rendah, karenanya masa paruhnya lebih panjang ( $\pm 30$  menit). Hormon ini mengalami filtrasi glomeruli dan reabsorpsi serta degradasi di tubuli ginjal.

### **c. Mekanisme kerja Insulin**

Organ target utama insulin dalam mengatur kadar glukosa adalah hepar, otot, dan adiposa. Peran utamanya a.l. uptake, utilisasi, dan penyimpanan nutrient di sel. Efek anabolik insulin meliputi stimulasi, utilisasi dan penyimpanan glukosa, asam amino, asam lemak intrasel, sedangkan proses katabolisme (pemecahan glikogen, lemak dan protein) dihambat. Semua efek ini dilakukan dengan stimulasi transport substrat dan ion ke dalam sel, menginduksi translokasi protein, mengaktifkan dan menonaktifkan enzim spesifik, merubah jumlah protein dengan mempengaruhi kecepatan transkripsi gen dan translasi mRNA spesifik.

### **d. Peran Insulin**

#### **1. Pengaturan kadar glukosa dalam darah**

Kadar glukosa darah sangat dipengaruhi fungsi hepar, pankreas, adenohipofisis, dan adrenal. Kecuali itu fungsi tiroid, kerja fisik, faktor imunologik dan genetik dapat berpengaruh pada kadar glukosa darah.

Peran insulin pada transport zat melalui membran.

Pada otot dan jaringan adipose, insulin memudahkan penyerapan berbagai zat melalui membran, termasuk glukosa dan monosakarida lain, serta asam amino, ion K, nukleosida, dan fosfat anorganik. Beberapa jaringan tubuh memberikan respon berbeda terhadap insulin. Hormon ini dibutuhkan untuk penyerapan glukosa pada otot skelet, otot polos, otot jantung, jaringan lemak, leukosit, lensa mata, humor akuosa dan hipofisis. Sedangkan penyerapan glukosa di otak (kecuali mungkin bagian hipotalamus), tubuli ginjal, mukosa intestinal, eritrosit, tidak dipengaruhi insulin. Jadi

insulin merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi mekanisme penyerapan zat melalui membran.

## 2. Pengaruh insulin pada enzim

Banyak enzim yang aktifitas perangsangan atau penghambatannya dipengaruhi oleh insulin. Enzim yang aktivitas perangsangannya dipengaruhi oleh insulin adalah enzim yang penting untuk proses glikolisis, yaitu glukokinase, enzim yang perlu untuk sintesis glikogen, juga diaktifkan oleh insulin. Enzim yang dihambat aktivitasnya oleh insulin ialah enzim yang penting untuk glukoneogenesis, yaitu glukosa-6-fosfatase, fruktosa-difosfatase, fosfoenolpiruvatkinase dan piruvatkarboksilase. Semua enzim tersebut berperan pada reaksi yang sebaliknya dari proses glikolisis (Ganiswarna, 1995 : 483 - 485 ).

### e. Farmakoterapi Insulin

#### 1. Terapi insulin

Untuk terapi, ada berbagai jenis sediaan insulin yang tersedia, yang terutama berbeda dalam hal mula kerja (onset) dan masa kerjanya (duration). Sediaan insulin untuk terapi dapat digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu :

- a. Insulin masa kerja singkat (*Short-acting Insulin*), disebut juga insulin reguler
- b. Insulin masa kerja sedang (*Intermediate-acting*)
- c. Insulin masa kerja sedang dengan mula kerja cepat
- d. Insulin masa kerja panjang (*Long-acting insulin*)

Respon individual terhadap terapi insulin cukup beragam, oleh sebab itu jenis sediaan insulin mana yang diberikan kepada seorang penderita dan berapa frekuensi penyuntikannya ditentukan secara individual, bahkan seringkali memerlukan penyesuaian dosis terlebih dahulu.

Umumnya, pada tahap awal diberikan sediaan insulin dengan kerja sedang, kemudian ditambahkan insulin dengan kerja singkat untuk mengatasi hiperglikemia setelah makan. Insulin kerja singkat diberikan sebelum makan, sedangkan insulin kerja sedang umumnya diberikan satu atau dua kali sehari dalam bentuk suntikan subkutan. Namun, karena tidak mudah bagi penderita untuk mencampurnya sendiri, maka tersedia sediaan campuran tetap dari kedua jenis insulin regular (R) dan insulin kerja sedang (NPH).

## 2. Terapi antidiabetik oral

Ada 5 golongan antidiabetik oral (ADO) yang dapat digunakan untuk DM dan telah dipasarkan di Indonesia yakni golongan: sulfonilurea, meglitinid, biguanid, penghambat  $\alpha$ -glikosidase dan tiazolidinedion. Kelima golongan ini dapat diberikan pada DM tipe 2 yang tidak dapat dikontrol hanya dengan diet dan latihan fisik saja (Ganiswarna, 1995 : 489).

**Tabel 4. Beberapa golongan senyawa hipoglikemik oral beserta mekanisme kerjanya (Muchid, *et al.*, 2005 : 36)**

<b>Golongan</b>	<b>Contoh senyawa</b>	<b>Mekanisme Kerja</b>
Sulfonilurea	Gliburida/ Glibenklamida Glipizida Glikazida Glimepirida Glikuidon	Merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas, sehingga hanya efektif pada penderita diabetes yang sel-sel $\beta$ pankreasnya masih berfungsi dengan baik
Meglitinida	Repaglinide	Merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas
Biguanida	Metformin	Bekerja langsung pada hati (hepar), menurunkan produksi glukosa hati. Tidak merangsang sekresi insulin oleh kelenjar pankreas.
Tiazolidindion	Rosiglitazone Troglitazone Pioglitazone	Meningkatkan kepekaan tubuh terhadap insulin. Berikatan dengan PPAR $\gamma$ (peroxisome proliferasi aktivasi reseptor-gamma) di otot, jaringan lemak, dan hati untuk menurunkan resistensi insulin
Inhibitor $\alpha$ -Glukosidase	Acarbose Miglitol	Menghambat kerja enzim-enzim pencernaan yang mencerna karbohidrat, sehingga memperlambat absorpsi glukosa ke dalam darah

#### ***E. Tinjauan Islam Tentang Penelitian Tanaman Obat***

Sebagaimana Islam memperhatikan kesehatan, Islam juga memperhatikan pengobatan baik, yang bersifat kuratif maupun preventif. Dan Islam menentang pengobatan versi dukun dan para tukang sihir. Sebaliknya Islam sangat menghargai

bentuk-bentuk pengobatan yang didasari oleh ilmu pengetahuan, penelitian, eksperimen ilmiah dan hukum sebab-akibat.

Keanekaragaman tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan pengobatan, segala sesuatu yang diciptakan Allah swt memiliki fungsi sehingga dihamparkan di bumi. Salah satu fungsinya adalah bahan pengobatan. Hanya saja untuk mengetahui fungsi dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut.

Di dalam Firman Allah SWT di dalam QS.Al-Syu'arā/26: 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

*“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?”*

Dari ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Allah SWT senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk meneliti, mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas tentang obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun mineral. Dimana ketiganya telah dijelaskan didalam Al-Qur'an mengandung suatu zat atau obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan manusia dari penyakit. Meskipun tidak semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah SWT di bumi dapat menyembuhkan penyakit tertentu.

Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah banyak digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pengobatan maupun kecantikan. Dunia kedokteran juga banyak mempelajari obat tradisional dan hasilnya mendukung bahwa tumbuhan obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis yang bermanfaat bagi kesehatan, salah satu contoh tanaman yang dapat berkhasiat dalam pengobatan yaitu umbi talas ungu dan umbi talas jepang.

Penelitian-penelitian yang bertujuan untuk menemukan senyawa obat baru akan terus dilakukan. Hal ini didasari oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah ra. Dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda :

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عِلْمُهُ مَنْ عِلْمَهُ وَجَهْلُهُ مَنْ جَهْلُهُ

Artinya :

*"Dari Abu Hurairah Ra. Dari Nabi SAW. bersabda : Allah tidak akan menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya.(H.R. Al-Bukhari, VII).*

Hadis ini mengandung penegasan dan perintah bagi yang sakit untuk berobat serta penjelasan bahwa pengobatan adalah sebab kesembuhan, bahwa obat tidak lain hanyalah sebab yang diciptakan Allah SWT sebagai sarana untuk mendapatkan kesembuhan dan sebagai media ikhtiar demi mematuhi sunnatullah atau hukum alam yang berlaku.

Dewasa ini beragam cara yang digunakan masyarakat untuk berobat, dan salah satunya adalah dengan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan karena selain murah

juga efek samping yang ditimbulkan juga sangat jarang. Oleh karena itu, para peneliti mulai bermunculan untuk melakukan penelitian pada tumbuhan-tumbuhan yang berkhasiat obat. Apalagi mengingat negara Indonesia kaya akan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat.

Firman Allah swt dalam Q.S *al-Thaahā*/ 20: 53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ

Terjemahnya :

*-Yang Telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. (Departemen Agama RI 2004, 53).*

Ayat di atas menyatakan bahwa *Dia yang telah menjadikan bagi kamu sebagai hamparan* adalah isyarat bahwa keberadaan manusia dipentas bumi dalam rangka kehidupannya adalah bagian dari hidayah Allah. Firman-Nya : *menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan*, adalah isyarat tentang jalan-jalan yang ditempuh manusia di bumi guna meraih tujuannya, juga adalah bagian dari hidayah-Nya. Selanjutnya firman-Nya bahwa : *Dia menurunkan dari langit air, maka kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam* juga bagian dari hidayah-Nya kepada manusia dan binatang guna memanfaatkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan itu untuk kelanjutan hidupnya, sebagaimana terdapat

pula isyarat bahwa Dia memberi hidayah-Nya kepada langit guna menurunkan hujan, dan hidayah buat hujan agar turun tercurah, dan untuk tumbuh-tumbuhan agar tumbuh berkembang (Shihab, 2002: 317).

Berdasarkan ayat di atas diketahui bahwa Allah swt menciptakan aneka macam tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia. Salah satunya sampel ekstrak umbi talas ungu dan umbi talas jepang sebagai sampel yang dapat digunakan sebagai bahan dalam bidang pengobatan yang bermanfaat sebagai makanan yang dapat dikonsumsi bagi penderita Diabetes Melitus.

Dalam surat Al-Nahl ayat 11, Allah swt juga menjelaskan mengenai tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat bagi manusia.

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

*“Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur, talas ungu, talas jepang dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan”* (Departemen Agama RI 2004, 11).

Pada ayat di atas, Allah menjelaskan bahwa Dia yang telah menciptakan tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam bentuk, warna, sifat khusus, rasa dan bau. Tumbuh-tumbuhan tersebut dimanfaatkan untuk manusia dan hewan. Allah

menciptakan alam semesta beserta isinya tidak diciptakan dengan sia-sia akan tetapi memiliki fungsi masing – masing (Rossidy, 2008).

Dalam surat Al- Nahl/16: 114 Allah swt menjelaskan mengenai halal dan thayyib.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ



Terjemahnya :

“ Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu Hanya kepada-Nya saja menyembah.” (Departemen Agama RI 2004, 114).

Dimana dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah swt menyeruhkan kepada umatnya untuk mengkomsumsi zat-zat yang halal dan baik. Dimana halal merupakan sesuatu yang hukumnya boleh dan tidak terdapat larangan serta tayyib yang berarti baik, bermanfaat dan tidak menimbulkan keburukan (mudharat). Maka diharapkan manusia memanfaatkan tumbuhan sebagai media pengobatan yang bersifat halal dan tayyib.

Dari beberapa ayat dan hadist diatas dapat kita ketahui bersama bahwa Allah swt telah memperlihatkan kekuasaannya sebagai pencipta Alam dan seluruh isinya sehingga bagaimanapun kecerdasan manusia melakukan pengobatan dan rekayasa genetik belum mampu melewati ketentuan-ketentuan Sang Pencipta, sebab Allah swt yang mengetahui manusia dan apa yang ada di langit dan di bumi secara mendetail,

sehingga dengan ayat dan hadist ini sebagai seorang hamba yang mempelajari ilmu pengobatan agar senantiasa bersyukur dan tidak mengkufurinya serta mengharap ridho-Nya semoga apa yang telah diusahakan oleh manusia mampu menjadi obat yang dapat menyembuhkan manusia dengan izin dan kekuasaan Sang Pencipta sebab segala sesuatunya apa yang ada akan kembali kepada-Nya.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan lokasi penelitian***

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai indeks glikemik umbi talas ungu (*Colocasia esculenta* L) dan umbi talas jepang (*Colocasia Esculenta Var Antiquorum*).

Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

#### ***B. Pendekatan penelitian***

Sesuai dengan permasalahan dan uraian pada latar belakang, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

#### ***C. Alat dan bahan***

##### **1. Alat yang digunakan**

Alat yang digunakan antara lain: Alu, batang pengaduk, cawan porselin, glukometer (*easy touch*®), jarum oral, kompor listrik, lumpang, panci pengukus, spoit, timbangan analitik (*Presica*), Gelas kimia 250 ml (*Pyrex*®) dan labu ukur 100 ml (*Pyrex*®),

##### **2. Bahan yang digunakan**

Adapun bahan yang digunakan antara lain Air suling, kapas, larutan glukosa 2,5 g/kgBB, Na.CMC 0,1 %, umbi talas ungu (*Colocasia esculenta* L), umbi talas jepang (*Colocasia esculenta Var antiquorum*).

### 3. Pemilihan dan Penyiapan Hewan Uji

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit jantan (*Mus musculus*) yang sehat dengan bobot badan 20-30 g sebanyak 12 ekor dan dibagi dalam 4 kelompok, tiap kelompok terdiri atas 3 ekor.

### ***D. Metode Kerja***

#### 1. Pengambilan sampel

Umbi talas ungu di peroleh dari daerah Bantaeng Sulawesi Selatan dan umbi talas jepang diperoleh dari Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa timur. Umbi talas ungu dan umbi talas jepang yang digunakan adalah umbi talas umur 6-9 bulan yang sudah matang.

#### 2. Pengolahan sampel

##### a. Umbi talas ungu dan umbi talas jepang rebus

Umbi talas ungu dan umbi talas jepang dibersihkan dari kotoran yang melekat, kemudian dicuci bersih dan direbus hingga matang.

#### 3. Prosedur Uji Antihiperlikemia pada Mencit Jantan

##### b. Pembuatan Suspensi Na.CMC 0,1%

Ditimbang serbuk Na.CMC sebanyak 0,1 gr kemudian disuspensikan dalam air hangat ad 100 ml lalu dihomogenkan.

##### c. Pembuatan Larutan Glukosa 2,5 g/kgBB

Glukosa sebanyak 750 mg dimasukan ke dalam labu takar 100 ml dan ditambahkan dengan air suling sebanyak 10 ml. Kemudian, diaduk hingga larut lalu dicukupkan volumenya dengan air suling hingga 100 ml.

d. Pembuatan sampel umbi talas ungu dan umbi talas jepang 2,5 g/KgBB

Umbi talas ungu dan umbi talas jepang sebanyak 750 mg dimasukan ke dalam gelas kimia dan disuspensikan dengan Na.CMC 0,1 % sebanyak 100 ml.

e. Perlakuan Terhadap Hewan Uji

Sebelum diberi perlakuan, mencit diadaptasi terlebih dahulu selama seminggu serta diberi makan dan minum secara oral. Kemudian mencit dibagi menjadi 4 kelompok dengan 3 replikasi. Kelompok 1: pemberian kontrol negatif Na.CMC 0,1 %; Kelompok II: pemberian glukosa murni dosis 2,5g/kgBB; Kelompok III: Pemberian umbi talas ungu rebus dengan dosis 2,5 g/kgBB. Kelompok IV: Pemberian umbi talas Jepang rebus dengan dosis 2,5 g/kgBB.

4. Penentuan Indeks Glikemik


Pada pengujian indeks glikemik digunakan 12 ekor mencit yang dibagi dalam 4 kelompok. Sebelumnya hewan coba dipuasakan selama 8 jam kemudian dilakukan pengukuran kadar glukosa puasa. Selanjutnya mencit jantan diberi pangan uji yaitu talas ungu 2,5 g/kgBB, talas jepang 2,5 g/kgBB, Na. CMC 0,1% dan glukosa 2,5 g/kgBB. Kemudian diukur kadar glukosa darah pada jam ke-0, 45 menit, 90 menit dan 135 menit. Kadar glukosa darah (setiap waktu sampling) diplot pada dua sumbu yaitu sumbu waktu (X) dan sumbu kadar glukosa darah (Y). IG ditentukan dengan membandingkan luas daerah kurva antara pangan yang diukur IG-nya dengan pangan acuan dikalikan 100.

#### 5. Penentuan Kadar Glukosa Darah Mencit

Glukometer dikalibrasi dengan menggunakan kunci kode strip kemudian strip dipasang pada alat tersebut. Darah diambil melalui pembuluh darah vena pada ujung ekor mencit kemudian diteteskan pada strip glukometer dan kadar glukosa darah mencit akan terukur dan hasilnya dapat dibaca pada monitor glukometer.

#### 6. Pengolahan data dan Analisis data

Analisis dilakukan antara lain pengukuran kadar glukosa darah dan Pengolahan data dilakukan dengan analisis korelasi (grafik) dengan metode AUC (Area Under Curve).



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Masing-masing perlakuan kelompok diuji kadar glukosa darah mencit jantan (*Mus musculus*) dan diperoleh hasil seperti yang terdapat pada tabel

**Tabel 5. Hasil penelitian**

Perlakuan	Replikasi	Kadar glukosa darah (mg/dl)				IG AUC
		KGD0	KGD45 menit	KGD90 menit	KGD135 menit	
Glukosa 2,5 g/KgBB	1	83	101	134	162	100
	2	95	128	200	235	
	3	89	135	277	338	
Na.CMC 0,1% 0,5 ml	1	85	99	83	63	47
	2	89	70	68	60	
	3	82	73	86	79	
Talas ungu rebus 2,5 g/KgBB	1	86	77	50	36	20
	2	99	63	59	42	
	3	91	64	45	28	
Talas Jepang rebus 2,5 g/KgBB	1	81	64	55	45	43
	2	84	77	63	52	
	3	97	80	67	48	

## ***B. Pembahasan***

Indeks Glikemik (IG) merupakan gambaran tentang hubungan karbohidrat dalam makanan dengan kadar glukosa dalam darah. Pangan yang dapat menaikkan kadar glukosa darah dengan cepat biasanya memiliki indeks glikemik yang tinggi (Rimbawan & Siagian, 2004). IG juga digunakan untuk standarisasi respon glikemik terhadap adanya karbohidrat (sebagai contoh : gula dan pati) serta makanan yang kaya akan karbohidrat seperti beras, sayur-sayuran, buah-buahan dan produk coklat (Jenkins. dkk, 1984).

Indeks glikemik adalah besaran yang membantu kita memperkirakan pengaruh fungsional dari makanan berkarbohidrat yang kita makan. Bagi orang yang menderita diabetes atau memiliki kecenderungan glukosa darah di atas normal, maka indeks glikemik membantu dalam memilih makanan dalam rangka mengendalikan glukosa darah. Memahami angka indeks glikemik tidak hanya penting bagi penderita diabetes tetapi juga bagi semua orang yang ingin meningkatkan derajat kesehatan. Mengonsumsi glukosa berlebihan berarti menerima asupan kalori berlebihan yang cenderung disimpan sebagai lemak tubuh sehingga dapat menyebabkan kelebihan berat badan yang merupakan faktor resiko berbagai penyakit karena gangguan metabolisme.

Hiperglikemia adalah peningkatan glukosa secara abnormal di dalam darah (Yulinah, *et al.*, 2008). Gejala hiperglikemia yaitu kehilangan berat badan, gatal-gatal, mual, dan muntah (Widyati, 2011). Hiperglikemia yang muncul, menghadirkan proses *glucotoxicity* yang seringkali kemudian disertai *lipotoxicity*. Proses kerusakan

tersebut telah mulai terjadi pada hiperglikemia ringan, pada tahap-tahap awal dari perjalanan penyakit diabetes atau bahkan pada pradiabetes sekalipun, akibat fluktuasi kadar glukosa darah.

Berbagai dampak negatif dapat ditimbulkan oleh tingginya kadar gula darah. Hiperglikemia dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan. Salah satu komponen penting tubuh yang dapat mengalami kerusakan adalah sel beta pankreas. Gangguan produksi hormon ini dapat menimbulkan kekacauan metabolisme gula dan lemak. Hiperglikemia kronis dapat menyebabkan kerusakan pembuluh darah, retina, ginjal dan saraf. Bukan hanya hiperglikemia kronis saja yang dapat menyebabkan kerusakan, namun juga hiperglikemia sesaat (Robertson, *et al.*, 2004). Hiperglikemia sesaat dapat menyebabkan perubahan yang permanen pada pembuluh darah. Penelitian ini dilakukan pada kultur sel pembuluh darah manusia dan tikus yang non-diabetik. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa hiperglikemia sesaat memicu ekspresi permanen gen-gen penyebab *atherosclerosis* (penebalan dinding pembuluh darah) (El-Osta, *et al.*, 2008).

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Indeks glikemik umbi talas ungu (*Colocasia esculenta* L) dan Umbi talas Jepang (*Colocasia esculenta* Var *Antiquorum*). Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit jantan karena memiliki sistem hormonal yang lebih stabil dibanding mencit betina yang mana memiliki kadar glukosa darah lebih tinggi pada saat hamil sebab terjadi peningkatan hormon yang dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Selain itu

kebutuhan nutrisi pada saat hamil meningkat sehingga glukosa yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan pada saat tidak hamil sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian.

Pengujian indeks glikemik dalam penelitian ini menggunakan metode AUC (Area Under Curve) dan pengukuran kadar glukosa darah dengan glukometer yang menggunakan metode elektrokimia, yaitu berdasarkan pada pengukuran potensial (daya listrik) yang disebabkan oleh reaksi dari glukosa dengan bahan pereaksi glukosa pada elektroda strip. Sampel darah diserap masuk ke dalam ujung strip uji berdasarkan reaksi kapiler. Apabila darah mengisi ruangan reaksi pada strip uji, kalium ferisianida diuraikan dan glukosa sampel dioksidasi oleh enzim glukosa oxidase, menyebabkan penurunan bilangan oksidasi (kalium heksasianoferat (III) menjadi kalium heksasianoferat (II)). Aplikasi jumlah voltase yang konstan dari meteran mengoksidasi kalium heksasianoferat (II) kembali pada kalium heksasianoferat (III), dan memberikan elektron. Elektron yang dihasilkan untuk menimbulkan arus sebanding dengan kadar glukosa pada sampel. Setelah waktu 10 detik, konsentrasi glukosa dalam sampel ditayangkan pada layar monitor.

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah umbi talas ungu dan umbi talas jepang. Sebelum diberikan perlakuan, masing-masing mencit dipuasakan selama 8 jam. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya pengaruh makanan terhadap peningkatan kadar glukosa darah (hiperglikemia). Selain itu untuk memudahkan pemberian secara oral pada mencit, karena tanpa dipuasakan

sebelum perlakuan kemungkinan makanan atau obat yang diberikan akan dikeluarkan melalui mulut selama pemberian oral. Kemudian mencit dibagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 ekor mencit. Kelompok 1: pemberian kontrol negatif Na.CMC 0,1 % 0,5 ml; Kelompok II: pemberian glukosa murni dosis 2,5g/kgBB; Kelompok III: Pemberian umbi talas ungu rebus dengan dosis 2,5 g/kgBB. Kelompok IV: Pemberian umbi talas Jepang rebus dengan dosis 2,5 g/kgBB.

Pemberian glukosa dengan dosis 2,5 g/kgBB digunakan sebagai kontrol positif dalam penelitian ini karena sudah mampu menaikkan kadar glukosa darah dengan baik sehingga mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang penurunan kadar glukosa darah dibandingkan dengan pemberian Na.CMC 0,1 %, umbi talas ungu dan umbi talas jepang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil perhitungan IG glukosa menunjukkan 100 yang berarti glukosa termasuk bahan yang memiliki indeks glikemik tinggi sedangkan Na.CMC memiliki IG sedang sebesar 47, Umbi talas ungu memiliki IG sebesar 20 dan umbi talas jepang memiliki IG sebesar 43 yang menandakan bahwa umbi talas ungu dan umbi talas jepang memiliki indeks glikemik rendah. Menurut Okoniewsk dan witwer. (2007), pati resisten yang terkandung dalam umbi talas ungu dan umbi talas jepang merupakan pati resisten tipe 2 yang memiliki kecepatan absorpsi sangat lambat dan dicerna dalam jumlah yang sedikit. Contoh pati resisten tipe 2 banyak ditemukan pada akar umbi, umbi-umbian dan kacang-kacangan. Maka diperoleh data bahwa umbi talas ungu dan umbi talas jepang dapat memberikan efek anti hiperglikemia dan berindeks glikemik

sedang pada mencit yang diujikan sehingga dapat dikonsumsi bagi penderita Diabetes Melitus.

Mekanisme penurunan kadar glukosa darah pada umbi talas ungu dan umbi talas jepang yang memiliki indeks glikemik rendah yakni  $< 55$  ini bisa terjadi karena umbi talas jepang memiliki senyawa kimia flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan, antikanker, antimikrobia antidiabetes dan antiinflamasi. Flavonoid dapat menstimulir pemanfaatan glukosa perifer dengan cara meningkatkan jalur glikolitik dan glikogenik yang secara simultan menekan jalur glikogenolisis dan glukoneogenesis. Melalui mekanisme tersebut flavonoid dapat mengendalikan glukosa darah sehingga kadar glukosa darah pada mencit menurun sedangkan umbi talas ungu mengandung senyawa saponin, flavonoid dan senyawa fenolik yang berfungsi sebagai antiulkus peptikum serta mengandung zat antioksidan yang membantu tubuh menangkal radikal bebas yang dapat merusak sel-sel dalam tubuh sehingga melindungi tubuh dari berbagai penyakit termasuk kanker.

Umbi talas ungu dan umbi talas jepang memiliki kandungan karbohidrat dengan IG rendah ini menunjukkan bahwa karbohidrat tersebut mengalami pencernaan secara lambat dan absorpsi dalam saluran pencernaan dalam jumlah yang sedikit sehingga kadar glukosa darah disertai dengan kadar insulin menurun. Oleh karena itu, pemilihan umbi talas ungu untuk dikonsumsi bagi penderita diabetes melitus lebih baik karena memiliki indeks glikemik lebih rendah dibandingkan umbi talas jepang.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Umbi talas ungu memiliki nilai IG 20 dan umbi talas jepang memiliki nilai IG 43.
2. Umbi talas ungu dan umbi talas jepang berindeks glikemik rendah yang dapat memberikan efek penurunan kadar glukosa sehingga dapat dikonsumsi bagi penderita diabetes melitus.

#### ***B. Saran***

1. Disarankan untuk melakukan penelitian isolasi kandungan kimia Umbi talas ungu (*Colocasia esculenta* L) dan Umbi talas jepang (*Colocasia esculenta* Var *Antiquorum*).
2. Disarankan kepada masyarakat secara umum agar lebih menggiatkan penggunaan obat tradisional atau herbal serta dapat menanam tanaman-tanaman obat sebagai salah satu bentuk swamedikasi.

## BAB V

### PENUTUP

#### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

3. Umbi talas ungu memiliki nilai IG 20 dan umbi talas jepang memiliki nilai IG 43.
4. Umbi talas ungu dan umbi talas jepang berindeks glikemik rendah yang dapat memberikan efek penurunan kadar glukosa sehingga dapat dikonsumsi bagi penderita diabetes melitus.

#### **D. Saran**

3. Disarankan untuk melakukan penelitian isolasi kandungan kimia Umbi talas ungu (*Colocasia esculenta* L) dan Umbi talas jepang (*Colocasia esculenta* Var *Antiquorum*).
4. Disarankan kepada masyarakat secara umum agar lebih menggiatkan penggunaan obat tradisional atau herbal serta dapat menanam tanaman-tanaman obat sebagai salah satu bentuk swamedikasi.

## KEPUSTAKAAN


- Arrington, L. R., 1972. *Introductory Laboratory Animal Science. The Breeding, Care, and Management of Experimental Animals*. United States of America : The Interstate Printers and Publishers, Inc.
- Aston L. 2006. *Glycemic index and metabolic di-sease risk. MRC Collaborative Centre for Human Nutrition Research*, 65, 125—134.
- Augustin, L.S., Franchesci, S., Jemkin, . D.J.A., Kendall, C.W.C and vecchia, C.L, 2002, *Glycemic index in cronic disease: a review*, European J., clin, Natur., 56: 1049-1071
- Bartosikova, L., Necas J., Suchy V., et al., 2003. *Monitoring of antioxidative effect of morine in alloxan-induced diabetes mellitus in the laboratory*. Acta Vett, BRNO.
- Behall, K.M. and J. Hallfrisch. 2002. *Plasma glucose and insulin reduction after consumption of bread varying in amylose content*. Eur. J. Clin. Nutr.
- Burge, R.M. dan Duensing, W.J. 1989. *Processing and dietary fiber ingredient applications of combran*. Cereal Foods World, 34: 535-538.
- Campbell, B, 2010. *Glycemic load Vs Glycemic Index, Paper of National Strength & conditioning association 1-5*.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit JART, 2005 .
- Dhital, S., A.K. Shrestha, and M.J. Gidley. 2010. *Relationship between granule size and in vitro digestibility of maize an potato starches*. Carbohydrate Polymers
- El-Osta, A. *et al.*, 2008. *Transient High Glucose Causes Persistent Epigenetic Changes and Altered Gene Expression During Subsequent Normoglycemia. The Journal of Experimental Medicine Vol. 205, 2409-2417*.
- Fernandes, G.A. Velangi, and T.M.S. Wolever. 2005. *Glycemic index of potatoes commonly consumed in North America*. J. Am. Diet. Assoc.
- Foster-Powel, K., Holt, S.H.A & Brand-Miller, J.C., 2002, *International tables of Glycemic index and Glycemic load Value*, Am. J. Clin. Nutr.

- Guevarra, M.T.B. and L.N. Panlasigui. 2000. *Blood glucose responses of diabetes mellitus type II patients to some local fruits*. Asia Pacific J. Clin. Nutr.
- Haliza, W., E.Y. Purwani, dan S. Yuliani. 2006. *Evaluasi kadar pati tahan cerna dan nilai indeks glikemik mi sagu*.
- Hoerudin. 2012. *Indeks glikemik buah dan implikasinya dalam pengendalian kadar glukosa darah*. Buletin Teknologi Pascapanen Pertanian
- Inglett, G. E. 1987. *Kernel, structure, composition and quality. ed. Corn: Culture. Processing and Products*. Avi Publishing Company, Westport.
- Isselbacher., K.J., Braundwald., E. Wilson., J.D Martin ., J.B Fausi A.S dan Lasper D.L 2000, harrison, *Prinsip-prinsip dasar ilmu penyakit dalam*, penerbit buku kedokteran. Jakarta
- Jenkis, D.J.A.,T.M.S.& Jenkins, A.L.,1984, *The Glycemic Response to Carbohidrat Food, Lancet*.
- Kalergis, M.,Granpre, E.,D.&Anderson, C.,2005,*The Role Of The Glycemic Index In the Prevention and Management of Diabetes: A Review and discussion, canadian journal of Diabetes*
- Larsen HN, Rasmussen OW, Rasmussen PH, Alstrup KK, Biswas SK, Tetens I, Thilsted SH & Hermansen K. 2000. *Glycemic index of parboiled rice depends on the severity of processing: study in type 2 diabetic subjects. European Journal of Clinical Nutrition*, 54(5), 380—385.
- Malole, M. B. M dan Pramono, C. S. U., 1989. *Penggunaan Hewan-Hewan Percobaan Di Laboratorium*. Bogor: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Pusat Antar Universitas Bioteknologi. IPB.
- Manaf, Asman, 2006. Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Edisi. IV. Jakarta.*
- Marsono, Y. 2004. *Serat pangan dalam perspektif ilmu gizi*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Maulana, Mirza, 2008. *Mengenal Diabetes : Panduan Praktis Menangani Penyakit Kencing Manis*, KATAHATI, Jogjakarta.


- McEwan R, Madivha RP, Djarova T, Oyedeji OA, Opoku AR. *Alpha-amylase inhibitor of amadumbe (Colocasia esculenta): Isolation, purification and selectivity toward  $\alpha$ - amylases from various sources Afr J Bioch Res 2010. vol 4 (2), 220-224).*
- Mercier, C. and P. Colonna. 1988. *Starch and enzymes: Innovations in the products, process and uses.* Biofuture Chemic. p.
- Meyer, L.H. 1973. *Food Chemistry.* Affiliated East-West PVT. Ltd., New Delhi.
- Muchid, Abdul. *et al.*, 2005. "*Pharmaceutical Care Untuk Diabetes mellitus*". Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Direktorat Jenderal Bina Dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI Kefarmasian.
- Mycek, Mary J. *et al.*, 2001. *Farmakologi Ulasan Bergambar ,Ed. 2.* Jakarta: Widya Medika.
- Okoniewska M, witwear RS. 2007. Natural resistant starch: an overview of health properties a useful replacement for flour, resistant starch may also boost insulin sensitivity and satiety. Nutritional outlook
- Prosky, L. and J.W. de Vries. 1992. *Controlling Dietary Fiber in Food Product.* Van Nostrad Reinhold, New York
- Ragnhild, A.L., N.L. Asp, M. Axelsen, and A. Raben. 2004. *Glycemic index relevance for health, dietary recommendations, and nutritional labeling.* Scandinavian J. Nutr
- Ribonson, T. , 1991. *Kandungan organik tumbuhan tinggi,* penerbit ITB. Bandung
- Rimbawan & siagian, A., 2004. *Indeks glikemik pangan, cara mudah memiliki pangan yang menyehatkan,* penebar swadaya. Jakarta.
- Robert K. Murray, Daryl K. Granner & Victor W.Rodwell, 2009. *Biokimia Harper, Edisi 27.* Jakarta : EGC
- Robertson, R.P. *et al.*, 2004. *Chronic Oxidative Stress as a Central Mechanism for Glucose Toxicity of Pancreatic Islet Beta Cells in Diabetes. The Journal of Biological Chemistry, R400019200. Robertson, R.P. et al. (2004).  $\beta$ -Cell Glucose Toxicity, Lipotoxicity, and Chronic Oxidative Stress in Type 2 Diabetes. Diabetes Vol. 53, 119–124.*

- Rossidy, I. -Fenomena Flora dan Fauna dalam Perspektif Al-Qur'an. Malang: UIN Press, 2008.
- Shihab, Q. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol. 10*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2002.
- Suarni. 2009b. *Pemanfaatan jagung masak susu berbagai produk olahan mendukung pemenuhan pangan menunjang hidup sehat*. Prosiding Seminar Nasional BBP2TP. Palu. p. 175-182.
- Suharmiati, 2003. -*Pengujian Bioaktivitas Anti Diabetes Mellitus Tumbuhan Obat*". Cermin Dunia Kedokteran.
- Tjay, Tan Hoan dan Kirana Rahardja. 2003. *Obat-Obat Penting, Ed. V*. Jakarta; PT. Gramedia.
- Tjokroadikoesoemo, P.S. 1986. *HFS dan Industri Ubi Kayu Lainnya*. PT Gramedia, Jakarta.
- Tharanthan, R.N. and S. Mahadevamma. 2003. *Grain legumes, a boon to human nutrition*. Trends Food Sci. Technol.
- Trinidad, T.P., A.C. Mallillin, R.S. Sagum, and R.R. Encabo. 2010. *Glycemic index of commonly consumed carbohydrate foods in the Philippines*. J. Functional Foods.
- V. Ramanatha et al. *The Global Diversity Of Taro Ethnobotany And Conversation*. Bioversuty International: Italy. 2010
- Widowati, S., B.A.S. Santosa, M. Astawan, dan Akhyar. 2009. *Penurunan indeks glikemik berbagai varietas beras melalui proses pratanak*. Jurnal Pascapanen Pertanian.
- Widyati, 2011. *Diktat kuliah pharmaceutical care pada berbagai penyakit*, Jakarta.
- Wijaya, C.H. 2002. *Pangan fungsional dan kontribusinya bagi kesehatan*. Makalah ini disampaikan pada Seminar Online Kharisma ke-2, Dengan Tema: *Menjadi Ratu Dapur Profesional: Mengawal kesehatan keluarga melalui pemilihan dan pengolahan pangan yang tepat*, Jakarta
- Yulinah, Elin, et al., 2008, *ISO Farmakoterapi*, ISPI, Jakarta.

Lampiran 1. Skema kerja umbi talas ungu (*Colocasia esculenta* L) dan umbi talas jepang (*Colocasia esculenta* Var *Antiquorum*)



Lampiran 2. Skema pengujian Indeks Glikemik umbi talas ungu (*Colocasia esculenta* Linn) dan umbi talas Jepang (*Colocasia esculenta* Var *Antiquorum*) pada mencit (*Mus musculus*)



### Lampiran 3. Perhitungan Dosis

1. Perhitungan dosis pemberian glukosa
  - Dosis glukosa = 2,5 g/kgBB
  - Bobot normal mencit = 30 g = 0,03 Kg
  - Dosis untuk mencit 30 g = 2,5 g/kgBB x 0,03 Kg  
= 0,075 g  
= 75 mg / 1 ml
2. Perhitungan dosis Na.CMC
  - Dosis Na.CMC =  $\frac{0,1 \text{ g}}{100 \text{ ml}}$
3. Perhitungan dosis umbi talas ungu
  - Dosis Umbi Talas ungu = 2,5 g/kgBB
  - Bobot normal mencit = 30 g = 0,03 Kg
  - Dosis untuk mencit 30 g = 2,5 g/kgBB x 0,03 Kg  
= 0,075 g  
= 75 mg / 1 ml
4. Perhitungan dosis umbi talas jepang
  - Dosis Umbi Talas Jepang = 2,5 g/kgBB
  - Bobot normal mencit = 0,03 Kg
  - Dosis untuk mencit 30 g = 2,5 g/kgBB x 0,03 Kg  
= 0,075 g  
= 75 mg / 1 ml

Lampiran 4. Volume pemberian glukosa, Na.CMC, umbi talas ungu dan umbi talas jepang pada mencit

1. Volume pemberian glukosa

- Berat mencit 1 = 28 g

$$VP_1 = \frac{28}{30} \times 1 \text{ ml} = 0,9 \text{ ml}$$

- Berat mencit 2 = 27 g

$$VP_2 = \frac{27}{30} \times 1 \text{ ml} = 0,9 \text{ ml}$$

- Berat mencit 3 = 24 g

$$VP_3 = \frac{24}{30} \times 1 \text{ ml} = 0,8 \text{ ml}$$

2. Volume pemberian Na.CMC

- Berat mencit 1 = 28 g

$$VP_1 = \frac{28}{30} \times 1 \text{ ml} = 0,9 \text{ ml}$$

- Berat mencit 2 = 22 g

$$VP_2 = \frac{22}{30} \times 1 \text{ ml} = 0,7 \text{ ml}$$

- Berat mencit 3 = 30 g

$$VP_3 = \frac{30}{30} \times 1 \text{ ml} = 1 \text{ ml}$$

3. Volume pemberian umbi talas jepang

- Berat mencit 1 = 20 g

$$VP_1 = \frac{20}{30} \times 1 \text{ ml} = 0,6 \text{ ml}$$

- Berat mencit 2 = 24 g

$$VP_2 = \frac{24}{30} \times 1 \text{ ml} = 0,8 \text{ ml}$$

- Berat mencit 3 = 27 g

$$VP_3 = \frac{27}{30} \times 1 \text{ ml} = 0,9 \text{ ml}$$

4. Volume pemberian umbi talas ungu

- Berat mencit 1 = 21 g


$$VP_1 = \frac{21}{30} \times 1 \text{ ml} = 0,7 \text{ ml}$$

- Berat mencit 2 = 30 g

$$VP_2 = \frac{30}{30} \times 1 \text{ ml} = 1 \text{ ml}$$

- Berat mencit 3 = 30 g


$$VP_3 = \frac{30}{30} \times 1 \text{ ml} = 1 \text{ ml}$$



Tabel 6. Data kadar glukosa darah mencit yang diberi glukosa, Na.CMC, umbi talas ungu dan umbi talas jepang


Perlakuan	Replikasi	Kadar glukosa darah (mg/dl)			
		KGD0	KGD45	KGD90	KGD135
Glukosa 2,5 g/KgBB	1	83	101	134	162
	2	95	128	200	235
	3	89	135	277	338
	$\Sigma X$	267	364	611	735
	X	89	121,333	203,666	245
Na.CMC 0,1%	1	85	99	83	63
	2	89	70	68	60
	3	82	73	86	79
	$\Sigma X$	256	242	237	202
	X	85,333	80,666	79	67,333
Talas ungu 2,5 g/KgBB	1	86	77	50	36
	2	99	63	59	42
	3	91	64	45	28
	$\Sigma X$	276	204	154	106
	X	92	68	51,333	35,333
Talas jepang 2,5 g/KgBB	1	81	64	55	45
	2	84	77	63	52
	3	97	80	67	48
	$\Sigma X$	262	221	185	145
	X	87,333	73,666	61,666	48,333

Lampiran 5. Gambar kadar glukosa darah pemberian Na. CMC 0,1%, umbi talas ungu dan umbi talas jepang dosis 2,5 g/kgBB serta glukosa dosis 2,5 g/kgBB



Gambar 2. Grafik kadar Glukosa darah (mg/dl) lawan waktu (jam) setelah pemberian Na. CMC 0,1% Umbi talas ungu dan umbi talas jepang dosis 2,5 g/kgBB serta glukosa dosis 2,5 g/kgBB

Lampiran 6. Perhitungan AUC dan IG glukosa



$$L_I = \frac{\text{Sisi sejajar} + \text{sisi sejajar 2}}{2} \times \text{tinggi}$$

$$= \frac{89 + 121,333}{2} \times 45$$

$$= 4732,492$$

$$L_{II_2} = \frac{\text{sisi sejajar}}{2} \times \text{tinggi}$$

$$= \frac{121,333 + 203,666}{2} \times 45$$

$$= 7312,477$$

$$L_{III_2} = \frac{\text{sisi sejajar}}{2} \times \text{tinggi}$$

$$= \frac{203,666 + 245}{2} \times 45$$

$$= 10094,985$$

$$\text{AUC Glukosa} = L_I + L_{II} + L_{III}$$

$$= 4732,492 + 7312,477 + 10094,985$$


$$= 22139,954$$

$$\text{IG} = \frac{\text{AUC glukosa}}{\text{luas AUC glukosa murni}} \times 100$$

$$\text{IG glukosa} = \frac{22139,954}{22139,954} \times 100$$

$$= 100$$

Lampiran 7. Perhitungan AUC dan IG Na. CMC



$$\begin{aligned}
 \text{LI} &= \frac{\text{Sis ejaar} + \text{sisi sejajar 2}}{2} \times \text{tinggi} \\
 &= \frac{85,333 + 80,666}{2} \times 45 \\
 &= 3734,977
 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 \text{LII} &= \frac{\text{Sis ejaar} + \text{sisi sejajar 2}}{2} \times \text{tinggi} \\
 &= \frac{80,666 + 79}{2} \times 45 \\
 &= 3592,458
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{LIII} &= \frac{\text{Sis ejaar} + \text{sisi sejajar 2}}{2} \times \text{tinggi} \\
 &= \frac{79 + 67,333}{2} \times 45 \\
 &= 3292,492
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{AUC Na.CMC} &= \text{LI} + \text{LII} + \text{LIII} \\
 &= 3734,977 + 3592,458 + 3292,492 \\
 &= 10619,927
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{IG} &= \frac{\text{AUC}_{\text{Na.CMC}}}{\text{luasAUC}_{\text{glukosa normal}}} \times 100 \\
 \text{IG Na. CMC} &= \frac{10619,927}{22139,954} \times 100 \\
 &= 47,967
 \end{aligned}$$

Lampiran 8. Perhitungan AUC dan IG umbi talas ungu



$$L_I = \frac{\text{Sisi sejajar} + \text{sisi sejajar 2}}{2} \times \text{tinggi}$$

$$= \frac{92+68}{2} \times 45$$

$$= 3600$$

$$L_{II_2} = \frac{\text{sisi sejajar}}{2} \times \text{tinggi}$$

$$= \frac{68+51,333}{2} \times 45$$

$$= 2684,992$$

$$L_{III_2} = \frac{\text{sisi sejajar}}{2} \times \text{tinggi}$$

$$= \frac{51,333+35,333}{2} \times 45$$

$$= 1949,985$$

$$\text{AUC talas ungu} = L_I + L_{II} + L_{III}$$

$$= 3600 + 2684,992 + 1949,985$$


$$= 4638,577$$

$$\text{IG} = \frac{\text{luas AUC}}{\text{luas AUC normal}} \times 100$$

$$\text{IG talas ungu} = \frac{4638,577}{22139,954} \times 100$$

$$= \mathbf{20,951}$$

Lampiran 9. Perhitungan AUC dan IG umbi talas jepang



$$L_I = \frac{\text{Sisi sejajar} + \text{sisi sejajar 2}}{2} \times \text{tinggi}$$

$$= \frac{87,333 + 73,666}{2} \times 45$$

$$= 4154,985$$

$$L_{II_2} = \frac{\text{sisi sejajar}}{2} \times \text{tinggi}$$

$$= \frac{73,666 + 61,666}{2} \times 45$$

$$= 3044,97$$

$$L_{III_2} = \frac{\text{sisi sejajar}}{2} \times \text{tinggi}$$

$$= \frac{61,666 + 48,333}{2} \times 45$$

$$= 2474,977$$

$$\text{AUC talas jepang} = L_I + L_{II} + L_{III}$$

$$= 4154,985 + 3044,97 + 2474,977$$

$$= 9674,932$$

$$\text{IG} = \frac{\text{AUC}}{\text{luas area}} \times 100$$

$$\text{IG talas jepang} = \frac{9674,932}{22139,954} \times 100$$

$$= 43,699$$

Lampiran 10. Gambar tanaman umbi talas ungu dan umbi talas jepang

- a. Umbi talas ungu (*Colocasia esculenta* L)



Gambar 3. Umbi talas ungu (*Colocasia esculenta* L)

- b. Umbi talas jepang (*Colocasia esculenta* var *antiquorum*)



Gambar 4. Umbi talas jepang (*Colocasia esculenta* Var *Antiquorum*)

Lampiran 11. Hasil rebusan umbi talas ungu dan umbi talas jepang

- a. Umbi talas ungu (*Colocasia esculenta* L)



Gambar 5. Hasil rebusan umbi talas ungu (*Colocasia esculenta* L)

- b. Umbi talas jepang (*Colocasia esculenta* Var *antiquorum*)



Gambar 6. Hasil rebusan Umbi talas jepang (*Colocasia esculenta* Var *Antiquorum*)



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **PENULIS**

ANUGRAH AMALIYAH dilahirkan di Takalar 12 Desember 1993 merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan suami istri Abd Kadir R dan Masnaeni. Pendidikan formal yang telah dilalui yaitu menamatkan pendidikan sekolah dasarnya di SDN Inp Campagaya pada tahun 2005. Penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di sekolah menengah pertama di SMPN. 2 Takalar pada tahun 2005-2008. Kemudian menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Atasnya di SMAN. 1 Takalar pada tahun 2011. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi Sarjana-nya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tepatnya di jurusan Farmasi Fakultas Ilmu kesehatan.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anugrah Amaliyah  
NIM : 70100111009  
Tempat/TanggalLahir : Takalar 12 Desember 1993  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi  
Alamat : Samata  
Judul : Uji indeks glikemik umbi talas ungu (*Colocasia esculenta*  
*L*) dan umbi talas jepang (*Colocasia Esculenta Var*  
*Antiquorum*) Pada mencit Jantan (*Mus musculus*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Gowa, 27 Agustus 2015

Penyusun,



**ANUGRAH AMALIYAH**  
NIM. 70100111009

14. Kepada sahabat-sahabat tercinta (Amel, Dwi, Amrah, Dian, Mia, Icha, Indri, Mardia, Zaky, Utti dan Akbar) yang telah memberi banyak dukungan, semangat, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
15. Kepada kakak-kakak angkatan 2005-2010 dan adik-adik angkatan 2012-2014 Farmasi UIN Alauddin Makassar.
16. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu-persatu, terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan pada penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalammu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Gowa, 27 Agustus 2015  
Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A   
**ANUGRAH AMALIYAH**  
NIM. 70100111009

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji indeks glikemik umbi talas ungu (*Colocasia esculenta* L) Dan umbi talas jepang (*Colocasia Esculenta Var Antiquorum*) pada mencit jantan (*Mus musculus*)” yang disusun oleh Anugrah Amaliyah, NIM : 70100111009, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 M yang bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.


Gowa, 27 Agustus 2015 M  
12 Dzulqaidah 1436 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.	(.....)
Sekretaris	: Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing II	: Nurlina, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji I	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji II	: Drs. Wahyuddin G. M.Ag	(.....)

Diketahui oleh:

 Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar,

  
Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.  
NIP. 19550203 198312 1 001