

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN
PENYAKIT ISPA PADA ANAK BALITA
DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MANIPI
KEC.SINJAI BARAT KAB. SINJAI
TAHUN 2010**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat pada Prodi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Oleh :

IRSAN AHMAD
NIM.70200106009

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2010

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NE **IRSAN AHMAD**
ALAUDDIN NIM.70200106009
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu alaikum Wr.Wb

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah swt., karena atas limpahan berkah dan nikmat tak terhingga yang diberikan-Nya kepada kami, sehingga skripsi dengan judul “*Faktor-faktor Yang berhubungan Dengan Kejadian Penyakit ISPA pada Anak Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai tahun 2010*” telah dapat diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. sebagai *uswah hasanah*, yang telah berjuang untuk menyempurnakan akhlak seluruh manusia di atas bumi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya selama mengikuti perkuliahan di UIN Alauddin Makassar sampai penyusunan skripsi ini, diperoleh banyak bimbingan, bantuan dan arahan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis merasa patut menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berjasa, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, MA., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar .

2. Bapak dr. H. M. Furqa'an Naiem, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin yang telah banyak memberikan nasehat, petunjuk, bimbingan serta dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibunda A. Susilawaty, S.Si, M.Kes selaku ketua Prodi Kesehatan Masyarakat, yang telah banyak memberikan nasehat, petunjuk, bimbingan serta dorongan dalam menyelesaikan studi kami.
4. Bapak Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si (Pembantu dekan II) Fakultas ilmu Kesehatan yang telah banyak memberikan nasehat, masukan dan arahan kepada penulis.
5. Bapak DR. drg. Andi Zulkifli, MS dan Bapak M. Fais Satrianegara, SKM, MARS selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan serta kesempatan yang sangat berharga bagi penulis.
6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Kesehatan atas keikhlasannya mengajar kami di ruang kuliah, sehingga menambah wawasan keilmuan kami.
7. Teristimewa Kedua Orang Tua tercinta Ayahnda Drs. H Ahmad T dan Ibunda Suaebah T yang senangtiasa mengasuh, memberikan kasih sayang, motivasi, materi, doa serta dukungan yang tak ternilai harganya. Sehingga kami dapat menyelesaikan Pendidikan di Fakultas Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
8. Saudara tecinta Kakanda Rosdiana Ahmad S.HI dan Kakanda Haeruddin S.Pd.I serta adiknda tersayang Munawwarah Ahmad dan Tarmizi Ahmad beserta

keluarga yang senang tiasa memberikan motivasi, doa dan dukungannya kepada penulis.

9. Kepala Puskesmas Manipi ibu dr. Asnita Arif atas ijin penelitian.
10. Kanda Asrul SKM, serta Seluruh kader dan pegawai Puskesmas Manipi atas bantuan dan kerjasamanya dalam pelaksanaan Penelitian.
11. Kanda Asparuddin S.HI (Kades Ulu Saddang) dan seluruh keluarga besar Salimbongan Pinrang yang telah banyak mensupport penyusun.
12. Kepada seluruh teman seperjuangan terutama teman-teman jurusan Kesehatan Masyarakat (Tulla, Cino, Anwar dan Agiel Krew) dan Para teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan teman-teman lainnya yang tak sempat dituliskan namanya satu-persatu yang telah banyak memberikan perhatian, cinta, kasih, dan persaudaraan selama ini.
13. Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian dan penyelesaian skripsi ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Tiada imbalan yang dapat penulis berikan, hanya kepada Allah swt. penulis menyerahkan segalanya dengan penuh keikhlasan dan semoga segala amal bakti yang diberikan oleh semua pihak yang terkait dalam penyelesaian studi ini bernilai ibadah di sisi Allah swt. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Makassar, Agustus 2010

Penyusun,

ABSTRAK

Nama : Irsan Ahmad

NIM : 70200106009

Judul : Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Penyakit ISPA Pada Anak Balita di Wilayah kerja Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai tahun 2010.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan dengan kejadian Penyakit ISPA pada Anak balita di Wilayah kerja Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai tahun 2010. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian penyakit ISPA pada Anak balita di Wilayah kerja Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai tahun 2010.

Jenis penelitian ini adalah Survey analitik dengan pendekatan *Cross Sectional study*. Populasi dalam penelitian ini adalah Anak balita yang berkunjung ke Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai bulan Januari- Juni 2010. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Simple Random Sampling*/acak diperoleh 159 anak balita . Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1) Kuesioner, 2) Dokumen berupa KMS, 3) *Lembaran Observasi*. Teknis analisis data menggunakan statistik uji *chi-square*.

Berdasarkan analisis *chi-square* didapatkan bahwa ada hubungan antara Merokok dalam rumah dengan kejadian penyakit ISPA pada anak balita ($p = 0,010 < 0,05$) , ada hubungan antara Ventilasi dengan kejadian penyakit ISPA pada anak balita ($p = 0,000 < 0,05$), ada hubungan antara kamarisasi dengan kejadian penyakit ISPA pada anak balita ($p = 0,009 < 0,05$) dan tidak ada hubungan penggunaan jenis bahan bakar masak Biomass dan Kelengkapan Imunisasi dengan kejadian penyakit ISPA pada anak balita.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang diajukan adalah perlunya peningkatan perilaku hidup sehat seperti tidak merokok baik dalam lingkungan keluarga maupun bermasyarakat dan peningkatan kegiatan penyuluhan oleh petugas kesehatan kepada masyarakat mengenai syarat rumah sehat sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2009 sebagai penyempurnaan dari SKN sebelumnya merupakan bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama seluruh elemen bangsa dalam rangka untuk meningkatkan tercapainya pembangunan kesehatan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. (KepMenKes, RI, 2009).

Kesehatan mempunyai peranan besar dalam meningkatkan derajat hidup masyarakat, semua Negara berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya untuk memelihara, dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan perseorangan, kelompok ataupun masyarakat. Hal itu merupakan pula Visi Misi yang diwujudkan Indonesia Sehat 2010.

Di Indonesia penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan penyakit yang sering terjadi pada anak. Episode penyakit batuk pilek pada balita di Indonesia diperkirakan sebesar 3 sampai 6 kali per tahun. Ini berarti seorang balita rata-rata mendapat serangan batuk pilek sebanyak 3 sampai 6 kali setahun. Sebagai kelompok penyakit, ISPA juga merupakan salah satu penyebab utama kunjungan pasien di sarana kesehatan. Sebanyak 40 % - 60 % kunjungan berobat

di puskesmas dan 15 % - 30 % kunjungan berobat dibagian rawat jalan dan rawat inap rumah sakit disebabkan oleh ISPA (Dep.Kes.RI,2006:9-10).

World Health Organization (WHO) memperkirakan insidens Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di negara berkembang dengan angka kematian balita diatas 40 per 1000 kelahiran hidup adalah 15 % - 20 % pertahun. Menurut WHO \pm 13 juta anak balita di dunia meninggal setiap tahun dimana pneumonia merupakan salah satu penyebab utama kematian dengan membunuh \pm 4 juta anak balita setiap tahun ([http:// syair.wordpress.com/2009](http://syair.wordpress.com/2009))

Dari hasil Riskesda tahun 2007 prevalensi ISPA di Sulawesi Selatan tahun 2007 yaitu 22,9% dengan tertinggi di Kab.Tana Toraja (45,8%) dan terendah di Kab. Maros (9,6%), dari 23 kab./kota ada 10 kab./kota yang melebihi angka provinsi. Penyakit ISPA tertinggi pada balita dan terendah pada kelompok umur 15-24 tahun, menurut jenis kelamin tertinggi pada laki-laki, dan berada di pedesaan.

Sedangkan menurut data yang dikumpulkan melalui Profil Kesehatan Kab./Kota Tahun 2008, tercatat bahwa jumlah kasus pneumonia di Sulawesi Selatan sebanyak 34.000 penderita, dengan jumlah balita pneumonia sebanyak 7.181 balita dan yang tertangani seluruh jumlah balita yang pneumonia, sebanyak 7.181 (100%).

Adapun menurut dari data Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai barat kabupaten Sinjai tahun 2009. Diantara sepuluh pola peyakit terbanyak, kasus

penyakit ISPA berada di urutan pertama dengan jumlah kasus sebanyak 1.035 orang pada tahun 2009. Ini mengindikasikan bahwa kasus penyakit ISPA masih tinggi di daerah wilayah kerja Puskesmas Manipi.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa penyakit ISPA merupakan salah satu penyakit dengan angka kesakitan, dan angka kematian yang cukup tinggi, maka penyakit ISPA perlu penanganan yang terpadu, terarah yang ditujukan pada perbaikan mutu lingkungan atau keadaan perumahan serta penatalaksanaan penderita pada Puskesmas/ Rumah sakit. Dengan mengingat angka kesakitan dan angka kematian dari penyakit ISPA yang cukup tinggi sehingga dalam penanganannya diperlukan kesadaran yang lebih tinggi baik dari masyarakat maupun petugas, terutama faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Menurut HL Blum, faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan terdiri dari ; faktor lingkungan (Environment), faktor perilaku (behavior), faktor pelayanan kesehatan (health service) dan faktor keturunan (heredity).

Hal ini mendasari penulis (peneliti) untuk membatasi penelitian hanya melihat bagaimana hubungan antara merokok dalam rumah, ventilasi, kamarisasi, penggunaan bahan bakar biomass dan kelengkapan Imunisasi dengan kejadian Penyakit ISPA pada anak balita.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut, Apakah ada hubungan antara Merokok dalam rumah, Ventilasi, Kamarisasi, Penggunaan bahan bakar masak Biomass dan kelengkapan Imunisasi dengan kejadian Penyakit ISPA pada anak balita di wilayah kerja Puskesmas Manipi, Kec. Sinjai barat Kab. Sinjai tahun 2010.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian penyakit ISPA pada anak Balita di wilayah kerja Puskesmas Manipi Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai tahun 2010.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui hubungan antara Merokok dalam rumah dengan kejadian penyakit ISPA pada anak Balita di wilayah kerja Puskesmas Manipi Kec. Sinjai barat Kab. Sinjai tahun 2010 ?
- b. Mengetahui hubungan antara ventilasi dengan kejadian penyakit ISPA pada anak Balita di wilayah kerja Puskesmas Manipi Kec. Sinjai barat Kab. Sinjai tahun 2010 ?

- c. Mengetahui hubungan antara kamarisasi dengan kejadian penyakit ISPA pada anak Balita di wilayah kerja Puskesmas Manipi Kec. Sinjai barat Kab. Sinjai tahun 2010 ?
- d. Mengetahui hubungan antara Bahan bakar masak dengan kejadian penyakit ISPA pada anak Balita di wilayah kerja Puskesmas Manipi Kec. Sinjai barat Kab. Sinjai tahun 2010 ?
- e. Mengetahui hubungan antara kelengkapan Imunisasi dengan kejadian penyakit ISPA pada anak Balita di wilayah kerja Puskesmas Manipi Kec. Sinjai barat Kab. Sinjai tahun 2010 ?

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan mampu memperkaya ilmu pengetahuan mengenai Penyakit ISPA.

2. Manfaat Praktis


Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pelaksana atau penanggung jawab program kesehatan dalam perencanaan penanggulangan penyakit ISPA pada anak balita serta menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai dan Puskesmas yang bersangkutan.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Sebagai pengalaman yang berharga bagi peneliti dalam rangka memperluas wawasan pengetahuan mengenai Faktor-faktor yang berhubungan dengan Penyakit ISPA.

4. Manfaat bagi Institusi

Sebagai bahan referensi dan bahan bacaan yang diharapkan bermanfaat dalam menambah kanzah pengetahuan mahasiswa UIN Alauddin Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang ISPA

1. Pengertian ISPA

Istilah ISPA yang merupakan singkatan Infeksi Saluran Pernafasan Akut mulai diperkenalkan pada tahun 1984 setelah dibahas dalam Lokakarya Nasional ISPA di Cipanas. Istilah ini merupakan padanan istilah Inggris Accute Respiratory Infections disingkat ARI. Dalam lokakarya ISPA I tersebut ada dua pendapat, pendapat pertama memilih istilah ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) dan pendapat kedua memilih istilah ISNA (Infeksi Saluran Nafas Akut). Pada akhir lokakarya diputuskan untuk memilih ISPA dan istilah ini pula yang dipakai hingga sekarang (Indah, 2007).

Istilah ISPA mengandung tiga unsur, yaitu infeksi, saluran pernafasan dan akut. Pengertian atau batasan masing-masing unsur adalah sebagai berikut:

- 1) Infeksi adalah masuknya kuman atau mikroorganisme ke dalam tubuh manusia dan berkembang biak sehingga menimbulkan gejala penyakit.
- 2) Saluran pernafasan adalah organ yang mulai dari hidung hingga alveoli beserta organ adneksanya seperti sinus-sinus, rongga telinga tengah dan pleura. Dengan demikian ISPA secara otomatis mencakup saluran pernafasan bagian atas, saluran pernafasan bagian bawah (termasuk

jaringan paru-paru) dan organ adneksa saluran pernafasan. Dengan batasan ini maka jaringan paru-paru termasuk dalam saluran pernafasan (*respiratory tract*).

3) Infeksi akut adalah infeksi yang berlangsung sampai dengan 14 hari ini. Batas 14 hari ini diambil untuk menunjukkan proses akut meskipun untuk beberapa penyakit yang dapat digolongkan ISPA proses ini dapat berlangsung lebih dari 14 hari (Ahmadi,dkk, 2006).

Pneumonia adalah proses akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli). Terjadinya pneumonia pada anak seringkali bersamaan dengan terjadinya proses infeksi akut pada bronkus.

2. Etiologi Atau Penyebab ISPA

Etiologi ISPA terdiri lebih dari 300 jenis bakteri, virus dan riketsia. Bakteri penyebab ISPA antara lain adalah dari genus Streptokokus, Stafilokokus, Pneumokokus, Hemofillus, Bordetelia dan Korinebakterium. Virus penyebab ISPA antara lain adalah golongan Miksovirus, Adnovirus, Koronavirus, Pikornavirus, Mikoplasma, Herpesvirus dan lain-lain.

ISPA bagian atas umumnya disebabkan oleh Virus, sedangkan ISPA bagian bawah dapat disebabkan oleh bakteri, virus dan mycoplasma. ISPA bagian bawah yang disebabkan oleh bakteri umumnya mempunyai manifestasi klinis yang berat sehingga menimbulkan beberapa masalah dalam penanganannya.

Adapun Faktor lain dari pendukung penyebab terjadinya ISPA, yakni :

1. Kondisi Ekonomi

Keadaan ekonomi yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan berdampak peningkatan penduduk miskin disertai dengan kemampuannya menyediakan lingkungan pemukiman yang sehat mendorong peningkatan jumlah Balita yang rentan terhadap serangan berbagai penyakit menular termasuk ISPA. Pada akhirnya akan mendorong meningkatnya penyakit ISPA dan Pneumonia pada Balita.

1. Kependudukan

Jumlah penduduk yang besar mendorong peningkatan jumlah populasi Balita yang besar pula. Ditambah lagi dengan status kesehatan masyarakat yang masih rendah, akan menambah berat beban kegiatan pemberantasan penyakit ISPA.

3. Geografi

Sebagai daerah tropis, Indonesia memiliki potensi daerah endemis beberapa penyakit infeksi yang setiap saat dapat menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Pengaruh geografis dapat mendorong terjadinya peningkatan kasus maupun kejadian penderita akibat ISPA. Dengan demikian pendekatan

dalam pemberantasan ISPA perlu dilakukan dengan mengatasi semua faktor risiko dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.

4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

PHBS merupakan modal utama bagi pencegahan penyakit ISPA. Perilaku bersih dan sehat tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya dan tingkat pendidikan penduduk. Dengan makin meningkatnya tingkat pendidikan di masyarakat diperkirakan akan berpengaruh positif terhadap pemahaman masyarakat dalam menjaga kesehatan Balita agar tidak terkena penyakit ISPA yaitu melalui upaya memperhatikan rumah sehat dan lingkungan sehat.

5. Lingkungan dan Iklim Global

Pencemaran lingkungan seperti asap karena kebakaran hutan, gas buang sarana transportasi dan polusi udara dalam rumah merupakan ancaman kesehatan terutama penyakit ISPA. Demikian pula perubahan iklim global terutama suhu, kelembaban, curah hujan, merupakan beban ganda dalam pemberantasan penyakit ISPA.

ISPA dan Pneumonia sangat rentan terjadi pada bayi dan Balita. Daya tahan tubuh dan juga polusi menjadi faktor pendukung terjadinya ISPA, seperti contohnya ISPA bagian atas seperti Batuk dan Pilek yang umumnya terjadi karena ketahanan tubuh kurang. dr. Ina Aniati menghimbau kepada

masyarakat untuk menjaga ketahanan tubuhnya melalui konsumsi makanan bergizi dan melindungi diri dari bahaya polusi, dan bagi para orang tua yang memiliki Balita agar menghindarkan Balitanya dari asap rokok atau pun polusi berlebih.

Dalam kitab suci Al-Qur'an dijelaskan pula mengenai tentang pencemaran lingkungan yang mengakibatkan terjadinya polusi udara sehingga menimbulkan masalah kesehatan seperti penyakit ISPA, dan itu sebagian besar dari ulah tangan manusia sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahannya :

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Q.S Ar Ruum[30]: 41

3. *Klasifikasi ISPA*

Klasifikasi penyakit ISPA dibedakan untuk golongan umur di bawah 2 bulan dan untuk golongan umur 2 bulan-5 tahun.

a. Golongan Umur Kurang 2 Bulan

1. Pneumonia Berat

Bila disertai salah satu tanda tarikan kuat di dinding pada bagian bawah atau napas cepat. Batas napas cepat untuk golongan umur kurang 2 bulan yaitu 6x per menit atau lebih.

2. Bukan Pneumonia (batuk pilek biasa)

Bila tidak ditemukan tanda tarikan kuat dinding dada bagian bawah atau napas cepat.

“Tanda Bahaya” untuk golongan umur kurang 2 bulan, yaitu:

- 1) kurang bisa minum (kemampuan minumannya menurun sampai kurang dari $\frac{1}{2}$ volume yang biasa diminum)
- 2) kejang
- 3) kesadaran menurun
- 4) stridor
- 5) *wheezing*
- 6) demam/ dingin.

b. Golongan Umur 2 Bulan-5 Tahun

1. Pneumonia Berat

Bila disertai napas sesak yaitu adanya tarikan di dinding dada bagian bawah ke dalam pada waktu anak menarik nafas (pada saat diperiksa anak harus dalam keadaan tenang, tidak menangis atau meronta).

2. Pneumonia Sedang

Bila disertai napas cepat. Batas napas cepat ialah:

- 1) Untuk usia 2 bulan-12 bulan = 50 kali per menit atau lebih
- 2) Untuk usia 1-4 tahun = 40 kali per menit atau lebih.

3. Bukan Pneumonia

Bila tidak ditemukan tarikan dinding dada bagian bawah dan tidak ada napas cepat.

“Tanda Bahaya” untuk golongan umur 2 bulan-5 tahun yaitu:

- 1) tidak bisa minum
- 2) kejang
- 3) kesadaran menurun
- 4) stridor
- 5) gizi buruk (Depkes RI, 2005:5).

4. Gejala ISPA

a. Gejala dari ISPA Ringan

Seseorang anak dinyatakan menderita ISPA ringan jika ditemukan satu atau lebih gejala-gejala sebagai berikut:

- 1) Batuk
- 2) Serak, yaitu anak bersuara parau pada waktu mengeluarkan suara (misal pada waktu berbicara atau menangis).
- 3) Pilek, yaitu mengeluarkan lender atau ingus dari hidung.
- 4) Panas atau demam, suhu badan lebih dari 37°C atau jika dahi anak diraba.

b. Gejala dari ISPA Sedang

Seorang anak dinyatakan menderita ISPA sedang jika dijumpai gejala dari ISPA ringan disertai satu atau lebih gejala-gejala sebagai berikut:

- 1) Pernafasan lebih dari 50 kali per menit pada anak yang berumur kurang dari satu tahun atau lebih dari 40 kali per menit pada anak yang berumur satu tahun atau lebih. Cara menghitung pernafasan ialah dengan menghitung jumlah tarikan nafas dalam satu menit. Untuk menghitung dapat digunakan arloji.
- 2) Suhu lebih dari 39°C (diukur dengan termometer).
- 3) Tenggorokan berwarna merah.
- 4) Timbul bercak-bercak merah pada kulit menyerupai bercak campak.
- 5) Telinga sakit atau mengeluarkan nanah dari lubang telinga.
- 6) Pernafasan berbunyi seperti mengorok (mendengkur).
- 7) Pernafasan berbunyi menciut-ciut.

c. Gejala dari ISPA Berat

Seorang anak dinyatakan menderita ISPA berat jika dijumpai gejala-gejala ISPA ringan atau ISPA sedang disertai satu atau lebih gejala-gejala sebagai

berikut:

- 1) Bibir atau kulit membiru.
- 2) Lubang hidung kembang kempis (dengan cukup lebar) pada waktu bernafas.
- 3) Anak tidak sadar atau kesadaran menurun.
- 4) Pernafasan berbunyi seperti orang mengorok dan anak tampak gelisah.
- 5) Sela iga tertarik ke dalam pada waktu bernafas.
- 6) Nadi cepat lebih dari 160 kali per menit atau tidak teraba.
- 7) Tenggorokan berwarna merah.

5. *Penyebaran dan Penularan ISPA*

Pada ISPA dikenal tiga cara penularan Infeksi, yaitu :

1. Melalui aerosol yang lembut, terutama karena batuk.
2. Melalui aerosol yang lebih kasar, terjadi pada waktu batuk dan bersin.
3. Melalui kontak langsung/ tidak langsung dari benda yang telah dicemari jasad renik (hand to hand transmission).

Kuman penyakit ISPA ditularkan dari penderita ke orang lain melalui udara pernapasan atau percikan ludah penderita. Pada prinsipnya kuman ISPA yang ada di udara terhisap oleh pejamu baru dan masuk ke seluruh saluran pernafasan. Dari saluran pernafasan kuman menyebar ke seluruh tubuh apabila orang yang terinfeksi ini rentan, maka ia akan terkena ISPA (Depkes RI, 2006:6).

Allah SWT telah berfirman dalam kitab suci Al-qur'an yakni :

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾

Terjemahannya :

“Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang dikehendakinya”. Q.S Shaad /38:36

Ayat di atas menjelaskan bahwa Tuhan menghembuskan angin ke mana saja arah dan tujuannya, sehingga udara dapat menyegarkan lingkungan atau pun sebaliknya udara dapat tercemar. Itu merupakan kehendak Tuhan dan terdapat pelajaran bagi yang berfikir dan beriman kepadanya.

Adapun bentuk aerosol dari penyebab penyakit tersebut ada dua, yakni: droplet nuclei (sisa dari sekresi saluran pernapasan yang dikeluarkan dari tubuh secara droplet melayang diudara): dan dust (campuran dari bibit penyakit yang melayang di udara).

Pada infeksi virus , transmisi diawali dengan penyebaran virus ke daerah sekitar terutama melalui bahn sekresi hidung. Virus menyebabkan ISPA terdapat 10-100 kali lebih banyak di dalam mukosa faring. Dari beberapa penelitian klinik laboratorium dan penelitian lapangan, diperoleh kesimpulan bahwa sebenarnya kontak to hand (kontak dari benda yang telah dicemari jasad renik) merupakan modus terbesar bila dibandingkan dengan

aerogen (penularan virus secara tidak langsung melalui udara) yang semula diduga sebagai penyakit penyebab utama. (Mukti, 2006).

Secara umum terdapat tiga faktor resiko terjadinya ISPA yaitu Lingkungan, Faktor Individu, serta faktor perilaku.

6. Pencegahan dan pengobatan Penyakit ISPA

1. Mengusahakan agar anak mempunyai gizi yang baik.
 - a. Bayi harus diberi ASI selama 2 tahun.
 - b. Pemberian makanan pada anak disesuaikan umurnya.
 - c. Makanan yang bergizi tidak mesti yang mahal, yang penting mengandung unsure protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral.
 - d. Bayi dan balita secara teratur ditimbang.
2. Mengusahakan kekebalan anak dengan Imunisasi (BCG, DPT, Hepatitis B, Polio dan Campak)
3. Menjaga kebersihan Perorangan dan lingkungan
 - a) Tubuh anak harus selalu bersih
 - b) Lingkungan hidup harus selalu bersih dan sehat.
 - c) Aliran udara dalam rumah harus selalu cukup baik.
 - d) Asap tidak boleh berkumpul dalam rumah

Serta Pengobatan ISPA meliputi:

- a) Anak yang menderita ISPA harus diobati segera dan dirawat dengan baik untuk mencegah penyakit menjadi bertambah buruk.
- b) Memeriksa anak secara teratur ke Puskesmas.

- c) ISPA ringan (bukan pneumonia) tanpa pemberian antibiotic. Bila panas/demam diberikan paracetamol.
- d) ISPA sedang (pneumonia) diberikan kotromoksasol atau obat pengganti seperti amoksilin per oral, ampisilin per oral dan proakin penisilin suntikan.
- e) ISPA berat (pneumonia berat) dirawat di rumah sakit diberikan oksigen, tetapi dengan antibiotic berupa kloramfenikol suntikan atau oral, prokain penisilin, kotrimoksasol, ampisilin atau amoksilin. Untuk bayi kurang dari dua bulan diberikan prokain penisilin dan gentasimin suntikan.

Adapun dalil dalam Al-qur'an menjelaskan mengenai tentang obat penawar bagi seseorang yang terkena penyakit. Sesuai dengan Firman Allah SWT.

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ
 مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٦﴾

Terjemahan :

"Dan makanlah oleh kamu bermacam-macam sari buah-buahan, serta tempuhlah jalan-jalan yang telah digariskan tuhanmu dengan lancar. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam jenisnya dijadikan sebagai obat untuk manusia .Di alamnya terdapat tanda-tanda Kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau memikirkan". QS. An-Nahl[16]: 69

Dari ayat tersebut telah menjelaskan bahwa setiap penyakit ada obatnya, sebagai contoh minuman madu dapat berkhasiat bagi kesehatan manusia dan dapat menyembuhkan beberapa penyakit termasuk penyakit ISPA. Itu merupakan tanda keEsaan Tuhan bagi yang memahaminya.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Balita

Balita yaitu anak yang berusia dibawah 5 tahun merupakan generasi yang perlu mendapat perhatian disebabkan oleh beberapa hal :

1. Balita merupakan generasi dan modal dasar untuk kelangsungan hidup bangsa.
2. Balita amat Peka terhadap penyakit.
3. Tingka kematian balita masih tinggi.

Balita diharapkan tumbuh dan berkembang dalam keadaan sehat jasmani, social dan bukan hanya bebas dari penyakit dan kelemahan.

Masalah kesehatan balita merupakan masalah Nasional, mengingat angka kesakitan dan angka kematian pada balita masih cukup tinggi. Angka kesakitan mencerminkan keadaan yang sesungguhnya karena penyebab utamanya berhubungan erat dengan factor lingkungan (perumahan, kebersihan lingkungan, dan polusi udara), kemiskinan, kurang gizi, penyakit infeksi dan pelayanan kesehatan.

Pneumonia merupakan pembunuh utama anak dibawah usia lima tahun (Balita) di dunia, lebih banyak dibandingkan dengan penyakit lain seperti AIDS, Malaria dan Campak. Namun, belum banyak perhatian terhadap penyakit ini. Di dunia, dari 9 juta kematian Balita lebih dari 2 juta Balita meninggal setiap tahun akibat pneumonia atau sama dengan 4 Balita meninggal setiap menitnya. beberapa factor penyebab kematian maupun yang berperan dalam proses tumbuh kembangnya balita yaitu :

1. Diare
2. Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
3. Infeksi Saluran Pernapasan Akut.

Adapun dalil Al-qur'an yang menjelaskan tumbuh kembang anak bayi/balita sampai dewasa/tua. Dalam Al-qur'an surah: al-mu'min ayat: 67.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلِيَبْلُغُوا

أَجَلًا مُّسَمًّى وَعَلَّامٌ تَعْلَمُونَ ﴿٦٧﴾

Terjemahan :

“Dialah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkan kamu seorang anak/balita, kemudian (dibiarkan kamu hidup) supaya kamu sampai ke masa dewasa, kemudian kamu dibiarkan kamu hidup

sampai tua, diantara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu.(Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya”. Q.S : Al-Mu'min[40] : 67

Ayat di atas menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan seorang manusia melalui tahap mulai dari bayi/ balita sampai kita dewasa. Tetapi ada diantara sebagian manusia diwafatkan sebelum dewasa/ tua. Di sini penyebab utama sehingga mengakibatkan kematian seorang anak sebelum dewasa adalah factor kesehatan atau adanya penyakit seperti kasus ISPA pada anak balita yang banyak terjadi pada saat sekarang ini.

C. Tinjauan Umum Tentang Kebiasaan merokok dalam Rumah

Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang lazim ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Di mana-mana, mudah menemui orang merokok lelaki, wanita, anak remaja, orang tua, kaya dan miskin tidak ada terkecuali. Betapa merokok dapat merupakan bagian hidup masyarakat. Dari segi kesehatan, tidak ada satu titik yang menyetujui atau melihat manfaat. Namun tidak mudah untuk menurunkan atau menghilangkannya. Karena itu gaya hidup sangat menarik sebagai suatu masalah kesehatan, minimal dianggap sebagai factor resiko dari berbagai macam penyakit.

Rokok merupakan salah satu produksi industry dan komodity internasional yang mengandung sekitar sekitar 3.000 bahan kimiawi. Unsur-unsur yang penting antara lain : tar, nikotin, benzopyrinm, metal-kloride,

aseton, ammoniadan karbonmoksida. Diantara sekian banyak zat berbahaya ini, ada tiga yang paling penting, yaitu :

1. Tar, mengandung ratusan zat kimia yang kebanyakan bersifat karsiogenik.
2. Nikotin, merangsang pelepasan catecholamine yang biasa meningkatkan denyut jantung.
3. Karbonmonoksida, (CO), merupakan 1-5 % dari asap rokok. Zat ini unsur oksigen dalam darah (eritrosit) dan membentuk carboxyhaemoglobin. Seorang perokok mempunyai carboxyhaemoglobin lebih tinggi dari orang normal, sekitar 2-5 % pada orang normal carboxyhaemoglobin hanya sekitar 0,5-2 %.

Perokok Pasif mempunyai resiko dua kali lebih besar untuk mendapatkan serangan kanker paru-paru dan ISPA, dari pada yang merokok. Khusus bagi anak-anak dan anggota keluarga dari perokok lebih mudah dan lebih sering menderita gangguan pernapasan dibanding anak-anak dari anggota keluarga yang bukan perokok.

Khusus untuk melindungi bayi dan anak-anak yang terlepas asap rokok, perlu diusahakan untuk dijauhkan dari kepulan asap rokok, atau anggota keluarga yang perokok diberikan waktu dan ruangan sendiri.

Setelah melalui berbagai permusyawaratan yang alot, Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengeluarkan fatwa haram untuk mengonsumsi merokok khusus bagi wanita hamil, anak dan remaja yang masih dibawah usia dewasa serta praktisi MUI pada khususnya.

Keputusan yang mengundang ragam tanggapan pro dan kontra ini dikeluarkan setelah sidang pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III di aula Perguruan Diniyyah Puteri, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Minggu (25/1/2009) yang dihadiri sedikitnya sekitar 700 ulama se-Indonesia.

D. Tinjauan Umum Tentang Ventilasi

Ventilasi Adalah merupakan tempat di mana masuk dan keluarnya udara yang biasa dibuka dan ditutup tutup.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan, luas penghawaan atau ventilasi alamiah yang permanen minimal 10% dari luas lantai. Pertukaran hawa (ventilasi) yaitu proses penyediaan udara segar dan pengeluaran udara kotor secara alamiah atau mekanis harus cukup. Berdasarkan peraturan bangunan Nasional, lubang hawa suatu bangunan harus memenuhi aturan sebagai berikut (Aisyah,2009):

- 1) Luas bersih dari jendela/ lubang hawa sekurang-kurangnya 1/10 dari luas lantai ruangan.
- 2) Jendela/ lubang hawa harus meluas ke arah atas sampai setinggi minimal 1,95 m dari permukaan lantai.
- 3) Adanya lubang hawa yang berlokasi di bawah langit-langit sekurang-kurangnya 0,35% luas lantai yang bersangkutan (Mukono, 2000:156).

Ventilasi rumah mempunyai beberapa banyak fungsi, yakni:

Yang pertama adalah untuk menjaga agar aliran udara di dalam rumah tersebut tetap segar. Hal ini berarti keseimbangan O₂ yang diperlukan oleh penghuni rumah tersebut tetap terjaga. Kurangnya ventilasi akan menyebabkan kurangnya O₂ di dalam rumah yang berarti kadar CO₂ yang bersifat racun akan meningkat . Tidak cukupnya ventilasi juga akan menyebabkan kelembaban udara di dalam ruangan naik karena terjadinya proses penguapan cairan dari kulit dan penyerapan. Kelembaban ini akan merupakan media yang baik untuk bakteri-bakteri, patogen (bakteri-bakteri penyebab penyakit).

Fungsi kedua dari ventilasi adalah untuk membebaskan udara ruangan dari bakteri-bakteri, terutama bakteri patogen, karena terjadi aliran udara yang terus menerus. Fungsi lain adalah untuk menjaga agar ruangan rumah selalu tetap di dalam kelembaban yang optimum (Soekidjo Notoatmodjo, 1997:150).

E. Tinjauan Umum Tentang Kamarisasi

1. Pada bangunan rumah perlu diperhatikan mengenai peraturan pembagian ruangan (kamarisasi). Sehingga pada ruangan tersebut akan terbentuk ruangan yang menarik dan keharmonisan keluarga dalam suatu rumah dapat terjamin. Pengaturan rumah untuk tempat tinggal tergantung pada kondisi keluarga yang bersangkutan.

2. Kamarisasi

Rumah yang sempit/ padat hunian memungkinkan tidak tercukupi adanya kamarisasi bagi penghuninya, hal ini akan mengganggu bagi anggota keluarga dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sehingga dapat menimbulkan masalah sosial di masyarakat, status social dan lingkungan yang sangat berpengaruh kejadian ISPA. Bahwa tiap anggota keluarga yang mendekati dewasa harus mempunyai ruangan atau kamar sendiri sehingga privacinya tidak terganggu (Sanitas, 2004).

Tetapi secara umum pengaturan dan penataan ruangan dibagi atas ruang untuk istirahat atau ruang tidur, ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar mandi dan WC.

a. Ruang tidur

Ruang yang khusus mempunyai ruangan khusus untuk tidur. Ruang tidur biasanya digunakan sekaligus untuk ruangan ganti pakaian dan ditempatkan di tempat yang cukup tenang tidak gaduh, jauh dari

tempat bermain anak-anak. Diusahakan ruangan tidur ini mendapat sinar matahari.

Tabel 1
Perbandingan Jumlah Kamar tidur dan Penghuni dalam Kamar.

No.	Jumlah Kamar tidur	Jumlah Orang
1.	1	2
2.	2	3
3.	3	5
4.	4	7
5.	5	10

b. Ruang tamu

Ruang tamu yaitu suatu ruangan khusus biasanya tersendiri dan ditempatkan dibagian mudah dicapai oleh tamu yang datang dari luar oleh karena itu sebaiknya ruangan tamu di tempatkan dib again depan rumah.

c. Ruang makan

Ruangan makan sebaiknya mempunyai ruangan khusus, ruangan tersendiri, sehingga bila ada anggota keluarga yang sedang makan tidak akan terganggu untuk kegiatan anggota keluarga lainnya.

d. Ruangan dapur

Dapur harus mempunyai ruangan tersendiri, karena asap dari hasil pembakaran dapat membawa dampak negative terhadap kesehatan.

Ruang dapur ini ventilasi harus baik, udara atau asap dari dapur harus dapat teralirkan keluar (keluar bebas).

e. Kamar mandi dan WC

Lantai kamar mandi dan WC harus kedap air dan selalu terpelihara kebersihannya agar tidak licin. Dindingnya minimal 1,5 meter dari lantai.

Adapun syarat minimal rumah sehat tampak dalam table di bawah ini :

Tabel 2
Syarat Minimal Rumah Sederhana Yang Sehat

No	Ruangan	Lebar Minimum Netto (m)	Tinggi Minimum Netto (m)	Luas Minimum Netto (m)
1	Ruang tidur I	1,90	2,25	9,00
2	Ruang tidur II	-	-	9,00
3	Dapur	1,40	2,25	-
4	Kamar mandi + WC	-	1,90	6,00
5	Kamar mandi	0,90	-	1,50
6	WC/ Kakus	0,75	-	1,00

Sumber: Badan Pengembangan Kesehatan

Menurut Suharmadi 2004 untuk ukuran kamar tidur yang normal 8m^2 dengan tinggi langit-langit 2,75 m.

F. Tinjauan Umum Tentang bahan bakar Masak Biomass

Aktivitas manusia berperan dalam penyebaran partikel udara yang berbentuk partikel-partikel kecil padatan dan *droplet* cairan, misalnya dalam

bentuk asap dari proses pembakaran di dapur, terutama dari batu arang. Partikel dari pembakaran di dapur biasanya berukuran diameter di antara 1-10 mikron. Polutan partikel masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui sistem pernafasan, oleh karena itu pengaruh yang merugikan langsung terutama terjadi pada sistem pernafasan (Srikandi Fardiaz, 1992:137-138).

Jenis bahan bakar yang digunakan untuk memasak jelas akan mempengaruhi polusi asap dapur ke dalam rumah yang dapurnya menyatu dengan rumah dan jenis bahan bakar minyak relatif lebih kecil resiko menimbulkan asap dari pada kayu bakar.

Bahan pencemar yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar biomass, yang berbahaya bagi kesehatan antara lain :

1. Partikel

Partikel dalam asap pembakaran bahan bakar biomass mengandung unsure-unsur kimia , seperi Timbal (Pb), Besi (Fe), Mangan (Mn), Arsen (As) dan Cadmium (Cd). Partikel yang terhisap dapat menempel pada saluran pernapasan bagian atas masuk langsung ke paru-paru hal ini tergantung pada kandungan kimia dan ukurannya.

Paparan partikel dengan kadar tinggi akan menimbulkan edema pada trachea, bronchi, dan bronchioles beberapa logam seperti PB dan Cd, bersifat akumulatif, paparan yang berulang dan berlangsung dalam waktu lama akan menyebabkan terakumulasinya logam-logam tersebut dalam

alat pernapasan. Hal ini menimbulkan pengaruh yang bersifat kronis, yaitu terjadinya iritasi pada saluran napas sampai dengan timbulnya kanker paru.

2. Senyawa-senyawa hidrokarbon aromatic polisyklinik

Salah satu senyawa yang berbahaya terhadap kesehatan karena diketahui bersifat karsinogenik adalah benzo-a-pyrene.

3. Formaldehid (HCHO)

Paparan Formaldehid dapat mengakibatkan iritasi pada mata, hidung dan alat pernapasan bagian atas. Hal ini terjadi karena adanya reaksi ketika bahan pencemar bercampur dengan air mata atau lendir dalam saluran pernapasan.

4. Carbonmonoksida (CO)

Pengaruh akut inhalasi CO adalah berkurangnya persediaan Oksigen dalam tubuh, yang disebabkan oleh bergabungnya CO dalam darah dengan molekul Haemoglobin membentuk CO-Hb.

Apabila oksigen yang digantikan oleh CO terlalu banyak, jaringan tubuh akan kekurangan oksigen dan berhenti berfungsi pada akhirnya akan menimbulkan kematian.

5. Nitrogendioksida (NO₂)

Nitrogendioksida merupakan bahan pencemar udara yang paling banyak mempengaruhi kesehatan paru bagian dalam. Paparan NO₂ yang berlangsung lama dapat menambah kerentanan terhadap infeksi alat pernapasan oleh bakteri (pneumonia) atau virus (influenza).

6. Sulfur dioksida (SO₂)

Sulfur dioksida mempunyai sifat yang lebih mudah larut dalam air membentuk asam sulfat aerosol, yang dapat masuk ke dalam paru dan mengganggu fungsi paru.

Secara umum dalam keluarga ibu berperan dalam menyiapkan makanan . Anak-anak biasanya berada di dekat api atau berada di pangkuan ibunya ketika memasak. Tanpa disadari, mereka menghirup asap yang mengandung bahan pencemaran yang dapat membahayakan kesehatannya. Oleh karena itu wanita dan anak-anak adalah kelompok yang mempunyai resiko tinggi terhadap pencemaran yang berasal asap pembakaran bahan bakar biomass.

G. Tinjauan Umum Tentang Kelengkapan Imunisasi

Ada dua jenis imunisasi, yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif.

Pemberian imunisasi pada anak biasanya dilakukan dengan cara imunisasi aktif, karena imunisasi aktif akan memberi kekebalan yang lebih lama. Imunisasi pasif diberikan hanya dalam keadaan yang sangat mendesak, yaitu bila diduga tubuh anak belum mempunyai kekebalan ketika terinfeksi oleh kuman penyakit yang ganas.

Perbedaan yang penting antara jenis imunisasi aktif dan imunisasi pasif adalah:

1) untuk memperoleh kekebalan yang cukup, jumlah zat anti dalam tubuh harus meningkat; pada imunisasi aktif diperlukan waktu yang agak lebih lama untuk membuat zat anti itu dibandingkan dengan imunisasi pasif.

2) kekebalan yang terdapat pada imunisasi aktif bertahan lama (bertahun-tahun) sedangkan pada imunisasi pasif hanya berlangsung untuk beberapa bulan. Sesuai dengan program pemerintah (Departemen Kesehatan) tentang Program Pengembangan Imunisasi (FPI), maka anak diharuskan mendapat perlindungan terhadap 7 jenis penyakit utama, yaitu penyakit TBC (dengan pemberian vaksin BCG), difteria, tetanus, batuk rejan, poliomielitis, campak dan hepatitis B.

Imunisasi lain yang dianjurkan di Indonesia pada saat ini adalah terhadap penyakit gondong dan campak Jerman (dengan pemberian vaksin MMR), tifus, radang selaput otak oleh kuman *Haemophilus influenzae* tipe B (Hib), hepatitis A, cacar air dan rabies (dr. hendra cipto, 2007/11/2).

Jenis-jenis imunisasi wajib:

1) Vaksin BCG

Pemberian imunisasi BCG bertujuan untuk menimbulkan kekebalan aktif terhadap penyakit tuberkulosis (TBC). Vaksin BCG mengandung kuman BCG yang masih hidup. Jenis kuman ini telah dilemahkan.

2) Vaksin DPT

Manfaat pemberian imunisasi ini ialah untuk menimbulkan kekebalan aktif

dalam waktu yang bersamaan terhadap penyakit difteria, pertusis (batuk rejan) dan tetanus.

3) Vaksin DT (Difteria, Tetanus)

Vaksin ini dibuat untuk keperluan khusus yaitu bila anak sudah tidak diperbolehkan atau tidak lagi memerlukan imunisasi pertusis, tapi masih memerlukan imunisasi difteria dan tetanus.

4) Vaksin Tetanus

Terhadap penyakit tetanus, dikenal 2 jenis imunisasi yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Vaksin yang digunakan untuk imunisasi aktif ialah toksoid tetanus, yaitu toksin kuman tetanus yang telah dilemahkan dan kemudian dimurnikan.

5) Vaksin Poliomielitis

Imunisasi diberikan untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit poliomielitis. Terdapat 2 jenis vaksin dalam peredaran, yang masing-masing mengandung virus polio tipe I, II, dan III yaitu:

- 1) Vaksin yang mengandung virus polio tipe I, II, dan III yang sudah dimatikan (vaksin Salk), cara pemberiannya dengan penyuntikan.
- 2) Vaksin yang mengandung virus polio tipe I, II, dan III yang masih hidup tetapi telah dilemahkan (vaksin Sabin), cara pemberiannya melalui mulut dalam bentuk pil atau cairan.

6) Vaksin Campak

Imunisasi diberikan untuk mendapat kekebalan terhadap penyakit campak secara aktif.

7) Vaksin Hepatitis B

Vaksinasi dimaksudkan untuk mendapat kekebalan aktif terhadap penyakit Hepatitis B. Penyakit ini dalam istilah sehari-hari lebih dikenal sebagai penyakit lever.

Hasil penelitian yang berhubungan dengan status imunisasi menunjukkan bahwa ada kaitan antara penderita pneumonia yang mendapatkan imunisasi tidak lengkap dan lengkap, dan bermakna secara statistis. Menurut penelitian yang dilakukan Tupasi (1985) menyebutkan bahwa ketidakpatuhan imunisasi berhubungan dengan peningkatan penderita ISPA.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sievert pada tahun 1993 menyebutkan bahwa imunisasi yang lengkap dapat memberikan peranan yang cukup berarti mencegah kejadian ISPA (Dinkes RI, 2001:10).

BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti

Penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di Negara berkembang. Sebab masih tingginya angka kematian dengan membunuh anak Balita setiap tahunnya (WHO,2009).

Angka kesakitan dan angka kematian balita masih tinggi, salah satu penyebab tingginya angka kematian dan angka kesakitan pada anak tersebut adalah panyakit ISPA yang hingga saat ini masih merupakan masalah dan tantangan bagi upaya pembangunan kesehatan (Depkes. RI, 2001).

Ada beberapa faktor berisiko terjadinya Penyakit Infeksi Saluran Penapasan Akut (ISPA) pada bayi dan balita adalah antara lain :

- a. Faktor kuman (agent)
- b. Faktor ketahanan tubuh (host) yang meliputi; umur, jenis kelamin, status gizi, status imunisasi.
- c. Faktor Lingkungan (kondisi perumahan, pendidikan ibu, kebiasaan merokok, serta pendapatan). Namun factor-faktor yang berhubungan

dengan ISPA yang diteliti didasarkan pada situasi dan kondisi di Wilayah Kerja Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai barat kabupaten Sinjai.

Penelitian ini secara khusus akan meninjau hubungan antara Pencahayaan, Ventilasi, kamarisasi, penggunaan bahan bakar Biomass, Kelengkapan Imunisasi dengan kejadian ISPA pada anak Balita.

Masing-masing tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Kebiasaan Merokok dalam rumah

Perokok Pasif mempunyai resiko dua kali lebih besar untuk mendapatkan serangan kanker paru-paru dan ISPA, dari pada yang merokok. Khusus bagi anak-anak dan anggota keluarga dari perokok lebih mudah dan lebih sering menderita gangguan pernapasan dibanding anak-anak dari anggota keluarga yang bukan perokok.

Khusus untuk melindungi bayi dan anak-anak yang terlepas asap rekok, perlu diusahakan untuk dijauhkan dari kepulan asap rekok, atau anggota keluarga yang perokok diberikan waktu dan ruangan sendiri untuk menyalurkan kebiasaan merokok.

b. Ventilasi

Hawa segar diperlukan dalam rumah tangga untuk menggantikan udara yang sudah terpakai. Udara segar diperlukan untuk menjaga temperatur dan

kelembaban udara dalam ruangan. Sebaiknya temperature udara dalam ruangan harus harus lebih rendah paling sedikit 4°C dari temperatur udara luar untuk daerah tropis. Umumnya temperatu kamar 22°C sudah cukup segar. Pergantian udara bersih untuk orang dewasa adalah $33\text{ m}^3/\text{orang/jam}$, kelembaban udara seperti dimaksud di atas diperlukan adanya ventilasi yang baik.

Ventilasi rumah mempunyai fungsi sebagai menjaga agar aliran udara di dalam rumah tetap segar. Hal ini berarti keseimbangan O_2 di dalam rumah meningkat. Udara dalam ruangan meningkat karena terjadi proses penguapan cairan dari kulit kelembaban ini merupakan media yang baik untuk kuman penyebab penyakit, termasuk penyakit saluran pernapasan.

Fungsi yang lain dari Ventilasi adalah untuk membebaskan udara ruangan dari kuman., karena di situ terjadi aliran udara terus menerus. Kuman yang terbawa udara akan selalu mengalir. Ventilasi yang berfungsi untuk menjaga agar ruangan rumah agar selalu tetap dalam kelembaban yang optimum.

c. Kamarisasi

Setiap rumah hendaknya memiliki cukup ruangan untuk bekerja, tidur,santai dengan tujuan agar penghuni tetap merasa bahagia dan privacy tetap terjaga. Tidak adanya kamarisasi akan mempermudah gangguan kesehatan (Chandra Budiman, 2006).

d. Penggunaan bahan bakar masak Biomass

Polusi yang ditimbulkan oleh asap bahan bakar biomass dalam rumah, yang berlangsung lama secara terus menerus akan membahayakan kesehatan, terutama pada balita. Resiko terjadinya ISPA pada anak balita yang tinggal dalam rumah dengan kualitas udara yang lebih rendah, dibandingkan dengan balita yang tinggal dalam rumah dengan kualitas udara yang lebih tinggi (Anwar daud, 1992). Partikel-partikel yang terkandung dalam bahan bakar akan menyebabkan iritasi mucosa saluran pernapasan, sehingga memudahkan terjadinya infeksi.


e. Kelengkapan Imunisasi

Kematian akibat ISPA pada anak balita terletak pada jenis ISPA yang berkembang dari penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi seperti difteri, pertusis, dan campak (<http://putraprabu.wordpress.com/2009/01/15>).

Imunisasi memegang peranan penting dalam menciptakan daya tahan anak balita. Adapun PD3I yang sering menyertai ISPA adalah difteri, pertusis dan campak sehingga dengan efektifnya imunisasi DPT dan Campak diharapkan dapat menurunkan penyakit ISPA pada anak balita.

B. Pola Pikir Variabel Yang Diteliti

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas maka di susunlah pola pikir variabel yang akan diteliti sebagai berikut:



Keterangan :

□ : Variabel bebas (Independent)

○ : Variabel terikat (Dependent)

Pada penelitian ini Variabel yang diteliti terdiri dari :

- a. Variabel Bebas (Independent)
 1. Merokok dalam Rumah
 2. Ventilasi

3. Kamarisasi
 4. Penggunaan bahan bakar masak biomass
 5. Kelengkapan Imunisasi
- b. Variabel Terikat (Dependent)

Kejadian ISPA pada Anak Balita.

C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Anak balita

Adalah anak balita berumur 12 bulan - 59 bulan pada saat dilakukan penelitian.

2. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)

Adalah Penyakit saluran Pernapasan yang bersifat akut ditandai dengan adanya batuk, pilek, demam, baik disertai maupun tidak disertai napas cepat atau sesak napas yang berlangsung selama 14 hari.

Kriteria objektif :

Menderita : bila hasil diagnosa medis/ Puskesmas setempat menunjukkan anak balita positif menderita ISPA.

Tidak Menderita : Bila hasil diagnosa medis/ di Puskesmas setempat menunjukkan anak balita tidak menderita ISPA.

3. Merokok dalam Rumah

Adalah terdapatnya seorang anggota keluarga atau lebih dari anggota keluarga yang mempunyai kebiasaan merokok dalam rumah.

Kriteria Objektif :

Ada : Bila terdapat anggota keluarga yang mempunyai kebiasaan merokok dalam rumah.

Tidak ada : Bila tidak terdapat anggota keluarga yang mempunyai kebiasaan merokok dalam rumah.

4. Ventilasi

Adalah Jalan masuk dan keluarnya udara dalam rumah yang bisa dibuka dan tutup.

Kriteria Objektif :

Memenuhi syarat : Bila luas ventilasi berkisar antara 10%-20% dari luas lantai (Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999)

Tidak memenuhi syarat : bila tidak memenuhi kriteria di atas.

5. Kamarisasi

Yaitu pembatas yang merupakan sekat antara ruangan-ruangan di dalam rumah agar penghuni merasa privacinya terjaga dengan ukuran 8m^2 per dua orang.

Kriteria Objektif :

Memenuhi syarat : bila ada sekat antara ruangan dalam rumah dengan luas kamar $8\text{m}^2/2$ orang (Permenkes/ 829/1999).

Tidak memenuhi syarat : bila tidak sesuai dengan kriteria di atas.

6. Penggunaan bahan bakar biomass

Adalah suatu jenis bahan bakar yang berasal dari tumbuhan (kayu, sekam, jerami) yang bila digunakan sebagai bahan bakar masak akan dapat menimbulkan polusi dalam rumah.

Kriteria objektif :

Menggunakan : Bila dalam kegiatan memasak menggunakan bahan bakar biomass (kayu, sekam, jerami).

Tidak menggunakan : Bila dalam kegiatan memasak tidak menggunakan bahan bakar biomass (kayu, sekam, jerami).

7. Kelengkapan Imunisasi

Adalah Kelengkapan imunisasi wajib (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis) yang diberikan sesuai dengan usia.

Kriteria Objektif :

1. lengkap : Diberikan vaksin secara lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B) sesuai dengan yang tercatat pada KMS pada anak balita tersebut.
2. Tidak Lengkap : Bila tidak memenuhi kriteria di atas.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2004:86). Hipotesis dalam penelitian ini adalah.

a. Hipotesis (Ho).

1. Ada hubungan antara merokok dalam rumah dengan kejadian ISPA pada anak balita di wilayah kerja Puskesmas Manipi kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai tahun 2010.
- 2 . Ada hubungan antara Ventilasi dengan kejadian ISPA anak balita di wilayah kerja Puskesmas Manipi kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai tahun 2010.

3. Ada hubungan antara kamarisasi dengan kejadian ISPA pada anak balita di Wilayah kerja Puskesmas Manipi kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai tahun 2010.
4. Ada hubungan antara jenis bahan bakar masak (biomass) dengan kejadian ISPA pada anak balita di wilayah kerja Puskesmas Manipi kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai tahun 2010.
5. Ada hubungan antara kelengkapan Imunisasi dengan kejadian ISPA pada anak balita di wilayah kerja Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai tahun 2010.

b. Hipotesis Ha

1. Tidak ada hubungan antara merokok dalam rumah dengan kejadian ISPA pada anak balita di wilayah kerja Puskesmas Manipi kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai tahun 2010.
2. Tidak ada hubungan antara Ventilasi dengan kejadian ISPA anak balita di wilayah kerja Puskesmas Manipi kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai tahun 2010.
3. Tidak ada hubungan antara kamarisasi dengan kejadian ISPA pada anak balita di Wilayah kerja Puskesmas Manipi kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai tahun 2010.
4. Tidak ada hubungan antara jenis bahan bakar masak (biomass) dengan kejadian ISPA pada anak balita di wilayah kerja Puskesmas Manipi kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai tahun 2010.

5. Tidak ada hubungan antara kelengkapan Imunisasi dengan kejadian ISPA pada anak balita di wilayah kerja Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai tahun 2010.



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini metode *survey analitik* dengan pendekatan *Cross sectional study* yaitu di mana data yang menyangkut variabel bebas atau resiko dan variabel terikat atau variabel akibat yang dikumpulkan dalam waktu bersamaan.

B. Gambaran dan Lokasi Penelitian

a.Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai barat kabupaten Sinjai, dengan pertimbangan bahwa di daerah tersebut merupakan daerah yang masih rentan mengalami penyakit ISPA, dengan melihat data tahun 2009 bahwa diantara sepuluh pola penyakit terbanyak kasus ISPA berada di urutan pertama. Serta pula melihat beberapa faktor-faktor yang dapat menyebabkan kejadian ISPA pada anak balita.

b.Keadaan Geografis

Puskesmas Manipi terletak di ibu kota Kecamatan Sinjai Barat Kab. Sinjai tepatnya di jalan Persatuan Raya No.159. Kecamatan Sinjai Barat adalah salah satu dari 9 kecamatan di kabupaten/kota Sinjai dalam wilayah Provinsi

Sulawesi Selatan yang terletak di pantai timur bagian selatan jazirah Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 120 km dari kota Makassar dengan luas wilayah 235,53 km² yang mempunyai perbatasan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bulu Pοδο dan Kabupaten Bone.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sinjai Tengah.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sinjai Borong.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

c. Keadaan Demografi

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh di Kantor Kecamatan Sinjai Barat Tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk sebanyak 23.977 Jiwa, yang terdiri dari :

1. Laki-laki : 11.722 Jiwa
2. Perempuan : 12.255 Jiwa

C. Populasi, Sampel Dan Responden

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini seluruh anak balita yang berkunjung di Puskesmas Manipi sebanyak 264 anak balita pada periode bulan Januari sampai Juni tahun 2010.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian pengunjung anak Balita di Puskesmas Manipi, sejak bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2010, dengan besar sampel sebanyak 159 anak balita .

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *Simple Random Sampling* yaitu pengambilan sampel secara *random* atau acak (Soekidjo Notoatmodjo, 2002:85).

Cara memilih elemen anggota sampel, dengan cara Lotere yaitu besar populasi adalah = 264, diambil sampel = 159 , ambil 264 potong kertas diberi nomor 1-264. Kertas dilipat dimasukkan ke dalam kotak, kotak dikocok lalu diambil 1 potong dilihat angkanya, katakan angka 30 terpilih maka elemen ke 30 terpilih, kemudian ulangi sampai sampel ke 159. Catatan bahwa nilai yang sudah muncul tidak dimasukkan lagi ke dalam kotak.

Cara perhitungan besar sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Dengan menggunakan rumus, yaitu :

$$\text{Rumus : } n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

d : Tingkat kemaknaan digunakan 0,05 (5 %).

Diketahui :

$$N = 264$$

$$d = 0,05$$

$$n = \dots\dots\dots ?$$

$$n = \frac{N}{1 + N (d^2)}$$

$$n = \frac{264}{1 + 264 (0,05^2)}$$

$$n = \frac{264}{1 + 264 (0,0025)}$$

$$n = \frac{264}{1,66} = 159,03614 = 159$$

Jadi sampel minimal yang diambil adalah 159 sampel.

3. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah ibu/ pengasuh anak balita yang terpilih sebagai sampel.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data primer

Diperoleh dengan wawancara langsung dengan ibu/pengasuh balita, dengan menggunakan kuesioer dan lembaran Obsevasi yang telah disediakan dengan tujuan memperoleh data penderita serta observasi langsung dengan objek yang akan diteliti.

2. Data sekunder

Data sekunder dari instansi terkait dalam penelitian antara lain kantor kecamatan, Puskesmas dengan tujuan memperoleh data (demografi, geografi, laporan bulanan dan register harian penderita ISPA). serta diperoleh dari buku-buku, jurnal, literature, dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Pengolahan dan penyajian data

1. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan computer.
2. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel yang disertai penjelasan .

F. Analisis Data

Analitik yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ISPA.

Untuk menguji Hipotesis pada penelitian ini digunakan uji statistik yaitu :

Chi- square dengan rumus :

$$X^2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E}$$

X^2 = Chi- Square hasil perhitungan

O = Nilai yang diamati (Observed)

E = Nilai yang diharapkan (Expected)

Interpretasi data dilakukan dengan melihat nilai P, dimana ;

- a. Ho ditolak jika nilai $P < 0,05$ ada hubungan yang bermakna.
- b. Ho diterima jika nilai $P > 0,05$ berarti tidak ada hubungan yang bermakna.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai, yang dilaksanakan dari tanggal 28 Juli-10 Agustus 2010. Jumlah sampel yang diteliti adalah sebanyak 159 sampel anak balita.

Tabel 5.1
10 Kasus Penyakit terbanyak Tahun 2009 di Wilayah Kerja
Puskesmas Manipi

No.	Jenis Penyakit	Jumlah orang
1.	Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)	1035
2.	Fraktur Cedera Lainnya termasuk benda asing, Luka bakar dan korosi	390
3.	Dermatitis dan Eksim	300
4.	Skabies	285
5.	Diare dan Gastroenteritis oleh penyebab Infeksi tertentu (Colitis Infeksi)	285
6.	Hipertensi Esensial (Primer)	240
7.	Penyakit jaringan keras gigi lainnya	210
8.	Gangguan jaringan Lunak lainnya	209
9.	Gastritis	195
10.	Penyakit Pulpa dan Jaringan periapikal.	165

Sumber: Profil Puskesmas Manipi, 2009.

Dari hasil pengumpulan data melalui wawancara dan observasi dengan menggunakan daftar pertanyaan/ kuesioer diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Karakteristik Responden

a. Umur Responden

Tabel 5.2
Distribusi Responden Menurut kelompok Umur di Wilayah Kerja
Puskesmas Manipi Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai
Tahun 2010

Umur Responden (Tahun)	N	%
< 20	7	4,4
20-29	71	44,7
30-39	66	41,5
≥40	15	9,4
Jumlah	159	100

Sumber : data primer

b. Pendidikan

Tabel 5.3
Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan di Wilayah Kerja
Puskesmas Manipi Kec. Sinjai barat
Kab. Sinjai Tahun 2010

Tingkat Pendidikan	n	%
Tidak Sekolah	4	2,5
SD	13	8,2
SMP	24	15,1
SMU	83	52,2
Akademi/ PT	35	22,0
Jumlah	159	100

Sumber : Data primer

2. Karakteristik Sampel

Tabel 5.4
Distribusi Anak Balita Menurut kelompok Umur dengan Kejadian Penyakit
ISPA Di Wilayah Kerja Puskesmas Manipi
Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai Tahun 2010

Golongan Umur (Bulan)	Kejadian ISPA				Jumlah	
	Menderita		Tidak menderita		n	%
	n	%	N	%		
12-23	35	62,5	21	37,5	56	100
24-35	30	63,8	17	36,2	47	100
36-47	19	65,5	10	34,5	29	100
48-59	13	48,1	14	51,9	27	100

Jumlah	97	61,0	62	39,0	159	100
--------	----	------	----	------	-----	-----

Sumber : data primer

Berdasarkan Tabel 5.2 di atas dapat dilihat bahwa pada golongan umur 12-23 bulan yang menderita ISPA sebanyak 56 anak balita (62,5 %) lebih besar dibandingkan yang tidak menderita 21 anak balita (37,5 %), sedangkan umur 24-35 bulan yang menderita ISPA sebanyak 30 anak balita (63,8 %) lebih besar dibandingkan yang tidak menderita 17 anak balita (36,2), sedangkan golongan umur 36-47 bulan yang menderita ISPA sebanyak 19 anak balita (48,1 %) lebih kecil dibandingkan yang tidak menderita 10 anak balita (51,9 %), sedangkan untuk golongan umur 48-59 bulan yang menderita ISPA sebanyak 13 anak balita (48,1) dibandingkan lebih kecil yang tidak menderita 14 anak balita (51,9).

3. Distribusi Variabel yang diteliti

a. Penderita ISPA

Tabel 5.5
Distribusi Anak Balita Menurut Kejadian Penyakit ISPA Di Wilayah
Kerja Puskesmas Manipi Kec. Sinjai Barat
Kab. Sinjai Tahun 2010

Kejadian ISPA	N	%
Menderita	97	61,0
Tidak Menderita	62	39,0
Jumlah	159	100

Sumber : Data primer

Berdasarkan tabel 5.3 di atas bahwa dari 159 anak balita terdapat 97 anak balita menderita ISPA (61 %) dan 62 anak balita yang tidak menderita ISPA (39 %).

b. Merokok Dalam Rumah

Tabel 5.6
Distribusi Responden Menurut Keberadaan Anggota Keluarga yang Merokok dalam Rumah di Wilayah Kerja Puskesmas Manipi Kec. Sinjai barat Kab. Sinjai Tahun 2010

Ada Keluarga Merokok	N	%
Ada	98	61,6
Tidak Ada	61	38,4
Jumlah	159	100

Sumber : Data primer

Berdasarkan tabel 5.4 terdapat 98 anggota keluarga yang merokok baik dalam rumah maupun di luar rumah atau 61,6 % dan anggota keluarga yang tidak merokok sebanyak 61 atau 38,4 %.

c. Ventilasi

Tabel 5.7
Distribusi Responden Menurut Persyaratan Ventilasi Rumah di Wilayah Kerja Puskesmas Manipi Kec. Sinjai barat Kab. Sinjai Tahun 2010

Ventilasi	n	%
Memenuhi Syarat	105	66,0
Tidak Memenuhi Syarat	54	34,0

Jumlah	159	100
--------	-----	-----

Sumber : Data primer

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Responden yang Ventilasinya memenuhi syarat sebanyak 105 (66,0 %) sedangkan yang tidak memenuhi syarat terdapat 54 (34,0 %).

d. Kamarisasi

Tabel 5.8
Distribusi Responden Menurut Kepemilikan Kamarisasi di Wilayah kerja Puskesmas Manipi Kec. Sinjai barat Kab. Sinjai Tahun 2010

Kamarisasi	n	%
Ada kamarisasi	157	98,7
Tidak ada kamarisasi	2	1,3
Jumlah	159	100

Sumber : Data primer

Berdasarkan tabel 5.7 menunjukkan bahwa dari 159 sampel yang memiliki kamarisasi sebanyak 157 atau 98,7 % dan yang tidak memiliki kamarisasi hanya 2 atau 1,3 %.

Tabel 5.9
Distribusi Respoden Menurut Persyaratan Kamarisasi di Wilayah
kerja Puskesmas Manipi Kec. Sinjai barat Kab. Sinjai
Tahun 2010

Kamarisasi	n	%
Memenuhi Syarat	101	64,3
Tidak memenuhi Syarat	56	35,7
Jumlah	157	100

Sumber : Data primer

Berdasarkan hasil Penelitian menunjukkan dari 159 sampel, responden memiliki kamarisasi sebanyak 157 dan 2 responden yang tidak memiliki kamarisasi, terdapat 101 kamarisasi yang memenuhi syarat (64,3 %) dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 56 (35,7).

e. Bahan Bakar Masak Biomass

Tabel 5.10
Distribusi Responden Menurut Penggunaan Bahan Bakar Biomass
di Wilayah Kerja Puskesmas Manipi Kec. Sinjai barat
Kab. Sinjai Tahun 2010

Biomass (kayu)	n	%
Menggunakan	41	25,8
Tidak menggunakan	118	74,2
Jumlah	159	100

Sumber : Data primer

Berdasarkan hasil Penelitian menunjukkan bahwa yang menggunakan bahan bakar biomass sebanyak 41 atau 25,8 % dan yang tidak menggunakan biomass sebanyak 118 atau 74,2 %.

f. Kelengkapan Imunisasi

Tabel 5.11
Distribusi Anak Balita menurut Kelengkapan Imunisasi di Wilayah kerja Puskesmas Manipi Kec. Sinjai barat Kab. Sinjai Tahun 2010

Kelengkapan Imunisasi	n	%
Lengkap	142	89,3
Tidak Lengkap	17	10,7
Jumlah	159	100

Sumber : Data primer

Tabel 5.11 menunjukkan sampel yang lengkap Imunisasinya 142 atau 89 % dan sampel yang tidak lengkap sebanyak 17 atau 10,7 %.

4. Analisis Hubungan Variabel yang diteliti

Pada analisis Variabel ini dilakukan analisis hubungan Merokok dalam rumah, kondisi Ventilasi, Kamarisasi, Penggunaan bahan bakar masak biomass dan kelengkapan Imunisasi dengan Kejadian Penyakit ISPA pada Anak balita di Wilayah Kerja Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai Tahun 2010.

a. Hubungan Merokok dalam Rumah dengan Kejadian ISPA

Tabel 5. 12
 Hubungan Merokok dalam Rumah Dengan Kejadian Penyakit
 ISPA Pada Anak Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Manipi
 Kec. Sinjai barat Kab. Sinjai Tahun 2010

Merokok	Kejadian ISPA				Total		P
	Menderita		Tidak menderita		n	%	
	n	%	n	%			
Ada	68	69,4	30	30,6	98	100	0,010
Tidak Ada	29	47,5	32	52,5	61	100	
Jumlah	97	61,0	62	39,0	159	100	

Sumber : Data primer

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 98 responden yang merokok di dalam rumah, menderita ISPA sebanyak 68 anak balita (69,4 %), lebih besar dari yang tidak menderita ISPA sebanyak 30 anak balita (30,6 %). Sedangkan dari 61 responden tidak ada anggota keluarga yang merokok di dalam rumah, yang menderita ISPA sebanyak 29 anak balita (47,5 %), lebih kecil sedikit dibanding yang tidak menderita ISPA sebanyak 32 anak balita (52,5 %). Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya anggota keluarga yang merokok di dalam rumah berpengaruh terhadap kejadian penyakit ISPA pada Anak balita.

Uji statistic dengan menggunakan SPSS versi 16,0 diperoleh Uji Continuity Correction dengan nilai $p = 0,010$ karena nilai $p < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Interpretasi : Ada hubungan antara adanya anggota keluarga yang merokok di dalam Rumah dengan Kejadian penyakit ISPA pada Anak Balita di Wilayah kerja Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai tahun 2010.

b. Hubungan Ventilasi Rumah dengan Kejadian ISPA

Tabel 5.13
 Hubungan Ventilasi Rumah Dengan Kejadian Penyakit ISPA Pada Anak Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Manipi Kec. Sinjai barat Kab. Sinjai Tahun 2010

Ventilasi	Kejadian ISPA				Total		P
	Menderita		Tidak Menderita		n	%	
	n	%	n	%			
Memenuhi Syarat	46	43,8	59	56,2	105	100	0,000
Tidak memenuhi syarat	51	94,4	3	5,5	54	100	
Jumlah	97	61,0	62	39,0	159	100	

Sumber : Data primer

Tabel 5.13 menunjukkan bahwa terdapat 105 responden Ventilasi rumahnya memenuhi syarat, yang menderita ISPA 46 anak balita (43,8 %), lebih kecil dibanding yang tidak menderita sebanyak 59 anak balita (56,2 %). Sedangkan dari 54 Responden yang Ventilasinya tidak memenuhi syarat, terdapat menderita ISPA sebanyak 51 anak balita (94,5 %) lebih besar dibandingkan yang tidak menderita ISPA sebanyak 3 anak balita (5,5 %). Hal ini menunjukkan bahwa rumah yang Ventilasinya tidak memenuhi syarat berhubungan dengan kejadian penyakit ISPA pada Anak balita.

Uji statistic dengan menggunakan SPSS versi 16,0 dipeoleh Uji Contiunity Correction dengan nilai $p = 0,000$. Karena nilai $p < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Interpretasi : Ada hubungan antara Ventilasi yang tidak memenuhi syarat dengan kejadian Penyakit ISPA pada anak balita di Wilayah kerja Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai barat kabupaten Sinjai tahun 2010.

c. Hubungan Kamarisasi dengan Kejadian ISPA

Tabel 5.14
Hubungan Kamarisasi Dengan Kejadian Penyakit ISPA Pada Anak Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Manip Kec. Sinjai barat Kab. Sinjai Tahun 2010

Kamarisasi	Kejadian ISPA				Total		P
	Menderita		Tidak Menderita		n	%	
	n	%	n	%			
Memenuhi syarat	53	52,5	48	47,5	101	100	0,009
Tidak memenuhi syarat	44	78,6	12	21,4	56	100	
Jumlah	97	61,8	60	38,2	157	100	

Sumber : Data primer

Tabel 5. 14 di atas, menunjukkan bahwa dari 101 responden yang kamarisasinya memenuhi syarat, yang menderita ISPA sebanyak 53 anak balita (52,5 %), lebih besar dibandingkan yang tidak menderita ISPA sebanyak 48 anak balita (47,5 %). Sedangkan dari 56 responden yang Kamarisasinya tidak

memenuhi syarat terdapat menderita ISPA sebanyak 44 anak balita (78,6 %) lebih besar bila dibandingkan yang tidak menderita ISPA sebanyak 12 anak balita (21,4 %). Perlu kami sampaikan bahwa dari 159 responden yang diteliti didapatkan 2 responden tidak memiliki kamarisasi, jadi hanya 157 yang dianalisis.

Hasil analisis data dengan menggunakan SPSS versi 16,0 Uji Continuity Correction nilai $p = 0,009$ karena nilai $p < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Interpretasi : Ada hubungan Kamarisasi yang tidak memenuhi syarat dengan kejadian Penyakit ISPA pada Anak balita di Wilayah kerja Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai tahun 2010.

d. Hubungan Penggunaan Bahan bakar masak Biomass

Tabel 5.15

Hubungan Penggunaan Bahan Bakar Masak Biomass dengan Kejadian Penyakit ISPA Pada Anak Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Manipi Kec. Sinjai barat Kab. Sinjai Tahun 2010

Bahan Bakar masak Biomass	Kejadian ISPA				Jumlah		P
	Menderita		Tidak menderita		n	%	
	n	%	n	%			
Menggunakan	23	56,1	18	43,9	41	100	0,574
Tidak Menggunakan	74	62,7	44	37,3	118	100	
Jumlah	97	61,0	62	39,0	159	100	

Sumber : Data primer

Tabel 5. 15 Menunjukkan bahwa dari 41 responden yang menggunakan bahan bakar biomass terdapat menderit ISPA sebanyak 23 anak balita (56,1 %) lebih besar bila dibandingkan tidak menderit sebanyak 18 anak balita (43,9 %) sedangkan dari 118 responden yang tidak menggunakan bahan bakar masak Biomass yang menderit ISPA sebanyak 74 anak balita (62,7 %), lebih besar bila dibandingkan yang tidak menderit sebanyak 44 anak balita (37,3 %).

Uji stastistik Countinty Correction dengan menggunakan SPSS versi 16,0 diperoleh nilai $p = 0,574$ karena nilai $p > 0,05$ maka H_0 diterima atau dapat diintreperetasikan bahwa tidak ada hubungan antara Penggunaan bahan bakar masak biomass dengan kejadian ISPA di Wilayah kerja Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai tahun 2010.

e. Hubungan Kelengkapan Imunisasi dengan Kejadian ISPA

Tabel 5. 16
 Hubungan Kelengkapan Imunisasi dengan Kejadian Penyakit ISPA pada Anak Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Manipi Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai Tahun 2010

Kelengkapan Imunisasi	Kejadian ISPA				Jumlah		P
	Menderit		Tidak Menderit		n	%	
	n	%	n	%			
Lengkap	90	63,4	52	36,6	142	100	0,131
Tidak Lengkap	7	41,2	10	58,8	17	100	
Jumlah	97	61,0	62	39,0	159	100	

Sumber : Data primer

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 142 sampel Imunisasi lengkap yang menderita ISPA sebanyak 90 anak balita (63,4 %) lebih besar bila dibandingkan yang tidak menderita ISPA 52 anak balita (36,6 %). Sedangkan dari 17 Sampel imunisasi tidak lengkap yang menderita ISPA 7 anak balita (41,2 %) lebih kecil bila dibandingkan yang tidak menderita 10 anak balita (58,8 %).

Hasil Uji statistik Countinty Correction dengan menggunakan SPSS versi 16,0 diperoleh nilai $p = 0,131$ karena nilai ($p > 0,05$), dengan demikian maka H_0 diterima atau dapat diinterpretasikan tidak ada hubungan antara Kelengkapan Imunisasi dengan kejadian ISPA di wilayah kerja Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai tahun 2010.

B. Pembahasan

a. Hubungan Antara Merokok dalam Rumah dengan Kejadian ISPA

Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang lazim ditemui dalam kehidupan sehari-hari, dan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia karena menjadi salah satu factor risiko utama dari beberapa jenis penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Perilaku merokok dewasa ini seolah menjadi budaya. Hal ini ditambah dengan gencarnya iklan rokok yang mengidentikkan perokok dengan kejantanan dan kesegaran. Bagi pria, semakin muda usia mereka merokok, makin tumbuh rasa bangga yang

besar. Dan ironisnya, sebagian kaum perempuan merokok merupakan bagian dari life style modern. Kebiasaan merokok akan merusak mekanisme pertahanan paru yang disebut mucociliary clearance. Asap rokok juga diketahui dapat menurunkan respons terhadap antigen sehingga jika ada benda asing masuk ke paru tidak mudah dikenali dan dilawan.

Dalam Al-Qur'an pun diterangkan bahaya tentang rokok tetapi tidak secara langsung disampaikan mengenai rokok, namun itu mendeskripsikan tentang pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Terjemahan :

"Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan"
QS.Al-Baqarah: 2/ 195

Memang, berdasarkan ayat tersebut merokok diharamkan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ilmu kedokteran dalam dua puluh tahun terakhir ini membuktikan bahwa merokok merupakan salah satu sebab rusaknya organ tubuh dan gangguan kesehatan yang serius. Bahkan tidak mustahil di masa datang akan menjadi sebab utama kematian yang terjadi. Mengingat banyaknya remaja yang merokok, apalagi yang berlebih-lebihan, yang dibiarkan tanpa pencegahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara keberadaan anggota Keluarga yang merokok dalam rumah dengan kejadian penyakit ISPA

($p \text{ value} = 0,010 < 0,05$). Hal ini berarti Anak balita yang orang tua atau keluarganya mempunyai resiko lebih besar untuk terkena penyakit ISPA dibandingkan dengan Anak balita yang orang tua atau keluarganya tidak merokok.

Anak Balita dengan anggota keluarga yang merokok dalam rumah pada Penderita ISPA sebesar 69,4 %, lebih besar bila dibandingkan dengan yang tidak menderita (30,6 %). Sedangkan anggota keluarga yang tidak merokok pada penderita ISPA sebesar 47,5 % lebih kecil bila dibandingkan dengan yang tidak menderita ISPA (52,2 %).

Konsentrasi CO yang tinggi di dalam asap rokok yang terisap mengakibatkan kadar COHb di dalam darah meningkat. Selain berbahaya terhadap orang yang merokok, adanya asap rokok yang mengandung CO juga berbahaya bagi orang yang berada di sekitarnya karena asapnya dapat terisap (Srikandi Fardiaz, 1992).

Hasil penelitian ini sesuai dengan Penelitian Abdullah (2003) menyatakan bahwa ada hubungan antara anggota keluarga yang merokok dalam rumah dengan Kejadian ISPA di Bekasi, Jawa barat.

b. Hubungan Antara Ventilasi dengan Kejadian ISPA

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 159 Anak balita menunjukkan bahwa ventilasi yang tidak memenuhi syarat menderita ISPA sebesar 94,5 %

lebih besar dibanding yang tidak menderita (5,5 %). Sedangkan ventilasi memenuhi syarat yang menderita ISPA sebesar 43,8 % lebih kecil dibandingkan yang tidak menderita sebesar 56,2 %. Ventilasi yang tidak memenuhi syarat pada kasus yang menderita ISPA lebih besar daripada yang tidak menderita ISPA, dan ventilasi yang memenuhi syarat pada kasus penderita ISPA lebih sedikit daripada yang tidak menderita ISPA.

Hasil Uji *Chi Square* yang diperoleh nilai $p = 0,000$. Karena nilai $p < 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti ada hubungan antara luas ventilasi yang tidak memenuhi syarat dengan kejadian penyakit ISPA pada Anak balita.

Pada dasarnya warga yang ada di Manipi sadar akan pentingnya kepemilikan Ventilasi terbukti dari sampel yang ditemui sudah sebagian besar ventilasi rumahnya memenuhi syarat tapi masih ada juga yang belum memenuhi standar kesehatan 10 % - 20 % dari luas lantai. Sehingga hal ini menyebabkan fungsi ventilasi yaitu untuk menjaga agar aliran udara di dalam rumah tersebut tetap segar sehingga keseimbangan O_2 yang diperlukan oleh penghuni rumah juga tetap terjaga dan untuk membebaskan udara ruangan dari bakteri-bakteri tidak terpenuhi apalagi ditambah dengan adanya polusi udara dalam rumah di mana adanya asap rokok dalam rumah juga merupakan faktor dominan dalam penelitian ini. Hal ini yang menyebabkan Ventilasi merupakan salah satu faktor risiko yang dominan terhadap kejadian penyakit ISPA pada Anak balita di Wilayah kerja Puskesmas Manipi.

Ventilasi rumah mempunyai banyak fungsi. Kurangnya ventilasi akan menyebabkan kurangnya O_2 di dalam rumah yang berarti kadar CO_2 yang bersifat racun akan meningkat. Tidak cukupnya ventilasi juga akan menyebabkan kelembaban udara di dalam ruangan naik karena terjadinya proses penguapan cairan dari kulit dan penyerapan. Kelembaban ini akan merupakan media yang baik untuk bakteri-bakteri penyebab penyakit (Soekidjo Notoatmodjo, 1997).

c. Hubungan Antara Kamarisasi dengan Kejadian ISPA

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 157 anak balita menunjukkan bahwa kamarisasi tidak memenuhi syarat yang menderita ISPA sebanyak (78,6 %) lebih besar jika dibandingkan dengan yang tidak menderita ISPA (21,4 %), sedangkan untuk yang menderita ISPA pada anak balita dengan Kamarisasi yang memenuhi syarat (52,5 %) lebih besar bila dibandingkan dengan yang tidak menderita ISPA (47,5 %).

Uji *Chi Square* yang dilakukan terhadap Persyaratan Kamarisasi dengan kejadian penyakit ISPA didapatkan hasil *p value* sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05 ($0,009 < 0,05$). Hal ini berarti bahwa ada hubungan antara Kamarisasi dengan kejadian ISPA dan anak balita yang kamarisasinya tidak memenuhi syarat ($< 8 \text{ m}^2 / 2 \text{ orang}$) mempunyai resiko terkena ISPA lebih besar bila dibandingkan dengan anak balita yang kamarisasinya memenuhi syarat ($\geq 8 \text{ m}^2 / 2 \text{ orang}$).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Eny Setyaningsih (2001) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara kamarisasi yang tidak memenuhi syarat dengan kejadian ISPA ($p = 0,001$). Penelitian yang dilakukan oleh Vitria (1993) juga menyatakan bahwa makin meningkatnya jumlah orang per kamar dari luas standar kamar akan meningkatkan kejadian ISPA. Semakin banyak penghuni rumah berkumpul dalam suatu kamar kemungkinan mendapatkan risiko untuk terjadinya penularan penyakit akan lebih mudah, khususnya bayi yang relatif rentan terhadap penularan penyakit (Dinkes RI, 2006).

d. Hubungan Antara Penggunaan Bahan bakar Biomass dengan Kejadian ISPA

Sumber polusi dalam rumah adalah pembakaran dalam rumah untuk keperluan memasak. Diketahui bahwa penyebab terjadinya ISPA dan penyakit gangguan saluran pernapasan lain adalah rendahnya kualitas udara dalam atau di luar rumah baik secara biologis, fisik, maupun kimia. Sumber polusi dalam rumah biasa berupa asap rokok ataupun menggunakan bahan bakar kayu, sekam (Biomass). Asap hasil pembakaran bahan bakar untuk memasak dan untuk pemanasan dengan konsentrasi tinggi dapat merusak mekanisme pertahanan paru sehingga akan memudahkan timbulnya ISPA.

Dari Tabel 5.16 Menunjukkan bahwa responden yang menggunakan bahan bakar biomass menderita ISPA sebanyak 23 anak balita (56,1 %) lebih

tinggi dibandingkan yang tidak menderita sebanyak 18 anak balita (43,9), Adapun responden yang tidak menggunakan bahan bakar masak yang menderita ISPA sebanyak 74 anak balita (62,7 %), lebih besar dibandingkan yang tidak menderita sebanyak 44 anak balita (37,3 %).

Mayoritas masyarakat di wilayah Kerja Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai sudah jarang menggunakan bahan bakar Biomass lagi, ini mungkin disebabkan oleh keadaan ekonomi dan status social yang cukup baik dan meningkat, tingkat pendapatan ekonomi yang tinggi dan penggunaan bahan bakar biomass berkurang. Adapun responden yang menggunakan Biomass hanya berjumlah 41 (25,8 %) responden dari 159 responden, itupun dengan frekuensi penggunaan lebih banyak pada waktu tertentu saja (Hajatan, Hari raya Agama).

Dari hasil Uji statistic Countinity Correction diperoleh nilai $p = 0,574$ ($p > 0,05$), dengan demikian H_0 diterima atau dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara penggunaan Bahan bakar masak biomass dengan kejadian ISPA di wilayah kerja Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai Tahun 2010.

Hasil Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Ike Suhandayani (2006) bahwa menyatakan tidak ada hubungan Penggunaan bahan bakar Biomass dengan kejadian ISPA pada anak Balita di Puskesmas Pati I Kab. Pati. Alasan karena kurangnya yang menggunakan Bahan bakar biomass.

e. Hubungan Antara Kelengkapan Imunisasi dengan Kejadian ISPA

Hasil penelitian di Wilayah kerja Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai didapatkan bahwa status imunisasi yang tidak lengkap menderita ISPA sebesar 41,2 % lebih kecil dibandingkan Anak balita yang tidak menderita sebesar 58,8 %. Sedangkan yang status imunisasi lengkap yang menderita ISPA sebesar 63,4 % lebih besar dibandingkan Anak balita yang tidak menderita sebanyak 36,6 %. Status imunisasi tidak lengkap pada penderita ISPA lebih kecil bila dibandingkan dengan yang menderita ISPA dan status imunisasi lengkap pada penderita ISPA lebih besar bila dibandingkan dengan yang tidak menderita ISPA.

Uji *Chi Square* yang dilakukan terhadap kelengkapan imunisasi dengan Kejadian penyakit ISPA didapatkan bahwa *p value* 0,131 lebih besar dari 0,05 ($0,131 > 0,05$) sehingga menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kelengkapan imunisasi dengan kejadian ISPA. Hal ini disebabkan karena cakupan Anak balita dengan status imunisasi yang lengkap jauh lebih besar bila dibandingkan dengan status imunisasi yang tidak lengkap.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Eny Setyaningsih (2001). Status imunisasi bukan merupakan faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian ISPA pada balita di Kabupaten Banjarnegara. Hal ini kemungkinan disebabkan karena tingginya cakupan imunisasi pada Anak balita.

Sebagian besar responden mengetahui bahwa imunisasi sangat penting bagi Anak balita untuk mencegah terjadinya penyakit infeksi. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah responden dengan anak balita yang status imunisasinya lengkap yaitu sebesar 89,3 %. Sedangkan responden dengan Anak balita yang status imunisasi tidak lengkap yaitu sebesar 10,7 %, dengan alasan bahwa setelah imunisasi Anak balita menjadi panas dan alasan lain dari sebagian responden karena jarak transportasi jauh ke tempat sarana kesehatan (Posyandu, Puskesmas) dan kesibukan ibu anak balita.

Imunisasi sangat berguna dalam menentukan ketahanan tubuh bayi terhadap gangguan penyakit (Depkes RI, 2004). Para ahli kesehatan menyebutkan bahwa dibanyak negara, dua penyebab utama tingginya angka kematian anak adalah gangguan gizi dan infeksi. Hal ini dapat dicegah dengan imunisasi yang merupakan hal mutlak dalam memelihara kesehatan dan gizi anak (Sjahmien Moehji, 2003).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu, sebagai berikut :

1. Dari 159 sampel anak balita, yang menderita ISPA sebanyak 61,0 % dan yang tidak menderita ISPA sebanyak 39,0 %.
2. Ada hubungan yang bermakna antara Merokok dalam rumah dengan Kejadian Penyakit ISPA pada Anak balita di Wilayah kerja Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai.
3. Ada hubungan yang bermakna antara Ventilasi dengan kejadian Penyakit ISPA pada Anak balita di Wilayah Kerja Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai.
4. Ada hubungan yang bermakna antara Kamarisasi dengan Kejadian penyakit ISPA pada Anak balita di Wilayah kerja Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai.
5. Tidak ada hubungan yang bermakna antara Penggunaan bahan bakar Biomass dan Kelengkapan Imunisasi dengan Kejadian penyakit ISPA pada Anak balita di Wilayah kerja Puskesmas Manipi Kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai.

B. Saran

Adapun Saran yang dapat diberikan , yaitu Sebagai berikut :

1. Kepada orang tua dan keluarga Anak Balita agar tidak merokok di dalam rumahnya atau di dekat Anak balita untuk mencegah timbulnya penyakit ISPA.
2. Masyarakat khususnya yang bermukim di Wilayah kerja Puskesmas Manipi dianjurkan agar memperhatikan luas Jendela rumah dan membiasakan membuka jendela pada pagi dan siang hari untuk mengurangi kelembaban udara dalam rumah.
3. Disarankan kepada masyarakat agar memiliki kamar yang sesuai dengan standar kesehatan ($8 \text{ m}^2 / 2 \text{ orang}$) untuk mencegah timbulnya penyakit ISPA .
4. Untuk mencegah terjadinya Penyakit ISPA, saran yang kami masukkan adalah tidak menggunakan bahan bakar masak Biomass di dalam rumah karena untuk mengurangi polusi asap yang menimbulkan pencemaran udara di lingkungan keluarga itu sendiri.
5. Saran kami pula bagi instansi adalah perumusan kebijakan program kesehatan khususnya Program Pemberantasan Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (P2ISPA) dapat lebih diperbaiki dan dilaksanakan kegiatan penyuluhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahan, disahkan Menteri Agama RI H. Munawir Sjadzali 1984. Penerbit Yayasan Penyelenggara/ Pentafsir Al-Qur'an (Prof. R.H.A Soenarjo S.H).
- Adisasmito Wiku, 2008. "*Sistem Kesehatan*" Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Daud. 2007. "*Analisis Kualitas Lingkungan*" Makassar : CV. Healthy & Sanitation.
- Amstrong, Soe. 1991. *Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Arcan.
- Asri, Muhammad. 2003. *Perilaku merokok mahasiswa kesehatan Unhas terhadap peringatan pemerintah tentang bahaya rokok di kota Makassar*. Makassar: FKM Unhas.
- Azwar, Asrul. 1991. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Mutiara
- A.H Markum. 2002. *Imunisasi*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI
- Budiharto. 2008. *Metodologi Penelitian Kesehatan dengan Contoh bidang ilmu Kesehatan Gigi*. Jakarta : EGC
- Chanra Budiman, 2006. "*Pengantar Kesehatan Lingkungan*" Jakarta: EGC
- Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan 2008 *Profil Kesehatan Sulawesi Selatan*. Makassar
- Direktorat Jenderal P2MPLP Departemen Kesehatan RI. 2001. *Pedoman Program Pemberantasan Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut Untuk Penanggulangan Pneumonia Pada Balita Dalam Pelita VI*. Jakarta
- Dr. Ahmad Syaugi Al-fanjari,1996. "*Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*" Sinar grafika Offset Bumi Karsa.
- Entjang Indah. 2000. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Bandung : Aditya Bakti
- Fardias, Srikandi. 1992. *Polusi Air dan Udara*, Bogor : Kanisius

- Ghazali, Muhammad. “*Al Qur'an dan Lingkungan*”. 29 Mei 2008
http://www.ghazali_sthi.blog.plasa.com/alquran-dan-lingkungan/ (diakses pada tanggal 11 juni 2009)
- Depkes RI, “*Pedoman Pemberantasan Penyakit ISPA*” . 2001
<http://putraprabu.wordpress.com/2009/01/15/faktor-resiko-isp-pada-balita>. (diakses tanggal 16 Juni 2010).
- Dr.dr. St. Fadilah Supari ,Sp,JP “ *Sistem Kesehatan Nasional Depkes RI 2009*”
<http://www.depkes.go.id/downloads/SKN%20final.pdf> (diakses tanggal 16 juni 2010)
- Irianto Kus, 2004. “*Gizi dan Pola hidup Sehat*” Bandung: Yrama Widya.
- Juli Soemirat Slamet. 2000. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- J. Mukono. 2000. *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*. Surabaya: Airlangga
- Keman, Soedajjadi, 2005. “*Kesehatan Perumahan dan lingkungan Pemukiman*”
Jurnal Kesehatan Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Republic Indonesia No. 41 Tentang Lingkungan Hidup Tahun 1996.*
- Prodjokusumo. 1995. *Air, kebersihan dan Kesehatan Lingkungan menurut ajaran Islam*.
- Profil, Puskesmas Manipi Kabupaten Sinjai, 2010.
- Profil, Kecamatan Sinjai barat Kabupaten Sinjai, 2010.
- Shihab, M. Quraish, Wawasan Al-Qur'an tentang Kesehatan (Suplemen) dalam
<http://media.isnet.org/islam/Quraish/Wawasan/Kesehatan1.html>(diakses Tanggal 08 Agustus 2010) .
- Sjahmien Moehji. 2003. *Ilmu Gizi dan Penanggulangan Gizi Buruk*. Jakarta: Papis Sinar Sinanti
- Soekidjo, Notoatmodjo. 1997. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: PT. Rineka

Cipta

Stang,2005. *Biostatistik*. Jurusan *Biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin*. Makassar

Sopiyudin Dahlan. 2004. *Statistik Untuk Kedokteran dan Kesehatan*. Jakarta. PT. Arkans

Srikandi Fardiaz. 1992. *Polusi Air dan Udara*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius

Syahri Alhusin. 2003. *Aplikasi Statistik Praktis dengan SPSS 10*.Yogyakarta. Graha Ilmu

Rahmatina, Mustari. “Faktor-faktor Yang berhubungan dengan Kejadian ISPA Pada Balita di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kab. Gowa tahun 2009”. Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar, 2009.

Uldayani, “Hubungan kondisi rumah dan Hygiene perorangan dengan kejadian ISPA di desa Kuajang Kec. Binuang Kab. Polman Tahun 2006”. Skripsi sarjana, fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin, 2006.