

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL DENGAN
KASUS HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT II
DI RSKD IBU DAN ANAK PERTIWI
TAHUN 2016**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Pendidikan Program
Ahli Madya Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

OLEH :

EKA SURYANINGRAT

NIM : 70400113001

**PRODI KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Suryaningrat
NIM : 70400113001
Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Bayur, 28 April 1995
Jurusan/ Prodi : Kebidanan
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar-benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain maka Karya Tulis Ilmiah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Makassar, 10 Mei 2017 M
13 Sya'ban 1438 H

Penyusun

EKA SURYANINGRAT
NIM : 70400113001

PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Eka Suryaningrat
Nim : 70400113001
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal dengan Kasus Hiperemesis Gravidarum Tingkat II di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Tahun 2016.

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan dalam seminar Hasil Karya Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Makassar, 10 Mei 2017 M
13 Sya'ban 1438 H

Pembimbing

Firdayanti, S.SiT.,M.Keb
NIP : 19751113 200604 2 0001

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Dengan Kasus Hiperemesis Gravidarum Tingkat II Di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Tahun 2016", yang disusun oleh **Eka Suryaningrat**, NIM: 70400113001, mahasiswa Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 29 Maret 2017 M, bertepatan dengan 1 Rajab 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan, Jurusan Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 10 Mei 2017 M
13 Sya'ban 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua :**Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc** (.....)

Sekretaris :**Fidayanti, S.SiT, M.Keb** (.....)

Pembimbing I :**Fidayanti, S.SiT, M.Keb** (.....)

Penguji I :**Andi Sri Hastuti Handayani, S.ST** (.....)

Penguji II :**dra.Hj.Hartini, M.HI** (.....)

Dekan


Dr.dr.H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP: 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahumma Shalli 'Ala Muhammad Wa 'Ala Ali Muhammad

Sebuah perjalanan hidup selalu memiliki awal dan akhir. Ibarat dunia ini yang memiliki permulaan dan akhir. Perjalanan hidup kurang lebih 4 tahun begitu terasa dalam sanubari. Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, menyita waktu, tenaga, dan pikiran, dapat merampungkan karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, sembari berserah diri dalam kerendahan hati dan kenistaan diri sebagai seorang hamba, maka sepantasnya puji syukur hanya diperuntukkan kepada sang Maha Kuasa, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan magfirah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Karya tulis ilmiah ini berjudul “Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Dengan Kasus Hiperemesis Gravidarum Tingkat II di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Tahun 2016”.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW suri tauladan bagi umat manusia. Semoga keselamatan dan kesejahteraan selalu tercurahkan kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, tabi'ut tabi'in yang telah memperjuangkan agama Islam sebagai agama samawi sekaligus pedoman hidup. Sebagai bagian dari seluruh makhluk Tuhan Allah SWT yang sangat membutuhkan

bantuan dari orang lain. Maka tepatlah bila menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada sederetan hamba-Nya yang telah memberikan sumbangsih baik berupa bimbingan, dukungan, dan materi serta bantuan lainnya yang diberikan, kiranya dapat dicatat oleh Allah SWT sebagai amal soleh. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya berikan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Suhermanto dan ibunda Nurnaningsih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, membesarkan dan mendidik penulis dengan tulus, ikhlas dan penuh kasih sayang. Serta saudara kandung yang tercinta Wahyu Kurniawan yang memberi semangat terhadap penulis. Terutama kepada tante Nurlaila dan yang turut membantu membiayai selama proses perkuliahan, terima kasih atas bantuannya. Maka tak lupa pula dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staffnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin M.Si selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staffnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Ibu Dr. Hj. Sitti Saleha, S.SiT, S.KM, M.Kes selaku Ketua Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Ibu Fidayanti, S.SiT, M.Keb selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.
5. Ibu Andi Sri Hastuti Handayani Usman, S.ST selaku dosen penguji I dan ibu Dra. Hj. Hartini, M.HI sebagai dosen penguji II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberikan pengarahan dan masukan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.
6. Kepada segenap Dosen dan staff Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas ilmu dan pengetahuan yang diberikan.
7. Kepada om Muhammad Muchlis dan tante Dra. Hj. Sri Winarti sekaligus sebagai orang tua angkat di Jalan Sultan Alauddin II Lorong 5 Kompleks BPD yang telah mengizinkan tinggal dirumahnya selama kurang lebih 2 tahun serta membantu membiayai dalam proses perkuliahan.
8. Kepada saudari-saudari di Asrama Mahasiswa Berau Puteri (AMB-Puteri) terima kasih telah tinggal bersama memberi dukungan, motivasi dan kebersamaannya yang tak akan terlupakan. Dan saudara-saudara di Asrama Mahasiswa Berau Putra (AMB-Banua) yang tidak dapat saya sebutkan nama-namanya terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis. Serta saudara-saudari dalam organisasi Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau Cabang Makassar (KPMKB Cab. Makassar) terima kasih atas persaudaraan dan ilmu yang diberikan selama berorganisasi.

9. Kepada seluruh angkatan 2013 khususnya kelas Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah menemani penulis baik dalam suka maupun duka.
10. Kepada kakanda Romansyah, ST., dan seluruh sahabat-sahabat Mawar Nurani, Muftihatun Ni'mah Haruna, Sri Wahyuni Rustam, Khairatu Fauziah, Nabila Amalia Hanisyaputri, Andi Iwin Octaviani, Mutiara Herman, Nadya Estu Setiorini, Sugianti Mansur, Nurul Yulia Nengsih Pratiwi, Nurul Intan Safitri Arifin, Rahmi, Bagus Prasetyo, Muhammad Nur Rifa'I, Subhan, Muhammad Sabri yang telah menemani dan banyak memberi dukungan, motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan diterima oleh Allah SWT dan diberikan balasan setimpal. Penulis menyadari masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam karya tulis ilmiah ini, oleh karena itu sangat mengharapkan saran dan masukan, maka penulis akan dengan senang hati menerimanya. Akhir kata semoga karya tulis ilmiah ini bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 10 Mei 2017 M
13 Sya'ban 1438 H

Penyusun

EKA SURYANINGRAT
NIM : 70400113001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	ii
PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1-8
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Lingkup Pembahasan.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penulisan.....	5
E. Metode Penulisan.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II PEMBAHASAN.....	9-49
A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan.....	9
1. Definisi Kehamilan.....	9
2. Proses Kehamilan.....	10
3. Tanda-Tanda Kehamilan.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Hiperemesis Gravidarum.....	18
1. Definisi Hiperemesis Gravidarum.....	16
2. Etiologi Hiperemesis Gravidarum.....	19

3. Diagnosis Hiperemesis Gravidarum.....	20
4. Patofisiologi Hiperemesis Gravidarum.....	21
5. Tanda dan Gejala Hiperemesis Gravidarum.....	23
6. Pencegahan Hiperemesis Gravidarum.....	25
C. Tinjauan Khusus Hiperemesis Gravidarum Tingkat II.....	31
1. Definisi Hiperemesis Gravidarum Tingkat II.....	31
2. Penanganan Hiperemesis Gravidarum Tingkat II.....	32
D. Tinjauan Islam Tentang Kehamilan.....	33
E. Manajemen Asuhan Kebidanan Dengan Kehamilan Hiperemesis Tingkat II.....	38
1. Definisi Asuhan Kebidanan.....	38
2. Tahapan Manajemen Kebidanan.....	38
3. Dokumentasi Kebidanan.....	47
BAB III STUDI KASUS.....	50-76
BAB IV PEMBAHASAN.....	77-95
A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar.....	77
B. Langkah II : Identifikasi Diagnosa/Masalah Aktual.....	86
C. Langkah III : Identifikasi Diagnosa/Masalah Potensial.....	88
D. Langkah IV : Tindakan Segera/Kolaborasi.....	90
E. Langkah V : Intervensi.....	91
F. Langkah VI : Implementasi.....	94
G. Langkah VII : Evaluasi.....	95

BAB V PENUTUP.....	96-98
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, kehamilan merupakan fertilisasi atau penyatuan spermatozoa dan ovum lalu terjadi nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan berlangsung 40 minggu atau 10 bulan menurut kalender internasional (Prawirohardjo, 2009).

Mual muntah terjadi pada 60-80% primigravida dan 40-60% multigravida. Satu diantara 1000 kehamilan gejala-gejala ini menjadi lebih berat. Perasaan mual ini disebabkan oleh karena meningkatnya kadar hormon estrogen HCG dalam serum. Pengaruh fisiologis kenaikan hormon ini belum jelas, mungkin karena sistem saraf pusat atau pengosongan lambung yang kurang.

Pada umumnya wanita dapat menyesuaikan dengan keadaan ini meskipun demikian gejala mual muntah yang berat berlangsung sampai 4 bulan. Pekerjaan sehari-hari menjadi terganggu dan keadaan umum menjadi buruk. Keadaan ini disebut hiperemesis gravidarum. Keluhan gejala dan perubahan fisiologi menentukan berat ringannya penyakit. Hiperemesis gravidarum yang tidak mendapatkan penanganan yang baik dapat pula menyebabkan kematian pada ibu hamil (Wiknjosastro, 2007).

WHO (Word Health Organization) memperkirakan setiap tahunnya 500.000 ibu meninggal sebagai akibat langsung dari kehamilan. Ironisnya sebagian besar kematian ibu dapat dicegah dengan teknologi sederhana. Kesukaran dalam mengukur kematian ibu sudah lama menjadi kendala dalam menyadarkan para perencana kesehatan dan pihak lainnya akan besarnya masalah serta penyebabnya, sehingga menghambat intervensi yang efektif dalam porsi yang memadai. Lebih dari dua pertiga kejadian kehamilan masih berada dalam perlindungan/pertolongan para dukun yang mudah dimengerti mempunyai tingkat keamanan yang rendah (Denis, 2008).

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah wanita yang meninggal mulai dari saat hamil hingga 6 minggu setelah persalinan per 100.000 persalinan. Pada 2015, AKI di Indonesia menjadi 102/100.000 Kelahiran Hidup (KH). AKI berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu ibu melahirkan dan masa nifas (<http://dinkeskotamakassar.net/download/718Gabung%20profil%202013.pdf>).

Survei Demografi Kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa terdapat Angka Kematian Ibu (AKI) 390/100.000 KH. Sebab utama kematian ibu salah adalah perdarahan, infeksi, eklampsia, partus lama, dan komplikasi abortus. Selain itu, penyebab kematian ibu tidak langsung antar lain gangguan pada kehamilan (Salmah, 2006).

Data provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 dari 43 Puskesmas di Kota Makassar diketahui jumlah ibu hamil yaitu 26.772 orang. Dengan perkiraan ibu hamil disertai komplikasi kebidanan yaitu 5.354 orang. Dan penanganan komplikasi kebidanan yaitu 3.373 atau 62,99% (<http://dinkes.sulselprov.go.id/#>).

Berdasarkan hasil dari data penelitian di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi pada tahun 2013 terdapat 4.662 orang ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya di Polik Kandungan, ibu dengan kehamilan normal yaitu 3.659 orang, ibu hamil dengan anemia 344 orang, dan sebanyak 161 orang ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum. Pada tahun 2014, terdapat 5.772 orang ibu yang memeriksakan kehamilannya, ibu dengan kehamilan normal sebanyak 5.165 orang, dan sebanyak 141 orang ibu dengan hiperemesis gravidarum. Sedangkan pada tahun 2015, ibu di rawat jalan dengan hiperemesis gravidarum sebanyak 20 orang, sebanyak 41 orang di rawat inap.

Mengingat kasus hiperemesis gravidarum dapat menimbulkan komplikasi yang lebih berat dan mempengaruhi status kesehatan ibu dan anak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Dengan Kasus Hiperemesis Gravidarum Tingkat II di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Tahun 2016”

B. Rumusan Lingkup Pembahasan

Dalam pembahasan studi ini menggunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan antenatal pada kasus kehamilan hiperemesis gravidarum tingkat II di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Melaksanakan asuhan kebidanan pada kasus kehamilan hiperemesis gravidarum serta dapat menerapkan manajemen asuhan kebidanan secara nyata sesuai standar dan wewenang bidan di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi.

2. Tujuan Khusus

- a. Melaksanakan pengumpulan data dan analisis data dasar pada kasus kehamilan hiperemesis gravidarum tingkat II di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi.
- b. Melaksanakan perumusan diagnosa/masalah aktual pada kasus kehamilan hiperemesis gravidarum tingkat II di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi.
- c. Melaksanakan perumusan diagnosa/masalah potensial pada kasus kehamilan hiperemesis gravidarum tingkat II di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi.
- d. Melaksanakan pengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada kasus kehamilan hiperemesis gravidarum tingkat II di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi.
- e. Melaksanakan rencana tindakan asuhan kebidanan sesuai dengan kasus kehamilan hiperemesis gravidarum tingkat II di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi.
- f. Melaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada kasus kehamilan hiperemesis gravidarum tingkat II di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi.

- g. Melaksanakan evaluasi tindakan asuhan kebidanan pada kasus kehamilan hiperemesis gravidarum tingkat di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi.
- h. Melaksanakan pendokumentasikan semua temuan dan tindakan dalam asuhan kebidanan yang telah di laksanakan pada kasus kehamilan hiperemesis gravidarum tingkat II di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan pada kasus tersebut di atas adalah :

- 1. Merupakan bahan pembelajaran, sumber pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam menangani kehamilan hiperemesis gravidarum tingkat II.
- 2. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada akademik kebidanan UIN Alauddin Makassar.
- 3. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi petugas kesehatan, utamanya yang ada di dalam menangani kasus kehamilan hiperemesis gravidarum tingkat II.
- 4. Sebagai sumber informasi dan menambah pengetahuan bagi para pembaca tentang kehamilan hiperemesis gravidarum tingkat II.

E. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah:

- 1. Studi Pustaka

Penulis membaca dan mempelajari buku-buku serta literature yang berhubungan dengan kasus kehamilan hiperemesis gravidarum tingkat II.

2. Studi Kasus

Dengan menggunakan pendekatan proses manajemen asuhan kebidanan yang meliputi pengumpulan data, analisa dan perumusan diagnosa/masalah aktual dan potensial, perencanaan tindakan, evaluasi dan pendokumentasian.

Untuk memperoleh data dalam pengkajian, penulis menggunakan teknik:

a. Anamnesa

Penulis melakukan tanya jawab dengan klien, keluarga, bidan dan dokter yang berada di kamar bersalin yang berhubungan dengan kasus yang dihadapi pasien.

b. Observasi

Penulis memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan langsung.

c. Pemeriksaan fisik

Penulis melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh dan sistematis agar didapatkan data yang akurat.

3. Studi Dokumentasi

Penulis memperoleh informasi berdasarkan catatan medik klien, baik dari bidan, dokter maupun data penunjang lainnya.

a. Diskusi

Penulis melakukan diskusi dengan tenaga kesehatan, pembimbing dan institusi demi kelancaran penulisan karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam studi kasus ini sebagai berikut:


BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Ruang Lingkup Pembahasan
- C. Tujuan Penulisan
- D. Manfaat Penulisan
- E. Metode Penulisan
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan
 - 1. Definisi Kehamilan
 - 2. Proses Kehamilan
 - 3. Tanda-tanda Kehamilan
- B. Tinjauan Umum Tentang Hiperemesis Gravidarum.
 - 1. Definisi Hiperemesis Gravidarum
 - 2. Etiologi Hiperemesis Gravidarum.
 - 3. Diagnosis Hiperemesis Gravidarum.
 - 4. Patofisiologi Hiperemesis Gravidarum.
 - 5. Tanda dan Gejala Hiperemesis Gravidarum.
 - 6. Pencegahan Hiperemesis Gravidarum
 - 7. Pengobatan Hiperemesis Gravidarum

- C. Tinjauan Khusus Tentang Hiperemesis Gravidarum Tingkat II
 - 1. Definisi Hiperemesis Gravidarum Tingkat II
 - 2. Penanganan Hiperemesis Gravidarum Tingkat II
- D. Tinjauan Islam Tentang Kehamilan
- E. Manajemen Asuhan Kebidanan Dengan Kehamilan Hiperemesis Gravidarum Tingkat II
 - 1. Definisi Asuhan Kebidanan
 - 2. Tahapan Manajemen Asuhan Kebidanan
 - 3. Dokumentasi Kebidanan



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kehamilan

1. Definisi Kehamilan

Kehamilan merupakan fertilisasi spermatozoa dan ovum hingga terjadi pembelahan sel lalu melakukan nidasi atau implantasi pada dinding saluran reproduksi yaitu pada lapisan endometrium dinding kavum uterus, pertumbuhan dan perkembangan zigot-embryo-janin menjadi bakal individu baru (Margareth, 2013).

Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterine mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan. Selain itu, kehamilan juga merupakan suatu proses reproduksi yang perlu perawatan khusus agar dapat berlangsung dengan baik demi tercapainya persalinan yang aman dan melahirkan bayi yang sehat (Maulana, 2010).

Kehamilan merupakan penyatuan dari sel mani dan sel telur didalam ampula tuba kemudian terjadi nidasi/penempelan pada dinding rahim, terus hingga mengalami perkembangan dan pertumbuhan janin dalam waktu 40 minggu (Saifuddin, 2009).

Menurut Federasi Obstetri Ginekologi Internasional, kehamilan merupakan fertilisasi atau penyatuan spermatozoa dan ovum lalu terjadi nidasi atau implantasi. Bila dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi, kehamilan

normal akan berlangsung 40 minggu atau 10 bulan menurut kalender internasional (Prawirohardjo, 2009).

Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterine mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai pemulaan persalinan. Selain itu, kehamilan juga merupakan suatu proses reproduksi yang perlu perawatan khusus agar dapat berlangsung dengan baik demi tercapainya persalinan yang aman dan melahirkan bayi yang sehat (Manuaba, 2010).

2. Proses Kehamilan

Proses kehamilan merupakan matarantai bersinambung dan terdiri dari ovulasi, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi (implantasi) pada uterus, pembentukan plasenta, dan tumbuh-kembang hasil konsepsi sampai aterm.

a. Ovulasi

Ovulasi adalah proses pelepasan ovum yang dipengaruhi oleh sistem hormonal yang kompleks. Ovum yang dilepaskan segera ditangkap oleh fimbriae tuba. Ovum yang ditangkap terus berjalan mengikuti tuba menuju uterus, dalam bentuk pematangan pertama, artinya telah siap untuk dibuahi.

b. Spermatozoa

Proses pembentukan spermatozoa merupakan proses yang kompleks. Spermatogonium berasal dari sel primitif tubulus menjadi spermatosit pertama, menjadi spermatosit kedua, menjadi sprematid, akhirnya menjadi spermatozoa.

Pertumbuhan spermatozoa dipengaruhi matarantai hormonal yang kompleks dari panca indra, hipotalamus, hipofisis, dan sel intersial *Leydig* sehingga terbentuk spermatogonium dapat mengalami proses mitosis. Pada setiap hubungan seksual dikeluarkan sekitar 3 cc sperma yang mengandung 40-60 juta spermatozoa setiap cc.

Sebagian besar spermatozoa mengalami kematian dan hanya beberapa ratus yang dapat mencapai tuba fallopi. Spermatozoa yang masuk ke dalam alat genitalia wanita dapat hidup selama 3 hari, sehingga cukup waktu untuk mengadakan konsepsi.

c. Konsepsi

Pertemuan inti ovum dengan inti spermatozoa disebut konsepsi atau fertilisasi dan membentuk zigot. Ovum yang dilepaskan dalam proses ovulasi diliputi oleh korona radiata yang mengandung persediaan nutrisi. Pada ovum, dijumpai inti dalam bentuk metafase di tengah sitoplasma yang disebut *vitelus*. Dalam perjalanan, korona radiata makin berkurang pada zona pelusida. Nutrisi dialirkan ke dalam vitelus melalui saluran pada zona pelusida.

Konsepsi terjadi pada pars ampularis tuba yaitu tempat yang paling luas, dindingnya penuh jonjot dan tertutup sel yang mempunyai silia. Ovum mempunyai waktu hidup terlama di dalam ampula. Ovum siap dibuahi setelah 12 jam dan hidup selama 48 jam.

Spermatozoa menyebar masuk melalui kanalis servikalis dengan kekuatan sendiri. Pada kavum uteri, terjadi proses kapasitasi yaitu pelepasan lipoprotein dari sperma sehingga mampu mengadakan fertilisasi. Spermatozoa melanjutkan perjalanan menuju tuba falopi dan akan mengelilingi ovum yang telah siap dibuahi serta mengikis korona radiata dan zona pelusida dengan proses enzimatik yaitu *hialuronidase*. Melalui stomata, spermatozoa memasuki ovum. Setelah kepala masuk ke dalam ovum, ekornya lepas dan tertinggal di luar. Kedua inti ovum dan inti spermatozoa bertemu dengan membentuk zigot.

d. Implantasi

Masuknya inti spermatozoa ke dalam sitoplasma, vitelus membangkitkan kembali pembelahan dalam inti ovum yang dalam keadaan metafase. Proses pemecahan dan pematangan mengikuti bentuk anafase dan telofase sehingga pronukleusnya menjadi haploid. Pronukleus spermatozoa dalam keadaan haploid saling mendekati dengan inti ovum yang kini haploid dan bertemu dalam pasangan pembawa tanda dari pihak pria maupun wanita.

Setelah pertemuan kedua inti ovum dan spermatozoa terbentuk zigot yang dalam beberapa jam telah mampu membelah dirinya menjadi dua dan seterusnya. Bersamaan dengan pembelahan inti, hasil konsepsi terus berjalan menuju uterus. Hasil pembelahan sel memenuhi seluruh ruangan dalam ovum yang besarnya 0,1 mm. Selama pembelahan sel dibagian dalam, terjadi pembentukan sel dibagian luar morula yang kemungkinan berasal dari korona

radiata yang menjadi sel trofoblas. Sel troblas dalam pertumbuhannya mampu mengeluarkan hormon korionik gonadotropin yang mempertahankan korpus luteum gravidarum.

Pembelahan berjalan terus dan didalam morula terbentuk ruangan yang mengandung cairan yang disebut blastula. Perkembangan dan pertumbuhan berlangsung, blastula dan vili korealisnya yang dilapisi sel trofoblas telah siap untuk mengadakan nidasi.

Sementara pada fase sekresi, endometrium telah menebal dan makin banyak mengandung glikogen yang disebut desidua. Sel trofoblas yang meliputi primer vili korealis melakukan destruksi enzimatik-proyeolitik sehingga dapat menanamkan diri didalam endometrium. Proses penanaman blastula yang disebut nidasi atau implantasi terjadi pada hari ke-6 sampai 7 setelah konsepsi. Pada saat tertanamnya blastula ke dalam endometrium mungkin terjadi perdarahan yang disebut *hartman*.

e. Plasenta

Nidasi atau implantasi terjadi pada bagian fundus uteri di dinding depan atau belakang. Pada blastula penyebaran sel trofoblas yang tumbuh tidak rata sehingga blastula dengan *inner cell mass* akan tertanam ke dalam endometrium. Sel trofoblas menghancurkan endometrium sampai terjadi pembentukan palsenta yang berasal dari primer vili korealis.

Terjadi implantasi mendorong sel blastula mengadakan diferensiasi. Sel dekat dengan ruangan eksoselom membentuk entoderm dan kantong kuning

telur sedangkan sel lain membentuk ektoderm dan ruangan amnion. Plat embrio terbentuk diantara dua ruang yaitu ruang amnion dan kantong kuning telur. Plat embrio terdiri dari unsur ektoderm, entoderm, dan mesoderm. Ruangan amnion dengan cepat mendekati korion sehingga jaringan yang terdapat diantara amnion dan embrio padat dan berkembang menjadi tali pusat.

Awalnya kantong kuning telur berfungsi sebagai pembentuk darah bersama dengan hati, limpa, dan sumsum tulang. Pada minggu kedua sampai ketiga terbentuk bakal jantung dengan pembuluh darahnya yang menuju *body stalk* (bakal tali pusat). Jantung bayi mulai dapat dideteksi pada minggu keenam sampai delapan dengan menggunakan ultrasonografi atau Doppler.

Pembuluh darah pada *body stalk* terdiri dari arteri umbilikus dan vena umbilikus. Cabang arteri dan vena umbilikus masuk ke vili korealis sehingga dapat melakukan pertukaran nutrisi dan sekaligus membuang hasil metabolisme yang tidak diperlukan.

Dengan berbagai implantasi dimana posisi plat embrio berada akan dijumpai bervariasi dari insersio tali pusat yaitu insersio sentralis, pars sentralis, marginalis atau insersio vilamentosa.

Vili korealis menghancurkan desidua sampai pembuluh darah mulai dengan pembuluh darah vena pada hari ke-10 sampai 11 setelah konsepsi sehingga sejak saat itu embrio mendapat tambahan nutrisi dari darah ibu secara langsung. Selanjutnya vili korealis menghancurkan pembuluh darah

arteri sehingga terjadilah aliran darah pertama reprotoplasenter pada hari ke-14 sampai 15 setelah konsepsi. Bagian desidua yang tidak dihancurkan membagi plasenta menjadi sekitar 15-20 kotiledon maternal. Pada janin plasenta akan dibagi menjadi sekitar 200 kotiledon fetus. Setiap kotiledon fetus terus bercabang dan mengambang ditengah aliran darah untuk menunaikan fungsinya memberikan nutrisi, pertumbuhan, dan perkembangan janin dalam rahim ibu. Darah ibu dan janin tidak berhubungan langsung dan dipisahkan oleh lapisan trofoblas dinding pembuluh darah janin. Fungsinya dilakukan berdasarkan sistem osmosis dan enzimatik serta pinositosis. Situasi plasenta tersebut disebut *sistem plasenta-hemokorial*.

Sebagian dari vili korealis tetap berhubungan dengan pars basalis desidua tetapi tidak sampai menembusnya. Hubungan vili korealis dengan lapisan desidua dibatasi oleh jaringan fibrotik yang disebut lapisan *Nitabusch*. Melalui lapisan *Nitabusch* plasenta dilepaskan pada saat persalinan kala tiga (kala uri).

Dengan terjadinya implantasi maka desidua terbagi menjadi desidua basalis yang berhadapan dengan korion frondosum yang berkembang menjadi plasenta, desidua kapsularis yang menutupi hasil konsepsi, desidua yang berlawanan dengan desidua kapsularis disebut desidua parietalis, kelanjutan desidua kapsularis dan desidua parietalis disebut desidua reflexa. Vili korealis yang tumbuhnya tidak subur disebut *korion leaf* (Manuaba, 2014).

3. Tanda-tanda Kehamilan

Menurut Manuaba (2014), tanda-tanda kehamilan dibagi menjadi 3 yaitu:

- a. Tanda dugaan kehamilan
 - 1) Amenorea (tidak haid). Konsepsi dan implantasi menyebabkan tidak terjadi pembentukan folikel *de Graf* dan ovulasi.
 - 2) Emesis (mual dan muntah). Pengaruh estrogen-progesteron menyebabkan pengeluaran asam lambung yang berlebihan. Mual dan muntah terutama pada pagi hari disebut *morning sickness*. Dalam batas fisiologis, keadaan ini dapat diatasi. Akibat mual dan muntah, nafsu makan berkurang.
 - 3) Ngidam. Wanita hamil sering menginginkan makanan tertentu yang disebut ngidam.
 - 4) Sinkope (pingsan). Terjadinya gangguan sirkulasi ke darah kepala menyebabkan iskemia susunan saraf pusat dan menimbulkan sinkope atau pingsan. Keadaan ini menghilang setelah usia kehamilan 10 minggu.
 - 5) Payudara tegang. Pengaruh estrogen-progesteron dan somatomamotrofin menimbulkan deposit lemak, air, dan garam pada payudara. Payudara membesar dan tegang. Ujung saraf tertekan menyebabkan rasa sakit pada hamil pertama.
 - 6) Sering miksi. Desakan rahim ke depan menyebabkan kandung kemih cepat terasa penuh dan sering miksi. Pada trimester kedua gejala ini akan menghilang.

- 7) Konstipasi atau obstipasi. Pengaruh progesteron dapat menghambat peristaltik usus meyebabkan kesulitan untuk buang air besar.
- 8) Pigmentasi kulit. Keluarnya *melanophore stimulating hormone* hipofisis anterior meyebabkan pigmentasi kulit disekitar pipi yang disebut *chlosmagravidarum*, pada dinding perut disebut striae lividae, striae nigra, linea alba yang berwarna hitam, dan sekitar payudara terlihat hiperpigmentasi areola mammae, puting susu makin menonjol.
- 9) Epulis. Hipertrofi gusi disebut epulis dapat terjadi apabila hamil.
- 10) Penampakan pembuluh darah vena (varises). Pengaruh dari estrogen-progesteron terjadi penampakan pembuluh darah vena. Biasa terjadi disekitar genitalia eksterna, kaki dan betis, serta payudara. Dan penampakan pembuluh darah ini dapat menghilang setelah persalinan.
- b. Tanda kemungkinan kehamilan
- 1) Rahim membesar sesuai umur kehamilan.
 - 2) Pada pemeriksaan dalam, terdapat tanda Hegar, tanda Chadwick, tanda Piscaseck, kontraksi Braxton Hicks, dan teraba ballottement.
 - 3) Pemeriksaan biologis kehamilan positif. Tetapi sebagian kemungkinan positif palsu.
- c. Tanda pasti kehamilan
- 1) Gerakan janin dalam rahim.
 - 2) Terdengar denyut jantung janin (DJJ).
 - 3) Teraba bagia-bagian janin.

- 4) Pada pemeriksaan USG terlihat adanya kantong kehamilan.

B. Tinjauan Umum Tentang Hiperemesis Gravidarum

1. Definisi Hiperemesis Gravidarum

Mual dan muntah merupakan hal yang umum terjadi pada awal kehamilan (trimester I). Biasanya terjadi pada pagi hari disebut *morning sickness*, namun tidak menutup kemungkinan terjadi pada siang dan malam hari. Mual dan muntah yang berlebihan dan terjadi sepanjang hari sampai mengganggu pekerjaan sehari-hari dan menyebabkan dehidrasi disebut hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum lebih banyak terjadi pada kehamilan primigravida daripada multigravida (Fauziyah, 2012).

Hiperemesis gravidarum merupakan muntah yang berlebihan pada ibu hamil yang terjadi mulai dari minggu ke-6 kehamilan dan dapat berlangsung sampai minggu ke-12 atau lebih (Lisnawati, 2012).

Hiperemesis gravidarum merupakan komplikasi mual dan muntah pada ibu hamil muda bila terjadi terus menerus dapat menyebabkan dehidrasi dan tidak seimbangnya elektrolit dengan alkosis hipokloremik (Rahmawati, 2011).

Hiperemesis gravidarum merupakan gangguan pada kehamilan muda yang paling sering ditemui, biasanya cukup parah hingga berlangsung sepanjang hari dengan tingkatan yang berbeda-beda. Sebanyak 90% ibu mengalami mual selama kehamilan dan setengahnya disertai muntah (Maulana, 2010).

2. Etiologi Hiperemesis Gravidarum

Penyebab kejadian hiperemesis gravidarum belum diketahui dengan pasti. Tidak ada bukti bahwa penyakit ini disebabkan oleh faktor toksik, juga ditemukan kelainan biokimia. Perubahan-perubahan anatomik pada otak, jantung, hati dan susunan saraf, disebabkan oleh kekurangan vitain serta zat-zat akibat inanisi.

Tetapi beberapa faktor predisposisi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Faktor adaptasi dan hormonal. Pada wanita hamil yang kekurangan darah lebih sering terjadi hiperemesis gravidarum. Dapat dimasukkan dalam ruang lingkup faktor adaptasi adalah wanita hamil dengan anemia, wanita primigravida, dan overdistensi rahim pada hamil kembar dan hamil mola hidatidosa. Sebagian kecil primigravida belum mampu beradaptasi terhadap hormon estrogen dan korionik gonadotropin, sedangkan pada hamil kembar dan mola hidatidosa, jumlah hormon yang dikeluarkan terlalu tinggi dan menyebabkan terjadi hiperemesis gravidarum itu.

Faktor psikologis. Hubungan faktor psikologis dengan kejadian hiperemesis gravidarum belum jelas. Besar kemungkinan bahwa wanita yang menolak hamil, takut kehilangan pekerjaan, keretakan hubungan dengan suami dan sebagainya, diduga dapat menjadi faktor kejadian hiperemesis gravidarum. Dengan perubahan suasana dan masuk rumah sakit penderitaannya dapat berkurang sampai menghilang.

Faktor alergi. Pada kehamilan, ketika diduga terjadi invasi jaringan villi korialis yang masuk ke dalam peredaran darah ibu, maka faktor alergi dianggap dapat menyebabkan hiperemesis gravidarum (Manuaba, 2014).

3. Diagnosis Hiperemesis Gravidarum

Menetapkan kejadian hiperemesis gravidarum tidak sukar, dengan menentukan kehamilan, muntah berlebihan sampai menimbulkan gangguan kehidupan sehari-hari dan dehidrasi. Muntah yang terus menerus tanpa pengobatan dapat menimbulkan gangguan tumbuh kembang janin dengan manifestasi klinisnya. Oleh karena itu, hiperemesis gravidarum berkelanjutan harus dicegah dan harus mendapat pengobatan yang adekuat.

Kemungkinan penyakit lain yang menyertai kehamilan harus berkonsultasi dengan dokter tentang penyakit hati, ginjal, dan penyakit tukak lambung. Pemeriksaan laboratorium dapat membedakan ketiga kemungkinan hamil yang disertai penyakit (Manuaba, 2014).

Hiperemesis gravidarum harus dibedakan dengan penyakit lain karena gejala dari hiperemesis gravidarum juga terdapat pada penyakit lain seperti ulserasi peptikum, hepatitis, pankreatitis, penyakit tiroid obstruksi, gastrointestinal, dan insifikasi adrenokartikol. Timbulnya gejala setelah usia kehamilan 10 minggu merupakan gejala yang khas untuk hiperemesis gravidarum. Pemeriksaan laboratorium seperti hematokrit, transaminase, bilirubin, tes fungsi tiroid, dan urin (ketonuria dan pH) harus dilakukan (Fauziyah, 2012).

4. Patofisiologi Hiperemesis Gravidarum

Mual adalah rasa ingin muntah yang dapat disebabkan oleh impuls iritasi yang datang dari traktus gastrointestinal, impuls yang berasal dari otak bawah yang berhubungan dengan motion sickness maupun impuls yang berasal dari korteks serebral untuk memulai muntah.

Didalam tubuh terjadi peradangan lambung sehingga menyebabkan terjadi iritasi pada lambung dan menyebabkan peradangan di lambung yang diakibatkan oleh tingginya asam lambung. Setelah terjadi peradangan lambung, maka tubuh akan merangsang pengeluaran zat yang disebut vas aktif yang menyebabkan permeabilitas kapiler pembuluh darah naik. Sehingga menyebabkan lambung menjadi oedema (bengkak) dan merangsang reseptor tegangan dan merangsang hipotalamus untuk mual.

Muntah adalah pengeluaran isi lambung/perut melalui esofagus dan mulut karena terjadi kontaksi otot abdominal dan otot dada yang disertai dengan penurunan diafragma dan kontrol oleh pusat muntah otak.

Lambung memberi sinyal ke zona kemoreseptor oleh sistem saraf aferen dan saraf simpatis sehingga menyebabkan kontaksi antiperistaltik dan menyebabkan makanan kembali ke duodenum dan lambung setelah masuk ke usus. Sehingga banyak terkumpul makanan di lambung dan mengganggu kerja lambung dan duodenum akibatnya duodenum teregang mengakibatkan kontaksi kuat diafragma dan otot dinding abdominal dapat menyebabkan tekanan didalam lambung tinggi. Setelah itu, kita bernafas dalam dan naiknya tulang lidah dan

laring untuk menarik sfingter esofagus bagian atas supaya terbuka sementara sfingter bagian bawah berelaksasi dan pengeluaran isi lambung melalui esofagus keluar (<https://www.slideshare.net/ndejava/mekanisme-mual-dan-muntah>).

Gejala mual biasanya disertai muntah umumnya terjadi pada awal kehamilan, biasanya pada trimester pertama disebut emesis gravidarum atau nama lainnya nausea gravidarum (NVP) atau lebih dikenal dengan istilah *morning sickness*. Kondisi ini umumnya disebabkan karena meningkatnya kadar hormon estrogen. Dalam beberapa kasus, gejala yang sama pula dialami oleh para wanita yang menggunakan kontrasepsi hormonal atau menjalani bentuk-bentuk terapi hormonal tertentu. Gejala ini biasanya timbul di pagi hari dengan frekuensi yang akan menurun setiap harinya seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Namun, mual juga disertai muntah dapat bertahan lama bahkan bisa mengalami mual dan muntah secara berlebihan yang disebut hiperemesis gravidarum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AL-AUDDIN MAKASSAR

Adapun penyebab atas gejala yang dapat menimbulkan terjadinya mual dan muntah belum diketahui secara pasti, namun perkiraan beberapa penyebab antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kadar sirkulasi hormon estrogen dalam tubuh. Kadar hormon estrogen dalam tubuh umumnya akan meningkat pada masa kehamilan.
- b. Kadar gula dalam darah yang rendah (hipoglikemia) yang disebabkan penyerapan energi yang dilakukan oleh plasenta.

- c. Meningkatnya kadar hormon hCG dikarenakan sel telur yang sudah dibuahi menempel pada dinding rahim sehingga tubuh akan memproduksi hormon hCG.
- d. Meningkatnya sensivitas terhadap bau atau aroma tertentu.
- e. Peningkatan kadar bilirubin yang disebabkan karena meningkatnya kadar enzim dalam hati (https://id.wikipedia.org/wiki/Emesis_gravidarum).

Hiperemesis gravidarum dapat mengakibatkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi. Karena oksidasi lemak yang tidak sempurna terjadilah ketosis dengan tertimbunnya asam aseton-asetik, asam hidroksi butirik dan aseton dalam darah. Kekurangan cairan yang diminum dan kehilangan karena muntah menyebabkan dehidrasi sehingga cairan ekstraseluler dan plasma berkurang. Natrium dan klorida darah dan klorida air kemih turun.

Selain itu juga dapat menyebabkan hemokonsentrasi sehingga aliran darah ke jaringan berkurang. Kekurangan kalium sebagai akibat dari muntah dan bertambahnya ekskresi lewat ginjal menambah frekuensi muntah-muntah lebih banyak, dapat merusak hati dan terjadilah lingkar setan yang sulit dipatahkan. Selain dehidrasi dan terganggunya keseimbangan elektrolit dapat terjadi robekan pada selaput lendir esofagus dan lambung (Sindroma Mallory-Weiss) dengan akibat perdarahan gastrointestinal (Rahmawati, 2011).

5. Tanda dan Gejala Hiperemesis Gravidarum

Menurut Manuaba (2014) adapun gejala dan tanda sesuai hiperemesis gravidarum tingkatannya, yaitu;

Hiperemesis gravidarum tingkat pertama:

- a. Muntah berlangsung terus
- b. Nafsu makan berkurang
- c. Berat badan menurun
- d. Kulit dehidrasi-tonusnya lemah
- e. Nyeri di daerah epigastrium
- f. Tekanan darah turun dan nadi meningkat
- g. Lidah kering
- h. Mata tampak cekung

Hiperemesis gravidarum tingkat kedua:

- a. Penderita tampak lebih lemah
- b. Gejala dehidrasi makin tampak mata cekung, turgor kulit makin kurang, lidah kering dan kotor
- c. Tekanan darah turun, nadi meningkat
- d. Berat badan makin menurun
- e. Mata ikterus
- f. Gejala hemokonsentrasi makin tampak: urine berkurang, badan aseton dalam urine meningkat
- g. Terjadinya gangguan buang air besar
- h. Mulai tampak gejala gangguan kesadaran, menjadi apatis
- i. Napas berbau aseton

Hiperemesis gravidarum tingkat ketiga:

- a. Muntah berkurang
- b. Keadaan umum wanita hamil makin menurun: tekanan darah turun, nadi meningkat, dan suhu naik disertai keadaan dehidrasi makin jelas
- c. Gangguan faal hati terjadi dengan manifestasi ikterus
- d. Gangguan kesadaran dalam bentuk: somnolen sampai koma dengan komplikasi susunan saraf pusat (ensefalopati Wernicke), nistagmus-perubahan arah bola mata, diplopia-gambar tampak ganda, perubahan mental.

6. Pencegahan Hiperemesis Gravidarum

Pencegahan terhadap hiperemesis gravidarum perlu dilaksanakan dengan jalan memberikan penerapan tentang kehamilan dan persalinan sebagai suatu proses yang fisiologik, memberikan keyakinan bahwa mual dan kadang-kadang muntah merupakan gejala yang fisiologik pada kehamilan muda dan akan hilang setelah kehamilan 4 bulan, menganjurkan mengubah makan sehari-hari dengan makanan dalam jumlah kecil tapi sering. Waktu bangun pagi, jangan segera turun dari tempat tidur, terlebih dahulu makan roti kering atau biskuit dengan teh hangat. Makan yang berminyak dan berbau lemak sebaiknya dihindarkan. Makanan seyogyanya disajikan dalam keadaan panas atau sangat dingin. Defekasi teratur, menghindari kekurangan karbohidrat merupakan faktor penting, dianjurkan makanan yang banyak megandung gula (Rahmawati, 2011).

1) Diet

Diet hiperemesis gravidarum adalah penekanan karbohidrat kompleks terutama pada pagi hari, serta menghindari makanan yang berlemak dan goreng-gorengan untuk menekan rasa mual dan muntah, sebaiknya diberi jarak dalam pemberian makan dan minum. Diet bertujuan untuk mengganti persediaan glikogen tubuh dan mengontrol asodosis secara berangsur memberikan makanan berenergi dan zat gizi yang cukup.

Adapun beberapa syarat diet hiperemesis gravidarum diantaranya adalah karbohidrat tinggi yaitu 75-80% dari kebutuhan energi total, lemak rendah yaitu <10% dari kebutuhan energi total, protein sedang yaitu 10-15% dari kebutuhan energi total. Makanan diberikan dalam bentuk kering, pemberian cairan di sesuaikan dengan keadaan pasien yaitu 7-10 gelas/hari, makanan mudah di cerna, tidak merangsang saluran pencernaan dan diberikan sering dalam porsi kecil, bila makan pagi dan sulit diterima, pemberian di optimalkan pada makan malam dan selingan malam, makanan yang berangsur di tingkatkan dalam porsi dan nilai gizi sesuai dengan keadaan dan kebutuhan gizi pasien (Rukiyah, 2010).

Ada tiga macam diet pada hiperemesis gravidarum, yaitu:

- a) Diet hiperemesis tingkat I diberikan kepada pasien hiperemesis gravidarum ringan. Diet diberikan secara berangsur dan dimulai dengan memberikan bahan makanan yang bernilai gizi tinggi. Makanan hanya berupa roti kering dan buah-buahan, makanan ini kurang

mengandung zat gizi, kecuali vitamin C. Minuman tidak diberikan bersamaan dengan makanan tetapi 1-2 jam sesudahnya. Pemilihan bahan makanan yang tepat dapat memenuhi kebutuhan gizi kecuali kebutuhan energi.

- b) Diet hiperemesis gravidarum tingkat II diberikan kepada pasien hiperemesis gravidarum sedang. Diet diberikan sesuai kesanggupan pasien dan minuman tidak boleh diberikan bersama makanan. Makanan mencukupi kebutuhan energi dan semua zat gizi kecuali vitamin A dan D.
- c) Diet hiperemesis tingkat III diberikan pada pasien hiperemesis gravidarum berat. Makanan hanya terdiri dari roti kering, singkong/ubi bakar atau rebus, dan buah-buahan. Cairan tidak diberikan bersama makanan tetapi 1-2 jam sesudahnya karena zat gizi yang terkandung didalamnya kurang, maka tidak diberikan dalam waktu lama.

Makanan yang tidak dianjurkan untuk hiperemesis I, II, dan III adalah makanan yang umumnya merangsang saluran pencernaan dan berbau tajam. Bahan makanan yang mengandung alkohol, kopi, dan yang mengandung zat tambahan (pengawet, pewarna, dan bahan penyedap) juga tidak dianjurkan.

2) Pengobatan

Pengobatan dalam keadaan muntah berlebihan dan dehidrasi ringan, ibu yang mengalami hiperemesis gravidarum tingkat II sebaiknya dirawat.

Konsep pengobatan yang dapat diberikan sebagai berikut:

Isolasi dan pengobatan psikologis. Dengan melakukan isolasi di ruangan sudah dapat meringankan wanita hamil karena perubahan suasana dari lingkungan rumah tangga. Petugas dapat memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang berbagai masalah berkaitan dengan kehamilan.

Pemberian cairan pengganti. Dalam keadaan darurat diberikan cairan pengganti sehingga keadaan dehidrasi dapat diatasi. Cairan pengganti yang diberikan adalah glukosa 5-10% dengan keuntungan dapat mengganti cairan yang hilang dan berfungsi sebagai sumber energi, sehingga terjadi perubahan metabolisme dari lemak dan protein menjadi pemecahan glukosa. Dalam cairan dapat ditambahkan vitamin C, B kompleks atau kalium yang diperlukan untuk kelancaran metabolisme. Selama pemberian cairan harus mendapat perhatian tentang keseimbangan cairan yang masuk dan keluar melalui kateter, nadi, tekanan darah, suhu dan pernapasan. Lancarnya pengeluaran urine memberikan petunjuk bahwa keadaan wanita hamil berangsur-angsur baik.

Pemeriksaan yang perlu dilakukan adalah darah, urine, dan bila mungkin fungsi hati dan ginjal. Bila keadaan muntah berkurang, kesadaran membaik, wanita hamil dapat diberikan makan minum dan mobilisasi.

Obat yang dapat diberikan. Memberikan obat untuk hiperemesis gravidarum sebaiknya berkonsultasi dengan dokter, sehingga dapat dipilih obat yang tidak bersifat teratogenik (kelainan kongenital-cacat bawaan bayi). Obat yang dapat diberikan adalah sedatif ringan yang sering digunakan, yaitu:

- a) Vitamin B1, B2 dan B6 masing-masing 50-100 mg/hari/infus.
- b) Vitamin B12 200 mcg/hari/infus, vitamin C 200/hari/infus.
- c) Fenobarbital 30 mg IM 2-3 kali/hari atau chlorpromazine 25-50 mg/hari IM atau kalau diperlukan diazepam 5 mg 2-3 kali/hari IM.
- d) Antiemetik: prometazine (avopreg) 2-3 kali 25 mg/hari/oral atau mediamer B6 3x1/hari/oral.
- e) Antasida: acidrine 3x1 tablet/hari/oral atau mylanta 3x1 tablet/hari/oral atau magnam 3x1 tablet/hari/oral (Prawirohardjo, 2008).

Menghentikan kehamilan. Pada beberapa kasus, pengobatan hiperemesis gravidarum tidak berhasil malah menjadi kemunduran dan keadaan semakin menurun sehingga diperlukan pertimbangan untuk melakuakan gugur kandung. Keadaan yang memerlukan pertimbangan gugur kandung diantaranya:

- a) Gangguan kejiwaan (delirium, apatis, somnolen sampai koma, terjadi gangguan kejiwaan ensefalopati Wernicke)
- b) Gangguan penglihatan (perdarahan retina, kemunduran penglihatan)
- c) Gangguan faal (hati dalam bentuk ikterus, ginjal dalam bentuk anuria, jantung dan pembuuh darah terjadi meningkat, tekanan darah menurun)

Dengan memperhatikan keadaan tersebut, gugur kandung dapat dipertimbangkan pada hiperemesis gravidarum (Manuaba, 2014).

3) Komplikasi

Menurut Wiknjosastro dalam Rukiyah (2010), dampak yang ditimbulkan dapat terjadi pada ibu dan janin, seperti ibu akan kekurangan nutrisi dan cairan sehingga keadaan fisik ibu menjadi lemah dan lelah dapat pula mengakibatkan gangguan asam basa, pneumoni aspirasi, robekan mukosa pada hubungan gastroesofagus yang menyebabkan perdarahan ruptur esofagus, kerusakan hepar dan kerusakan ginjal, ini akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan janin karena nutrisi yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan kehamilan, yang mengakibatkan peredaran darah janin berkurang. Pada bayi, jika hiperemesis ini terjadi hanya di awal kehamilan tidak berdampak terlalu serius, tetapi jika sepanjang kehamilan si ibu menderita hiperemesis gravidarum, maka kemungkinan bayinya mengalami *BBLR* (Berat Badan Lahir Rendah), *IUGR* (*Intrauterine Growth Retardation*), Prematur hingga terjadi abortus.

Hal ini didukung oleh pernyataan Gross et al menyatakan bahwa ada peningkatan peluang retradasi pertumbuhan intrauterus jika ibu mengalami penurunan berat badan sebesar 5% dari berat badan sebelum kehamilan, karena pola pertumbuhan janin terganggu oleh metabolisme maternal. Terjadi pertumbuhan janin terhambat sebagai akibat kurangnya pemasukan oksigen dan makanan yang kurang adekuat dan hal ini mendorong terminasi kehamilan lebih dini (Rukiyah, 2010).

C. Tinjauan Khusus Hiperemesis Gravidarum Tingkat II

1. Definisi Hiperemesis Gravidarum Tingkat II

Hiperemesis gravidarum tingkat II adalah pasien tampak lemah dan apatis, lidah kotor, nadi kecil dan cepat, suhu kadang naik dan mata sedikit ikterik. Berat badan pasien turun, timbul hipotensi, hemokonsentrasi, oligouria, konstipasi, dan napas berbau aseton (Mansjoer, 2009).

Hiperemesis gravidarum tingkat II adalah hiperemesis tingkat lanjut yang ditandai dengan dehidrasi yaitu turgor kulit makin berkurang, lidah kering dan kotor, berat badan menurun, mata cekung; gangguan sirkulasi darah yaitu nadi cepat dan tekanan darah menurun, hemokonsentrasi, oliguria, obstipasi dan gangguan metabolisme yang ditandai dengan bau keton pada urin dan napas (Sulistyawati, 2011).

Hiperemesis gravidarum tingkat II adalah mual dan muntah yang hebat menyebabkan keadaan umum penderita lebih parah; lemah, apatis, turgor kulit

mulai jelek, lidah kering dan kotor, nadi kecil dan cepat, suhu badan naik (dehidrasi), ikterus ringan, berat badan turun, mata cekung, tekanan turun, hemokonsentrasi, oliguri, dan konstipasi. Dapat pula terjadi asetonuria, dan dari nafas keluar bau aseton (Sofian, 2012).

2. Penanganan Hiperemesis Gravidarum tingkat II

Menurut Sofian (2012) penanganan hiperemesis gravidarum tingkat II harus dirawat inap dirumah sakit sebagai berikut :

- a. Kadang-kadang pada beberapa wanita, hanya tidur dirumah sakit saja, telah banyak mengurangi mual muntahnya.
- b. Isolasi. Penderita sebaiknya dalam kamar tersendiri yang tenang tetapi cerah dan peredaran udara baik, bebas dan bau-bau. Tamu-tamu dibatasi hanya dokter dan petugas yang boleh masuk. Sampai muntah berhenti dan penderita mau makan dengan tidak memberikan makan/minum selama 24 jam. Kadang kala hal ini saja, tanpa pengobatan khusus telah mengurangi mual dan muntah.
- c. Terapi psikologis. Berikan pengertian bahwa kehamilan adalah suatu hal yang wajar, normal, dan fisiologis, jadi tidak perlu takut dan khawatir. Cari dan coba hilangkan faktor psikologis seperti keadaan sosial ekonomi dan pekerjaan serta lingkungan.
- d. Cairan perenteral. Cairan sebaiknya menggunakan larutan yang memiliki karbohidrat dan protein dengan glukose 5%, bila perlu dapat ditambah vitamin dan kalium khusunya vitamin B kompleks dan vitamin C serta bila kekurangan protein, dapat pula diberikan asam amino secara intravena untuk

menambah kalori yang kurang dari makanan yang didapat peroral sekaligus mencegah kekurangan elektrolit.

- e. Pemberian obat. Menggunakan sedatif (phenobarbital), vitamin (B1 dan B6), anti muntah (drammamin, avomin), antisida.

Pada beberapa kasus dan terapi tidak dapat dengan cepat memperbaiki keadaan umum penderita, dapat dipertimbangkan suatu abortus buatan.

D. Tinjauan Islam Tentang Kehamilan

Kemajuan yang dicapai dalam embriologi dapat diketahui secara lahiriah betapa besar pengorbanan ibu. Setelah terjadi pembuahan zat yang merupakan cikal bakal manusia, bergerak menuju dinding rahim untuk berdempet. Zat itu dilengkapi dengan potensi menyerap makanan sehingga dia merobek rahim dimana ia berdempet dan memakannya sehingga darah mengalir menuju zat itu dan ia pun senantiasa bagaikan berenang di dalam kolam darah ibu yang kaya dengan saripati makanan. Ia mengisapnya agar dapat dan tumbuh berkembang, sedang sang ibu makan, minum, mengunyah, dan mengisap yang kesemuanya menghasilkan darah yang bersih untuk anak yang dikandungnya dengan lahap memakannya.

Allah telah menjelaskan makanan yang dianjurkan dalam Q.S Al-Baarah/2:168.

يَأَيُّهَا النَّاسُ
الْأَرْضُ حَلَّا طَيِّبًا وَلَا تَنْتَعُوا حُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّمَا كُمْ

عَدُوُّ مُبِينٌ

Terjemahan:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Selanjutnya, pada periode pembentukan tulang-tulang, semakin banyak kebutuhan janin kepada kalsium dan karena itu pula sang ibu memberikan kepadanya dari saripati tulang-tulangnya pada darah agar kerangka sang anak dapat terbentuk dengan sempurna. Itu sedikit dari banyak sekali yang di anugerahkan ibu saat kehamilan janinnya.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Mu'minun/23:12-14.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلْطَانٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

خَلَقْنَا الْنُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَمَ لَحْمًا ثُمَّ

أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا إِخْرَاجًا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَحْسَنُ الْخَلْقِينَ

Terjemahan:

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang

(berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik”.

Firman Allah dalam Q.S As-Sajdah/32:7-9.

الَّذِي أَخْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنْسَنِ مِنْ طِينٍ
 جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلْطَةٍ
 الْسَّمْعَ الْأَبْصَرَ
 سَوْلَهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ
 مِنْ مَاءٍ مَّهِينٍ
 إِلَّا قَدَّهُ....

Terjemahan:

“Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari dari saripati air yang hina (air mani). Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh (ciptaan)-Nya ke dalam (tubuhnya) dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu....”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AL AUDDIN
 AL MAKAASSAR

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam satu hadits shahih bersabda:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْفُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً
 يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَالِكُ فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعَ
 كَلِمَاتٍ: بِكَثْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِّيٌّ أَوْ سَعْ

“Sesungguhnya salah seorang diantara kalian dipadukan bentuk ciptaannya dalam perut ibunya selama empat puluh hari (dalam bentuk mani) lalu menjadi segumpal darah selama itu pula (selama 40 hari), lalu menjadi segumpal daging selama itu pula, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut, lalu ditetapkan baginya empat hal: rizkinya, ajalnya, perbuatannya, serta kesengsaraannya dan kebahagiaannya”. Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu (<https://almanhaj.or.id/3033-proses-dan-perkembangan-janin-di-rahim.html>).

Adanya janin dalam rahim ibu, turut mempengaruhi kondisi fisik sang ibu, seorang ibu yang sedang hamil mengalami banyak perubahan baik perubahan fisik maupun psikologi. Hal ini mengakibatkan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh ibu yang sedang hamil. Salah satu yaitu keadaan lemah, merujuk firman Allah dalam Q.S Al-Lukman/31: 14.

وَصَيَّّدَ الْإِنْسَنَ بِوْلَدِيهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَا عَلَىٰ وَهُنَّ وَفَصِّلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرُ

وَلَوْلَدِيَّكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahan:

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.

Ayat ini menegaskan betapa besar jasa ibu terhadap anak, yaitu mulai dari

beban mengandung dalam keadaan lemah dan bahkan beban tersebut senantiasa bertambah dari saat kesaat lalu dia melahirkannya dengan susah payah, kemudian memelihara dan menyusukannya setiap saat.

Allah telah perintahkan untuk merenungkan kembali awal atau asal dari penciptaan kita sebagai manusia dalam firman Q.S At-Tariq/86:5-8.

فَلَيَنْظُرْ إِلَّا إِنْسَنٌ
يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الْصُّلْبِ الْتَّرَابِ

إِلَهٌ عَلَى رَجْعَةٍ لَقَادِرٌ

Terjemahan:

“Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya (hidup sesudah mati)”.

E. Manajemen Asuhan Kebidanan Dengan Kehamilan Hiperemesis Gravidarum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tingkat II

1. Definisi Asuhan Kebidanan

Asuhan kebidanan adalah penerapan fungsi dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada klien yang mempunyai masalah dalam bidang kesehatan ibu masa hamil, bersalin, nifas, bayi setelah lahir, dan keluarga berencana (Varney, 2007).

2. Tahapan Manajemen Kebidanan

Manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan

sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, ketrampilan dalam rangkaian atau tahapan yang logis untuk pengambilan suatu keputusan yang berfokus pada klien (Varney, 2007).

Manajemen kebidanan adalah metode dan pendekatan pemecahan masalah ibu dan anak yang khusus dilaksanakan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan kepada individu, keluarga dan masyarakat (Depkes RI).

Menurut IBI, manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengkajian, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Manajemen kebidanan menurut Varney terdiri dari 7 langkah yaitu pengkajian, interpretasi data, identifikasi, diagnosa potensial, antisipasi, rencana tindakan, pelaksanaan rencana asuhan secara efisien dan aman kemudian evaluasi, adapun langkah-langkah terikut sebagai berikut :

a. Langkah I: Pengumpulan Data Dasar

Adalah sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan klien. Pengumpulan data dimulai saat klien masuk dan dilanjutkan secara terus menerus selama proses asuhan kebidanan berlangsung. Pasien adalah sumber informasi yang akurat, disebut juga sumber data primer. Adapun data yang didapat dari anggota keluarga atau tenaga kesehatan lain disebut juga sumber

data sekunder. Teknik pengumpulan data ada 3 yaitu observasi, wawancara, dan pemeriksaan.

Pada kasus kehamilan hiperemesis gravidarum tingkat II didapat data subjektif kehamilan mual dan muntah setiap makan dengan frekensi ±8 x/sehari hingga mengganggu aktivitas.

Menetapkan kejadian hiperemesis gravidarum tidak sulit yaitu dengan menentukan kehamilan dengan muntah berlebihan sampai menimbulkan gangguan kehidupan sehari-hari dan dehidrasi. Muntah yang terus menerus tanpa pengobatan dapat menimbulkan gangguan tumbuh kembang janin dengan manifestasi klinisnya. Oleh karena itu, hiperemesis gravidarum berkelanjutan harus dicegah dan harus mendapat pengobatan yang adekuat.

Pada anamnesa diketahui setelah usia kehamilan 10 minggu merupakan gejala yang khas untuk hiperemesis gravidarum.

Pada pemeriksaan fisik ditemukan tanda dan gejala hiperemesis gravidarum tingkat II dengan ciri-ciri: keadaan umum lemah, kesadaran apatis, pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan tekanan darah turun, nadi meningkat, napas berbau aseton, pada pemeriksaan fisik dilihat berat badan makin menurun saat sebelum kehamilan, mata cekung, konjungtiva pucat, sclera sedikit ikterus, bibir kering, terdapat sariawan, lidah kotor, turgor jelek, gejala hemokonsentrasi dinilai dari urin berkurang, terjadi gangguan saat BAB.

Pemeriksaan penunjang seperti laboratorium akan dilakukan pemeriksaan

darah yaitu hemoglobin, hemotokrit, golongan darah, dan kadar estriol. Pada urin kemungkinan ditemui protein, aceton dan kadar estriol yang berkurang, dan reduksi.

b. Langkah II: Mengidentifikasi Diagnosa/Masalah Aktual

Setelah data dasar dikumpulkan dan dilakukan identifikasi yang benar terhadap data-data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan interpretasi data dasar sehingga ditemukan diagnosa dan masalah yang spesifik. Rumus dan diagnosa tujuannya digunakan karena masalah tidak dapat didefinisikan seperti diagnosa tetapi membutuhkan penanganan.

Diagnosa kebidanan adalah diagnosa yang ditegakkan dalam lingkup praktek kebidanan dan memenuhi standar. Pada kasus hiperemesis gravidarum tingkat II dapat diketahui berdasarkan kehamilan dengan muntah berlebihan sampai menimbulkan gangguan kehidupan sehari-hari dan dehidrasi, keadaan umum lemah, kesadaran apatis, pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan tekanan darah turun, nadi meningkat, napas berbau aseton, pada pemeriksaan fisik dilihat berat badan makin menurun saat sebelum kehamilan, mata cekung, konjungtiva pucat, sclera sedikit icterus, gejala hemokonsentrasi dinilai dari urin berkurang, terjadi gangguan saat BAB.

Pemeriksaan penunjang seperti laboratorium akan dilakukan pemeriksaan darah yaitu hemoglobin, hemotokrit, golongan darah, dan kadar estriol. Pada urin akan didapatkan keton (+), jumlah urin kurang, mulut berbau aseton dan kadar estriol yang berkurang, dan reduksi.

c. Langkah III: Mengidentifikasi Diagnosa/Masalah Potensial

Langkah ini mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasi. Langkah ini membutuhkan antisipasi, bila mungkin diberikan pencegahan, sambil mengamati klien, diharapkan dapat bersiap-siap apabila ada masalah.

Diagnosa potensial pada kasus hiperemesis gravidarum tingkat II yang terus berlanjut bisa menyebabkan komplikasi hiperemesis gravidarum tingkat III, antara lain gangguan gizi, gangguan metabolisme, penyakit infeksi dan lain-lain.

Dampak yang di timbulkan dapat terjadi pada ibu dan janin, seperti ibu akan kekurangan nutrisi dan cairan sehingga keadaan fisik ibu menjadi lemah dan lelah dapat pula mengakibatkan gangguan asam basa, pneumoni aspirasi, robekan mukosa pada hubungan gastroesofagus yang menyebabkan perdarahan ruptur esofagus, kerusakan hepar dan kerusakan ginjal, ini akan memberikan pengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan janin karena nutrisi yang tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan kehamilan, yang mengakibatkan peredaran darah janin berkurang.

Pada bayi, jika hiperemesis ini terjadi hanya di awal kehamilan tidak berdampak terlalu serius, tetapi jika sepanjang kehamilan ibu menderita hiperemesis gravidarum, maka kemungkinan bayinya mengalami BBLR, IUGR, prematur hingga terjadi abortus.

Pada kehamilan hiperemesis gravidarum tingkat II masalah-masalah yang

mungkin terjadi pada ibu yaitu dehidrasi karena terjadi mual dan muntah dengan frekuensi $\pm 8x/\text{hari}$ disertai pusing. Hal ini dikarenakan kekurangan cairan akibat muntah sehingga menyebabkan cairan ekstraseluler dan plasma berkurang. Dehidrasi menyebabkan hemokonsentrasi sehingga aliran darah ke jaringan berkurang. Kekurangan kalium sebagai akibat dari muntah dan bertambahnya ekskresi lewat ginjal menambah frekuensi muntah-muntah lebih banyak, dapat merusak hati dan terjadilah lingkaran setan yang sulit dipatahkan. Selain dehidrasi dan terganggunya keseimbangan elektrolit dapat terjadi robekan pada selaput lendir esofagus dan lambung (Sindroma *Mallory-Weiss*) dengan akibat perdarahan gastrointestinal.

d. Langkah IV: Antisipasi / Tindakan Segera

Dalam pelaksanaannya terkadang bidan dihadapkan pada beberapa situasi yang memerlukan penanganan segera/emergensi. Bidan harus segera melakukan tindakan untuk menyelamatkan pasien, namun kadang ada beberapa situasi yang memerlukan tindakan segera sementara menunggu intruksi dokter, atau bahkan juga situasi yang memerlukan konsultasi dengan tim kesehatan lain. Bidan sangat dituntut kemampuannya untuk dapat selalu melakukan evaluasi keadaan pasien agar asuhan yang diberikan tepat dan aman.

Antisipasi dalam hiperemesis gravidarum tingkat II yaitu kolaborasi dengan dokter untuk memberikan terapi Vitamin B1, B6, Sedative, anti emetik

dan anti histamin, serta motivasi untuk bedrest total.

Dalam kasus hiperemesis gravidarum tingkat II diperlukan kolaborasi dengan dokter kandungan untuk antisipasi terjadinya komplikasi terhadap ibu yaitu dengan pemberian obat serta vitamin dan pemasangan infus.

e. Langkah V: Rencana Asuhan

Langkah ini melakukan perencanaan asuhan yang menyeluruh berdasarkan langkah sebelumnya. Rencana asuhan yang akan diberikan pada kasus kehamilan hiperemesis gravidarum yaitu merencanakan untuk dilakukan pemeriksaan fisik dan pemberitahuan kepada keluarga agar keluarga mengetahui kondisi kehamilan ibu. Pemeriksaan fisik salah satu penunjang untuk menegakkan salah satu diagnosa.

Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, merencanakan untuk pemberitahuan kepada keluarga agar ibu di rawat inap. Hal ini dilakukan agar ibu mendapatkan tindakan yang tepat dan aman sesuai dengan kondisi yang dialami.

Lakukan diskusi antara tenaga kesehatan dengan keluarga mengenai semua rencana tindakan atau pemberian *informed consent* kepada keluarga sebagai tanda penegasan dan persetujuan dilakukan tindakan kepada ibu.

Bidan merencanakan pemasangan infus cairan RL merupakan tindakan segera untuk penambah kalori yang kurang dari makanan yang didapat peroral sekaligus mencegah kekurangan elektrolit. Serta merencanakan kolaborasi dengan dokter spesial obgyn dalam melakukan tindakan dan pemberian obat

yang aman untuk janin serta dapat membantu proses pemulihan kondisi ibu. Pemberikan injeksi vitamin B1 dan B12, serta vitamin peroral yaitu B6 untuk mengurangi rasa mual dan muntah ibu.

Menganjurkan ibu untuk makan dan minum dalam porsi sedikit tapi sering agar dapat mencukupi kebutuhan gizi ibu hamil serta hindari makan dan minuman yang memicu terjadinya mual dan muntah seperti makanan yang mengandung gas, berlemak, berminyak serta pedas yaitu nangka, kol, durian, dll.

Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melakukan pekerjaan berat akan dapat memberikan relaksasi otot dan mengurangi beban kerja jantung dengan isolasi ibu di ruangan dapat meringankan wanita hamil karena perubahan suasana dari lingkungan.

Berikan dukungan dan motivasi kepada ibu agar tidak cemas terhadap kondisi yang sedang di alaminya. Lakukan isolasi di ruangan dapat meringankan wanita hamil karena perubahan suasana dari lingkungan juga sebagai pengobatan psikologis ibu.

f. Langkah VI: Implementasi atau Melaksanakan Perencanaan

Langkah ini merupakan pelaksanaan dari rencana asuhan menyeluruh secara efisien dan aman.

Perencanaan asuhan yang diberikan pada kasus kehamilan hiperemesis gravidarum yaitu melakukan pemeriksaan fisik dan memberitahukan kepada keluarga agar keluarga mengetahui kondisi kehamilan ibu. Pemeriksaan fisik

salah satu penunjang untuk menegakkan salah satu diagnosa.

Setelah melakukan pemeriksaan fisik, memberitahukan kepada keluarga agar ibu di rawat inap. Hal ini dilakukan agar ibu mendapatkan tindakan yang tepat dan aman sesuai dengan kondisi yang dialami.

Melakukan diskusi antara tenaga kesehatan dengan keluarga mengenai semua tindakan atau memberikan *informed consent* kepada keluarga sebagai tanda penegasan dan persetujuan dilakukan tindakan kepada ibu.

Bidan melakukan pemasangan infus dengan kalori tinggi seperti cairan RL merupakan tindakan segera untuk menambah kalori yang kurang dari makanan yang didapat peroral sekaligus mencegah kekurangan elektrolit. Serta melakukan kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn dalam melakukan tindakan dan memberikan obat yang aman untuk janin serta dapat membantu proses pemulihan kondisi ibu. Memberikan injeksi vitamin B1 dan B12, serta vitamin peroral yaitu B6 untuk mengurangi rasa mual dan muntah ibu.

Adapun menganjurkan ibu untuk makan dan minum dalam porsi sedikit tapi sering agar dapat mencukupi kebutuhan gizi ibu hamil serta hindari makan dan minuman yang memicu terjadinya mual dan muntah seperti makanan yang berlemak.

Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melakukan pekerjaan berat akan dapat memberikan relaksasi otot dan mengurangi beban kerja jantung dengan isolasi ibu di ruangan dapat meringankan wanita hamil karena perubahan suasana dari lingkungan.

Memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu agar tidak cemas terhadap kondisi yang sedang di alaminya. Melakukan isolasi di ruangan dapat meringankan wanita hamil karena perubahan suasana dari lingkungan juga sebagai pengobatan psikologis ibu.

g. Langkah VII: Evaluasi

Langkah ini untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan asuhan yang kita berikan kepada pasien. Pada langkah ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah dipenuhi sesuai dengan kebutuhan sebagaimana rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya.

Manajemen kebidanan merupakan suatu kontinum, maka perlu mengulang kembali dari awal setiap asuhan yang tidak efektif melalui proses manajemen untuk mengidentifikasi proses manajemen tidak efektif serta melakukan penyesuaian pada rencana asuhan berikutnya.

Setelah dilakukan pelaksanaan asuhan kehamilan pada ibu hiperemesis gravidarum tingkat II kemungkinan terjadi kekurangan nutrisi dan cairan. Pada bayi, jika sepanjang kehamilan ibu menderita hiperemesis gravidarum maka kemungkinan bayinya mengalami BBLR, IUGR, prematur hingga terjadi abortus.

3. Dokumentasi Kebidanan

Dokumentasi kebidanan adalah suatu sistem pencatatan atau pelaporan

informasi tentang kondisi dan perkembangan kesehatan reproduksi dan semua kegiatan yang dilaksanakan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan (Varney, 2007).

Dokumentasi SOAP merupakan urutan langkah yang dapat membantu kita mengatur pola pikir kita dan memberikan asuhan yang menyeluruh. Merupakan catatan yang bersifat sederhana, jelas, logis dan singkat. Prinsip dan metode SOAP merupakan proses pemikiran penatalaksanaan manajemen kebidanan. Dalam metode SOAP, S adalah data Subjektif, O adalah data Objektif, A adalah *Analysis/Assesment* dan P adalah *Planning*.

Data Subjektif berhubungan dengan masalah dari sudut pandang pasien. Ekspresi pasien mengenai kekhawatiran dan keluhan yang dicatat sebagai kutipan langsung atau ringkasan yang akan berhubungan dengan diagnosa. Pada pasien yang bisu, di bagian data di belakang huruf “S” diberi tanda huruf “O” atau “X”. Tanda ini menjelaskan bahwa pasien adalah penderita tuna wicara. Data Subjektif nantinya akan menguatkan diagnosis yang akan disusun. Catatan medik dan informasi dari keluarga atau orang lain dapat dimasukkan dalam data subjektif sebagai data penunjang.

Data Objektif merupakan pendokumentasian hasil observasi yang jujur, hasil pemeriksaan fisik pasien, pemeriksaan laboratorium/pemeriksaan diagnostik lain. Data ini akan memberikan bukti gejala klinis pasien dan fakta yang berhubungan dengan diagnosis.

Analysis/Assesment merupakan pendokumentasian hasil analisis dan


interpretasi (kesimpulan) dari data subjektif dan objektif. Karena keadaan pasien yang setiap saat bisa mengalami perubahan dan akan ditemukan informasi baru dalam data subjektif maupun data objektif, maka proses pengkajian data akan menjadi sangat dinamis. Hal ini menuntut bidan untuk sering melakukan analisis data yang dinamis dalam rangka mengikuti perkembangan pasien. Analisis yang tepat dan akurat mengikuti perkembangan data pasien akan menjamin cepat diketahuinya perubahan pada pasien, dapat terus diikuti dan diambil keputusan/tindakan yang tepat. Analisis data adalah melakukan interpretasi data yang telah dikumpulkan mencakup: diagnosa/masalah kebidanan, diagnosa/masalah potensial serta perlunya tindakan segera.

Planning adalah membuat rencana asuhan saat ini dan yang akan datang. Rencana asuhan disusun berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data bertujuan untuk mengusahakan tercapainya kondisi pasien seoptimal mungkin dan mempertahankan kesejahteraannya. Rencana asuhan ini harus bisa mencapai kriteria tujuan yang ingin dicapai dalam batas waktu tertentu.

Tindakan yang akan dilaksanakan harus mampu membantu pasien mencapai kemajuan dan harus sesuai dengan hasil kolaborasi tenaga kesehatan lain antara lain dokter. Dalam pelaksanaan tindakan harus disetujui oleh pasien, kecuali bila tindakan tidak dilaksanakan akan membahayakan keselamatan pasien. Sebanyak mungkin pasien harus dilibatkan dalam proses implementasi. Bila kondisi pasien berubah, analisis juga berubah, maka

rencana asuhan maupun implementasi pun kemungkinan besar akan ikut berubah atau harus disesuaikan.

Dalam *Planning* juga harus mencantumkan evaluasi yaitu tafsiran dari efek tindakan yang telah diambil untuk menilai efektivitas asuhan/hasil pelaksanaan tindakan. Evaluasi berisi analisis hasil yang telah dicapai dan merupakan fokus ketepatan nilai tindakan/asuhan. Jika kriteria tujuan tidak tercapai, proses evaluasi dapat menjadi dasar untuk mengembangkan tindakan alternatif sehingga tercapai tujuan yang diharapkan (Muslihatun, 2009).



BAB III

STUDI KASUS

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL PADANY “F” DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT II DI RSKD IBU DAN ANAK PERTIWI MAKASSAR

TAHUN 2016

Nomor Regiter	: 08 76 xx
Tanggal MRS	: 04 Mei 2016, pukul 21.00 WITA
Tanggal Pengkajian	: 04 Mei 2016, pukul 21.30 WITA
Nama Pengkaji	: Eka Suryaningrat

LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR

A. Identitas istri/suami

Nama	: Ny F / Tn H
Umur	: 27 tahun/ 33 tahun
Nikah/Lamanya	: 1x/± 3 tahun
Suku	: Makassar/Makassar
Agama	: Islam/Islam
Pendidikan	: SMA/SMA
Pekerjaan	: Karyawan swasta/Karyawan swasta
Alamat	: BTN. Minasa Upa Blok D8/1

B. Keluhan utama

Mual, muntah, pusing dan nyeri ulu hati.

C. Riwayat keluhan utama

1. Ibu mengalami mual dan muntah sejak sebulan yang lalu.
2. Setiap makan dan minum dimuntahkan kembali.
3. Bertambah sering ±8 x/hari disertai pusing dan nyeri ulu hati hingga mengganggu aktivitas sejak 2 hari yang lalu.

D. Riwayat kesehatan yang lalu

1. Tidak ada riwayat alergi makanan dan obat.
2. Tidak ada ketergantungan obat, alkohol dan rokok.
3. Ibu tidak pernah menderita penyakit yang serius dan harus operasi.
4. Ibu mengatakan cemas BB mengalami penurunan sebanyak 5 kg dari BB sebelumnya adalah 55 kg.

E. Riwayat kesehatan keluarga

1. Tidak ada riwayat penyakit menular dan menurun.
2. Tidak ada riwayat penyakit hipertensi, jantung, asma dan DM.

F. Riwayat reproduksi

1. Riwayat menstruasi

Menarche : 14 tahun

Siklus : 28-35 hari

Lamanya : 3-7 hari

Dysmenorrhea : Tidak ada

2. Riwayat kehamilan sekarang

- a. GI P0 A0
- b. Hari pertama haid terakhir (HPHT) :02 Maret 2016
- c. Hari taksiran persalinan (HTP) :09 Desember 2016.
- d. Ibu pernah melakukan pemeriksaan di salah satu RS dengan menggunakan USG pada tanggal 01 Mei 2016. Pada pemeriksaan diketahui ukuran jarak dari puncak kepala ke ekor bayi atau disebut CRL (*Crown Rump Length*) yaitu 1,18 cm, umur kehamilan atau GA (*Gestational Age*) 6 minggu 3 hari.

3. Riwayat ginekologi

Tidak pernah mengalami suatu kelainan.

4. Riwayat KB

Ibu tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi.

G. Riwayat pemenuhan kebutuhan dasar

- 1. Pola nutrisi, kebiasaan ibu makan 3 kali sehari dengan porsi sedang, ibu mengatakan nafsu makan berkurang selama kehamilan disertai mual dan muntah. Minum 6-7 gelas sehari.
- 2. Pola eliminasi, kebiasaan BAB 1 kali sehari dengan konsistensi lunak dan berwarna kuningserta BAK 5-6 kali sehari berwarna kuning jernih. Selama hamil, saat BAB konsistensi keras dengan warna coklat kehitaman dan BAK warna kuning seperti teh.
- 3. Pola istirahat, kebiasaan tidur siang 1-2 jam sehari dan tidur malam 6-8 jam. Selama kehamilan tidak mempengaruhi jam tidur.

H. Pemeriksaan Fisik

1. Pemeriksaan umum

- a. Keadaan umum ibu lemah.
- b. Turgor kulit kurang baik.
- c. Tinggi badan : 152 cm.
- d. Berat badan sekarang : 50 kg.
- e. Tanda-tanda vital

Tekanan Darah 90/50 mmHg

Nadi 90 x/menit

Suhu 38°C

Pernapasan 28x/menit

2. Pemeriksaan khusus

a. Mata

Inspeksi : mata cekung, konjungtiva pucat, sclera sedikit

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

b. Mulut dan gigi

Inspeksi : bibir kering, terdapat sariawan, lidah kotor.

c. Leher

Inspeksi : tidak ada luka bekas operasi dan pembengkakan pada leher.

Palpasi : tidak ada pembesaran vena jugularis, kelenjar limfe dan thyroid.

d. Payudara

Inspeksi : simetris kiri dan kanan, bentuk dan ukuran sama.

Palpasi : tidak ada benjolan dan nyeri tekan.

e. Abdomen

Inspeksi : tidak ada luka bekas operasi dan tampak striae livide.

Palpasi : tidak ada nyeri tekan.

- Leopold I : belum teraba.

-Leopold II s/d IV : tidak dilakukan.

f. Ektremitas

Inspeksi : simetris kiri dan kanan.

Palpasi : tidak oedema dan varises.

3. Pemeriksaan penunjang

USG :CRL 1,18 cm

GA 6 minggu 3 hari

Plano test : (+)

Hb : 11,8 gr%

Leukosit : 14,8 ribu/ul

Neutrofil : 73,8

Limfosit : 18,8%

Eritrosit : 4,8 juta/ul

Urin : Agak keruh

Warna : Kuning

I. Riwayat sosial ekonomi

1. Ini pernikahan ibu yang pertama dengan suaminya ± 3 tahun.
2. Ibu mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangganya.
3. Suami adalah pengambil keputusan dalam keluarga.
4. Suami dan keluarga senang dengan kehamilannya.

J. Data psikologi

Keluarga menunggu kehamilan ini.

K. Data spiritual

Ibu dan keluarga selalu berdoa semoga kehamilannya berjalan dengan lancar sampai proses persalinan hingga ibu dan bayinya sehat dan selamat.

LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Diagnosa : GIP0A0, gestasi 8-10 minggu, intauterine, keadaan ibu lemah dengan hiperemesis gravidarum tingkat II serta gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit.

Masalah : mual dan muntah.

1. GIP0A0

DS :

- a. Ibu mengatakan ini kehamilan yang pertama dan tidak pernah keguguran.
- b. Ibu pernah melakukan pemeriksaan menggunakan USG.

DO :

- a. Tampak striae livide.

- b. Pada hasil pemeriksaan USG diketahui CRL adalah 1,18 cm.

Analisa dan interpretasi data

- a. Pada primigravida timbul garis-garis memanjang atau serong pada perut kadang pula terdapat pada payudara dan paha yang disebut striae gravidarum. Pada primigravida warnanya membiru disebut striae livide sedangkan pada multigravida warna garis putih agak mengkilat seperti jaringan perut yang disebut linea albicans atau striae alba.
- b. Salah satu tanda pasti kehamilan adalah pemeriksaan dengan alat canggih seperti USG (Manuaba, 2010).

2. Gestasi 8-10 minggu

DS :

- a. Ibu mengatakan haid terakhir pada 02 Maret 2016.
- b. Ibu mengatakan umur kehamilannya \pm 2 bulan.
- c. Ibu pernah melakukan pemeriksaan menggunakan USG.

DO:

- a. Hari taksiran persalinan tanggal 09-12-2016.
- b. Tanggal pengkajian Gestasi 8 minggu 6 hari, HTP 09 Desember 2016.
- c. Pada hasil USG, diketahui GA adalah 6 minggu 3 hari.

Analisa dan interpretasi data

- a. Menurut rumus Neegle dari HPHT tanggal 02-03-2016 sampai tanggal pengkajian 04-05-2016, maka usia kehamilan adalah 8 minggu 6 hari (Manuaba, 2008).
- b. Pemeriksaan USG merupakan suatu metode diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mempelajari morfologi dan fungsi suatu organ berdasarkan gambaran eko dari gelombang ultrasonik yang dipantulkan oleh organ. Penentuan usia kehamilan dilakukan berdasarkan tabel data atau nomogram yang menggambarkan hubungan antara ukuran biometri janin dan usia kehamilan pada kehamilan tersebut (Prawirohardjo, 2014).

3. Intrauterine

DS :tidak pernah merasakan nyeri perut yang hebat.

DO :

- a. Saat palpasi abdomen, ibu tidak merasakan nyeri tekan.
- b. Hasil USG,CRL adalah 1,18 cm.

Analisa dan interpretasi data

- a. Kavum uteri merupakan bagian dari uterus tempat terjadinya hasil konsepsi dapat tumbuh dan berkembang hingga aterm tanpa menyebabkan adanya nyeri.

4. Keadaan ibu

DS : Ibu merasa mual dan makan setiap makan disertai pusing serta nyeri ulu hati.

DO :

- a. Keadaan lemah
- b. Tanda-tanda vital :

Tekanan darah : 90/50 mmHg

Nadi : 90x/menit

Suhu : 38°C

Pernapasan : 28x/menit.

- c. Mata cekung, konjungtiva pucat, sclera sedikit ikterus.
- d. Bibir kering, terdapat sariawan, lidah kotor.

Analisa dan interpretasi data

Selama masa hamil nafsu makan berkurang, sekresi usus berkurang, fungsi hati berubah dan absorpsi nutrisi meningkat. Aktivitas peristaltik (motilitas) menurun akibatnya bising usus berkurang sehingga terjadi stagnasi isi lumen usus disampaikan ke cortex cerebrum kemudian dipersepsi sebagai rasa penuh di perut sehingga berdampak pada rasa mual dan muntah serta tidak nafsu makan.

Penurunan nafsu makan akibat mual atau muntah yang merupakan akibat perubahan saluran cerna dan peningkatan kadar progesteron, estrogen dan *human chorionic gonadotropin* (hCG) dapat menjadi faktor pencetus mual dan muntah. Peningkatan hormon progesteron menyebabkan otot polos pada sistem gastrointestinal mengalami relaksasi sehingga motilitas lambung

menurun dan pengosongan lambung melambat. Refluks esofagus, penurunan motilitas lambung dan penurunan motilitas lambung serta penurunan sekresi asam hidroklorid juga berkontribusi terhadap terjadinya mual dan muntah (Runiari, 2010).

LANGKAH III :IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Diagnosa potensial : Antisipasi terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin.

Analisa dan interpretasi data

Muntah berlebihan sehingga suplai cairan dan makanan kurang apabila berlangsung lama tanpa pengobatan menimbulkan gangguan tumbuh kembang janin dalam rahim dengan manifestasi klinisnya (Manuaba, 2010).

LANGKAH IV :TINDAKAN SEGERA ATAU KOLABORASI

Tidak ada tindakan segera.

LANGKAH V :INTERVENSI ISLAM NEGERI

Tujuan :

- a. Proses kehamilan berjalan normal.
- b. Ibu dan janin dalam keadaan baik.
- c. Hiperemesis gravidarum tingkat II teratas.
- d. Antisipasi terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin.

Kriteria:

- a. Tidak lagi mengalami mual dan muntah.
- b. TTV dalam batas normal

Tekana Darah : diastol 60-90, sistol 100-130 mmHg.

Nadi : 60-90 x/menit.

Suhu : 36,5-37,5°C.

Pernapasan : 16-24 x/menit.

- c. Ibu dapat beraktivitas seperti biasa.

Rencana tindakan

1. Jelaskan kepada ibu dan keluarga tentang hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Rasional : Agar ibu dan keluarga mengetahui serta mengerti kondisi kehamilannya.

2. Anjurkan ibu untuk rawat inap di RSKDIA Pertiwi.

Rasional : Agar ibu dan janin mendapat asuhan yang tepat oleh bidan sesuai dengan diagnosa yang di alami.

3. Lakukan kolaborasi dengan dokter dalam melakukan tindakan dan pemberian obat.

Rasional : Agar dapat membantu proses pemulihan kondisi ibu dengan pemberian obat yang aman untuk ibu serta janin. Dan dapat membantu mengganti cairan dan elektrolit yang keluar melalui muntah.

4. Anjurkan ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bernutrisi selama kehamilan.

Rasional : Nutrisi yang adekuat sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin didalam kandungan.

5. Anjurkan ibu untuk makan dan minum dalam porsi sedikit tapi sering serta hindari makan dan minum yang berbau.

Rasioanal : Dengan mengkonsumsi makanan dalam jumlah sedikit tapi sering akan dapat mencukupi kebutuhan gizi ibu hamil serta menghindari makanan yang berbau yang dapat memicu ibu untuk mual dan muntah seperti makanan berbumbu dan berlemak.

6. Anjurkan ibu untuk makan selingan seperti biskuit dan roti kering.

Rasional : Menghindari rangsangan mual dan muntah yang berlebihan serta mencegah hipoglikemia.

7. Aanjurkan ibu untuk perbanyak minum air putih.

Rasional : Minum air yang cukup dapat membantu peristaltik usus sehingga dapat mencegah konstipasi.

8. Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melakukan pekerjaan berat serta membatasi pengunjung.

Rasional : Istirahat yang cukup dan tidak melakukan pekerjaan berat dapat memberikan relaksasi otot dan mengurangi beban kerja jantung.

9. Observasi mual dan muntah.

Rasional : Frekuensi jumlah cairan yang keluar saat muntah dapat menggambarkan reaksi terhadap perawatan dan pengobatan yang diberikan.

10. Observasi tanda-tanda vital.

Rasional : Untuk menilai perkembangan sebagai indikator dalam membantu mengevaluasi tindakan selanjutnya.

11. Observasi pengeluaran urine.

Rasional : Untuk mengetahui dan menilai cairan yang keluar.

12. Berikan dukungan dan motivasi kepada ibu.

Rasional : Agar ibu tidak cemas terhadap kondisi yang sedang di alaminya.

LANGKAH VI : IMPLEMENTASI

Tanggal 04-05-2016

1. Menyampaikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan mengetahui hasil pemeriksaan.

2. Menganjurkan ibu untuk rawat inap di RSKDIA Pertiwi.

Hasil : Ibu bersedia di rawat inap.

3. Melakukan kolaborasi dengan dokter obgyn dalam melakukan tindakan dan pemberian obat.

Hasil:

- a. Pukul 21.10 WITA telah terpasang cairan valamin 40 tpm.
- b. Pukul 21.15 WITA melakukan injeksi ranitidin 1 amp/IV/8 jam.
- c. Pukul 21.15 WITA melakukan injeksi ondansetron 1 amp/IV/8 jam.

4. Menganjurkan makanan yang bernutrisi selama kehamilan.

Hasil : Ibu bersedia mengkonsumsi makanan yang bernutrisi.

5. Mengajurkan ibu untuk makan dan minum dalam porsi sedikit tapi sering serta menghindari makanan dan minuman yang berbumbu atau berlemak.

Hasil : Ibu bersedia melakukannya.

6. Mengajurkan makan selingan seperti biskuit dan roti kering.

Hasil : Ibu bersedia mengkonsumsinya.

7. Mengajurkan perbanyak minum air putih.

Hasil : Ibu minum air putih \pm 1000 ml.

8. Mengajurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melakukan pekerjaan berat serta membatasi pengunjung.

Hasil : Ibu bersedia melaksanakannya.

9. Mengobservasi mual dan muntah.

Hasil : Ibu muntah \pm 6 kali.

10. Mengobservasi TTV pukul 23.30 WITA.

Tekanan darah **NIV** : 100/70 mmHg **M NEGERI**

Nadi : 80 x/menit.

Suhu : $37,5^{\circ}\text{C}$.

Pernapasan : 20 x/menit.

11. Mengobserasi pengeluaran urine.

Hasil : Pengeluaran urine sebnayak \pm 150 ml.

12. Memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu.

Hasil : Ibu merasa lebih baik dan lebih tenang dengan kondisinya.

LANGKAH VII : EVALUASI

Tanggal 04 Mei 2016.

1. Keadaan ibu masih lemah.
2. Ibu masih mual dan muntah setiap kali makan dan minum.
3. Mata cekung, konjungtiva pucat dan sclera sedikit ikterus.
4. Turgor kurang baik.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL
PADA NY “F” DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TK II
DI RSKD IBU DAN ANAK PERTIWI MAKASSAR**

TAHUN 2016

Nomor Regiter	:	08 76 xx
Tanggal MRS	:	04 Mei 2016, pukul 21.00 WITA
Tanggal Pengkajian	:	04 Mei 2016, pukul 21.30 WITA
Nama Pengkaji	:	Eka Suryaningrat

DATA SUBJEKTIF (S)

A. Identitas istri/suami

Nama	:	Ny F / Tn H
Umur	:	27 tahun/ 33 tahun
Nikah/Lamanya	:	1x/ \pm 3 tahun
Suku	Makassar/Makassar	
Agama	:	Islam/Islam
Pendidikan	:	SMA/SMA
Pekerjaan	:	Karyawan swasta/Karyawan swasra
Alamat	:	BTN. Minasa Upa Blok D8/1

B. Keluhan utama

1. Ibu merasa mual dan muntah \pm 8 kali/hari sejak 2 hari yang lalu disertai pusing dan nyeri ulu hati hingga mengganggu aktivitas.
2. Setiap makan dan minum dimuntahkan kembali.

3. Tidak ada riwayat alergi makanan dan obat-obatan, tidak pernah menderita hipertensi, jantung, asma, DM, penyakit menular seperti HIV/AIDS, dll.
4. Ibu mengatakan ini kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran.
5. Haid terakhir tanggal 02-03-2016.
6. Ibu mengatakan pernah melakukan pemeriksaan USG di salah satu rumah sakit.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu lemah.
2. Turgor kurang baik.
3. Tinggi badan : 152 cm.
4. Berat badan sekarang : 50 kg.
5. Tanda-tanda vital :

Tekanan Darah : 90/50 mmHg

Nadi : 90 x/menit

Suhu : 38°C

Pernapasan : 28x/menit

6. Mata cekung, konjungtiva pucat, sclera sedikit ikterus.
7. Bibir kering, terdapat sariawan, lidah kotor.
8. Pemeriksaan penunjang

USG : CRL 1,18 cm

GA 6 minggu 3 hari.

Plano test : (+)

Hb : 10 gr%
 Leukosit : 14,8 ribu/ul
 Neutrofil : 73,8
 Limfosit : 18,8%
 Eritrosit : 4,8 juta/ul
 Urin : Agak keruh
 Warna : Kuning

ASSESMEN (A)

Masalah aktual : GIP0A0, gestasi 8-10 minggu, intauterine, keadaan ibu lemah dengan hiperemesis gravidarum tingkat II serta gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit.

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin.

PLANNING (P)

Tanggal 04 Mei 2016

1. Menyampaikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan mengetahui hasil pemeriksaan.

2. Menganjurkan ibu untuk rawat inap di RSKDIA Pertiwi.

Hasil : Ibu bersedia di rawat inap.

3. Melakukan kolaborasi dengan dokter dalam melakukan tindakan dan pemberian obat.

Hasil:

- a. Pukul 21.10 WITA telah terpasang cairan valamin 40 tpm.

- b. Pukul 21.15 WITA melakukan injeksi ranitidin 1 amp/IV/8 jam.
 - c. Pukul 21.15 WITA melakukan injeksi ondansetron 1 amp/IV/8 jam.
4. Menganjurkan makanan yang bernutrisi selama kehamilan.

Hasil : Ibu bersedia mengkonsumsi makanan yang bernutrisi.

5. Menganjurkan ibu untuk makan dan minum dalam porsi sedikit tapi sering serta menghindari makanan dan minuman yang berbumbu atau berlemak.

Hasil : Ibu bersedia melakukannya.

6. Menganjurkan makan selingan seperti biskuit dan roti kering.

Hasil : Ibu bersedia mengkonsumsinya.

7. Menganjurkan perbanyak minum air putih.

Hasil : Ibu minum air putih \pm 1000 ml.

8. Menganjurkan ibu untuk istirahat yang cukup dan tidak melakukan pekerjaan berat serta membatasi pengunjung.

Hasil : Ibu bersedia melaksanakannya.

9. Mengobservasi mual dan muntah.

Hasil : Ibu muntah \pm 6 kali.

10. Mengobservasi TTV pukul 23.30 WITA.

Tekanan darah : 100/70 mmHg.

Nadi : 80 x/menit.

Suhu : $37,5^{\circ}\text{C}$.

Pernapasan : 20 x/menit.

11. Mengobserasi pengeluaran urine.

Hasil : Pengeluaran urine sebanyak ± 150 ml.

12. Memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu.

Hasil : Ibu merasa lebih baik dan lebih tenang dengan kondisinya.



PENDOKUMENTASIAN HASILASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL
PADA NY “F” DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TK II
DI RSKD IBU DAN ANAK PERTIWI
TANGGAL 05 MEI 2016

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan mual dan muntah mulai berkurang.
2. Nafsu makan mulai membaik.
3. Masih sedikit pusing.
4. Nyeri ulu hati berkurang.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu masih lemah.
2. Kesadaran baik.
3. Turgor kulit mulai baik.
4. Tanda-tanda vital :

Tekanan Darah : 100/70 mmHg.

Nadi : 79 x/menit.

Suhu : 37,2°C.

Pernapasan : 24 x/menit.

5. Wajah ibu tampak pucat.
6. Mata masih cekung.
7. Bibir tidak kering, sariawan membaik, lidah masih agak kotor.

ASSESMEN (A)

Masalah aktual : GIP0A0, gestasi 8-10 minggu, intauterine, keadaan ibu lemah dengan hiperemesis gravidarum tingkat II serta gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit.

Masalah potensial : Antisipasi terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin.

PLANNING (P)

Tanggal 05 Mei 2016

1. Menyampaikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa kondisi ibu sudah lebih baik dari sebelumnya.

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan mengetahui hasil pemeriksaan.

2. Memantau pemberian cairan dan obat serta mengganti cairan dextrose 5% : RL = 2 : 1.

Hasil:

- a. Pukul 05.00 WITA telah terpasang cairan RL 28 tpm.
- b. Pukul 05.10 WITA drips neurobion/24 jam pada cairan RL.
- c. Pukul 06.05 WITA melakukan injeksi ranitidine dan ondansetron 1 amp/IV/8 jam.
- d. Pukul 14.05 WITA melakukan injeksi ranitidine dan ondansetron 1 amp/IV/8 jam.
- e. Pukul 20.15 WITA mengganti cairan dextrosa 5% 28 tpm.
- f. Pukul 22.05 WITA melakukan injeksi ranitidine dan ondansetron 1 amp/IV/8 jam.

- g. Pemberian obat antasida sirup 3x1.
3. Menganjurkan makanan yang bernutrisi selama kehamilan.
- Hasil : Ibu mengkonsumsi bubur yang diberikan oleh rumah sakit.
4. Menganjurkan ibu untuk makan dan minum dalam porsi sedikit tapi sering serta menghindari makanan dan minuman yang berbumbu atau berlemak.

Hasil : Ibu bersedia melakukannya.

5. Menganjurkan makan selingan seperti biskuit dan roti kering.

Hasil : Ibu mengkonsumsi makanan yang dibawakan pengunjung.

6. Mengobservasi muntah.

Hasil : Ibu muntah ± 4 kali.

7. Mengobservasi TTV.

a. Pukul 05.05WITA :Tekanan darah : 100/70 mmHg.

Nadi : 79 x/menit.

Suhu Suhu : 37,2°C.

Pernapasan : 24 x/menit.

b. Pukul 12.00 WITA : Tekanan darah : 110/80 mmHg.

Nadi : 81 x/menit.

Suhu : 36,5°C.

Pernapasan : 21 x/menit.

c. Pukul 17.00 WITA : Tekanan darah : 110/70 mmHg.

Nadi : 81 x/menit.

Suhu : 36,8°C.

Pernapasan : 22 x/menit.

8. Mengobservasi pengeluaran urine.


Hasil : Pengeluaran urin sebanyak \pm 250 ml.

9. Melibatkan keluarga dalam perawatan ibu.

Hasil : Keluarga bersedia membantu dalam penyembuhan ibu.

10. Memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu.

Hasil : Ibu merasa lebih tenang dengan kondisinya.



PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL
PADA NY “F” DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TK II
DI RSKD IBU DAN ANAK PERTIWI
TANGGAL 06 MEI 2016

DATA SUBJEKTIF (S)

1. Ibu mengatakan masih sedikit mual dan muntah sudah berhenti .
2. Nafsu makan sudah membaik dan mulai banyak minum air putih..
3. Ibu merasa tidak terlalu pusing.
4. Ibu merasa sudah lebih baik dari sebelumnya.

DATA OBJEKTIF (O)

1. Keadaan umum ibu baik.
2. Kesadaran compositus.
3. Turgor kulit baik.
4. Tanda-tanda vital :

Tekanan Darah : 110/70 mmHg.

Nadi : 80 x/menit.

Suhu : 36,8°C.

Pernapasan : 22 x/menit.

5. Wajah ibu tampak segar.

6. Mata tidak cekung.

7. Bibir tidak kering, sariawan membaik, lidah bersih.

ASSESMEN (A)

Masalah aktual : GIP0A0, gestasi 8-10 minggu, intauterine, keadaan ibu baik.

PLANNING (P)

Tanggal 05 Mei 2016

1. Menyampaikan kepada ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan bahwa kondisi ibu sudah membaik.

Hasil : Ibu dan keluarga mengerti dan mengetahui hasil pemeriksaan.

2. Memantau pemberian cairan dan obat.

Hasil:

- a. Pukul 05.10 WITA drips neurobion/24 jam pada cairan RL.
- b. Pukul 06.05 WITA melakukan injeksi ranitidine dan ondansetron 1 amp/IV/8 jam.
- c. Pemberian antasida sirup 3x1.
- d. Pukul 10.00 WITA aff infus.

3. Mengobservasi muntah.

Hasil : Ibu tidak muntah lagi namun masih mual.

4. Mengobservasi TTV.

- a. Pukul 05.05 WITA : Tekanan darah : 110/70 mmHg.

Nadi : 80 x/menit.

Suhu : 36,8°C.

Pernapasan : 22 x/menit.

5. Memberikan ibu health education untuk mengkonsumsi makanan bergizi saat kehamilan agar pertumbuhan dan perkembangan janin berlangsung dengan baik.

Hasil : Ibu bersedia mengkonsumsi makanan bergizi.

6. Menjelaskan kepada ibu 9 tanda bahaya pada kehamilan, yaitu:

- a. Sakit kepala menetap.
- b. Wajah dan tungkai oedema.
- c. Mual dan muntah berlebihan.
- d. Nyeri perut yang hebat.
- e. Pergerakan janin kurang dari 10x dalam sehari.
- f. Keluar darah dari jalan lahir/perdarahan pervaginam.
- g. Ketuban Pecah Dini (KPD).
- h. Oedema.
- i. Kejang.

Hasil : Ibu mengerti dan bersedia segera datang ke pelayanan kesehatan jika mengalami kejadian tersebut.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang kesesuaian dan kesenjangan antara teori hasil studi pada penerapan dan pelaksanaan asuhan kebidanan pada Ny “F” dengan kasus hiperemesis gravidarum tingkat II di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Makassar tanggal 04 sampai 06 Mei 2016. Pembahasan ini dibuat berdasarkan landasan teoritis dan studi kasus yang bertujuan agar tindakan direncanakan berdasarkan rasional yang relevan yang dapat dianalisa secara teroritis untuk memudahkan kesesuaian dan kesenjangan yang terjadi pada kasus ini.

A. *LANGKAH I : IDENTIFIKASI DATA DASAR*

Teori pada langkah I mengatakan bahwa dilakukan pengumpulan data dasar untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi keadaan pasien secara lengkap untuk membuat kesimpulan tentang kehamilan tersebut.

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “F” didapatkan bahwa ibu mengalami mual dan muntah sejak sebulan lalu namun bertambah sering ±8 x/hari selama 2 hari disertai pusing dan nyeri ulu hati hingga mengganggu aktivitas ibu sebagai karyawan swasta dan ibu rumah tangga. Hal ini juga mengakibatkan ibu mengalami penurunan berat badan sebanyak 5 kg.

Teori menjelaskan bahwa salah satu perubahan fisiologis yang terjadi pada masa kehamilan yaitu perubahan pada sistem pencernaan. Selama masa hamil

nafsu makan berkurang, sekresi usus berkurang, fungsi hati berubah dan absorpsi nutrisi meningkat. Aktivitas peristaltik (motilitas) menurun akibatnya bising usus berkurang sehingga terjadi stagnasi isi lumen usus disampaikan ke kortek serebral kemudian dipersepsikan sebagai rasa penuh di perut sehingga berdampak pada rasa mual dan muntah serta tidak nafsu makan.

Pada trimester I sering terjadi penurunan nafsu makan akibat *nusea* (mual) atau *vomitus* (muntah) yang merupakan akibat perubahan saluran cerna dan peningkatan kadar progesteron, estrogen dan *Human Chorionic Gonadotropin* (HCG) dapat menjadi faktor pencetus mual dan muntah. Peningkatan hormon progesteron menyebabkan otot polos pada sistem gastrointestinal mengalami relaksasi sehingga motilitas lambung menurun dan pengosongan lambung melambat. Refluks esofagus, penurunan motilitas lambung dan penurunan motilitas lambung serta penurunan sekresi asam hidroklorid juga berkontribusi terhadap terjadinya mual dan muntah. Hal ini diperberat dengan adanya penyebab lain berkaitan dengan faktor psikologis, spiritual, lingkungan dan sosiokultural.

Keadaan dehidrasi dan intake yang kurang mengakibatkan penurunan berat badan yang terjadi bervariasi tergantung durasi dan beratnya penyakit. Pencernaan serta absorpsi karbohidrat dan nutrisi lain yang tidak adekuat mengakibatkan tubuh membakar lemak untuk mempertahankan panas dalam tubuh, jika tidak ada karbohidrat maka lemak digunakan untuk menghasilkan energi. Akibatnya beberapa hasil pembakaran dari metabolisme lemak terdapat

dalam darah dan urin sehingga terdapat atau kelebihan keton dalam urin (Runiari, 2010).

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Tatik, 2012) menjelaskan mual dan muntah dapat disebut fisiologis apabila frekuensi kurang atau sama dengan 10 kali dalam satu hari, tidak mengganggu aktivitas atau ibu hamil masih dapat melakukan aktivitas yang wajar dan masih dapat makan dan minum meskipun pada beberapa ibu hamil nafsu makannya cenderung menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh (Octaviani, dkk, 2011) mengatakan hiperemesis gravidarum merupakan mual dan muntah yang berlebihan sebanyak 10 kali dalam 24 jam atau setiap saat sehingga mengganggu kesehatan dan sering di temukan pada kehamilan trimester I.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh (Tatik, dkk, 2012) mendapatkan frekuensi mual muntah 10 kali sebanyak 96,6% dan 3,4% 10 kali.

Hiperemesis gravidarum sering terjadi pada ibu hamil yang tidak bekerja karena adanya kesukaran hidup yang hanya mengandalkan pendapatan suami atau karena rutinitas ibu di rumah yang membosankan berkaitan dengan faktor psikologi sebagai pemicu terjadinya hiperemesis gravidarum (Prawirohardjo, 2009).

Pekerja adalah segala usaha yang dilakukan atau dikerjakan untuk mendapatkan hasil atau upah yang dapat dinilai dengan uang (Depkes RI, 2008).

Sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa pekerjaan ibu yang beresiko rendah terhadap hiperemesis gravidarum adalah antara ibu rumah tangga dan

pekerja salon. Sedangkan pekerjaan yang beresiko tinggi antara lain adalah pelayan toko, pelayan department store, pekerja kantor, karyawan pabrik, petani. Jadi pekerjaan dilihat dari aktivitas yang dilakukan untuk menunjang kehidupannya dan keluarganya, diukur berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan sehari-hari.

Sejalan dengan hasil penelitian oleh (Sastri, 2013) menunjukkan bahwa ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum pada ibu yang tidak bekerja sebanyak 67 orang (66,3%) lebih banyak daripada yang bekerja yaitu 34 orang (33,7%).

Hasil penelitian oleh (Anasari, 2012) mendapatkan ibu yang bekerja dengan hiperemesis gravidarum sebanyak 11,2% dan yang tidak bekerja sebanyak 88,8%. Beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara teori dan kasus.

Pada faktor predisposisi juga disebutkan faktor psikologis. Hubungan faktor psikologis dengan kejadian hiperemesis gravidarum belum jelas. Besar kemungkinan bahwa wanita yang menolak hamil, takut kehilangan pekerjaan, keretakan hubungan dengan suami dan sebagainya, diduga dapat menjadi faktor kejadian hiperemesis gravidarum (Manuaba, 2014).

Stres mempengaruhi hipotalamus dan memberi rangsangan pada pusat muntah otak sehingga terjadi kontraksi otot abdominal dan otot dada yang disertai dengan penurunan diafragma menyebabkan tingginya tekanan dalam lambung memaksa ibu untuk menarik nafas dalam-dalam sehingga membuat

sfingter esofagus bagian atas terbuka dan sfingter bagian bawah berelaksasi maka menimbulkan mual dan muntah (Rochjati dalam Sastri, 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyowati, dkk, 2012) menunjukkan bahwa sebagian responden yang merasakan tingkat stress ringan namun sedang mengalami hiperemesis gravidarum sebanyak 4,8% dan tingkat stress sedang sebanyak 87,5%. Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa tidak ada kesesuaian teori dengan kasus yang didapatkan bahwa ibu sangat menunggu kehamilannya.

Dari data subjektif diketahui Ny “F” berumur 27 tahun sedang hamil anak pertama dan tidak pernah keguguran. Ibu haid terakhir tanggal 02 Maret 2016, ibu mengatakan usia kehamilannya ± 2 bulan.

Penjelasan Rochjati dalam Sastri (2010) yaitu ibu hamil lebih beresiko menderita hiperemesis gravidarum pada umur <20 dan >35 tahun. Usia yang terlalu muda atau berumur <20 tahun secara fisiologis dan fungsional rahim seorang ibu belum sepenuhnya berfungsi optimal dan psikologis belum siap untuk hamil serta menjadi orang tua. Akibatnya terjadi konflik mental yang membuat ibu tidak memperhatikan asupan nutrisinya dan menyebabkan iritasi lambung, sehingga menimbulkan reaksi pada *impuls motoric* untuk memberi rangsangan pada pusat muntah. Sedangkan ibu yang usianya >35 tahun dapat mengakibatkan terjadinya penurunan fungsi termasuk organ reproduksi dan secara psikologis ibu merasa tidak sanggup lagi untuk hamil atau tidak

menginginkan kehamilan yang dapat memicu stress dan merangsang hipotalamus pada pusat muntah di otak.

Pada ibu primigravida belum mampu beradaptasi dengan hormon estrogen dan HCG yang membuat kadar asam lambung meningkat sehingga muncul keluhan rasa mual. Faktor psikologis memegang peranan penting diantaranya adalah takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai seorang ibu sehingga menyebabkan konflik mental yang dapat memperberat mual dan muntah sebagai ekspresi tidak sadar terhadap keengganan menjadi hamil atau sebagai kesukaran hidup (Manuaba, 2010).

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Syarifah, 2012) menunjukkan ada beberapa faktor yang berhubungan dengan kejadian hiperemesis gravidarum yaitu: umur ibu, paritas, dan usia kehamilan. Dalam penelitian faktor pertama didapatkan responden <24 tahun sebanyak 42,5% lebih sedikit dari responden >24 tahun sebanyak 57,5%. Paritas, pada primigravida yang mengalami hiperemesis gravidarum sebanyak 86,5% sedangkan pada multigravida yang mengalami hiperemesis gravidarum sebanyak 2,8%. Dan pada usia kehamilan, diketahui kehamilan ibu 12 minggu (Trimester I) yang menderita hiperemesis gravidarum sebanyak 65,2% sedangkan pada kehamilan 12 minggu (Trimester II) terdapat 36%.

Berdasarkan hasil penelitian oleh (Anasari, 2012) didapatkan umur ibu dengan kehamilan beresiko lebih sedikit yaitu sebanyak 20,6% daripada

kehamilan tidak beresiko sebanyak 79,4%. Pada paritas, didapatkan primigravida sebanyak 54,2% dan multigravida sebanyak 45,8%.

Pada hasil penelitian (Sastri, 2013) didapatkan umur ibu hamil dengan resiko tinggi sebanyak 64,3% dan resiko rendah sebanyak 35,7% serta paritas primigravida sebanyak 56,5% dan multrigravida sebanyak 42,5%. Dapat dilihat dari uraian beberapa hasil penelitian bahwa ada hubungan usia ibu, paritas, dan usia kehamilan dengan kejadian hiperemesis gravidarum.

Data objektif didapatkan bahwa keadaan umum ibu lemah, turgor kulit kurang baik, tanda-tanda vital tidak seimbang. Pada mata dilakukan pemeriksaan didapatkan mata cekung, konjungtiva pucat, sclera sedikit ikterus. Bibir tampak kering, terdapat sariawan dan lidah kotor. Pada Ny “F” didapatkan kehamilan dengan hiperemesis gravidarum tingkat II.

Teori hiperemesis gravidarum tingkat II menjelaskan dehidrasi yang semakin meningkat mengakibatkan turgor kulit semakin turun, lidah kering dan kotor, mata tampak cekung dan karena fungsi hati terganggu sehingga menimbulkan ikterus. Pada sistem kardiovaskuer, frekuensi nadi semakin cepat >100 x/menit, nadi kecil karena volume darah turun, suhu badan meningkat, dan tekanan darah turun. Sedangkan pada organ ginjal, dehidrasi menimbulkan gangguan fungsi yang dapat menyebabkan oliguria, anuria, dan terdapat timbunan benda keton aseton. Aseton dapat tercium dalam hawa pernafasan itu sendiri. Kadang-kadang muntah bercampur darah akibat rupture esofagus dan

pecahnya mukosa lambung pada *sindrom Mallory Weiss*. Dari kasus yang didapatkan dan dikaitkan dengan teori menunjukkan ada kesenjangan.

Data penunjang Ny “F” didapatkan bahwa ibu pernah melakukan pemeriksaan di salah satu rumah sakit di Makassar dengan menggunakan USG. Pada pemeriksaan diketahui janin tunggal, ukuran jarak dari puncak kepala ke ekor bayi atau disebut CRL (*Crown Rump Length*) yaitu 1,18 cm, umur kehamilan atau GA (*Gestational Age*) 6 minggu 3 hari. Dilakukan pemeriksaan urin yaitu plano test (+), urin keruh berwarna kuning. Dan pengambilan darah hasil Hb 11,8 gr%, leukosit 14,8 ribu/ul, neutrofil 73,8, limfosit 18,8%, dan eritrosit 4,8 juta/ul.

Pemeriksaan USG merupakan suatu metode diagnosis dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mempelajari morfologi dan fungsi suatu organ berdasarkan gambaran eko dari gelombang ultrasonik yang dipantulkan oleh organ. Penentuan usia kehamilan dilakukan berdasarkan tabel data atau nomogram yang menggambarkan hubungan antara ukuran biometri janin dan usia kehamilan pada kehamilan tersebut (Prawirohardjo, 2014). Terdapat kesenjangan teori dan kasus yang didapatkan.

Beberapa faktor predisposisi juga salah satunya adalah faktor adaptasi dan hormonal. Pada wanita hamil yang kekurangan darah lebih sering terjadi hiperemesis gravidarum. Dapat dimasukkan dalam ruang lingkup faktor adaptasi adalah wanita hamil dengan anemia, wanita primigravida, dan overdistensi rahim pada hamil kembar dan hamil mola hidatidosa (Manuaba, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh (Tatik, dkk) pada ibu hamil tidak mengalami anemia dengan trimester I dan trimester II sebanyak 39 orang (66,1%) yang mengalami mual dan muntah <10 x/hari sedangkan yang mengalami anemia sebanyak 18 orang (31,6%).

Salah satu perubahan yang terjadi pada ibu hamil yaitu perubahan sirkulasi darah ibu, termasuk didalamnya perubahan sel darah. Sel darah merah semakin meningkatkan jumlahnya untuk mengimbangi pertumbuhan janin dalam rahim, tetapi pertambahan sel darah merah darah tidak seimbang dengan peningkatan volume sehingga terjadi hemodilusi yang disertai anemia fisiologis (Manuaba, 2010).

Sedangkan dari hasil penelitian oleh (Anasari T, 2012) membuktikan bahwa ada hubungan antara faktor kehamilan ganda dengan kejadian hiperemesis gravidarum dengan OR sebesar 3,253. Kehamilan ganda terjadi apabila dua atau lebih ovum dilepaskan dan dibuahi atau apabila satu ovum yang dibuahi membelah secara dini hingga membentuk dua embrio yang sama pada stadium massa sel dalam atau lebih awal. Kehamilan kembar dapat memberi resiko yang lebih tinggi terhadap ibu dan janin.

Kehamilan kembar umumnya plasenta besar atau ada 2 plasenta maka produksi HCG akan tinggi pada kehamilan ganda menimbulkan dugaan bahwa faktor hormon memegang peranan karena pada keadaan tersebut hormon HCG dibentuk berlebihan (Winkjosastro, 2007).

Dan pada penelitian oleh (Nelis H, dkk, 2012) didapatkan hasil sebanyak 64,7% responden molahidatidosa mengalami hiperemesis gravidarum karena HCG memicu tingginya asam lambung dan dapat merangsang mual dan muntah yang berlebihan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan dapat menyebabkan dehidrasi. Melihat dari beberapa faktor menunjukkan tidak ada kesenjangan yang terdapat pada teori dan kasus yang didapatkan.

B. LANGKAH II : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH AKTUAL

Berdasarkan data pada kasus Ny “F” dapat ditegakkan diagnosa sebagai berikut: Ny “F” dengan GIP0A0, gestasi 8 minggu 6 hari, intrauterine, keadaan ibu lemah dengan hiperemesis gravidarum tingkat II serta gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Masalah yang dirasakan ibu adalah cemas karena mual dan muntah.

Menetapkan diagnosa hiperemesis gravidarum tidak sukar, dengan menentukan kehamilan, muntah berlebihan sampai menimbulkan gangguan kehidupan sehari-hari dan dehidrasi (Manuaba, 2014).

Diagnosis harus ditentukan adanya kehamilan muda dan muntah terus menerus, sehingga mempengaruhi keadaan umum. Namun demikian, harus dipikirkan kehamilan muda dengan penyakit pielonefritis, hepatitis, ulkus ventrikuli dan tumor serebri yang dapat menyebabkan kekurangan makanan yang dapat pula memberikan gejala muntah (Rahmawati, 2011).

Tanda dan gejala hiperemesis gravidarum tingkat I apabila muntah terus menerus sehingga menimbulkan dehidrasi ditandai dengan turgor kulit turun,

nafsu makan berkurang, berat badan turun, mata cekung dan lidah kering. Pada epigastrium terjadi nyeri karena asam lambung meningkat dan terjadi regurgitasi ke esofagus, nadi meningkat dan tekanan darah turun, frekuensi nadi sekitar 100 x/menit, tampak lemah dan lemas (Rahmawati, 2011).

Merujuk pada hiperemesis gravidarum tingkat II menjelaskan dehidrasi yang semakin meningkat mengakibatkan turgor kulit semakin turun, lidah kering dan kotor, mata tampak cekung dan karena fungsi hati terganggu sehingga menimbulkan ikterus. Pada sistem kardiovaskuler, frekuensi nadi semakin cepat >100 x/menit, nadi kecil karena volume darah turun, suhu badan meningkat, dan tekanan darah turun. Sedangkan pada organ ginjal, dehidrasi menimbulkan gangguan fungsi yang dapat menyebabkan oliguria, anuria, dan terdapat timbunan benda keton aseton. Aseton dapat tercium dalam hawa pernafasan itu sendiri. Kadang-kadang muntah bercampur darah akibat rupture esofagus dan pecahnya mukosa lambung pada *sindrom Mallory Weiss* (Rahmawati, 2011).

Sedangkan pada hiperemesis gravidarum tingkat III keadaan lebih parah, muntah berhenti, *sindrom Mallory Weiss*, kesadaran makin menurun hingga mencapai somnollen atau koma, juga terdapat ensefalopati wernicke seperti nystagmus, diplopia, gangguan mental. Pada kardiovaskuler didapati nadi kecil, tekanan darah menurun dan temperature suhu meningkat. Ikterus semakin berat dan terdapat timbunan aseton yang makin tinggi dengan bau yang makin tajam akibat gastrointestinal. Di ginjal, oliguria semakin parah dan menjadi anuria (Rahmawati, 2011).

C. LANGKAH III : IDENTIFIKASI DIAGNOSA/MASALAH POTENSIAL

Dalam kasus Ny “F” telah dilakukan tindakan yang cepat dan tepat sehingga tidak terjadi diagnosa potensial yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin.

Teori menjelaskan muntah yang terjadi terus menerus tanpa pengobatan dapat menimbulkan gangguan tumbuh kembang janin dengan manifestasi klinisnya. Oleh karena itu, hiperemesis gravidarum berkelanjutan harus dicegah dan harus mendapat pengobatan yang adekuat (Manuaba, 2014).

Hasil penelitian dari (Putri, dkk, 2013) menjelaskan kehamilan yang sehat merupakan suatu kondisi sehat fisik dan mental ibu serta janin yang dikandungnya. Status kesehatan ibu hamil mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan janin yang dikandungnya. Pada saat hamil seorang ibu memerlukan asupan nutrisi lebih banyak, ibu hamil harus memberikan nutrisi yang cukup untuk janin, agar meminimalisir kemungkinan kecil terjadi komplikasi mual dan muntah secara berlebihan khususnya pada kehamilan trimester I.

Didapatkan pula hasil penelitiannya hubungan paritas dan status nutrisi dengan hiperemesis gravidarum yaitu pada primigravida sebanyak 53,3% dan 46,7% ibu dengan multrigravida. Hiperemesis gravidarum tingkat I yang dialami responden sebanyak 63,3% lebih banyak dari hiperemesis gravidarum tingkat II yaitu 36,7%. Dan responden yang mengalami hiperemesis gravidarum tingkat I

dengan status nutrisi kurang sebanyak 78,3% dan 21,7% pada hiperemesis gravidarum tingkat II.

Masalah potensial yang dapat terjadi pada kehamilan dengan hiperemesis gravidarum yaitu pada ibu dan janin sebagai berikut:

Pada ibu hamil dengan usia muda perlu tambahan gizi yang banyak karena digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan dirinya sendiri juga untuk berbagi dengan janin yang sedang dikandungnya. Sedangkan untuk ibu hamil dengan usia tua perlu energi yang besar karena fungsi organ yang semakin melemah dan diharuskan untuk bekerja maksimal maka memerlukan tambahan energi yang cukup guna mendukung kehamilan yang sedang berlangsung.

Teori lain menyebutkan bahwa mual dan muntah pada ibu dengan trimester I akan berpengaruh terhadap status gizi yaitu pertumbuhan embrio pada masa perkembangan dan pembentukan organ-organ tubuh (organogenesis). Pada trimester II dan III kebutuhan janin terhadap zat-zat atau gizi semakin meningkat jika tidak terpenuhi, plasenta akan kekurangan zat makanan sehingga akan mengurangi kemampuannya dalam mensintesis zat-zat yang dibutuhkan oleh janin. Gizi ibu hamil menentukan berat bayi yang dilahirkan, maka pemantauan gizi ibu hamil penting dilakukan. Selain itu, umur kehamilan dapat menentukan berat badan janin, semakin tua kehamilan maka berat badan janin akan semakin bertambah. Pada umur kehamilan 28 minggu berat janin \pm 1000 gram, sedangkan pada kehamilan 37-42 minggu berat janin diperkirakan mencapai 2500-3500 gram (Gunawan K, dkk, 2011).

Ada beberapa dampak yang dapat terjadi apabila ibu mengalami hiperemesis gravidarum menurut Mochtar dalam Putri dkk (2013) yaitu terjadi perdarahan berupa bercak pada otak, pendarahan *sub endokardinal* pada jantung, pucat degenerasi pada *tubuli kontorti* ginjal dan kemungkinan adanya hepar pada tingkat ringan.

Pada bayi, jika hiperemesis ini terjadi hanya di awal kehamilan tidak berdampak terlalu serius, tetapi jika sepanjang kehamilan si ibu menderita hiperemesis gravidarum, maka kemungkinan bayinya mengalami *BBLR*, *IUGR*, Prematur hingga terjadi abortus (Wiknjosastro, 2007).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jannah, 2013) menunjukkan bahwa sebanyak 62,1% ibu yang mengalami hiperemesis gravidarum saat melahirkan pada bayi mengalami *BBLR* sedangkan ibu yang tidak mengalami hiperemesis gravidarum saat kehamilan pada bayi mengalami *BBLR* sebanyak 19,5%.

Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan kejadian hiperemesis gravidarum dengan *BBLR* pada ibu bersalin. Namun berdasarkan data dalam penerapan asuhan kebidanan pada Ny “F” tidak ada data yang menunjukkan bahwa terjadi gawat janin.

D. LANGKAH IV : TINDAKAN SEGERA/KOLABORASI

Tindakan ini dilakukan apabila menemukan adanya diagnosa potensial atau masalah emergency sehingga membutuhkan tindakan segera atau tindakan kolaborasi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Gunawan K, dkk, 2011) menjelaskan bahwa perempuan hamil dengan hiperemesis gravidarum dan kenaikan berat badan dalam kehamilan yang kurang <7 kg memiliki risiko yang lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah, kecil untuk masa kehamilan, prematur, dan nilai APGAR lima menit kurang dari tujuh. Perlu diwaspada jika terdapat muntah berat yang disertai dengan gejala okular, seperti perdarahan retina atau hambatan gerakan ekstraokular.

Berdasarkan penerapan asuhan terhadap Ny “F” tidak ada data yang menunjang untuk dilakukannya tindakan segera atau kolaborasi.

E. LANGKAH V : INTERVENSI

Pada langkah ini ditentukan asuhan yang menyeluruh dimana asuhan ini ditentukan oleh langkah sebelumnya. Jika terdapat diagnosa potensial maka dilakukan rencana asuhan sesuai dengan diagnosa.

Kebutuhan dari masalah tersebut adalah memberikan konseling, motivasi dan dukungan mental tentang keadaan kehamilannya. Menurut (Mansjoer, 2009) kebutuhan adalah hal-hal yang dibutuhkan pasien dan belum teridentifikasi dalam diagnosa dan masalah yang didapatkan dengan melakukan analisa data.

Pada kasus Ny “F” rencana asuhan yang diterapkan antara lain pemberian cairan, pemantauan tanda-tanda vital, pemantauan muntah dan urine, pemberian cairan dan obat, anjuran pemenuhan kebutuhan cairan dan nutrisi serta beri motivasi untuk psikologis ibu.

Dalam penanganan kehamilan dengan hiperemesis gravidarum yang perlu diperhatikan adalah pemantauan keadaan ibu yang meliputi tanda-tanda vital, pemantauan muntah dan urine, pemberian cairan dan obat. Ibu disarankan untuk memperhatikan pemenuhan kebutuhan cairan dan nutrisi serta beri motivasi ibu untuk psikologisnya.

Hal ini sesuai dengan teori pengobatan selama kehamilan dengan hiperemesis gravidarum tingkat II yaitu isolasi atau pengobatan psikologis, pemberian cairan pengganti dan obat untuk dapat membantu proses pemulihan kondisi ibu dengan pemberian obat yang aman untuk ibu serta janin. Dan dapat membantu mengganti cairan dan elektrolit yang keluar melalui muntah.

Isolasi dan pengobatan psikologis. Dengan melakukan isolasi di ruangan sudah dapat meringankan wanita hamil karena perubahan suasana dari lingkungan rumah tangga. Petugas dapat memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang berbagai masalah berkaitan dengan kehamilan.

Pemberian cairan pengganti. Dalam keadaan darurat diberikan cairan pengganti sehingga keadaan dehidrasi dapat diatasi. Cairan pengganti yang diberikan adalah glukosa 5-10% dengan keuntungan dapat mengganti cairan yang hilang dan berfungsi sebagai sumber energi, sehingga terjadi perubahan metabolisme dari lemak dan protein menjadi pemecahan glukosa. Dalam cairan dapat ditambahkan vitamin C, B kompleks atau kalium yang diperlukan untuk kelancaran metabolisme. Selama pemberian cairan harus mendapat perhatian tentang keseimbangan cairan yang masuk dan keluar melalui kateter, nadi, tekanan

darah, suhu dan pernapasan. Lancarnya pengeluaran urine memberikan petunjuk bahwa keadaan wanita hamil berangsur-angsur baik (Praworihardjo, 2009).

Menurut Irianti dalam penelitian Octaviadon (2011) menyebutkan ada beberapa bentuk dukungan sosial sesuai dengan kebutuhannya antara lain:

1. Dukungan harga diri untuk membantu pemecahan masalah individu seperti keraguan terhadap kemampuan diri. Dukungan dapat berupa perhatian, dorongan, sapaan atau kasih sayang.
2. Dukungan informasi untuk menyelesaikan masalah. Dukungan dapat berupa informasi, saran, nasihat pemecahan masalah dan umpan balik.
3. Dukungan instrumental adalah bantuan nyata dalam bentuk materi atau benda yang dibutuhkan guna meringankan beban individu.
4. Dukungan kedekatan sosial untuk menghindari individu dari kesepian dan kesendirian.
5. Dukungan motivasi yang bertujuan agar individu termotivasi segera mencari penyelesaian masalah.

Sedangkan menurut penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wiwik, dkk, 2015) dukungan suami sangat diperlukan dalam menentukan berbagai kebijakan dalam keluarga. Dukungan tersebut bisa dalam bentuk verbal dan non verbal, saran, bantuan yang nyata berupa tingkah laku atau kehadiran yang dapat memberikan keuntungan emosional dan mempengaruhi tingkah laku istrinya.

F. LANGKAH VI : IMPLEMENTASI

Rencana tindakan dibuat berdasarkan intervensi yang dibuat sebelumnya.

Rencana tindakan yang dibuat sesuai dengan teori yaitu pemberian cairan dan obat, pementauan tanda-tanda vital, pemantauan muntah dan urine, pemberian cairan dan obat, anjuran pemenuhan kebutuhan cairan dan nutrisi serta beri motivasi untuk psikologis ibu.

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “F” yaitu memberitahu ibu dan keluarga hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Dari hasil penelitian menunjukkan sebagian besar ibu hamil sebanyak 64,4% memiliki pengetahuan yang baik dalam mencegah kejadian hiperemesis gravidarum dan sebanyak 54,8% sebagian ibu hamil memiliki sikap yang positif dalam mencegah kejadian hiperemesis gravidarum. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan dengan sikap ibu hamil dalam mencegah kejadian hiperemesis gravidarum (Wiwik Octaviani, dkk, 2015).

Pada Ny “F” telah diberikan pemberian cairan terpasang cairan valamin 40 tpm, cairan RL 28 tpm, cairan dextrose 5% 28 tpm. Melakukan injeksi ranitidine dan ondansetron 1 amp/IV/8 jam dan drips neurobion/24 jam. Dilanjutkan memantau muntah tiap 2 jam dan pengeluaran urine serta tanda-tanda vital. Memberikan obat antasida sirup 3x1. Mengkonsumsi makanan yang bernutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Istirahat yang cukup dan tidak melakukan pekerjaan berat serta membatasi pengunjung. Dan memberi dukungan


psikologis kepada ibu. Terdapat kesenjangan antar teori dan kasus yang didapatkan.

G. LANGKAH VII : EVALUASI

Pada langkah ini dilakukan evaluasi terhadap asuhan yang telah diberikan.

Berdasarkan penerapan asuhan kebidanan terhadap Ny “F” didapatkan hiperemesis gravidarum tingkat II yang dialami oleh ibu mulai membaik dan kembali normal seperti kehamilan lainnya.

Hasil evaluasi didapatkan bahwa kehamilan ibu akan berlangsung normal.



BAB V

PENUTUP

Setelah melakukan studi kasus pada Ny “F” dengan kehamilan hiperemesis gravidarum serta menghubungkan dengan teori dan konsep asuhan kebidanan antenatal, maka penulis akan menarik kesimpulan dan saran yaitu:

A. KESIMPULAN

1. Telah dilakukan pengkajian dan analisis data dasar pada Ny “F” dengan hiperemesis gravidarum tingkat II di RSUD Ibu dan Anak Pertiwi tahun 2016. Pada kasus Ny “F” didapatkan data dasar mual dan muntah ±8 x/hari disertai pusing dan nyeri ulu hati.
2. Telah dilakukan pengidentifikasi diagnosa/masalah actual pada Ny ‘F’ dengan hiperemesis gravidarum tingkat II di RSUD Ibu dan Anak Pertiwi tahun 2016. Ny “R” dengan masalah actual hiperemesis gravidarum tingkat II serta gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit.
3. Telah dilakukan pengidentifikasi diagnosa/masalah potensial pada Ny “F” dengan hiperemesis gravidarum tingkat II di RSUD Ibu dan Anak Pertiwi tahun 2016. Masalah potensial yaitu antisipasi terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin.
4. Tidak ada dilakukan tindakan segera/kolaborasi pada Ny “F” dengan hiperemesis gravidarum tingkat II di RSUD Ibu dan Anak Pertiwi tahun 2016.

5. Telah dilakukan penyusunan rencana tindakan asuhan kebidanan pada Ny “F” dengan hiperemesis gravidarum tingkat II di RSUD Ibu dan Anak Pertiwi tahun 2016. Intervensi dilakukan dengan rawat inap ibu, kolaborasi dengan dokter dalam melakukan tindakan dan pemberian obat, dan diet hiperemesis gravidarum tingkat II.
6. Telah dilakukan tindakan asuhan kebidanan pada Ny “F” dengan hiperemesis gravidarum tingkat II di RSUD Ibu dan Anak Pertiwi tahun 2016. Telah dilakukan sesuai dengan intervensi tindakan dan pemberian obat pukul 21.10 WITA terpasang cairan valamin 40 tpm, pukul 21.15 WITA injeksi ranitidine 1 amp/IV/8 jam dan injeksi ondansetron 1 amp/IV/8 jam.
7. Telah dilakukan evaluasi asuhan kebidanan pada Ny “F” dengan hiperemesis gravidarum tingkat II di RSUD Ibu dan Anak Pertiwi tahun 2016. Kondisi ibu baik dan tidak muntah lagi, pemberian cairan dan obat telah diberikan setelah itu aff infus, tanda-tanda vital berada dalam batas normal, ibu telah diperbolehkan pulang dengan memberi health education makanan bergizi saat kehamilan dan penjelasan tanda bahaya pada kehamilan.

B. SARAN

Melihat besarnya efek yang ditimbulkan hiperemesis gravidarum tingkat II yang berdampak buruk baik pada ibu dan bayi, maka perlu diberikan tindakan yang tepat dan segera untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, adapun penulis sarankan sebagai berikut:

1. Untuk mencegah kejadian hiperemesis gravidarum tingkat II maka perlu peningkatan kualitas pelayanan ANC dengan mengenali sedini mungkin komplikasi-komplikasi pada kehamilan dan upaya menanganinya.
2. Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam melaksanakan asuhan diperlukan kerjasama yang baik dengan pasien, keluarga pasien, dokter, serta bidan yang terlibat dalam penanganan kasus klien.
3. Seorang bidan harus dapat menilai dan mengetahui penyulit-peyulit yang dapat terjadi pada kehamilan serta memberikan tindakan yang efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

- Anasari, T. 2012. *Beberapa Determinan Penyebab Kejadian Hiperemesis Gravidarum di RSU Ananda Purwokerto.*
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, DH. 2012. *Buku Ajaran Asuhan Kebidanan 1 Kehamilan.* Jakarta: Rohima Press.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2008. *Kebijakan Departemen Kesehatan Tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Pekerja Wanita.* Jakarta: Pusat Kesehatan Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Fauziyah, Y. 2012. *Obstetri Patologi Untuk Mahasiswa Kebidanan dan Keperawatan.* Yogyakarta: Nuha Medika.
- Gunawan, dkk. 2011. *Diagnosis dan Tata Laksana Hiperemesis Gravidarum.*
<https://almanhaj.or.id/3033-proses-dan-perkembangan-janin-di-rahim.html>
<http://dinkes.sulselprov.go.id/#>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Emesis_gravidarum
- <https://www.slideshare.net/ndejava/mekanisme-mual-dan-muntah>
- Jannah, R. 2013. *Hubungan Kejadian Hiperemesis Gravidarum dengan Berat Badan Lahir Rendah Pada Ibu Bersalin di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Jaya Baru Banda Aceh.*
- Kementerian Agama RI, 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Tajwid.* PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Lisnawati, L. 2012. *Asuhan Kebidanan Terkini Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal.* Jakarta: CV Trans Info media.
- Mansjoer, Arif. 2009. *Kapita Selekta Kedokteran.* Jakarta: Media Aesculapius.

- Manuaba, dkk. 2010. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB Untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta: EGC.
- Manuaba, IAC. 2014. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB Untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta: EGC.
- Margareth, ZH. 2013. *Kehamilan, Persalinan dan Nifas*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Muslihatun, WN. 2009. *Dokumentasi Kebidanan*. Yogyakarta: Fitramaya.
- Nelis, dkk. 2012. *Hubungan Primigravida, Mola Hidatidosa dan Gemelli dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum Pada Ibu Hamil di Ruang Mawar RSUD dr. M. Yunus Bengkulu*.
- Notoatmodjo, S. 2010. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Octaviadon, A.D. 2011. *Hubungan Dukungan Suami Terhadap Kehamilan dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum*.
- Prawirohardjo, Sarwono. 2009. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Prawirohardjo, Sarwono. 20014. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Putri, dkk. 2013. *Hubungan Paritas dan Status Nutrisi dengan Hiperemesis Gravidarum Pada Ibu Hamil Trimester I di RB NH Kuwaron Gubug Kabupaten Purwodadi*.
- Rahmawati, N.E. 2011. *Ilmu Praktis Kebidanan*. Surabaya: Victory Inti Cipta.
- Rukiyah, dkk. 2010. *Asuhan Kebidanan 4 Patologi Kebidanan*. Jakarta: Trans Info Media.
- Runiari, N. 2010. *Asuhan Keperawatan Pada Klien dengan Hiperemesis Gravidarum: Penerapan Konsep dan Teori*. Jakarta: Salemba Medika
- Saifuddin, Abdul Bahri. 2009. *Buku Acuan Nasional Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

- Sastri, N. 2013. *Gambaran Karakteristik Ibu Hamil dengan Hiperemesis Gravidarum di Rumah Sakit Islam Sitti Khadijah Palembang.*
- Sofian, A. 2012. *Sinopsis Obstetri.* Jakarta: EGC.
- Sulistyawati, A. 2011. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Kehamilan.* Jakarta: Salemba Medika.
- Sulistyowati, dkk. 2012. *Hubungan Antara Tingkat Stres dengan kejadian Hiperemesis Gravidarum Pada Ibu Hamil Trimester I di BPS Ny Sahidah Kendal.*
- Syarifah. 2012. *Faktor-faktor Yang Berhubungan dengan Kejadian Hiperemesis Gravidarum Pada Ibu Hamil yang Dirawat di Rumah Sakit Gumawang Belitang OKU Timur.*
- Tatik, dkk. 2012. *Hubungan Emesis Gravidarum Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Trimester I dan II.*
- Varney, H. 2007. *Asuhan Kebidanan.* Jakarta: EGC.
- Wiknjosastro, H. 2007. *Ilmu Kebidanan.* Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Wiwik, dkk. 2015. *Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Ibu Hamil Dalam Mencegah Kejadian Hiperemesis Gravidarum di Wilayah Kerja Puskesmas Padalarang.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Samata-Gowa
Kampus II : Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax. (0411) 8221400 Samata-Gowa

Nomor : FKIK/PP.00.9/2016/2016

Makassar, 29 Februari 2016

Lamp :-

Hal : **Permohonan Izin Pengambilan Data**

Kepada Yth.
Direktur RSKD Ibu dan Anak Pertiwi
di-
Makassar

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan proposal Karya Tulis Ilmiah mahasiswa Jurusan Kebidanan Semester VI (enam) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Eka Suryaningrat
NIM : 70400113001
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Pada Ny. X Dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat II di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi.

8/3.16
maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami tersebut dapat diberikan rekomendasi untuk pengambilan data awal dalam penyelesaian proposal penelitian.

Demikian harapan kami, atas bantuan dan kerjasama baiknya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Wassalam
An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.
Nip. F2810405 200604 2 003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK PERTIWI
Jln. Jend. Sudirman Nomor 14 Telepon (0411) 316134 Fax. 312242
MAKASSAR 90113

INSTALASI DIKLAT

Nomor : 855 /RSKDP.1/ viii /2016

Makassar, 05 Agustus 2016

Perihal : Pengambilan Data / Penelitian
Lampiran : -

Kepada
Yth. Ka Instalasi / Ka. Ruang

.....

Di –
Tempat

Dengan Hormat,

Mohon bantuannya untuk memberikan data/informasi yang diperlukan untuk penelitian kepada yang bersangkutan :

Nama : EKA SURYANINGRAT

Nim : 70400113001

Program Studi : DIII KEBIDANAN

Institusi : UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Judul Penelitian : MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL DENGAN HIPERREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT II

Atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Wasalam,
Ka. Instalasi Diklat

dr. Hj. Susiawaty, Sp.OG, M.Kes
Nip : 19639121 199002 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK PERTIWI
Jln. Jend. Sudirman Nomor 14 Telepon (0411) 316134 Fax. 312242
MAKASSAR 90113

SURAT KETERANGAN

Nomor : 42011229/RSKDP/I/III/2016

Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa :

Nama	:	EKA SURYANINGRAT
NIM	:	70400113001
Program Studi	:	DIII. KEBIDANAN
Kampus	:	UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Pekerjaan	:	MAHASISWA
Alamat	:	Jl. Sultan Alauddin No.63

Telah melaksanakan Pengambilan Data Awal Pada Bulan Februari Sampai Maret 2016, di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi Prov. SulSel jalan Jendral Sudirman No. 14 Makassar, dengan judul "Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Pada Ny. X Dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat II di RSKDIA Pertiwi Makassar".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 14 Maret 2016

An. DIREKTUR RUMAH SAKIT KHUSUS
DAERAH IBU DAN ANAK PERTIWI
KEPALA SUB.BAG.TATA USAHA



H. TURA. S.Si.M.kes
NIP : 19650123 198803 1 004



120161914210648

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS - PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
(UPT - P2T)

Nomor : 10379/S.01P/P2T/08/2016
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Direktur RSKDIA Pertwi Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : 5189/Un.06/FKIK/PP.00.9/07/2016 tanggal 28 Juli 2016 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : EKA SURYANINGRAT
Nomor Pokok : 70400113001
Program Studi : Kebidanan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL DENGAN HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT II DI
RSKD IBU DAN ANAK PERTWI "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 01 s/d 29 Agustus 2016

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 01 Agustus 2016

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar;
2. Pertiggal.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK PERTIWI
Jln. Jend. Sudirman Nomor 14 Telepon (0411) 316134 Fax. 312242
MAKASSAR 90113

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470 / 2220/R SKDP/I/VIII/2016

Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa :

Nama	:	EKA SURYANINGRAT
NIM	:	70400113001
Program Studi	:	DIII. KEBIDANAN
Kampus	:	UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Pekerjaan	:	MAHASISWA
Alamat	:	Jl. Sultan Alauddin No.63

Telah melaksanakan Penelitian Pada Bulan Agustus 2016, di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi Prov. SulSel jalan Jendral Sudirman No. 14 Makassar, dengan judul "Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Care Dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat II di RSKDIA Pertiwi Makassar".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Makassar, Agustus 2016

An. DIREKTUR RUMAH SAKIT KHUSUS
DAERAH IBU DAN ANAK PERTIWI
KEPALA SUB.BAG.TATA USAHA

H. TURA. S.SI.M.kes
NIP. 19650123 198803 1 004

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI

JUDUL

**"MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN ANTENATAL DENGAN KASUS
HIPEREMESIS GRAVIDARUM TINGKAT II DI RSKD IBU DAN ANAK
PERTIWI TAHUN 2016"**

Telah disetujui oleh pembimbing untuk di ajukan dalam seminar Hasil Karya
Tulis Ilmiah (KTI) mahasiswa kebidanan.

Pembimbing

Fidayanti, S.SiT, M.Keb
NIP: 19751113 200604 2 0001

UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN
MAKASSAR




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. (0411) 864923. Makassar 90221

Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No. 36 (0411) 841879 Fax. (0411) 8221400. Samata-Gowa 92113

WAKTU PERSETUJUAN UJIAN


NAMA : Eka Suryaningrat
NIM : 70400113001
JUDUL : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat II di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi TAHUN 2016.

NO	NAMA	JABATAN	HARI/TANGGAL	WAKTU	TANDA TANGAN
1.	Fidayanti, S.SiT.,M.Keb	Pembimbing	Rabu 29-03-2017	11.00 WITA	
2.	Andi Sri Hastuti Handayani Usman, S.ST	Pengaji I	Rabu 29-03-2017	11.00 WITA	
3.	Dra. Hj. Hartini, M.HI	Pengaji II	Rabu 29-03-2017	11.00 WITA	

Samata-Gowa,

Mei 2017

Pembimbing



Fidayanti, S.SiT., M.Keb
NIP. 19751113 200604 2 0001

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 43 TAHUN 2016

TENTANG

DEWAN PENGUJI UJIAN KARYA TULIS ILMIAH
JURUSAN/PROGRAM STUDI KEBIDANAN TAHUN AKADEMIK 2015/2016

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR


- Membaca : Surat pengantar mahasiswa Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Jurusan Kebidanan atas nama: **Eka Suryanigrat NIM. 70400113001** tertanggal 29 Maret 2017 perihal permohonan Ujian Karya Tulis Ilmiah pada tanggal 29 Maret 2017 Yang berjudul "**Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal Dengan Hiperemesis Gravidarum Tingkat II Di RSUD Ibu Dan Anak Pertiwi Makassar Tahun 2016**"
- Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan Ujian Karya Tulis Ilmiah
b. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran Ujian Karya Tulis Ilmiah, perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja UIN Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
7. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 219C tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Dewan Penguji Ujian Karya Tulis Ilmiah Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- | | |
|------------|---------------------------------------|
| Ketua | : Dr. dr. H. Andi Armin Nurdin, M. Sc |
| Sekretaris | : Firdayanti.,S.Si.T.,M.Keb |
| Pembimbing | : Firdayanti.,S.Si.T.,M.Keb |
| Penguji I | : Andi Sri Hastuti Handayani.,S.ST |
| Penguji II | : dra.Hj.Hartini.,M.Hi |
| Pelaksana | : ST. Raodatul Jannah, S.ST |
2. Dewan penguji bertugas melaksanakan Ujian Karya Tulis Ilmiah bagi Mahasiswa yang namanya tersebut di atas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan Di : Samata
Pada Tanggal : 29 Maret 2017

An. Rektor
Dekan,

Dr. dr. H. Andi Armin Nurdin, M. Sc
NIP. 19550203 198312 1 001

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Para Pembimbing dan Penguji;


LEMBAR KEGIATAN KONSULTASI

Nama : EkaSuryaningrat
Nim : 70400113001
Judul : Manajemen Asuhan Kebidanan Antenatal dengan Kasus Hiperemesis Gravidarum Tingkat II di RSKD Ibu dan Anak Pertiwi Tahun 2016.
Pembimbing : Fidayanti, S.SiT.,M.Keb.

No.	Hari/Tgl	Materi Konsultasi	Saran/Perbaikan	Paraf
1.	Jumat 05-02-2016	Konsul Judul	ACC Judul, lanjutkan konsul kasus.	/
2.	Selasa 07-06-2016	Konsul Kasus	ACC Kasus	/
3.	Selasa 21-06-2016	Konsul BAB I	Perbaikan penulisan, tambahan materi pada manajemen asuhan kebidanan.	/
4.	Kamis 23-06-2016	Konsul Bab I dan BAB II	Perbaikan penulisan, tambahan materi pada manajemen asuhan kebidanan.	/
5.	Senin 27-06-2016	Konsul Proposal	ACC Proposal.	/
6.	Rabu 29-06-2016	Ujian Seminar Proposal		/

7.	Senin 25-07-2016	Konsul Perbaikan Proposal	Daftar pustaka, asuhan kebidanan pada langkah II, III dan IV.	/
8.	Selasa 26-07-2016	Konsul perbaikan proposal	Perbaikan asuhan kebidanan dan daftar pustaka.	/
9.	Rabu 27-07-2016	Konsul perbaikan proposal	ACC perbaikan proposal.	/
10.	Selasa 15-11-2016	Konsul BAB III	Perbaikan sistematika kasus.	/
11.	Rabu 16-11-2016	Konsul BAB III	ACC BAB III, lanjut BAB IV.	/
12.	Kamis 17-11-2016	Konsul BAB IV	Tambahan pembahasan, tambahan jurnal.	/
13.	Selasa 22-11-2016	Konsul BAB IV	Tambahan pembahasan, tambahan jurnal.	/
14.	Rabu 23-11-2016	Konsul BAB IV	Tambahan pembahasan, tambahan jurnal.	/
15.	Jumat 17-03-2017	Konsul BAB IV	Tambahan jurnal.	/
16.	Selasa 21-03-2017	Konsul BAB IV	Perbaikan penulisan.	/
17.	Senin 27-13-2017	Konsul BAB IV dan BAB V	ACC BAB I sampai V.	/

18.	Rabu 29-03-2017	Ujian hasil.		/
19.	Senin 08-05-2017	Perbaikan KTI	Perbaikan margin dan nomor halaman pada awal BAB I sampai V.	/
20.	Selasa 09-05-2017	Perbaikan KTI	ACC KTI.	/



BIODATA PENELITI



A. Identitas Peneliti

Nama lengkap	: Eka Suryaningrat
NIM	: 70400113001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat/Tgl Lahir	: Berau, 28 April 1995
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Pulau Sambit 742, Kecamatan Tanjung Redeb, Kelurahan Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur.
No. Hp	: 085247535380
Email	: eka.suryaningrat123@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2001-2007 : SDN 001 TanjungRedeb, Berau, Kal-Tim.
2. Tahun 2007-2010 : SMPN 9 Berau, Kal-Tim.
3. Tahun 2010-2013 : SMAN 2 Berau, Kal-Tim.
4. Tahun 2013-2016 : Jurusan Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sul-Sel.