

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT  
KECEMASAN PADA PASIEN PRE OPERASI DI RUANG  
BEDAH RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan Pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh:  
**M. IMRAN JUM WAHAB**  
**70300106030**  
M A K A S S A R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
JURUSAN KEPERAWATAN  
MAKASSAR  
2010**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat dengan dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 20 Agustus 2010

Penulis

**M. Imran Jum Wahab**

Nim. 70300106030


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

Skripsi ini telah kami setuju untuk diajukan pada ujian Seminar Hasil di hadapan tim penguji fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam rangka penyempurnaan penulisan.

MAKASSAR,

2010



Tim Pembimbing

Pembimbing 1

Pembimbing II

Sukriyadi S.Kep.Ns M.Kes  
NIP. 1962 0911 198803 1001

Mulyadi S.Kep.Ns  
NIP. 197502211998031005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Mengetahui

Jurusan Fakultas Ilmu Kesehatan  
Universitas Islam Negeri Makassar

Nur Hidayah,S.Kep.NS,M.Kes  
NIP. 19810405 200604 2 003

## KATA PENGANTAR



Segala Puji hanya bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami haturkan atas segala Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga tugas skripsi ini dapat kami selesaikan.

Ketika hendak memulai sampai akhir penyusunan Skripsi ini, Terus memanjatkan doa semoga dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik, walaupun banyak halangan dan rintangan, tetapi berkat kekuatan yang diberikan-Nya Alhamdulillah skripsi ini mampu kami selesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini di sadari banyak pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah SWT memberikan Rahmat-Nya kepada mereka semua dan perkenankanlah kami mempersembahkan rasa terima kasih yang tak terhingga tersebut kepada :


1. Kedua orang tuaku ucapan doa, kiranya keduanya diampuni dan dikasihi oleh Allah SWT. Sebagaimana keduanya mengasihi penulis semenjak kecil, yang atas asuhan dan limpahan kasih sayangnya, penulis beroleh kekuatan moril maupun materil dalam menapaki jenjang pendidikan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A. selaku Rektor UIN Alauddin makasar yang telah memberi kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin agar lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain.

3. Dr. M. Furqaan Naim, M. Sc, Ph.D. Selaku Dekan bersama para pembantu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negri Makassar.
4. Ketua jurusan keperawatan Nur hidayah, S.Kep.Ns.MARS dan sekertaris jurusan keperawatan Anwar Hafid, S.Kep.Ns.M.Kes yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis ketika pertama kali sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar.
5. Sukriyadi. S.Kep, Ns. M.Kes dan Rahmianti Arsyad, S.Kep,Ns. Selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah kesabaran telah memberikan bimbingan, koreksi dan petunjuk dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
6. Para dosen di lingkungan Fakultas ilmu kesehatan UIN Alauddin makassar yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis dalam menyelesaikan studi ini.
7. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu.
8. Buat teman-teman seperjuanganku dalam menimbah ilmu, teman-teman Jurusan Keperawatan 06 (Dhila, Anha, Adila, Darwis, Edhi, Galih dll) Karni dan seniorku angkatan 05 (Herul, Undi, Ramlan) serta teman-teman KKN Angkatan ke-45 (Akbar-Minna, Chupe', Cully, Dhila, Ihfar, dll), dan spesial untuk A. Fadlia yang menjadi inspirasiku selama penyusunan skripsi ini.

Kami sadar bahwa apa yang telah kami buat ini jauh dari kesempurnaan, karenanya kami memohon kritik dan saran yang membangun untuk Penyempurnaan skripsi ini.

Makassar 8 Agustus 2010

Penulis,  
M. Imran Jum Wahab



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	3
C. Tujuan penelitian.....	3
1. Tujuan umum .....	3
2. Tujuan khusus.....	4
D. Manfaat penelitian .....	4
1. Manfaat ilmiah.....	4
2. Manfaat bagi instansi.....	4
3. Manfaat bagi peneliti.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
A. Tinjauan tentang kecemasan.....	6
1. Penertian kecemasan.....	6
2. Etiologi.....	7
3. Rentang respon kecemasan.....	9
4. Tingkatan kecemasan.....	9
5. Sumber coping kecemasan.....	14
6. Mekanisme coping kecemasan.....	14
B. Tinjauan umum tentang pre operasi .....	15
1. Defenisi.....	15
2. Persiapan pasien pre operasi .....	15

C. Tinjauan tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan.....	17
1. Umur.....	17
2. Jenis kelamin.....	17
3. Pendidikan.....	18
4. Pengetahuan.....	19
5. Pekerjaan.....	21
6. Sosial ekonomi.....	22
7. Pengalaman operasi.....	22
8. Informed konsent.....	22
9. Jenis operasi .....	23
D. Alat ukur kecemasan.....	23
<b>BAB III KERANGKA KONSEP.....</b>	<b>25</b>
A. Kerangka konsep penelitian.....	25
B. Defenisi operasional.....	26
C. Hipotesis penelitian.....	27
<b>BAB IV METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Jenis penelitian.....	28
B. Populasi dan sampel.....	28
1. Populasi penelitian .....	28
2. Sampel penelitian.....	28
C. Tehnik pengambilan sampling.....	29
D. Prosedur pengambilan data.....	29
E. Pengolahan dan analisis data.....	31
F. Jadwal penelitian.....	32
G. Etika penelitian .....	32
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Hasil penelitian.....	33
B. Pembahasan.....	44
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	54

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
5.1 Data Demografi Responden Berdasarkan Usia Yang Dirawat Di Ruang Bedah RSUD Labuang Baji Makassar.....	34
5.2 Data Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Yang Dirawat Di Ruang Bedah RSUD Labuang Baji Makassar.....	34
5.3 Data Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan Yang Dirawat Di Ruang Bedah RSUD Labuang Baji Makassar.....	35
5.4 Data Demografi Responden Berdasarkan Pengetahuan Yang Dirawat Di Ruang Bedah RSUD Labuang Baji Makassar.....	36
5.5 Data Demografi Responden Berdasarkan Pekerjaan Yang Dirawat Di Ruang Bedah RSUD Labuang Baji Makassar.....	36
5.6 Data Demografi Responden Berdasarkan Kecemasan Yang Dirawat Di Ruang Bedah RSUD Labuang Baji Makassar.....	37
5.7 Hubungan Usia Dengan Kecemasan Pasien Yang Dirawat Di Ruang Bedah RSUD Labuang Baji Makassar.....	38
5.8 Hubungan Jenis Kelamin Dengan Kecemasan Pasien Yang Dirawat Di Ruang Bedah RSUD Labuang Baji Makassar.....	40
5.9 Hubungan Pendidikan Dengan Kecemasan Pasien Yang Dirawat Di Ruang Bedah RSUD Labuang Baji Makassar.....	41
5.10 Hubungan Pengetahuan Dengan Kecemasan Pasien Yang Dirawat Di Ruang Bedah RSUD Labuang Baji Makassar.....	42
5.11 Hubungan Pekerjaan Dengan Kecemasan Pasien Yang Dirawat Di Ruang Bedah RSUD Labuang Baji Makassar.....	44

## ABSTRAK

Nama : M. IMRAN JUM WAHAB

Nim : 70300106030

Judul : Faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pada pasien pre operasi di ruang bedah RSUD Labuang Baji Makassar.

---

Kecemasan merupakan respon psikologis terhadap stress yang mengandung komponen fisiologis dan psikologis. Kecemasan itu akan mengganggu keseimbangan dan fungsi tubuh individu. Gejala cemas sebelum operasi dapat dilihat dari gejala yang ada yaitu kenaikan kecepatan nadi, pernafasan, telapak tangan basah, gerakan yang terus-menerus atau kegiatan motorik verbal dan gelisah.

Tujuan umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pasien pre-operasi di ruang bedah RSUD Labuang Baji Makassar dan tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan umur, jenis kelamin, pendidikan, pengetahuan dan pekerjaan dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi. Desain penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptik analitik dengan pendekatan cross sectional untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi di ruang bedah RSUD Labuang Baji Makassar. Penarikan sampel dengan tehnik non probability sampling dengan cara accidental sampling pada 32 responden sesuai dengan criteria inklusi yang telah ditetapkan. Penelitian dilaksanakan dari tanggal 23 Juli sampai dengan 06 Agustus 2010. Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, lembar observasi dan wawancara menurut HARS.

Berdasarkan Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat hubungan antara usia dengan keceemasan dengan nilai  $p=0,014$ . Terdapat hubungan antara pendidikan dengan kecemasan dengan nilai  $p=0,001$ . Terdapat hubungan antara Pengetahuan dengan kecemasan dengan nilai  $p=0,03$ . Terdapat hubungan antara pekerjaan dengan kecemasan dengan nilai  $p=0,031$  dan tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kecemasan. Saran yang dianjurkan kepada pihak rumah sakit adalah agar dapat memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan kecemasan pasien pre operasi dan meningkatkan mutu asuhan keperawatan.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. LATAR BELAKANG***

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan tujuan seluruh dunia. Untuk meningkatkan kesehatan bangsa Indonesia, pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan telah menetapkan Visi Indonesia Sehat 2010. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah memelihara dan meningkatkan pelayanan yang bermutu, merata dan terjangkau.

Sejalan dengan hal tersebut diatas perawat dalam melakukan praktek profesi keperawatan harus berdasarkan standar praktek profesi dan kode etik profesi yang telah ditetapkan dan ditinjau dalam meningkatkan perawatan klien yang lebih efektif dan kepuasan pasien.

Dengan demikian salah satu bentuk praktek profesi keperawatan adalah membantu dokter ahli bedah dalam persiapan maupun proses pembedahan, dimana segala bentuk prosedur pembedahan harus sesuai standar praktik dan kode etik profesi yang ditetapkan, agar pasien tidak gelisah, cemas dan syok dengan tindakan pembedahan, segala bentuk prosedur pembedahan selalu didahului dengan suatu reaksi emosional tertentu dari pasien, apakah reaksi tersebut jelas atau tersembunyi, normal atau abnormal.

Kecemasan merupakan respon psikologis terhadap stress yang mengandung komponen fisiologis dan psikologis. Kecemasan itu

akan mengganggu keseimbangan dan fungsi tubuh individu. Gejala cemas sebelum operasi dapat dilihat dari gejala yang ada yaitu kenaikan kecepatan nadi, pernafasan, telapak tangan basah, gerakan yang terus-menerus atau kegiatan motorik verbal dan gelisah.

Pada periode pre-operatif pasien dapat mengalami kecemasan, kemungkinan kecemasan ini merupakan suatu respon antisipasi terhadap suatu pengalaman yang dapat dianggap pasien sebagai suatu ancaman terhadap perannya dalam hidup, integritas tubuh, bahkan kehidupannya itu sendiri.

Dengan mendengarkan bacaan Al Qur'an, seorang muslim, baik mereka yang berbahasa Arab maupun yang bukan, mampu merasakan perubahan fisiologis yang besar, seperti penurunan depresi, kesedihan, bahkan dapat memperoleh ketenangan dan menolak berbagai macam penyakit. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Ar-Ra'd/13:28

الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُّ لِلَّهِ بِذِكْرِهِ أَلاَّ اللَّهُ بِذِكْرِهِ قَلْبُهُمْ وَتَطْمَئِنُّ آمَنُوا الَّذِينَ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenteram.

Hal ini menunjukkan bahwa pasien yang akan dioperasi kadang-kadang tampak tidak jelas secara fisik bahwa dia cemas dan kadang pula pasien terlihat agak gelisah, bertanya-tanya secara terus-menerus bahkan berulang-ulang walaupun pertanyaannya telah dijawab. Ini menandakan kecemasan sebelum operasi dapat terjadi, namun selain hal diatas kecemasan dapat terlihat dari gejala fisik pasien seperti kenaikan kecepatan nadi, pernapasan, telapak tangan basah dan gerakan yang terus menerus. Kecemasan sering terjadi pada pasien sebelum

operasi terutama kecemasan yang diderita pasien yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda atau sama. (Stuart&Sunden,1998).

Berdasarkan data rekam medis RSUD Labuang Baji Makassar tahun 2009 diperoleh jumlah pasien operasi besar sebanyak 334 orang, operasi sedang 6 orang dan operasi khusus 188 orang. Serta umumnya diperoleh informasi bahwa pasien yang akan dioperasi sebagian besar mengalami kecemasan yang berdampak pada penundaan jadwal operasi. Ini disebabkan kurangnya informasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan / perawat mengenai prosedur operasi yang akan dilakukan. Dari uraian diatas menjadi motivasi bagi peneliti untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pasien di ruang bedah RSUD Labuang Baji Makassar.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pasien pre-operasi di ruang bedah RSUD Labuang Baji Makassar?

## **C. Tujuan penelitian.**

### 1. Tujuan umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pasien pre-operasi di ruang bedah RSUD Labuang Baji Makassar.

## 2. Tujuan khusus.

- a) Telah diketahuinya hubungan usia dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi.
- b) Telah diketahuinya hubungan jenis kelamin dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi.
- c) Telah diketahuinya hubungan pendidikan dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi.
- d) Telah diketahuinya hubungan pengetahuan dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi.
- e) Telah diketahuinya hubungan pekerjaan dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi.

## **D. Manfaat penelitian**

### 1. Manfaat Ilmiah


Hasil penelitian ini sebagai sumbangan ilmiah dan bahan bacaan terutama semua petugas kesehatan yang sedang bertugas di instansi pelayanan dimanapun dan bahan bacaan bagi masyarakat dan peneliti selanjutnya.

### 2. Manfaat bagi Instansi

Hasil penelitian ini sebagai sumber informasi bagi RSUD Labuang Baji Makassar serta pihak lain untuk dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi.

### 3 Manfaat bagi peneliti

- a) Sebagai bahan pengetahuan peneliti untuk mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kemampuan dalam menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pasien pre operasi.
- b) Sebagai persyaratan dalam menyelesaikan gelar sarjana keperawatan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN TENTANG KECEMASAN

##### 1. Pengertian Kecemasan

Kecemasan adalah respon emosional terhadap penilaian intelektual terhadap sesuatu yang berbahaya dan mengancam. Kecemasan adalah respons emosi tanpa objek yang spesifik yang secara subjektif dialami dan dikomunikasikan secara interpersonal. Kecemasan adalah kebingungan, kekhawatiran pada sesuatu yang akan terjadi dengan penyebab dengan tidak jelas dan dihubungkan dengan perasaan tidak menentu dan tidak berdaya.

Kecemasan sangat berkaitan dengan tidak pasti dan tidak berdaya, keadaan emosi ini tidak memiliki objek yang spesifik. Kecemasan berbeda dengan rasa takut yang merupakan penilaian terhadap sesuatu yang berbahaya. (Stuart & Sunden, 1998).

Dalam Agama Islam sangat lengkap petunjuk mengatasi kecemasan. Bersedih secara berkepanjangan (depresi) tidak diajarkan syariat dan tidak bermanfaat. Musibah dan cobaan bisa silih berganti sepanjang hidup kita. Seketika kita boleh dan wajar bersedih, tetapi setelah itu kita kembalikan semuanya kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah Q.S. Al-Baqarah/2:38

﴿حَزَنُونَ لَهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ حَوْفٌ فَلَا هُدَاىَ تَبِعَ فَمَنْ هُدىٰ مِنِّى يَأْتِيَنَّكُمْ فَأَمَّا جَمِيعًا مِّنْهَا أَهْبَطُونَا﴾



Terjemahannya:

Kami berfirman: "Turunlah kamu semuanya dari surga itu! kemudian jika datang petunjuk-Ku kepadamu, Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati".

## 2. Etiologi

### a. Teori psikoanalitik

Kecemasan merupakan konflik emosional yang terjadi antara 2 elemen kepribadian yaitu id dan super ego. Id mewakili dorongan insting dan impulsif primitif seseorang, sedangkan super ego mencerminkan hati nurani seseorang dan dikendalikan oleh norma-norma budaya seseorang.

Kecemasan merupakan problem pertama dalam masa pre operasi. Berbagai penyebab yang dapat menyebabkan kecemasan pada klien pre operasi kecemasan (ansietas). Menurut Roizen dan Lector 1995 adalah sebagai berikut :

- 1) Persiapan yang dilakukan petugas RS disekitar klien serta kegiatan rutin sehari-hari yang merupakan pemandangan yang mengerikan.
- 2) Ketakutan yang berhubungan dengan kurang pengetahuan.
- 3) Ketakutan hilangnya kesadaran selama pembiusan.
- 4) Ketakutan berdasar pada pengalaman atau kecemasan timbul dari perasaan takut terhadap tidak adanya penerimaan dan penolakan interpersonal. Kecemasan juga berhubungan dengan perkembangan

trauma, seperti perpisahan dan kehilangan, yang menimbulkan kelemahan spesifik.

b. Teori prilaku

Menurut pandangan prilaku kecemasan merupakan produk frustrasi, yaitu segala sesuatu yang mengganggu kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pakar prilaku lain menganggap kecemasan sebagai dorongan untuk belajar berdasarkan keinginan dari dalam untuk menghindari kepedihan. Pakar tentang pembelajaran meyakini bahwa individu yang terbiasa dalam kehidupan dirinya dihadapkan pada ketakutan yang berlebihan lebih sering menunjukkan kecemasan pada kehidupan selanjutnya.

c. Kajian biologis

Kajian biologis menunjukkan bahwa otak mengandung reseptor khusus untuk *benzodiazepines*. Reseptor ini mungkin membantu mengatur kecemasan. Penghambat asam *aminobutirik-gammanonregulator* (GABA). Juga mungkin memainkan peran utama dalam mekanisme biologis berhubungan dengan kecemasan, sebagaimana halnya dengan endorphin. Selain itu telah dibuktikan bahwa kesehatan umum seseorang mempunyai akibat nyata sebagai predisposisi terhadap kecemasan. Kecemasan mungkin disertai dengan gangguan fisik, dan selanjutnya menurunkan kapasitas seseorang untuk mengatasi stressor orang lain.


d. Teori Interpersonal

Ansietas terjadi dari ketakutan akan penolakan interpersonal. Hal ini juga dihubungkan dengan trauma pada masa pertumbuhan seperti kehilangan,

perpisahan yang menyebabkan seseorang tidak berdaya. Individu yang mempunyai harga diri rendah biasanya sangat mudah mengalami ansietas yang berat. (Stuart & Sunden, 1998).

### 3. Rentang Respon Kecemasan

Respon cemas



### 4. Tingkatan kecemasan

#### a) Tingkatan kecemasan ringan

Pada tingkat ini, lahan persepsi melebar dan individu akan berhati-hati dan waspada. Individu terdorong untuk belajar yang akan menghasilkan pertimbangan kreatifitas.

##### (1) Respon Fisiologis;

Sesekali napas pendek, nadi dan tekanan darah naik, gejala ringan pada lambung (rasa mual), muka berkeringat, dan bibir bergetar.

##### (2) Respon Kognitif

Lapangan persepsi meluas, mampu menerima rangsangan yang kompleks, konsentrasi pada masalah, menyelesaikan masalah secara efektif.

##### (3) Respon perilaku dan emosi

Tidak dapat duduk dengan tenang, tremor halus pada tangan, suara kadang-kadang untuk meningkat.

b) Tingkat kecemasan sedang

Memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada masalah yang penting dan mengesampingkan yang lain sehingga seseorang mengalami perhatian yang selektif, namun dapat melakukan sesuatu yang terarah. Contohnya pasangan suami istri yang mengalami kelahiran bayi pertama yang mengalami resiko tinggi, keluarga yang mengalami perpecahan/berantakan, dan individu yang mengalami konflik dalam pekerjaan.

c) Tingkat kecemasan berat

Sangat mengurangi lahan persepsi seseorang. Seseorang dengan kecemasan berat cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang terinci dan spesifik, serta tidak dapat berfikir tentang hal lain. Orang tersebut memerlukan banyak pengarahan untuk dapat memusatkan pada area yang lain. Contohnya individu yang mengalami kehilangan harta benda dan orang yang dicintai karena bencana alam, dan individu dalam penyanderaan.

d) Tingkat panik.

Gangguan panik ditandai oleh serangan panik yang datang dengan sendirinya dan tidak diharapkan, terdiri dari kumpulan gejala yang meliputi sesak napas, pusing tujuh keliling, jantung berdebar dan rasa ketakutan yang hebat bahwa dirinya akan mati atau menjadi gila.

Pada tingkat panik ini, lahan persepsi sudah terganggu sehingga individu tidak dapat mengendalikan diri lagi dan tidak dapat melakukan apa-apa walaupun sudah diberi penghargaan/ tuntutan.

- 1) Respon Psikologis
  - a) Napas pendek.
  - b) Rasa tercekik dan palpasi.
  - c) Sakit dada, pucat.
  - d) Hipotensi.
  - e) Kordinasi motorik rendah.
- 2) Respon kognitif
  - a) Lapangan persepsi sangat sempit.
  - b) Tidak dapat berfikir logis.
- 3) Respon prilaku dan emosi.
  - a) Agitasi.
  - b) Amuk dan marah.
  - c) Ketakutan.
  - d) Berteriak/*blocking*.
  - e) Kehilangan kendali/ kontrol diri.

Sedangkan menurut (Dirjen Pelayanan Medik, 2000). Mengemukakan beberapa teori tingkat kecemasan (ansietas) menjadi 4 tingkatan yaitu :

1. Kecemasan ringan

Kecemasan berhubungan dengan ketegangan akan peristiwa kehidupan sehari-hari pada tingkat ini lapangan persepsi meningkat dan individu akan berhati-hati dan waspada, terdorong untuk belajar yang akan menghalalkan pertumbuhan dan kreativitas.

## 2. Kecemasan sedang

Pada tingkat ini lapangan persepsi terhadap lingkungan menurun, individu lebih memfokuskan pada hal penting saat itu dan mengasampingkan hal lain.

## 3. Kecemasan berat

Pada kecemasan (ansietas) berat lapangan persepsi menjadi sangat menurun individu cenderung memikirkan hal yang kecil saja dan mengabaikan hal yang lain, individu tidak mampu berfikir realistis dan membutuhkan banyak pengarahan untuk dapat memusatkan pada area lain.

## 4. Panik

Pada tingkat ini lapangan persepsi sangat sempit sehingga individu tidak biasa mengendalikan diri lagi dan tidak dapat melakukan apa-apa walaupun sudah diberi penghargaan. Pada keadaan ini terjadi peningkatan aktivitas motorik, menurunnya kemampuan berhubungan dengan orang lain dan kehilangan pemikiran rasional.

Sedangkan menurut Tomb (2004) tingkat ansietas yaitu:

### a) Ansietas ringan kronis

- 1) Ketegangan
- 2) Mudah marah
- 3) Takut pada sesuatu yang akan terjadi

b) Ansietas kronis yang cukup berat.

Respon otonom:

- 1) Palpitasi
  - 2) Diare
  - 3) Ekstremitas lembab
  - 4) Berkeringat
  - 5) Sering buang air kecil
  - 6) Insomnia
  - 7) Sulit berkonsentrasi rasa lelah
  - 8) Sering menarik napas
  - 9) Gemetaran
  - 10) Waspada berlebihan
  - 11) Takut akan sesuatu yang terjadi
- c) Ansietas akut: serangan panik

Gangguan panik tanpa agorapobia adalah menunjukkan gejala akut dramatik yang berlangsung selama beberapa menit hingga beberapa jam dan timbul pada pasien dengan atau tanpa ansietas kronis. Gejala yang dirasakan yaitu timbulnya gejala otonomik-jantung yang berdebar kuat, nyeri dada, gemetaran, rasa tercekik, nyeri abdominal, berkeringat, pusing, kebingungan, rasa takut, dan sering timbul rasa seakan terjadi bencana kematian segera yang akan datang atau perasaan teror.

- d) Ansietas dengan rasa takut spesifik; gangguan fobia.

Fobia adalah rasa takut yang kuat dan menetap serta tidak sesuai dengan stimulus, tidak rasional bahkan bagi sipenderita sendiri, yang menyebabkan penghindaran objek maupun situasi yang ditakuti tersebut. Dan apabila cukup menimbulkan penderitaan dan ketidakmampuan maka disebut gangguan agropobia

**5. Sumber koping kecemasan.**

Individu dapat mengatasi stress dan kecemasan dengan menggerakkan sumber koping di lingkungan. Sumber koping tersebut sebagai modal ekonomik, kemampuan penyelesaian masalah, dukungan sosial, dan keyakinan budaya dapat membantu seseorang mengintegrasikan pengalaman yang menimbulkan stress dan mengadopsi strategi koping yang berhasil.

**6. Mekanisme koping kecemasan**

Tingkat ansietas sedang dan berat menimbulkan dua jenis mekanisme koping antara lain :

- a. Reaksi yang berorientasi pada tugas yaitu upaya yang disadari, dan berorientasi pada tindakan untuk memenuhi secara realistis tuntutan situasi stress.
- b. Mekanisme pertahanan ego, membantu mengatasi ansietas ringan dan sedang, tetapi jika berlangsung pada tingkat tidak sadar dan melibatkan penipuan diri dan distorsi realitas, maka mekanisme ini dapat merupakan respon maladaptif terhadap stress.

## B. TINJAUAN UMUM TENTANG PRE OPERASI

### 1. Defenisi

- a) Yang dimaksud dengan pre operasi adalah dimulai ketika keputusan untuk intervensi bedah dibuat dan berakhir ketika pasien dikirim ke meja operasi. (Smeltzer & Bare, 2001).
- b) Operasi adalah semua tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasive dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan ditangani.
- c) Tindakan bedah merupakan suatu bentuk terapi medis yang dapat mendatangkan stress bagi pasien maupun keluarganya, karena terdapat ancaman terhadap tubuh, integritas dan jiwa seseorang.
- d) Pre-operasi merupakan tindakan umum yang dilakukan setelah diputuskan melakukan pembedahan untuk mempersiapkan penderita agar penyulit pasca bedah dapat dicegah sebanyak mungkin. Dalam persiapan ini telah ditentukan adanya indikasi atau kontra indikasi operasi, toleransi penderita terhadap tindakan bedah dan ditetapkan waktu yang tepat untuk melaksanakan pembedahan. Fase pre operasi adalah waktu dimana izin operasi dibuat sampai pasien dikirim ke ruang operasi.

### 2. Persiapan pasien pre operasi

#### a. Persiapan mental

Secara mental, penderita harus dipersiapkan untuk menghadapi pembedahan karena selalu ada rasa cemas atau takut terhadap penyuntikan, nyeri luka, anesthesia, bahkan terhadap kemungkinan cacat atau mati. Dalam hal ini hubungan baik antara pasien, keluarga, dan dokter sangat menentukan. Kecemasan ini adalah reaksi normal yang dapat dihadapi

dengan sikap terbuka dan penerangan dari dokter dan petugas layanan kesehatan lainnya. Atas dasar pengertian, penderita dan keluarganya dapat memberikan persetujuan dan izin untuk pembedahan.

b. Persiapan fisiologis

Persiapan fisik meliputi puasa (nutrisi dan cairan), eliminasi, personal hygiene, tidur dan istirahat, medikasi, instruksi khusus dan persiapan kulit. Persiapan fisik dimaksudkan supaya pasien mampu menghadapi prosedur bedah sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi pasca bedah sebagai dampak terhadap pemberian obat anastesi.

c. Persiapan psikologis

Pasien dan keluarga perlu diberikan kesempatan untuk membicarakan isi hati dan rasa takutnya terhadap tindakan operasi yang akan dilakukan terhadap pasien. Penyuluhan merupakan fungsi penting dari perawat pada fase pre operasi yang dapat mengurangi rasa takut pasien dan keluarga.

Mengetahui apa yang tidak diketahui akan menenangkan pasien dan keluarga, sehingga dapat lebih meningkatkan kerjasama pasien dan keluarga dalam menghadapi prosedur. Persiapan psikologis meliputi pemberian pendidikan kesehatan pre operasi. Pendidikan kesehatan pre operasi dapat menurunkan tingkat stress dengan mengurangi ketakutan pasien, takut karena ketidaktahuan, nyeri anastesi dan kehilangan kontrol. Komplikasi pasca bedah dapat juga dikurangi dengan menurunkan tingkat stress. Fase pre operasi adalah waktu dimana izin dibuat sampai pasien dikirim ke ruang operasi.

### **C. TINJAUAN TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINGKAT KECEMASAN**

Adapun faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan yang akan menjalani tindakan medis atau perawatan menurut Jendral Pelayanan Medik (2000) adalah :

#### **1. Umur**

Semakin bertambah umur seseorang dan semakin matang dalam berfikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan pasien yang akan dioperasi, seseorang yang lebih dewasa akan lebih percaya diri dari orang yang belum tinggi kedewasaannya. Makin tua umur seseorang makin konsentrasi dalam menggunakan koping dalam masalah yang dihadapi.

Menurut Kaplan dan Sadock (1997) gangguan kecemasan dapat terjadi pada semua usia, lebih sering pada usia dewasa dan lebih banyak pada wanita. Sebagian besar kecemasan terjadi pada umur 21-45 tahun.

#### **2. Jenis kelamin**

Jenis kelamin adalah sifat jasmani atau rohani yang dapat membedakan 2 mahluk sebagai laki-laki atau perempuan. Menurut Fredman bahwa cemas banyak didapat dilingkungan hidup dengan ketegangan jiwa yang lebih banyak pada jenis kelamin perempuan dari pada laki-laki. Hal ini disebabkan karena perempuan dipresentasikan sebagai makhluk yang lemah lembut, keibuan dan emosional.

Berkaitan dengan kecemasan pada pria dan wanita, Myers (1983) mengatakan bahwa perempuan lebih cemas akan ketidakmampuannya dibanding dengan laki-laki, laki-laki lebih aktif, eksploratif, sedangkan

perempuan lebih sensitif. Penelitian lain menunjukkan bahwa laki-laki lebih rileks dibanding perempuan (Power dalam Myers, 1983).

James dalam Smith (1968) mengatakan bahwa perempuan lebih mudah dipengaruhi oleh tekanan-tekanan lingkungan daripada laki-laki. Perempuan juga lebih cemas, kurang sabar, dan mudah mengeluarkan air mata. Lebih jauh lagi, dalam berbagai studi kecemasan secara umum, menyatakan bahwa perempuan lebih cemas daripada laki-laki (Maccoby dan Jacklin, 1974).

Morris dalam Leary(1983) menyatakan bahwa perempuan memiliki skor yang lebih tinggi pada pengukuran ketakutan dalam situasi sosial dibanding laki-laki (Jurnal Pshyce, 2004).

### 3. Pendidikan.

Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman terprogram didalam bentuk formal, non formal dan informal disekolah dan diluar sekolah yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu agar dikemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.

Menurut Notoatmodjo (2005) yang dikutip Nursalam (2003), pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk akan pola hidup terutama akan motivasi untuk sikap berperan serta dalam membangun kesehatan. Makin tinggi pendidikan seseorang, makin mudah menerima informasi sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki, sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang harus diperkenalkan.

Semakin tinggi pendidikan, semakin luas pengetahuan yang dimiliki dan semakin baik tingkat pemahaman tentang suatu konsep disertai cara pemikiran dan penganalisaan yang tajam dengan sendirinya memberikan persepsi yang baik pula terhadap objek yang diamati.

Tingkat pendidikan yang cukup akan lebih mudah dalam mengidentifikasi stresor dalam diri sendiri maupun dari luar dirinya. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kesadaran dan pemahaman terhadap stimulus (Jatman, 2000).

#### 4. Pengetahuan

Menurut Soekidjo (2000), pengetahuan merupakan hasil tahu, dan hal ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Perilaku yang didasari pengetahuan akan lebih langgeng daripada yang tidak didasari oleh pengetahuan.

Pengetahuan dapat membantu pasien mencapai respon yang optimal tentang respon fisiologis dan psikologis terhadap intervensi bedah/operasi. Dengan adanya pengetahuan, pasien dapat memuat strategi koping, mengubah perilaku, mempelajari teknik baru, mengendalikan respon emosi dan bersiap terhadap dampak stress.

Menurut Notoatmojo (2005), pengetahuan adalah salah satu komponen perilaku yang termasuk dalam kognitif domain yang terdiri dari enam tingkatan yakni:

a) Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya.

b) Memahami (*Comprehension*)

Memahami diartikan sebagai sesuatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat mengimplementasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan. Dan sebagainya terhadap objek yang dipelajarinya.

c) Aplikasi (*Application*)

- 1) Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya).
- 2) Aplikasi disini dapat diartikan atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

d) Analisis (*Analysis*)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi suatu objek dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis dapat dilihat dari penggunaan kata-kata kerja: dapat menggambarkan/membuat bagan, membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya.

e) Sintesis (*Syntesis*)

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis itu suatu kemampuan untuk menyusun formalasi baru dari formalasi-formalasi yang ada. Misalnya dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkaskan, dapat menyesuaikan dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada.

f) Evaluasi (*Evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

5. Pekerjaan

Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan, diperbuat atau dikerjakan oleh seseorang yang bersifat rutin untuk mendapatkan nafkah atau menghasilkan uang. Pasien yang mengalami pembedahan dilingkupi

oleh kekhawatiran mengenai kehilangan waktu kerja. Kemungkinan kehilangan pekerjaan, tanggung jawab mendukung keluarga dan ancaman ketidakmampuan permanen yang lebih jauh, memperberat ketegangan emosional (Umi Lutfa, 2008).

#### 6. Sosial Ekonomi

Status sosial ekonomi juga berkaitan dengan pola gangguan psikiatrik. Berdasarkan hasil penelitian Durham diketahui bahwa masyarakat kelas sosial ekonomi rendah prevalensi psikiatriknya lebih banyak. Jadi keadaan ekonomi yang rendah atau tidak memadai dapat mempengaruhi peningkatan kecemasan pada pasien yang akan menjalani kemoterapi (Umi Lutfa, 2008).

#### 7. Pengalaman operasi.

Kecemasan atau kekhawatiran nyata yang lebih ringan dapat terjadi karena ada pengalaman sebelumnya. Menurut Stuart and Sundeen (1998), semakin seringnya seseorang mengalami stressor maka pengalaman dalam menghadapi stressor akan meningkat sehingga cemas yang dialami semakin menurun. Pekerjaan adalah kebutuhan yang harus dilakukan terutama untuk menunjang kehidupannya Ramadhan (2001). Semakin seseorang mengalami stressor maka pengalamannya dalam menghadapi stressor tersebut akan meningkat sehingga cemas yang dialami semakin menurun.

#### 8. *Informed Consent*

Informasi sangat dibutuhkan baik bagi perawat maupun pasien. Terlebih bagi pasien yang akan menjalani operasi. Hampir sebagian besar

pasien yang menjalani kemoterapi mengalami kecemasan. Pasien sangat membutuhkan penjelasan yang baik dari perawat. Informasi yang baik diantaramereka akan menentukan tahap selanjutnya. Pasien yang cemas saat akanmenjalani operasi kemungkinan mengalami efek yang tidak menyenangkanbahkan akan membahayakan (Umi Lutfu, 2008).

#### 9. Jenis operasi

MenurutLong (1996), tindakan pembedahan/operasi dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara yaitu:

- a) Menurut lokasinya, tindakan pembedahan dapat dilaksanakan eksternal dan internal selain itu juga diklasifikasi sesuai dengan lokasi system tubuh seperti bedah kardiovaskuler dan rhiraks.
- b) Menurut luas jangkawannya, tindakan pembedahan dapat diklasifikasikan sebagai bedah minor (kecil) dan mayor (besar).
- c) Menurut tujuannya, tindakan pembedahan dapat diklasifikasikan sebagai bedah diagnostic, kuratif, restorative, paliatif, serta kosmetik.
- d) Menurut prosedur pembedahan, kebanyakan prosedur bedah dapat diklasifikasikan dengan member kata-kata akhiran pada lokasi pembedahan sesuai dengan tipe-tipe pembedahan antara lain: ektomi (pengangkatan organ), rhapy (penjahitan), ostomi (membuat lubang) dan plasti ( perbaikan menurut bedah plastik)

#### **D. Alat ukur tingkat kecemasan**

Untuk mengetahui derajat kecemasan seseorang dapat menggunakan alat ukur *Hamilton Scale for Anxiety* (HRS-A). Alat ukur ini terdiri dari 14 kelompok gejala yang masing-masing kelompok dirinci lagi dengan gejala yang spesifik.

Petunjuk penggunaan alat ukur Hamilton Scale for Anxiety (HRS-A) adalah:

a. Penilaian:

- 0 : Tidak ada (tidak ada gejala sama sekali)
- 1 : Ringan ( Satu gejala dari pilihan yang ada)
- 2 : Sedang ( separuh dari gejala yang ada )
- 3 : Berat (Lebih dari separuh dari gejala yang ada)
- 4 : Sangat berat ( Semua gejala yang ada )


b. Penilaian derajat kecemasan

- Score < 6 : Tidak ada kecemasan
- 6 – 14 < : Kecemasan ringan
- 15- 27 : Kecemasan sedang
- > 27 : Kecemasan berat

### BAB III

#### KERANGKA KONSEP

##### A. KERANGKA KONSEP PENELITIAN



##### Keterangan :



Variabel yang diteliti



Variabel yang tidak diteliti

## ***B. DEFENISI OPERASIONAL***

1. Usia adalah umur responden Mulai lahir sampai menjelang operasi

Kriteria objektif:

Dewasa muda :19-35

Dewasa tua :36-70

2. Jenis kelamin adalah sifat jasmani atau rohani yang dapat membedakan dua makhluk sebagai laki-laki atau perempuan.
3. Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman terprogram didalam bentuk formal, non formal dan informal disekolah dan diluar sekolah.

Kriteria objektif:

Baik : Apabila berpendidikan minimal SMU

Kurang : Apabila berpendidikan SMP ke bawah

4. Pengetahuan adalah mengetahui, memahami tentang prosedur dan manfaat dari operasi. Yang diukur melalui multiple choice yang terdiri dari 30 pertanyaan

Kriteria objektif :

Baik : Bila responden menjawab > 60 % pertanyaan.

Kurang : Bila jumlah skor < 60 % pertanyaan.

5. Pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan, diperbuat atau dikerjakan oleh seseorang yang bersifat rutin untuk mendapatkan nafkah atau menghasilkan uang.

Kriteria objektif :

Bekerja : Bila responden memiliki pekerjaan dan menghasilkan income

Tidak bekerja: Bila responden tidak memiliki pekerjaan.

6. Kecemasan adalah perasaan takut dan tegang seseorang menjelang operasi yang diukur dengan menggunakan skala HARS.

Kriteria objektif:

Tidak cemas : Kurang dari 6

Cemas ringan : Hasil skor 6-14

Cemas sedang : Hasil skor 15-27

Cemas berat : Skor lebih dari 27

### ***C. HIPOTESIS PENELITIAN***

1. Ada hubungan antara usia dengan tingkat kecemasan.
2. Ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan.
3. Ada hubungan antara pendidikan dengan tingkat kecemasan.
4. Ada hubungan antara pengetahuan dengan tingkat kecemasan.
5. Ada hubungan antara pekerjaan dengan tingkat kecemasan.

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### A. JENIS PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitik dengan pendekatan *cross sectional* yaitu jenis penelitian yang menekankan pada waktu pengukuran atau observasi data variabel independen dan dependen hanya satu kali, pada suatu saat pengukuran dilakukan pada saat bersamaan dan pada sampel yang representative untuk mengetahui faktor penyebab tingkat kecemasan pada pasien pra operasi di ruang bedah RSUD Labuang Baji Makassar.

#### B. POPULASI DAN SAMPEL

##### 1. Populasi Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pasien yang dirawat di ruang bedah RSUD Labuang Baji Makassar yang akan menjalani operasi selama periode bulan Juli-Agustus 2010.

##### 2. Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Penarikan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan tehnik *non probability sampling* dengan cara “*accidental sampling*”.

### C. **TEHNIK PENGAMBILAN SAMPLING**

#### 1. Teknik sampling

Dalam penelitian ini pemilihan sampel dilakukan dengan cara *non probability sampling*. Jenis *accidental sampling* adalah mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Teknik ini biasanya dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh.

##### a. Kriteria Inklusi.

- 1) Pasien preoperasi yang bersedia menjadi responden.
- 2) Pasien dengan operasi yang direncanakan.
- 3) Pasien yang baru pertama kali menjalani operasi.
- 4) Pasien yang telah mendapatkan *informed konsent*.

##### b. Kriteria Eksklusi

- 1) Pasien yang keadaannya memburuk selama dalam penelitian.
- 2) Pasien yang tidak mampu berkomunikasi dengan baik .

### D. **PROSEDUR PENGUMPULAN DATA**

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan pemilihan sampel dengan cara masing-masing responden diminta kesediaanya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Peneliti memberikan penjelasan tentang tujuan penelitian.
- 2) Setelah responden memahami tujuan peneliti, maka responden diminta kesediaanya untuk menandatangani lembar persetujuan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan lembar observasi untuk pengumpulan data yang disusun oleh peneliti sendiri sesuai buku metodologi penelitian administrasi dan alat ukur tingkat kecemasan “HARS” variabel tingkat kecemasan. Peneliti menggunakan skala ordinal dengan memberikan skor yang berbeda-beda pada setiap jawaban yaitu : Tidak cemas (skor 0-6), Ringan (skor 6-14), Sedang (skor 14-27), Berat (lebih dari 27)

### **Instrumen Penelitian**

- a. Bentuk kuesioner yang diberikan pertama adalah ditujukan kepada pasien yang dirawat dan memenuhi kriteria inklusi yang mencakup identitas umum responden. Pertanyaan berupa nomor responden, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, penanggung biaya selama dirawat.
- b. Bentuk yang kedua adalah koesioner tentang pengetahuan yang terdiri dari nomor 1-30 diisi langsung oleh pasien, atau keluarga pasien yang memuat tentang sikap, persepsi, pendapat dengan menggunakan skala Likert adalah memilih jawaban yang paling dianggap benar. Dengan kriteria objektif: Kurang bila responden menjawab  $< 60\%$  pertanyaan dan Cukup bila responden menjawab  $\geq 60\%$  dari pertanyaan.
- c. Bentuk yang kedua adalah observasi langsung, khusus tentang kecemasan yang terdiri dari 14 item pertanyaan nomor 1 sampai 14 dengan menggunakan alat ukur kecemasan HARS (*Hamilton Anxiety Rating Scale*) yang dinilai dengan menggunakan skala Likert.

## E. Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Pengolahan Data

#### a. Editing

Setelah data terkumpul maka dilakukan editing atau penyuntingan data, lalu data di kelompokkan sesuai kriteria.

#### b. Coding

Dilakukan untuk memudahkan pengolahan data yaitu dengan melakukan pengkodean pada daftar pertanyaan yang telah diisi untuk setiap jawaban responden.

#### c. Tabulasi

Setelah dilakukan pengkodean kemudian data dimasukkan kedalam tabel untuk memudahkan penganalisaan data.

### 2. Analisa Data

Setelah memperoleh nilai dari masing-masing tabel, selanjutnya data dianalisa dengan menggunakan program SPSS.

#### 1. Analisa Univariat

Membuat tabel distribusi frekuensi dan persentase dari masing-masing variabel.

#### 2. Analisa Bivariat

Analisa bivariat dilakukan terhadap tiap variabel independen dan dependen, dengan menggunakan uji statistik, *Chi-square* dengan tingkat kemaknaan  $\alpha = 0.05$ . setelah uji hipotesa dilakukan, dengan taraf kesalahan 5 % maka penilaian hipotesis  $H_a$  diterima jika  $p < \alpha = 0,05$ .

## **F. Jadwal Penelitian**

### 1. Waktu

Penelitian akan dilaksanakan pada Bulan Juli sampai Bulan Agustus 2010.

### 2. Tempat

Penelitian ini akan dilaksanakan di Ruang Perawatan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar.

## **G. Etika Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, peneliti perlu mendapat adanya rekomendasi dari institusinya atas pihak lain dengan mengajukan permohonan izin kepada institusi tempat penelitian tetap memperhatikan masalah etik meliputi:

#### a. *Informed consent.*

Lembar persetujuan yang diberikan pada responden yang akan diteliti yang memenuhi kriteria inklusi.

#### b. *Anonimity.*

Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan mencantumkan nama responden, tetapi lembar tersebut diberi kode.

#### c. *Confidentially.*

Kerahasiaan informasi dari responden dijamin, peneliti hanya melaporkan data tersebut sebagai hasil penelitian.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *HASIL PENELITIAN*

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan di ruang Perawatan Bedah RSUD Labuang Baji Makassar. Dari tanggal 23 Juli sampai dengan 6 Agustus 2010. Besar sampel yang diteliti sebanyak 32 orang responden yang semuanya memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang memuat pernyataan-pernyataan tentang pengetahuan pasien sebelum menjalani operasi, serta menggunakan kuesioner alat ukur kecemasan menurut HARS, yang memuat tentang observasi langsung dan wawancara ke responden.

Berdasarkan hasil Pengolahan data maka berikut ini akan disajikan analisis univariat dan analisis bivariat.

#### 1. Analisis Univariat

Analisis Univariat pada penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan distribusi frekuensi dari variabel independen, meliputi: usia, jenis kelamin, pendidikan, pengetahuan, dan pekerjaan, serta variabel dependen yaitu kecemasan. Dengan menggunakan olah data SPSS versi 15 berdasarkan uji Chisquare dan tingkat kemaknaan  $\alpha = 0,05$ .

Tabel 5.1  
Data Demografi Responden Berdasarkan Usia Yang Dirawat Di Ruang Bedah  
RSUD Labuang Baji Makassar

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	Dewasa muda	18	56,2
2	Dewasa tua	14	43,8
	Jumlah	32	100

Sumber: Data primer, 2010

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa 18 (56,2%) responden yang berusia muda dan diikuti 14 (43,8%) responden yang berusia dewasa tua.

Tabel 5.2  
Data Demografi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Yang Dirawat Di  
Ruang Bedah RSUD Labuang Baji Makassar.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	16	50,0
2	Perempuan	16	50,0
	Jumlah	32	100

Sumber: Data Primer 2010

Berdasarkan tabel diatas didapatkan laki-laki dan perempuan memiliki jumlah responden yang sama yaitu 16 dengan persentase (50%).

Tabel 5.3  
Data Demografi Responden Berdasarkan Pendidikan Yang Dirawat Di Ruang Bedah RSUD Labuang Baji Makassar

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Baik	21	65,6
2	Kurang	11	34,4
	Jumlah	32	100

Sumber: Data Primer 2010

Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 21 responden berdasarkan tingkat pendidikan dengan persentase (65,6%) dengan kategori baik dan 11 responden yang berpendidikan kurang dengan persentase (34,4%).

Tabel 5.4  
Data Demografi Responden Berdasarkan Pengetahuan Yang Dirawat Di Ruang Bedah RSUD Labuang Baji Makassar

No	Pengetahuan	Jumlah	Presentase
1	Baik	19	59,4
2	Kurang	13	40,6
	Jumlah	32	100

Sumber: Data Primer 2010

Berdasarkan tabel diatas kategori tingkat pengetahuan didapatkan 19 responden dengan persentase (59,4%) yang memiliki pengetahuan baik dan 13 responden dengan persentase (40,6%) yang memiliki tingkat pengetahuankurang.

Tabel 5.5  
Data Demografi Responden Berdasarkan Pekerjaan Yang Dirawat Di Ruang Bedah RSUD Labuang Baji Makassar

No	Pekerjaan	Jumlah	Presentase
1	Bekerja	16	50,0
2	Tidak bekerja	16	50,0
	Jumlah	32	100

Sumber: Data Primer 2010

Berdasarkan tabel diatas jumlah responden yang bekerja dan tidak bekerja memiliki jumlah yang sama yaitu 16 orang dengan persentase (50,0%).

Tabel 5.6  
Data Demografi Responden Berdasarkan Kecemasan Yang Dirawat Di Ruang Bedah RSUD Labuang Baji Makassar

No	Kecemasan	Jumlah	Presentase
1	Berat	15	46,9
2	Sedang	17	53,1
	Jumlah	32	100

Sumber: Data Primer 2010

Berdasarkan tabel diatas jumlah responden dengan tingkat kecemasan berat yaitu 15 orang dengan persentase (46,9%) dan responden dengan tingkat kecemasan sedang yaitu 17 orang dengan persentase (53,1%).

## 2. Analisis Bivariat

Untuk menilai hubungan usia, pendidikan, jenis kelamin, pengetahuan dan pekerjaan sebagai variabel independen dengan kecemasan sebagai variabel dependen pada pasien yang dirawat di ruang bedah RSUD Labuang

Baji Makassar. Digunakan uji statistik dengan menggunakan olah data SPSS 15 berdasarkan rumus Chi-Square test dan tingkat kemaknaan  $\alpha = 0,05$ .

Maka ketentuan bahwa usia, pendidikan, pengetahuan, jenis kelamin, pekerjaan, dengan kecemasan dikatakan mempunyai hubungan yang bermakna bila  $p < 0,05$ .

a. **Hubungan Usia dengan Kecemasan Pasien.**

Terdapat empat kategori variabel usia yaitu: anak-anak, dewasa muda, dewasa tua dan lansia. Hubungan variabel ini dengan kecemasan pasien dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.7

Hubungan Usia Dengan Kecemasan Pasien Di Ruang Bedah RSUD Labuang Baji Makassar

Usia	Kecemasan				Jumlah	
	Sedang		Berat			
	F	%	f	%	f	%
Dewasa muda	13	40,6	5	15,6	18	56,2
Dewasa tua	4	12,5	10	31,2	14	43,8
jumlah	17	53,1	15	46,8	32	100

Sumber: Data primer 2010 p= 0,004

Berdasarkan tabel diatas responden dengan kriteria dewasa muda mengalami kecemasan sedang sebanyak 13 responden dengan persentase (40,6%). Kecemasan berat sebanyak 5 responden dengan persentase (15,6%). Sedangkan responden dewasa tua yang mengalami kecemasan sedang sebanyak 4 responden dengan persentase (12,5%). Kecemasan berat sebanyak 10responden dengan persentase (31,2 %).

Berdasarkan olah data SPSS 15 berdasarkan rumus Chi-Square Test  $\alpha$  (0,05) diperoleh nilai  $p=0,004$  yang menunjukkan  $p < \alpha$  (0,05) artinya ada hubungan antara usia dengan kecemasan pada pasien yang dirawat di ruang bedah RSUD Labuang Baji Makasar. Maka responden yang Berusia dewasa muda mempunyai peluang lebih besar mengalami kecemasan dibandingkan yang berusia tua.

**b. Hubungan Jenis kelamin dengan Kecemasan Pasien**

Terdapat dua kategori variabel jenis kelamin yaitu: Laki-laki apabila responden mempunyai jenis kelamin laki-laki dan perempuan apabila responden mempunyai jenis kelamin perempuan. Hubungan variabel ini dengan kecemasan dapat dilihat pada tabel V.8 berikut ini:

Tabel 5.8  
Hubungan Jenis Kelamin Dengan Kecemasan Pasien Di Ruang Bedah RSUD Labuang Baji Makasar

Jenis kelamin	Kecemasan				Jumlah	
	Sedang		Berat		F	%
	f	%	f	%		
Laki-laki	8	25,0	8	25,0	16	50,0
Perempuan	9	28,1	7	21,9	16	50,0
Jumlah	17	53,1	15	46,9	32	100

Sumber: Data primer 2010

$p= 0,723$

Berdasarkan tabel 5.7 bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki mengalami kecemasan sedang sebanyak 8 responden dengan persentase (25,0%) dan yang mengalami kecemasan berat sebanyak 8 responden dengan

persentase (25,0%). Sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan yang mengalami kecemasan sedang sebanyak 9 responden dengan persentase (28,1%) dan kecemasan berat sebanyak 7 responden dengan persentase (21,9%).

Berdasarkan olah data dengan menggunakan SPSS 15 berdasarkan rumus Chi-Square Test  $\alpha$  (0,05) diperoleh nilai  $p=0,723$  yang menunjukkan  $p > \alpha$  (0,05) artinya tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan pada pasien yang dirawat di ruang bedah RSUD Labuang Baji Makasar.

### c. Hubungan Pendidikan dengan Kecemasan Pasien

Terdapat dua kategori variabel pendidikan yaitu: baik apabila berpendidikan minimal SMA. Dan kurang apabila berpendidikan SMP kebawah. Hubungan variabel ini dengan tingkat kecemasan dapat dilihat dalam tabel 5.9

Tabel 5.9

Hubungan Pendidikan Dengan Kecemasan Pasien Di Ruang Bedah RSUD Labuang Baji Makasar

Pendidikan	Kecemasan				Jumlah	
	Sedang		Berat		F	%
	F	%	f	%		
Baik	16	50,0	5	15,6	21	65,6
Kurang	1	3,1	10	31,3	11	34,4
Jumlah	17	53,1	15	46,9	32	100

Sumber : Data primer 2010

$p= 0,000$

Berdasarkan tabel diatas bahwa responden yang berpendidikan baik mengalami kecemasan sedang sebanyak 16 responden dengan persentase(50,0%) dan kecemasan berat sebanyak 5 responden dengan

persentase (15,6%). Sedangkan responden yang berpendidikan kurang yang mengalami kecemasan sedang sebanyak 1 responden dengan persentase (3,1%) dan kecemasan berat sebanyak 10 responden dengan persentase (31,3%).

Berdasarkan data dengan menggunakan SPSS 15 berdasarkan rumus Chi-Square Test  $\alpha$  (0,05) diperoleh nilai  $p=0,000$  yang menunjukkan  $p < \alpha$  (0,05) artinya ada hubungan antara pendidikan dengan tingkat kecemasan pada pasien yang dirawat di ruang bedah RSUD Labuang Baji Makasar.

#### d. Hubungan Pengetahuan dengan Kecemasan Pasien

Terdapat dua kategori variabel pengetahuan yaitu: baik apabila responden mampu menjawab lebih 60% dari soal koesioner yang diberikan atau nilai 1 = 60-100 dan kurang apabila responden tidak mampu menjawab 60% dari soal koesioner yang diberikan atau nilai 2 = 10-59.

Tabel 5.10

Hubungan Pengetahuan Dengan Kecemasan Pasien Di Ruang Bedah RSUD Labuang Baji Makasar

Pengetahuan	Kecemasan				Jumlah	
	Sedang		Berat			
	F	%	f	%	F	%
Baik	17	53,1	2	6,3	19	59,4
Kurang	0	0,0	13	40,6	13	40,6
Jumlah	17	53,1	15	46,9	32	100

Sumber: Data primer 2010

$p=0,000$

Berdasarkan tabel diatas bahwa responden yang berpengetahuan baik mengalami kecemasan sedang sebanyak 17 responden dengan persentase (53,1%) dan kecemasan berat sebanyak 2 responden dengan

persentase(6,3%). Sedangkan responden yang berpengetahuan kurang yang mengalami kecemasan sedang yaitu 0 % dan kecemasan berat sebanyak 13 responden dengan persentase (40,6%).

Berdasarkan olah data dengan menggunakan SPSS 15 berdasarkan rumus Chi-Square Test  $\alpha$  (0,05) diperoleh nilai  $p=0,000$  yang menunjukkan  $p<\alpha$  (0,05) artinya ada hubungan antara pengetahuan dengan tingkat kecemasan pada pasien yang dirawat di ruang bedah RSUD Labuang Baji Makasar.

**e. Hubungan Pekerjaan dengan Kecemasan.**

Terdapat dua kategori variabel pekerjaan yaitu: bekerja apabila responden mempunyai penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan tidak bekerja apabila responden tidak mendapatkan penghasilan tetap untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari.

Tabel 5.11  
Hubungan Pekerjaan Dengan Kecemasan Pasien Di Ruang Bedah RSUD  
Labuang Baji Makasar

Pekerjaan	Kecemasan				Jumlah	
	Sedang		Berat		F	%
	f	%	F	%		
Bekerja	12	37,5	4	12,5	16	50,0
Tidak Bekerja	5	15,6	11	34,4	16	50,0
Jumlah	17	53,1	15	46,9	32	100

Sumber : Data primer 2010

$p= 0,013$

Berdasarkan tabel diatas bahwa responden yang memiliki pekerjaan mengalami kecemasan sedang sebanyak 12 responden dengan persentase (37,5%) dan kecemasan berat sebanyak 4 responden dengan persentase (12,5%). Sedangkan responden yang tidak bekerja mengalami tingkat

kecemasan sedang sebanyak 5 responden dengan persentase (15,6%) dan tingkat kecemasan berat sebanyak 11 responden dengan persentase (34,4 %.)

Berdasarkan olah data dengan menggunakan SPSS 15 berdasarkan rumus Chi-Square Test  $\alpha$  (0,05) diperoleh nilai  $p=0,013$  yang menunjukkan  $p<\alpha$  (0,05) artinya ada hubungan antara pekerjaan dengan tingkat kecemasan pada pasien yang dirawat di ruang bedah RSUD Labuang Baji Makasar.

## **B. PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian dengan membandingkan teori yang ada, maka dapat dikemukakan bahwa:

### 1. Hubungan Usia dengan Tingkat Kecemasan

Hasil analisa univariat menunjukkan bahwa lebih besar responden berusia dewasa muda yaitu berjumlah 18 responden dengan persentase (56,2%) dan hanya 14 responden dengan persentase (43,8%) yang berusia dewasa tua.

Demikian pula dengan hasil analisa bivariat menunjukkan bahwa dari distribusi responden berdasarkan usia diperoleh usia dewasa muda yang mengalami kecemasan sedang sebanyak 13 responden dengan persentase (40,6%). Kecemasan berat sebanyak 5 responden dengan persentase (15,6%). Sedangkan responden dewasa tua yang mengalami kecemasan sedang sebanyak 4 responden dengan persentase (12,5%). Kecemasan berat sebanyak 10 responden dengan persentase (31,2 %). Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan yang bermakna antara usia dengan tingkat kecemasan pada pasien yang dirawat di ruang bedah RSUD Labuang Baji Makasar.

Demikian pula dengan hasil pengamatan dan wawancara yang didapatkan pada saat pengambilan data adalah bahwa hampir rata-rata responden yang usia dewasa muda sebagian besar mengalami kecemasan berat dibandingkan dengan dewasa tua karena pada saat diwawancarai, sebagian dari mereka yang berusia dewasa muda mengatakan bahwa jantungnya sering berdebar-debar, sulit untuk bernafas, sering kaget-kagetan, kehilangan nafsu makan. Dan hasil observasi juga menunjukkan bahwa sebagian besar yang berusia muda memperlihatkan tanda-tanda napas cepat, napas pendek, sering terkejut, responden sering meminta untuk mengulangi pertanyaan yang diberikan, wajah pucat, dan sedikit dari responden biasanya berkeringat. Sedangkan usia dewasa tua hanya sedikit dari gejala tersebut yang didapatkan. Hal ini sejalan dengan teori Bruner & Suddart (2001) yang mengatakan bahwa pasien dapat mempunyai perasaan yang berbeda dalam menjalani operasi. Pasien akan merasa takut tentang operasi yang akan dijalani, merasa ancaman nyeri, cacat atau bahkan kematian.

Maka dapat dikatakan bahwa kecemasan yang dialami oleh pasien sebelum operasi lebih banyak yang dialami oleh pasien yang berusia dewasa muda daripada dewasa tua karena hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Long (1996) bahwa semakin bertambah umur seseorang, maka semakin matang dalam berfikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan bahwa pasien yang akan dioperasi atau seseorang yang lebih dewasa akan lebih percaya diri daripada orang yang belum tinggi kedewasaannya. Makin tua umur seseorang makin konsentrasi dalam menggunakan koping dalam masalah yang dihadapi.

Dari beberapa pendapat tersebut diatas salah satunya adalah kematangan jiwa dewasa tua dimana menurut Siagian (1995) mengatakan bahwa semakin bertambah usia seseorang semakin meningkat pula kedewasaan fisik, dan usia yang semakin meningkat akan meningkatkan kebijaksanaan seseorang dalam mengambil keputusan, berfikir rasional, mengendalikan emosi dan bertoleransi terhadap pandangan yang lain. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin tua usia seseorang maka semakin meningkat pula kematangan jiwanya yang berakibat pada penerimaan mekanisme coping yang lebih baik.

## 2. Hubungan Jenis Kelamin dengan Tingkat Kecemasan.

Hasil analisa univariat menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki 16 responden dengan persentase (50,0%).

Namun berdasarkan hasil analisa bivariat menunjukkan bahwa dari distribusi responden berdasarkan jenis kelamin diperoleh jenis kelamin laki-laki yang mengalami kecemasan berat sebanyak 8 responden dengan persentase (25,0%) sedangkan dari distribusi responden berdasarkan jenis kelamin perempuan yang mengalami kecemasan berat sebanyak 7 responden dengan persentase (21,9%). Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan pada pasien yang dirawat di ruang bedah RSUD Labuang Baji Makasar.

Hal ini tidak sesuai dengan teori Fredman (1998) dalam Muthalim (2001) yang menyatakan bahwa cemas banyak didapat dilingkungan hidup

dengan ketegangan jiwa yang lebih banyak pada jenis kelamin perempuan daripada laki-laki.

Maka dapat dikatakan bahwa kecemasan berat yang dialami oleh pasien sebelum operasi lebih banyak yang dialami oleh pasien yang berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Kecemasan responden menunjukkan sebagian besar pada laki-laki daripada perempuan karena yang memegang peranan yang paling banyak dalam keluarga adalah laki-laki dalam hal ini tanggung jawab yang paling besar dimiliki oleh laki-laki sehingga dia selalu memikirkan nasib keluarganya karena sumber mata pencaharian atau nafkah tidak ada lagi. Hal inilah yang memicu sehingga terjadinya kecemasan yang paling didominasi oleh laki-laki tersebut

### 3. Hubungan Pendidikan dengan Tingkat Kecemasan

Hasil analisa univariat menunjukkan bahwa lebih besar responden berpendidikan kurang SMP ke bawah yaitu sebanyak 11 responden dengan persentase (34,4%) dan hanya 21 responden dengan persentase (65,6%) yang berpendidikan baik minimal SMA.

Demikian pula dengan hasil analisa bivariat menunjukkan bahwa dari distribusi responden berdasarkan pendidikan diperoleh pendidikan baik atau minimal SMA yang mengalami kecemasan berat sebanyak 5 responden dengan persentase (15,6%) sedangkan dari distribusi responden berdasarkan pendidikan diperoleh pendidikan kurang atau SMP ke bawah yang mengalami kecemasan berat sebanyak 10 responden dengan persentase (31,3%) sehingga diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan yang bermakna antara

pendidikan dengan tingkat kecemasan padapasien yang dirawat di bedah RSUD Labuang Baji Makasar.

Sedangkan hasil pengamatan dan wawancara yang didapatkan pada saat pengambilan data adalah bahwa hampir rata-rata responden yang berpendidikan kurang sebagian besar mengalami kecemasan berat dibandingkan dengan yang berpendidikan baik yang ditandai dengan seringnya responden meminta untuk mengulangi pertanyaan yang diberikan, sering bingung terhadap penjelasan yang diberikan karena kurang dimengerti, wajah pucat, dan sedikit dari responden biasanya berkeringat. Sedangkan yang berpendidikan baik hanya sedikit dari gejala tersebut yang didapatkan.

Hal ini sejalan dengan teori Soekidjo (2003) yang mengatakan bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin luas pengetahuan yang dimiliki dan semakin baik tingkat pemahaman tentang suatu konsep disertai cara pemikiran dan penganalisaan yang tajam dengan sendirinya memberikan persepsi yang baik pula terhadap objek yang diamati. Hal ini sejalan juga dengan pendapat Notoatmodjo yang dikutip Nursalam (2001), menyatakan bahwa pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk akan pola hidup terutama akan motivasi untuk sikap berperan serta dalam membangun kesehatan. Makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimiliki, sebaliknya pendidikan yang kurang akan menghambat sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang harus diperkenalkan.

Maka dapat dikatakan bahwa kecemasan berat yang dialami oleh pasien sebelum operasi lebih banyak yang dialami oleh pasien yang

berpendidikan kurang dalam hal ini tingkat pendidikannya yang masih SMP ke bawah karena pengetahuan atau pemahamannya tentang prosedur, manfaat, kerugian dari operasi tersebut masih kurang sehingga mekanisme koping yang dimiliki kurang efektif dari pada pendidikannya yang baik dalam hal ini yang pendidikannya minimal SMU karena responden mampu memahami dan menganalisis tentang segala informasi yang diberikan sehingga memiliki tingkat pemahaman yang bagus atau memiliki mekanisme koping yang lebih bagus.

#### 4. Hubungan Pengetahuan dengan Kecemasan

Hasil analisa univariat menunjukkan bahwa lebih besar responden yang mempunyai pengetahuan baik yaitu berjumlah 19 responden dengan persentase (59,4%) dan hanya 13 responden dengan persentase (40,6%) yang memiliki pengetahuan kurang.

Demikian pula dengan hasil analisa bivariat menunjukkan bahwa dari distribusi responden berdasarkan pengetahuan diperoleh pengetahuan baik yang mengalami kecemasan berat hanya 2 responden dengan persentase (6,3%) sedangkan dari distribusi responden berdasarkan pengetahuan diperoleh pengetahuan kurang yang mengalami tingkat kecemasan berat sebanyak 13 responden dengan persentase (40,6%) sehingga diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan tingkat kecemasan pada pasien yang dirawat di ruangbedah RSUD Labuang Baji Makasar. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Ali Imran/3:7

﴿الْأَلْبَابُ أُثُوًّا لِأَيْدِيكُمْ وَمَا رَبَّنَا عِنْدَ كُلِّ

Terjemahnya:

Semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tiadalah yang dapat mengambil pelajaran (daripadaNya) melainkan orang-orang yang berakal (Berilmu)”

Dari ayat diatas menjelaskan tentang orang-orang yang berilmu pasti mendapatkan hikmah atau pelajaran yang telah dilakukan. Sehingga demikian orang tersebut dalam menghadapi suatu masalah tidaklah khawatir atau cemas lagi dengan masalah tersebut.

Sedangkan hasil pengamatan dan wawancara yang didapatkan pada saat pengambilan data adalah bahwa hampir rata-rata responden yang berpengetahuan kurang sebagian besar mengalami kecemasan berat dibandingkan dengan pengetahuan baik yang ditandai dengan ungkapan responden bahwa dia merasa sangat cemas tentang operasi yang akan dijalannya, responden sering meminta untuk mengulangi pertanyaan yang diberikan, sering bingung terhadap penjelasan yang diberikan karena kurang dimengerti, wajah pucat, dan sedikit dari responden biasanya berkeringat. Sedangkan yang berpengetahuan baik hanya memperlihatkan tanda-tanda kecemasan hanya sedikit. Hal ini dapat dilihat pada saat responden diwawancarai tentang bagaimana keadaannya, sebagian besar mereka mengatakan bahwa baik-baik saja karena responden mengatakan bahwa dengan operasi yang mereka hadapi merupakan usaha untuk cepat sembuh dari sakit. Responden memiliki motivasi untuk sembuh juga didukung dari keluarga yang menemani atau yang mengunjunginya. Dan hasil observasi juga menunjukkan bahwa wajah pasien tidak pucat, napas normal, cara berbicara yang santai tanpa terburu-buru, sedikit yang meminta untuk mengulangi

pertanyaan yang diberikan. Hal ini sejalan dengan teori Rothrock, (2000) yang menyatakan bahwa pengetahuan dapat membantu pasien mencapai respon yang optimal tentang respon fisiologis dan psikologis terhadap intervensi bedah/operasi. Dengan adanya pengetahuan, pasien dapat memuat strategi coping, mengubah perilaku, mempelajari teknik baru, mengendalikan respon emosi dan bersiap terhadap dampak stress. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al Mujaadilah/58:11

دَرَجَاتِ الْعِلْمِ أَوْ تُوَاوِ الَّذِينَ مِنْكُمْ ءَامَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعُ

Terjemahnya:

Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan diantara kamu.

Maka sangat mulihsilah dihadapan Allah orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan apabila ilmunya dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan. Demikian pula dengan tingkat keimanan yang dia miliki dapat memberikan pengetahuan tentang penyakit dan pengobatan karena sesungguhnya Allahlah yang mendatangkan suatu penyakit begitupun penawarnya.

Maka dapat dikatakan bahwa kecemasan yang dialami pasien sebelum operasi lebih banyak yang memiliki pengetahuan kurang daripada yang memiliki pengetahuan baik. Hal ini terjadi karena pasien yang memiliki pengetahuan yang sangat kurang tentang persiapan-persiapan, prosedur, keuntungan, dan kerugian operasi tersebut sehingga mereka selalu merasa was-was atau cemas tentang bagaimana yang selanjutnya terjadi selama operasi maupun setelah operasi. Dan pasien yang memiliki pengetahuan yang baik memperlihatkan sebahagian kecil mengalami kecemasan berat hal ini

dikarenakan pasien tersebut mampu memahami dan menganalisis semua pengetahuan yang diberikan tentang prosedur, keuntungan maupun kerugian operasi tersebut sehingga memiliki mekanisme coping yang bagus atau adaptif.

Hal ini sejalan juga dengan teori yang diungkapkan oleh Rothtok, (1999) yaitu mengetahui apa yang tidak diketahui akan menenangkan pasien dan keluarga, sehingga dapat lebih meningkatkan kerjasama pasien dan keluarga dalam menghadapi prosedur maupun persiapan psikologis yang meliputi pemberian pendidikan kesehatan preoperasi karena pendidikan kesehatan pre operasi dapat menurunkan tingkat stress dengan mengurangi ketakutan pasien, takut karena ketidaktahuan, nyeri anesthesia dan kehilangan kontrol.

#### 5. Hubungan Pekerjaan dengan Tingkat Kecemasan.


Hasil analisa univariat menunjukkan bahwa responden yang memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pekerjaan sama-sama berjumlah 16 responden dengan persentase (50,0%).

Demikian pula dengan hasil analisa bivariat menunjukkan bahwa dari distribusi responden berdasarkan pekerjaan diperoleh responden bekerja yang mengalami kecemasan berat sebanyak 4 responden dengan persentase (12,5%) sedangkan dari distribusi responden berdasarkan pekerjaan diperoleh responden tidak bekerja yang mengalami kecemasan berat sebanyak 11 responden dengan persentase (34,4%). Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pekerjaan dengan tingkat kecemasan pada pasien yang dirawat di bedah RSUD Labuang Baji Makasar.

Sedangkan hasil pengamatan dan wawancara yang didapatkan pada saat pengambilan data adalah bahwa sebagian dari responden yang tidak memiliki pekerjaan mengalami kecemasan berat dibandingkan dengan memiliki pekerjaan yang ditandai dengan perasaan cemas yang berlebihan tentang keadaannya selama dalam perawatan, sebelum dan setelah pembedahan, responden sering meminta untuk dipercepat proses pembedahan agar tidak terlalu banyak menggunakan biaya yang banyak, cepat sembuh, agar cepat bekerja. Hal ini sejalan dengan teori Brunner & Studdath (2001) menyatakan bahwa pasien yang mengalami pembedahan dilingkupi oleh kekhawatiran mengenai kehilangan waktu kerja. Kemungkinan kehilangan pekerjaan, tanggung jawab mendukung keluarga dan ancaman ketidakmampuan permanen yang lebih jauh, memperberat ketegangan emosial.

Maka dapat dikatakan bahwa kecemasan yang dialami oleh pasien sebelum operasi lebih banyak yang dialami oleh pasien yang tidak bekerja daripada yang bekerja. Hal ini terjadi karena kemungkinan pasien selalu memikirkan biaya pengobatan maupun semua biaya selama dia dalam perawatan, mulai masuk sampai keluar dari rumah sakit. Karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak bisa menghasilkan uang, dan kemungkinan besar juga pasien memikirkan bagaimana keadaannya setelah operasi apakah tidak terjadi hal-hal yang membuat dia bertambah cacat, sehingga dia selalu merasa cemas, dan selalu bertanya-tanya dalam dirinya, apakah masih dapat bekerja setelah menjalani operasi atau tidak, karena belum mendapat jawaban yang jelas tentang apakah dia bertambah sehat

setelah operasi atau tambah sakit. Sehingga inilah yang memicu meningkatnya rasa kecemasan pada pasien tersebut. Sedangkan pasien yang memiliki pekerjaan menunjukkan sebagian kecil mengalami kecemasan berat hal ini disebabkan karena pasien tidak terlalu memikirkan masalah penghasilannya. Karena dengan penghasilan sebelumnya dapat membiayai operasi dan kebutuhan keluarganya tersebut misalnya: yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. *KESIMPULAN*

Dari hasil pengolahan dan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa :


1. Ada hubungan yang bermakna antara usia dengan tingkat kecemasan pada pasien yang dirawat di ruang bedah RSUD Labuang Baji Makassar.
2. Tidak ada hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan pada pasien yang dirawat di ruang bedah RSUD Labuang Baji Makassar.
3. Ada hubungan yang bermakna antara pendidikan dengan tingkat kecemasan pada pasien yang di rawat di ruang bedah RSUD Labuang Baji Makassar.
4. Ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan tingkat kecemasan pada pasien yang di rawat di ruang bedah RSUD Labuang Baji Makassar.
5. Ada hubungan yang bermakna antara pekerjaan dengan tingkat kecemasan pada pasien yang di rawat di ruang bedah RSUD Labuang Baji Makassar.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disampaikan beberapa saran kepada pihak terkait yang ada kaitannya dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pasien di ruang bedah RSUD Labuang Baji Makasar.

1. Agar pihak rumah sakit dalam hal ini tenaga keperawatan yang melaksanakan asuhan keperawatan agar dapat memperhatikan faktor-faktor yang berhubungan dengan kecemasan pasien pre operasi dengan caramemperhatikan kesiapan-kesiapan pasien sebelum operasi dilaksanakan. baik berupa penjelasan yang lengkap. Terutama pengetahuan prosedur pembedahan, keuntungan, kerugian operasi, sehingga kecemasan pasien dapat berkurang dalam menghadapi proses operasi tersebut.
2. Untuk meningkatkan mutu asuhan keperawatan hendaknya tenaga kesehatan atau perawat selalu mengembangkan pengetahuan, atau keterampilan-keterampilannya , khususnya pengembangan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan kecemasan pasien diruang perawatan bedah RSUD Labuang Baji Makasarsehingga kecemasan pasien dapat berkurang sebelum menghadapi proses operasi tersebut.
3. Kami menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena peneliti memiliki keterbatasan waktu, biaya, fasilitas, wawasan yang luas untuk menyusun dan masih kurangnya teori-teori yang membahas tentang kecemasan pasien pre operasi. Olehnya itu kami sarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas lagi teori-teori pendukung sehingga hasil skripsi menjadi lebih baik.

4. Di sarankan kepada peneliti selanjutnya yang berminat meneliti judul yang sama agar segera untuk mengkaji pasien yang mau diteliti, sebab seringkali responden yang mau diteliti langsung pulang atau ditunda untuk operasi.
5. Sarankan kepada pasien agar tidak cemas yakni harus rutin melaksanakan ibadah shalat fardhu dan ibadah-ibadah lainnya, banyak berzikir dan mengingat Allah dalam segala kegiatannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya. Departemen Agama RI,1996. Medinah Munawwarah:Mujamma' Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahdli thiba'at al Mush-haf asy Syarif.
- Brunner & Studdath. (2001).*Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah* vol 1. edisi 8, EGC, Jakarta.
- Data Hasil Rekam Medis RSUD Labuang Baji Makassar.
- Dirjen Pelayanan Medik Dan Direktorat Pelayanan Keperawatan.2003.
- Hawari, Dadang.2008.*Manajemen Stres, Cemas, dan Depresi*.Jakarta: FKUI.
- Keperawatan jiwa (Teori dan tindakan keperawatan) Dep-kes RI. Jakarta.
- Kaplan Harold I, & Sadock.Benyamin J.(1998). *Ilmu kedokteran jiwa Darurat*.Jakarta: Widya Medika
- Long.B.C.1996.*Perawatan Medikal Bedah suatu Pendekatan Proses keperawatan* 2.Bandung: Yayasan IAPK.
- Nurjannah.I.(2004). *Pedoman penanganan Gangguan jiwa (manajemen, proses keperawatan dan hubungan terapeutik perawat klien)* .Yogyakarta : Mocomedia
- Nursalam. (2003). *Konsep dan penerapan metodologi penelitian ilmu keperawatan (pedoman skripsi, Tesis dan instrument penelitian keperawatan)*.Jakarta: Salemba Medika
- Notoatmojo S,(2005), *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka cipta. Jakarta.
- Siagian, P.S (2000), *Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara*,Jakarta.
- Syamsuhidayat,R & Wim De Jong, (1997), *Buku Ajar Ilmu Bedah*, Edisi revisi.Jakarta: EGC.
- Sugiyono,(2006), *Metode penelitian kuantitatif dan R & D*, CV.Bandung: Alfabeta.
- Stuart W.G dan J.Sunden.(1998) *Buku saku keperawatan jiwa*. Cetakan 1, edisi Buku penerbit kedokteran jiwa.Jakarta: EGC.


Ramadhan S, (2001), *Kamus lengkap bahasa indonesia*, Surabaya: Ikhtiar.

Thalib.H.(2006). *Skripsi. Pengaruh pelayanan konseling preoperasi terhadap penurunan kecemasan klien. Di ruang perawatan bedah digestif lntara II. Rumah sakit umum wahidin sudirohusodo. Makassar.*

Tomb David A. (2004) *.Buku saku Psikiatri.Cetakan 1 edisi 6. Penerbit buku kedokteran.Jakarta: EGC.*

Trismiati.2004.*Perbedaan Tingkat kecemasan antara Pria dan wanita Akseptor Kontrasepsi di RSUP Dr.Sardjito Yogyakarta.Jurnal\_trismiati.pdf.diakses tanggal 24 Juli 2010 pukul 13.30 Wita.*

Lutfa, Umi.2008.*Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan pasien dalam Tindakan Kemoterapi di RS DR.Moewardi.eprints.ims.id/1131/1/4g.pdf.diakses tanggal 24 Juli 2010 pukul 13.45.*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



M. Imran Jum Wahab lahir di Kab. Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 02 April 1987. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan buah kasih sayang dari pasangan suami istri Jum Wahab dengan St. Aqirah, sekarang orangtua penulis menetap dimana penulis dilahirkan dan dibesarkan.

Penulis menempuh pendidikan formal pertama pada tahun 1994 di SDN Inpres 181 Parang Lambere Kab. Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan daerah penulis dibesarkan, di sekolah tersebut penulis menimba ilmu selama enam tahun dan selesai pada tahun 2000. Pada tahun yang sama penulis memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya di SLTP Negeri 1 Tamalatea Jeneponto dan selesai pada tahun 2002. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan pada SMU Negeri 1 Tamalatea Jeneponto dan selesai pada tahun 2006.

Setelah berhasil menyelesaikan studi di SMU, penulis memutuskan untuk tidak berhenti sampai disitu dan memilih melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang ada di kota Makassar yang memang menjadi keinginan dan pilihan penulis sendiri yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) sekarang Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, penulis mengambil program strata satu di Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Keperawatan dan selesai pada tahun 2010, dengan judul karya tulis ilmiah (skripsi)

***“Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Tingkat Kecemasan pada Pasien Pre Operasi Di Ruang Bedah RSUD Labuang Baji Makassar”***.

Penulis sangat bersyukur telah diberikan kesempatan menimba ilmu pada perguruan tinggi tersebut sebagai bekal penulis dalam mengarungi kehidupan dimasa yang akan datang. Penulis berharap apa yang didapatkan berupa ilmu pengetahuan dapat penulis amalkan di dunia dan mendapat balasan Rahmat dari Allah SWT.

## LEMBAR KUESIONER

### A. DATA DEMOGRAFI

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap sesuai dengan data demografi, dengan cara melingkari atau menyilang (X).

1. No. responden :
2. Usia :
3. Jenis kelamin : 1. Laki-laki  
2. Perempuan
- 4 Pendidikan : 1. SD  
2. SMP  
3. SMA  
4. Sarjana
5. Pekerjaan : 1. Bekerja  
2. Tidak bekerja
6. Apakah jaminan anda di rumah sakit ini?
  1. Askes
  2. Jamkesmas
  3. Jamkesda
  4. Umum
7. Operasi sekarang yang seberapa?
8. Apakah anda sudah mendapatkan penjelasan yang akan anda jalani?
  1. Ya
  2. Tidak
9. jenis operasi
  1. Ringan
  2. Sedang
  3. Berat

## B. SOAL KOESIONER PENGETAHUAN

### Petunjuk pengisian

- a. Bacalah dengan cermat dan teliti setiap pertanyaan dibawah ini.
- b. Pilih salah satu jawaban yang saudara anggap paling sesuai dengan pendapat atau keadaan Bapak/ibu/saudara.
- c. Lingkari jawaban yang dianggap paling benar pada setiap pertanyaan yang diberikan
- d. Terima kasih atas partisipasi bapak/ibu/saudara dalam penelitian

### Soal koesioner

1. Tindakan operasi disebut juga:
  - a. Pembedahan
  - b. Penjahitan
  - c. Perawatan
  - d. Terapi
2. Tindakan operasi terdiri dari:
  - a. Pre operatif
  - b. Operasi
  - c. Pasca operatif
  - d. Semua benar
3. Pemeriksaan radiologi sebelum operasi adalah dengan menggunakan:
  - a. Foto rontgen
  - b. Foto digital
  - c. Foto camera
  - d. Semua salah
4. Fungsi dari anastesi/pembiusan adalah:
  - a. Menghilangkan rasa sakit pada saat operasi
  - b. Mengancam hidup pasien
  - c. Meningkatkan kecemasan
  - d. Mengurangi kecemasan

5. Pemeriksaan modern pada saudara, sebelum dipastikan penyakitnya dan dapat dilihat langsung melalui layar komputer disebut:
- a. USG
  - b. Foto digital
  - c. Foto rongten
  - d. Foto camera
6. Sebelum saudara dioperasi, saudara dianjurkan untuk berpuasa selama:
- a. 5 jam sebelum operasi
  - b. 4 jam sebelum operasi
  - c. 3 jam sebelum operasi
  - d. 8 jam sebelum operasi
7. Penggunaan antibiotik (obat) adalah bertujuan untuk mencegah:
- a. Infeksi
  - b. Supaya tidak nyeri
  - c. Nafsu makan menuru
  - d. Nafsu makan meningkat
8. Bagi saudara perokok sebaiknya berhenti sebelum...
- a. Menjelang operasi
  - b. Sebelum dan sesudah operasi
  - c. Setelah operasi
  - d. Di kamar operasi
9. Keuntungan operasi bagi saudara adalah:
- a. Dapat menyembuhkan
  - b. Membebaskan dari beban
  - c. Sebagai penyelamat hidup
  - d. Meningkatkan harga diri
10. Sebelum saudara dioperasi sebaiknya harus diberikan:
- a. Informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai operasi
  - b. Tidak perlu diberikan informasi
  - c. Informasi dari apoteker
  - d. Semangat dan dukungan dari keluarga

11. Berikut ini adalah merupakan salah satu alat yang digunakan untuk pemeriksaan sebelum dioperasi adalah, kecuali:
- Mengukur tekanan darah dengan menggunakan tensimeter
  - Mengukur denyut nadi dengan jam tangan
  - Mengukur suhu dengan menggunakan thermometer
  - Tidak perlu menggunakan alat
12. Izin tertulis yang dibuat secara sadar dan sukarela dibuat oleh:
- Perawat
  - Dokter
  - Saudara
  - Rumah sakit
13. Saudara yang membuat izin tertulis ini ditandatangani pada saat:
- Sebelum operasi dilakukan
  - Sesudah operasi dilakukan
  - Sebelum dan sesudah operasi dilakukan
  - Keselamatan buat diri saudara
14. Sebelum menandatangani persetujuan operasi, saudara diberikan penjelasan tentang apa yang dibutuhkan dalam operasi serta kemungkinan yang akan terjadi oleh:
- Keluarga
  - Dokter ahli operasi
  - Pihak rumah sakit
  - Perawat
15. Menarik nafas dalam-dalam dan membuangnya kembali disebut:
- Batuk
  - Latihan tungkai
  - Teknik nafas dalam
  - Bernafas

16. Hal yang harus diperhatikan sebelum operasi pada saudara adalah:
- Kesiapan mental dari pasien
  - Persiapan fisik dari pasien
  - Pemeriksaan tekanan darah
  - Persiapan fisik dan mental pasien
17. Jika dilakukan tindakan operasi, maka kemungkinan resiko yang akan terjadi setelah tindakan operasi adalah:
- Perubahan bentuk tubuh
  - Timbul kecacatan
  - Tidak terjadi apa-apa
  - Perubahan bentuk tubuh dan biasanya timbul kecacatan
18. Sebelum operasi hal dasar yang harus diperiksa oleh perawat terhadap pasien adalah:
- Pemeriksaan air kemih
  - Pemeriksaan kotoran
  - Pemeriksaan tanda-tanda vital
  - Pemeriksaan air kemih dan tanda-tanda vital
19. Rasa nyeri pada operasi akan terasa saat:
- Efek bius hilang
  - Setelah pasien sadar
  - Setiap selesai operasi
  - Setelah pasien bangun dari tidur
20. Masa pemulihan operasi adalah selama:
- 2-3 hari
  - 5-7 hari
  - 7-14 hari
  - >30 hari

21. Persiapan fisik pre operasi yang dijalani pasien dibagi dalam... tahap.
- a. 1
  - b. 2
  - c. 3
  - d. 4
22. Status kesehatan fisik umum yangn penting untuk diperiksa sebelum dilakukan operasi adalah:
- a. Riwayat penyakit
  - b. Status pernafasan
  - c. Status tekanan darah
  - d. Semua benar
23. Latihan-latihan yang penting untuk dianjurkan kepada pasien operasi adalah:
- a. Latihan nafas dalam
  - b. Latihan batuk efektif
  - c. Latihan ROM
  - d. Semua benar
24. Yang termasuk persiapan mental pasien sebelum operasi adalah:
- a. Membantu pasien untuk mengetahui tentang penyakit-penyakit pasien sebelum operasi
  - b. Memberi latihan batuk efektif
  - c. Tidak member tahu untuk operasi
  - d. Semua benar
25. Tahapan keperawatan operatif terdiri dari:
- a. Intra operatif
  - b. Pre operatif
  - c. Pasca operatif
  - d. Semua benar
26. Tehnik nafas dalam berfungsi untuk:
- a. Mengurangi kecemasan
  - b. Mengurangi rasa takut
  - c. Mengurangi rasa nyeri
  - d. Semua benar

27. Berikut ini yang termasuk pemeriksaan laboratorium adalah:

- a. Hemoglobin
- b. USG
- c. CT Scan
- d. Foto toraks

28. Petugas yang ada dalam ruang operasi adalah sebagai berikut, kecuali:

- a. Dokter
- b. Ahli anastesi
- c. Perawatu
- d. Apoteker

29. Yang termasuk persiapan fisik sebelum operasi adalah:

- a. Distraksi
- b. Teknis nafas dalam
- c. Pemasangan huknah (pengosongan lambung)
- d. Batuk efektif

30. Yang merupakan indikasi pembedahan adalah:

- a. Eksisi tumor
- b. Memperbaiki luka
- c. Kosmetik
- d. Semua benar

Berilah tanda (√) jika terdapat pada gejala dibawah ini.

**1. Perasaan cemas**

Firasat buruk

Takut akan pikiran sendiri

Mudah tersinggung

Gelisah

**2. Ketegangan**

Tampak tegang

Mudah terkejut

Tidak dapat istirahat dengan nyaman

Mudah menangis

**3. Ketakutan**

Pada gelap

Ditinggal sendiri

Pada keramaian lalu lintas

Pada kerumunan orang banyak

**4. Gangguan tidur**

Sukar memulai tidur

Terbangun pada malam hari

Tidak pulas

Mimpi buruk



**5. Gangguan kecerdasan**

Daya ingat buruk

Sulit berkonsentrasi

Sering bingung

Pelupa

**6. Perasaan depresi**

Kehilangan minat

Sedih

Berkurangnya kesukaan pada hobi

Perasaan berubah-ubah sepanjang hari

**7. Gejala somatik (otot-otot)**

Nyeri otot

Kaku

Gigi gemeretak

Suara tidak strabil

**8. Gejala sensorik**

Teliga berdengung

Penglihatan kabur

Muka merah dan pucat

Merasa lemah

### 9. Gejala Cardiovasculer

- Denyut nadi cepat
- Berdebar-debar
- Nyeri dada
- Rasa lemah seperti mau pingsan

### 10. Gejala pernapasan

- Rasa tertekan didada
- Perasaan tercekik
- Merasa napas pendek / sesak
- Sering menarik napas panjang

### 11. Gejala gastrointestinal

- Sulit menelan
- Mual muntah
- Konstipasi / sulit buang air besar
- Nyeri lambung sebelum dan sesudah makan

### 12. Gejala Urogenetalia

- Sering kencing
- Tidak dapat menahan kencing
- Rasa sakit jika menahan kencing
- Kencing tidak lancer

**13. Gejala Vegetatif / otonom**

Mulut kering

Mudah berkeringat

Pusing/sakit kepala

Bulu romah berdiri

**14. Apakah bapak / ibu merasakan**

Gelisah

Tonus / ketegangan otot meningkat

Napas pendek dan cepat

Muka merah

Jumlah skore :.....

Kesimpulan :

Tidak ada kecemasan

Kecemasan ringan

Kecemasan sedang

Kecemasan berat

NO	NAMA	USIA	KRITERIA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	KRITERIA	PENGETAHUAN	KRITERIA	PEKERJAAN
1	tn. U	Dewasa tua	53	Laki-laki	Baik	SMA	Baik	> 60 %	Tidak bekerja
2	tn.m	Lansia	70	Laki-laki	Kurang	SMP	Kurang	< 60 %	Tidak bekerja
3	ny. S	Dewasa muda	35	Perempuan	Baik	SMA	Baik	> 60 %	Bekerja
4	ny. N	Dewasa tua	39	Perempuan	Baik	SMA	Kurang	< 60 %	Tidak bekerja
5	tn. R	Dewasa tua	40	Laki-laki	Baik	SMA	Baik	> 60 %	Bekerja
6	tn. B	Dewasa tua	39	Laki-laki	Kurang	SD	Kurang	< 60 %	Bekerja
7	tn. L	Dewasa tua	45	Laki-laki	Kurang	SMP	Kurang	< 60 %	Bekerja
8	ny. K	Dewasa muda	25	Perempuan	Kurang	SMP	Baik	> 60 %	Tidak bekerja
9	ny. H	Dewasa muda	31	Perempuan	Baik	SMA	Baik	> 60 %	Bekerja
10	ny. s	Dewasa muda	21	Perempuan	Baik	SMA	Baik	> 60 %	Tidak bekerja
11	ny. B	Dewasa tua	38	Perempuan	Kurang	SD	Kurang	< 60 %	Tidak bekerja
12	tn. M	Dewasa muda	32	Laki-laki	Baik	sarjana	Baik	> 60 %	Bekerja
13	tn.Mu	Lansia	63	Laki-laki	Baik	SMA	Baik	> 60 %	Tidak bekerja
14	ny. SU	Dewasa muda	32	Perempuan	Baik	sarjana	Baik	> 60 %	Bekerja
15	ny. SE	Dewasa tua	29	Perempuan	Baik	SMA	Baik	> 60 %	Bekerja
16	ny. Si	Anak-anak	15	Perempuan	Kurang	SMP	Kurang	< 60 %	Tidak bekerja
17	ny. Ha	Dewasa muda	28	Perempuan	Baik	SMA	Baik	> 60 %	Tidak bekerja
18	tn. Hs	Dewasa tua	40	Laki-laki	Baik	SMA	Kurang	< 60 %	Tidak bekerja
19	tn. Ru	Dewasa tua	39	Laki-laki	Baik	sarjana	Baik	> 60 %	Bekerja
20	ny. Ss	Dewasa muda	32	Perempuan	Baik	sarjana	Baik	> 60 %	Bekerja
21	tn. E	Lansia	61	Laki-laki	Baik	SMA	Kurang	< 60 %	Tidak bekerja
22	ny. Nu	Anak-anak	14	Perempuan	Kurang	SMP	Kurang	< 60 %	Tidak bekerja
23	tn. Im	Dewasa muda	23	Laki-laki	Baik	sarjana	Baik	> 60 %	Bekerja
24	tn. Dr	Dewasa tua	38	Laki-laki	Kurang	SMP	Kurang	< 60 %	Bekerja
25	ny. Ic	Dewasa muda	31	Perempuan	Baik	SMA	Baik	> 60 %	Bekerja
26	ny. D	Dewasa muda	28	Perempuan	Baik	sarjana	Baik	> 60 %	Bekerja
27	tn. R	Dewasa muda	24	Laki-laki	Baik	sarjana	Baik	> 60 %	Tidak bekerja
28	tn. U	Dewasa tua	36	Laki-laki	Kurang	SMP	Kurang	< 60 %	Tidak bekerja
29	ny. Il	Anak-anak	13	Perempuan	Kurang	SD	Kurang	< 60 %	Tidak bekerja
30	tn. F	Dewasa muda	34	Laki-laki	Baik	sarjana	Baik	> 60 %	Bekerja
31	tn. G	Dewasa muda	35	Laki-laki	Kurang	SMP	Kurang	< 60 %	Tidak bekerja
32	ny. Un	Dewasa muda	24	Perempuan	Baik	SMA	Baik	> 60 %	Bekerja

SOSIAL EKONOMI	PENG OPERASI	INFORM CONSENT	JENIS OPERASI	KECEMASAN	KRITERIA
Askes	1	Ya	Berat	Sedang	27
Jamkesda	1	Ya	Sedang	Berat	35
Jamkesda	1	Ya	Berat	Sedang	24
Umum	1	Ya	Berat	Berat	31
Umum	1	Ya	Berat	Sedang	29
Jamkesmas	1	Ya	Sedang	Berat	33
Umum	1	Ya	Sedang	Berat	41
Jamkesda	1	Ya	Ringan	Sedang	23
Jamkesmas	1	Ya	Berat	Sedang	22
Umum	1	Ya	Sedang	Berat	33
Jamkesmas	1	Ya	Sedang	Berat	34
Askes	1	Ya	Sedang	Sedang	23
Jamkesda	1	Ya	Sedang	Sedang	27
Askes	1	Ya	Sedang	Sedang	24
Askes	1	Ya	Berat	Berat	33
Jamkesmas	1	Ya	Ringan	Berat	30
Umum	1	Ya	Ringan	Sedang	24
Jamkesda	1	Ya	Sedang	Berat	31
Askes	1	Ya	Berat	Sedang	25
Umum	1	Ya	Berat	Sedang	24
Jamkesda	1	Ya	Ringan	Berat	32
Umum	1	Ya	Ringan	Berat	35
Umum	1	Ya	Berat	Sedang	22
Jamkesda	1	Ya	Ringan	Berat	34
Askes	1	Ya	Sedang	Sedang	21
Umum	1	Ya	Sedang	Sedang	24
Askes	1	Ya	Sedang	Sedang	25
Jamkesda	1	Ya	Ringan	Berat	34
Jamkesda	1	Ya	Ringan	Berat	33
Umum	1	Ya	Berat	Sedang	25
Jamkesda	1	Ya	Sedang	Berat	35
Askes	1	Ya	Sedang	Sedang	23

## Frequencies

[DataSet0]

## Frequency Table

### usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
Dewasa m	18	56,2	56,2	56,2
Dewasa t	14	43,8	43,8	43,8
Total	32	100,0	100,0	100,0

### jenis kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
Laki-lak	16	50,0	50,0	50,0
Perempua	16	50,0	50,0	100,0
Total	32	100,0	100,0	

### pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
Baik	21	65,6	65,6	65,6
Kurang	11	34,4	34,4	100,0
Total	32	100,0	100,0	

### kriteria

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid				
sarjana	8	25,0	25,0	25,0
SD	3	9,4	9,4	34,4
SMA	13	40,6	40,6	75,0
SMP	8	25,0	25,0	100,0
Total	32	100,0	100,0	

**pengetahuan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	19	59.4	59.4	59.4
	Kurang	13	40.6	40.6	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

**kriteria**

		Frequency	Percent
Missing	System	32	100.0

**pekerjaan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Bekerja	16	50.0	50.0	50.0
	Tidak be	16	50.0	50.0	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

**sosialekonomi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Askes	8	25.0	25.0	25.0
	Jamkesda	10	31.3	31.3	56.3
	Jamkesma	4	12.5	12.5	68.8
	Umum	10	31.3	31.3	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

**peng.operasi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	32	100.0	100.0	100.0

**informconsent**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	32	100.0	100.0	100.0

**jenis operasi**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Berat	10	31.3	31.3	31.3
	Ringan	8	25.0	25.0	56.3
	Sedang	14	43.8	43.8	100.0
	Total	32	100.0	100.0	


**kecemasan**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Berat	15	46.9	46.9	46.9
	Sedang	17	53.1	53.1	100.0
	Total	32	100.0	100.0	

**Bar Chart**





**usia**




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R


**jenis kelamin**



### pendidikan




### kriteria



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R


### pengetahuan



**pekerjaan**



**sosialekonomi**




**sosialekonomi**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**jenis operasi**



### kecemasan



## Crosstabs

[DataSet0]

### usia \* kecemasan

Crosstab

		kecemasan		Total
		Berat	Sedang	
usia				
Dewasa m	Count	3	15	18
	Expected Count	7.0	8.0	15.0
	% within usia	13.3%	86.7%	100.0%
	% within kecemasan	13.3%	76.5%	46.9%
	% of Total	6.3%	40.6%	46.9%
Dewasa t	Count	9	5	14
	Expected Count	5.2	5.8	11.0
	% within usia	72.7%	27.3%	100.0%
	% within kecemasan	53.3%	17.6%	34.4%
	% of Total	25.0%	9.4%	34.4%
Total				
Total	Count	15	17	32
	Expected Count	15.0	17.0	32.0
	% within usia	46.9%	53.1%	100.0%
	% within kecemasan	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	46.9%	53.1%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	13.601 <sup>a</sup>	3	.004
Likelihood Ratio	15.746	3	.001
N of Valid Cases	32		

a. 0 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.41.

**Symmetric Measures<sup>a</sup>**

	Value
N of Valid Cases	32

a. Correlation statistics are available for numeric data only.

**jenis kelamin \* kecemasan**

**Crosstab**

			kecemasan		Total
			Berat	Sedang	
jenis kelamin	Laki-lak	Count	8	8	16
		Expected Count	7.5	8.5	16.0
		% within jenis kelamin	50.0%	50.0%	100.0%
		% within kecemasan	53.3%	47.1%	50.0%
		% of Total	25.0%	25.0%	50.0%
	Perempua	Count	7	9	16
		Expected Count	7.5	8.5	16.0
		% within jenis kelamin	43.8%	56.3%	100.0%
		% within kecemasan	46.7%	52.9%	50.0%
		% of Total	21.9%	28.1%	50.0%
Total	Count	15	17	32	
	Expected Count	15.0	17.0	32.0	
	% within jenis kelamin	46.9%	53.1%	100.0%	
	% within kecemasan	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	46.9%	53.1%	100.0%	

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.125 <sup>b</sup>	1	.723		
Continuity Correction <sup>a</sup>	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.126	1	.723		
Fisher's Exact Test				1.000	.500
N of Valid Cases	32				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.50.

**Symmetric Measures<sup>a</sup>**

	Value
N of Valid Cases	32

a. Correlation statistics are available for numeric data only.

**pendidikan \* kecemasan**

**Crosstab**

			kecemasan		Total
			Berat	Sedang	
pendidikan	Baik	Count	5	16	21
		Expected Count	9.8	11.2	21.0
		% within pendidikan	23.8%	76.2%	100.0%
		% within kecemasan	33.3%	94.1%	65.6%
		% of Total	15.6%	50.0%	65.6%
	Kurang	Count	10	1	11
		Expected Count	5.2	5.8	11.0
		% within pendidikan	90.9%	9.1%	100.0%
		% within kecemasan	66.7%	5.9%	34.4%
		% of Total	31.3%	3.1%	34.4%
Total	Count	15	17	32	
	Expected Count	15.0	17.0	32.0	
	% within pendidikan	46.9%	53.1%	100.0%	
	% within kecemasan	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	46.9%	53.1%	100.0%	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	13.052 <sup>b</sup>	1	.000		
Continuity Correction <sup>a</sup>	10.496	1	.001		
Likelihood Ratio	14.482	1	.000		
Fisher's Exact Test				.001	.000
N of Valid Cases	32				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.16.

**Symmetric Measures<sup>a</sup>**

	Value
N of Valid Cases	32

a. Correlation statistics are available for numeric data only.

**pengetahuan \* kecemasan**

**Crosstab**

			kecemasan		Total
			Berat	Sedang	
pengetahuan	Baik	Count	2	17	19
		Expected Count	8.9	10.1	19.0
		% within pengetahuan	10.5%	89.5%	100.0%
		% within kecemasan	13.3%	100.0%	59.4%
		% of Total	6.3%	53.1%	59.4%
	Kurang	Count	13	0	13
		Expected Count	6.1	6.9	13.0
		% within pengetahuan	100.0%	.0%	100.0%
		% within kecemasan	86.7%	.0%	40.6%
		% of Total	40.6%	.0%	40.6%
Total		Count	15	17	32
		Expected Count	15.0	17.0	32.0
		% within pengetahuan	46.9%	53.1%	100.0%
		% within kecemasan	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	46.9%	53.1%	100.0%

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	24.814 <sup>b</sup>	1	.000		
Continuity Correction <sup>a</sup>	21.351	1	.000		
Likelihood Ratio	31.449	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
N of Valid Cases	32				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.09.

**Symmetric Measures<sup>a</sup>**

	Value
N of Valid Cases	32

a. Correlation statistics are available for numeric data only.

**pekerjaan \* kecemasan**

**Crosstab**

			kecemasan		Total
			Berat	Sedang	
pekerjaan	Bekerja	Count	4	12	16
		Expected Count	7.5	8.5	16.0
		% within pekerjaan	25.0%	75.0%	100.0%
		% within kecemasan	26.7%	70.6%	50.0%
		% of Total	12.5%	37.5%	50.0%
	Tidak be	Count	11	5	16
		Expected Count	7.5	8.5	16.0
		% within pekerjaan	68.8%	31.3%	100.0%
		% within kecemasan	73.3%	29.4%	50.0%
		% of Total	34.4%	15.6%	50.0%
Total	Count	15	17	32	
	Expected Count	15.0	17.0	32.0	
	% within pekerjaan	46.9%	53.1%	100.0%	
	% within kecemasan	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	46.9%	53.1%	100.0%	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.149 <sup>b</sup>	1	.013		
Continuity Correction <sup>a</sup>	4.518	1	.034		
Likelihood Ratio	6.367	1	.012		
Fisher's Exact Test				.032	.016
N of Valid Cases	32				

a. Computed only for a 2x2 table

b. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.50.

**Symmetric Measures<sup>a</sup>**

	Value
N of Valid Cases	32

a. Correlation statistics are available for numeric data only.

**sosialekonomi \* kecemasan**

**Crosstab**

			kecemasan		Total
			Berat	Sedang	
sosialekonomi	Askes	Count	1	7	8
		Expected Count	3.8	4.3	8.0
		% within sosialekonomi	12.5%	87.5%	100.0%
		% within kecemasan	6.7%	41.2%	25.0%
		% of Total	3.1%	21.9%	25.0%
	Jamkesda	Count	7	3	10
		Expected Count	4.7	5.3	10.0
		% within sosialekonomi	70.0%	30.0%	100.0%
		% within kecemasan	46.7%	17.6%	31.3%
		% of Total	21.9%	9.4%	31.3%
	Jamkesma	Count	3	1	4
		Expected Count	1.9	2.1	4.0
		% within sosialekonomi	75.0%	25.0%	100.0%
		% within kecemasan	20.0%	5.9%	12.5%
		% of Total	9.4%	3.1%	12.5%
	Umum	Count	4	6	10
		Expected Count	4.7	5.3	10.0
		% within sosialekonomi	40.0%	60.0%	100.0%
		% within kecemasan	26.7%	35.3%	31.3%
		% of Total	12.5%	18.8%	31.3%
Total	Count	15	17	32	
	Expected Count	15.0	17.0	32.0	
	% within sosialekonomi	46.9%	53.1%	100.0%	
	% within kecemasan	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	46.9%	53.1%	100.0%	

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	7.404 <sup>a</sup>	3	.060
Likelihood Ratio	8.032	3	.045
N of Valid Cases	32		

a. 6 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.88.

### Symmetric Measures<sup>a</sup>

	Value
N of Valid Cases	32

a. Correlation statistics are available for numeric data only.

## peng.operasi \* kecemasan

### Crosstab

		kecemasan		Total
		Berat	Sedang	
peng.operasi 1	Count	15	17	32
	Expected Count	15.0	17.0	32.0
	% within peng.operasi	46.9%	53.1%	100.0%
	% within kecemasan	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	46.9%	53.1%	100.0%
Total	Count	15	17	32
	Expected Count	15.0	17.0	32.0
	% within peng.operasi	46.9%	53.1%	100.0%
	% within kecemasan	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	46.9%	53.1%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. <sup>a</sup>
N of Valid Cases	32

a. No statistics are computed because peng.operasi is a constant.

### Symmetric Measures<sup>a</sup>

	Value
N of Valid Cases	32

a. Correlation statistics are available for numeric data only.

## informconsent \* kecemasan

### Crosstab

		kecemasan		Total
		Berat	Sedang	
informconsent Ya	Count	15	17	32
	Expected Count	15.0	17.0	32.0
	% within informconsent	46.9%	53.1%	100.0%
	% within kecemasan	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	46.9%	53.1%	100.0%
Total	Count	15	17	32
	Expected Count	15.0	17.0	32.0
	% within informconsent	46.9%	53.1%	100.0%
	% within kecemasan	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	46.9%	53.1%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value
Pearson Chi-Square	. <sup>a</sup>
N of Valid Cases	32

a. No statistics are computed because informconsent is a constant.

### Symmetric Measures<sup>a</sup>

	Value
N of Valid Cases	32

a. Correlation statistics are available for numeric data only.

## jenis operasi \* kecemasan

### Crosstab

			kecemasan		Total
			Berat	Sedang	
jenis operasi	Berat	Count	2	8	10
		Expected Count	4.7	5.3	10.0
		% within jenis operasi	20.0%	80.0%	100.0%
		% within kecemasan	13.3%	47.1%	31.3%
		% of Total	6.3%	25.0%	31.3%
Ringan		Count	6	2	8
		Expected Count	3.8	4.3	8.0
		% within jenis operasi	75.0%	25.0%	100.0%
		% within kecemasan	40.0%	11.8%	25.0%
		% of Total	18.8%	6.3%	25.0%
Sedang		Count	7	7	14
		Expected Count	6.6	7.4	14.0
		% within jenis operasi	50.0%	50.0%	100.0%
		% within kecemasan	46.7%	41.2%	43.8%
		% of Total	21.9%	21.9%	43.8%
Total		Count	15	17	32
		Expected Count	15.0	17.0	32.0
		% within jenis operasi	46.9%	53.1%	100.0%
		% within kecemasan	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	46.9%	53.1%	100.0%

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.496 <sup>a</sup>	2	.064
Likelihood Ratio	5.823	2	.054
N of Valid Cases	32		

a. 3 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.75.

### Symmetric Measures<sup>a</sup>

	Value
N of Valid Cases	32

a. Correlation statistics are available for numeric data only.