

**MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “S ” DENGAN POST
OPERASI MIOMA UTERI DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR
TANGGAL 23 S/D 27 JUNI 2010**



Karya Tulis Ilmiah

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Ahli Madya
Kebidanan Jurusan Kebidanan pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

OLEH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RISMAWATI
70400007041

ALAUDDIN
M A K A S S A R

**JURUSAN KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2010

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka karya tulis ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Agustus 2010

Penyusun

Rismawati
70400007041



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Nama : Rismawati
Nim : 70400007041
Judul :Manajemen Asuhan Kebidanan pada Ny “S” dengan Post Operasi
Mioma Uteri di RSUD Labuang Baji Makassar Tanggal 23 s/d 27
Juni 2010.

Karya Tulis Ilmiah ini telah disetujui untuk diajukan pada seminar Karya
Tulis Ilmiah Jurusan Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar.

Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Sitti Saleha, S. SiT, SKM, M. Keb

NIP. 19760126 200604 2 001

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan hidayah-Nya berupa kesehatan jasmani dan rohani serta akal fikiran sehingga penulisan Karya Tulis Ilmiah ini meskipun dalam bentuk sederhana dapat terlaksana dan terselesaikan dengan judul : **“Manajemen Asuhan Kebidanan pada NY “S” dengan Post Operasi Mioma Uteri di RSUD Labuang Baji Makassar Tanggal 23 s/d 27 Juni 2010”**.

Penulis menyadari dalam pelaksanaan dan penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, dan arahan yang tak henti-hentinya dari dosen pembimbing yaitu **Sitti Saleha, S.SiT., SKM., M.Keb.** Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, dan juga kepada :

1. Bapak Prof. DR. M. Azhar Arsyad, MA, selaku rektor UIN Alauddin Makassar beserta stafnya.
2. Bapak dr. H. M. Furqaan Naiem, M.Sc. Ph.D, selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan beserta staf-stafnya.
3. Sitti Saleha, S.SiT, S.KM, M.Keb, selaku pembimbing KTI dan Ketua Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar.

4. dr. H. Bambang Arya, M.Kes, selaku Kepala Rumah Sakit RSUD Labuang Baji Makassar beserta stafnya yang memberikan izin dalam penelitian hingga akhir.
5. dr. Rini Fitriani, S.Ked selaku penguji yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
6. Dra. Noer Huda Noer, M.Ag selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan dalam mendidik penulis selama pendidikan.
8. Sembah sujudku kepada kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Abd.Rahman dan Ibunda Kamariah yang telah mengasuh, mendidik, dan memberikan semangat dengan penuh kesabaran dan kasih sayang agar penulis menjadi lebih baik.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mensupport hingga penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan Karya Tulis Ilmiah ini. Semoga apa yang dikerjakan penulis selama ini mendapat ridho dari Allah SWT. Amin.

Gowa , Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11

A. Konsep Dasar tentang Mioma Uteri.....	11
1. Defenisi Mioma Uteri.....	11
2. Etiologi.....	12
3. Klasifikasi Mioma Uteri.....	13
4. Perubahan Sekunder Mioma Uteri.....	14
5. Tanda dan Gejala	16
6. Mioma Uteri dan Kehamilan	18
7. Komplikasi.....	11
8. Diagnosis.....	11
9. Penatalaksanaan Medik.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Post Operasi Mioma uteri.....	11
1. Pengertian Histerektomi.....	28
2. Penyebab Histerektomi.....	29
3. Prosedur Histerektomi.....	29
4. Perawatan Post Operasi Mioma Uteri.....	32
C. Tinjauan Islam Tentang Post Op Mioma Uteri.....	12
D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan.....	12
E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP).....	15
BAB III.STUDI KASUS.....	40
Langkah I. Identifikasi Data dasar.....	40

Langkah II. Identifikasi Diagnosa/ Masalah Aktual.....	46
Langkah III. Identifikasi Diagnosa/ Masalah Potensial.....	49
Langkah IV. Tindakan Segera/ Kolaborasi.....	50
Langkah V. Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan.....	51
Langkah VI. Tindakan Asuhan Kebidanan.....	54
Langkah VII. Evaluasi Asuhan Kebidanan.....	56
Pendokumentasian.....	57
BAB IV: PEMBAHASAN.....	76
BAB V : PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
Bagan 2.1 Tatalaksana Mioma Uteri.....	27



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1. Lokasi Mioma Uterus pada Mioma Uteri.....	91
Gambar 2.2. Prosedur Histerektomi.....	29



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Kegiatan Konsul

Lampiran 2. Surat Permohonan Izin Pengambilan Data

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu penyakit sistem reproduksi wanita sejenis tumor yang paling sering ditemukan adalah mioma uteri. Mioma uteri disebut juga leiomioma, fibromioma, atau fibroid merupakan neoplasma jinak yang berasal dari otot uterus dan jaringan ikat. (Arif Mansjoer, dkk. Hal 387).

Sebagian besar kasus mioma uteri adalah tanpa gejala, sehingga kebanyakan penderita tidak menyadari adanya kelainan pada uterusnya. Diperkirakan hanya 20%-50% dari tumor ini yang menimbulkan gejala klinik, terutama perdarahan menstruasi yang berlebihan, infertilitas, abortus berulang, dan nyeri akibat penekanan massa tumor.

Pertumbuhan mioma diperkirakan memerlukan waktu 3 tahun agar dapat mencapai ukuran sebesar tinju, akan tetapi beberapa kasus ternyata tumbuh cepat. Dengan pertumbuhan mioma dapat mencapai berat lebih dari 5 kg. Jarang sekali mioma ditemukan pada wanita berumur 20 tahun, paling banyak berumur 35 – 45 tahun (25%). Mioma uteri ini lebih sering didapati pada wanita nulipara atau yang kurang subur.

Menurut penelitian di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Schwartz, angka kejadian mioma uteri adalah 2-12,8 orang per 1000 wanita tiap tahunnya. Schwartz menunjukkan angka kejadian mioma uteri 2-3 kali lebih tinggi pada wanita kulit hitam dibanding kulit putih .diperkirakan setiap 4-5

wanita mengidap kelainan ini dan menunjukkan kecenderungan pertumbuhan pada dekade usia ke-3 dan ke-4 dalam kurun kronologi kehidupan wanita. Usia termuda yang pernah dijumpai adalah 13 tahun dan tumor jinak ini mempunyai kecenderungan untuk regenerasi pada masa post menopause.

Berdasarkan otopsi, Novak menemukan 27% wanita berumur 25 tahun mempunyai sarang mioma, pada wanita yang berkulit hitam ditemukan lebih banyak. Mioma uteri belum pernah dilaporkan terjadi sebelum menarche. Setelah menopause hanya kira-kira 10% mioma yang masih bertumbuh.

(<http://ayurai.wordpress.com/2009/03/30/askeb-myoma-uteri/> diakses tgl 28 April 2010)

Di Indonesia mioma uteri ditemukan 2,39%-11,70% pada semua penderita ginekologi yang dirawat. Diperkirakan 1 dibanding 4 atau 5 wanita yang berumur lebih dari 35 tahun terdapat mioma uteri. Meskipun umumnya mioma tidak menunjukkan gejala, diperkirakan 60% dari laparotomi pelvis pada wanita dikerjakan dengan alasan Mioma Uteri. Lesi ini sering ditemukan pada dekade 4 atau 5 ([http://yayanakhyar.wordpress.com -mioma-uteri-rsud-aa/diakses_tgl](http://yayanakhyar.wordpress.com-mioma-uteri-rsud-aa/diakses_tgl) 31 April 2010).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Medical Record di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar, jumlah pasien yang menderita penyakit mioma uteri tahun 2009 berkisar 40 penderita rawat inap dan rawat jalan. Pasien rawat inap berkisar 34 penderita yaitu umur 15 – 24 tahun sebanyak 2 penderita, umur 25 – 44 tahun sebanyak 24 penderita, umur 45– 64 tahun sebanyak 8 penderita. Sedangkan pasien rawat jalan sebanyak 6

penderita dari umur 25-44 tahun. Dari data tersebut didapatkan kejadian mioma uteri terbanyak pada umur 25 – 45 tahun.

Sampai saat ini penyebab pasti mioma uteri belum dapat diketahui secara pasti, namun dari hasil penelitian diketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan mioma uteri distimulasi oleh hormon esterogen dan siklus hormonal.

Resiko yang paling ditakuti dari mioma uteri yaitu mengalami degenerasi keganasan, di samping itu bisa mengalami torsi sehingga menimbulkan nekrosis, nyeri akut atau infeksi. Sehingga mioma uteri memerlukan penanganan yang professional dan multi disiplin. (Wiknjosastro.H.2005, hal 340)

Dengan masih tingginya kejadian mioma uteri, maka penulis merasa tertarik akan membahas secara spesifik mengenai masalah ini dengan menggunakan metode pendekatan manajemen asuhan kebidanan dengan judul “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny “S” Dengan Post Operasi Mioma Uteri di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar Tanggal 23 s/d 27 Juni 2010. ”

B. Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun ruang lingkup pembahasan karya tulis ilmiah ini meliputi penerapan “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny “S” Dengan Post Operasi Mioma Uteri di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar Tanggal 23 s/d 27 Juni 2010. ”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Dapat melaksanakan “Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny “S” Dengan Post Operasi Mioma Uteri di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar Tanggal 23 s/d 27 Juni 2010.”

2. Tujuan Khusus

- a. Dapat mengkaji dan menganalisa data pada Ny “S” Dengan Post Operasi Mioma Uteri di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar.
- b. Dapat merumuskan diagnosa masalah aktual pada Ny “S” Dengan Post Operasi Mioma Uteri di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar.
- c. Dapat merumuskan diagnosa / masalah potensial pada Ny “S” Dengan Post Operasi Mioma Uteri di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar.
- d. Dapat melakukan tindakan segera dan kolaborasi pada Ny “S” Dengan Post Operasi Mioma Uteri di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar.
- e. Dapat merencanakan tindakan asuhan kebidanan pada Ny “S” Dengan Post Operasi Mioma Uteri di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar.

- f. Dapat melaksanakan tindakan asuhan kebidanan pada Ny “S” Dengan Post Operasi Mioma Uteri di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar.
- g. Dapat mengevaluasi asuhan kebidanan pada Ny “S” Dengan Post Operasi Mioma Uteri di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar.
- h. Dapat melakukan pendokumentasian manajemen asuhan kebidanan pada Ny “S” Dengan Post Operasi Mioma Uteri di Rumah Sakit Umum Labuang Baji Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Sebagai salah satu sumber informasi bagi setiap penentu kebijakan dan pelaksana program di Departemen Kesehatan maupun pihak Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar dalam menyusun perencanaan , pelaksanaan, dan evaluasi program sebagai upaya pencegahan atau penanganan penyakit mioma uteri sejak dini.

2. Manfaat institusi

Sebagai bahan masukan bagi rekan – rekan mahasiswa program D III Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam melaksanakan asuhan kebidanan.

3. Manfaat ilmiah

Diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi sumber informasi dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan bahan acuan bagi penulisan selanjutnya.

4. Manfaat bagi penulis

- a. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir jenjang pendidikan D III Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- b. Merupakan kontribusi pemikiran penulis dalam proses penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh khususnya tentang Asuhan Kebidanan pada penderita mioma uteri.

E. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini adalah:

1. Studi kepustakaan

Merupakan berbagai referensi yang ada kaitannya dengan mioma uteri dan histrektomi antara lain : membaca buku dari berbagai sumber, mengakses data melalui internet serta mempelajari karya tulis ilmiah yang ada.

2. Studi Kasus

Dengan menggunakan metode pendekatan masalah dalam asuhan kebidanan yang meliputi pengkajian dan analisa data dasar, menetapkan diagnosa atau masalah aktual dan potensial, mengidentifikasi tindakan

dan mengevaluasi asuhan kebidanan pada wanita dengan mioma uteri serta melakukan pendokumentasian.

Data yang terhimpun dalam pengkajian didapatkan dengan menggunakan metode :

a. Anamnesa

Penulis melakukan tanya jawab kepada pasien dan keluarga yang mendampingi saat itu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

b. Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung keadaan pasien.

c. Pemeriksaan fisik

Melakukan pemeriksaan fisik secara sistematis pada klien dari kepala sampai kaki dengan memulai pemeriksaan dengan inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi, dan pemeriksaan laboratorium untuk memperoleh data objektif.

3. Studi Dokumentasi

Mempelajari status klien berdasarkan catatan medik yang terkait dengan kasus klien.

4. Diskusi

Melakukan diskusi dengan bidan dan dokter yang menangani kasus klien di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, selain itu juga diskusi dilakukan dengan pembimbing Karya Tulis Ilmiah.

F . Sistematis Penelitian

Metode kasus ini terdiri dari lima bab dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Ruang Lingkup Pembahasan
- C. Tujuan Penulisan
- D. Manfaat Penulisan
- E. Metode Penulisan
- F. Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Konsep Dasar Tentang Mioma Uteri
 - 1. Defenisi Mioma Uteri
 - 2. Etiologi
 - 3. Klasifikasi Mioma Uteri
 - 4. Perubahan Sekunder Mioma Uteri
 - 5. Tanda dan Gejala
 - 6. Mioma Uteri dan Kehamilan
 - 7. Komplikasi
 - 8. Diagnosis
 - 9. Penatalaksanaan Medik

B. Tinjauan Umum Tentang Post Operasi Mioma uteri

1. Pengertian Histerektomi.
2. Penyebab Histerektomi.
3. Prosedur Histerektomi.
4. Perawatan Post Operasi

C. Tinjauan Islam Tentang Post Op Mioma Uteri

D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

1. Pengertian Manajemen Asuhan Kebidanan
2. Tahapan Dalam Manajemen Asuhan Kebidanan

E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

BAB III : STUDI KASUS

Langkah I : Pengkajian Data dan Analisa Data Dasar

Langkah II : Merumuskan Diagnosa Masalah Aktual

Langkah III : Merumuskan Diagnosa Masalah Potensial

Langkah IV : Tindakan segera / Kolaborasi Asuhan Kebidanan

Langkah V : Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan

Langkah VI : Pelaksanaan Tindakan Asuhan Kebidanan

Langkah VII : Evaluasi Asuhan Kebidanan Pendokumentasian

Asuhan Kebidanan

Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

BAB IV : PEMBAHASAN


Pada Bab ini dibahas tentang kesenjangan antara teori dan praktek asuhan kebidan pada Ny “S” Post Operasi Mioma Uteri di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Tanggal 23 s/d 27 Juni 2010.

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Tentang Mioma

1. Definisi mioma uteri

- a. Mioma uteri adalah tumor jinak otot rahim dengan berbagai komposisi jaringan ikat . Nama lain: leiomiomauteri dan fibroma uteri.
(Manuaba,2001. Hal 600)
- b. Mioma uteri adalah tumor jinak yang berasal dari sel – sel otot polos .
(Rayburn.W.F,2001. Hal 268)
- c. Mioma uteri adalah neoplasma jinak yang berasal dari otot uterus dan jaringan ikat sehingga dalam kepustakaan disebut juga leiomioma , fibromioma , atau fibroid.
- d. Mioma Uteri (bahasa Inggris: uterine myoma) adalah tumor jinak pada dinding rahim. Mioma juga disebut mioma, myom, tumor otot rahim atau tumor fibroid, karena berasal dari sel jaringan fibro.
(http://id.wikipedia.org/wiki/Mioma_Uteri#Riwayat_penyakit,di akses tgl 21 April 2010)
- e. Mioma uteri, dikenal juga dengan sebutan fibromioma, fibroid ataupun leiomioma dan merupakan neoplasma jinak yang berasal dari otot uterus dan jaringan ikat yang menumpangnya.


2. Etiologi

Penyebab yang pasti dari mioma uteri sampai saat ini belum diketahui. Beberapa peneliti menduga mioma tumbuh dari sel neoplastik tunggal (monoklonal) sel - sel otot yang normal, dari sel -sel otot imatur dalam miometrium atau dari sel - sel embrional di dinding pembuluh darah uterus.

Hormon estrogen juga berperan penting terjadinya mioma uteri. Walaupun tidak ada bukti bahwa estrogen menyebabkan mioma, pertumbuhan mioma tergantung pada kadar estrogen. Tumor ini tumbuh selama masa aktifitas paling tinggi, dan ovarium. Sekresi estrogen yang terus menerus, terutama jika tidak diselingi oleh kehamilan dan laktasi diduga sebagai faktor resiko utama yang melatarbelakangi pertumbuhan mioma.

Faktor genetik mungkin turut mempredisposisi terjadinya mioma uteri, karena sering dijumpai riwayat mioma pada keluarga penderita mioma uteri. Mioma dijumpai 3-9 kali lebih sering pada ras negro dari pada kaukasia, dimana mioma banyak terjadi diantara mereka yang sangat muda dan nullipara, sementara pada ras kaukasia dijumpai pada wanita - wanita lebih tua dan multipara.

3. Klasifikasi Mioma Uteri



Gambar 2.1. Lokasi mioma uteri pada uterus

- a. Berdasarkan lokasi, mioma uteri terdapat di :
 - 1) Cervical (2,6%), umumnya tumbuh ke arah vagina menyebabkan infeksi.
 - 2) Isthmica (7,2%), lebih sering menyebabkan nyeri dan gangguan traktus urinarius.
 - 3) Corporal (91%), merupakan lokasi paling lazim, dan seringkali tanpa gejala.
- b. Berdasarkan posisi terhadap lapisan – lapisan uterus, mioma uteri dapat dibagi dalam beberapa jenis :
 - 1) Mioma submukosa
Mioma submukosa terletak di bawah endometrium dan menonjol ke dalam rongga uterus. Mioma submukosa dapat tumbuh bertangkai, kemudian dilahirkan melalui serviks uteri.

2) Mioma intramural

Mioma intramural (interstisial) terletak di dalam otot dinding rahim.

3) Mioma subserosa

Mioma subserosa terletak di bawah lapisan serosa permukaan rahim.

4) Mioma intraligamenter

Mioma subserosa yang tumbuh menempel pada jaringan lain, misalnya ke ligamentum atau omentum kemudian membebaskan diri dari uterus sehingga disebut *wondering parasitis fibroid*.

5) Mioma pedunculata

Mioma pedunculata merupakan mioma yang melekat ke dinding uterus dengan tangkai yang bisa masuk ke peritoneal atau cavum uteri.

4. Perubahan Sekunder Mioma Uteri

a. Atropi

Setelah menopause dan rangsangan estrogen hilang

b. Degenerasi hialin

Sering terjadi pada penderita usia lanjut.

(1) Jaringan ikat bertambah.

(2) Berwarna putih dan keras.

(3) Disebut “ mioma durum “

c. Degenerasi kistik :

- (1) Bagian tengah dengan degenerasi hialin mencair .
- (2) Menjadi poket kistik.

d. Degenerasi membantu (*calcerous degeneration*):

- (1) Terdapat timbunan kalsium pada mioma uteri.
- (2) Padat dan keras.
- (3) Berwarna putih

e. *Red* degenerasi (*carneous degeneration*):

- (1) Estrogen merangsang tumbuh kembang mioma.
- (2) Aliran darah tidak seimbang.
 - Edema sekitar tangkai.
 - Tekanan hamil.
- (3) Terjadi kekurangan darah menimbulkan :
 - Nekrosis.
 - Pembentukan thrombus.
 - Bendungan darah dalam mioma.
 - Warna merah : hemosiderin / hemofuksin.

(4) Degenarasi Lemak

Jarang terjadi merupakan kelanjutan degenerasi hialin. Pada kasus-kasus lain mungkin disebabkan karena tumornya merupakan variasi campuran.

(5) Degenerasi Sarcomateus

Jarang terjadi

(6) Infeksi dan Suppurasi

Banyak terjadi pada jenis submukosa oleh karena adanya Ulkerasi. (Manuaba,2001 hal 600)

5. Tanda dan Gejala

1. Faktor yang menimbulkan gejala klinik :

- a. Besarnya mioma uteri
- b. Lokasi mioma uteri
- c. Perubahan pada mioma uteri (Manuaba, 2001)

2. Gejala Klinik

a) Perdarahan Abnormal

- Menoragia
- Menometroragia
- Metroragia

Yang sering menyebabkan perdarahan adalah jenis submukosa sebagai akibat pecahnya pembuluh darah. Perdarahan oleh mioma dapat menimbulkan anemia yang berat.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab perdarahan antara lain :

- a) Pengaruh ovarium sehingga terjadilah hiperplasi Endometrium sampai Adeno Karsinoma Endometrium.
- b) Permukaan Endometrium yang lebih luas dari biasa.
- c) Atrofi Endometrium di atas Mioma Nibmukosur.

d) Miometrium tidak dapat berkontraksi optimal karena adanya sarang mioma di antara serabut miometrium, sehingga tidak dapat menjepit pembuluh darah yang melaluinya dengan baik.

a. Terasa nyeri

Timbul karena gangguan sirkulasi darah pada Sarang mioma yang disertai nekrosis setempat dan peradangan.

- 1) Torsi bertungkal
- 2) Infeksi pada mioma

b. Gejala dan tanda penekanan

Gejala ini tergantung dari besar dan tempat mioma uteri :

- 1) Pada uretra menyebabkan retensio urin.
- 2) Pada pembuluh darah dan limfe di pinggul dapat menyebabkan oedema tungkai dan nyeri panggul.

c. Menimbulkan infertilitas dan Abortus

Infertilitas dapat terjadi apabila sarang mioma menutup atau menekan pars interstitialis submukosum juga memudahkan terjadinya abortus oleh karena distorsi rongga uterus.

d. Gejala-gejala sekunder

- 1) Anemia
- 2) Lemah
- 3) Pusing-pusing

- 4) Sesak nafas
- 5) Fibroid Heat, sejenis degenerasi myocard, yang dulu disangka berhubungan dengan adanya mioma uteri. Sekarang anggapan ini disangkal.
- 6) Erytbaru Cytosis pada mioma yang besar.

(<http://ayurai.wordpress.com/2009/03/30/askeb-myoma-uteri/>, diakses tgl 28 April 2010)

6. Mioma uteri dan Kehamilan

Insidens mioma yang mempersulit kehamilan adalah 1 dalam 200, tetapi kebanyakan mioma tersebut kecil dan tidak menimbulkan masalah. Komplikasi yang terjadi tergantung pada jumlah, ukuran dan posisi mioma di dalam uterus. (Liewellyn – Jones, Derek, 2001 hal 265)

Kehamilan dengan disertai mioma uteri menimbulkan proses saling mempengaruhi :

- 1) Kehamilan dapat mengalami keguguran.
- 2) Persalinan prematuritas.
- 3) Gangguan proses persalinan.
- 4) Tertutupnya saluran indung telur menimbulkan infertilitas.
- 5) Pada kala III dapat terjadi gangguan pelepasan plasenta dan perdarahan.
- 6) Biasanya mioma akan mengalami involusi yang nyata setelah kelahiran.

(<http://www.emir-fakhrudin.com>, diakses tgl 31-04-2010)

Secara spesifik, selama trimester pertama, mioma dari segala ukuran tidak mengalami perubahan atau membesar (respons awal terhadap peningkatan estrogen). Selama trimester kedua, mioma kecil (2 sampai 6 cm) biasanya tetap tidak berubah atau membesar, sedangkan mioma yang lebih besar mengecil (dimulainya pengurangan reseptor estrogen). Berapapun ukuran awal mioma, selama trimester ketiga ukuran mioma biasanya tidak berubah atau malah mengecil (reseptor estrogen sudah berkurang). Hal penting dari pengamatan ini adalah bahwa pertumbuhan mioma tidak dapat diprediksi dengan akurat.(Cunningham, Gary dkk, 2005 hal 1031).

7. Komplikasi

a. Degenerasi ganas

Leiomioma sarkoma 0.32 – 0.6% dan seluruh mioma merupakan 50 – 57% dari semua sarkoma uterus. Keganasan umumnya baru ditemukan pada pemeriksaan histologik uterus yang telah diangkat.

b. Torsi tangkai mioma dari :

1) Subseroma mioma uteri.

2) Submukosa mioma uteri.

c. Nekrosis dan infeksi

Setelah torsi dapat diikuti infeksi dan nekrosis.

d. Pengaruh timbal balik mioma dan kehamilan.

1) Pengaruh mioma terhadap kehamilan.

- (a) Menimbulkan infertility.
 - (b) Meningkatkan kemungkinan abortus.
 - (c) Saat kehamilan :
 - Persalinan prematuritas.
 - Kelainan letak.
 - (d) Inpartu :
 - Inersia uteri.
 - Gangguan jalan persalinan.
 - (e) Pascapartum :
 - Perdarahan post partum.
 - Retensio plasenta.
 - *Red generation*.
- 2) Pengaruh kehamilan terhadap mioma uteri.
- (a) Mioma uteri cepat membesar karena rangsangan estrogen.
 - (b) Terjadi *red degeneration* mioma uteri.
 - (c) Kemungkinan torsi mioma uteri bertangkai.
 - (d) Tumor solid ovarium.
 - (e) Uterus gravid.
 - (f) Kelainan bawaan rahim.
 - (g) Endometriosis, adenomiosis.
 - (h) Perdarahan uterus disfungsional. (Manuaba,2005 hal 601)

8. Diagnosis

a. Dasar diagnosis

1. Pemeriksaan fisik

Mioma uteri mudah ditemukan melalui pemeriksaan bimanual rutin uterus. Diagnosis mioma uteri menjadi jelas bila dijumpai gangguan kontur uterus oleh satu atau lebih massa yang lebih licin, tetapi sering sulit untuk memastikan bahwa massa seperti ini adalah bagian dari uterus.

2. Temuan laboratorium

Anemia merupakan akibat paling sering dari mioma. Hal ini disebabkan perdarahan uterus yang banyak dan habisnya cadangan zat besi. Kadang-kadang mioma menghasilkan eritropoetin yang pada beberapa kasus menyebabkan polisitemia. Adanya hubungan antara polisitemia dengan penyakit ginjal diduga akibat penekanan mioma terhadap ureter yang menyebabkan peninggian tekanan balik ureter dan kemudian menginduksi pembentukan eritropoetin ginjal.

3. Pemeriksaan penunjang

a. Ultrasonografi

Ultrasonografi transabdominal dan transvaginal bermanfaat dalam menetapkan adanya mioma uteri. Ultrasonografi transvaginal terutama bermanfaat pada uterus yang kecil. Uterus atau massa yang paling besar baik diobservasi melalui

ultrasonografi transabdominal. Mioma uteri secara khas menghasilkan gambaran ultrasonografi yang mendemonstrasikan irregularitas kontur maupun pembesaran uterus. Adanya klasifikasi ditandai oleh fokus-fokus hiperekoik dengan bayangan akustik. Degenerasi kistik ditandai adanya daerah yang hipoekoik.

b. Histeroskopi

Dengan pemeriksaan ini dapat dilihat adanya mioma uteri submukosa, jika tumornya kecil serta bertangkai. Tumor tersebut sekaligus dapat diangkat.

c. MRI (Magnetic Resonance Imaging)

Sangat akurat dalam menggambarkan jumlah, ukuran, dan lokasi mioma tetapi jarang diperlukan. Pada MRI, mioma tampak sebagai massa gelap berbatas tegas dan dapat dibedakan dari miometrium normal. MRI dapat mendeteksi lesi sekecil 3 mm yang dapat dilokalisasi dengan jelas, termasuk mioma.

4. Pemeriksaan penunjang

a. Pemeriksaan Darah Lengkap : Adalah untuk Menentukan tingkat keganasan dari sel-sel neoplasma tersebut.

Hb : 12-15 gr%

Albumin : 2,3

Leukosit : 4-11.000/mmk

Eritrosit : 3,9-5,6.000.000/mmk

Hematrokit : 45 %

Trombosit : 161.000cmm

b. Pemeriksaan radiolog

- 1) Rontgen :Untuk mengetahui kelainan yang mungkin ada yang dapat menghambat tindakan operasi.
- 2) USG : Terlihat massa pada daerah uterus
- 3) ECG : Mendeteksi kelainan yang mungkin terjadi, yang dapat mempengaruhi tindakan operasi.
- 4) Kuretase :Sering disertai hiperplasi endometrium dan untuk menyingkirkan kanker endometrium.
5. Vaginal Toucher : Didapatkan perdarahan pervaginam, teraba massa, konsistensi dan ukurannya serta serviks ikut bergerak bila massa tersebut digerakan.
6. BNO-IVP : Pada mioma uteri yang besar atau dengan perlekatan (dapat merubah topegrafiureter).

9. Penatalaksanaan Medik

Penanganan mioma uteri tergantung pada umur, paritas, lokasi, dan ukuran tumor, dan terbagi atas :

(<http://www.emir-fakhrudin.com/2010/02/mioma-uteri.html>,tgl 31 April 2010).

a. Penanganan konservatif, bila :

- 1) mioma yang kecil pada pra dan post menopause tanpa gejala.
- 2) Cara penanganan konservatif sebagai berikut :

- (a) Observasi dengan pemeriksaan pelvis secara periodik setiap 3-6 bulan.
- (b) Bila anemia, Hb < 8 g% transfusi PRC(Packed Red Cell)
- (c) Pemberian zat besi.
- (d) Pengobatan Medikamentosa dengan GnRH

b. Penanganan Operatif

1) Indikasi penanganan Operatif ,bila:

- (a) Ukuran tumor lebih besar dari ukuran uterus 12-14 minggu.
- (b) Pertumbuhan tumor cepat.
- (c) Mioma subserosa bertangkai dan torsi.
- (d) Bila dapat menjadi penyulit pada kehamilan berikutnya
- (e) Hipermenorea pada mioma submukosa.
- (f) Penekanan pada organ sekitarnya.

2) Jenis Operasi yang dilakukan berupa :

(a) Enukleasi Mioma (Miomektomi)

Dilakukan pada penderita infertil atau yang masih menginginkan anak atau mempertahankan uterus demi kelangsungan fertilitas. Sejauh ini tampaknya aman, efektif, dan masih menjadi pilihan terbaik. Enukleasi sebaiknya tidak dilakukan bila ada kemungkinan terjadinya karsinoma endometrium atau sarkoma uterus, juga dihindari pada masa kehamilan. Tindakan ini seharusnya dibatasi pada tumor dengan tangkai dan jelas yang dengan mudah dapat dijepit dan

diikat. Bila miomektomi menyebabkan cacat yang menembus atau sangat berdekatan dengan endometrium, kehamilan berikutnya harus dilahirkan dengan seksio sesarea. Kriteria preoperasi menurut American College of Obstetricians Gynecologists (ACOG) adalah sebagai berikut :

- Kegagalan untuk hamil atau keguguran berulang.
- Terdapat leiomioma dalam ukuran yang kecil dan terbatas tegas.
- Apabila tidak ditemukan alasan yang jelas penyebab kegagalan kehamilan dan keguguran yang berulang.

(b) Histerektomi

Histerektomi total merupakan terapi pilihan pada wanita tua, wanita yang tidak menginginkan kehamilan lagi dan yang mengalami menoragia atau gejala penekanan yang nyata. (Liewellyn-jones, Derek, 2001 hal 265).

Dilakukan bila pasien tidak menginginkan anak lagi, dan pada penderita yang memiliki leiomioma yang simptomatik atau yang sudah bergejala.


Kriteria ACOG untuk histerektomi adalah sebagai berikut:

1. Terdapatnya 1 sampai 3 leiomioma asimtomatik atau yang dapat teraba dari luar dan dikeluarkan oleh pasien.
2. Perdarahan uterus berlebihan :

- a. Perdarahan yang banyak bergumpal-gumpal atau berulang-ulang selama lebih dari 8 hari.
- b. Anemia akibat kehilangan darah akut atau kronis.
3. Rasa tidak nyaman di pelvis akibat mioma meliputi
 - a. Nyeri hebat dan akut.
 - b. Rasa tertekan punggung bawah atau perut bagian bawah yang kronis.
4. Penekanan buli-buli dan frekuensi urine yang berulang-ulang dan tidak disebabkan infeksi saluran kemih. (<http://www.emirfakhrudin.com/2010/02/mioma-uteri.html>, tgl 31-04-2010).

c. Radioterapi

- 1) Hanya dilakukan pada pasien yang tidak dapat dioperasi (bad risk patient).
- 2) Uterus harus lebih kecil dari usia kehamilan 12 minggu.
- 3) Bukan jenis submukosa.
- 4) Tidak disertai radang pelvis atau penekanan pada rektum.
- 5) Tidak dilakukan pada wanita muda, sebab dapat menyebabkan menopause.
- 6) Maksud dari radioterapi adalah untuk menghentikan perdarahan. (<http://www.emirfakhrudin.com/2010/02/mioma-uteri.html>, tgl 31-04-2010)



Bagan 2.1. Tatalaksana Mioma Uteri

B. Tinjauan Umum Tentang Mioma Uteri

1. Pengertian Histerektomi

- a. Histerektomi adalah tindakan operatif yang dilakukan untuk mengangkat rahim, baik sebagian (subtotal) tanpa serviks uteri ataupun seluruhnya (total) berikut serviks uteri. (Prawirohardjo,Sarwono, 2006, hal 558).
- b. Histerektomi adalah operasi pengangkatan kandungan (rahim, uterus) seorang wanita. Dengan demikian, setelah menjalani histerektomi seorang wanita tidak mungkin lagi untuk hamil dan mempunyai anak. (<http://majalahkesehatan.com/sekilas-tentang-histerektomi/>, diakses tgl 21-04-2010)
- c. Histerektomi merupakan sebuah operasi pengangkatan kandungan (rahim,uterus) seorang wanita.(E.Sukaca,Bertiarni, 2009, hal 145).

Beberapa tingkatan histerektomi adalah sebagai berikut :

- a. Histerektomi total (lengkap)
Histerektomi total (lengkap) adalah mengangkat semua organ secara total. Pada tipe ini, uterus diangkat bersama mulut rahim.
- b. Histerektomi subtotal (parsial)
Histerektomi parsial hanya mengangkat bagian atas uterus yang diangkat sedangkan mulut rahim dibiarkan di tempatnya.
- c. Histerektomi radikal
Histerektomi radikal adalah mengangkat uterus, mulut rahim,bagian atas vagina, dan jaringan penyangga yang ada di sekitarnya.

d. Histerektomi dan salpingo-ooforektomi bilateral


Histerektomi dan salpingo-ooforektomi bilateral yaitu pengangkatan uterus, mulut rahim, kedua tuba fallopi, dan kedua ovarium. (E.Sukaca,Bertiarni, 2009, hal 146)

2. Penyebab Histerektomi

Histerektomi biasanya dilakukan karena berbagai alasan. Penyebab yang paling sering dilakukan histerektomi adalah adanya kanker mulut rahim atau kanker rahim. Beberapa penyebab lain adalah :

- 1) Fibroid, yaitu tumor jinak rahim, terutama jika tumor ini menyebabkan perdarahan berkepanjangan, nyeri panggul, anemia, atau penekanan pada kandung kencing.
- 2) Endometriosis, dimana dinding rahim bagian dalam seharusnya tumbuh di rahim saja, tetapi ikut tumbuh di indung telur (ovarium), tuba fallopi, atau organ perut dan rongga panggul lainnya.
- 3) Prolapsus uteri, yaitu keluarnya kandungan melalui vagina.

3. Prosedur Histerektomi



Gambar 2.2. Prosedur Histerektomi

Cara operasi histerektomi juga terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1) Histerektomi Abdominal

Histerektomi abdominal adalah cara operasi pengangkatan kandungan dilakukan melalui irisan pada perut, baik irisan vertikal maupun horizontal (pfanenstiel).

Keuntungan teknik ini :

- Dokter yang melakukan operasi dapat melihat dengan leluasa uterus.
- Dapat melihat jaringan sekitarnya.
- Memiliki cukup ruang untuk melakukan pengangkatan uterus.

Kekurangan teknik ini adalah :

- Biasanya menimbulkan rasa nyeri yang lebih berat
- Menyebabkan masa pemulihan yang lebih panjang
- Menimbulkan jaringan parut yang lebih banyak

2) Histerektomi Vaginal

Histerektomi vaginal adalah operasi melalui irisan kecil pada bagian atas vagina. Dengan melalui irisan tersebut, uterus dan mulut rahim dipisahkan dari jaringan dan pembuluh darah di sekitarnya kemudian dikeluarkan melalui vagina.

Kelebihan tindakan ini adalah :

- Kesembuhan lebih cepat
- Sedikit nyeri
- Tidak ada jaringan parut yang tampak.

3) Histerektomi Laparoskop

Histerektomi laparoskop ada dua macam yaitu

1. LAVH

LAVH adalah histerektomi vagina yang dibantu laparoskop. Singkatan dari LAVH adalah Laparoscopically Assited Vagina hysterectomy. LAVH mirip dengan histerektomi vaginal. Namun hanya dibantu oleh Laparoskop yang dimasukkan melalui irisan kecil di perut. Ini bertujuan untuk melihat uterus dan jaringan sekitarnya untuk membedakan uterus dari jaringan sekitarnya.

2.LSH

LSH adalah Histerektomi Supraservikal Laparoskop atau Laparoscopic Supraservikal Hysterektomy. LSH tidak menggunakan irisan pada bagian atas vagina, tetapi hanya irisan pada perut.

Kedua teknik ini hanya menimbulkan sedikit nyeri, pemulihan yang lebih cepat, serta sedikit jaringan parut. Setelah histerektomi, siklus haid atau menstruasi akan berhenti dan wanita tidak dapat hamil lagi. Jika pada histerektomi juga dilakukan pengangkatan ovarium (indung telur), maka dapat timbul menopause dini.

4. Perawatan post operasi

a. Perawatan luka insisi / pasca operasi

Beberapa prinsip yang perlu di implementasikan antara lain:

- 1) Balutan dari kamar operasi dapat dibuka pada hari pertama pasca operasi.
- 2) Klien harus mandi shower bila memungkinkan.
- 3) Luka harus dikaji setelah operasi dan kemudian setiap hari selama pasca operasi sampai ibu diperbolehkan pulang.
- 4) Luka mengeluarkan aksudat cair atau tembus ke pakaian, pembalut luka harus diulang sebab bila tidak kemungkinan luka terbuka.
- 5) Bila luka perlu dibalut ulang, balutan yang digunakan harus sesuai dan tidak lengket.

b. Pemberian cairan

Karena selama 24 jam pertama penderita puasa operasi (PPO), maka pemberian cairan perinfus harus cukup banyak dan mengandung elektrolit yang diperlukan oleh tubuh agar tidak terjadi hipertemia, dehidrasi, dan komplikasi pada organ-organ lain.

Cairan yang diperlukan biasanya dekstrose 5-10 %, garam fisiologis, dan ringer laktat (RL) secara bergantian. Jumlah tetesan tergantung pada keadaan dan kebutuhan, biasanya kira-kira 20 tetes permenit. Bila kadar hemoglobin dalam darah rendah, berikan transfusi darah atau packed-cell sesuai dengan kebutuhan.

c. Diet

Pemberian cairan perinfus biasanya dihentikan setelah penderita platus, kemudian dimulailah pemberian minuman dan makanan peroral. Sebenarnya pemberian sedikit minuman sudah boleh diberikan pada 6 – 10 jam pasca operasi berupa air putih atau air teh yang jumlahnya dapat dinaikkan pada hari pertama dan kedua pasca operasi.

Setelah cairan infus dihentikan berikan makanan bubur saring (MI), minuman air, buah dan susu. Selanjutnya secara bertahap diperbolehkan makan bubur (MI) dan akhirnya makanan biasa (MB). Sejak boleh minum pada hari pertama, obat-obatan sudah boleh diberikan.

Pemberian makanan rutin tersebut di atas akan berubah bila dijumpai komplikasi pada saluran pencernaan seperti adanya kembung pada perut dan peristaltik usus yang kurang sempurna.

d. Nyeri

Sejak penderita sadar, dalam 24 jam pertama rasa nyeri tersebut dapat diberikan obat-obat anti sakit dan penenang seperti suntikan intramuskular (IM) pethidin dengan dosis 100 – 150 mg atau morphin sebanyak 10 – 15 mg secara perinfus atau dengan obat-obatan di atas penderita yang kurang tenang atau gelisah akan merasa lebih tenang.

e. Mobilisasi

Mobilisasi segera tahap demi tahap sangat berguna untuk penyembuhan penderita. Kemajuan mobilisasi tergantung pada jenis operasi yang dilakukan dan komplikasi yang mungkin di jumpai. Secara psikologis hal ini memberikan pula kepercayaan pada klien bahwa mulai sembuh. Perubahan gerak dan posisi ini harus diterangkan pada penderita atau keluarga yang menunggunya.

Miring ke kanan dan miring ke kiri sudah dapat dimulai 6-10 jam setelah penderita sadar. Latihan pernapasan dapat dilakukan penderita sambil tidur terlentang sedini mungkin setelah sadar. Pada hari kedua penderita dapat didudukkan selama 5 menit untuk bernapas dalam-dalam lalu untuk melonggarkan pernapasan sekaligus menumbuhkan kepercayaan pada penderita bahwa iya mulai pulih. Kemudian posisi tidur terlentang dirubah menjadi posisi setengah duduk (semi fowler).

Selanjutnya secara berturut-turut demi hari penderita dianjurkan belajar duduk selama sehari, belajar berjalan sendiri kemudian berjalan sendiri pada hari ke 3-5 pasca operasi.

Mobilisasi berguna untuk mencegah terjadinya trombositis dan emboli. Sebaiknya bila terlalu dini melakukan mobilisasi secara teratur dan bertahap diikuti dengan istirahat adalah yang paling dianjurkan.

f. Kateterisasi

Kandungan kemih yang penuh dapat menimbulkan rasa nyeri dan rasa nyaman pada penderita serta dapat menyebabkan perdarahan. Karena itu dianjurkan juga pemasangan kateter tetap (balon Kateter) yang terasang selama 24-48 jam atau lebih lama lagi, tergantung jenis operasi dan keadaan penderita. Dengan cara urin dapat ditampung dan diukur dalam kantong plastik secara periodik. bila tidak dipasang kateter yang tetap. Di anjurkan kateterisasi rutin kira-kira 12 Jam pasca operasi kecuali bila penderita dapat bekemih sendiri sebanyak 100cc.

g. Pemberian obat-obatan

a. Antibiotic, kemoterapi dan antiplamasi.

Cara pemilihan dan pemberian antibiotic sangat berbeda-beda di setiap institusi, masing-masing mempunyai cara dan pemilihan obat yang berlainan.

b. Obat – obatan pencegah kembung

Untuk mencegah perut kembung dan untuk memperlancar kerja saluran pencernaan dapat diberikan obat – obatan secara suntikan dan peroral.

h. Perawatan rutin

Hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan dan pengukuran adalah :

- 1) Tanda-tanda vital meliputi : tekanan darah (TD), jumlah nadi permenit (N) , frekuensi pernapasan permenit (P) ,dan suhu badan (S).
- 2) Jumlah cairan yang masuk dan keluar (urine).
- 3) Pemeriksaan lainnya menurut operasi dan kasus.

i. Konsultasi

Pada keadaan dan kasus tertentu,selain kerja sama dengan unit unit anastesi, kadang kala diperlukan konsultasi dengan disiplin lainnya.

C. Tinjauan Islam Tentang Post Operasi Mioma Uteri

Penyakit Tumor / Kanker Rahim sering menyerang kaum Wanita tanpa terdeteksi pada stadium awal, biasanya penyakit ini menyerang pada leher rahim, saluran rahim, di rahim dan bisa juga diluar rahim / kandungan. Penyakit baru dirasakan setelah terbentuk benjolan yang relatif besar yaitu 2-3 cm dan terasa mengganjal, dan teraba oleh tangan.

Kanker / tumor dapat timbul di semua tubuh manusia seperti payudara, leher rahim, kandungan, hati, lambung, usus besar, pankreas, paru-paru, prostat dan lain-lain. umunya penderita kanker yang datang memeriksakan diri ke dokter sudah dalam stadium lanjut, sehingga pengobatannya menjadi sangat sulit, apalagi bila sudah menyebar (metastase).

http://www.pengobatan.com/pengobatan/info/tumor_kanker_rahim.htm,

[diakses](#) tanggal 01 Juli 2010)

Akan tetapi, Allah SWT tidak akan menurunkan suatu penyakit melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Hadis Riwayat Muslim yang berbunyi “ Setiap Penyakit itu pasti ada obatnya, jika tepat obatnya maka Penyakit akan Sembuh dengan izin Allah ‘Azza wa jalla”.

Dari uraian hadis di atas, jelas bahwa setiap penyakit dalam bentuk apapun pasti ada obatnya asalkan kita sebagai umat muslim selalu berusaha dan berdo’a kepada Allah SWT agar diberi petunjuk dan kemudahan melalui al-Qur’an dan Hadist untuk mencapai kesembuhan terhadap penyakit yang ada dalam diri kita seperti Do’a Nabi Ayyub dalam Q.S.Al Anbiyaa’(21) ayat 83 sebagai berikut :

الرَّحِيمِ أَرْحَمُ وَأَنْتَ الْضَّرُّ مَسْنِيَ أَنِّي رَبَّهُ نَادَى إِذْ وَآيُوبَ

Terjemahnya :

Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), Sesungguhnya Aku Telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang".

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S.Al Israa’(17) ayat 82 sebagai berikut :

حَسَارًا إِلَّا الظَّالِمِينَ يَزِيدُ وَلَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً شِفَاءً هُوَ مَا الْقُرْآنِ مِنْ وَنُزِّلُ



Terjemahnya :

Dan kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.

Q.S.Yunus (10) Ayat 57

مَّةٌ وَهَدَى الصُّدُورِ فِي لِمَا وَشِفَاءً رَبِّكُمْ مِّن مَّوْعِظَةٍ جَاءَتْكُمْ قَدْ أَلْنَسُ يَتَأَيُّهَا
لِّلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً

Terjemahnya :

Hai manusia, Sesungguhnya Telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Kedua ayat tersebut menjelaskan manfaat al-Qur'an sebagai obat terhadap suatu penyakit yang diturunkan oleh Allah SWT baik itu penyakit hati seperti ragu, dengki, takabur dan semacamnya dan penyakit jasmani seperti kanker, tumor, dan sebagainya serta rahmat bagi orang – orang yang beriman.

Jika kedua ayat tersebut dipahami demikian, ayat ini seakan-akan menyatakan : “ *Dan* bagaimana kebenaran itu tidak akan menjadi kuat dan batil tidak akan lenyap, sedangkan *Kami telah menurunkan al-Qur'an sebagai* obat *penawar* keraguan dan penyakit-penyakit yang ada dalam dada dan al-Qur'an juga adalah *rahmat bagi orang-orang yang beriman dan ia*, yakni al-Qur'an itu, *tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian* disebabkan oleh kekufuran mereka.” (Shihab, M.Quraish, 2002, hal 173)

Ayat ini membatasi rahmat al-Qur'an untuk orang-orang mukmin karena merekalah yang paling berhak menerimanya sekaligus paling banyak memperolehnya. Tapi ini bukan berarti selain mereka tidak memperoleh walau secercah, dari rahmat akibat kehadiran al-Qur'an. Perolehan dari yang sekedar beriman tanpa kemantapan, jelas lebih sedikit dari perolehan orang mukmin, dan perolehan orang kafir atas kehadirannya lebih sedikit lagi dibanding orang-orang yang sekedar beriman. Ayat di atas menjelaskan empat fungsi al-Qur'an : pengajaran, obat, petunjuk, serta rahmat. (Shihab, M.Quraish, 2002, hal 104)

D. Proses Manajemen Asuhan Kebidanan

a. Pengertian manajemen asuhan kebidanan.

Manajemen asuhan kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisasikan pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, penemuan-penemuan, keputusan yang berfokus pada klien.

b. Langkah – langkah manajemen asuhan kebidanan.

Menurut VARNEY proses manajemen asuhan kebidanan terdiri dari 7 langkah yaitu :

a) Langkah I : Pengumpulan Data Dasar.

Pada langkah pertama ini dilakukan pengkajian dengan pengumpulan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap yaitu riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, meninjau catatan terbaru yang sebelumnya, serta meninjau data

laboratorium, mengumpulkan semua informasi yang akurat dari sumber yang berkaitan dengan kondisi klien.

b) Langkah II : Merumuskan Diagnosa / Masalah Aktual

Pada langkah pada langkah ini dilakukan identifikasi yang benar terhadap diagnosa atau masalah kebutuhan klien yang berdasarkan intervensi yang benar atas data-data yang telah dikumpulkan dan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik.

c) Langkah III: Mengidentifikasi Diagnosa / Masalah Potensial

Mengidentifikasi masalah atau diagnosa lain berdasarkan rangkaian masalah atau diagnosa yang sudah diidentifikasi. Pada langkah ini penting sekali melakukan asuhan yang aman

d) Langkah IV: Identifikasi Kebutuhan Yang Memerlukan Penanganan

Segera.

Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter untuk mengkonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai dengan kondisi klien.

e) Langkah V : merencanakan asuhan yang menyeluruh

Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh, ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan kelanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang diidentifikasi atau diantisipasi. Pada langkah ini informasi /data yang tidak lengkap dapat dilengkapi. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak

hanya meliputi apa yang sudah diidentifikasi dari kondisi klien atau dari setiap masalah yang berkaitan tetapi juga dari kerangka pedoman antisipasi terhadap wanita tersebut seperti apa yang diperkirakan akan terjadi berikutnya. Dengan perkataan lain asuhan terhadap wanita tersebut sudah mencakup setiap hal yang berkaitan dengan semua aspek asuhan, setiap rencana asuhan harus disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu oleh bidan dan klien merupakan bagian dari pelaksanaan rencana tersebut.

f) Langkah VI : Melaksanakan Perencanaan

Melaksanakan rencana asuhan menyeluruh secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan seluruhnya oleh bidan atau sebagian klien atau anggota tim kesehatan lainnya. Dalam situasi dimana bidan berkolaborasi dengan dokter, untuk menangani klien yang mengalami komplikasi, maka keterlibatan bidan dalam manajemen asuhan bagi klien adalah bertanggung jawab atas terlaksananya rencana asuhan bersama yang menyeluruh tersebut. Manajemen yang efisien akan meningkatkan waktu dan biaya serta meningkatkan mutu dari asuhan klien.

g) Langkah VII : Evaluasi

Pada langkah ketujuh ini dilakukan evaluasi keefektifan dari asuhan yang sudah diberikan meliputi pemenuhan kebutuhan akan bantuan apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan

sebagaimana telah diidentifikasi didalam masalah dan diagnosa.

Rencana tersebut dapat dianggap efektif pelaksanaannya.

Pengawasan dan koordinasi yang baik dari tim yang dibentuk dengan pembagian dalam unit-unit pelayanan kebidanan yang tepat akan menciptakan kerja sama antar tim yang solid, sehingga pelayanan yang diberikan dapat dikoordinir dengan baik dan benar serta berkesinambungan.

E. Pendokumentasian Asuhan Kebidanan (SOAP)

Pendokumentasian harus dapat mengkomunikasikan kepada orang lain mengenai asuhan yang telah ada yang dilakukan kepada seseorang, yang di dalamnya tersirat proses berfikir sistematis seorang bidan menghadapi seorang klien sesuai dengan langkah-langkah dalam proses manajemen kebidanan.

1) Subjektif (S)

Menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnese sebagai langkah I Varney.

2) Objektif (O)

Menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, hasil laboratorium dan tes diagnostik lain yang dirumuskan dalam data fokus untuk mendukung asuhan sebagai langkah I, langkah II, III dan IV Varney.

3) Assessment (A)

Menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan interpretasi data subjektif dan objektif suatu identifikasi.

- a. Diagnosa masalah
- b. Antisipasi diagnosa/masalah potensial
- c. Perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter, konsultasi kolaborasi dan atau rujukan sebagai langkah II , III dan IV Varney.

4) Planning (P)

Menggambarkan pendokumentasian dari perencanaan, tindakan implementasi (I) dan evaluasi (E) berdasarkan assement sebagai langkah V, VI dan VII Varney.

BAB III

STUDI KASUS

Dalam studi kasus ini penulis menggunakan proses manajemen asuhan kebidanan yang terdiri dari tujuh langkah Varney yang dimulai dari langkah pertama yaitu identifikasi data dasar sampai dengan langkah ke tujuh yaitu evaluasi dan disertai dengan pendokumentasian asuhan kebidanan. Adapun studi kasus yang akan diuraikan adalah sebagai berikut :

MANAJEMEN ASUHAN KEBIDANAN PADA NY “S” DENGAN POST OPERASI MIOMA UTERI DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR TGL 23 JUNI 2010

No Register : 56745
No.MR : 199783
Tgl.MRS : 17 Juni 2010 jam 13.15 Wita
Tgl.Operasi : 23 Juni 2010 jam 10.40 Wita
Tgl.Pengkajian : 23 Juni 2010 jam 14.00 Wita

A. Langkah I : Identifikasi Data Dasar

1. Identitas Pasien

- a. Nama : Ny “ Salmiah” / Tn.Lukman
- b. Umur : 34 tahun / 38 tahun
- c. Suku : Makassar / Makassar

- d. Nikah /lamanya : 1x / ± 4 tahun
- e. Agama : Islam / Islam
- f. Pendidikan : SMA / SMA
- g. Pekerjaan : IRT / Wiraswasta
- h. Alamat : Jl. Tentara Pelajar Lorong 187/A

2. Riwayat Penyakit Sekarang

- a. Keluhan utama : Nyeri daerah perut akibat luka operasi
- b. Riwayat Keluhan Utama:
 - 1) Nyeri dirasakan setelah operasi sejak tanggal 23 Juni 2010.
 - 2) Nyeri pada daerah perut dirasakan terutama bila melakukan pergerakan.
 - 3) Klien mengeluh merasa haus
 - 4) Klien mengatakan lemah
 - 5) Klien mengeluh merasa pusing
 - 6) Klien mengatakan cemas

3. Riwayat Penyakit yang Lalu

- a. Ibu tidak pernah menderita penyakit hipertensi, jantung, DM, hepatitis maupun penyakit menular lainnya.
- b. Ibu tidak pernah ada riwayat operasi sebelumnya
- c. Tidak ada riwayat ketergantungan obat-obatan dan alkohol
- d. Tidak ada riwayat alergi

4. Riwayat Keluarga

Tidak ada riwayat penyakit menular dan penyakit turunan dalam keluarga.

5. Riwayat Reproduksi

a. Riwayat haid

- 1) Menarche : Umur 15 tahun
- 2) Siklus Haid : 28 – 30 hari
- 3) Lamanya : 7 hari
- 4) Dismenorrhoe : ada, setiap hari pertama sampai hari kedua haid.

b. Riwayat Obstetri

- 1) G 0 P 0 A 0
- 2) Menikah umur 30 tahun

c. Riwayat Gynekologi.

- 1) Ibu tidak pernah mengalami tumor kandungan atau tumor payudara sebelumnya.
- 2) Ibu tidak pernah mengalami infeksi organ reproduksi.
- 3) Ibu tidak pernah menderita penyakit kelamin.

d. Riwayat KB

Ibu tidak pernah menjadi akseptor KB.

6. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

a. Kebutuhan Nutrisi

Kebiasaan :

- 1) Menu makanan nasi dan lauk pauk
- 2) Frekuensi 3 x sehari

- 3) Nafsu makan baik
- 4) Kebutuhan minum \pm 6 – 7 gelas perhari

Setelah operasi :

- 1) Menu makanan nasi dan lauk pauk
- 2) Frekuensi 3 x sehari
- 3) Nafsu makan kurang baik
- 4) Kebutuhan minum \pm 6 – 7 gelas perhari

b. Kebutuhan Eliminasi

Kebiasaan :

- 1) Frekuensi BAK 4 – 5 kali perhari
- 2) Warna kuning jernih
- 3) Bau amoniak
- 4) Frekuensi BAB 1 kali sehari
- 5) Konsistensi padat

Setelah operasi : Kateter masih terpasang setelah operasi dan setelah keluar dari ruangan operasi

c. Personal Hygiene

Kebiasaan :

- 1) Mandi 2 x sehari dengan menggunakan sabun mandi.
- 2) Sikat gigi 2x sehari.
- 3) Keramas 3 x seminggu.
- 4) Mengganti pakaian tiap habis mandi.

Setelah operasi : Klien tidak dapat mandi sendiri

d. Kebutuhan Istirahat / Tidur

Kebiasaan :

1) Tidur siang jam 13.00 – 15.00 WITA

2) Tidur malam jam 22.00 – 05.00 WITA

Setelah operasi : Klien dapat tidur apabila tidak nyeri pada luka bekas operasi.

7. Data psikologis dan Spritual

- a. Klien menerima keadaannya dan setelah operasi ini klien berharap agar cepat sembuh
- b. Pola interaksi dalam keluarga baik
- c. Ibu selalu berdoa untuk kesembuhannya.

8. Pemeriksaan Fisik

- a. KU ibu baik
- b. Kesadaran komposmentis
- c. TTV:

TD : 120/80 mmHg

N : 84 x/i

P : 26 x/i

S : 36,7°C

d. Kepala

Inspeksi : Nampak bersih, rambut hitam dan ikal, rambut tidak rontok.

e. Wajah

Inspeksi : tidak tampak oedem, ekspresi wajah meringis terutama jika bergerak.

f. Mata

Inspeksi : konjungtiva pucat dan sklera tidak ikterus (putih)

g. Hidung

Inspeksi : simetris kiri dan kanan

Palpasi : sekret tidak ada

h. Mulut dan gigi

Inspeksi : tampak bersih, tidak ada caries dan sariawan

i. Leher

Palpasi : tidak ada pembesaran pada kelenjar tyroid dan vena jugularis.

j. Payudara

Inspeksi : simetris kiri dan kanan

Palpasi : tidak ada nyeri tekan dan puting susu terbentuk

k. Abdomen

Inspeksi : tampak luka bekas operasi yang tertutup dengan kasa steril.

l. Genitalia

Inspeksi : - tampak bersih dan personal hygiene bersih

- Terpasang kateter tetap

m. Ekstremitas

1) Atas

Inspeksi : tampak terpasang infus dextrose 5 % di lengan kanan.

2) Bawah

Inspeksi : tidak ada oedema dan varices.

9. Pemeriksaan Penunjang

a. Pemeriksaan laboratorium Pre Operasi

1) Pemeriksaan darah rutin tanggal 18 Juni 2010

Leucocyte : 5600 / mm³

Erythrocyte : 4,55 jt / mm³

Haemoglobin : 7,2 gr/dL

Haematokrit : 29,7 %

Trombosit : 365.000 / mm³

Pembekuan (CT) : 5' – 30"

Perdarahan (BT) : 2'-0

CTDS : 87 mg/dL

2) Pemeriksaan Haemoglobin (Hb) tanggal 22 Juni 2010

HB = 10,4 gr %

b. Pemeriksaan laboratorium post operasi tanggal 24 juni 2010

HB = 9,2 gr %

c. Pemeriksaan Penunjang

USG (tgl 21 Juni 2010) Terlihat massa pada daerah uterus

10. Pengobatan:

a. Ringer Laktat (RL) : Dextrose(Ds) : 2:1/28 tetes/menit

b. Injeksi : Cefotaxime 1 gr / 12 jam / IV

Drips Metronidazole 0,5 gr / 8 jam / IV

Ketorolac 1 amp / 8 jam / IV

Ranitidine 1 amp / 8 jam / IV

Transamin 1 amp / 8 jam / IV

11. Laporan Operasi

b. Operasi dilakukan pada tanggal 23 Juni 2010 jam 10.40 – 11.40 Wita

c. Jenis anastesi : Spinal Epidural

d. Diagnosa pra operasi : Mioma Uteri

e. Diagnosa post operasi : Mioma Uteri Submukosa

f. Tindakan : Myomektomi

B. Langkah II : Identifikasi Diagnosa / Masalah Aktual

1. Diagnosa

Dua Jam Pasca Operasi Mioma Uteri

a. Data Subjektif

Klien mengatakan dioperasi tanggal 23 Juni 2010 jam 10.40- 11.40 wita

b. Data Objektif

1) Pada status klien, klien di operasi tanggal 23 Juni 2010 jam 10.40-

11.40 wita

2) Pengkajian dilakukan tanggal 23 Juni 2010 jam 14.00 wita

3) Ibu di operasi karena adanya massa pada uterus

4)Tampak luka operasi tertutup dengan kasa steril pada abdomen..

c. Analisa dan Interpretasi Data:

Dari jam operasi sampai dengan pengkajian, ibu masih dalam keadaan pasca operasi dan memerlukan perawatan, pengawasan karena kondisi ibu belum baik.

2. Masalah Aktual

a. Nyeri pada luka bekas operasi

1) Data Subjektif

(a) Ibu mengatakan nyeri pada luka bekas operasi

(b) Ibu mengatakan sakitnya hilang timbul

2) Data Objektif

(a) Ekspresi wajah ibu tampak meringis terutama jika bergerak

(b) Tampak luka operasi tertutup kasa steril pada abdomen

(c) Tingkat nyeri sedang

3) Analisa dan Interpretasi Data

Terputusnya kontinuitas jaringan akan melepaskan hormon vasilator yang merangsang saraf perifer ke hipotalamus sehingga terjadi feedback ke dalam tubuh melalui efferent yang menimbulkan suatu rangsangan yang dipersepsikan sebagai nyeri.

b. Kecemasan

1) Data Subjektif

(a) Klien mengatakan merasa cemas dengan keadaan yang dialaminya.

(b) Klien sering menanyakan tentang keadaannya.

2) Data Obektif

Ekspresi wajah tampak murung dan meringis bila ditekan pada daerah perut.

3) Analisa dan Interpretasi Data

Kurangnya pengetahuan tentang keadaannya menyebabkan timbul rasa takut yang merangsang hipotalamus untuk menghasilkan hormon adrenalin serta kurangnya pengetahuan dan informasi dapat mempengaruhi mekanisme coping klien dalam menghadapi kondisinya sehingga cemas dipersepsikan.

C. Langkah III : Antisipasi Diagnosa / Masalah Potensial

1. Masalah Potensial : potensial terjadi infeksi luka bekas operasi

a. Data Subjektif

(1) Ibu mengatakan dioperasi tanggal 23 Juni 2010 jam 10.40-11.40

Wita.

(2) Klien mengatakan nyeri pada daerah operasi

b. Data Objektif

(a) Tampak luka bekas operasi tertutup kain kasa

(b) Tanda – Tanda Vital

TD : 130/70 mmHg

N : 80 x / menit

P : 22 x / menit

S : 36,7°C

c. Analisa dan Interpretasi Data

Adanya luka operasi merupakan pintu masuknya kuman pathogen dan menjadi tempat untuk berkembangnya mikroorganisme sehingga dapat menimbulkan infeksi.

D. Langkah IV : Evaluasi Tindakan Segera / Kolaborasi

Tidak ada data yang mendukung untuk dilakukannya tindakan segera

E. Langkah V : Rencana Tindakan

Diagnosa : 2 jam Post Operasi Mioma Uteri

Tujuan :

- a. Post Operasi berlangsung normal
- b. Nyeri berkurang atau teratasi
- c. Kecemasan teratasi
- d. Tidak terjadi infeksi

Kriteria :

a. Keadaan Umum ibu baik

b. Tanda-tanda Vital normal

TD Sistole = 100 – 130 mmHg

 Diastole = 60 – 90 mmHg

N = 70 – 100 x/ menit

S = 35,5°C – 37,5 °C

P = 20 – 28 x/ menit

- c. Tidak ada keluhan rasa nyeri
- d. Ekspresi wajah ceria
- e. Luka bekas operasi sembuh
- f. Tidak ada tanda-tanda infeksi seperti merah, bengkak, dan panas.

Intervensi tanggal 23 Juni 2010 jam 14.00 wita

1. Observasi Keadaan Umum ibu

Rasional:

Untuk mengetahui KU ibu dan sebagai petunjuk untuk melakukan pengawasan dan perawatan.

2. Observasi Tanda-Tanda Vital.

Rasional:

Untuk mengetahui TTV dalam batas normal dan sebagai penuntun untuk melakukan tindakan selanjutnya.

3. Jelaskan penyebab nyeri

Rasional:

Dengan mengetahui penyebab nyeri, ibu dapat memahami dan mengerti nyeri yang dirasakan.

4. Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup

Rasional :

Istirahat yang cukup memberikan kesempatan otot dan otak untuk relaksasi setelah mengalami proses operasi sehingga pemulihan tenaga serta stamina ibu dapat berlangsung dengan baik.

5. Beri penjelasan tentang personal hygiene yaitu mengganti pembalut minimal 3x sehari dan pakaian bila basah / kotor

Rasional :

Dengan melakukan kebersihan diri dapat memberikan rasa nyaman dan mencegah terjadinya infeksi terutama daerah bekas operasi.

6. Observasi pemberian cairan infus

Rasional :

Pemberian cairan infus mengandung elektrolit yang diperlukan oleh tubuh untuk mencegah terjadinya hipotermia, dehidrasi dan komplikasi pada organ-organ lain.

7. Observasi pengeluaran urin

Rasional :

Kandung kemih yang penuh menimbulkan rasa nyeri dan rasa tidak nyaman pada penderita.

8. Observasi keadaan luka operasi

Rasional :

Untuk mengetahui proses penyembuhan luka operasi berjalan dengan normal atau tidak.

9. Anjurkan ibu untuk mobilisasi dini

Rasional :

Mempercepat proses penyembuhan dan memperlancar peredaran darah klien.

10. Penatalaksanaan pemberian antibiotik, analgetik dan vitamin.

Rasional :

Cefotaxime merupakan golongan antibiotik yang dapat membunuh mikroorganisme penyebab infeksi, asam mefenamat merupakan golongan analgetik yang dapat mengurangi rasa nyeri, metrodinazole dapat mencegah infeksi, membentuk sel-sel tubuh dan pembuluh darah serta membantu regenerasi sel-sel dan jaringan yang rusak, dan transamin untuk mencegah perdarahan.

F. Langkah VI : Implementasi

Tanggal 23 Juni 2010 jam 14.00 wita

1. Mengobservasi Keadaan Umum ibu

Hasil

- a) Ibu masih berbaring di tempat tidur dengan wajah meringis
- b) Kesadaran komposmentis

2. Mengobservasi Tanda – Tanda Vital

Hasil:

TD : 120/80 mmHg

N : 80 x/rmenit

P : 22 x/menit

S : 36,7°C

3. Menjelaskan penyebab nyeri yaitu karena terputusnya kontinuitas jaringan otot, kulit dan serabut akibat dari regangan otot abdomen yang berlebihan saat operasi dengan adanya luka ini maka dapat merangsang ujung-ujung saraf sehingga timbul rasa nyeri.
4. Menganjurkan ibu istirahat yang cukup:
 - a) Tidur siang 1-2 jam
 - b) Tidur malam 7-8 jam
5. Memberi penjelasan tentang personal hygiene yaitu mengganti pembalut minimal 3x sehari dan pakaian bila basah / kotor.
6. Mengobservasi pemberian cairan infus Ringer Laktat : Dextrose 5 % (2:1) dengan 28 tetes permenit.
7. Mengobservasi pengeluaran urine : urine sebanyak 300 ml tertampung di dalam urine bag.
8. Menganjurkan ibu untuk mobilisasi dini yaitu miring kiri dan miring kanan.
9. Penatalaksanaan pemberian obat yaitu Cefotaxime 1 gr/1 jam, drips Metronidazole 0,5 gr/8 jam, Ketorolac 1 amp/8 jam, Ranitidine 1 amp/8 jam, Transamin 1 amp/8 jam, diberikan secara intravena.

Langkah VII : Evaluasi

Tanggal 23 Juni 2010 jam 14.00 wita

1. Post Operasi berlangsung normal ditandai :
 - a. Keadaan umum ibu baik
 - b. Ibu beristirahat dengan tenang

c. Tanda – tanda vital dalam batas normal

TD : 120/70 mmHg P : 22 x/i

N : 80 x/i S : 36,7°C

2. Nyeri di daerah bekas operasi belum berkurang ditandai dengan :

a. Ibu masih mengeluh nyeri pada daerah luka operasi

b. Ekspresi wajah ibu masih meringis bila bergerak

c. Nyeri tekan pada daerah luka operasi

3. Potensial terjadi infeksi ditandai dengan :

a. Luka operasi masih basah

b. Nyeri tekan pada luka operasi

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN
PADA NY “S” DENGAN POST OPERASI MIOMA UTERI
DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR
TGL 23 JUNI 2010**

No Register : 56745
No.MR : 199783
Tgl.MRS : 17 Juni 2010 jam 13.15 Wita
Tgl.Operasi : 23 Juni 2010 jam 10.40 Wita
Tgl.Pengkajian : 23 Juni 2010 jam 14.00 Wita

A. Data Subjektif (S)

1. Identitas Pasien

Nama : Ny “S” / Tn. “L”

Umur : 34 tahun / 38 tahun

Suku : Makassar / Makassar

Agama : Islam / Islam

Pendidikan : SMA / SMA

Pekerjaan : IRT / Wiraswasta

Alamat : Jl. Tentara Pelajar Lorong 187/A

2. Ibu mengatakan dioperasi tanggal 23 Juni 2010 jam 10.50 – 11.40 wita
3. Ibu mengatakan nyeri pada perut bekas operasi
4. Ibu mengatakan buang air kecil melalui kateter
5. Ibu mengatakan cemas dengan keadaannya

B. Data Objektif (O)

1. Keadaan umum ibu baik
2. Kesadaran komposmentis
3. Ekspresi wajah tampak meringis bila bergerak
4. Nyeri tekan pada luka operasi
5. TTV:

TD : 120/80 mmHg

N : 84 kalipermenit

P : 26 kalipermenit

S : 36,7°C

6. Kepala

Inspeksi : Nampak bersih, rambut hitam dan ikal, rambut tidak rontok.

7. Wajah

Inspeksi : tidak tampak oedem, ekspresi wajah meringis terutama jika bergerak.

8. Mata

Inspeksi : konjungtiva pucat dan sklera tidak ikterus (putih)

9. Hidung

Inspeksi : simetris kiri dan kanan

Palpasi : sekret tidak ada

10. Mulut dan gigi

Inspeksi : tampak bersih, tidak ada caries dan sariawan

11. Leher

Palpasi : tidak ada pembesaran pada kelenjar tyroid dan vena jugularis.

12. Payudara

Inspeksi : simetris kiri dan kanan

Palpasi : tidak ada nyeri tekan dan putting susu terbentuk

13. Abdomen

Inspeksi : tampak luka bekas operasi yang tertutup dengan kasa steril.

14. Genitalia

Inspeksi : tampak bersih dan personal hygiene bersih
Terpasang kateter tetap

15. Ekstremitas

a) Atas

Inspeksi : tampak terpasang infus dextrose 5 % di lengan kanan.

b) Bawah

Inspeksi : tidak ada oedema dan varices.

16. Pemeriksaan laboratorim :

Hb : 10,4 gr%

C. Assesment (A)

Diagnosa : Pasca Operasi

Masalah Aktual :

1. Nyeri pada luka bekas operasi.

2. Kecemasan

Masalah Potensial : Infeksi luka bekas operasi

D. Planning (P)

Tanggal 23 Juni 2010 jam 14.00 Wita

1. Mengobservasi Keadaan Umum ibu

Hasil :

- a) Ibu masih berbaring di tempat tidur dengan wajah meringis bila bergerak.
- b) Kesadaran komposmentis dan baik

2. Mengobservasi Tanda – Tanda Vital

Hasil:

TD : 130/80 mmHg

N : 80 kalipermenit

P : 22 kalipermenit

S : 36,7°C

3. Menjelaskan ulang penyebab nyeri yaitu karena terputusnya kontinuitas jaringan otot, dan serabut akibat dari regangan otot abdomen yang berlebihan saat operasi dengan adanya luka ini maka dapat merangsang ujung-ujung saraf sehingga timbul rasa nyeri.
4. Menganjurkan ibu istirahat yang cukup :
 - a) Tidur siang 1-2 jam
 - b) Tidur malam 7-8 jam

5. Memberi penjelasan tentang personal hygiene yaitu mengganti pembalut minimal 3x sehari dan pakaian bila basah/kotor. Dan ibu sudah mengerti dengan penjelasan yang diberikan.
6. Mengobservasi pemberian cairan infus Ringer Laktat : Dextrose 5% (2:1) dengan 28 tetes permenit
7. Mengobservasi pengeluaran urine : urine sebanyak 300 ml tertampung di dalam urine bag.
8. Mengobservasi keadaan luka operasi : luka operasi masih basah



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN
PADA NY “S” DENGAN POST OPERASI MIOMA UTERI
DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR
TGL 24 JUNI 2010**

No Register : 56745
No.MR : 199783
Tgl.MRS : 17 Juni 2010 jam 13.15 Wita
Tgl.Operasi : 23 Juni 2010 jam 10.40 Wita
Tgl.Pengkajian : 24 Juni 2010 jam 09.00 Wita

A. Data Subjektif (S)

1. Klien mengatakan dioperasi tanggal 23 Juni 2010.
2. Klien mengatakan merasakan nyeri pada daerah luka operasi bila bergerak.
3. Klien mengatakan merasa pusing.
4. Ibu mengatakan sudah flatus

B. Data Objektif (O)

1. Keadaan umum baik
2. Ekspresi wajah meringis
3. Luka operasi masih basah
4. Nyeri tekan pada luka operasi
5. Masih terpasang kateter tetap
6. Tanda – Tanda Vital

TD : 120 / 80 mmHg

N : 80 x/i

S : 36,7°C

P : 22 x/i

C. Assesment (A)

Post operasi mioma uteri hari pertama, nyeri luka operasi potensial terjadi infeksi.

D. Planning

Tanggal 24 Juni 2010 jam 10.00 Wita

1. Mengobservasi Tanda-Tanda Vital

TD : 120/80 mmHg P : 20x/menit

N : 80 x/ menit S : 36,5 °C

2. Menjelaskan ulang penyebab nyeri yaitu karena terputusnya kontinuitas jaringan otot, kulit dan serabut akibat dari regangan otot abdomen yang berlebihan saat operasi, dengan adanya luka ini maka dapat merangsang ujung-ujung saraf sehingga timbul rasa nyeri.
3. Menganjurkan ibu untuk makan sedikit demi sedikit dengan bubur.
 - a. Tidur siang 1-2 jam
 - b. Tidur malam 7-8 jam
4. Menganjurkan ibu untuk mobilisasi dengan berjalan – jalan disekitar tempat tidur.
5. Menganjurkan ibu agar tetap memperhatikan personal hygiene yaitu mengganti pembalut dan pakaian bila basa/ kotor.

6. Penatalaksanaan pemberian obat pada jam 10.00 Wita yaitu Cefotaxime 1 gr, Metronidazole 0,5 gr, Ketorolac 1 ampul, Ranitidin 1 ampul, Transamin 1 ampul diberikan secara intravena. Dan dilanjutkan setiap 8 jam kecuali obat Cefotaxime 1 gr setiap 12 jam.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN
PADA NY “S” DENGAN POST OPERASI MIOMA UTERI
DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR
TGL 25 JUNI 2010**

No Register : 56745
No.MR : 199783
Tgl.MRS : 17 Juni 2010 jam 13.15 Wita
Tgl.Operasi : 23 Juni 2010 jam 10.40 Wita
Tgl.Pengkajian : 25 Juni 2010 jam 09.00 Wita

A. Data Subjektif (S)

1. Klien mengatakan dioperasi tanggal 23 Juni 2010.
2. Klien mengatakan masih merasa nyeri pada daerah luka operasi bila bergerak.
3. Klien mengatakan sudah tidak merasa pusing.
4. Klien mengatakan sudah platus tapi belum BAB.

B. Data Objektif (O)

1. Keadaan umum baik
2. Ekspresi wajah cerah
3. Luka operasi masih basah
4. Nyeri tekan pada luka operasi
5. Masih ada pengeluaran bercak darah
6. Masih terpasang kateter tetap dan ibu belum BAB

7. Tanda – Tanda Vital

TD : 120 / 80 mmHg

N : 80 x/i

S : 36,7°C

P : 22 x/i

C. Assesment (A)

Post operasi mioma uteri hari kedua, nyeri luka operasi potensial terjadi infeksi.

D. Planning

Tanggal 25 Juni 2010 jam 10.00 Wita

1. Mengobservasi Tanda-Tanda Vital

TD : 120/80 mmHg P : 20x/menit

N : 80 x/ menit S : 36,5 °C

2. Menjelaskan ulang penyebab nyeri yaitu karena terputusnya kontinuitas jaringan otot, kulit dan serabut akibat dari regangan otot abdomen yang berlebihan saat operasi, dengan adanya luka ini maka dapat merangsang ujung-ujung saraf sehingga timbul rasa nyeri.

3. Menganjurkan ibu untuk makan sedikit demi sedikit dengan bubur.

a. Tidur siang 1-2 jam

b. Tidur malam 7-8 jam

4. Menganjurkan ibu untuk mobilisasi dengan berjalan – jalan di sekitar tempat tidur.

5. Menganjurkan ibu agar tetap memperhatikan personal hygiene yaitu mengganti pembalut dan pakaian bila basa/ kotor.
6. Penatalaksanaan pemberian obat pada jam 10.00 Wita yaitu Cefotaxime 1 gr, Metronidazole 0,5 gr, Ketorolac 1 ampul, Ranitidin 1 ampul, Transamin 1 ampul diberikan secara intravena. Dan dilanjutkan setiap 8 jam kecuali obat Cefotaxime 1 gr setiap 12 jam.



**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN
PADA NY “S” DENGAN POST OPERASI MIOMA UTERI
DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR
TGL 26 JUNI 2010**

No Register : 56745
No.MR : 199783
Tgl.MRS : 17 Juni 2010 jam 13.15 Wita
Tgl.Operasi : 23 Juni 2010 jam 10.40 Wita
Tgl.Pengkajian : 26 Juni 2010 jam 09.00 Wita

A. Data Subjektif (S)

1. Ibu sudah miring ke kiri dan ke kanan
2. Ibu mengatakan nyeri bekas operasi berkurang
3. Ibu mengatakan belum BAB

B. Data Objektif (O)

1. Keadaan umum baik
2. Ekspresi wajah cerah
3. Luka operasi mulai kering
4. Nyeri tekan sudah berkurang
5. Masih ada pengeluaran bercak darah
6. Kateter sudah di aff dan BAK sudah lancar
7. Tanda – Tanda Vital

TD : 120 / 80 mmHg

N : 80 x/i

S : 36,7°C

P : 22 x/i

C. Assesment (A)

Post operasi mioma uteri hari ketiga, nyeri luka operasi, potensial terjadi infeksi luka operasi.

D. Planning

Tanggal 26 Juni 2010 jam 10.00 Wita

1. Memberikan motivasi pada klien untuk memenuhi sendiri kebutuhannya.
2. Memberi penjelasan tentang pentingnya pergerakan (mobilisasi dini) dalam proses penyembuhan.

3. Mengobservasi Tanda-Tanda Vital

TD : 120/80 mmHg

P : 20x/menit

N : 80 x/ menit

S : 36,5 °C

4. Mengganti perban luka operasi dan ibu bersedia untuk digantikan perban lukanya.
5. Menghentikan pemberian cairan melalui infuse sesuai dengan instruksi dokter dan infuse telah di aff.
6. Memberi dukungan moril kepada ibu bahwa perlahan ibu mulai pulih dan merasa senang serta berterima kasih.
7. Penatalaksanaan pemberian obat-obatan seluruhnya diganti oral yaitu Asam Mefenamat 500 gram, Asam Sulfatferosus (SF) 1x1, Cefadroxil 2x1, Metronidazole 3x1, Dulcolax sp II.

**PENDOKUMENTASIAN HASIL ASUHAN KEBIDANAN
PADA NY “S” DENGAN POST OPERASI MIOMA UTERI
DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR
TGL 27 JUNI 2010**

No Register : 56745
No.MR : 199783
Tgl.MRS : 17 Juni 2010 jam 13.15 Wita
Tgl.Operasi : 23 Juni 2010 jam 10.40 Wita
Tgl.Pengkajian : 27 Juni 2010 jam 09.00 Wita

A. Data Subjektif (S)

1. Ibu sudah miring ke kiri dan ke kanan
2. Ibu mengatakan nyeri bekas operasi berkurang
3. Ibu mengatakan sudah BAB

B. Data Objektif (O)

1. Keadaan umum baik
2. Ekspresi wajah cerah
3. Luka operasi mulai kering
4. Nyeri tekan sudah berkurang
5. Pengeluaran bercak darah sedikit
6. Tanda – Tanda Vital

TD : 120 / 80 mmHg

N : 80 x/i

S : 36,7°C

P : 22 x/i

C. Assesment (A)

Post operasi mioma uteri hari keempat, nyeri luka operasi, potensial terjadi infeksi luka operasi.

D. Planning

Tanggal 27 Juni 2010 jam 10.00 Wita

1. Memberikan motivasi pada klien untuk memenuhi sendiri kebutuhannya.
2. Memberi penjelasan tentang pentingnya pergerakan (mobilisasi dini) dalam proses penyembuhan.
3. Mengobservasi Tanda-Tanda Vital
TD : 120/80 mmHg P : 20x/menit
N : 80 x/ menit S : 36,5 °C
4. Mengganti perban luka operasi dan ibu bersedia untuk digantikan perban lukanya dengan menggunakan Verban offsit
5. Memberi dukungan moril kepada ibu bahwa perlahan ibu mulai pulih dan merasa senang serta berterima kasih.
6. Ibu dianjurkan untuk pulang, keadaan umum membaik, pemberian obat-obatan dilanjutkan di rumah seperti Asam Mefenamat 500 gram, Asam Sulfatferosus (SF) 1x1, Cefadroxil 2x1, Metronidazole 3x1, Dulcolax sp II.

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang kesenjangan antara tinjauan pustaka dan studi kasus pada pelaksanaan Manajemen Asuhan Kebidanan Pada Ny“S” dengan Post Operasi Mioma di RSUD Labuang Baji Makassar Tanggal 23 s/d 27 Juni 2010. Untuk menguraikan keterkaitan antara teori dan praktek, maka digunakan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang terdiri atas 7 langkah yaitu pengkajian/ analisa data dasar, merumuskan diagnosa/masalah aktual, merumuskan diagnosa/ masalah potensial, melaksanakan tindakan segera/ kolaborasi, rencana tindakan, pelaksanaan tindakan dan evaluasi, serta dilakukan pendokumentasian hasil asuhan kebidanan dalam bentuk SOAP.

A. Langkah I: Identifikasi Data Dasar

Identifikasi data dasar merupakan proses manajemen asuhan kebidanan yang ditunjukkan untuk pengumpulan informasi mengenai baik fisik, psikososial, dan spiritual. Pengumpulan data dilakukan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi, serta pemeriksaan penunjang yaitu laboratorium dan pemeriksaan diagnostik. Pada tahap ini penulis tidak menemukan kesenjangan. Hal ini disebabkan karena respon ibu dalam memberikan informasi sangat baik begitu juga dengan keluarga, bidan dan dokter yang merawat sehingga penulis dengan mudah memperoleh data yang diinginkan. Data diperoleh secara terfokus sehingga

intervensinya juga terfokus sesuai data klien. Menurut teori yang ada bahwa mioma uteri ukurannya >5 cm harus diangkat melalui suatu pembedahan. Operasi pembedahan ini akan menyebabkan pada daerah luka operasi adalah akibat dari operasi pengangkatan mioma uteri yang dialami klien pada tanggal 23 Juni 2010, sehingga apa yang dijelaskan di tinjauan pustaka dengan studi kasus tampaknya ada persamaan antara tinjauan pustaka dan studi kasus.

B. Langkah II: Identifikasi Diagnosa / Masalah Aktual

Dalam pengkajian dan masalah kebidanan dilakukan berdasarkan pendekatan manajemen asuhan kebidanan yang didukung dan ditinjau dalam beberapa data, baik secara subjektif maupun secara objektif yang diperoleh dari hasil pengkajian yang telah dilakukan dan berdasarkan tinjauan pustaka adalah:

1. Dengan adanya perdarahan menyebabkan konsentrasi haemoglobin dan eritrosit menurun sehingga tidak dapat memenuhi fungsinya untuk membawa oksigen dalam jumlah yang cukup untuk membawa ke jaringan perifer dan hipotalamus yang menyebabkan pusing, konjungtiva dan bibir tampak pucat.
2. Adanya luka operasi menyebabkan terputusnya kontinuitas jaringan sehingga rangsangan pada saraf meningkat, implus nyeri disebarkan ke korteks cerebri dan nyeri dipersepsikan.
3. Kurangnya pengetahuan tentang keadaannya menyebabkan timbulnya rasa takut yang merangsang hipotalamus untuk menghasilkan hormon adrenalin serta kurangnya pengetahuan dan informasi dapat mempengaruhi

mekanisme coping klien dalam menghadapi kondisinya sehingga cemas dipersepsikan.

Sehingga yang diidentifikasi pada klien Ny “S” adalah post operasi mioma uteri adalah nyeri pada luka operasi dan kecemasan.

Dengan demikian penerapan tinjauan pustaka dan tinjauan studi kasus Ny “S” secara garis besar tampak ada persamaan dalam diagnosa aktual yang ditegakkan sehingga memperlihatkan tidak ada kesenjangan antara teori dan praktek.

C. Langkah III. Merumuskan Diagnosa/ Masalah Potensial

Berdasarkan tinjauan pustaka manajemen asuhan kebidanan adalah mengidentifikasi masalah potensial yaitu mengantisipasi jika memungkinkan dan mempersiapkan sesuatu yang mungkin terjadi. Sesuai dengan tinjauan pustaka bahwa nyeri daerah luka operasi memungkinkan dapat terjadi infeksi apabila tidak tertangani dengan baik.

Berdasarkan data yang ada pada studi kasus Ny “S” dapat diidentifikasi masalah potensial yaitu masalah terjadi infeksi. Dengan demikian penerapan tinjauan pustaka dan manajemen asuhan kebidanan pada studi kasus Ny “S” nampak ada kesamaan.

D. Langkah IV. Melaksanakan Tindakan Segera dan Kolaborasi

Berdasarkan data yang memberikan indikasi adanya tindakan segera dimana harus menyelamatkan jiwa klien, berupa kolaborasi dengan tenaga

kesehatan yang lebih profesional dengan keadaan yang dialami oleh klien ataupun konsultasi dengan dokter.

Berdasarkan tinjauan pustaka pada post operasi mioma uteri tindakan segera dilakukan apabila ada perdarahan post operasi, tetapi pada studi kasus Ny "S" dengan post operasi mioma uteri, tidak ditemukan indikasi untuk melakukan tindakan segera atau kolaborasi, mengingat keadaan ibu tidak mengalami perdarahan. Dengan demikian ada kesamaan antara tinjauan pustaka dan studi kasus manajemen asuhan kebidanan Ny "S".

E. Langkah V. Rencana Tindakan Asuhan Kebidanan

Pada manajemen asuhan kebidanan suatu rencana tindakan yang komprehensif dilakukan atas indikasi yang timbul berdasarkan kondisi klien serta hubungannya dengan masalah yang dialami klien dan juga meliputi antisipasi dengan penyuluhan terhadap klien, rencana tindakan harus disetujui klien dan semua tindakan yang diambil harus berdasarkan rasional yang relevan dan diakui kebenarannya.

Pada Ny "S" dengan post operasi mioma uteri, penulis merencanakan asuhan kebidanan berdasarkan diagnosa / masalah aktual dan masalah potensial yaitu observasi tanda-tanda vital, anjurkan ibu istirahat yang cukup, anjurkan ibu makan makanan yang bergizi, anjurkan ibu untuk mobilisasi dini, beri penjelasan tentang personal hygiene yaitu mengganti pembalut dan pakaian bila basah / kotor, jelaskan penyebab nyeri, observasi keadaan luka, observasi pemberian perinfus, observasi kandungan kemih, dan penatalaksanaan pemberian antibiotik, analgetik, dan vitamin.

Dari rencana asuhan kebidanan yang telah diberikan pada kasus ini ada kesesuaian antara teori dengan kasus yang ada.

F. Langkah VI. Melaksanakan Tindakan Asuhan Kebidanan

Berdasarkan tinjauan manajemen asuhan kebidanan bahwa bahwa melaksanakan rencana tindakan harus efisien dan menjamin rasa aman pada klien. Implementasi dapat dikerjakan seluruhnya oleh bidan ataupun sebagian dilaksanakan klien serta kerjasama dengan tim kesehatan lainnya sesuai dengan tindakan yang telah direncanakan.

Pada studi kasus Ny "S" dengan post operasi mioma uteri, semua tindakan yang direncanakan dapat dilaksanakan seluruhnya dengan baik tanpa hambatan karena adanya kerjasama dan penerimaan yang baik dari klien serta adanya dukungan dari keluarga dan petugas kesehatan di ruang nifas / perawatan ginekologi RSUD labuang baji Makassar.

G. Langkah VII. Evaluasi Asuhan Kebidanan

Evaluasi merupakan langkah akhir dari proses manajemen asuhan kebidanan dalam mengevaluasi pencapaian tujuan, kriteria yang ditentukan, memutuskan apakah tujuan telah dicapai atau tidak dengan tindakan yang sudah diimplementasikan.

Evaluasi yang berhasil dilakukan sebelum dan sesudah meliputi : luka insisis/operasi kering , nyeri pada daerah bekas operasi berkurang, tanda-tanda vital dalam batas normal, dan tanda-tanda infeksi tidak ditemukan seperti merah, bengkak, nyeri, dan panas.

Berdasarkan studi kasus Ny “S” dengan post operasi mioma uteri tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dari evaluasi tinjauan pustaka. Oleh karena itu bila dibandingkan dengan tinjauan pustaka dan studi kasus Ny “S” secara garis besar ada persamaan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis mempelajari teori dan pengalaman langsung di lahan praktek melalui studi kasus tentang manajemen asuhan kebidanan pada Ny “S” dengan post operasi mioma uteri di RSUD Labuang Baji Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penanganan mioma uteri dengan cara operasi pengangkatan massa adalah cara yang tepat, karena apabila mengalami degenerasi ganas akan menjadi sarkoma uteri.
2. Diagnosa yang dapat ditegakkan berdasarkan data subjektif dan data objektif Ny “S” dengan post operasi mioma uteri adalah nyeri luka operasi. Jika nyeri luka operasi tidak ditangani dengan baik, maka potensial terjadi infeksi.
3. Berdasarkan praktek yang telah di lakukan di RSUD labuang baji Makassar dalam memberikan asuhan kebidanan pada kasus mioma uteri menunjukkan tidak ada kesenjangan dengan teori yang ada. Hal ini dapat dilihat dari awal pengkajian sampai pada evaluasi dan dokumentasi asuhan kebidanan yang diberikan pada klien dapat terlaksana dengan baik, karena dukungan dan kerja sama yang baik antar klien, keluarga, paramedis (bidan), dan tim medis (dokter).

4. Pendokumentasian sangat penting dilaksanakan pada setiap tahap dari prosedur manajemen kebidanan, karena hal ini merupakan bukti pertanggung jawaban bidan terhadap asuhan kebidanan yang telah diberikan kepada klien.

B. Saran

1. Saran bagi ibu (klien)

Diharapkan setiap wanita produktif untuk rajin memeriksakan diri ke tempat pelayanan kesehatan agar dapat mendeteksi secara dini apabila mengalami gangguan reproduksi karena penyakit ini tidak mengakibatkan gangguan sistem reproduksi karena penyakit ini tidak menimbulkan gejala yang karakteristik.

2. Saran bagi petugas kesehatan

- a. Sebagai seorang petugas kesehatan khususnya bidan diharapkan dapat juga mengetahui tanda dan gejala pada gangguan sistem reproduksi, sehingga dapat mendeteksi lebih awal apabila menemukan kasus tersebut dan dapat segera mengambil keputusan klinik dalam penanganan selanjutnya.
- b. Bidan harus memberikan asuhan sesuai dengan kewenangannya, untuk itu manajemen kebidanan perlu dikembangkan karena merupakan alat mendasar bagi bidan untuk memecahkan masalah ibu (klien) dalam berbagai kasus.

3. Penerapan manajemen asuhan kebidanan dalam pemecahan masalah dapat lebih ditingkatkan dan dikembangkan mengingat proses ini sangat bermamfaat dalam membina tenaga bidan guna menciptakan sumber daya manusia yang berpotensi dan professional.



DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, Yayan. *Mioma Uteri*, available at <http://wordpress.com>, diakses tanggal 31 april 2010.
- Anonim. *Sekilas Tentang Histerektomi*, available at <http://majalahkesehatan.com>, diakses tanggal 21 April 2010.
- Ayurai. *Askeb Mioma Uteri*, available at <http://wordpress.com>, diakses tanggal 28 April 2010.
- Cunningham, Gary, dkk. 2005. *Obstetri William*. Jakarta : EGC, hal 1031.
- Fakhrudin, Emir. *Mioma Uteri*, available at <http://www.emir-fakhrudin.com/html>, diakses tanggal 31 April 2010
- Mansjoer, Arif. 2002. *Kapita Selekta Kedokteran*. Bandung : Media Aesculapius, hal 387.
- Manuaba, Ida Bagus Gde. 2001. *Kapita Selekta Penatalaksanaan Rutin Obstetri Ginekologi dan KB*. Jakarta : EGC, hal 600-603.
- Medika. *Mioma Uteri*, available at <http://digilib.unsri.ac.id/jurnal/health-sciences>, diakses tanggal 21 April 2010.
- Mufida. *Mioma Uteri / Riwayat Penyakit*, available at <http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 21 April 2010.
- Liewellyn - Jones, Derek. 2001. *Dasar – dasar Obstetri dan Ginekologi*. Jakarta : hipokrates, hal 263,265.
- Prawirohardjo, Sarwono. 2006. *Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, hal 558.
- Rayburn. William F. 2001. *Obstetri dan Ginekologi*. Jakarta : Widya Medika, hal 268.
- Sukaca, Bertiami E. 2009. *Cara Cerdas Menghadapi Kanker Serviks (Leher Rahim)*. Yogyakarta : Genius Publisher, hal 145 – 148.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 6*. Jakarta : Lentera Hati, hal 102-104.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 7*. Jakarta : Lentera Hati, hal 171-176.