

**GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU TERHADAP
KEJADIAN DIARE PADA ANAK DI PUSKESMAS BONTONOMPO II
KABUPATEN GOWA TAHUN 2015**



KARYA TULIS ILMIAH

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Pendidikan
Program Ahli Madya Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
OLEH
ALAUDDIN
ASNIDAR
70400112094
M A K A S S A R

**PRODI DIII KEBIDANAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2015**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuatkan oleh orang lain sebagian atau seluruhnya , maka Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Mei 2016

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Asnidar
70400112096

HALAMAN PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “**Gambaran Tingkat Pengetahuan dan Sikap Ibu Terhadap Angka Kejadian Diare Pada Anak Di Puskesmas Bontonompo II tahun 2015**” yang disusun oleh **Asnidar.**, NIM: 70400112094, mahasiswi Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian proposal dan hasil penelitian Karya Tulis Ilmiah yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 28 Juli 2017 M.
1439 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. dr. Andi Armyn Nurdin, M. Sc.** (.....)

Sekretaris : **Hj. Sitti Saleha, S. SiT, S. KM, M. Kes.** (.....)

Pembimbing : **dr. Andi Sitti Rahma, M. kes.** (.....)

Penguji I : **dr. Miswani Mukani Syuaib, M. Kes.** (.....)

Penguji II : **Dr. Nur Huda Noer, M. Ag.** (.....)

cy Dekan

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M. Sc
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi nama Allah yang Maha Besar dan Maha Mengasihi, dan dengan segala ni'mat serta keridhoan yang Allah berikan, penulis memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya serta pujian yang tiada terhingga karena hanya dengan petunjuk, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dengan baik meskipun dalam bentuk yang sangat sederhana. Dan dengan keteguhan dan kesabaran Rasulullah yang berusaha menyelamatkan umatnya dari kesesatan, memberikan contoh yang baik untuk semua hamba Allah sehingga semua hamba dapat bertaqarrub dengan-Nya, penulis haturkan shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Amin Allahumma Amin.

Dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul **“Gambaran Tingkat Pengetahuan dan Sikap Ibu terhadap Kejadian Diare pada Anak Di Puskesmas Bontonompo II Kab. Gowa Tahun 2015”** ini, penulis mendapatkan sejumlah tantangan, rintangan dan hambatan. Namun, berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sejumlah tantangan tersebut dapat teratasi. Olehnya itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Andi Bahtiar syahrir dan ibunda Sukma yang telah bersusah payah membesarkan, mengasuh, mendidik dan membina

penulis dengan ikhlas, penuh pengorbanan baik lahiriah maupun batiniah serta kekhusu'an do'a yang selalu terucap dalam shalat beliau untuk penulis. Dan juga kepada seluruh keluarga yang telah setia memberikan bantuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

2. Bapak Drs. Arifuddin tike dan Ibunda Hj. Nurmiati SE. MM yang selaku orang tua wali yang sudah banyak membantu, mendidik, dan memberikan motivasi selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Ag, selaku rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan serta mengerahkan segala kemampuan demi membangun kampus UIN Alauddin Makassar agar menjadi perguruan tinggi yang terdepan dan lebih berkualitas.
4. Bapak Dr. dr. H. Andi Armin Nurdin, M, selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada seluruh mahasiswa UIN Alauddin Makassar selama masa pendidikan.
5. Hj. Sitti Saleha, S.Si.T, SKM. M. Keb, selaku ketua jurusan kebidanan yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar A. Md. Keb

6. Ibu dr. Andi Sitti Rahma, M. Kes, selaku pembimbing Karya Tulis Ilmiah yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan fikirannya dalam membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk serta memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
7. Ibu dr. Miswani Mukani Syaib, M. Kes, selaku penguji yang telah banyak memberikan saran dan motivasi dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.
8. Ibu Nur Huda Noer, S.Ag, M.Ag, selaku penguji II yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah khususnya dalam bidang keagamaan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini.
9. Para dosen dan seluruh staf UIN Alauddin terkhusus pada Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis serta memberikan wawasan, pengetahuan dan nasehat selama penulis menuntut ilmu dalam Prodi Kebidanan UIN Alauddin Makassar.
10. Kawan- kawan kebidanan angkatan 2012 khususnya Mariyuni D, Amd.keb dan jumrah wana, Amd.keb, yang telah bersama-sama penulis mengarungi samudra ilmu saling berbagi suka maupun duka. Kebersamaan yang telah kita rajut selama ini memberi arti dalam hidup penulis yang senantiasa menjadi kisah terindah yang tak akan pernah penulis lupakan.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk perbaikan dan penyempurnaan Karya Tulis Ilmiah ini.

Akhirnya penulis hanya bisa berdoa *Jazakumullah khairan katsiran* dan mengharapkan kiranya segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mempunyai nilai ibadah disisi Allah SWT. Dan semoga Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, Amin.

Makassar, Mei 2016

Penulis

Asnidar
70400112096

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH	ii
LEMAR PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Umum Tentang Diare	5
a. Defenisi Diare	5
b. Etiologi/ Faktor penyebab	6
c. Patofisiologi Diare	17

d. Tanda dan Gejala Diare	19
e. Penatalaksanaan Diare	20
B. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan dan Sikap	22
1. Pengetahuan	22
2. Sikap	26
C. Tinjauan Umum islam Tentang Penyakit Diare	29
D. Kerangka Konsep	32
1. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti	32
2. Bagan Kerangka Konsep	32
3. Defenisi Operasional dan Kriteria Penelitian	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	36
D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Penyajian Data	38
F. Metode Pengelolaan Data dan Analisis Data	39
G. Besaran Sampel	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil	42
B. Pembahasan.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 4.1	Distribusi frekuensi pendidikan responden di puskesmas Bontonompo II Tahun 2015	42
Tabel 4.2	Distribusi frekuensi umur responden di puskesmas Bontonompo II Tahun 2015	43
Tabel 4.3	Distribusi frekuensi pekerjaan responden di puskesmas Bontonompo II Tahun 2015	44
Tabel 4.4	Distribusi fekuensi pengetahuan ibu terhadap angka kejadian diare pada anak di puskesmas Bontonompo II tahun 2015	45
Tabel 4.5	pengetahuan responden berdasarkan pendidikan terhadap angka kejadian diare pada anak di puskesmas Bontonompo II tahun 2015	45
Tabel 4.6	pengetahuan responden berdasarkan umur terhadap angka kejadian diare pada anak di puskesmas Bontonompo II tahun 2015	46
Tabel 4.7	pengetahuan responden berdasarkan pekerjaan terhadap angka kejadian diare pada anak di puskesmas Bontonompo II tahun 2015	47
Tabel 4.8	Distribusi fekuensi sikap ibu terhadap angka kejadian diare pada anak di puskesmas Bontonompo II tahun 2015.....	48
Tabel 4.9	Distribusi fekuensi sikap responden berdasarkan pendidikan terhadap angka kejadian diare pada anak di puskesmas Bontonompo II tahun 2015.....	49
Tabel 4.10	Distribusi fekuensi sikap responden berdasarkan umur terhadap angka kejadian diare pada anak di puskesmas Bontonompo II tahun 2015	50
Tabel 4.11	Distribusi fekuensi sikap responden berdasarkan pekerjaan terhadap angka kejadian diare pada anak di puskesmas Bontonompo II tahun 2015.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Kuesioner Penelitian
- Lampiran II : Surat Permohonan Izin Penelitian Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Lampiran III : Surat Izin dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA).
- Lampiran IV : Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kota Kabupaten Gowa
- Lampiran V : Surat Pernyataan Telah Selesai Melaksanakan Penelitian dari Puskesmas Bontonomopo II



ABSTRAK

Nama : Asnidar
Nim : 70400112096
Judul : Gambaran Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Ibu Terhadap Kejadian Diare Pada Anak Di Puskesmas Bontonompo II Kabupaten Gowa Tahun 2015.

Diare merupakan frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali sehari dalam waktu 24 jam dengan konsistensi cair. Di Indonesia penyakit diare masih merupakan penyakit yang sering menyerang pada anak. Walaupun Angka mortalitas diare menurun namun angka morbiditas diare pada anak masih cukup tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan dan sikap ibu terhadap kejadian diare pada anak di Puskesmas Bontonompo II kab. Gowa Tahun 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan jumlah populasi 80 orang dan didapatkan sampel yang dipilih secara “purposive sampling” serta pengumpulan data menggunakan kuesioner.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari 80 responden ibu yang datang membawa anaknya berobat di Puskesmas Bontonompo II terdapat 10 responden (13%) diantaranya memiliki pengetahuan baik, 32 responden (40%) diantaranya memiliki pengetahuan cukup dan 38 responden (47%) diantaranya memiliki pengetahuan yang kurang. Dan berdasarkan sikap dari 80 responden, 29 responden (36%) yang memiliki sikap baik, 33 responden (41%) yang memiliki sikap cukup, 18 responden (22%) yang memiliki sikap kurang. Oleh karena itu pengetahuan dan sikap ibu terhadap kejadian diare pada anak sangat penting dalam mengurangi dan menekan angka kejadian diare, morbiditas dan mortalitas pada anak.

Kata kunci : pengetahuan, sikap, kejadian diare pada anak.

ABSTRACT

Name : Asnidar
Nim : 70400112096
Title : Knowledge level describing and mother response within diarrhea case of child at Bontonompo clinic II to Gowa regency 2015.

Diarrhea is a body liquid movements more than three times in a day, in Indonesia diarrhea is still be exist as a childrens disease. Everthough the rate of diarrhea mirtalitas is down but the rate of diarrhea morbiditas of children is still hing.

The aims of this research are to describe knowledge level and mothers response within diarrhea case in child at Bontonompo clinic II Gowa regency 2015. The research is used is descriptive metode with so member of population are 80 people with choosing sampel "purposive sampling" and use questionnaire to collec the data.

The results of the research shows that 80 mother respondents brought their children to Bontonompo clinic II to there are 10 respondents (13%) have good knowledge guarenes 32 respondents (40%) have enough a and 38 respondents (47%) have less knowledge. Based on respond of 80 respondents, 29 respondents (36%) have good respond, 33 respondents (41%) have enough respond, 10 respondents (22%) have less respond. The refor knowledge and mother's respond within diarrhea case in child is very importaat to decrease cind minimize rate of diarrhea case. Morbidity and mortality on child.

Keywords: knowledge, response, diarrhea case.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diare merupakan kehilangan cairan tubuh dalam 24 jam dengan frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali sehari (*World Health Organization, 2009*). Gejala ini manifestasi dari infeksi system gastrointestinal yang dapat disebabkan berbagai jenis bakteri, virus dan parasit. Infeksi ini dapat menyebar melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi maupun infeksi langsung antar manusia (*Ernawati.2012*).

Di Indonesia penyakit diare masih merupakan penyakit yang sangat sering menyerang pada anak terutama anak di bawah usia dua tahun. Walaupun angka mortalita diare menurun namun angka morbiditas diare pada anak masih cukup tinggi. Serisnya dampak akibat penyakit diare pada anak sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kehilangan cairan yang sering serta terganggunya proses absorpsi makanan dan zat nutrient yang dibutuhkan anak untuk pertumbuhan bahkan bisa mengakibatkan kematian pada anak. Rentangnya anak usia balita, terutama usia dibawah 2 tahun terhadap berbagai macam penyakit infeksi terutama untuk penyakit pada saluran pencernaan seperti diare sering dihubungkan karena masih rendahnya daya tahan tubuh anak terhadap berbagai macam infeksi, status gizi buruk pada anak alita juga kurangnya kebersihan anak terutama tangan dan kuku. Inilah salah satu dasar bahwa berbagai penyebab diare pada anak yang termasuk dalam salah satu

penyakit infeksi ini telah banyak kita ketahui secara umum. Sebagai makhluk yang berakal adalah lebih baik melakukan pencegahan dari pada pengobatan, sehubungan dengan pencegahan diare pada anak sikap dan pentingnya peranan seorang ibu dalam 1 kepala keluarga, dimana keersihan/higenitas menjabdi topik dalam kasus ini (diare).

Dilihat dari distribusi umur balita penderita diare di tahun 2010 didapatkan prevalensi terbesar adalah kelompok umur 6-11 bulan yaitu serbesar 21,65%, lalu kelompok umur 12-17 bulan sebesar 14,43%, kelompok umur 24-29 sebesar 12,37%, sedangkan prevalansi terkecil pada kelompok umur 54-59 bulan yaitu 2,06 %. Kelompok umur dengan insiden tertinggi pada kelompok umur 6-11 bulan pada saat diberikan makanan pendamping ASI (Kemenkes RI,2011; juffrie,2011).

Ada hubungan negatif antara kejadian diare dengan tingkat pendidikan ibu dan indeks kekayaan kuantil. Semakin tinggi pendidikan ibu dan semakin tinggi indeks kekayaan kuantil rumah tangga, semakin rendah prevalensi diare dan sumber air minum serta fasilitas kaakus. Terlihat baahwa presentasi diare lebih rendah pada anak yang tinggal di rumah dengan fasilitas kakus sendiri. Seperti yang tinggal di rumah tanpa akses air bersih, yaitu yang memakai fasilitas kakus di sungai/kolam/danau (18,4%), (Buletin jendela data dan informasi kesehatan : situasi diare di Indonesia, 2011).

Berdasarkan profil data kesehatan Indonesia tahun 2011, setiap tahun diperkirakan 2,5 miliar kejadian diare pada anak balita, dan hampir tidak ada

perubahan dalam dua decade terakhir. Diare pada balita tersebut lebih dari separuhnya terjadi di Afrika dan Asia Selatan, dapat mengakibatkan kematian atau keadaan berat lainnya. Insiden diare bervariasi menurut musim dan umur. Anak-anak adalah kelompok usia rentan terhadap diare, insiden diare tertinggi pada anak kelompok usia dibawah dua tahun, dan menurut dengan bertambahnya usia anak.

Kabupaten Gowa merupakan salah satu dari kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki penduduk terbanyak. Kejadian diare di daerah ini tentu akan memberikan dampak yang besar terhadap status kesehatan di Sulawesi selatan. Kejadian diare di Kabupaten Gowa pada tahun 2009 cukup tinggi yaitu sebanyak 17.165 kasus dan angka kejadian diare setiap tahun menunjukkan tren peningkatan. Tercatat ada 23.538 kasus di tahun 2010. Pada tahun 2011 kejadian diare di Kabupaten Gowa menjadi 20.148 kasus. Tren peningkatan terus berlangsung di tahun 2012, kasus diare sebanyak 24.660 penderita.

Berdasarkan data dari puskesmas BONTONOMPO II didapatkan angka kejadian diare pada 3 tahun terakhir adalah 2012 sebanyak 366 jiwa anak, 2013 sebanyak 413 jiwa anak, 2014 sebanyak 423 jiwa anak, dari 2884 jiwa anak yang terdiri dari 14 desa yang ada di kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa.

Berdasarkan uraian di atas, hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai **“Gambaran Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Ibu Terhadap Kejadian Diare Pada Anak Di Puskesmas Bontonompo II Kabupaten Gowa Tahun 2015”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Ibu Terhadap Kejadian Diare Pada Anak Di Puskesmas Bontonompo II Ka.Gowa Tahun 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan dan sikap ibu terhadap kejadian diare pada anak di Puskesmas Bontonompo II kab. Gowa tahun 2015.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu terhadap kejadian diare pada anak di Puskesmas Bontonompo II kab. Gowa tahun 2015.
- b. Untuk mengetahui gambaran sikap ibu terhadap kejadian diare pada anak di Puskesmas Bontonompo II kab. Gowa tahun 2015.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman untuk enulisan karya tulis selanjutnya khusus jurusan kebidanan universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Sebagai bahan bacaan dan sumber informasi bagi masyarakat pembaca mengenai pengetahuan dan sikap ibu terhadap kejadian diare pada anak di Puskesmas Bontonompo II kab. Gowa Tahun 2015.
3. Menambah wawasan dan keterampilan penelitian di bidang kesehatan khususnya tentang diare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Diare

a. Definisi

- a. Diare adalah perubahan frekuensi dan konsistensi tinja. WHO pada tahun 1984 mendefinisikan diare sebagai berak cair tiga kali atau lebih dalam sehari semalam (24 jam). Para ibu mungkin mempunyai istilah tersendiri seperti lembek, cair, berdarah, berlendir, atau dengan muntah ('**muntabe**'). Penting untuk menanyakan kepada orang tua mengenai frekuensi dan konsistensi tinja anak yang dianggap sudah tidak normal lagi (Widoyono, 2012)
- b. Diare adalah pengeluaran feses yang tidak normal dan cair. Bisa juga didefinisikan sebagai buang air besar yang tidak normal dan berbentuk cair dengan frekuensi lebih banyak dari biasanya. Bayi dikatakan diare bila sudah lebih dari 3 kali buang air besar (Dewi, 2010)
- c. Diare merupakan salah satu penyakit yang sering mengenai bayi dan balita. Seorang bayi baru lahir umumnya akan buang air besar sampai lebih dari sepuluh kali sehari, ada yang sehari 2-3 kali sehari atau ada yang hanya 2 kali seminggu. Neonatus dinyatakan diare bila frekuensi buang air besar lebih dari empat kali, sedangkan untuk bayi berumur

lebih dari 1 bulan dan anak, bila frekuensinya lebih dari 3 kali sehari (Hasan, 2007).

- d. Diare adalah peningkatan volume, keenceran atau frekuensi buang air besar. Dan diare yang disebabkan oleh masalah kesehatan biasanya jumlahnya sangat banyak, bisa mencapai lebih dari 500 gram/hari. Orang yang banyak makan serat sayuran, dalam keadaan normal tidak cair dan diare yang disebabkan oleh masalah kesehatan biasanya jumlahnya sangat banyak, bisa mencapai lebih dari 500 gram/hari. Dalam keadaan normal, tinja mengandung 60-90% air, pada diare airnya bisa mencapai lebih dari 90%. (Anonim, 2009).

b. Etiologi/ faktor penyebab

- a. Penyebab paling umum diare akut adalah infeksi virus, bakteri, dan parasit. Bakteri juga dapat menyebabkan keracunan makanan akut.

- 1) Infeksi virus

- a) Viral Gastroenteritis

Viral gastroenteritis (infeksi virus dari lambung dan usus kecil) adalah penyebab paling umum diare akut diseluruh dunia. Gejala gastroenteritis virus (mual, muntah, kram perus, dan diare) biasanya berlangsung hanya 48-72 jam.

Tidak seperti bakteri enterocolitis (infeksi bakteri dari usus kecil dan usus besar), pasien yang terkena virus gastroenteritis biasanya tidak memiliki darah atau nanah dalam tinja mereka dan kadang tidak mengalami demam.

Faktor resiko yang dapat menyebabkan diare karena faktor infeksi misalnya ketersediaan sumber air bersih, ketersediaan jamban, dan kebiasaan tidak mencuci tangan.

a) Sumber Air Bersih

Sumber air bersih yang digunakan untuk minum merupakan salah satu sarana sanitasi yang tidak kalah pentingnya berkaitan dengan kejadian diare. Sebagian kuman infeksius penyebab diare ditularkan melalui jalur fekal oral. Mereka dapat ditularkan dengan memasukkan ke dalam mulut, cairan atau benda yang tercemar oleh tinja, misalnya air minum, jari-jari tangan makanan, dan makanan yang disiapkan dalam panci yang dicuci dengan air yang tercemar (Depkes RI, 2000). Menurut Depkes RI (2000), hal - hal yang perlu diperhatikan dalam penyediaan air bersih adalah :

- (1) Mengambil air dari sumber air yang bersih.
- (2) Mengambil dan menyimpan air dalam tempat yang bersih dan tertutup nserta menggunakan gayung khusus untuk mengambil air.
- (3) Memelihara atau menjaga sumber air dari pencemaran oleh binatang, anak-anak, dan sumber pengotoran. Jarak antara sumber air minum dengan sumber pengotoran seperti *septictank*, tempatn

pembuangan sampah dan air limbah harus lebih dari 10 meter.

- (4) Menggunakan air yang direbus.
- (5) Mencuci semua peralatan masak dan makan dengan air yang bersih dan cukup

b) Ketersediaan Jamban Keluarga

Ketersediaan jamban atau pembuangan tinja merupakan bagian yang penting dari kesehatan lingkungan. Pembuangan tinja yang tidak menurut aturan memudahkan terjadinya penyebaran penyakit tertentu yang penulurannya melalui tinja antara lain penyakit diare. Menurut Notoatmodjo (2003), syarat pembuangan kotoran yang memenuhi aturan kesehatan adalah :

- (1) Tidak mengotori permukaan tanah di sekitarnya
- (2) Tidak mengotori air permukaan di sekitarnya
- (3) Tidak mengotori air dalam tanah di sekitarnya
- (4) Kotoran tidak boleh terbuka sehingga dapat dipakai tempat lalat bertelur atau perkembangbiakan vector penyakit lainnya
- (5) Tidak menimbulkan bau
- (6) Pembuatannya murah, penggunaannya mudah dan mudah dipelihara

c) Kebiasaan Mencuci Tangan

Beberapa perilaku yang tidak sehat dalam keluarga adalah kebiasaan tidak mencuci tangan. Mencuci tangan yang baik sebaiknya menggunakan sabun sebagai desinfektan atau pembersih kuman yang melekat pada tangan, kebiasaan mencuci tangan dapat dilakukan pada saat sesudah membuang air besar, sesudah membuang tinja anak, sebelum menyuapi makanan pada anak, dan sesudah makan mempunyai dampak terhadap diare. Kemudian kebiasaan membaung tinja juga dapat beresiko terhadap diare misalnya membuang tinja (termasuk tinja bayi) harus dilakukan secara bersih dan benar. Banyak orang yang beranggapan bahwa tinja pada bayi tidaklah berbahaya, padahal sesungguhnya mengandung virus atau bakteri dalam jumlah besar sehingga dapat menimbulkan diare pada anak.

2) Makanan

a) Keracunan makanan

Keracunan makanan adalah penyakit singkat yang disebabkan oleh racun yang dihasilkan oleh bakteri. Racun menyebabkan sakit perut (kram) dan muntah, juga menyebabkan usus kecil mengeluarkan sejumlah besar air menyebabkan diare. Gejala keracunan makanan biasanya berll

angung kurang dari 24 jam. Dengan beberapa bakteri, racun diproduksi dalam makanan sebelum dimakan, sedangkan dengan bakteri lain, racun yang diproduksi dalam usus setelah makanan dimakan.

Gejala biasanya muncul dalam waktu beberapa jam ketika keracunan makanan disebabkan oleh racun yang terbentuk dalam makanan sebelum dimakan. Perlu waktu lebih lama untuk gejala untuk mengembangkan saat racun terbentuk didalam usus (karena butuh waktu bagi bakteri untuk menghasilkan racun). Oleh karena itu, dalam kasus terakhir, gejala biasanya muncul setelah 7-15 jam.

Staphylococcus. Aureus adalah contoh dari bakteri yang menghasilkan racun dalam makanan sebelum dimakan. N (sperti salad, daging atau sandwich dengan mayones) dibiarkan apa adanya didinginkan pada suhu kamar semalam. Bakteri *Staphylococcus* berkembangbiak dalam makanan dan menghasilkan racun. *Clostridium perfringens* adalah contoh dari bakteri yang berkembangbiak dalam makanan (biasanya kaleng makanan) dan menghasilkan racun dalam usus halus setelah makanan yang terkontaminasi dimakan.

3) Bakteri

a) *Traveler's Diare*

Ada banyak jenis E.coli. sebagian besar bakteri E.coli merupakan penghuni normal usus kecil dan usus besar dan non-patogen, yang berarti mereka tidak menyebabkan penyakit di usus. Namun demikian, non patogenik E.coli dapat menyebabkan penyakit jika menyebar diluar usus, misalnya ke dalam saluran kemih (dapat menyebabkan infeksi ginjal atau kandung kemih) atau ke dalam aliran darah (sepsis).

Beberapa *strain* E.coli, bagaimanapun, adalah patogen (yang berarti mereka dapat menyebabkan penyakit di usus kecil dan usus besar). Patogen strain E.coli ini menyebabkan diare, baik oleh racun memproduksi (disebut enterotoksigenik E.coli atau ETEC) atau dengan menyerang dan mengiritasi lapisan usus kecil dan usus besar dan menyebabkan enterocolitis (disebut enteropathogenik E.coli atau EPEC). *Traveler's diare* biasanya disebabkan oleh *strain* E.coli ETEC yang menghasilkan toksin yang menginduksi diare.

Wisatawan yang mengunjungi negara-negara asing dengan iklim hangat dan sanitasi yang buruk (mexico, bagian dari afrika, dan lain-lain) dapat terkena ETEC dengan makan makanan yang terkontaminasi, seperti buah-buahan, sayuran, makanan laut, daging mentah, air dan es batu. Racun yang

dihasilkan oleh ETEC menyebabkan diare tiba-tiba, kram perut, mual, dan kadang-kadang muntah. Gejala-gejala ini biasanya terjadi 3-7 hari setelah tiba di negara asing dan biasanya mereda dalam waktu 3 hari. Kadang-kadang, bakteri lain atau parasit dapat menyebabkan diare pada pelancong (misalnya, *Shigella*, *Giardia*, *Campylobacter*). Diare yang disebabkan oleh organisme lain biasanya berlangsung lebih lama dari 3 hari.

b) Enterocolitis

Bakteri penyebab diare biasanya menyerang usus kecil dan usus besar dan menyebabkan enterocolitis (radang usus kecil dan usus besar). Bakteri *enterocolitis* ditandai dengan tanda-tanda peradangan (darah atau nanah dalam demam, tinja) dan nyeri perut dan diare.

Jejuni Campylobacteri adalah bakteri yang paling umum yang menyebabkan enterocolitis akut selain bakteri AS yang menyebabkan enterocolitis termasuk *Shigella*, *Salmonella*, dan EPEC. Bakteri ini biasanya diperoleh dengan minum air yang tercemar atau makan makanan yang terkontaminasi, seperti sayuran, unggas dan produk susu.

Enterocolitis disebabkan oleh bakteri *Clostridium difficile* tidak biasa karena sering disebabkan oleh pengobatan antibiotik. *Clostridium difficile* juga merupakan infeksi

nasokomial yang paling umum (infeksi yang diperoleh sementara dirumah sakit) dapat menyebabkan diare. Sayangnya, infeksi juga meningkat antara individu-individu yang tidak mengkomsumsi antibiotik atau berada dirumah sakit.

c) Bakteri *E.coli* O157:H7

Bakteri *E.coli* O157:H7 adalah strain *E.coli* yang menghasilkan racun yang menyebabkan *hemorrhagic enterocolitis* (enterocolitis dengan perdarahan). Ada wabah *hemorrhagic enterocolitis* terkenal AS yang ditelusuri untuk daging sapi terkontaminasi dalam hamburger. Oleh karena itu, wabah ini juga disebut “kolitis hamburger”. Sekitar 5% dari pasien terinfeksi dengan *E.coli* O157:H7, khususnya anak, dapat mengembangkan sindrom yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Beberapa bukti menunjukkan bahwa penggunaan jangka panjang agen-agen anti diare atau penggunaan antibiotik dapat meningkatkan kemungkinan HUS berkembang.

4) Parasit

Infeksi parasit tidak menjadi penyebab umum diare di AS dengan infeksi giardia lamblia terjadi antara individu-individu yang berada dipegunungan atau bepergian ke luar negeri dan ditularkan melalui air minum yang tercemar. Infeksi giardia

biasanya tidak berhubungan dengan peradangan, tidak ada darah atau nanah dalam tinja, dan sedikit penderita mengalami demam. Infeksi dengan amuba (disentri amuba) biasanya terjadi selama perjalanan ke luar negeri di negara-negara berkembang dan berhubungan dengan tanda-tanda peradangan, darah atau nanah dalam tinja dan demam.

Cryptosporidium adalah parasit yang menghasilkan diare yang disebarkan oleh air yang terkontaminasi karena bisa bertahan klorinasi. Cyclospora adalah parasit diare yang dikaitkan dengan respberry yang terkontaminasi dari Guatemala.

b. Penyebab umum diare kronis

1) *The irritable bowel syndrome (IBS)*

The irritable bowel syndrome (IBS) adalah penyebab fungsional diare atau sembelit. Peradangan biasanya tidak ada dalam usus yang teriritasi. Namun demikian, informasi terakhir menunjukkan bahwa ada kemungkinan menjadi komponen peradangan. Ini mungkin disebabkan oleh beberapa masalah mendasar yang berbeda, tetapi percaya bahwa penyebab paling umum adalah bagian yang cepat dari isi usus melalui usus besar.

2) Penyakit infeksi

Ada beberapa penyakit menular yang dapat menyebabkan diare kronis, misalnya Giardia lamblia. Penderita AIDS sering mengalami infeksi kronis usus mereka yang menyebabkan diare

3) Bakteri berlebihan di usus kecil

Karena masalah usus kecil, bakteri kolon normal dapat menyebar dari usus besar dan masuk ke usus kecil. Ketika itu terjadi, usus kecil berada dalam posisi siap mencerna dan menyerap makanan. Namun, karena bakteri ini, makanan pun tidak dapat diserap dan dicerna oleh usus kecil. Mekanisme yang mengarah ke pengembangan diare pada pertumbuhan bakteri yang berlebihan tidak diketahui.

4) Tertular virus, bakteri, atau parasit akut

Setelah infeksi virus, bakteri atau parasit akut, beberapa individu mengembangkan diare kronis. Penyebab diare jenis ini tidak jelas, tetapi beberapa orang memiliki pertumbuhan bakteri yang berlebihan dari usus kecil. Kondisi ini juga disebut sebagai IBS pasca-menular

5) Radang usus (IBD)

Penyakit crohn dan kolitis ulseratif menyebabkan radang usus besar usus dan/atau kecil, sering menyebabkan diare kronis.

6) Kanker usus besar

Kanker usus besar dapat menyebabkan diare atau sembelit. Jika kanker menghalangi jalannya feces, biasanya mengalami sembelit. Kadang-kadang bagaimanapun, ada sekresi air dibelakang sumbatan, dan tinja cair dari balik kebocoran

penyumbatan disekitar kanker dan hasil di diare. Kanker, terutama dibagian distal usus besar, dapat menyebabkan feses encer.

7) Malabsorpsi karbohidrat atau gula

Malabsorpsi karbohidrat atau gula adalah ketidakmampuan untuk mencerna dan menyerap gula. Malabsorpsi sebagian besar gula terjadi karena defisiensi *lactase* (juga dikenal sebagai intoleransi laktosa atau susu), yaitu produk-produk susu yang mengandung gula susu, laktosa menyebabkan diare. Laktosa ini tidak rusak di usus karena tidak adanya enzim di usus, laktase, yang biasanya memecah laktosa. Tanpa putus, laktosa tidak dapat diserap ke dalam tubuh. Laktosa tercerna mencapai usus besar dan menarik air (dengan osmosis) ke dalam usus besar. Hal ini menyebabkan diare. Walaupun laktosa adalah bentuk paling umum dari malabsorpsi gula, gula-gula lain dalam diet juga dapat menyebabkan diare, termasuk fruktosa dan sorbitol.

8) Malabsorpsi lemak

Malabsorpsi lemak adalah ketidakmampuan untuk mencerna atau menyerap lemak. Malabsorpsi lemak dapat terjadi karena sekresi pankreas berkurang yang diperlukan untuk mencerna lemak normal (misalnya, karena pankreatitis atau kanker pankreas) atau dengan penyakit pada lapisan usus kecil dan usus besar tempat bakteri mengubahnya menjadi zat (bahan kimia) yang menyebabkan air akan disekresikan oleh usus kecil dan usus

besar. Penyerapan melalui usus kecil dan usus besar juga dapat lebih cepat bila ada malabsorpsi lemak.

9) Penyakit endokrin

Beberapa penyakit ketidakseimbangan hormon dapat menyebabkan diare, misalnya hipertiroidisme (kelenjar tiroid yang terlalu aktif) dan kelenjar adrenal pituitari aktif bawah (penyakit Addison).

10) Penyalahgunaan laktasi

Penyalahgunaan pencakar yang ditujukan untuk mencari perhatian atau menurunkan berat badan adalah penyebab utama diare kronis.

11) Faktor psikologis

Rasa takut, cemas, dan tegang yang berlebihan, jika terjadi pada anak bisa menyebabkan diare. Tetapi jarang terjadi pada balita umumnya pada anak yang lebih besar.

c. Patofisiologi

Mekanisme dasar yang menyebabkan diare ialah yang pertama gangguan osmotik, akibat terdapatnya makanan atau zat yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meningkat, sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus, isi rongga usus yang berlebihan ini akan merangsang usus untuk mengeluarkannya sehingga timbul diare. Kedua akibat rangsangan tertentu (misalnya toksin) pada dinding usus akan terjadi peningkatan

sekali air dan elektrolit ke dalam rongga usus dan selanjutnya diare timbul karena terdapat peningkatan isi rongga usus. Ketiga gangguan motilitas usus, terjadinya hiperperistaltik akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan usus untuk menyerap makanan sehingga timbul diare sebaliknya bila peristaltik usus menurun akan mengakibatkan bakteri timbul berlebihan yang selanjutnya dapat menimbulkan diare pula. Selain itu diare juga dapat terjadi, akibat masuknya mikroorganisme hidup ke dalam usus setelah berhasil melewati rintangan asam lambung, mikroorganisme tersebut berkembang biak, kemudian mengeluarkan toksin dan akibat toksin tersebut terjadi hipersekresi yang selanjutnya akan menimbulkan diare (Latief, Abdul dkk, 2007)

Menurut Latief, Abdul dkk (2007) Mekanisme dasar yang dapat menyebabkan timbulnya diare adalah:

- a. Gangguan osmotik Akibat terdapatnya makanan atau zat yang tidak dapat diserap oleh tubuh akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus. Isi rongga usus yang berlebihan akan merangsang usus untuk mengeluarkan isi dari usus sehingga timbul diare.
- b. Gangguan sekresi Akibat rangsangan tertentu, misalnya oleh toksin pada dinding usus yang akan menyebabkan peningkatan sekresi air dan elektrolit yang berlebihan ke dalam rongga usus, sehingga akan terjadi peningkatan-peningkatan isi dari rongga usus yang akan merangsang pengeluaran isi dari rongga usus sehingga timbul diare.

- c. Gangguan motilitas usus Hiperperistaltik akan menyebabkan berkurangnya kesempatan bagi usus untuk menyerap makanan yang masuk, sehingga akan timbul diare. Tetapi apabila terjadi keadaan yang sebaliknya yaitu penurunan dari peristaltic usus akan dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri yang berlebihan didalam rongga usus sehingga akan menyebabkan diare juga.

d. Tanda dan gejala

Berikut adalah tanda dan gejala pada anak yang mengalami diare.

- a. Cengeng
- b. Gelisah
- c. Suhu meningkat
- d. Nafsu makan menurun
- e. Feses cair dan berlendir, kadang juga disertai dengan ada darahnya.
- f. Anus lecet
- g. Dehidrasi, bila menjadi dehidrasi berat akan terjadi penurunan volume dan tekanan darah, nadi cepat dan kecil, peningkatan denyut jantung, penurunan kesadaran, dan diakhiri dengan syok.
- h. Berat badan menurun
- i. Turgor kulit menurun
- j. Mata dan ubun-ubun cekung
- k. Selaput lendir dan mulut serta kulit menjadi kering.

e. Penatalaksanaan

Prinsip perawatan diare adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian cairan (rehidrasi awal dan rumatan)
- b. Diatetik (pemberian makanan)
- c. Obat-obatan.

Pengobatan diare berdasarkan derajat dehidrasinya.

1) *Tanpa dehidrasi, dengan terapi A*

Pada keadaan ini, buang air besar terjadi 3-4 kali sehari atau disebut mulai mencret. Anak yang mengalami kondisi ini masih lincah dan masih mau makan dan minum seperti biasa. Pengobatan dapat dilakukan di rumah oleh ibu atau anggota keluarga lainnya dengan memberikan makanan dan minuman yang ada di rumah seperti air kelapa, larutan gula garam (LGG), air tajin, air teh maupun oralit. Istilah pengobatan ini adalah dengan menggunakan terapi A.

Ada tiga cara pemberian cairan yang dapat dilakukan di rumah.

- a) Memberikan anak lebih banyak cairan
- b) Memberikan makanan terus-menerus
- c) Membawa ke petugas kesehatan bila anak tidak membaik dalam tiga hari

2) *Dehidrasi ringan atau sedang dengan terapi B*

Diare dengan dehidrasi ringan ditandai dengan hilangnya cairan sampai 5% dari berat badan, sedangkan pada diare sedang terjadi

kehilangan cairan 6-10% dari berat badan. Untuk mengobati penyakit diare pada derajat dehidrasi ringan atau sedang digunakan terapi B, yaitu sebagai berikut:

Pada tiga jam pertama jumlah oralit yang digunakan:

Usia	<1 tahun	1-4 tahun	>5 tahun
Jumlah oralit	300 mL	600 mL	1200 mL

Setelah itu, tambahkan setiap kali mencret:

Usia	<1 tahun	1-4 tahun	>5 tahun
Jumlah oralit	100 ML	200 mL	400 mL

3) *Dehidrasi berat, dengan terapi C*

Diare dengan dehidrasi berat ditandai dengan buang air dengan konsistensi cair secara terus-menerus, biasanya lebih dari 10 kali disertai muntah, kehilangan cairan lebih dari 10% berat badan. Diare ini diatasi dengan terapi C, yaitu perawatan di puskesmas atau rumah sakit untuk diinfus RL (Ringer Laktat)

4) *Teruskan pemberian makanan.*

Pemberian makanan seperti semula diberikan sedini mungkin dan disesuaikan dengan kebutuhan. Makanan tambahan diperlukan pada masa penyembuhan. Untuk bayi, ASI tetap diberikan bila sebelumnya

mendapatkan ASI< namun bila sebelumnya tidak mendapatkan ASI dapat diteruskan dengan memberikan susu formula.

5) *Antibiotik bila perlu*

Sebagian besar penyebab diare adalah Rotavirus yang tidak memerlukan antibiotik dalam penatalaksanaan kasus diare karena tidak bermanfaat dan efek sampingnya bahkan merugikan penderita.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan dan Sikap

Akibat kurangnya pengetahuan Ibu terhadap perilaku hidup bersih dan sehat yang mengakibatkan resiko kejadian diare pada bayi, seperti: Faktor ibu yang dimaksudkan disini adalah kurangnya pengetahuan, sikap, tindakan dan sosial ekonomi orang tua.

1. Pengetahuan.

Pengetahuan (*knowledge*) adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga dan sebagainya). Notoatmodjo, 2010).

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai enam tingkat (Notoatmodjo, 2003) sebagai berikut :

- a. Tahu : mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya.
- b. Memahami : kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan secara benar.
- c. Aplikasi : kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi riil.
- d. Analisis : kemampuan menjabarkan materi atau komponen, tetapi masih di dalam suatu struktur organisasi tersebut.
- e. Sintesis : kemampuan untuk meletakkan atau menggabungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk kelesuluruhan yang baru.
- f. Evaluasi : kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, yaitu :

- a. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu usaha untuk menggambarkan kepribadian atau kemampuan didalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar makin mudah seseorang tersebut untuk menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang

masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkan tentang kesehatan.

b. Media Massa/ Informasi

Informasi yang diperoleh baik itu dari pendidikan formal maupun non formal dapat memberikan pengaruh jangka pendek (*immediate impact*) sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan.

Majunya teknologi akan tersedia bermacam-macam media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat tentang inovasi baru. Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain.

Dalam menyampaikan informasi sebagai tugas pokoknya, media massa memawah pula pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memerlukan landasan kognitif baru bagi terbentuknya pengetahuan terhadap hal tersebut.

c. Sosial Budaya dan Ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan.

Status ekonomi seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pengetahuan seseorang.

d. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut.

e. Pengalaman

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang kemabali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi masa lalu.

Pengalaman belajar dalam bekerja yang dikembangkan memberikan pengetahuan dan keterampilan profesional serta pengalaman belajar selama bekerja akan dapat mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang merupakan manifestasi dari keterpaduan menalar secara ilmiah dan etika yang bertolak dari masalah nyata dalam bidang bekerja.

f. Usia

Usia merupakan tahapan daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pikirannya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Pada usia madya, individu akan semakin lebih berperan aktif dalam masyarakat dan kehidupan sosial serta lebih banyak melakukan persiapan demi suksesnya upaya menyesuaikan diri menuju usia tua, selain itu orang usia madya akan lebih banyak waktu untuk membaca.

2. Sikap.

a. Pengertian

Sikap merupakan kesiapan atau kesediaan bertindak, dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap seseorang dapat diukur melalui pemahaman, pengalaman individual, pendapat atau emosi yang bersangkutan seperti senang – tidak senang, setuju – tidak setuju, baik – tidak baik, dan sebagainya (Notoadmodjo, 2005).

b. Komponen Sikap

Ada tiga komponen yang secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh yaitu:

1) Kognitif

Berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Sekali kepercayaan itu telah terbentuk

maka ia akan menjadi dasar seseorang mengenai apa yang dapat diharapkan dari objek tertentu.

2) Afektif

Menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap sesuatu objek sikap. Secara umum komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki objek tertentu.

3) Konatif

Komponen konatif atau komponen perilaku dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku dengan nyaman ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapi (Notoatmodjo, 2007).

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap tidak dapat langsung dilihat, tetapi dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. (Notoatmodjo S, 2010).

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan sikap, yaitu:

a. Pengalaman pribadi

Dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi meningkatkan kesan yang kuat. Sikap mudah terbentuk jika melibatkan faktor emosional.

b. Kebudayaan

Pembentukan sikap tergantung pada kebudayaan tempat individu tersebut didasarkan. Contoh pada sikap orang kota dan orang desa kebebasan dalam bergaul.

c. Orang lain yang dianggap penting

Orang-orang yang kita harapkan persetujuannya bagi setiap gerak tingkah laku dan opini kita, yang tidak ingin dikecewakan, dan yang berarti khusus misalnya : orang tua, pacar, suami/istri, teman dekat, guru, pimpinan umumnya individu tersebut akan memiliki sikap yang searah (konformis) dengan orang yang dianggap penting.

d. Media Massa

Media massa berupa media cetak dan elektronik. Dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulasi sosial. Sikap merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan atau perilaku.

c. Tingkatan Sikap

Berbagai tingkatan dalam pembentukan sikap yaitu :

1) Menerima

Pada tingkat ini, seseorang sadar akan kehadiran sesuatu (orang nilai perbedaan) dan orang tersebut akan menjelaskan sikap seperti mendengarkan, menghindari atau menerima keadaan tersebut.

2) Merespon

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan atau menjelaskan tugas yang diberikan sebagai sikap terhadap hal tertentu.

3) Menghargai

Sikap untuk mengajak orang lain mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah.

4) Bertanggung jawab

Rasa tanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko (Notoatmodjo, 2007).

C. Tinjauan Islam Tentang Diare

Islam merupakan agama yang begitu memperhatikan umatnya. Segala aspek kehidupan telah diatur di dalamnya. Mulai dari konsepsi sampai seseorang meninggal dunia. Semuanya terdapat di dalam Al-Qur'an termasuk mengenai penyakit, cara pengobatan, dan pencegahannya.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman membuktikan bahwa ada beberapa penyakit yang telah muncul pada waktu tertentu. Yang tidak dapat sembuh dan kemudian penderita sembuh dalam waktu yang singkat atau lama. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor personal atau sarana dan prasarana

Perlu diketahui bahwa jauh sebelumnya perkembangan ilmu dan teknologi menemukan beberapa penyakit, Islam sudah lebih dulu mengenal

beberapa penyakit, salah satunya adalah Diare adalah peningkatan volume, keenceran atau frekuensi buang air besar. Dalam kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan cairan dan elektrolit, inilah yang berfungsi menyembuhkan, mengembangkan dan menggerakkan anggota tubuh manusia sehingga dapat melanjutkan kehidupannya dipermukaan bumi ini.

Penyebab dari diare itu sendiri salah satunya adalah makanan yang dikonsumsi bisa jadi telah terjangkit virus, bakteri, atau parasit dari penyakit diare. Islam dari awal menganjurkan supaya memilih makanan yang baik-baik akan sehat sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2): 172 telah dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

Allah Swt menasehatkan kepada orang-orang mukmin ,agar memamfaatkan nikmat-nikmatnya dan agar tidak mengharapkan sesuatu tanpa dalil dan alasan, karena nikmat-nikmatnya tadi pada dasarnya diciptakan untuk mereka. Dimaklumkan bahwa rezeki Allah bukanlah untuk penyembahan perut dan pelampiasan nafsu semata, karena buah kebun ilahi adalah amal shalih, maka nikmat-nikmat Tuhan harus dimamfaatkan dijalan yang terbaik dan inilah syukur yang sejati.

Serta yang dimaksud dengan makanan yang baik-baik disini adalah makanan yang banyak mengandung gizi, tidak membuat alergi dan bukan

merupakan pantangan atau ketika dimakan akan menyebabkan sesuatu hal yang buruk terjadi pada diri manusia.

Telah ddijelaskan pula dalam Q.S Al-Maidah: 88 bahwa :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya

Mengonsumsi makanan yang halalan thayyiban sangat erat kaitannya dengan masalah iman dan takwa serta kesehatan. Keterikatan ini telah Allah tegaskan dalam Q.S Al-Maidah:88. Penggalan pertama ayat ini memerintahkan makanan yang halalan thayyiban yang telah Allah sediakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sementara penggalan kedua dari ayat ini mengingatkan agar orang-orang beriman berhati-hati dan waspada dalam memilih makanan yang hendak dikonsumsi, dan selalu berupaya meraih karunia Allah Swt pada saat mengkonsumsinya. Ayat diatas menekankan kecuali substansi materi makanan harus halalan thayyiban dan segi kehalalan dari beberapa segi.

- a. Halalan zatnya (bendanya) akan hal ini telah dijelaskan dalam ayat lain.
- b. Halalan dari mendapatkannya yaitu harta yang diperoleh untuk dikonsumsi adalah sesuai dengan ajaran yang ridhoi Allah.
- c. Tidak halal karena telah terkontaminasi dengan zat yang tidak dihalalkan dalam agama kita.

Selain makanan maka orang tua terutama ibu harus memperhatikan pemeliharaan anak dan penjagaan anak, supaya anak bisa bebas dari gangguan lain seperti masuk angin, kedinginan dll. Supaya anak terhindar dari penderitaan seperti diare.

Firman Allah SWT.


النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُودُهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.


D. Kerangka Konsep

a. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti

Berdasarkan dasar pemikiran variabel penelitian di atas, maka skema kerangka konsep penelitian tentang *Faktor Resiko Kejadian Diare Pada Bayi*.



Keterangan:



b. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara dari masalah penelitian (Sugiyono, 2008). Hipotesis penelitian (H_a) merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat (Setiadi, 2007).

Adapun hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_a : ada hubungan antara Faktor Resiko dengan kejadian diare pada bayi di RSIA Sitti Fatima Makassar 2015.

c. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

a. Pengetahuan

Pengetahuan responden terhadap angka kejadian diare pada anak adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden tentang angka kejadian diare pada anak berdasarkan jawaban dari pernyataan dalam kuesioner.

Pengetahuan responden diukur melalui 13 pernyataan. Responden yang menjawab setuju diberi skor 1 sedangkan yang menjawab tidak

setuju atau ragu-ragu diberi skor 0 sehingga skor tertinggi yang dapat dicapai responden adalah 13.

Kriteria Objektif

Baik : Jika responden mampu menjawab pertanyaan dengan benar 76-100%.

Cukup : Jika responden mampu menjawab pertanyaan dengan benar 56-75%.

Kurang : Jika responden mampu menjawab pertanyaan dengan benar \geq 55%.

b. Sikap

Sikap responden terhadap angka kejadian diare pada anak adalah tanggapan atau reaksi responden terhadap angka kejadian diare pada anak berdasarkan jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner.

Sikap responden diukur melalui 13 pertanyaan. Responden yang menjawab setuju diberi skor 1 sedangkan yang menjawab tidak setuju atau ragu-ragu diberi skor 0 sehingga skor tertinggi yang dapat dicapai responden adalah 13.

Pernyataan positif : scoring jika setuju +1 dan jika tidak setuju 0.

Pertanyaan positif terdapat pada item nomor 1,4,6,7,8,9,11,dan 13.

Pernyataan negatif : scoring jika setuju 0 dan jika tidak setuju + 1.


Pertanyaan positif terdapat pada item nomor 2,3,5,10 dan 12.

Kriteria Objektif

Baik : Jika responden mampu menjawab pertanyaan dengan benar 76-100%.

Cukup : Jika responden mampu menjawab pertanyaan dengan benar 56-75%.

Kurang : Jika responden mampu menjawab pertanyaan dengan benar \geq 55%.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut azizalimul (2007). Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk menerangkan atau menggambarkan masalah penelitian yang terjadi berdasarkan karakteristik tempat, waktu, umur, jenis kelamin, social ekonomi, pekerjaan, status perkawinan, dan lain-lain.

Dalam hal peneliti menggunakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui “gambaran tingkat pengetahuan dan sikap ibu terhadap angka kejadian diare pada anak Di Puskesmas Bontonompo II Kab. Gowatahun 2015”

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Menurut Notoadmodjo (2010), lokasi penelitian adalah tempat atau lokasi yang digunakan untuk mengembalikan sesuatu observasi.

Penelitian ini akan dilaksanakan Di Puskesmas Bontonompo II Kabupaten Gowa Tahun 2015. Lokasi ini dipilih karena kurangnya kesadaran keluarga tentang pentingnya penanganan diare pada anak. Dan penyakit ini masih menjadi ancaman bagi anak seperti halnya di Indonesia, utamanya di pedesaan dan ditinjau dari data Puskesmas Bontonompo II Kabupaten Gowa .

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah waktu atau saat yang digunakan untuk pelaksanaan penelitian atau observasi (Notoadmodjo,2010).

Penelitian ini direncanakan pada 2 november – 2 desember 2015.

C. Populasi ,Sampel, danTeknik Pengambilan Sampel.

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti (notoadmodjo,2010). Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang memiliki anak dan datang berobat di Puskesmas Bontonompo II Kabupaten Gowa tahun 2015. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 80 responden .

2. Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti atau sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi. (a.azizalimul hidayat,2007).

Sampel dalam penelitian yaitu sejumlah ibu yang datang berobat di Puskesmas Bontonompo II Kabupaten Gowa tahun 2015.

a. Kriteria Inklusi

- 1) Ibu yang membawa anaknya datang berobat di Puskesmas Bontonompo II Kabupaten Gowa tahun 2015.
- 2) Ibu yang bersedia menjadi responden.
- 3) Ibu yang sehat jasmani dan rohani.
- 4) Ibu yang dapat membaca dan menulis.

3. Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah secara “Purposive Sampling” yaitu sampel yang dipilih sesuai dengan kriteria inklusi agar relevan dengan desain penelitian sehingga memperoleh data tentang tingkat pengetahuan dan sikap ibu mengenai kejadian diare pada anak.

Dalam penelitian, sampel yang diambil harus memenuhi kriteria inklusi.

D. Metode Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini, informasi yang diperlukan melalui data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara unjangan kelokasi penelitian dan membagikan kuisioner untuk di isi sendiri oleh responden. Kuisioner yang bagikan berupa pertanyaan yang menggali pengetahuan dan sikap ibu yang datang membawa anaknya berobat di Puskesmas Bontonompo II kabupaten Gowa Tahun 2015 .

E. Penyajian Data

1. Editing

Yaitu melakukan pengecekan kembali apakah semua item pertanyaan telah terisi dan melihat apakah ada kekeliruan yang mungkin dapat mengganggu pengelolaan data selanjutnya.

2. Coding

Yaitu memberi kode berupa nomor pada lembaran kuisioner untuk memudahkan pengelolaan data.

3. Transferring

Yaitu data yang telah diberikode disusun secara berurutan dari responden pertama sampai responden terakhir untuk dimasukkan kedalam tabel sesuai dengan variabel yang diteliti.

4. Tabulating

Yaitu pengelompokan responden yang telah dibuat pada tiap-tiap variabel yang diukur dan selanjutnya dimasukkan kedalam tabel distribusi frekuensi.

Dalam penelitian ini, informasi yang didapatkan melalui data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara kunjungan kelokasi penelitian dan membagikan kuisioner untuk diisi sendiri oleh responden. Kuisioner yang dibagikan berupa pertanyaan yang menggali tentang pengetahuan dan sikap ibu tentang kejadian diare pada anak.

F. Metode Pengelolaan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan secara manual dengan menggunakan kalkulator, data dikumpulkan melalui kuisisioner dengan daftar pertanyaan pengetahuan dengan dua alternative pilihan yaitu ya/ setuju, tidak/ tidak setuju dan ragu-ragu. Data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

Untuk setiap jawaban, responden diberikan penilaian dengan system “tanda denda” dengan formula rumus sebagai berikut.

$$S=R$$

Keterangan :

S= Skor yang diperoleh

R= Jawaban yang benar

b. Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan dengan cara deskriptif dengan melihat presentase data yang terkumpul dan disajikan tabel distribusi frekuensi kemudian dicari besarnya presentase jawaban masing-masing responden dan selanjutnya dilakukan pembahasan dengan menggunakan rumus distribusi frekuensi sebagai berikut.

$$P = f/n \times 100\%$$

Keterangan :

P: presentase

F: frekuensi variabel

N: Jumlah sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang datang berobat di Puskesmas Bontonompo II kabupaten Gowa.

G. Besaran Sampel

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah populasi ibu yang datang berobat di Puskesmas Bontonompo II kabupaten Gowa, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$n = \frac{n}{1 + n(d)^2}$$

Keterangan :

N : Besar populasi

N : Besar sampel

D : Tingkat kepercayaan/ketepatan yang diinginkan

Berdasarkan rumus tersebut didapatkan bawah jumlah sampel adalah sebagai berikut

$$N = 423$$

$$d = 0,1 \quad d^2 = 0,01$$

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

$$n = \frac{423}{1 + 423 (0,01)}$$

$$n = \frac{423}{1 + 4,23}$$

$$n = \frac{423}{5,23} = 80,87$$

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Bontonompo II Gowa tanggal 02 november sampai pada 2 desember 2015. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang datang membawah anaknya untuk berobat di Puskesmas Bontonompo II Gowa periode November- desember dengan sampel 80 responden. Kuesioner dibagikan kepada 80 responden. Variabel yang diteliti adalah pengetahuan dan sikap ibu terhadap angka kejadian diare pada anak erdasarkan pendidikan, umur dan pekerjaan yang diperoleh melalui kuesioner, selanjutnya dilakukan pengolahan dan hasilnya disajikan dalam tabel distriusi frekuensi dan presentaseee sebagai berikut :

1. Distribusi frekuensi karakteristik Responden

a. Pendidikan

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Pendidikan Responden
Di Puskesmas Bontonompo
II Tahun 2015

Pendidikan	n	%
Rendah (SD/Tidak Tamat)	19	24
Menengah (SMP/SMA/Sederajat)	41	51
Tinggi (Perguruan Tinggi/Akademik)	20	25
Total	80	100

Data Primer

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 80 responden, dapat diketahui bahwa distribusi responden berdasar tingkat pendidikan rendah, yaitu pada SD/Tidak Tamat sebanyak 19 responden (24%), kemudian diikuti tamatan SMP/SMA/Sederajat sebanyak 41 responden (51%), dan tamatan Perguruan Tinggi/Akademik sebanyak 20 responden (25%).

b. Umur

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Umur Responden
Di Puskesmas Bontonompo II
Tahun 2015

Pendidikan	n	%
Remaja (<21 tahun)	5	7
Dewasa Awal (21-35 tahun)	30	37
Dewas Tengah (36-45 tahun)	45	56
Total	80	100

Data Primer

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 80 responden, dapat diketahui distribusi responden pada kelompok remaja (umur <21 tahun) adalah sebanyak 5 responden (7%), responden pada kelompok dewasa awal (umur 21-35 tahun) adalah sebanyak 30 responden (37%), responden pada kelompok umur dewasa tengah (umur 36-45 tahun) adalah sebanyak 45 responden (56%).

c. Pekerjaan

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Pekerjaan Responden
Di Puskesmas Bontonompo II
Tahun 2015

Pekerjaan	n	%
Pegawai	12	15
Wiraswasta	11	14
IRT	57	71
Total	80	100

Data Primer

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 80 responden, dapat diketahui bahwa jumlah responden dengan pekerjaan pegawai sebanyak 12 responden (15%), dan jumlah dengan pekerjaan Wiraswasta sebanyak 11 responden (14%), dan jumlah responden dengan pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 57 responden (71%).

2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Variabel Yang Diteliti
 - a. Pengetahuan ibu terhadap Angka Kejadian Diare Pada Anak di Puskesmas Bontonompo II tahun 2015.

Adapun hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Ibu terhadap Angka
Kejadian Diare Di Puskesmas Bontonompo II
tahun 2015

Pengetahuan	N	%
Baik	18	22
Cukup	26	32
Kurang	36	45
Total	80	100

Data Primer

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 80 responden ibu yang datang berobat di Puskesmas Bontonompo II terdapat 18 responden (22%) diantaranya memiliki pengetahuan baik, 26 responden (32%) diantaranya memiliki pengetahuan cukup dan 36 responden (45%) diantaranya memiliki pengetahuan yang kurang.

Tabel 4.5
Pengetahuan Responden Berdasarkan Pendidikan Terhadap
Angka Kejadian Diare Di Puskesmas Bontonompo II
Tahun 2015

Pendidikan	Pengetahuan						Total	
	Baik		Cukup		Kurang			
	N	%	N	%	N	%	N	%
Rendah	0	0%	4	21%	15	78.9%	19	100%
Menengah	6	14.6%	15	36.5%	20	48.8%	41	100%
Tinggi	12	60%	7	35%	1	5%	20	100%
Jumlah	18	22%	26	32%	36	45%	80	100%

Data primer

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 80 responden (100%) 19 responden yang berpendidikan rendah (SD/Tidak Tamat), 4 responden (21%) diantaranya memiliki pengetahuan yang cukup dan 15 responden (78.9%) diantaranya memiliki pengetahuan kurang. Dari 41 responden yang berpendidikan menengah (SMP/SMA/Sederajat), 6 responden (14.6%) diantaranya berpengetahuan baik, 15 responden (36.5%) diantaranya berpengetahuan cukup dan 20 responden (48.8%) diantaranya memiliki pengetahuan yang kurang. Dari 20 responden yang berpengetahuan tinggi, dan 12 responden (60%) diantaranya yang berpengetahuan baik, dan 7 responden (35%) diantaranya berpengetahuan cukup, 1 responden (5%) diantaranya berpengetahuan kurang.

Tabel 4.6
Pengetahuan Responden Berdasarkan Umur Terhadap
Angka Kejadian Diare Di Puskesmas Bontonompo II
Tahun 2015

Umur	Pengetahuan						Total	
	Baik		Cukup		Kurang			
	N	%	N	%	N	%	N	%
Remaja	0	0%	0	0%	5	100%	5	100%
Dewasa Awal	6	20%	12	40%	12	40%	30	100%
Dewasa Tengah	12	27%	14	31%	19	42%	45	100%
Jumlah	18	22%	26	32%	36	45%	80	100%

Data primer

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 5 responden (100%) pengetahuan berdasarkan umur kelompok Remaja (umur >21 tahun), 5 responden (100%) diantaranya memiliki pengetahuan kurang. Sedangkan dari 30 responden (100%) pada kelompok Dewas Awal (umur 22-35 tahun), 6 responden (20%) yang memiliki pengetahuan baik, 12 responden (40%) yang memiliki pengetahuan cukup, dan 12 responden (40%) yang memiliki pengetahuan yang kurang. Dari 45 responden pada kelompok Dewas Tengah (umur 36-45 tahun), 12 responden (27%) yang memiliki pengetahuan baik, 14 responden (31%) yang memiliki pengetahuan cukup, 19 responden (45%) yang memiliki pengetahuan yang kurang.

Tabel 4.7
Pengetahuan Responden Berdasarkan Pekerjaan Terhadap
Angka Kejadian Diare Di Puskesmas Bontonompo II
Tahun 2015

Pekerjaan	Pengetahuan						Total	
	Baik		Cukup		Kurang			
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pegawai	4	33.3%	5	41,7%	3	25%	12	100%
Wiraswasta	3	27.2%	6	54.6%	2	18.1%	11	100%
IRT	11	19.3%	15	26.3%	31	54.3%	57	100%
Jumlah	18	22%	26	32%	36	45%	80	100%

Data primer

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 80 responden (100%) yang memiliki pekerjaan Pegawai 12 responden (100%), 4 responden (33.3%) diantaranya berpengetahuan baik, 5 responden (41.7%) diantaranya berpengetahuan cukup, dan 3 responden (25%) dengan pengetahuan kurang. 11 responden (100%) yang memiliki pekerjaan Wiraswasta , 3 responden (27.2%) dengan pengetahuan baik, 6 responden (54.6%) diantaranya berpengetahua cukup dan 2 responden (18.1%) diantaranya berpengetahuan kurang. Dan 57 responden (100%) yang memiliki pekerjaan IRT (ibu rumah tangga), 11 responden (19.3%) dengan pengetahuan baik, 15 responden (26.3%) diantaranya berpengetahuan cukup, dan 31 resppondenn (54.3%) diantaranya berpengetahuan kurang .

b. Sikap ibu terhadap Angka Kejadian Diare Pada Anak di Puskesmas Bontonompo II tahun 2015.

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Sikap Ibu terhadap Angka Kejadian Diare Di Puskesmas Bontonompo II tahun 2015

Sikap	N	%
Baik	29	36
Cukup	33	41
Kurang	18	22
Total	80	100

Data Primer

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 80 responden, 29 resonden (36%) yang memiliki sikap baik, sedangkan 33 responden (41%)

yang memiliki sikap yang cukup, 18 responden (22%) yang memiliki sikap yang kurang.

Distribusi Frekuensi sikap berdasarkan karakteristik responden adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Sikap Responden Berdasarkan Pengetahuan Terhadap Angka Kejadian Diare Di Puskesmas Bontonompo II Tahun 2015

Pendidikan	Sikap						Total	
	Baik		Cukup		Kurang			
	N	%	N	%	N	%	N	%
Rendah	0	0%	9	47%	10	53%	19	100%
Menengah	14	34%	20	49%	7	17%	41	100%
Tinggi	15	75%	5	20%	1	5%	20	100%
Jumlah	29	46%	33	41%	18	22%	80	100%

Data primer

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 19 responden yang berpendidikan rendah (SD/Tidak Tamat), 9 responden (47%) diantaranya memiliki sikap yang cukup dan 10 responden (53%) diantaranya memiliki sikap yang kurang. Dari 41 responden yang berpendidikan menengah (SMP/SMA/Sederajat), 14 responden (34%) diantaranya memiliki sikap baik, 20 responden (49%) diantaranya memiliki sikap cukup dan 7 responden (17%) diantaranya memiliki sikap yang kurang. Dari 20 responden yang berpendidikan tinggi, 15 responden (75%) diantaranya

yang memiliki sikap baik dan 4 responden (20%) diantaranya yang memiliki sikap cukup, 1 responden (5%) diantaranya memiliki sikap yang kurang.

Tabel 4.10
Distribusi Frekuensi Sikap Responden Berdasarkan Umur
Terhadap Angka Kejadian Diare Di Puskesmas Bontonompo II
Tahun 2015

Umur	Sikap						Total	
	Baik		Cukup		Kurang			
	N	%	N	%	N	%	N	%
Remaja	0	0%	3	60%	2	40%	5	100%
Dewasa Awal	10	33.3%	16	53.3%	4	13.3%	30	100%
Dewasa Tengah	19	42%	14	31%	12	27%	45	100%
Jumlah	29	36%	33	41%	18	22%	80	100%

Data primer

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 5 responden sikap berdasarkan umur pada kelompok remaja (umur >21 tahun), 3 responden (60%) diantaranya memiliki sikap cukup, 2 responden (40%) diantaranya memiliki sikap kurang. Sedangkan dari 30 responden pada kelompok dewasa Awal (umur 22-35 tahun), 10 responden (33.3%) yang memiliki sikap baik, dan 16 responden (53.3%) yang memiliki sikap yang cukup, dan 4 responden (13.3%) yang memiliki sikap yang kurang. Dan dari 45 responden (100%) pada kelompok Dewasa Tengah (umur 36-45 tahun), 19 responden (42%) yang memiliki sikap yang baik, 14 responden (31%)

yang memiliki sikap cukup , 12 responden (27%) yang memiliki sikap yang kurang.

Tabel 4.11
Distribusi Frekuensi Sikap Responden Berdasarkan Pekerjaan Terhadap Angka Kejadian Diare Di Puskesmas Bontonompo II Tahun 2015

Pekerjaan	sikap						Total	
	Baik		Cukup		Kurang			
	N	%	N	%	N	%	N	%
Pegawai	7	58%	4	33%	1	9%	12	100%
Wiraswasta	5	45.5%	5	45.5%	1	9%	11	100%
IRT	18	32%	24	42%	15	26%	57	100%
Jumlah	29	36%	33	41%	18	22%	80	100%

Data primer

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 12 responden yang memiliki pekerjaan Pegawai , 7 responden (58%) diantaranya memiliki sikap baik, 4 responden (33%) diantaranya memiliki sikap yang cukup, dan 1 responden (9%) diantaranya yang memiliki sikap kurang. 11 responden (100%) yang memiliki pekerjaan Wiraswasta, 5 responden (45.5%) yang memiliki sikap baik, 5 responden (45.5%) yang memiliki sikap cukup, 1 responden (9%) yang memiliki sikap kurang. Dari 57 responden (100%) yang memiliki pekerjaan IRT (ibu rumah tangga), 18 responden (32%) dengan yang memiliki sikap baik, 24 responden (42%) yang memiliki sikap cukup, 15 responden (26%) yang memiliki sikap kurang.

B. Pembahasan

1. Pengetahuan responden terhadap angka kejadian diare pada anak.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pengetahuan ibu terhadap angka kejadian diare pada anak masih rendah. Hal ini terlihat pada hasil kuesioner 80 responden terhadap 38 responden (47%) yang menjawab dengan hasil kurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Najamuddin Andi Paloncoi (2014) dapat terlihat bahwa hubungan pengetahuan dengan kejadian diare dari 40 responden didapatkan responden yang berpengetahuan baik berjumlah 12 (30,0%) responden, sedangkan yang pengetahuannya cukup berjumlah 21 (52,5%) responden, dan yang pengetahuannya kurang berjumlah 7 (17,5%) responden.

Menurut penelitian, tingkat pengetahuan yang rendah menyebabkan ibu tidak mengerti cara penanganan diare pada anak. Hal ini disebabkan karena mereka cenderung malas untuk melakukan sesuatu hal seperti mencari informasi atau mengikuti penyuluhan kesehatan yang diberikan oleh petugas kesehatan. Hasil penelitian kurang terhadap kejadian diare pada anak ini disebabkan karena responden hanya sebatas tahu dan belum sampai memahami, mengaplikasikan, menganalisa, mensintesis, dan mengevaluasi terhadap suatu materi yang berkaitan dengan kejadian diare.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartati Rauf, Dkk (2013). Yang hanya menggunakan dua skala yaitu cukup dan kurang dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dari 31 responden,

terhadap 21 orang (67,7%) responden memiliki pengetahuan yang cukup terhadap kejadian diare dan dari data tersebut terdapat 18 orang (58,1%) responden yang mengalami diare tanpa dehidrasi dan 3 orang (9,7%) responden lainnya mengalami dehidrasi . sedangkan responden yang memiliki pengetahuan yang kurang terhadap kejadian diare tercatat sebanyak 10 orang (32,3%) responden yang diantaranya 2 orang (6,5%) responden yang mengalami diare tanpa dehidrasi dan 8 orang (25,8%) responden lainnya mengalami dehidrasi.

Dari penelitian ini yang menunjukkan bahwa ibu yang memiliki pengalaman menangani diare dengan dehidrasi memiliki pengetahuan yang cukup dibanding dengan ibu yang tidak pernah menangani diare dengan dehidrasi.

Selain itu minimnya pengetahuan responden tentang kejadian diare pada anak disebabkan karena beberapa faktor seperti tingkat pendidikan ibu. Hal ini terlihat pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 80 responden, terdapat 15 responden (78.9%) yang memiliki pendidikan rendah dan memiliki pengetahuan kurang serta yang memiliki pendidikan tinggi terdapat 1 (5%) responden yang memiliki pengetahuan kurang.

Hasil ini menunjukkan bahwa ibu yang memiliki pengetahuan tentang diare pada kategori baik dengan kejadian diare lebih rendah, dari pada ibu yang memiliki pengetahuan kurang dengan kejadian diare yang memberi indikasi, bahwa ibu yang memiliki pemahaman/pengetahuan tentang kejadian diare akan menjadi dasar terhadap terbentuknya sikap dengan kiat-kiat ibu

dalam pencegahan dan penanggulangan diare pada anak, sehingga tidak mengalami dehidrasi. Sedangkan kurangnya pemahaman yang dimiliki ibu tentu akan memenuhi kesulitan dalam rangka mencegah dampak lebih lanjut terhadap diare yang tidak mendapatkan penanganan secara lengkap yaitu dehidrasi dan dampak lanjut lagi adalah kematian pada anak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ibu yang memiliki pengetahuan dalam kategori kurang sebanyak 36 orang (45%) angka ini memberikan indikasi bahwa sebagian besar masyarakat khususnya wilayah kerja puskesmas Bontonompo II belum memperoleh pemahaman yang baik terhadap diare yang tertentu dapat berindikasi bahwa upaya penyebaran informasi tentang diare kepada masyarakat belum dapat dikaitkan merata secara maksimal.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan dan harus diperoleh semua umat manusia. Karena semakin tinggi pendidikan seseorang tersebut menerima dan segala bentuk informasi sehingga akan memperluas informasi yang dimilikinya. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang banyak dan luas, akan semakin baik pula dalam menjalani hidup sehat, terutama pada ibu yang akan memperhatikan kebutuhan keluarganya. (Budiman dan riyanto,2013).

Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya, (Budiman Riyanto,2013).

Selain pendidikan, usia juga mempengaruhi pendidikan seseorang, seperti yang terlihat pada hasil penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa seluruh responden memiliki pengetahuan kurang. Dan pada kelompok umur dewasa tengah (36-45 tahun) diantaranya memiliki pengetahuan yang kurang sebanyak 19 responden (42%).

Umur yang terlalu muda biasanya belum siap untuk memiliki anak sehingga dia tidak ada minat untuk mencari informasi yang berkaitan dengan anaknya. Umur juga mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperoleh semakin membaik. Apabila mereka yang usianya sudah tua dan punya banyak anak, sebagian akan berfikir bahwa bukan lagi saatnya bagi mereka untuk belajar, mereka hanya fokus mengurus keluarga. (Natoatmodjo soekidjo.2010).

Pekerjaan ibu juga dapat mempengaruhi pengetahuan ibu tentang pentingnya angka kejadian diare pada anak. Pekerjaan ibu yang mayoritas bekerja sebagai IRT (ibu rumah tangga) yang sibuk mengurus kebutuhan rumah tangga tanpa sempat mencari informasi kesehatan. Menyebabkan rendahnya pengetahuan sebagaimana terlihat pada tabel hasil penelitian, sebanyak 31 responden (54%) bekerja sebagai IRT.

Wanita yang bekerja bukan lagi hal yang baru, meningkatnya kesempatan belajar bagi kaum wanita membuka peluang pula bagi mereka untuk bekerja di luar rumah. Sebagain wanita yang bekerja di luar rumah bertujuan menambah pendapatan keluarga sehingga akan lebih muda menggunakan media yang lebih canggih untuk mendapatkan informasi. Wanita yang bekerja diluar rumah juga akan lebih banyak mendapatkan

informasi dari orang lain sekitar dibanding wanita yang hanya mengabdikan diri untuk keluarganya. (Ahmad,Syafiq,Ir.Dkk.2010).

Faktor ini juga disebabkan karena kurangnya kesadaran seseorang untuk mencari tahu akan pentingnya pengetahuan tentang kejadian diare pada anak yang dapat diperoleh dari berbagai media seperti informasi dari tenaga kesehatan , khususnya bidan, cerita dari orang lain, maupun informasi dari media massa seperti televisi, radio, Koran ataupun majalah. Lebih banyak responden yang tingkat pengetahuan kurang karena kurangnya informasi dari tenaga kesehatan maupun media massa misalnya dengan memberikan penyuluhan. (Natoatmodjo soekidjo. 2010).

2. Sikap responden terhadap kejadian diare pada anak

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 80 responden, 29 responden (36%) yang memiliki sikap baik, sedangkan 33 responden (41%) yang memiliki sikap yang cukup, 18 responden (22%) yang memiliki sikap kurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Arianti (2013), diperoleh hasil yaitu gambaran sikap ibu mengenai program STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) terhadap kejadian diare menunjukkan hasil 45 orang (45,0%) memiliki sikap buruk, 30 orang (30,0%) memiliki sikap sedang, dan 25 orang (25,0%) memiliki sikap baik. Penelitian menunjukkan bahwa ibu yang memiliki sikap baik mengenai program STBM terhadap kejadian diare paling

banyak ditemui pada kelompok umur 26-35 tahun, pada tingkat pendidikan SMA atau sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa ibu yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai, selain dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengetahuan juga dipengaruhi oleh informasi yang didapat. Penyampaian informasi ini salah satunya dilakukan dengan metode penyuluhan (Hartati Rauf dkk, 2013)

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartati Rauf dkk, 2013. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa dari 31 responden, terdapat 18 orang (58,1%) responden memiliki sikap yang positif terhadap kejadian diare dan dari data tersebut terdapat 17 orang (54,8%) responden yang mengalami diare tanpa dehidrasi dan 1 orang (3,2%) responden lainnya mengalami dehidrasi. Sedangkan responden yang memiliki sikap yang negatif terhadap kejadian diare tercatat sebanyak 13 orang (41,9%) responden yang diantaranya 3 orang (9,7%) responden yang mengalami diare tanpa dehidrasi dan 10 orang (32,3%) responden lainnya mengalami dehidrasi. Hal ini menunjukkan bahwa sikap yang positif sangat perlu ditanamkan dalam diri untuk membentuk suatu tindakan yang positif pula di mana dapat terlihat dari hasil penelitian bahwa sikap positif dapat mencegah terjadinya diare dengan dehidrasi. Perbedaan yang terlihat di antara penelitian Hartati Rauf dkk, (2013) yaitu dengan penelitian yang menggunakan kriteria objektif ada 2 yaitu kategori positif dan negatif.

Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa pengetahuan ibu terhadap angka kejadian pada anak masih rendah. Hal ini selaras dengan hasil

penelitian dengan menggunakan kuisioner, 80 responden (100%) terdapat 38 responden (47%) yang menjawab dengan hasil kurang. Berbeda dengan sikap yang didapat dari hasil penelitian dimana ibu memiliki sikap terhadap kejadian diare pada anak mendapatkan hasil cukup. Hal ini terlihat dari hasil penelitian dengan 80 responden (100%), terdapat 33 responden (41%) yang menjawab cukup.

Sikap ibu tentang kejadian diare pada anak berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwa dari 19 responden yang berpendidikan rendah (SD/Tidak Tamat), 10 responden (53%) diantaranya memiliki sikap yang kurang. Dari 41 responden yang berpendidikan menengah (SMP/SMA/Sderajat), 20 responden (49%) diantaranya memiliki sikap cukup dan 7 responden (17%) diantaranya memiliki sikap yang kurang. Dari 20 responden yang berpendidikan tinggi, 15 responden (57%) diantaranya yang memiliki sikap baik dan 1 responden (5%) diantaranya memiliki sikap kurang.

Kemudian berdasarkan umur menunjukkan bahwa 5 responden sikap berdasarkan umur pada kelompok remaja (umur > 21 tahun), 3 responden (60%) di antaranya memiliki sikap yang cukup. Dewasa Awal (umur 22-35 tahun), 14 responden (31%) memiliki sikap yang cukup. Dan dari 45 responden pada kelompok Dewasa Tengah (umur 36-45 tahun), 19 responden (42%) yang memiliki sikap baik.

Berdasarkan pekerjaan menunjukkan bahwa dari 12 responden yang memiliki pekerjaan Pegawai, 7 responden (58%) diantaranya memiliki sikap

baik, dan hanya ada 1 responden (9%) diantaranya yang memiliki sikap kurang. Dari 57 responden (100%) yang memiliki pekerjaan IRT (ibu rumah tangga), 18 responden (32%) dengan yang memiliki sikap baik, 24 responden (42%) yang memiliki sikap cukup, 15 responden (26%) yang memiliki sikap kurang.

Menurut peneliti, sikap yang cukup yang ditunjukkan oleh responden ini membuktikan bahwa meskipun responden kurang mengetahui tentang kejadian diare pada anak namun mereka memberikan respon yang baik. Hal ini disebabkan karena faktor kebudayaan yang masih sangat erat terhadap keturunan, yaitu mereka yang mengikuti perilaku dari ajaran yang diberikan oleh orang tua untuk atau orang yang terdekatnya meskipun kurang mengetahui mamfaat dan kegunaanya.

Sikap merupakan respon atau reaksi evaluative, respon ini muncul ketika individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi balik dari individu. Sikap dinyatakan timbul secara sadar oleh proses evaluasi dari individu terhadap respon dalam nilai baik, buruk, positif, negative, menyenangkan kemudian menetapkan dan mengkeristal sebagai dasar potensi untuk bereaksi. (Natoatmodjo S,2010).

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Menifestasi sikap tidak dapat langsung dilihat, tetapi dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari prilaku (Natiatmodjo S, 2010).

Sikap pada penelitian ini adalah kehendak ibu yang diukur berdasarkan pernyataan yang diberikan tentang sikap baik, cukup, maupun kurang terhadap kejadian diare pada anak yang mencakup keadaan diare berupa tindakan pertama terdapat diare melalui pemberian obat standar tentang penyebab diare.

Beberapa aspek penilaian sikap tersebut akan memberikan gambaran tentang kemampuan ibu untuk melaksanakan penanganan diare dengan cepat dan tepat sehingga akan mengurangi dampak lebih besar dari diare yang tidak mendapatkan penanganan dengan segera.

Sikap terhadap kejadian diare pada anak merupakan kehendak dari individu untuk melaksanakan suatu penanganan dalam rangka penanggulangan diare. Namun sikap belum sampai pada tingkat aplikasi pelaksanaan penanganan tersebut. Sikap ibu yang kurang terhadap kejadian diare pada anaknya biasanya didasarkan atas pengetahuan yang kurang dimiliki ibu tentang penanganan diare secara cepat dan tepat. Sebagaimana diketahui bahwa dalam upaya pembentukan sikap harus didasarkan atas adanya pemahaman yang lebih mendalam dari individu atau objek dan begitu pula pada ibu dalam rangka pencegahan atau penanganan diare harusnya dilandasi dengan pengetahuan tentang diare.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. 22% responden dengan pengetahuan baik, 32% responden dengan pengetahuan cukup, dan 45% responden dengan pengetahuan kurang.
2. 36% responden memiliki sikap yang baik, 41% responden memiliki sikap yang cukup, dan 22% responden yang memiliki pengetahuan kurang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Saran penulis agar ibu-ibu yang datang berobat di Puskesmas lebih mengetahui tentang kejadian diare pada anak. Para ibu dapat mencari informasi tentang apa-apa saja yang harus dilakukan saat anak terkena diare.
2. Diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitiannya ini dengan metode penelitian yang berbeda, variabel yang berbeda, jumlah populasi dan sampel yang lebih banyak sehingga diperoleh hasil yang lebih baik .
3. Ibu harus bisa mengetahui cara penanganan diare agar dapat melakukan pertolongan pertama pada saat anak diare

4. Instansi kesehatan diharapkan dapat mengupayakan peningkatan pelayanan khususnya konseling/penyuluhan tentang cara penanganan diare sehingga dapat membantu menekan angka kejadian diare maupun morbiditas dan mortalitas pada anak.



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan terjemahan

Ahmad, Syafiq, Ir. Dkk. *Gizi dan Kesehatan Masyarakat*. Rajawali Pers. Cet ; 5. Jakarta, 2010

Asuhan Keperawatan Anak/ Kartika Sri Wijayaningsih, S.kep.,Ners; jakarta: TIM, 2013

Asuhan Keperawatan pada Anak. Suriadi, Skp,MSN & Rita,Skp,M.Psi, 2010

Andarmoyo Sulistyio & Isro'in Laily (2012) *Peronal Hygiene Konsep*, proses dan Aplikasi Dalam Peraktik keperawatan. Graha Ilmu: Jakarta.

Amin,Rahadi. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Diare pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Borong Lompo Kecamatan Ujung Tanah Tahun 2012. [Skripsi]. Makassar : Unhas; 2012

Budiman & Riyanto, 2013. Kapita Selekta Kuesioner Pengetahuan Dan Sikap Dalam Penelitian Kesehatan.

Buletin Jendela Data Informasi Kemenkes RI.PDF,2011

Corwin, Elizabeth J. Patofisiologi: buku saku/ Elizabeth J. Corwin; alih bahasa, Nike Budhi Subekti; editor edisi bahasa Indonesia, Egi Komara Yudha ... [et al.] –Ed.3. – jakarta : EGC, 2009

Deliana 2014, *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Pengetahuan tentang Diare Pada Anak Usia Sekolah Di TK Nur Inayah Gowa. Skripsi Tidak Diterbitkan. Samata:Program Studi Keperwatan Fakultas Kesehatan.*

Depkes RI. *Buku acuan pelatihan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar*. Jakarta: Depkes; 2007. h. 9-1-9-12

Dinkes sulse; 2013. Dalam *Skripsi Kadaruddin,2012. Faktor yang berhubungan dengan kejadian diare pada bayi di wilayah Puskesmas Palangga Kabupaten Gowa.*

Dinkes Gowa;2014. Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa (online)

Dinas Kesehatan Bandar Lampung,2013. (online) <http://Www.dinkes-bandarlampung.go.id>.

Eka,Dkk. Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Angka Kejadian Diare Akut pada Bayi Usia 0-1 Tahun di Puskesmas Kuranji Kota Padang.2013; *Jurnal Kesehatan Andalas*.2013;2(2)

Kemenkes RI.Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan.Jakarta. Triwulan II;2011.

Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan. Dr. Saryono-Mekar Dwi Anggraeni, M.kep,2013

Notoatmodjo S. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta; 2010.

Notoatmodjo, Sukidjo. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. PT.Rineka Cipta:Jakarta

Notoatmodjo, Sukidjo. *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasinya*. PT.Asdi Mahasatya: Jakarta ,2005

Pengantar Ilmu Keperawatan Anak/A. Aziz Alimul Hidayat-Cetakan ketiga-jakarta:Salemba Medika,2008

Prawirohardjo S. *Buku acuan nasional pelayanan kesehatan maternal dan neonatal*. Jakarta: YBP-SP; 2009. h. 347-369

Prawirohardjo S. *Ilmu kebidanan*. Jakarta: BP-SP; 2011.

Rahadi E B. Hubungan Sanitasi Rumah dengan Kejadian Diare di Desa Penganjaran Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Tahun 2005. [Online jurnal]2005; [Diakses 07 april 2014]. Available at: [Http//etd.library.ums.ac.id/ekobagusara-9071](http://etd.library.ums.ac.id/ekobagusara-9071).

Umiati. Hubungan Antara Sanitasi Lingkungan dengan Kejadian Diare pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2009. [skripsi] Surakarta:UMS; 2010.

Wawan & Dewi,2011. *Teori Pengukuran Pengetahuan Dan Perilaku Manusia*. Medical Book. Niha Medika: Yogyakarta.

dr. Widoyono, MPH. *Penyakit tropis edisi kedua*. Semarang, April 2011.

Wijaya,Yulianto. Faktor Resiko Kejadian Diare Balita di Sekitar TPS Banaran Kampus UNNES. [online journal] 2012; unnes journal of Publik health 2 (1) (2012). [diakses 08 april 2014]. Available at:<http://journal.unnes.ac.is/sju/index.php/ujph>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ASNIDAR panggilan Andi Nidar lahir di Bontobaju 05 November 1993 dari pasangan suami istri Bapak Andi Bahtiar Syahrir dan Ibu Sukma.

Peneliti adalah anak pertama dari 2 bersaudra.

Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di Madrasa Ibtidaiyah Lonrong Kabupaten Kota Bulukumba pada tahun 2006. Pada tahun itu juga peneliti kemudian melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 4 BontoBulaeng Kabupaten Kota Bulukumba dan selesai pada tahun 2009, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMK Keperawatan Gafur Yahya Kabupaten Kota Bulukumba dan selesai pada tahun 2012. Peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) pada Program Studi DIII Kebidanan. Peneliti menyelesaikan kuliah diploma pada tahun 2016.

KUESIONER

GAMBARAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU TERHADAP KEJADIAN DIARE PADA ANAK DI PUSKESMAS BONTONOMPO II KABUPATEN GOWA TAHUN 2015

A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Responden :
2. Alamat Responden :
3. Umur Responden :
 - a) < 20 tahun
 - b) 21-30 tahun
 - c) 31-40 tahun
 - d) 41-50 tahun
 - e) >50 tahun
4. Pendidikan formal terakhir :
 - a) Tidak sekolah/ tidak tamat SD
 - b) Sekolah Dasar/ sederajat
 - c) Sekolah Menengah Pertama/ sederajat
 - d) Sekolah menengah Atas / sederajat
 - e) Perguruan Tinggi/ akademik
5. Pekerjaan Responden :
 - a) Pegawai Negeri/TNI/POLRI
 - b) Pegawai swasta
 - c) Wiraswasta/pedagang
 - d) Petani/Buruh
 - e) IRT (ibu rumah tangga)
 - f) Tidak bekerja
 - g) Lain-lain.

B. KUESIONER PENGETAHUAN

Keterangan :

B=BENAR

S= SALAH

No	PERTANYAAN	B	S
1.	Diare adalah keadaan frekuensi buang air besar lebih dari empat kali dengan konsistensi kotoran encer		
2.	Penyakit diare merupakan penyakit pada system pencernaan		
3.	Gejala dari penyakit diare adalah buang air besar lebih dari 4 kali dengan konsistensi cair disertai mual muntah, kurang nafsu makan dan gelisah.		
4.	Penyakit diare akut disebabkan oleh virus, bakteri, makanan yang kurang sehat atau alergi terhadap makanan.		
5.	Makanan yang bisa dapat menyebabkan timbulnya penyakit diare		
6.	Selain makanan, alat makan yang dihadapkan lalat atau telah terkontaminasi dengan kotoran penderita diare, dapat menjadi salah satu cara penularan diare.		
7.	Menjaga kebersihan diri dan makanan tetapi buang air disembarang tempat merupakan salah satu cara pencegahan diare		
8.	Mengganti cairan elektrolit (oralit) tubuh yang hilang sangat penting bagi penderita diare		
9.	Bila tidak tahu cara membuat Oralit buatan, dapat diganti dengan air rebusan jambu biji		
10.	Menentukan tingkat kehilangan cairan (dehidrasi) pada anak dapat dilihat dari berapa kali anak buang air dalam 1 hari, dan penurunan berat badab anak.		
11.	Bila diare menyebabkan kehiilangan banyak cairan (dehidrasi) berat yang disertai muntah darah, lemas, suhu badan meningkat, tidak dapat lagi mencerna makanan yang diberikan, maka dapat menyebabkan kematian jika tidak segera ditangani secara serius		

12.	Pada saat anak terkena diare, pemberian ASI harus segera dihentikan.		
13.	Bila anak muntah pada saat diberikan oralit, hentikan pemberian oralit.		

C. KUESIONER SIKAP

No	PERTANYAAN	S	TS
1.	Diare harus segera ditangani		
2.	Penanganan awal diare harus dilakukan ditempat pelayan kesehatan		
3.	Anak diare harus segera diberikan obat antibiotic		
4.	Memberikan cairan gula ditambahkan garam sedikit (Oralit buatan) dapat membantu mengganti cairan dalam tubuh		
5.	Sikap yang baik untuk mencegah terjadinya diare yaitu dengan memberikan susu formula dan menghentikan pemberian ASI		
6.	Menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu cara pencegahan diare		
7.	Salah satu faktor hilangnya cairan dalam tubuh adalah diare		
8.	Menjaga kebersihan diri, makanan, lingkungan, dapat mencegah terjadinya diare		
9.	Pemberian makanan harus dihentikan / dikurangi pada anak yang mengalami diare dan lebih banyak memberikan asupan air saja		
10.	Hentikan pemberian oralit pada saat anak muntah, dan berikan air tajian		
11.	Diare pada dilakukan melalui tinja,udara, tangan dan makanan		

12.	Makanan yang bersoda, mengandung banyak lemak dan mengandung pemanis buatan diberikan oleh anak penderita diare		
13.	Pemberian susu formula pada anak yang menderita diare harus segera dihentikan.		



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

	Responden	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Nomor Urut Soal													Skor Soal	%	Tingkat Pengetahuan		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			Baik	Sedang	Kurang
1	Ny"H	42	SMP	IRT	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	6	46			√
2	Ny"R"	17	SD	IRT	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	6	46			√
3	Ny"F"	27	SMP	WIRASWAT/	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	8	62			√	
4	Ny"H"	26	SMA	IRT	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	9	69			√	
5	Ny"S"	18	SMP	IRT	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	6	46			√	
6	Ny"S"	38	PT	PEGAWAI	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10	77			√	
7	Ny"S"	39	SMP	WIRASWAT/	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	85			√	
8	Ny"L"	27	SD	IRT	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	7	54			√	
9	Ny"S"	29	SD	WIRASWAT/	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	7	54			√	
10	Ny"H"	36	PT	IRT	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	8	62			√	
11	Ny"K"	27	SMP	IRT	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	7	54			√	
12	Ny"H"	18	SD	IRT	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	5	38			√	
13	Ny"M"	29	PT	PEGAWAI	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10	77			√	
14	Ny"A"	19	SD	IRT	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	4	31			√	
15	Ny"M"	28	PT	PEGAWAI	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	85			√	
16	Ny"S"	29	SMP	IRT	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9	69			√	
17	Ny"H"	37	PT	PEGAWAI	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	9	69			√	
18	Ny"A"	28	SMA	IRT	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8	62			√	
19	Ny"H"	37	SMA	IRT	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10	77			√	
20	Ny"M"	39	SMA	IRT	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	7	54			√	
21	Ny"M"	40	SMA	WIRASWAT/	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	77			√	
22	Ny"H"	37	SD	IRT	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	7	54			√	
23	Ny"H"	36	SD	IRT	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	7	54			√	
24	Ny"N"	18	SD	IRT	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	6	46			√	
25	Ny"N"	27	SMP	IRT	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	9	69			√	
26	Ny"H"	29	SMP	IRT	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	6	46			√	
27	Ny"K"	38	SD	IRT	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	6	46			√	
28	Ny"M"	28	SMA	IRT	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	6	46			√	
29	Ny"J"	37	SMP	IRT	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	6	46			√	
30	Ny"H"	39	SMA	IRT	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	8	62			√	
31	Ny"K"	40	SD	IRT	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	4	31			√	
32	Ny"R"	27	SMP	IRT	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9	69			√	
33	Ny"N"	29	PT	IRT	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	8	62			√	
34	Ny"M"	31	PT	PEGAWAI	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10	77			√	
35	Ny"S"	37	PT	PEGAWAI	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	8	62			√	
36	Ny"S"	36	PT	PEGAWAI	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9	69			√	
37	Ny"A"	36	SMA	IRT	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	4	31			√	
38	Ny"K"	30	SMP	IRT	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	7	54			√	
39	Ny"S"	26	SMP	IRT	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	8	62			√	
40	Ny"R"	36	PT	IRT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10	77			√	
41	Ny"S"	39	PT	PEGAWAI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	10	77			√	
42	Ny"H"	40	SMA	IRT	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8	62			√	
43	Ny"S"	38	PT	PEGAWAI	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10	77			√	
44	Ny"J"	38	SD	IRT	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	4	31			√	
45	Ny"S"	26	SMA	IRT	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9	69			√	
46	Ny"S"	37	SMP	IRT	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	85			√	
47	Ny"A"	37	PT	IRT	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	10	77			√	

