

**GAMBARAN KEBIASAAN MEROKOK PADA MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN
MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Keperawatan (S.Kep) Pada Jurusan Keperawatan
Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MUSH'AB IBNU MUNIR

70300105021

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
MAKASSAR
2010**

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
1. Tujuan Umum	7
2. Tujuan Khusus	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A Tinjauan Umum Tentang Kebiasaan.....	9
B Tinjauan Umum Tentang Merokok.....	10
C Tinjauan Umum Tentang Kebiasaan Merokok.....	15
D Tinjauan Tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebiasaan Merokok.....	18
E Tinjauan Tentang Dampak Merokok.....	18
BAB III KERANGKA KONSEP	33
A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti.....	33
B. Kerangka Konsep Penelitian	34

C.	Jenis Variabel	35
D.	Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	35
BAB IV	METODE PENELITIAN	36
A.	Jenis Penelitian	36
B.	Lokasi Penelitian	36
C.	Populasi dan Sampel	36
D.	Kriteria Sampel	36
E.	Instrumen Penelitian	37
F.	Prosedur Pengambilan Data	37
G.	Analisis Data	37
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A.	Hasil Penelitian	38
B.	Pembahasan	53
	PENUTUP	59
A.	Kesimpulan	59
B.	Saran	59
	DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Nama : Mush'ab Ibnu Munir

NIM : 70300105021

Jurusan : Keperawatan

Judul : Gambaran Kebiasaan Merokok Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Merokok merupakan masalah kesehatan masyarakat yang terus meningkat. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dan sikap acuh dari pecandu rokok akan dampak merokok terhadap kesehatannya. Ada banyak alasan dan faktor-faktor mengapa kebiasaan merokok tetap bertahan. Faktor-faktor tersebut dapat digolongkan dalam faktor psikologik, faktor fisiologik, dan intervensi yang belum memadai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kebiasaan merokok berdasarkan alasan dan faktor-faktor mengapa kebiasaan merokok tetap bertahan pada mahasiswa. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif survey. Populasinya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar khususnya angkatan 2007, 2008, 2009.

Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan diketahui bahwa rasa ingin tahu merupakan alasan terbesar responden yang mendasari alasan pertama kali merokok, berdasarkan orang yang pertama kali mengajak merokok teman merupakan pilihan terbanyak yang mempengaruhi responden merokok, kemudian dari hasil gambaran kebiasaan merokok berdasarkan kondisi saat responden sangat membutuhkan rokok yaitu ketika berkumpul bersama teman, yang menjadi motivasi terbesar responden untuk merokok adalah tingginya rasa penasaran mereka untuk mencoba rokok, sakit kepala merupakan keluhan yang paling sering dialami responden ketika tidak merokok, berdasarkan hasil penelitian, meningkatnya kepercayaan diri responden merupakan efek terbesar yang mereka peroleh dari merokok.

Kata kunci : Kebiasaan Merokok, Mahasiswa Perokok.

KATA PENGANTAR

Segala Puji hanya bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami haturkan atas segala Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga tugas skripsi ini dapat kami selesaikan.

Ketika hendak memulai sampai akhir penyusunan Skripsi ini, Terus memanjatkan doa semoga dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik, walaupun banyak halangan dan rintangan, tetapi berkat kekuatan yang diberikan-Nya Alhamdulillah skripsi ini mampu kami selesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini di sadari banyak pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah SWT memberikan Rahmat-Nya kepada mereka semua dan perkenankanlah kami mempersembahkan rasa terima kasih yang tak terhingga tersebut kepada :


1. Allah SWT yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, dan petunjuk kepada kami dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ucapan do'a kepada kedua orang tuaku, kiranya keduanya diampuni dan dikasihi oleh Allah SWT. Sebagaimana keduanya mengasihi penulis semenjak kecil, yang atas asuhan dan limpahan kasih sayangnya, penulis beroleh kekuatan moril maupun materil dalam menapaki jenjang pendidikan.

3. Bapak Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A. selaku Rektor UIN Alauddin makassar yang telah memberi kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin agar lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain.
4. Dr. M. Furqaan Naim, M. Sc, Ph.D. Selaku Dekan bersama para pembantu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negri Makassar.
5. Ketua Prodi keperawatan Nur hidayah, S.Kep.Ns.MARS dan sekretaris jurusan keperawatan Muh. Anwar Hafid, S.Kep.Ns, M.Kes. yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis ketika pertama kali sebagai mahasiswa UIN Alauddin Makassar.
6. Arbiansih. S.Kep, Ns. M.Kes dan dr. Asrini S.Ked. Selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, koreksi dan petunjuk dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Para dosen di lingkungan Fakultas ilmu kesehatan UIN Alauddin makassar yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis dalam menyelesaikan studi ini.
8. Terimah kasih buat teman-temanku yang senasib sepananggungan Khaerul.P, Afrisal, Ulla, Undi, Muh. Ramlan, Edhie, Syamsir, dan adik-adikku angkatan 2006, Unnu, Ana, Dila, Liska, Yulia serta yang belum sempat kami cantumkan namanya yang telah membantu dalam tahap penyelesaian skripsi ini semoga kita dapat menjadi orang yang berhasil.Amin

9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu.

Kami sadar bahwa apa yang telah kami buat ini jauh dari kesempurnaan, karenanya kami memohon kritik dan saran yang membangun untuk Penyempurnaan skripsi ini. Jika dalam penyusunan skripsi ini kepada pihak tertentu, maka dengan ini kami memohon maaf yang setulusnya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti yang lainnya, Amin.



Makassar 24 juli 2010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penulis,
Mush'ab Ibnu Munir

DAFTAR TABEL

- Tabel 5:1 Distribusi Responden Menurut Umur Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010
- Tabel 5:2 Distribusi Responden Menurut Angkatan Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010
- Tabel 5:3 Distribusi Responden berdasarkan lama merokok Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010
- Tabel 5:4 Distribusi Responden berdasarkan alasan tetap merokok Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010
- Tabel 5:5 Distribusi Responden berdasarkan keluhan selama merokok Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010
- Tabel 5:6 Distribusi Responden berdasarkan ketergantungan pada rokok Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010
- Tabel 5:7 Distribusi Responden efek saat tidak merokok Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010
- Tabel 5:8 Distribusi Responden berdasarkan alasan pertama kali merokok Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Tabel 5:9 Distribusi Responden berdasarkan kondisi saat membutuhkan rokok
Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Tabel 5:10 Distribusi Responden berdasarkan keinginan berhenti merokok Pada
Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Tabel 5:11 Distribusi Responden berdasarkan alasan kembali merokok Pada
Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Tabel 5:12 Distribusi Responden berdasarkan kekhawatiran terhadap kesehatan
akibat merokok Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli
2010

Tabel 5:13 Distribusi Responden berdasarkan orang yang pertama kali mengajak
merokok Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Tabel 5:14 Distribusi Responden berdasarkan umur pertama kali merokok Pada
Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Tabel 5:15 Distribusi Responden berdasarkan teman bergaul yang merupakan
perokok Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Tabel 5:16 Distribusi Responden berdasarkan larangan keluarga merokok Pada
Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Tabel 5:17 Distribusi Responden berdasarkan motivasi merokok Pada
Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010.

Tabel 5:18 Distribusi Responden berdasarkan jumlah rokok yang dikonsumsi dalam sehari Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Tabel 5:19 Distribusi Responden berdasarkan pernah berhenti merokok Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Tabel 5:20 Distribusi Responden berdasarkan apa yang diperoleh dari merokok selama ini Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Tabel 5:21 Distribusi Responden berdasarkan alasan yang mendasari tetap merokok Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010



GAMBARAN KEBIASAAN MEROKOK PADA MAHASISWA

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN

MAKASSAR



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Keperawatan (S.Kep) Pada Jurusan Keperawatan
Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MUSH'AB IBNU MUNIR

70300105021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

MAKASSAR

2010

ABSTRAK

Nama : Mush'ab Ibnu Munir
NIM : 70300105021
Jurusan : Keperawatan
Judul : Gambaran Kebiasaan Merokok Pada Mahasiswa
Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Merokok merupakan masalah kesehatan masyarakat yang terus meningkat. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dan sikap acuh dari pecandu rokok akan dampak merokok terhadap kesehatannya. Ada banyak alasan dan faktor-faktor mengapa kebiasaan merokok tetap bertahan. Faktor-faktor tersebut dapat digolongkan dalam faktor psikologik, faktor fisiologik, dan intervensi yang belum memadai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kebiasaan merokok berdasarkan alasan dan faktor-faktor mengapa kebiasaan merokok tetap bertahan pada mahasiswa. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif survey. Populasinya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar khususnya angkatan 2007, 2008, 2009.

Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan diketahui bahwa rasa ingin tahu merupakan alasan terbesar responden yang mendasari alasan pertama kali merokok, berdasarkan orang yang pertama kali mengajak merokok teman merupakan pilihan terbanyak yang mempengaruhi responden merokok, kemudian dari hasil gambaran kebiasaan merokok berdasarkan kondisi saat responden sangat membutuhkan rokok yaitu ketika berkumpul bersama teman, yang menjadi motivasi terbesar responden untuk merokok adalah tingginya rasa penasaran mereka untuk mencoba rokok, sakit kepala merupakan keluhan yang paling sering dialami responden ketika tidak merokok.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rokok merupakan salah satu penyebab kematian utama didunia dan merupakan produk legal yang membunuh sepertiga hingga setengah penggunanya rata-rata meninggal lebih cepat. Menurut *World Healt Organization* (WHO) tahun 2008, diperkirakan 5,4 juta orang meninggal pertahunnya karena rokok. (dakwatuna.com, 2008).

Wetherall (2006) mengemukakan bahwa ribuan penelitian telah membuktikan fakta tersebut. Semua badan kesehatan telah setuju. Bahkan perusahaan rokok besarpun mengakui, perbuatan merokok merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga itu bertentangan dengan larangan Allah dalam Q.S. an-Nisa (4) : 29

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“...dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Begitu sayangnya Allah SWT terhadap ummatnya sampai hal-hal yang menyangkut konsumsi manusia pun telah ia atur untuk kebaikan dan kesehatannya. Namun sayangnya, meskipun telah dilakukan berbagai penelitian mengenai bahaya rokok, namun banyak perokok yang tetap saja memungkirinya. Hal ini dikarenakan efek yang ditimbulkan akibat merokok tidak dirasakan dalam jangka

waktu yang pendek. Umumnya, efeknya akan terasa dan terakumulasi sedikit demi sedikit dan baru dapat dirasakan langsung beberapa tahun bahkan beberapa puluh tahun kemudian. (Rositawaty).

Sejak rokok daun tembakau dipopulerkan pada abad XIV di Eropa, jumlah perokok terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Walaupun Organisasi Kesehatan sedunia mengkampanyekan gerakan tidak merokok dengan menetapkan Tanggal 31 Mei sebagai “Hari Bebas Rokok Sedunia” sejak tahun 1988, perkembangan perokok belum mengalami kemunduran, bahkan cenderung meningkat dinegara-negara yang sedang membangun. Di negara-negara maju kelihatannya kampanye bebas rokok memberikan efek yang menggembirakan, walaupun jumlah perokok hanya mengalami penurunan beberapa persen saja. Namun, merokok dikalangan remaja dan anak-anak –baik pada pria maupun wanita mulai menunjukkan peningkatan. (Sirait, 2002:139).

Saat ini jumlah perokok, terutama perokok remaja terus bertambah, khususnya di negara-negara berkembang. Keadaan ini merupakan tantangan berat bagi upaya peningkatan derajat kesehatan di masyarakat. Bahkan organisasi kesehatan sedunia telah memberikan peringatan bahwa dalam dekade 2020-2030 tembakau akan membunuh 10 juta orang per tahun, 70% di antaranya terjadi di negara-negara berkembang. Melalui resolusi tahun 1983, *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan tanggal 31 Mei sebagai Hari Bebas Tembakau Sedunia setiap tahun. (Dakwatuna.com, 2008).

Di Indonesia sendiri merokok merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat, karena merokok merupakan salah satu penyebab utama beberapa

penyakit kronis seperti kanker paru, kanker saluran pernafasan bagian atas, penyakit jantung, stroke, bronchitis, emphysema dan lain-lain, bahkan merokok dapat menyebabkan kematian. Penyakit kronis dan kematian dini akibat merokok banyak terjadi terutama di Negara maju, akan tetapi sekarang dengan cepat wabah ini berpindah ke negara berkembang. Bila tahun 2000 hampir 4 juta orang meninggal akibat merokok, maka pada tahun 2020 persentasenya akan meningkat menjadi 7 dari 10 orang akan meninggal karena merokok. Hal ini diperkirakan akan terjadi di negara berpendapatan rendah dan menengah. Diestimasikan pada tahun 2030 mendatang 10 juta orang akan meninggal setiap tahunnya karena merokok. (Sirait, 2002:52)

Menurut penelitian, di Indonesiapun terdapat kecenderungan peningkatan jumlah perokok terutama dikalangan remaja. Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2003 yang berintegrasi dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas) 2003 menunjukkan hasil bahwa kebanyakan perokok mulai merokok pada usia muda, yaitu antara umur 15-20 tahun. Promosi rokok yang melalui iklan yang menggunakan idola remaja dan sponsor-sponsor kegiatan olah raga memberikan dorongan bagi kaum remaja untuk mulai merokok. (Sirait, 2002).

Berdasarkan pola konsumsi rokok saat ini, maka pada tahun 2020 diperkirakan 8.4 juta orang di dunia meninggal setiap tahunnya akibat merokok. Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di Asia yang diperkirakan sangat terpengaruh oleh epidemic merokok, apalagi dilihat dari konsumsi rokok yang begitu tinggi akibat dari pemasaran yang begitu intensif melalui iklan rokok dan hampir tidak adanya program pengendalian rokok. Indonesia berada di urutan

tertinggi kelima dunia dengan konsumsi rokok sebanyak 182 miliar batang pada tahun 2002, berdasarkan data susenas lebih dari 30% penduduk dewasa mempunyai kebiasaan merokok. Kaum remaja mulai merokok lebih awal daripada yang diduga oleh banyak orang tua. (Rina,2005).

Ada fakta lain yang menyebutkan bahwa sebanyak 9% orang dewasa mulai merokok selama masa remajanya. Seiring perjalanan waktu, begitu anak lulus dari SMU, sekitar 20% diantaranya sudah menjadi perokok, kata pakar kesehatan Jeffrey L Brown, M.D. selain itu seorang remaja yang merokok lebih dari dua kali, punya peluang 50% menjadi seorang perokok. Sebuah data di Amerika menunjukkan 9 dari 10 ABG (remaja) merokok. Sebuah angka yang mencemaskan terutama bagi orang tua.(Anonymous, 2005).

Melihat besarnya permasalahan merokok di Indonesia, maka diperlukan suatu inisiatif untuk mengidentifikasi pola merokok, pemahaman tentang keuntungan dan resiko merokok, dan perilaku perokok untuk berhenti merokok. Selain itu berdasarkan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa perokok mulai merokok pada usia remaja maka perlu juga dikembangkan kapasitas system pendidikan melalui pengembangan kurikulum mengenai merokok yang telah disesuaikan dengan kondisi lokal. Selain itu ada usaha nyata dari pemerintah dengan menetapkan PP RI No. 19 Thn.2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan dimana Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mencegah penyakit akibat rokok bagi individu dan masyarakat. (Antirokok.com.2008).

Berdasarkan penelitian sebelumnya pada beberapa Universitas di Makassar mengenai Gambaran Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa Perokok, diperoleh Fakta

bahwa sebahagian besar mahasiswa yang menjadi responden dianggap telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai akibat dari kebiasaan merokok, persentasenya mencapai 87,8% dimana tertinggi menjawab benar pada pengetahuan bahwa merokok menyebabkan penyakit jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan, dan 12,2% sisanya dianggap masih kurang dengan jawaban salah tertinggi pada pengetahuan bahwa agama Islam menganjurkan ummatnya untuk menjauhi hal-hal yang banyak mudharatnya dalam hal ini rokok dan zat-zat berbahaya lainnya yaitu sekitar 24,39% .

Dari penelitian tersebut diperoleh gambaran bahwa pada umumnya mahasiswa perokok memiliki pengetahuan yang cukup serta menanggapi dengan sikap positif mengenai kebiasaan merokok dan akibat yang ditimbulkan oleh rokok, faktor fisiologis yang menyebabkan bertambahnya kebiasaan merokok pada mahasiswa perokok terlalu dini mereka memulai merokok dan efek zat-zat dalam rokok menyebabkan ketergantungan pada rokok sedang faktor psikososial yang menyebabkan bertambahnya kebiasaan merokok pada mahasiswa perokok karena kesenangan dan ketenangan lebih besar dari pada ketidaknyamanan fisik saat merokok dan lingkungan dimana mereka berada kondusif untuk membentuk individu-individu perokok, Pada kenyataannya mereka tetap saja merokok. Oleh Karena itu peran orang tua sangat diharapkan dalam memberikan informasi yang lebih intensif dan lebih luas tentang bahaya rokok.

Kebiasaan merokok dapat memberikan gangguan kesehatan yang akan mempengaruhi proses belajar berupa berkurangnya aktivitas otak akibat

efek nikotin serta dapat menyebabkan kelelahan dan sakit kepala akibat peningkatan karboksihemoglobin. Apabila seseorang tersebut sudah ketagihan tembakau dan tiba-tiba berhenti merokok maka akan timbul gejala-gejala berupa rasa gelisah/cemas dan sulit berkonsentrasi. Besarnya efek rokok tersebut tergantung dari dosis atau jumlah zat yang terkandung dalam rokok yang masuk kedalam tubuh. Besarnya dosis atau jumlah zat tersebut terutama dipengaruhi oleh lamanya seseorang merokok dan jumlah rokok yang dihisap.

Dengan mempertimbangkan data-data yang ada serta kenyataan bahwa sebagian besar mahasiswa mengalami masalah merokok, maka kami melakukan penelitian untuk mengetahui gambaran kebiasaan merokok pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang ditinjau berdasarkan kebiasaan mereka dalam mengkonsumsi rokok.

Dari data yang diperoleh dari fakultas Ilmu Kesehatan, ada sekitar 1.300an mahasiswa yang masih aktif kuliah sampai dengan tahun ajaran 2009/2010, terdiri dari 427 mahasiswa Prodi Keperawatan, 322 mahasiswa Farmasi, 420 mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat, dan sebanyak 160 mahasiswa Prodi Kebidanan. Dari jumlah tersebut, sekitar 250 orang diantaranya adalah pria, sekitar 75 % diantaranya merupakan perokok.

B. Rumusan Masalah

Melihat besarnya jumlah perokok dan dengan mempertimbangkan data-data yang ada serta kenyataan bahwa sebagian mahasiswa mengalami masalah merokok, maka kami melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana gambaran kebiasaan merokok pada mahasiswa.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran kebiasaan merokok dikalangan mahasiswa.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran kebiasaan merokok berdasarkan alasan pertama kali merokok.
- b. Untuk mengetahui gambaran kebiasaan merokok berdasarkan orang yang pertama kali mengajak merokok
- c. Untuk mengetahui gambaran kebiasaan merokok berdasarkan alasan tetap merokok
- d. Untuk mengetahui gambaran kebiasaan merokok berdasarkan kondisi saat sangat membutuhkan rokok, motivasi merokok
- e. Untuk mengetahui gambaran kebiasaan merokok berdasarkan keluhan selama merokok
- f. Untuk mengetahui gambaran kebiasaan merokok berdasarkan yang diperoleh dari merokok selama ini.

D. Manfaat Penelitian

- a. Untuk memberikan informasi atau bahan masukan bagi perencanaan program kesehatan dan pembuat keputusan dalam usaha mengurangi kebiasaan merokok dalam masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya
- b. Untuk memberikan informasi pada institusi pendidikan bidang kesehatan dalam mengkaji lebih jauh kebiasaan merokok dalam kaitannya dengan kesehatan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya.
- d. Memberikan informasi ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga bagi peneliti sendiri dalam rangka menambah wawasan serta pengembangan diri khususnya dibidang penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebiasaan

Kebiasaan adalah titik temu dari pengetahuan, keterampilan, dan keinginan. Kesalingtergantungan adalah konsep yang jauh lebih matang dan maju. Jika saya saling tergantung secara intelektual, saya sadar bahwa saya membutuhkan cara berpikir terbaik dari orang lain untuk bergabung dengan cara berpikir terbaik saya. Sebagai orang yang saling tergantung saya mempunyai peluang untuk membagi diri saya secara mendalam dan bermakna dengan orang lain, dan saya mempunyai akses pada sumber daya dan potensi yang besar sekali dari orang lain.

Kebiasaan juga dapat didefinisikan sebagai kecenderungan ke arah suatu tindakan yang menjadi kinerja ulang, relatif tetap, konsisten, mudah dilakukan, dan hampir otomatis. Setelah belajar, kebiasaan mungkin terjadi tanpa maksud orang atau mungkin tampak tak terkendali dan sulit untuk berubah. Dalam kedokteran gigi, kebiasaan seperti bruxism, mengepalkan, lidah mendorong, dan menggigit bibir dan pipi dapat menghasilkan cedera pada gigi, lampiran aparat mereka, mukosa mulut, otot rahang bawah dan rahang, dan artikulasi.

B. Tinjauan Umum Tentang Merokok

1. Defenisi rokok

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara agar asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung lainnya.(Gatra.com,2004).

Menurut PP RI No.19 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pengamanan rokok, adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sejenisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. (Rina, 2005). Bila seseorang membakar sebatang rokok dan kemudian menghisapnya, maka itu berarti ia menghisap semua bahan kimia yang terkandung didalamnya.. Asap rokok yang dihisap si perokok disebut “asap utama” (*main Stream Smoke*), atau perokok aktif. Dan asap yang keluar dari ujung rokok yang terbakar dan terisap oleh orang disekitar perokok disebut “asap sampingan” (*Side Stream Smoke*), atau dengan kata lain perokok pasif. Bahan-bahan kimia itulah yang kemudian menimbulkan penyakit. (Bangun, 2008).

Rasulullah Shollallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda (yang artinya):
“*Barangsiapa yang meniup racun hingga mati maka racun tersebut akan berada di tangannya lalu dihirupkan selama-lamanya di neraka Jahannam.*“(Hadits Riwayat Muslim). (Dakwatuna.com)

Sebatang rokok akan mempercepat 15 kali lipat pukulan denyut jantung dalam satu menit, hal ini menyebabkan tekanan darah menjadi lebih tinggi dan mengurangi kemampuan paru-paru untuk melakukan tugasnya. Akibat yang

paling besar dan mematikan karena kebiasaan merokok adalah kerusakan yang terjadi pada jantung. Dengan singkat dapat dipastikan hampir semua system tubuh menderita karena beraneka racun yang bersemayam dalam asap tembakau. (Bangun, 2008).

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Al-halalu wal-Haramu fil Islam* mengemukakan pendapatnya bahwa kaidah yang telah ditetapkan dalam syariat islam, bahwasanya tidak halal bagi seorang muslim untuk mengkonsumsi makanan yang berbahaya yang dapat membunuh dirinya dengan cepat maupun lambat, seperti racun dengan segala macamnya, membahayakannya, dan menyakitinya. (Nashr, 2008).

Hal tersebut berkaitan dengan firman Allah dalam Q.S. Al-A'raf (7) : 157

وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِهِمْ لَكَرِهِمْ
 وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِهِمْ لَكَرِهِمْ
 وَمَا كُنَّا بِمُعَذِّبِهِمْ لَكَرِهِمْ

Terjemahnya:

...dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...

Makanan yang baik menurut islam adalah makanan yang sehat dan bergizi yang tidak membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya. Menurut Rositawaty, (2007) berdasarkan buku *Disease and Disorders* yang diterbitkan oleh *Anatomical Chart Company*, rokok adalah racun yang berbahaya yang mengandung lebih dari 200 jenis racun. Setiap perokok yang menghisap dua bungkus rokok dalam sehari, berarti ia telah mengurangi umurnya selama delapan

tahun. Hal serupa pun dialami orang yang menghirup asap dari dua bungkus rokok tersebut, berarti dia telah mengurangi umurnya selama empat tahun.

Banyak cara yang dilakukan rokok untuk menyerang system imun tubuh diantaranya mengurangi leukosit, mengurangi limposit, membunuh sel pembunuh yang berguna untuk mengurangi sel kanker dan sebagainya. Akibat terserangnya system imun tubuh, perokok berpotensi terkena flu lebih banyak dibandingkan mereka yang tidak merokok. (zulkifli, 2008).

Bahan-bahan yang terkandung dalam rokok

Ketika perokok membakar sebatang rokok, sejumlah besar bahan kimia dibentuk pada akhir pembakaran, dan kemudian perokok menghisapnya, asap yang dihisap oleh para perokok disebut asap utama (*mainstream smoke*), dan asap yang keluar dari ujung rokok (bagian yang terbakar) disebut asap sampingan (*sidestream*). (Anonymous,2005).

Asap rokok mengandung sekitar 4.000 komponen yang berbahaya. Sebagian komponen itu berbentuk gas seperti karbon monoksida (CO) yang merupakan gas beracun yang dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen dan partikel zat padat, terutama tar dan nikotin. Tar tersebut mempunyai sifat karsinogen (penyebab kanker) yang merusak sel paru-paru, sehingga tidak heran jika kanker paru menempati urutan pertama. Sedangkan nikotin adalah zat yang menimbulkan ketergantungan kepada perokok atau pengguna tembakau. Efek nikotin tidak berbeda dengan efek pada pengguna kokain dan heroin. (Aziz, 2002). Asap sampingan terbukti mengandung lebih banyak hasil pembakarantembakau dibanding asap utama. Asap ini mengandung karbon

monoksida(CO) 5 kali lebih besar, tar dan nikotin tiga kali lipat, ammonia 45 kali lipat, nikel 3 kali lipat, nitrosamine yang adalah penimbul kanker kadarnya mencapai 50 kali lebih besar pada asap sampingan dibanding yang terkandung pada asap utama. Demikian pula zat-zat racun lainnya dengan kadar yang lebih tinggi terdapat pada asap sampingan. (Antirokok.com.2008).

Komposisi asap rokok tergantung pada jenis tembakau, temperature pembakaran, panjang rokok yang dipergunakan, penggulung (pembalut), bahan tambahan lainnya, dan penggunaan filter. Temperature rokok pada bibir adalah 30°C, sedangkan temperature pada ujung rokok yang terbakar adalah 900°C.(Mangku, 1998).

a. Nikotin

Nikotin adalah unsur kimia beracun yang memiliki susunan seperti alkali. Unsur inilah yang banyak menimbulkan dampak pada perokok. Merokok dengan nikotin tinggi atau nikotin rendah akan menyebabkan peningkatan tekanan darah sistolik dan diastolik, peningkatan denyut jantung, sehingga meningkatkan kebutuhan myokard. (Saad, 1998) Pada system vaskuler nikotin menurunkan aliran darah kulit dan menambah resistensi vaskuler. Selain itu nikotin mengaktifkan trombosit dengan akibat timbulnya adhesi trombosit (penggumpalan ke dinding pembuluh darah). (fajriwan, 1999).

Nikotin merupakan zat adiktif yang mempengaruhi saraf dan peredaran darah. Pada system saraf pusat sebagai stimulan atau penenang tergantung dari jumlah yang dihisap serta keadaan fisiologik dan

psikologik si pemakai. Nikotin merupakan substansi yang menimbulkan adiksi. Apabila penggunaannya dihentikan secara tiba-tiba maka dapat menimbulkan suatu periode depresi. Periode ini menyebabkan sulitnya usaha untuk menghentikan kebiasaan merokok. (Fajriwan,1999).

b. Karbon Monoksida

Karbon monoksida merupakan gas yang tidak berwarna dan tidak berbau, kira-kira 3% sampai 5% dari asap rokok terdiri dari karbon monoksida. Daya gabung karbon monoksida dengan hemoglobin kira-kira 245 kali lebih kuat dari daya gabungannya terhadap oksigen. (Kompas.com,2009).

Karbon monoksida merupakan zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. Karbon monoksida menimbulkan desaturasi hemoglobin, menurunkan langsung persediaan oksigen untuk jaringan seluruh tubuh termasuk myokard. Karbon monoksida (CO) menggantikan tempat oksigen di hemoglobin, mengganggu pelepasan oksigen dan mempercepat aterosklerosis (pengapuran atau penebalan dinding pembuluh darah). Dengan demikian, karbon monoksida (CO) menurunkan kapasitas latihan fisik, meningkatkan viskositas darah, sehingga mempermudah penggumpalan darah. (Fajriwan,1999).

c. Tar

Tar adalah komponen dalam asap rokok yang tinggal sebagai sisa setelah dihilangkannya komponen nikotin dan cairan, dan tar ini

bersifat karsinogen. Tar merupakan substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru. Tar adalah kumpulan dari beribu-ribu bahan kimia dalam komponen padat asap rokok, dan bersifat karsinogen. Pada saat rokok dihisap, tar masuk ke dalam rongga mulut sebagai uap padat. Setelah dingin, akan menjadi padat dalam pernapasan, dan paru-paru. Pengendapan ini bervariasi antara 3-40 mg membentuk endapan berwarna coklat pada permukaan gigi, saluran per batang rokok, sementara kadar tar dalam rokok berkisar 24 – 45 mg. (Kompas.com,2009).

C. Tinjauan Umum Tentang Kebiasaan Merokok

Menurut *Cornwath* dan *Miller* kebiasaan merokok dibedakan menjadi:

1. Dorongan psikologis : rasanya sebagai rangsangan seksual melalui mulut ketika sedang menghisap rokok, sebagai ritual, menunjukkan kejantanan (bangga diri), pengalih kecemasan, menunjukkan kedewasaan, serta rangsangan mulut melalui jari-jari pada saat merokok.
2. Dorongan Fisiologis : Adiksi (ketagihan) tubuh terhadap kandungan rokok berupa nikotin atau disebut kecanduan nikotin.

Remaja mulai merokok dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Pengaruh Orang Tua

Salah satu temuan tentang remaja perokok adalah anak-anak yang berasal dari rumah tangga yang tidak bahagia, dimana orang tua tidak begitu memperhatikan anak-anaknya dan memberikan hukuman fisik yang lebih

keras akan mudah untuk menjadi perokok dibandingkan anak-anak muda yang berasal dari lingkungan rumah tangga yang bahagia. Remaja yang berasal dari keluarga konservatif yang menekankan nilai-nilai sosial dan agama yang baik dengan tujuan jangka panjang lebih sulit untuk terlibat dengan rokok/tembakau/obat-obatan dibanding keluarga yang permisif dengan penekanan pada falsafah “kerjakan urusanmu sendiri-sendiri”, dan yang paling kuat pengaruhnya adalah bila orang tua sendiri menjadi figure contoh yaitu sebagai perokok berat, maka anak-anaknya akan mungkin sekali mencontohinya. Perilaku merokok lebih banyak didapat pada mereka yang tinggal dengan single parent. Remaja akan lebih cepat berperilaku sebagai perokok bila ibu mereka merokok dari pada ayah yang merokok, hal ini lebih terlihat pada remaja putri.

2. Pengaruh Teman

Berbagai fakta mengungkapkan bahwa semakin banyak remaja merokok maka semakin besar kemungkinan teman-temannya adalah perokok juga dan demikian sebaliknya. Dari fakta tersebut ada dua kemungkinan yang terjadi, pertama remaja putri tadi terpengaruh oleh teman-temannya atau bahkan teman-temannya yang dipengaruhi oleh remaja putri tersebut yang akhirnya mereka semua menjadi perokok. Diantara remaja perokok terdapat 87% mempunyai sekurang-kurangnya satu atau lebih sahabat perokok begitu pula dengan remaja nonperokok.

3. Faktor kepribadian

Orang mencoba merokok karena alasan ingin tahu atau ingin melepaskan diri dari rasa sakit baik fisik maupun jiwa, melepaskan diri dari rasa bosan. Namun satu sifat kepribadian yang bersifat prediktif pada pengguna obat-obatan (termasuk rokok) ialah konformitas social. Orang yang memiliki skor tinggi pada berbagai tes konformitas social lebih mudah menjadi pengguna dibanding mereka yang mempunyai skor yang rendah. (E-psikologi.com, 2007).

4. Pengaruh Iklan

Melihat iklan di media yang menampilkan gambaran bahwa perokok adalah lambing kejantanan atau glamour, membuat remaja sering kali terpicu untuk mengikuti perilaku seperti yang ada dalam iklan tersebut. (E-psikologi.com, 2007).

Ada beberapa macam motivasi orang untuk merokok, yaitu ; ingin mengetahui rasa rokok itu sendiri, agar dapat diterima oleh lingkungannya, sebagai ekspresi rasa bebas atau rasa permusuhan, untuk mendapatkan pengalaman baru, untuk mendapatkan ketenangan serta untuk menghindar serta melarikan diri dari permasalahan yang sedang dihadapi. (Mangku, 1998).

Perokok dapat digolongkan menjadi :

- a. Tidak merokok, tetapi menghirup asap rokok yang dihasilkan oleh perokok atau biasa disebut perokok pasif.
- b. Perokok ringan, yang menghisap rokok kurang dari 10 batang perhari.
- c. Perokok sedang, yang menghabiskan 10-20 batang rokok perhari.

- d. Perokok berat, yang menghabiskan lebih dari 20 batang rokok perhari.
- e. Berhenti merokok, yang tadinya perokok kemudian berhenti dan tidak merokok lagi. (Mangku, 1998).

D. Tinjauan Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebiasaan Merokok

Ada banyak alasan dan faktor-faktor mengapa kebiasaan merokok tetap bertahan. Faktor-faktor tersebut dapat digolongkan dalam faktor psikologik, faktor fisiologik, dan intervensi yang belum memadai, yaitu :

1. Karena stimulasi, untuk kesenangan, rileks, mengurangi ketegangan, kegelisahan, rasa takut, tau merokok sudah menjadi kebiasaan.
2. Perokok sering melakukan rasionalisasi dan cenderung berfikir mereka sendiri tidak akan terkena akibat fatal dari merokok
3. Tidak/belum adanya motivasi untuk berhenti merokok.
4. Faktor-faktor fisiologik yang ikut serta menyebabkan sukar berhenti merokok adalah menurunnya tekanan darah, temperature badan dan detak jantung yang dialami sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan sehingga orang kembali merokok.

Dengan berjalannya waktu, merokok menjadi respon bersyarat terhadap perubahan kadar nikotin dalam darah. Kecanduan merokok menjadi sama pentingnya dengan kebutuhan emosional yang pada awalnya mempengaruhi tingkah laku merokok.

E. Tinjauan Tentang Dampak Merokok

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, yang menjadi kebutuhan dasar derajat kesehatan masyarakat, salah satu aspeknya adalah “tidak *ada anggota keluarga yang merokok*“. Sedangkan PHBS harus menjadi kewajiban kita dan para kader kesehatan untuk mensosialisasikannya.

Setiap kali menghirup asap rokok, entah sengaja atau tidak, berarti juga mengisap lebih dari 4.000 macam racun! Karena itulah, merokok sama dengan memasukkan racun-racun tadi ke dalam rongga mulut dan tentunya paru-paru. Merokok mengganggu kesehatan, kenyataan ini tidak dapat kita pungkiri. Banyak penyakit telah terbukti menjadi akibat buruk merokok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebiasaan merokok bukan saja merugikan si perokok, tetapi juga bagi orang di sekitarnya. (Dakwatuna.com, 2008).

Saat ini jumlah perokok, terutama perokok remaja terus bertambah, khususnya di negara-negara berkembang. Keadaan ini merupakan tantangan berat bagi upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Bahkan organisasi kesehatan sedunia telah memberikan peringatan bahwa dalam dekade 2020-2030 tembakau akan membunuh 10 juta orang per tahun, 70% di antaranya terjadi di negara-negara berkembang.

Penelitian terbaru juga menunjukkan adanya bahaya dari *secondhand-smoke*, yaitu asap rokok yang terhirup oleh orang-orang bukan perokok karena berada di sekitar perokok, atau biasa disebut juga dengan perokok pasif. (Kompas.com, 2009).

Angka kematian pada perokok lebih tinggi dibandingkan non perokok terutama bagi pria umur 45-54 tahun. beberapa zat kimia dalam rokok yang

berbahaya bagi kesehatan bersifat kumulatif, suatu saat dosis racunnya akan mencapai titik toksik sehingga mulai kelihatan gejala yang ditimbulkan. Bahan-bahan kimia rokok ada yang bersifat iritasi membrana dimulut, Hidung, faring dan takea-brongkial. Ada juga bahan kimia rokok yang diserap masuk kedalam darah dan disebarkan keseluruh tubuh, serta ada juga yang masuk kedalam saluran ludah dan dicerna masuk kedalam system pencernaan, diserap serta masuk lagi kedalam darah dan disebarkan keseluruh tubuh. Jadi, merokok menimbulkan banyak gangguan pada seluruh bagian tubuh dan mengganggu jaringan tubuh mulai ujung rambut hingga ujung jari kaki. (Fajriwan,1999).

Bahaya merokok terhadap kesehatan tubuh telah diteliti dan dibuktikan oleh banyak orang. Efek-efek yang merugikan akibat merokok pun sudah diketahui dengan jelas. Banyak penelitian membuktikan bahwa kebiasaan merokok meningkatkan risiko timbulnya berbagai penyakit. Seperti penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah, kanker paru-paru, kanker rongga mulut, kanker laring, kanker oesofagus, bronkhitis, tekanan darah tinggi, impotensi, serta gangguan kehamilan dan cacat pada janin. (Kompas.com, 2009).

Beberapa organisasi Islam di Indonesia mengeluarkan fatwa haram rokok yang tujuannya untuk mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai bagian dari tujuan syariah (hukum Islam). Fatwa tersebut diputuskan berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh rokok itu sendiri dan ditetapkan berdasarkan ijtihad dari para ulama dengan dasar Al-Qur'an dan Al-hadits.

Oleh karena itu Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MTT/III/2010 mengeluarkan fatwa tentang hukum merokok:

1. Wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah.
2. Merokok hukumnya adalah haram karena:
 - a. Merokok termasuk kategori perbuatan *khabaits* yang dilarang dalam Q.S 7:157.
 - b. Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga oleh karena itu bertentangan dengan larangan al Quran dalam Q.S. 2: 195 dan 4: 29.
 - c. Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkenapaparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi dan oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadis Nabi saw bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.
 - d. Rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapawaktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan suatu yang melemahkan sehingga bertentangandengan hadis

Nabi saw yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan.

- e. Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan Orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelajaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang dalam Q. 17: 2627,
 - f. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah , yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa/raga, perlindungan akal, perlindungan keluarga, perlindungan harta.
3. Mereka yang belum atau tidak merokok wajib menghindarkan diri dan keluarganya dari percobaan merokok sesuai dengan Q.S. 66: 6 yang menyatakan, “Wahai orang-orang beriman hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”
 4. Mereka yang telah terlanjur menjadi perokok wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok dengan mengingat Q.S. 29: 69, “Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik,” dan Q.S. 2: 286, “Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya, ia akan mendapat hasil apa yang ia usahakan dan memikul akibat perbuatan yang dia lakukan”.

Hukum merokok pada dasarnya adalah makruh, yaitu apabila dikerjakan tidak apa-apa tetapi bila ditinggalkan mendapatkan pahala. Namun, melihat akibat yang

ditimbulkan oleh rokok, maka para ulama mengeluarkan fatwa tentang haramnya merokok, walaupun belum didapatkan dalil yang menunjukkan langsung bahwa merokok itu haram, namun akibat dari merokok itulah yang bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah islam (*maqasid asy-syariah*) yaitu perlindungan agama, jiwa/raga, akal, keluarga dan harta, Lingkungan, dan kelompok. Agama Islam (syariah) mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Perwujudan tujuan tersebut dicapai melalui perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa/raga, perlindungan terhadap akal, perlindungan terhadap keluarga, dan perlindungan terhadap harta).

Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan peningkatan ketakwaan melalui pembinaan hubungan vertikal kepada Allah SWT dan hubungan horizontal kepada sesama dan kepada alam lingkungan dengan mematuhi berbagai norma dan petunjuk syariah tentang bagaimana berbuat baik terhadap Allah, manusia dan alam lingkungan. Perlindungan terhadap jiwa/raga diwujudkan melalui upaya mempertahankan suatu standar hidup yang sehat secara jasmani dan rohani serta menghindari semua faktor yang dapat membahayakan dan merusak manusia secara fisik dan psikhis, termasuk menghindari perbuatan yang berakibat bunuh diri walaupun secara perlahan dan perbuatan menjatuhkan diri kepada kebinasaan yang dilarang di dalam al- Quran. Perlindungan terhadap akal dilakukan dengan upaya antara lain membangun manusia yang cerdas termasuk mengupayakan pendidikan yang terbaik dan menghindari segala hal yang bertentangan dengan upaya pencerdasan manusia. Perlindungan terhadap keluarga diwujudkan antara lain melalui upaya penciptaan suasana hidup keluarga yang

sakinah dan penciptaan kehidupan yang sehat termasuk dan terutama bagi anak-anak yang merupakan tunas bangsa dan umat. Perlindungan terhadap harta diwujudkan antara lain melalui pemeliharaan dan pengembangan harta kekayaan materiil yang penting dalam rangka menunjang kehidupan ekonomi yang sejahtera dan oleh karena itu dilarang berbuat mubazir dan menghamburkan harta untuk hal-hal yang tidak berguna dan bahkan merusak diri manusia sendiri. (Dakwatuna.com, 2008).

Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan-lahan. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. Lebih jelas lagi Allah menerangkan dalam firmannya dalam Q.S. al-Baqarah (2) :195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan...”

Adapun dalil dari i'tibar (logika) yang benar yang menunjukkan keharaman rokok adalah karena dengan perbuatan itu perokok mencampakkan dirinya ke dalam hal yang menimbulkan bahaya, rasa cemas, dan keletihan jiwa.

Orang yang berakal tentu tidak rela hal itu terjadi pada dirinya sendiri. Alangkah tragisnya kondisinya, dan demikian sesaknya dada si perokok bila tidak

menghisapnya. Alangkah berat ia melakukan puasa dan ibadah-ibadah lainnya karena hal itu menghalagi dirinya dari merokok.

Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif plus mengandung 4000 zat kimia, 69 di antaranya adalah karsinogenik/pencetus kanker (Fact Sheet TCSC-AKMI, Fakta Tembakau di Indonesia) sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi kesehatan. Oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadits Nabi SAW bahwa “*tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain*”. Rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan sesuatu yang melemahkan sehingga bertentangan dengan hadits Nabi SAW yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan. (Dakwatuna.com,2008).

Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelanjaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubazir (pemborosan) yang dilarang. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S. al- Isra' (17) :26-27

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ

تَبَذِيرًا ٢٦

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ

كَفُورًا ٢٧

Terjemahnya

”...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”

Dari ayat diatas penulis menyimpulkan Makna menyalakan harta adalah mengalokasikannya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana dimaklumi bahwa mengalokasikan harta dengan membeli rokok adalah termasuk pengalokasian harta pada hal yang tidak bermanfaat, bahkan pengalokasian harta kepada hal-hal yang mengandung kemudharatan.

Salah satu pengaruh rokok yakni dapat menimbulkan penyakit pada saluran pernafasan. Merokok menjadi penyebab utama penyakit paru-paru yang bersifat kronis dan obstruktif, misalnya bronchitis dan emfisema (85% dari penderita ini disebabkan oleh rokok). Bagi pria perokok kematian karena penyakit ini 4-25 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pria yang tidak merokok. Gejala yang ditimbulkan berupa batuk kronis, berdahak dan gangguan pernafasan banyak dijumpai pada perokok. (Mangku, 1998).

Adapun akibat-akibat merokok adalah:

1. Dampak Pada Paru-paru

Merokok dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran napas dan jaringan paru-paru. Pada saluran napas besar, sel mukosa membesar (hipertrofi) dan kelenjar mucus bertambah banyak (hiperplasia). Pada saluran napas kecil, terjadi radang ringan hingga penyempitan akibat bertambahnya sel dan penumpukan lendir. Pada jaringan paru-paru, terjadi peningkatan jumlah sel radang dan kerusakan alveoli. (Anonymous, 2005)

Akibat perubahan anatomi saluran napas, pada perokok akan timbul perubahan pada fungsi paru-paru dengan segala macam gejala klinisnya. Hal ini menjadi dasar utama terjadinya penyakit obstruksi paru menahun (PPOM). Dikatakan merokok merupakan penyebab utama timbulnya PPOM, termasuk emfisema paru-paru, bronkitis kronis, dan asma. (Kompas.com, 2005).

Hubungan antara merokok dan kanker paru-paru telah diteliti dalam 4-5 dekade terakhir ini. Didapatkan hubungan erat antara kebiasaan merokok, terutama sigaret, dengan timbulnya kanker paru-paru. Bahkan ada yang secara tegas menyatakan bahwa rokok sebagai penyebab utama terjadinya kanker paru-paru. (Anonymous, 2005)

Partikel asap rokok, seperti benzopiren, dibenzopiren, dan uretan, dikenal sebagai bahan karsinogen. Juga tar berhubungan dengan risiko terjadinya kanker. Dibandingkan dengan bukan perokok, kemungkinan timbul kanker paru-paru pada perokok mencapai 10-30 kali lebih sering. (Anonymous, 2005).

2. Dampak Terhadap Jantung

Banyak penelitian telah membuktikan adanya hubungan merokok dengan penyakit jantung koroner (PJK). Dari 11 juta kematian per tahun di negara industri maju, World Health Organization melaporkan lebih dari setengah (6 juta) disebabkan gangguan sirkulasi darah, di mana 2,5 juta adalah penyakit jantung koroner dan 1,5 juta adalah stroke. Survei Depkes RI tahun 1986 dan 1992, mendapatkan peningkatan kematian akibat penyakit jantung dari 9,7

persen (peringkat ketiga) menjadi 16 persen (peringkat pertama). (Kompas.com, 2009).

Merokok menjadi faktor utama penyebab penyakit pembuluh darah jantung tersebut. Bukan hanya menyebabkan penyakit jantung koroner, merokok juga berakibat buruk bagi pembuluh darah otak dan perifer.

Asap yang diembuskan para perokok dapat dibagi atas asap utama (*main stream smoke*) dan asap samping (*side stream smoke*). Asap utama merupakan asap tembakau yang dihirup langsung oleh perokok, sedangkan asap samping merupakan asap tembakau yang disebarkan ke udara bebas, yang akan dihirup oleh orang lain atau perokok pasif. (Kompas.com, 2009).

Telah ditemukan 4.000 jenis bahan kimia dalam rokok, dengan 40 jenis di antaranya bersifat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker), di mana bahan racun ini lebih banyak didapatkan pada asap samping, misalnya karbon monoksida (CO) 5 kali lipat lebih banyak ditemukan pada asap samping daripada asap utama, benzopiren 3 kali, dan amoniak 50 kali. Bahan-bahan ini dapat bertahan sampai beberapa jam lamanya dalam ruang setelah rokok berhenti. (Kompas.com, 2009).

Umumnya fokus penelitian ditujukan pada peranan nikotin dan CO. Kedua bahan ini, selain meningkatkan kebutuhan oksigen, juga mengganggu suplai oksigen ke otot jantung (*miokard*) sehingga merugikan kerja miokard.

Nikotin mengganggu sistem saraf simpatis dengan akibat meningkatnya kebutuhan oksigen miokard. Selain menyebabkan ketagihan merokok, nikotin juga merangsang pelepasan adrenalin, meningkatkan frekuensi denyut jantung,

tekanan darah, kebutuhan oksigen jantung, serta menyebabkan gangguan irama jantung. Nikotin juga mengganggu kerja saraf, otak, dan banyak bagian tubuh lainnya. Nikotin mengaktifkan trombosit dengan akibat timbulnya adhesi trombosit (penggumpalan) ke dinding pembuluh darah. Merokok terbukti merupakan faktor risiko terbesar untuk mati mendadak. (Soeharto, 2004).

Risiko terjadinya penyakit jantung koroner meningkat 2-4 kali pada perokok dibandingkan dengan bukan perokok. Risiko ini meningkat dengan bertambahnya usia dan jumlah rokok yang diisap. Penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko merokok bekerja sinergis dengan faktor-faktor lain, seperti hipertensi, kadar lemak atau gula darah yang tinggi, terhadap tercetusnya PJK. (Soeharto, 2004).

Perlu diketahui bahwa risiko kematian akibat penyakit jantung koroner berkurang dengan 50 persen pada tahun pertama sesudah rokok dihentikan. Akibat penggumpalan (trombosis) dan pengapuran (aterosklerosis) dinding pembuluh darah, merokok jelas akan merusak pembuluh darah perifer. (Bangun.com, 2008).

3. Stroke

Penyumbatan pembuluh darah otak yang bersifat mendadak atau stroke banyak dikaitkan dengan merokok. Risiko stroke dan risiko kematian lebih tinggi pada perokok dibandingkan dengan bukan perokok.

Dalam penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat dan Inggris, didapatkan kebiasaan merokok memperbesar kemungkinan timbulnya AIDS

pada pengidap HIV. Pada kelompok perokok, AIDS timbul rata-rata dalam 8,17 bulan, sedangkan pada kelompok bukan perokok timbul setelah 14,5 bulan. Penurunan kekebalan tubuh pada perokok menjadi pencetus lebih mudahnya terkena AIDS sehingga berhenti merokok penting sekali dalam langkah pertahanan melawan AIDS. (Kompas.com, 2009).

Kini makin banyak diteliti dan dilaporkan pengaruh buruk merokok pada ibu hamil, impotensi, menurunnya kekebalan individu, termasuk pada pengidap virus hepatitis, kanker saluran cerna, dan lain-lain. Dari sudut ekonomi kesehatan, dampak penyakit yang timbul akibat merokok jelas akan menambah biaya yang dikeluarkan, baik bagi individu, keluarga, perusahaan, bahkan negara.

Penyakit-penyakit yang timbul akibat merokok mempengaruhi penyediaan tenaga kerja, terutama tenaga terampil atau tenaga eksekutif, dengan kematian mendadak atau kelumpuhan yang timbul jelas menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Penurunan produktivitas tenaga kerja menimbulkan penurunan pendapatan perusahaan, juga beban ekonomi yang tidak sedikit bagi individu dan keluarga. Pengeluaran untuk biaya kesehatan meningkat, bagi keluarga, perusahaan, maupun pemerintah. (Kompas.com, 2009).

4. Menyebabkan Menopause Dini

Perempuan yang merokok sangat mungkin untuk mulai memasuki masa menopause sebelum usia 45 tahun dan juga membuat mereka menghadapi resiko osteoporosis dan serangan jantung, demikian laporan beberapa peneliti Norwegia. (Kompas.com, 2009).

“Di antara sebanyak 2.123 perempuan yang berusia 59 sampai 60 tahun, mereka yang saat ini merokok, 59% lebih mungkin mengalami menopause dini dibandingkan dengan perempuan yang tidak merokok,” kata Dr. Thea F. Mikkelsen dari University of Oslo dan rekannya. (Kompas.com, 2009).

Bagi perokok paling berat, resiko menopause dini hampir dua kali lipat. Namun, perempuan yang dulunya merokok, tapi berhenti setidaknya 10 tahun sebelum menopause, pada dasarnya kurang mungkin untuk berhenti menstruasi dibandingkan dengan perokok sebelum usia 45 tahun. (Lane, 2003).

Ada bukti bahwa merokok belakangan dalam kehidupan membuat seorang perempuan lebih mungkin untuk mengalami menopause dini, sedangkan perokok yang berhenti sebelum berusia setengah baya mungkin tak terpengaruh, kata Mikkelsen dan timnya di dalam jurnal Online, BMC Public Health. (Kompas.com, 2009).

Mereka meneliti hubungan lebih lanjut dan menetapkan apakah menjadi perokok pasif juga mungkin mempengaruhi waktu menopause. Para peneliti tersebut mendapati bahwa hampir 10% perempuan memasuki menopause sebelum usia 45 tahun.

5. Meracuni Janin

Dampak negatif rokok terhadap janin juga sudah tidak diragukan lagi. Secara logis bias dipahami, bila pembelahan sel-sel mengalami gangguan karena nikotin yang masuk ke dalam darah, maka dengan sendirinya proses pertumbuhan janin akan terhambat pula. Akibatnya, bisa terjadi keguguran atau

bayi cacat lahir, seperti bibir sumbing, hidung pipih atau berat badan rendah. (Anonymous, 2005).

6. Gangguan Reproduksi

Menurut prof. Dr. H. Arjatmo Tjokronegoro, Ph.D Sp.And., spesialis andrologi dari FK UI “seseorang yang terus-menerus merokok selama bertahun-tahun, tentu saja darahnya akan tercemar oleh nikotin yang melalui pembuluh darah akan disebar kemana-mana termasuk organ reproduksi. Racun nikotin akan berpengaruh terhadap spermatogenesis atau terjadinya pembelahan sel sperma pada pria padahal pembelahan itu sangatlah kompleks, yang kemudian menjadi gen bagi sipemilik sperma. (Kompas.com, 2009).

Bagi wanita perokok memiliki resiko lebih besar untuk penundaan konsepsi serta fertilitas atau kemandulan primer maupun sekunder. Selama hamil mengakibatkan komplikasi kehamilan.persalinan prematur, bayi dengan berat badan rendah serta kematian pada bayi. (Anonymous, 2005),

7. Beberapa penyakit Rongga Mulut

Kandungan tobacco stain pada rokok dapat mengubah warna gigi, penggunaan pipa dapat mengganggu jaringan lunak mulut sehingga terjadi stomatitis dan leukoplakia nikotin, karena oral hygiene yang jelek dan adanya latar belakang penyakit sistemik pada perokok dapat menimbulkan periodontitis dankalkulusginggivitis. (Kompas.com,2009).

BAB III

KERANGKA KONSEP


A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti

Meningkatnya jumlah perokok dikalangan masyarakat Indonesia cukup memperhatikan. Dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia oleh beberapa peneliti menunjukkan adanya peningkatan jumlah perokok. Tidak hanya pada pria tetapi juga pada wanita. Dalam penelitian ini, kami hanya membatasi subjek penelitian pada mahasiswa dengan asumsi bahwa kebiasaan merokok belum membudaya di kalangan mahasiswi, khususnya pada lokasi penelitian ini. Selain itu dari hasil penelitian ini juga diperoleh bahwa kebiasaan merokok sudah terbentuk pada usia muda sehingga penelitian ini ditunjukkan untuk memperoleh informasi mengenai kebiasaan merokok.

Ada banyak faktor yang mendorong atau mempengaruhi seseorang merokok diantaranya adalah faktor psikis dan faktor lingkungan. Walaupun pengetahuan tentang masalah dan resiko merokok meningkat, perilaku kebiasaan merokok dan menyatakan susah berhenti merokok dengan berbagai alasan. Dengan berjalannya waktu, merokok menjadi respon bersyarat terhadap kadar nikotin dalam darah. Kecanduan rokok menjadi

sama pentingnya dengan kebutuhan emosional yang pada awalnya mempengaruhi perilaku merokok.

B. Kerangka Konsep Penelitian



———— = Variabel yang diteliti.

C. Jenis Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah:

- Kebiasaan merokok.
- Merokok

D. Defenisi operasional dan kriteria objektif

1. Kebiasaan merokok

Kebiasaan merokok yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah waktu atau situasi yang sering digunakan untuk mengkonsumsi rokok serta alasan utama yang mendasarinya. Dalam hal ini faktor lingkungan, faktor fisiologis, faktor psikologis, dan motivasi.

2. Merokok

Merokok yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah lamanya waktu merokok antara awal merokok hingga sekarang dan jumlah rata-rata rokok yang dikonsumsi dalam sehari.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif survey untuk memperoleh informasi tentang gambaran pengetahuan dan kebiasaan merokok pada mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Besar populasi sebanyak 190 orang.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang merokok. Sampel diambil dengan tehnik purposive Sampling. Besar sampel dalam penelitian ini sekitar 20-30% dari populasi. Sampel adalah bagian keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Nursalam, Pariani, 2002).

D. Kriteria Sampel

1. Kriteria Inklusi

Karakteristik sampel yang dapat dimasukkan atau layak untuk diteliti adalah :

- a. Klien yang berjenis kelamin laki-laki dan bersedia untuk diteliti dengan syarat mau mengisi lembaran kuisioner.
- b. Klien yang masih aktif kuliah.
- c. Klien yang kooperatif.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan sebagai alat pengumpul data berupa kuisioner (Pertanyaan terbuka) yang dibagikan untuk diisi oleh responden. Jenis pertanyaan yang disajikan berupa pertanyaan pilihan ganda mengenai kebiasaan dan pertanyaan mengenai merokok. Setelah semua data terkumpul, selanjutnya data tersebut kemudian dianalisis. Setelah proses analisis, data kemudian disajikan dalam bentuk table beserta penjelasannya.

F. Prosedur Pengambilan Data

Data primer diambil secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

G. Analisis Data

Data yang diperoleh diolah dengan bantuan program komputer, disusun dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang disertai dengan penjelasannya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Penelitian tentang kebiasaan merokok pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang pada tanggal 10-19. Responden dalam penelitian ini berdasarkan dari angkatan 2007, 2008, dan 2009 dengan jumlah responden 46 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuisisioner yang dibagi kepada responden.

Data primer diperoleh langsung dari responden yang ditemui pada saat pemberian kuisisioner berjumlah 80 orang dan yang berhasil mengembalikan kuisisioner berjumlah 46 orang yang merupakan jumlah responden yang diteliti. Data yang diperoleh dikumpul dan diolah secara manual dengan bantuan program komputer, disusun dan disajikan dalam bentuk table distribusi frekuensi yang disertai dengan penjelasan. Dari hasil kuisisioner yang dibagikan terhadap 46 responden, diperoleh data sebagai berikut:

Karakteristik Umum

Tabel 5:1

Distribusi Responden Menurut Umur Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin

Makassar Juli 2010

Umur	(f)	Persentase (%)
16-18	6	13,04
19-21	28	60,88
>21	12	26,08
Jumlah	46	100%

Sumber : Data Primer

Dari tabel I diatas dapat diketahui distribusi umur mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang menjadi responden pada penelitian ini dan pada table ini kami mengambil umur antara 16 tahun sampai umur >20 tahun. Dari tabel tersebut terlihat bahwa distribusi umur mereka bervariasi dan terbanyak pada umur 19-21 tahun yaitu sebanyak 28 orang (60,88%), kemudian disusul umur >21 tahun sebanyak 12 orang (26,08%), diikuti umur 16-18 tahun sebanyak 6 orang (13,04%).

Tabel 5:2
Distribusi Responden Menurut Angkatan Pada Mahasiswa FIK-UIN
Alauddin Makassar Juli 2010

Angkatan	(f)	Persentase (%)
2009	7	15,26
2008	25	54,22
2007	14	30,52
Jumlah	46	100%

Sumber : Data Primer

Dari tabel I diatas dapat diketahui distribusi angkatan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang menjadi responden pada penelitian ini dan pada tabel ini kami mengambil dari angkatan 2007-2009 . Dari tabel tersebut terlihat bahwa distribusi angkatan bervariasi dan terbanyak pada angkatan 2008 yaitu sebanyak 25 orang (54,22%), kemudian disusul angkatan 2007 sebanyak 14 orang (30,52%), diikuti angkatan 2009 sebanyak 7 orang (15,26%).

Tabel 5:3
Distribusi Responden berdasarkan lama merokok Pada Mahasiswa FIK-
UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Lamanya merokok	(f)	Persentase (%)
<1 tahun	20	43,47
1-5 tahun	18	39,14
>5 Tahun	8	17,39
Jumlah	46	100%

Dari tabel 3 diatas dapat diketahui distribusi jawaban responden mengenai lamanya merokok, terlihat bahwa terbanyak menjawab lamanya merokok <1 tahun sebanyak 20 orang (43,47%), kemudian disusul 1-5 tahun sebanyak 18 orang (39,14%) dan terakhir >5 tahun sebanyak 8 orang (17,39%).

Tabel 5:4
Distribusi Responden berdasarkan alasan tetap merokok Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Alasan tetap merokok	(f)	Persentase (%)
Lebih santai	12	26,08
Kebiasaan saja	20	43,50
Badan terasa hangat	8	17,39
Menghilangkan kebosanan	6	13,03
Jumlah	46	100%

Sumber : Data Primer

Dari tabel 4 diatas dapat diketahui distribusi jawaban responden mengenai yang dirasakan dan diinginkan pada saat merokok, terlihat bahwa terbanyak menjawab kebiasaan saja sebanyak 20 orang (43,50%), kemudian disusul lebih santai sebanyak 12 orang (26,08%) dan kemudian jawaban badan terasa hangat sebanyak 8 orang (17,39), dan terakhir 6 orang (13,04) menjawab untuk menghilangkan kebosanan.

Tabel 5:5
Distribusi Responden berdasarkan keluhan selama merokok Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Keluhan selama merokok	(f)	Persentase (%)
Batuk	13	28,26
Sesak	21	45,65
BB menurun	10	21,74
Lainnya	2	4,35
Jumlah	46	100%

Sumber : Data Primer

Dari tabel 5 diatas dapat diketahui distribusi jawaban responden mengenai keluhan selama merokok, terlihat bahwa terbanyak menjawab sesak sebanyak 21

orang (45,65%), kemudian disusul batuk sebanyak 13 orang (28,26%) dan kemudian jawaban BB menurun sebanyak 10 orang (21,74%), dan 2 orang (4,35%) menjawab keluhan lainnya.

Tabel 5:6
Distribusi Responden berdasarkan ketergantungan pada rokok Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Ketergantungan pada rokok	(f)	Persentase (%)
Ya	34	73,92
Tidak	12	26,08
Jumlah	46	100%

Sumber : Data Primer

Dari tabel 6 diatas dapat diketahui distribusi jawaban responden mengenai ketergantungan pada rokok pada saat merokok, terlihat bahwa terbanyak menjawab ketergantungan sebanyak 34 orang (73,91%), kemudian disusul dengan tidak ketergantungan pada rokok sebanyak 12 orang (26,08%).

Tabel 5:7
Distribusi Responden efek saat tidak merokok Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Efek saat tidak merokok	(f)	Persentase (%)
Batuk	12	26,08
Mual dan sakit ulu hati	6	13,05
Sakit kepala	23	50,00
Mulut terasa asam	5	10,87
Jumlah	46	100%

Sumber : Data Primer

Dari tabel 7 diatas dapat diketahui distribusi jawaban responden mengenai yang dirasakan pada saat rokok habis, terlihat bahwa terbanyak menjawab sakit kepala sebanyak 23 orang (50,00%), kemudian disusul batuk sebanyak 12 orang (26,08%) dan kemudian jawaban mual dan sakit ulu hati sebanyak 6 orang (13,05%), dan mulut terasa asam sebanyak 5 orang (10,87%).

Tabel 5:8
Distribusi Responden berdasarkan alasan pertama kali merokok Pada
Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Alasan pertama kali merokok	(f)	Persentase (%)
Ingin tahu	22	47,83
Ikut-ikutan	15	32,61
Cari pengalaman	8	17,39
Lainnya	1	2,17
Jumlah	46	100%

Sumber : Data Primer

Dari tabel 8 diatas dapat diketahui distribusi jawaban responden mengenai alasan pertama kali yang mendasari merokok, terlihat bahwa terbanyak menjawab ingin tahu sebanyak 22 orang (47,83%), kemudian disusul ikut-ikutan sebanyak 15 orang (32,61%) dan kemudian jawaban cari pengalaman sebanyak 8 orang (17,39), dan terakhir 1 orang (2,17%) mengemukakan alasan lain merokok.

Tabel 5:9
Distribusi Responden berdasarkan kondisi saat membutuhkan rokok Pada
Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Kondisi saat membutuhkan rokok	(f)	Persentase (%)
Belajar dan kerja keras	8	17,39
Bersama teman	15	32,61
Waktu santai	13	28,26
Lainnya	10	21,74
Jumlah	46	100%

Sumber : Data Primer

Dari tabel 9 diatas dapat diketahui distribusi jawaban responden mengenai kondisi sangat membutuhkan rokok, terlihat bahwa terbanyak menjawab bersama teman sebanyak 15 orang (32,61%), kemudian disusul waktu santai sebanyak 13 orang (28,26%) dan kemudian jawaban lainnya sebanyak 10 orang (21,74%), dan terakhir 8 orang (17,39%) menjawab pada saat belajar dan kerja keras.

Tabel 5:10
Distribusi Responden berdasarkan keinginan berhenti merokok Pada
Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Keinginan berhenti merokok	(f)	Persentase (%)
Punya	43	93,48
Tidak punya	3	6,52
Jumlah	46	100%

Sumber : Data Primer

Dari tabel 10 diatas dapat diketahui distribusi jawaban responden mengenai mempunyai keinginan untuk berhenti merokok, terlihat bahwa terbanyak menjawab punya keinginan untuk berhenti merokok sebanyak 43 orang (93,48%), dan sebanyak 3 orang (6,52%) tidak punya keinginan untuk berhenti merokok.

Tabel 5:11
Distribusi Responden berdasarkan alasan kembali merokok Pada
Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Alasan kembali merokok	(f)	Persentase (%)
Menambah kekuatan	7	15,22
Menjadi kebiasaan	34	73,91
Takut ditinggal teman	5	10,87
Tidak tahu akibat merokok	0	00,00
Jumlah	46	100%

Sumber : Data Primer

Dari tabel 11 diatas dapat diketahui distribusi jawaban responden mengenai keinginan kembali merokok, terlihat bahwa terbanyak menjawab menjadi kebiasaan sebanyak 34 orang (73,91%), kemudian disusul menambah kekuatan percaya diri dan konsentrasi sebanyak 7 orang (15,22%) dan kemudian jawaban takut ditinggal teman sebanyak 5 orang (10,87%), dan terakhir tidak ada responden yang menjawab tidak tahu akibat merokok.

Tabel 5:12
Distribusi Responden berdasarkan kekhawatiran terhadap kesehatan
akibat merokok Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Kekhawatiran terhadap kesehatan akibat merokok	(f)	Persentase (%)
Pernah	40	86,96
Tidak pernah	6	13,04
Jumlah	46	100%

Sumber : Data Primer

Dari tabel 12 diatas dapat diketahui distribusi jawaban responden mengenai mengkhawatirkan kesehatan akibat merokok, terlihat bahwa terbanyak menjawab pernah sebanyak 40 orang (86,96%) dan yang tidak pernah mengkhawatirkan kesehatannya yakni 6 orang (13,04%).

Tabel 5:13
Distribusi Responden berdasarkan orang yang pertama kali mengajak
merokok Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Yang pertama kali mengajak merokok	(f)	Persentase
Teman	35	76,09
Saudara	4	8,69
Orang tua	0	00,00
Lainnya	7	15,22
Jumlah	46	100%

Sumber : Data Primer

Dari tabel 13 diatas dapat diketahui distribusi jawaban responden mengenai yang pertama kali mengajak merokok, terlihat bahwa terbanyak menjawab ajakan teman sebanyak 35 orang (76,09%), kemudian disusul dengan kategori lainnya sebanyak 7 orang (15,22%) dan untuk orang tua 0 %.

Tabel 5:14
Distribusi Responden berdasarkan umur pertama kali merokok Pada
Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Umur pertama kali merokok	(f)	Persentase (%)
6-12 tahun	2	4,35%
13-15 tahun	13	28,26%
16-20 tahun	24	52,17%
>20 tahun	7	15,22%
Jumlah	46	100%

Sumber : Data Primer

Dari tabel 14 diatas dapat diketahui distribusi jawaban responden mengenai tentang usia pertama kali merokok, terlihat bahwa terbanyak menjawab 16-20 tahun sebanyak 24 orang (52,17%), kemudian disusul 13-15 tahun sebanyak 13 orang (28,26%) dan kemudian jawaban >20 tahun sebanyak 7 orang (15,22%), dan terakhir 6-12 tahun sebanyak 2 orang (4,35%).

Tabel 5:15
Distribusi Responden berdasarkan teman bergaul yang merupakan perokok
Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Teman bergaul merupakan perokok	(f)	Persentase (%)
Ya	42	91,31
tidak	4	8,69
Jumlah	46	100%

Sumber : Data primer

Dari tabel 15 diatas dapat diketahui distribusi jawaban responden mengenai teman bergaul merupakan perokok, terlihat bahwa terbanyak menjawab teman bergaul mereka merokok sebanyak 42 orang (91,31%), dan yang tidak merokok sebanyak 4 orang (8,69%).

Tabel 16
Distribusi Responden berdasarkan larangan keluarga merokok Pada
Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Keluarga melarang merokok	(f)	Persentase (%)
Ya	38	82,61
tidak	8	17,39
Jumlah	46	100%

Sumber : Data Primer

Dari tabel 16 diatas dapat diketahui distribusi jawaban responden mengenai keluarga melarang merokok, terlihat bahwa terbanyak menjawab keluarga melarang merokok sebanyak 38 orang (82,61%), dan keluarga yang tidak melarang merokok sebanyak 8 orang (17,39%).

Tabel 5:17
Distribusi Responden berdasarkan motivasi merokok Pada Mahasiswa
FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010.

motivasi merokok	(f)	Persentase (%)
Rasa penasaran	19	41,30
Lebih gaul	10	21,74
Agar lebih jantan	2	4,35
Ekspresi kebebasan	15	32,61
Jumlah	46	100%

Sumber : Data Primer

Dari tabel 17 diatas dapat diketahui distribusi jawaban responden mengenai yang memotivasi merokok, terlihat bahwa terbanyak menjawab rasa penasaran sebanyak 19 orang (41,30%), kemudian disusul ekspresi kebebasan 15 orang (32,61%) lebih gaul sebanyak 10 orang (21,74%) dan terakhir 2 orang (4,35%) menjawab agar lebih jantan.

Tabel 5:18
Distribusi Responden berdasarkan jumlah rokok yang dikonsumsi dalam sehari Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Jumlah batang rokok yang dikonsumsi dalam sehari	(f)	Persentase (%)
<10 batang	39	84,78
10-20 batang	5	10,87
>20 batang	2	4,35
Jumlah	46	100%

Sumber : Data Primer

Dari tabel 18 diatas dapat diketahui distribusi jawaban responden tentang jumlah batang rokok yang dikonsumsi dalam sehari, terlihat bahwa terbanyak menjawab <10 batang sebanyak 39 orang (84,78%), kemudian disusul 10-20 batang sebanyak 5 orang (10,87%) dan >20 batang sebanyak 2 orang (4,35%) kemudian jawaban dengan pilihan lainnya 0 responden.

Tabel 5:19
Distribusi Responden berdasarkan pernah berhenti merokok Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Pernah berhenti merokok	(f)	Persentase (%)
Pernah	15	32,61
Tidak pernah	31	67,39
Jumlah	46	100%

Sumber : Data Primer

Dari tabel 19 diatas dapat diketahui distribusi jawaban responden mengenai pernah berhenti merokok terbanyak menjawab tidak pernah sebanyak 31 orang (67,39%), dan pernah berhenti merokok sebanyak 15 orang (32,61%).

Tabel 5:20
Distribusi Responden berdasarkan apa yang diperoleh dari merokok selama ini Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Yang diperoleh dari merokok	(f)	Persentase (%)
Lebih gaul	11	23,91
Merasa tenang	10	21,74
Merasa jantan	2	4,35
Lebih percaya diri	14	30,44
Menambah konsentrasi	9	19,56
Jumlah	46	100%

Sumber : Data Primer

Dari tabel 20 diatas dapat diketahui distribusi jawaban responden mengenai yang diperoleh dari merokok, terlihat bahwa terbanyak menjawab lebih percaya diri sebanyak 14 orang (30,44%), kemudian disusul lebih gaul sebanyak 11 orang (23,91%) dan menambah konsentrasi sebanyak 9 orang (19,56%) kemudian jawaban merasa tenang sebanyak 10 orang (21,74%), dan terakhir 2 orang (4,35%) menjawab untuk merasa jantan.

Tabel 5:21
Distribusi Responden berdasarkan alasan yang mendasari tetap merokok Pada Mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar Juli 2010

Yang mendasari tetap merokok	(f)	Persentase (%)
Tidak tahu bahaya rokok	0	00,00
Memberikan kenikmatan	26	56,51
Tahu bahaya rokok	8	17,39
Tidak menyukai akibat ketika berhenti merokok	12	26,08
Jumlah	46	100%

Sumber : Data Primer

Dari tabel 4 diatas dapat diketahui distribusi jawaban responden mengenai yang mendasari tetap merokok, terlihat bahwa terbanyak menjawab memberikan

kenikmatan sebanyak 26 orang (56,52%), kemudian disusul tidak menyukai akibat ketika berhenti merokoki sebanyak 12 orang (26,08%) dan kemudian jawaban tidak tahu bahaya rokok sebanyak 8 orang (17,39), dan terakhir tidak ada responden yang tidak tahu bahaya dari merokok.

B. PEMBAHASAN

Pada penelitian yang dilakukan terhadap 46 responden mahasiswa FIK-UIN Alauddin Makassar angkatan 2007, 2008, dan 2009, terlihat bahwa umur responden bervariasi, mulai umur 17-23 tahun, dengan jumlah terbesar pada kelompok umur 19-21 tahun (60,88) dan jumlah terkecil kelompok umur 16-18 tahun (13,08%), dimana responden seluruhnya adalah laki-laki. Kebanyakan responden kami adalah mahasiswa angkatan 2008, disusul mahasiswa angkatan 2007, dan terakhir mahasiswa angkatan 2009.

Dari hasil penelitian yang kami lakukan tentang usia pertama kali responden merokok, ternyata tertinggi pada usia 16-20 tahun (52,17) dan yang terendah pada usia 6-12 tahun, ini berarti lamanya mereka merokok terbesar diatas 4 tahun. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan pada pelajar SMK Kartika Bhakti dimana rata-rata umur pertama kali merokok antara 15-18 tahun. Mungkin diusia tersebut mereka lebih banyak meniru orang-orang merokok disekitarnya, oleh beberapa peneliti mengatakan bahwa diusia tersebut anak-anak ingin merasa “besar” dan “penting” seperti orang dewasa sehingga mendorong mereka untuk meniru perbuatan orang dewasa. (Adonia dan Alfrida 1995). salah satunya adalah merokok walaupun pada penelitian ini didapatkan responden sebanyak (82,61%) keluarga mereka

melarang merokok, faktor keluarga sangat berperan dalam membantu menjaga mereka dari pergaulan yang buruk serta mengarahkan mereka untuk mengerjakan hal-hal yang positif sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. at-Tahrim (66) : 6.



Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.

Ayat diatas menjelaskan bahwa hal yang pertama yang harus kita hindarkan dari perbuatan-parbuatan buruk yang dapat menjerumuskan seseorang kedalam neraka adalah diri sendiri kemudian keluarga dan setelah itu barulah kita memperbaiki orang lain, sehingga orang lainpun yakin terhadap ajakan untuk meninggalkan perbuatan yang merugikan dan berbuat kebaikan, Sedangkan siapa yang pertama kali mengajak mereka merokok, responden terbanyak menjawab “teman (76,09%)” diikuti “lainnya (15,22%)” dan ada juga responden menjawab “saudara (8,69%)”.responden yang menjawab lain-lain didasarkan pada alasan bahwa mereka merokok pertama kali tidak diajak oleh siapapun, mungkin karena kemauan sendiri , dan alasan mereka pertama kali merokok dari 46 responden terbanyak menjawab “ingin tahu” (42,83%%) dan (32,61%) responden menjawab ikut –ikutan dan yang terkecil dengan alasan yang tidak jelas dengan menjawab”lain-lain (2,17%)” . hasil ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian di SMUN 1 dan SMUN 6 Makassar pada tahun 2009(Sherley dan

Nathalia) menunjukkan bahwa alasan pertama kali merokok pada kedua SMU ialah “ingin tahu” (48%) disusul alasan “ikut-ikutan” (20%). Hal ini dapat dipahami karena diusia remaja dengan rasa ingin tahu dan mencoba-coba sesuatu yang baru dan menarik baginya sangat besar dan minimnya kemampuan remaja dalam mengambil keputusan yang sehat berdasarkan pertimbangan yang matang dalam hal merokok. Remaja adalah masa yang penuh dengan permasalahan. Statemen ini sudah dikemukakan jauh pada masa lalu yaitu di awal abad ke-20 oleh Bapak Psikologi Remaja yaitu Stanley Hall. Pendapat Stanley Hall pada saat itu yaitu bahwa masa remaja merupakan masa badai dan tekanan (*storm and stress*).

Menurut Erickson masa remaja adalah masa terjadinya krisis identitas atau pencarian identitas diri. Gagasan Erickson ini dikuatkan oleh James Marcia yang menemukan bahwa ada empat status identitas diri pada remaja yaitu *identity diffusion/ confusion, moratorium, foreclosure, dan identity achieved* (Santrock, 2003, Papalia, dkk, 2001, Monks, dkk, 2000, Muss, 1988). Karakteristik remaja yang sedang berproses untuk mencari identitas diri ini juga sering menimbulkan masalah pada diri remaja.

Gunarsa (1989) merangkum beberapa karakteristik remaja yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada diri remaja, yaitu Kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan, ketidakstabilan emosi, adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup, adanya sikap menentang dan menantang orang tua, pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan-pertentangan dengan orang tua,

kegelisahan karena banyak hal diinginkan tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya, senang bereksperimentasi, senang bereksplorasi, mempunyai banyak fantasi, khayalan, dan bualan, kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan kegiatan berkelompok.

Berdasarkan tinjauan teori perkembangan, usia remaja adalah masa saat terjadinya perubahan-perubahan yang cepat, termasuk perubahan fundamental dalam aspek kognitif, emosi, sosial dan pencapaian (Fagan, 2006). Sebagian remaja mampu mengatasi transisi ini dengan baik, namun beberapa remaja bisa jadi mengalami penurunan pada kondisi psikis, fisiologis, dan sosial. Beberapa permasalahan remaja yang muncul biasanya banyak berhubungan dengan karakteristik yang ada pada diri remaja.

Dari hasil penelitian tentang apa yang dirasakan dan diinginkan pada saat merokok, responden terbesar menjawab “kebiasaan saja” (43,50%) dan terbesar kedua menjawab lebih santai (26,08%), paling sedikit responden menjawab menghilangkan kebosanan (13,03%). Jawaban tersebut dapat dipahami karena nikotin dalam rokok dapat mempengaruhi system saraf pusat sebagai stimulant atau penenang, tergantung dari jumlah yang dihisap serta keadaan psikologis dan fisiologis si perokok. Demikian halnya dengan jawaban responden mengenai kondisi dimana mereka sangat membutuhkan rokok, tertinggi menjawab “bersama teman” (32,61%) dan terendah menjawab “saat belajar /bekerja” (17,39%), Berbagai fakta mengungkapkan bahwa semakin banyak remaja merokok maka semakin besar kemungkinan teman-temannya adalah perokok juga dan demikian sebaliknya. Dari fakta tersebut ada dua kemungkinan yang

terjadi, pertama remaja tadi terpengaruh oleh teman-temannya atau bahkan teman-temannya yang dipengaruhi oleh remaja tersebut yang akhirnya mereka semua menjadi perokok. Diantara remaja perokok terdapat 87% mempunyai sekurang-kurangnya satu atau lebih sahabat perokok begitu pula dengan remaja nonperokok. (Dakwatuna.com)

Namun pada penelitian ini sebagian kecil responden merasa tidak tergantung pada rokok (26,08%) dan sekitar (73,92%) yang merasa sangat tergantung pada rokok yang didukung sekitar (50,00%) yang merasa sakit kepala jika tidak mengkonsumsi rokok. Demikian halnya dengan persoalan pernah berhenti merokok, sekitar (67,39%) responden menyatakan tidak pernah berhenti merokok. Alasan tertinggi bahwa merokok dapat menambah kekuatan, menambah konsentrasi serta dapat menghilangkan stress (56,51%) sedangkan alasan bahwa merokok sudah merupakan kebiasaan (73,91%) dan terakhir beralasan takut ditinggal teman (10,87%). Hal itu disebabkan oleh efek dari nikotin yang merupakan zat adiktif yang mempengaruhi saraf dan peredaran darah. Pada system saraf pusat sebagai stimulan atau penenang tergantung dari jumlah yang dihisap serta keadaan fisiologik dan psikologik si pemakai. Nikotin merupakan substansi yang menimbulkan adiksi. Apabila penggunaannya dihentikan secara tiba-tiba maka dapat menimbulkan suatu periode depresi. Periode ini menyebabkan sulitnya usaha untuk menghentikan kebiasaan merokok. (Fajriwan,1999).

Ketidaktergantungan perokok terhadap rokok dan masih pernahnya mereka berhenti merokok seperti pada penelitian kami ini, dimungkinkan karena mereka

belum termasuk dalam kategori perokok berat, yakni perokok yang merokok lebih dari 10 batang perhari (soewandi, 1995) sedangkan perokok yang pernah berhenti namun kembali merokok, dapat dihubungkan dengan efek nikotin yang dapat menimbulkan ketergantungan berupa adiksi dan ditambah lagi ketidakmampuan remaja dalam mengambil keputusan yang sehat berdasarkan pertimbangan yang matang dalam hal kembalinya merokok.

Dari hasil penelitian ini juga kami dapatkan bahwa kekhawatiran perokok terhadap kesehatan akibat rokok, karena hampir seluruhnya menjawab khawatir dengan kesehatannya akibat rokok (86,96%) mungkin karena kekhawatiran tersebut maka mereka juga punya keinginan untuk berhenti merokok, (93,48%) responden menjawab punya keinginan untuk berhenti merokok. Ini berarti mereka pada umumnya masih memiliki kesadaran bahwa merokok merupakan perilaku yang kurang baik yang dapat merugikan kesehatan, Karena sekitar (45,65%) responden merasa sesak dan (28,26 %) mengalami batuk. Pengetahuan tentang bahaya merokok terhadap kesehatan tubuh telah diteliti dan dibuktikan oleh banyak orang. Efek-efek yang merugikan akibat merokok pun sudah diketahui dengan jelas. Banyak penelitian membuktikan bahwa kebiasaan merokok meningkatkan risiko timbulnya berbagai penyakit. Seperti penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah, kanker paru-paru, kanker rongga mulut, kanker laring, kanker oesofagus, bronkhitis, tekanan darah tinggi, impotensi, serta gangguan kehamilan dan cacat pada janin. (Kompas.com, 2009).

Mereka yang terlanjur merokok wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok dengan mengingat peringatan Allah SWT.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. al- Ankabut (29) : 69.

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk (mencari keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.

Ketika kita memiliki keinginan yang kuat untuk berhenti melakukan perbuatan yang buruk, maka Allah SWT akan membantu kita selama kita mau berusaha dan berdo'a agar yang kita inginkan dapat terwujud dan Allah juga tidak akan memberikan kepada hambanya cobaan yang tidak mampu ia selesaikan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa rasa ingin tahu merupakan alasan terbesar responden yang mendasari alasan pertama kali merokok.
2. Berdasarkan orang yang pertama kali mengajak merokok, teman merupakan pilihan terbanyak yang mempengaruhi responden merokok.
3. Dari hasil gambaran kebiasaan merokok berdasarkan kondisi saat responden sangat membutuhkan rokok yaitu ketika berkumpul bersama teman.
4. Yang menjadi motivasi terbesar responden untuk merokok adalah tingginya rasa penasaran mereka untuk mencoba rokok.
5. Sakit kepala merupakan keluhan yang paling sering dialami responden ketika tidak merokok.
6. Berdasarkan hasil penelitian, meningkatnya kepercayaan diri responden merupakan efek terbesar yang mereka peroleh dari merokok.

7. Masih kurangnya kesadaran untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT menjadi penyebab utama masih bertahannya kebiasaan merokok pada mahasiswa.

B. Saran

1. Perlu diadakan program pemberian informasi secara intensif oleh instansi kesehatan dan pendidikan mengenai dampak merokok secara dini.
2. Kepada instansi pendidikan dan pemerintahan diharapkan untuk lebih memperketat aturan dilarang merokok pada tempat tertentu.
3. Perlu diadakan kajian keagamaan yang membahas tentang rokok dan hukumnya.
4. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji dan membahas akibat dari zat-zat racun yang terkandung dalam rokok.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-kariim.

Ahmad, Dr. *Filsafat Umum. Tafsir.* Bandung: Rosda Karya, 2003.

Anonymous., *Bahaya Merokok,* terdapat Dalam <http://www.antirokok.or.id/berita.2008>.

Azis, salim, *500 nasehat dan bimbingan islam.* Jakarta : Gema insane, 1996.

Aziz, B.G., Sulfadly., *Survey Prevalensi Perokok Pada Mahasiswa UMI Makassar.* Makassar, Universitas Hasanuddin., 2005.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia,* Cet 10, Jakarta: Balai Pustaka,1999.

Djaali, H., *psikologi Pendidikan,* Cetakan Ke 3, Jakarta: PT. Dian rakyat, 2003.

Fajriwan, A.Y., *Perokok Pasif,* dalam Jurnal Respirologi Indonesia Vol. 10 No. 1., Jakarta, 1999.

Lane, Nancy E., *Osteoporosis,* diterjemahkan oleh Eri D. Nasution, dengan judul: Osteoporosis (Rapuh Tulang) edisi 1, Cet 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Mangku, S., *Usaha Mencegah Bahaya Rokok,* P.T. Gramedia, 1998: 11-27.

MUI; *Fatwa Haram Merokok,* <http://www.Dakwatuna.com/artikel.php?pil=238id=123720>; 2004.

Nashr, Abdul Karim Muhammad, *ROKOK HARAM,* Cet 1, Bandung: Citra Risalah, 2008.

- Nurlita, sari, *Tobat Merokok*, Cetakan II, Depok : Pustaka iman, 2006.
- Notoatmodjo, S., *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.
- Notoatmodjo, S.. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Cetakan I. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007.
- Quraisy shihab, *Wawasan Al-qur'an*, Jakarta,2002.
- Rina, R., *Konsumsi Rokok Indonesia Lima Besar Dunia : PP. RI No. 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*, dalam <http://www.pikas.bkkbn.go.id/article.php>.
- Rositawaty,S., *25 Kiat Sehat dan Bugar*, Jakarta Timur: PT. Karya Kita, 2007.
- S.Suriasumantri, Jujun. *Filsafat ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998
- Sehari 1.174 Orang Mati Karena Rokok; <http://www.Dakwatuna.com/org/html/15> Agustus 2008.
- Sirait, A.M. dkk.,*Perilaku Merokok di Indonesia*,dalam Buletin Penelitian Kesehatan Vol.3.m., Jakarta, departemen Kesehatan R.I.,2002:139.
- Sudijono, Anas. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sugiono, DR, *Metode Penelitian Administrasi*, Edisi ke-5, Bandung: CV. ALFABETA, 1998.
- Sunaryo, *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta : EGC, 2004.
- WHO; *Iklan Rokok Dorong remaja Merokok*; <http://www.Gatra.com/artikel.php?pil=238id=123720>; 2004.
- Zulkifli, *Thank You For Smoking*, Cet 1, Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2008.
- , *Serangan Jantung dan Stroke*, Edisi ke 2, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,2004.
- , *Tujuan Syariat Islam*, <http://www.dakwatuna.com/artikel>.

LAMPIRAN

GAMBARAN KEBIASAAN MEROKOK PADA MAHASISWA
 FAKULTAS ILMU KESEHATAN
 UIN ALAUDDIN
 MAKASSAR

KUESIONER

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Nomor :
 NIM : Kode Responden :
 Angkatan :
 Umur :
 Alamat :

PERTANYAAN TENTANG FAKTOR FISIOLOGIK

Berilah tanda silang (X) pada jawaban anda.

NO	PERTANYAAN
1.	Sudah berapa lama anda merokok? a. <1 tahun c. >5 tahun b. 1-5 tahun d. lainnya
2.	Apa yang anda rasakan dan inginkan pada saat merokok? a. Lebih santai, fikiran tenang. b. Merupakan kebiasaan saja. c. Badan terasa hangat.

1.	<p>Apa yang memotivasi anda untuk merokok</p> <ul style="list-style-type: none">a. Rasa penasaran/ingin mencobab. Agar lebih gaulc. agar lebih jantand. ekspresi kebebasan
2.	<p>Berapa batang rokok yang anda konsumsi dalam sehari?</p> <ul style="list-style-type: none">a. <10 batangb. 10-20 batangc. >20 batangd. lainnya
3.	<p>Pernahkah anda berhenti merokok?</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pernahb. Tidak pernah
4.	<p>Apa yang anda peroleh dari merokok selama ini?</p> <ul style="list-style-type: none">a. Merasa lebih gaulb. Merasa tenang/rileksc. Merasa jantand. Merasa lebih percaya dirie. Menambah konsentrasi saat belajar/bekerja
5.	<p>Jika saudara pernah mencoba berhenti merokok tetapi tidak berhasil atau memang tidak mau berhenti merokok, apa yang mendasari anda kembali merokok?</p> <ul style="list-style-type: none">a. Karena tidak mengetahui bahaya merokok bagi kesehatanb. Merokok memberikan kenikmatan, menambah konsentrasi, dan menghilangkan kecemasan.c. Tahu bahaya merokok tetapi tidak mampu berhenti karena faktor kecanduan.d. Karena tidak menyukai akibat yang ditimbulkan bila berhenti merokok.