

**HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN PASIEN
TUBERKULOSIS PARU DENGAN KETERATURAN BEROBAT DI
WILAYAH KERJA PUSKESMAS KASSI-KASSI**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh
SISKAWATI
NIM. 70300106080

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2010

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir saya yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep) pada program studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul **“HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN PASIEN TUBERKULOSIS PARU DENGAN KETERATURAN BEROBAT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KASSI-KASSI** Penulis menyadari akan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun merupakan input dalam penyempurnaan selanjutnya. Semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang dan masyarakat pada umumnya.

Mengawali ucapan terima kasih ini disampaikan penghargaan yang istimewa kepada ayahanda dan ibunda tercinta atas segala perhatian, kasih sayang, do'a restu serta pengorbanannya yang tak terhingga. Ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Azhar Arsyad, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
2. Bapak dr. H. M. Furqan Naiem, M. Sc, P.hD selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh

stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.

3. Ibu Nur Hidayah, S.Kep, Ns, M.Kes selaku ketua Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan bimbingan selama masa pendidikan.
4. Bapak Muh.Anwar S.Kep, Ns, M.Kes dan bapak, Misbahuddin, S. Kep, Ns selaku dosen pembimbing yang dengan kerelaan dan keikhlasannya memberikan bimbingan dari awal hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Alfi Syahar S. Kep, Ns, M. Kes, selaku penguji yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Nurman Said M.A selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Kepala Puskesmas Kassi-Kassi yang telah memberikan ijin penelitian penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada pasien TBC selaku responden penelitian atas kesediannya meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.
9. Kepada seluruh teman-teman yang banyak membantu dan memberikan motivasi serta kebersamaan menghadapi tantangan dan cita-cita.
10. Seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi kita semua khususnya perkembangan ilmu keperawatan.

Makassar, 3 Agustus 2010

Penulis

SISKAWATI



DAFTAR TABEL

Tabel 5.1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pengetahuan pasien TB Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi pada bulan Juli – Agustus 2010

Tabel 5.2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Keteraturan Berobat tentang TB Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi pada bulan Juli –Agustus 2010

Tabel 5.3. Hubungan Antara Pengetahuan dengan Keteraturan Berobat di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi pada bulan Juli –Agustus 2010



ABSTRAK

Nama : Siskawati

Nim :70300106056

Judul : HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN PASIEN TUBERKULSIS PARU DENGAN KETERATURAN BEROBAT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KASSI-KASSI

Tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang masih menjadi masalah serius di berbagai bagian dunia. Di Indonesia, tuberkulosis menjadi penyebab kematian ke tiga setelah penyakit kardiovaskuler dan penyakit saluran pernafasan. Pengobatan pada tuberkulosis merupakan paduan obat anti tuberkulosis (OAT) jangka pendek dengan pengawasan langsung oleh pengawas menelan obat (PMO). Ketidakteraturan minum obat merupakan salah satu penyebab kegagalan program penanggulangan TB Paru. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif korelasi dengan menggunakan metode survei dengan pendekatan cross sectional. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dimana data primer menggunakan kuesioner dan data sekunder dengan melihat catatan berobat dan melihat register di Puskesmas. Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih/diambil dari suatu populasi. Dalam pengambilan sampel ini peneliti menggunakan tehnik *aksidental sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan kebetulan bertemu. Berdasarkan hasil penelitian bahwa data menggunakan uji statistic dengan chi square pada tabel di atas maka di peroleh hasil nilai value =0,017 pada batas kemaknaan (α 0,05) maka H_0 ditolak yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan pasien TB paru dengan keteraturan berobat. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengetahuan tentang TB paru, sikap untuk melakukan pengobatan dan motivasi untuk berobat teratur ada hubungan dengan keteraturan berobat. Saran penulis kepada Puskesmas agar lebih memperhatikan dan memberikan penyuluhan tentang penyakit TB paru kepada masyarakat sebagai upaya preventif guna mengurangi penyakit TB paru.

Kata kunci :Pengetahuan,Keteraturan berobat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuberkulosis paru merupakan suatu infeksi kronik jaringan paru, yang dapat menular dan disebabkan oleh kuman tuberkulosis. Kuman tersebut biasanya masuk ke dalam tubuh manusia melalui udara pernafasan ke dalam paru, kemudian kuman tersebut menyebar dari paru ke bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah, sistem saluran limfe, melalui saluran nafas (*bronchus*) atau penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya, baik di paru maupun di luar paru.

Tuberkulosis disebabkan oleh kuman, dan karena itu tuberkulosis bukanlah penyakit keturunan. Karena disebabkan oleh kuman, maka tuberkulosis dapat ditularkan dari seseorang ke orang lain. Bila seorang penderita tuberkulosis batuk-batuk misalnya, maka kuman tuberkulosis yang ada didalam paru-parunya akan ikut dibatukkan ke luar, dan bila kemudian terisap orang lain maka kuman tuberkulosis itu akan ikut pula terisap dan mungkin menimbulkan penyakit. Hanya saja memang perlu diketahui bahwa tidak semua penderita tuberkulosis paru berpotensi menularkan penyakit-penyakit pada orang lain.

Kuman tuberkulosis berbentuk batang, mempunyai sifat khusus yaitu tahan terhadap asam pada pewarnaan. Oleh karena itu disebut sebagai Basil Tahan Asam (BTA), kuman TB cepat mati dengan sinar matahari langsung, tetapi dapat bertahan hidup beberapa jam ditempat yang gelap dan lembab.

Dalam jaringan tubuh kuman ini dapat *dormant*, (tertidur lama selama beberapa tahun), selama beberapa bulan.

World Health Organization (WHO) dalam Annual Report on Global TB Control 2003 menyatakan terdapat 22 negara dikategorikan sebagai high-burden countries terhadap tuberkulosis paru. Indonesia termasuk peringkat ketiga setelah India dan China dalam menyumbang tuberkulosis paru di dunia. Menurut WHO estimasi incidence rate untuk pemeriksaan dahak didapatkan BTA (+) adalah 115 per 100.000.

Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 2001 estimasi prevalensi angka kesakitan di Indonesia sebesar 8 per 1000 penduduk berdasarkan gejala tanpa pemeriksaan laboratorium. Tuberkulosis paru menduduki ranking ketiga sebagai penyebab kematian (9,4% dari total kematian) . setelah penyakit sistem sirkulasi dan sistem pernafasan. Hasil survei prevalensi tuberkulosis di Indonesia tahun 2004 menunjukkan bahwa angka prevalensi tuberkulosis BTA (+) secara nasional 110 per 100.000 penduduk .

Sejak tahun 2000 Indonesia telah berhasil mencapai dan mempertahankan angka kesembuhan sesuai dengan target global, yaitu minimal 85% penemuan kasus Tuberkulosis paru di Indonesia pada tahun 2006 adalah 76%. Keberhasilan pengobatan Tuberkulosis paru dengan DOTS pada tahun 2004 adalah 83% dan meningkat menjadi 91% pada tahun 2005.

Penerapan strategi DOTS secara baik, disamping secara cepat menekan penularan, juga mencegah berkembangnya Multi Drugs Resistance

Tuberculosis (MDR-TB). Fokus utama DOTS adalah penemuan dan penyembuhan pasien, prioritas diberikan kepada pasien menular. Menemukan dan menyembuhkan pasien merupakan cara terbaik dalam upaya pencegahan penularan tuberculosis paru. WHO telah merekomendasikan strategi DOTS sebagai strategi dalam penanggulangan tuberculosis paru sejak tahun 1995 .

Berdasarkan data puskesmas kassi-kassi, pada tahun 2009 jumlah total penderita tuberculosis sebanyak 103 orang. Yang masih melanjutkan pengobatan lengkap sebanyak 49 orang, sembuh 51 orang, dan penderita yang mengalami drop out sebanyak 3 orang. Sedangkan pada tahun 2010, jumlah penderita yang sembuh sebanyak 44 orang ,dan yang mengalami drop out sebanyak 6 orang. Hal ini memberikan gambaran bahwa angka kesembuhan penderita TB paru sangat rendah, masalah yang menjadi penyebabnya yaitu masyarakat belum menyadari bahaya TB paru tersebut. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang mengenai Hubungan antara tingkat Pengetahuan pasien tuberculosis paru dengan keteraturan berobat pada wilayah kerja puskesmas Kassi-Kassi.

B. Rumusan Masalah

Apakah ada Hubungan antara tingkat pengetahuan pasien tuberculosis paru dengan keteraturan berobat di wilayah kerja puskesmas Kassi-Kassi.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan pasien tuberkulosis paru dengan keteraturan berobat di wilayah kerja Puskesmas kassi-kassi.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan pasien tuberkulosis paru dengan keteraturan berobat di wilayah kerja Puskesmas kassi-k assi
- b. mengidentifikasi keteraturan berobat di wilayah kerja puskesmas Kassi-Kassi
- c. mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan pasien tuberkulosis paru dengan keteraturan berobat di wilayah kerja puskesmas Kassi-Kassi.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Puskesmas

Mendapatkan masukan tentang hubungan tingkat pengetahuan pasien tuberkulosis paru dengan keteraturan berobat , berupa saran dan harapan yang luas untuk dijadikan masukan bagi peningkatan dan pengobatan di Puskesmas Kassi-kassi.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi peneliti untuk mendapatkan pengalaman dan mengetahui hubungan tingkat pengetahuan pasien tuberkulosis paru dengan keteraturan berobat

3. Bagi profesi keperawatan

Hasil penelitian ini dapat menambah informasi khususnya mengenai TB paru tentang pentingnya tingkat pengetahuan pasien Tuberkulosis paru dengan keteraturan berobat

4. Bagi institusi

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan kepada pihak institusi, dinas kesehatan setempat ataupun masyarakat yang terkait dan dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan kebijakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tuberkulosis Paru (TBC)

1. Pengertian Tuberkulosis Paru (TBC)

Tuberkulosis paru adalah penyakit infeksi yang menyerang parenkim paru-paru yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*. Penyakit ini dapat juga menyebar ke bagian tubuh lain seperti meningen, ginjal, tulang, dan nodus limfe. Pada hampir semua kasus, infeksi tuberkulosis didapat melalui inhalasi partikel kuman yang cukup kecil (sekitar 1-5 μ m). Droplet dikeluarkan selama batuk, tertawa, atau bersin. Nukleus yang terinfeksi kemudian terhirup oleh individu yang rentan (hospes). Sebelum infeksi pulmonari dapat terjadi, organisme yang terhirup terlebih dahulu harus melawan mekanisme pertahanan paru dan masuk jaringan paru.

2. Penyebab Tuberkulosis Paru (TBC)

Mycobacterium tuberculosis merupakan jenis kuman berbentuk batang berukuran panjang 1-4 μ m dengan tebal 0,3-0,6 μ m. Sebagian besar komponen *Mycobacterium tuberculosis* adalah berupa lemak/lipid sehingga kuman mampu tahan terhadap asam serta sangat tahan terhadap zat kimia dan faktor fisik. Mikroorganisme ini adalah bersifat aerob yakni menyukai daerah yang banyak oksigen. Oleh karena itu, *Mycobacterium tuberculosis* senang tinggal di daerah apeks paru-paru yang kandungan

oksigenya tinggi. Daerah tersebut menjadi tempat yang kondusif untuk penyakit tuberculosis.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tuberkulosis Paru (TBC)

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian tuberculosis paru diantaranya:


1. Faktor ekonomi, keadaan sosial yang rendah pada umumnya berkaitan erat dengan berbagai masalah kesehatan karena ketidakmampuan dalam *mengatasi* masalah kesehatan. Masalah kemiskinan akan sangat mengurangi kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi, pemukiman dan lingkungan sehat, jelas semua ini akan mudah menumbuhkan penyakit tuberculosis.
2. Status gizi, ini merupakan faktor yang penting dalam timbulnya penyakit tuberculosis. Berdasarkan hasil penelitian kejadian tuberculosis menunjukkan bahwa penyakit yang bergizi normal ditemukan kasus lebih kecil daripada status gizi kurang dan buruk.
3. Status pendidikan, latar belakang pendidikan mempengaruhi penyebaran penyakit menular khususnya tuberculosis paru. Berdasarkan hasil penelitian mengatakan semakin rendah latar belakang pendidikan kecenderungan terjadi kasus tuberculosis, hal ini faktor terpenting dari kejadian tuberculosis paru (TBC).

Sedangkan menurut Departemen Kesehatan, tuberculosis paru (TBC) dapat dipengaruhi oleh:

- a. Status sosial ekonomi

- b. Kepadatan penduduk
- c. Status gizi
- d. Pendidikan
- e. Pengetahuan
- f. Jarak tempuh dengan pusat pelayanan kesehatan
- g. Keteraturanberobat. (Taufan, 2008)

4. Cara Penularan



Gambar: Mekanisme Penularan TB

Sumber penularan adalah penderita TBC BTA positif, pada waktu batuk atau bersin, penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk *droplet* (percikan dahak). Droplet yang mengandung kuman dapat bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam,

orang dapat terinfeksi kalau droplet tersebut terhirup ke dalam saluran pernafasan. Setelah kuman TB masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernafasan, kuman TB tersebut dapat menyebar dari paru ke bagian tubuh lainnya, melalui sistem peredaran darah, sistem saluran limfe, saluran nafas, atau penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya.

Daya penularan dari seorang penderita ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan oleh parunya. Makin tinggi derajat positif hasil pemeriksaan dahak, makin tinggi pula tingkat penularannya. Bila hasil pemeriksaan dahak negatif (tidak terlihat kuman), maka penderita tersebut dianggap tidak menular. Kemungkinan seseorang terinfeksi TB ditentukan oleh konsentrasi droplet dalam udara dan lamanya menghirup udara tersebut.

4. Gejala Penyakit Tuberkulosis Paru (TBC)

a. Batuk

Gejala batuk timbul paling dini dan merupakan gangguan yang paling sering dikeluhkan. Biasanya batuk ringan sehingga dianggap batuk biasa atau akibat rokok. Proses yang paling ringan ini menyebabkan sekret akan terkumpul pada waktu penderita tidur dan dikeluarkan saat penderita bangun pagi hari.

b. Dahak

Dahak awalnya bersifat mukoid dan keluar dalam jumlah sedikit, kemudian berubah menjadi purulen/kuning atau kuning hijau sampai

purulen dan kemudian berubah menjadi kental bila sudah terjadi perlunakan.

c. Batuk darah

Darah yang dikeluarkan penderita mungkin berupa garis atau bercak-bercak darah, gumpalan-gumpalan darah atau darah segar dalam jumlah sangat banyak.

d. Nyeri dada

Nyeri dada pada tuberkulosis paru termasuk nyeri pleuritik yang ringan. Bila nyeri bertambah berat berarti telah terjadi pleuritis luas (nyeri dikeluhkan di daerah aksila, di ujung skapula atau di tempat-tempat lain).

e. Wheezing

Wheezing terjadi karena penyempitan lumen endobronkus yang disebabkan oleh sekret, bronkostenosis, peradangan, jaringan granula, ulserasi dan lain-lain (pada tuberkulosis lanjut).

f. Dispneu

Dispneu merupakan late symptom dari proses lanjut tuberkulosis paru akibat adanya restriksi dan obstruksi saluran pernapasan serta loss of vascular bed / thrombosis yang dapat mengakibatkan gangguan difusi, hipertensi pulmonal dan korpulmonal.

Gejala-gejala umum:

a. Panas badan

Merupakan gejala paling sering dijumpai dan paling penting sering kali panas badan sedikit meningkat pada siang maupun sore hari.

b. Menggigil

Dapat terjadi bila panas badan naik dengan cepat, tetapi tidak diikuti pengeluaran panas dengan kecepatan yang sama atau dapat terjadi sebagai suatu reaksi umum yang lebih hebat.

c. Keringat malam

Keringat malam bukanlah gejala yang patognomonis untuk penyakit tuberkulosis paru. Keringat malam umumnya baru timbul bila proses telah lanjut, kecuali pada orang-orang dengan vasomotor labil, keringat malam dapat timbul lebih dini. Nausea, takikardi dan sakit kepala timbul bila ada panas.

d. Gangguan menstruasi

Gangguan menstruasi sering terjadi bila proses tuberkulosis paru sudah menjadi lanjut.

e. Anoreksia

Anoreksia dan penurunan berat badan merupakan manifestasi toksemia yang timbul belakangan dan lebih sering dikeluhkan bila proses progresif.

f. Lemah badan

Gejala-gejala ini dapat disebabkan oleh kerja berlebihan, kurang tidur dan keadaan sehari-hari yang kurang menyenangkan, karena itu harus dianalisa dengan baik dan harus lebih berhati-hati apabila dijumpai

perubahan sikap dan temperamen (misalnya penderita yang mudah tersinggung), perhatian penderita berkurang atau menurun pada pekerjaan, anak yang tidak suka bermain, atau penyakit yang kelihatan neurotic. Gejala umum ini, seringkali baru disadari oleh penderita setelah ia memperoleh terapi dan saat ini masih lebih baik dari sebelumnya

5. Pengobatan Tuberkulosis Paru (TB)

a. Tujuan Pengobatan

Pengobatan tuberkulosis paru bertujuan untuk menyembuhkan pasien, mencegah kematian, mencegah kekambuhan, memutuskan rantai penularan dan mencegah terjadinya resistensi kuman terhadap OAT (Obat Anti Tuberkulosis). Penderita TBC dapat melakukan rawat jalan dan pengobatan di rumah. Pengobatan TBC biasanya berupa pengobatan oral (obat minum). Pengobatan bertujuan untuk menyembuhkan, mencegah kematian, dan kekambuhan. Penyakit ini kadang kala baru disadari oleh penderita setelah berkelanjutan. Islam memandang, bahwa kesehatan merupakan nikmat dan karunia Allah swt yang wajib disyukuri sehingga Rasullulah bersabda;

Terjemahannya:

“Berobatlah, karena tiada satu penyakit yang diturunkan Allah, kecuali diturunkan pula obat penangkalnya, selain dari satu penyakit,

yaitu ketuaan.” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi dari sahabat Nabi Usmah bin Syuraik)(Shihab, M, 2001).

Dalam Hadist lain Rasulullah saw. bersabda yang artinya :

Terjemahanya:

“Setiap penyakit pasti ada obatnya, maka apabila ditemukan obatnya, maka sembuhlah ia dengan izin Allah”. (HR. Muslim dan Ahmad) (Syauqi, 1999; 37)

Islam memerintahkan agar berobat kepada ahlinya karena kesembuhan penyakit yang datangnya hanya dari Allah SWT dan tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Pengobatan hukumnya mubâh (dibolehkan), karena hal ini telah dilakukan oleh pemimpin orang-orang yang bertawakkal, Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, sehingga sama sekali tidak perlu dipersoalkan orang-orang yang melakukannya.

Demikian pula dengan orang-orang yang memilih untuk bersabar atas penyakitnya apabila dia termasuk orang-orang yang yakin dan tawakkal. Akan tetapi, jika tidak demikian, maka yang lebih utama bagi dirinya adalah segera berobat, dengan keyakinan bahwa Allah *Shubhaanahu wa Ta'ala* Maha Penyembuh. Wallahu A'la wa A'lam. Adapun Obat yang digunakan untuk TBC digolongkan atas dua kelompok yaitu:

Obat primer : INH (isoniazid), Rifampisin, Etambutol, Streptomisin, Pirazinamid. Memperlihatkan efektifitas yang tinggi dengan toksisitas

yang masih dapat ditolerir, sebagian besar penderita dapat disembuhkan dengan obat-obat ini.

Obat sekunder : Exionamid, Paraaminosalisilat, Sikloserin, Amikasin, Kapreomisin dan Kanamisin.

Meskipun demikian pada bulan pertama selama tidak ada resistensi terhadap satu atau lebih obat TBC primer ini. Rangkaian pengobatan harus dijalani dengan lengkap agar TBC dapat disembuhkan, meskipun membutuhkan waktu beberapa bulan (TBC paru minum obat selama 6 bulan, TBC tulang minum obat sampai 18 bulan). Obat yang digunakan merupakan kombinasi antibiotik, tergantung dari resistensi bakteri terhadap obat digunakan. Adapun kategori yang digunakan yaitu:

a. Kategori 1 (2HRZE/4H3R3)

Tahap intensif terdiri dari Isoniasid (H), Rifampisin (R), Pirasinamid (Z) dan Etambutol (E). Obat-obat tersebut diberikan setiap hari selama 2 bulan (2HRZE). Kemudian diteruskan dengan tahap lanjutan yang terdiri dari Isoniasid (H), Rifampisin (R), diberikan tiga kali dalam seminggu selama 4 bulan (4H3R3). Obat ini diberikan untuk: Penderita baru TBC paru BTA (-) Penderita TBC paru BT Af rontgen positif yang “sakit berat” Penderita TBC ekstra paru berat.

b. Kategori 2 : 2HRZES/HRZE/5H3R3E3

Tahap intensif diberikan selama 3 bulan, yang terdiri dari 2 bulan dengan Isoniasid (H), Rifampisin (R), Pirasinamid (Z) dan

Etambutol (E) dan suntikan streptomisin setiap hari di UPK. Dilanjutkan 1 bulan dengan Isoniasid (H), Rifampisin (R), Pirasinamid (Z) dan Etambutol (E) setiap hari. Setelah itu diteruskan dengan tahap lanjutan selama 5 bulan dengan HRE yang diberikan tiga kali dalam seminggu. Perlu diperhatikan bahwa suntikan streptomisin diberikan setelah penderita selesai menelan obat.

Obat ini diberikan untuk:

1. Penderita kambuh (relaps)
2. Penderita gagal (failure)
3. Penderita dengan pengobatan setelaah lalai (after default).

c. Kategori 3 : 2HRZ/4H3R3

Tahap intensif terdiri dari HRZ diberikan setiap hari selama 2 bulan (2HRZ), diteruskan dengan tahap lanjutan terdiri dari HR selama 4 bulan diberikan 3 kali seminggu (4H3R3). Obat ini diberikan untuk: Penderita baru BTA positif dan rontgen positif sakit ringan. Penderita ekstra paru ringan, yaitu TBC kelenjar limfe (limfadenitis), pleuritis eksudativa unilateral, TBC kulit, TBC ulang (kecuali tulang belakang), sendi dan kelenjar adrenal.

d. OAT sisipan (HRZE)

Bila pada akhir tahap intensif pengobatan penderita baru BTA positif dengan kategori 1 atau penderita BTA positif pengobatan

ulang dengan kategori 2, hasil pemeriksaan dahak masih BTA positif, diberikan obat sisipan (HRZE) setiap hari selama 1 bulan .

6. Prinsip Pengobatan

Pengobatan tuberkulosis dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. OAT harus diberikan dalam bentuk kombinasi beberapa jenis obat, dalam jumlah cukup dan dosis tepat sesuai dengan kategori pengobatan. Jangan gunakan OAT tunggal (monoterapi). Pemakaian OAT-Kombinasi Dosis Tetap lebih menguntungkan dan sangat dianjurkan.
- b. Untuk menjamin kepatuhan pasien menelan obat, dilakukan pengawasan langsung (DOT= Directly Observed Treatment) oleh seorang Pengawas Menelan Obat (PMO).
- c. Pengobatan tuberkulosis paru diberikan dalam 2 tahap, yaitu tahap intensif dan lanjutan.

7. PMO (Pengawasan Menelan Obat)

Salah satu komponen DOTS adalah pengobatan paduan OAT jangka pendek dengan pengawasan langsung. Untuk menjamin keteraturan pengobatan diperlukan seorang PMO.

a. Persyaratan PMO

1. Seseorang yang dikenal, dipercaya, dan disetujui, baik oleh petugas kesehatan maupun pasien, selain itu harus disegani dan dihormati oleh pasien.

2. Seseorang yang tinggal dekat dengan pasien.
3. Bersedia membantu pasien dengan sukarela
4. Bersedia dilatih dan atau mendapat penyuluhan bersama-sama dengan pasien.

b. Siapa yang bisa jadi PMO

Sebaiknya PMO adalah petugas kesehatan, misalnya bidan di desa, perawat, pekarya, sanitarian, juru imunisasi, dan lain-lain. Bila tidak ada petugas kesehatan yang memungkinkan, PMO dapat berasal dari kader kesehatan, guru, anggota PPTI, PKK, atau tokoh masyarakat lainnya atau anggota keluarga.

c. Tugas seorang PMO

1. Mengawasi pasien tuberculosis paru agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
2. Memberi dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur.
3. Mengingatkan pasien untuk periksa ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
4. Memberi penyuluhan pada anggota keluarga pasien tuberculosis yang mempunyai gejala-gejala mencurigakan tuberculosis untuk segera memeriksakan diri ke Unit Pelayanan Kesehatan. Tugas seorang PMO bukanlah untuk mengganti kewajiban pasien mengambil obat dari unit pelayanan kesehatan

d. Informasi penting yang perlu dipahami PMO untuk disampaikan kepada pasien dan keluarganya:

1. Tuberkulosis paru disebabkan kuman, bukan penyakit keturunan atau kutukan.
2. Tuberkulosis paru dapat disembuhkan dengan berobat teratur.
3. Pentingnya pengawasan supaya pasien berobat secara teratur.
4. Kemungkinan terjadinya efek samping obat dan perlunya segera meminta pertolongan ke UPK.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya). Pengetahuan yang lebih menekankan pengamatan dan pengalaman inderawi dikenal sebagai pengetahuan empiris atau pengetahuan aposteriori. Pengetahuan ini bisa didapatkan dengan melakukan pengamatan dan observasi yang dilakukan secara empiris dan rasional. Pengetahuan empiris tersebut juga dapat berkembang menjadi pengetahuan deskriptif bila seseorang dapat melukiskan dan menggambarkan segala ciri, sifat, dan gejala yang ada pada objek empiris tersebut.

Pengetahuan empiris juga bisa didapatkan melalui pengalaman pribadi manusia yang terjadi berulang kali. Misalnya, seseorang yang sering dipilih untuk memimpin organisasi dengan sendirinya akan mendapatkan pengetahuan tentang manajemen organisasi. Dengan sendirinya, pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar

pengetahuan seseorang diperoleh melalui indera pendengaran (telinga) dan indera penglihatan (mata).

Pengetahuan tentang keadaan sehat dan sakit adalah pengalaman seseorang tentang keadaan sehat dan sakitnya seseorang yang menyebabkan seseorang tersebut bertindak untuk mengatasi masalah sakitnya dan bertindak untuk mempertahankan kesehatannya atau bahkan meningkatkan status kesehatannya.

Tujuan pengetahuan

1. Untuk menclaparkan kepastian secara menghilangkan prasangka sebagai akibat ketidakpastian.
2. Untuk mendalami dan mengetahui segala segi kehidupan.

Syarat Pengetahuan

- a. Harus ada objeknya
- b. Dapat sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud disusun secara sistematis
- c. Bagian-bagian yang tidak bertentangan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang lengkap.
- d. Harus memiliki metodologi tertentu

Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda secara garis besarnya dibagi dalam tingkatan pengetahuan yaitu:

1. Tahu (Know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sepenuhnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah

mengingat kembali terhadap sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima “Tahu” ini adalah merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa seseorang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain : menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, mengatakan dan sebagainya.

2. Memahami (Comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan dan menyebutkan.

3. Aplikasi (Application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang dipelajari pada situasi dan kondisi real. Aplikasi dapat diartikan penggunaan hukum-hukum, rumus-rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lainnya.

4. Sintesis (Synthesis)

Sintesis menunjukkan sebagai kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk kecednrunan yang baru, dengan kata lain sintesis adalah sautu kemampuan formulasi yang ada.

5. Analisis (Analysis)

Analisis. adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen tetapi masih dalam suatu struktur

organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata-kata kerja, dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan dan sebagainya.

6. Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu objek tertentu

C. Keteraturan Berobat

Keteraturan berobat yaitu diminum tidaknya obat-obat tersebut, penting karena ketidakteraturan berobat menyebabkan timbulnya masalah resistensi. Karena semua tatalaksana yang telah dilakukan dengan baik akan menjadi sia-sia, bila tanpa disertai dengan sistem evaluasi yang baik pula. Oleh karena itu, peranan pendidikan mengenai penyakit dan keteraturan berobat sangatlah penting.

Walaupun telah ada cara pengobatan tuberkulosis dengan efektifitas yang tinggi, angka sembuh masih lebih rendah dari yang diharapkan. Penyakit utama terjadinya hal tersebut adalah pasien tidak mematuhi ketentuan dan lamanya pengobatan secara teratur untuk mencapai kesembuhan. Terutama pemakaian obat secara teratur pada 2 bulan fase inisial sering kali tidak tercapai, sementara itu dengan mempersingkat lamanya pengobatan menjadi 6 bulan telah menunjukkan penurunan angka drop out.

Hal ini mudah dimengerti, karena kalau penderita tidak tekun meminum obat-obatnya, hasil akhir hanyalah kegagalan penyembuhan

ditambah dengan timbulnya basil- basil tuberkulosis yang multiresisten. Resistensi obat anti tuberkulosis terjadi akibat pengobatan tidak sempurna, putus berobat atau karena kombinasi obat anti tuberkulosis tidak adekuat. menekankan adanya pengawas minum obat (PMO) untuk setiap penderita tuberkulosis paru dengan harapan dapat menjamin keteraturan minum obat bagi setiap penderita selama masa pengobatan.

Kondisi seorang penderita penyakit tuberkulosis sering berada dalam kondisi rentan dan lemah, baik fisik maupun mentalnya. Kelemahan itu dapat menyebabkan penderita tidak berobat, putus berobat, dan atau menghentikan pengobatan karena berbagai alasan. Tuberkulosis paru dapat disembuhkan dengan berobat secara teratur sampai selesai dalam waktu 6-8 bulan. Tata cara penyembuhan itu terangkum dalam strategi DOTS.

Dalam proses penyembuhan, penderita tuberkulosis paru dapat diberikan obat anti-Tuberkulosis Paru (TBC (OAT) yang diminum secara teratur sampai selesai dengan pengawasan yang ketat. Masa pemberian obat memang cukup lama yaitu 6-8 bulan secara terus-menerus, sehingga dapat mencegah penularan kepada orang lain. Oleh sebab itu, para penderita tuberkulosis paru jika ingin sembuh harus minum obat secara teratur. Tanpa adanya keteraturan minum obat penyakit sulit disembuhkan. Jika tidak teratur minum obat penyakitnya sukar diobati kuman tuberkulosis paru dalam tubuh akan berkembang semakin banyak dan menyerang organ tubuh lain akan membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat sembuh biaya pengobatan akan sangat besar dan tidak ditanggung oleh pemerintah, sehingga di butuhkan

kepatuhan dalam minum obat adalah mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan dokter pada waktu dan dosis yang tepat. Pengobatan hanya akan efektif apabila penderita mematuhi aturan dalam penggunaan obat

Faktor-faktor Kepatuhan minum obat

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang untuk meminum obat, yaitu antara lain:

a. Usia

Dalam beberapa penelitian telah disebutkan bahwa pada beberapa tingkatan usia menentukan kepatuhan terhadap sesuatu yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Dalam hal ini kepatuhan minum obat pun dapat dikaitkan dengan usia, sebagai contoh untuk usia yang kurang dari 5 tahun kepatuhan minum obat untuk suatu penyakit akan lebih sulit dibandingkan dengan orang yang lebih dewasa. Begitu pun pada seseorang yang mempunyai usia lanjut akan mempunyai kesulitan dalam kepatuhan meminum obat.

b. Pekerjaan dan waktu luang

Suatu aktivitas rutin pada seseorang memungkinkan untuk menghabiskan waktu dengan pekerjaannya sehingga waktu luangnya pun terbatas. Bagi seseorang yang termasuk sibuk dalam pekerjaannya akan sangat sulit untuk meluangkan waktu, walaupun sekedar untuk meminum obatnya sendiri. Hal ini akan berbeda dengan seseorang dengan pekerjaan yang mempunyai waktu luang yang cukup akan memungkinkan untuk lebih teratur dalam meminum obat sesuai waktunya.

c. Pengawasan

Pengawasan adalah tindakan untuk memperhatikan dan melihat bagaimana suatu peraturan yang berlaku tersebut dijalankan atau tidak. Pada kepatuhan minum obat, pengawasan dapat dilakukan oleh petugas kesehatan atau keluarga dari pasien yang menderita sakit. Pengawasan tersebut dapat berupa peringatan atau anjuran untuk selalu mematuhi waktu dan dosis yang telah dianjurkan untuk meminum obat tersebut.

d. Jenis dan dosis obat

Jenis dan dosis obat pada seseorang menderita suatu penyakit akan berbeda dalam jenis dan dosisnya, semakin parah suatu penyakit pada seseorang maka jenis dan dosisnya akan semakin banyak atau besar. Banyaknya jenis obat untuk diminum dalam suatu waktu akan mengakibatkan seseorang sulit untuk mematuhi minum obat tersebut dengan berbagai alasan.


BAB III

KERANGKA KONSEP TUAL

A . Kerangka Konsep

Variabel Independen

Variabel dependen



Keterangan:

Variabel yang akan diteliti ———

Variabel yang tidak diteliti - - - -

B. Hipotesa

Ha: Ada hubungan antara tingkat pengetahuan pasien tuberkulosis paru dengan keteraturan berobat pada wilayah kerja puskesmas Kassi-Kassi

C. Hipotesi

Ho : Tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan pasien tuberkulosis paru dengan keteraturan berobat pada wilayah kerja puskesmas Kassi-Kassi

D. Definisi Operasional

1. Tingkat Pengetahuan adalah hal-hal yang diketahui dan penerapan pasien seputar penyakit tuberkulosis paru, pada keteraturan pengobatan.

Kriteria Objektif

- a. Baik: jika pasien menjawab pertanyaan dengan benar maka nilainya > 10
 - b. kurang: jika pasien menjawab pertanyaan dengan salah maka nilainya < 10
2. Keteraturan berobat pasien tuberkulosis paru adalah Pengobatan yang dilaksanakan secara teratur sejak pertama dinyatakan tuberkulosis paru BTA (+) dan datang kembali setiap persediaan obat habis dari petugas kesehatan sampai dinyatakan sembuh.

Kriteria Objektif

- a. Teratur: jika pasien rajin minum obat secara teratur
- b. Tidak teratur: jika pasien terlambat minum obat.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif korelasi dengan menggunakan metode survei dengan pendekatan cross sectional adalah pencarian hubungan antara satu keadaan lain yang terdapat dalam satu populasi yang sama . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan pasien tuberkulosis paru dengan keteraturan berobat pada wilayah kerja puskesmas kassi-kassi

B. Populasi,

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah sebgaiian penderita tuberkulosis paru yang masih melanjutkan pengobatan.

C. Sampel

Sampel penelitan dikumpulkan *non random (Non probability) sampling* yakni pengambilan sampel yang tidak didasarkan atas kemungkinan yang dapat di perhitungkan, tetapi semata-mata hanya berdasarkan kepraktisan belaka.dalam hal ini metode yang dipakai adalah *proposive sampling*.

D. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

1. Kriteria Inklusi

Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti

Kriteria inklusi dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Responden kategori I

Penderita lama yang sudah mendapatkan pengobatan selama 6 bulan ,
pasien tuberkulosis.

b. Responden yang sementara menjalankan pengobatan selama 6 bulan

c. Responden yang berobat di wilayah kerja Puskesmas Kassi-kassi

d. Responden yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Kassi-
kassi

2. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subyek yang memenuhi kriteria inklusi karena berbagai sebab sehingga tidak dapat menjadi responden penelitian (Kriteria Eksklusi dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Responden yang kasus baru

b. Responden dalam keadaan tidak sadar

c. Responden yang menolak berpartisipasi.

E. Besar Sampel

Sampel penelitian diambil dari populasi terjangkau dan telah diseleksi berdasarkan criteria sampel. Jumlah sampel yang memenuhi persyaratan minimal untuk dapat di analisis statistic disesuaikan dengan tujuan, hipotesis, rancangan penelitian dan tingkat penelitian yang dikehendaki. Pada penelitian ini, besar sampel di hitung berdasarkan rumus sbb:

$n = \text{—————}$

Ket:

N =Besar populasi Pasien tbc yang baru

n =Jumlah sampel

d =Tingkat kesalahan (0,05))

$n = \text{—————}$

$n = \text{—————}$

$n = \text{—————}$

$n = \text{————} = 44$

Jadi, jumlah keseluruhan adalah sebanyak 44 namun peneliti menjadikan 44 sampel untuk memudahkan pengambilan sampel.

F. Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas yang diteliti terdiri dari tingkat pengetahuan pasien tuberkulosis paru

2. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keteraturan berobat pada wilayah Puskesmas Kassi-kassi Makassar.

G. Lokasi dan Waktu penelitian

Lokasi .penelitian ini pada wilayah kerja Puskesmas kassi-kassi.Waktu penelitian selama dua minggu.

H. Pengumpulan Data

Adalah suatu proses pendekatan kepada subjek dan proses pengumpulan karakteristik yang diperlukan dalam suatu penelitian. Pengumpulan data ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan responden dengan menggunakan kuesioner.

2. Data Sekunder

Data tentang keteraturan pasien berobat dengan melihat kartu control pasien dalam pengambilan obat setiap kali obat habis. data jumlah suspek tuberculosis paru yang diperiksa di unit Puskesmas Kassi-Kassi.

J. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berbentuk pertanyaan dan pernyataan tertutup dengan skala Guttman.

H. Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

➤ Pengolahan Data

Pengolahan data pada dasarnya merupakan suatu proses untuk memperoleh data atau data ringkasan berdasarkan suatu kelompok data mentah dengan menghasilkan informasi.

Pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Editing

Editing adalah menyeleksi data yang telah didapat dari hasil wawancara untuk mendapatkan data yang akurat.

b. Koding

Koding adalah melakukan pengkodean data agar tidak terjadi kekeliruan dalam melakukan tabulasi data.

c. Tabulasi data

Tabulasi data adalah penyusunan data sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam penjumlahan data dan disajikan dalam bentuk tulisan.

d. Entri data

Entri data adalah memasukan data melalui pengolahan SPSS windows komputer.

➤ Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

➤ Analisa Univariat

Pengetahuan tentang penyakit tuberkulosis paru

➤ Analisa Bivariat

Dilakukan untuk mencari hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat yang dilakukan dengan uji chi-square yaitu uji statistik yang digunakan untuk menguji signifikansi hubungan dua variable.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di puskesmas kassi-kassi pada bulan Juli –Agustus dengan menggunakan instrument (kuesioner) yang terdiri dari 20 point pertanyaan yang memuat pertanyaan hubungan antara tingkat pengetahuan pasien tuberculosis dengan keteraturan berobat pada wilayah kerja puskesmas kassi-kassi. Kuesioner ini dibagikan pada setiap responden dengan didampingi oleh peneliti.

Besar sampel dalam penelitian ini adalah total sebanyak 20 orang responden yang terpilih sesuai dengan kriteria inklusi. Setelah data terkumpul dilakukan pemeriksaan ulang, kemudian diolah, berdasarkan hasil pengolahan data maka berikut ini peneliti menyajikan analisa data univariat terhadap setiap variabel independen untuk menghasilkan distribusi frekuensi presentase serta analisa bivariat untuk mengetahui hubungan dari variabel dependen dan variabel independen dengan menggunakan uji statistic chi-square.

1. Analisa Univariat

Analisa univariat pada penelitian ini bertujuan untuk melihat distribusi frekuensi dari variabel dependen dan independen.

Tabel 5.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan tingkat Pengetahuan pasien TB Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi pada bulan Juli-Agustus 2010

| Pengetahuan | Frekuensi | Persentase |
|-------------|-----------|------------|
| Baik | 11 | 55 |
| Kurang | 9 | 45 |
| Total | 20 | 100 |

Sumber: Data primer

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 20 responden terdapat 11 orang (55,0 persen) pasien tuberculosis yang memiliki pengetahuan baik, dan 9 orang (45,0 persen) pasien tuberculosis yang memiliki pengetahuan kurang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pasien tuberculosis masih baik dalam keteraturan berobat.

Tabel 5.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Keteraturan Berobat tentang TB Paru di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi pada bulan Juli- Agustus 2010

| Keteraturan Berobat | Frekuensi | Persentase |
|---------------------|-----------|------------|
| Teratur | 7 | 35,0 |
| Tidak teratur | 13 | 65,0 |
| Total | 20 | 100 |

Sumber : Data Primer

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 20 responden terdapat 13orang (65,0 persen) pasien tuberculosis termasuk kategori melakukan

pengobatan secara tidak teratur dan 7 orang (35,0 persen) pasien tuberculosis termasuk kategori melakukan pengobatan secara teratur.

Analisa Bivariat

Untuk melihat adanya hubungan antara variable independen dengan variable dependen maka uji yang digunakan uji chi square.

Tabel 5.3

Hubungan Antara Pengetahuan dengan Keteraturan Berobat di Wilayah Kerja Puskesmas Kassi-Kassi pada bulan Juli-Agustus 2010

| pengetahuan | Keteraturan Berobat | | | | Jumlah | | ρ |
|-------------|---------------------|----|---------------|----|--------|-----|-------|
| | Teratur | | Tidak teratur | | N | % | |
| | N | % | N | % | | | |
| Baik | 6 | 30 | 1 | 5 | 7 | 35 | 0,017 |
| Kurang | 3 | 15 | 10 | 50 | 13 | 13 | |
| Jumlah | 9 | 45 | 11 | 55 | 20 | 100 | |

Sumber: Data Primer

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari 7 responden yang memiliki pengetahuan baik 6 orang (30%) keteraturan berobat yang teratur 6 orang (30%),pengetahuan baik 6 orang (30%) keteraturan berobat tidak teratur 1 orang (5%), pengetahuan kurang 3 orang (15%) keteraturan berobatnya teratur 3 orang (50%), pengetahuan kurang 3 orang (15%) keteraturan berobatnya tidak teratur 10 orang (50%), Berdasarkan hasil analisa data menggunakan uji statistic dengan chi square pada tabel di atas maka di peroleh hasil nilai value =0,017 pada batas kemaknaan (α 0,05)

maka H_0 ditolak dan H_a di terima yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan pasien TB paru dengan keteraturan berobat

B. Pembahasan

1. Hubungan antara tingkat Pengetahuan pasien TB paru dengan keteraturan berobat.

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindera manusia yaitu: penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. (Notoadmodjo, 2003).

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Az-Zumar/ 39: 9

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Terjemahannya:

Katakanlah, "Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? "sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. (Q.S. Az-Zumar/ 39: 9)

Berdasarkan ayat diatas, pengetahuan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan yang dapat membedakan keduanya adalah orang yang mempunyai akal fikiran. Hal ini berarti kita dituntut untuk terus

mencari ilmu pengetahuan tentang apapun, baik yang didapat dari lingkungan masyarakat, keluarga maupun dari instansi pendidikan

Berdasarkan penelitian di peroleh data bahwa pengetahuan yang baik, 6 orang (30%) memiliki keteraturan berobat yang teratur dan 6 orang (30%),pengetahuan baik 6 orang (30%) memiliki keteraturan berobat tidak teratur Sedangkan responden yang memiliki pengetahuan kurang berjumlah 3 orang (15%) keteraturan berobatnya teratur 3 orang (50%), pengetahuan kurang berjumlah 3 orang (15%) keteraturan berobatnya tidak teratur 10 orang (50%),Berdasarkan *uji pears chi square* menunjukkan bahwa nilai P : 0,017 pada batas kemaknaan(α :0,05) sehingga H_0 ditolak dan H_a di terima yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan pasien TB paru dengan keteraturan berobat

Hasil penelitian ini didukung dengan teori dari Notoadmodjo .Ini disebabkan karena tingkat pendidikan yang relatif rendah pada penderita TB paru menyebabkan keterbatasan informas. Penulis beramsumsi bahwa pengetahuan tentang Tuberkulosis Paru di pengaruhi oleh latar belakang pendidikan yng memberi pengaruh positif dalam penyembuhan, hal ini sesuai dengan yang di kemukakan oleh (Depkes RI,2006) Bahwa tingkat pendidikan yang relative rendah pada penderita Tuberkulosis paru menyebabkan keterbatasan infrmasi tentang gejala dan pengobatan tentang gejala Tuberkulosis paru, sebagian besar pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan

seseorang(Notoadmojo,2003) Keteraturan berobat yaitu diminum tidaknya obat-obat tersebut, penting karena ketidakteraturan berobat menyebabkan timbulnya masalah resistensi. Karena semua tatalaksana yang telah dilakukan dengan baik akan menjadi sia-sia, bila tanpa disertai dengan sistem evaluasi yang baik pula. Oleh karena itu, peranan pendidikan mengenai penyakit dan keteraturan berobat sangatlah penting.

Walaupun telah ada cara pengobatan tuberkulosis dengan efektifitas yang tinggi, angka sembuh masih lebih rendah dari yang diharapkan. Penyakit utama terjadinya hal tersebut adalah pasien tidak mematuhi ketentuan dan lamanya pengobatan secara teratur untuk mencapai kesembuhan. Terutama pemakaian obat secara teratur pada 2 bulan fase inisial sering kali tidak tercapai, sementara itu dengan mempersingkat lamanya pengobatan menjadi 6 bulan telah menunjukkan penurunan angka drop out. Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan pasien tuberculosi paru dengan keteraturan berobat sedangkan keteraturan berobat Keteraturan berobat

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian *Hubungan antara tingkat Pengetahuan pasien TB paru dengan Keteraturan Berobat di Wilayah Kerja Puskesmas kassi kassi Periode Juli- Agustus* maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut di sehingga peroleh data bahwa

1. Berdasarkan penelitian puskesmas kassi kassi diperoleh data bahwa pengetahuan baik 6 orang (30%) keteraturan berobat teratur 6 orang (30%), hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pasien TBC masih tinggi dan dia teratur dalam menjalankan pengobatannya.
2. Berdasarkan penelitian puskesmas kassi kassi diperoleh data bahwa Pengetahuan baik 6 orang (30%) keteraturan berobat tidak teratur 1 orang (5%),hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pasien TBC masih tinggi tetapi dia tidak teratur dalam menjalankan pengobatannya karena sibuk dengan aktivitas.
3. Berdasarkan penelitian puskesmas kassi kassi diperoleh data bahwa pengetahuan kurang 3 orang (15%) keteraturan berobat teratur 3 orang (15%). hal ini menunjukkan bahwa dia memiliki tingkat pendidikan yang rendah tetapi dia teratur dalam menjalankan pengobatannya
4. Berdasarkan penelitian puskesmas kassi kassi diperoleh data bahwa pengetahuan kurang 3 orang (15%) keteraturan berobatnya tidak teratur 10 orang (50%),Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan,pasien

Tuberkulosis masih rendah dan malas berobat karena sibuk dengan aktivitas. Berdasarkan *uji pears chi square* menunjukkan bahwa nilai P : 0,017 pada batas kemaknaan ($\alpha : 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a di terima yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan pasien TB paru dengan keteraturan berobat.

B. Saran

1. Bagi Puskesmas

- a. Melihat dari permasalahan dilapangan maka tidak menutup kemungkinan semakin hari jumlah penderita Tuberkulosis paru akan semakin meningkat. Hal ini perlu dicegah jangan sampai terjadi peningkatan yang terus-menerus. Maka dari itu sangat perlu sekali diberikan penjelasan, penyuluhan dan peningkatan pengetahuan masyarakat terutama masalah yang dapat menyebabkan terjadinya Tuberkulosis paru sebagai upaya preventif dan kuratif kepada masyarakat dalam melakukan pengobatan secara teratur untuk mencegah timbulnya masalah resistensi terhadap obat.
- b. Kemampuan petugas pemegang program Tuberkulosis paru di Puskesmas dalam memberikan pelayanan pengobatan pada penderita TBC paru akan lebih baik bila mengetahui pengetahuan penderita TBC paru. Penjelasan tentang pengobatan, adanya penyuluhan, serta bahasa yang digunakan akan bermanfaat terhadap keberhasilan pengobatan pada penderita TBC paru.

2. Bagi Institusi Pendidikan

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan bagi perencanaan upaya pembinaan masyarakat khususnya tentang pengetahuan pasien tuberkulosis yang berhubungan dengan keteraturan berobat.
- b. Tingginya angka kejadian TB paru di masyarakat maka perguruan tinggi sebaiknya memperhatikan masyarakat sebagai wujud pengabdian masyarakat agar dapat mengurangi angka kejadian TB paru.

3. Bagi Peneliti

Peneliti harus dapat memanfaatkan ilmu yang telah diterima selama menjalankan penelitian ini serta dapat mengaplikasikannya dengan kenyataan di lapangan.

4. Bagi Profesi Perawat

Dalam menjalankan tugasnya sebagai perawat, maka perawat harus dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai TB paru serta melaksanakan program pendidikan yang berkelanjutan untuk memberikan pelayanan yang prima serta memberikan arahan atau penyuluhan untuk memberdayakan dan mendorong masyarakat untuk hidup sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainur. (2008). *Kejadian Putus Berobat Penderita Tuberkulosis Paru dengan Pendekatan DOTS*. [www/http: Libang.depkes.go.id](http://www.libang.depkes.go.id) .
- Alsagaf, H dan Mukty H.A., . (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Penyakit Paru*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Arikunto, Suharsini. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asih, N.G, dan Efendi, C. (2003). *Keperawatan Medikal Bedah*. Jakarta: EGC.
- Azwar, A. dan Prihartono, J. (2003). *Metodologi Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Binnarupa Aksara.
- Crofton, J. Et all. (2002) *Tuberkulosis Klinis*. Jakarta: Widya Medika.
- Departemen Kesehatan RI. (2007). *Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis*: Jakarta: DEPKES.
- Hatmoko. (2008). *Sistem Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas*. [www/http: freewebtown.com](http://www.freewebtown.com).
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2002). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursalam. (2003). *Konsep & Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Setiadi.(2007). *Konsep & Penulisan Riset Keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sulianti. (2007). *Tuberkulosis*. [www/http: infeksi](http://www.infeksi).
- Somantri, Irman. (2008). *Keperawatan Medikal Bedah: Asuhan Keperawatan Pada Pasien dengan Gangguan Sistem Pernapasan*. Jakarta: Salemba Medika.

Sugiyono. (2006). *Statiska Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Smeltzer, S.C dan Bare, B.G. (2001). *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner& Suddarth*. Jakarta: EG.

Departemen Agama RI. (1971). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an.

[http//www. Al-Qur'an Obat segala penyakit.ac.id](http://www.Al-Qur'an%20Obat%20segala%20penyakit.ac.id) pada 11 Juni 2010 10:3.



KUESIONER PENELITIAN
HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENGETAHUAN PASIEN
TUBERKULOSIS PARU DENGAN KETERATURAN BEROBAT DI
WILAYAH KERJA PUSKESMAS KASSI-KASSI

A. Identitas Responden

1. Nama :
2. Alamat :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :

B. Pengetahuan

Mohon dijawab pertanyaan tersebut dengan cara memberi tanda checklist

(√) pada kotak yang telah di sediakan

| | Pertanyaan | Ya | Tidak |
|---|--|----|-------|
| 1 | Apakah anda tahu TBC merupakan penyakit infeksi ? | | |
| 2 | Apakah anda tahu penyebab TBC adalah bakteri kecil yang dinamakan Microbakterium Tuberculosis? | | |
| 3 | Apakah anda tahu TBC ditularkan melalui udara ? | | |
| 4 | Apakah anda tahu bahwa batuk penderita TBC dapat menularkan penyakit TBC? | | |
| 5 | Apakah anda tahu bahwa bersin penderita TBC dapat menularkan penyakit TBC ? | | |
| 6 | Apakah anda tahu bahwa tertawa keras penderita TBC dapat menularkan penyakit TBC ? | | |
| 7 | Apakah anda tahu apabila penderita batuk/bersin dan menutup mulut dengan tisu dapat mengurangi resiko penularan TBC? | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 8 | Apakah anda tahu bahwa cahaya matahari dapat membunuh bakteri TBC? | | |
| 9 | Apakah anda mengetahui dengan ventilasi yang baik dapat mengurangi resiko penularan TBC? | | |
| 10 | Apakah anda tahu tanda bahwa seseorang terkena penyakit TBC ? | | |
| 11 | Apakah anda tahu bahwa dengan vaksin BCG dapat mencegah penyakit TBC? | | |
| 12 | Apakah anda tahu bahwa penderita baru TBC diobati selama 6 bulan ? | | |
| 13 | Apakah anda tahu bahwa penderita TBC yang kambuh diobati selama 9-12 bulan ? | | |
| 14 | Apakah anda tahu bahwa pengobatan TBC yang gagal diulangi kembali selam 12 bulan ? | | |
| 15 | Apakah anda tahu bahwa pemberian obatan TBC pada penderita harus teratur ? | | |

C. Keteraturan berobat

Mohon dijawab pertanyaan tersebut dengan cara memberi tanda checklist


(√) pada kotak yang telah di sediakan

| No. | Pertanyaan | Ya | Tidak |
|-----|--|----|-------|
| 1. | Apakah anda benar minum obat TB secara tepat waktu ? | | |
| 2. | Apakah anda minum obat sesuai dengan dosis yang dianjurkan ? | | |
| 3. | Apakah ada yang mengingatkan dan mengawasi anda dalam minum obat ? | | |
| 4. | Apakah anda menyadari bahwa putus berobat dapat mengakibatkan terjadinya kegagalan penyembuhan ? | | |
| 5. | Apakah dengan kondisi rentan dan lemah, tidak membuat anda putus berobat atau menghentikan | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| | pengobatan | | |
| 6 | Apakah anda tetap meminum obat walaupun anda sibuk dengan pekerjaan atau aktivitas | | |
| 7. | Apakah anda merasakan efek samping obat seperti;tuli, mual /muntah,gatal,warna kencing kemerahan,dll ? | | |
| 8. | Jika ya,apakah anda tetap meminum obat ? | | |



RIWAYAT HIDUP



SISKAWATI, Lahir pada tanggal 09 Februari 1988 di Kelurahan Kahu Kecamatan Bonto Cani. Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan anak pertama dari Empat bersaudara, hasil buah hati dari pasangan suami istri Ayahanda Bernama **JUFRI** dan Ibunda bernama **HALI**

Jenjang Pendidikan :

1. Tamat SD Inp. 12/79 Kahu, Kec Bonto Cani Kab Bone Pada tahun 2000
2. Tamat SLTP Negeri 1 Kahu pada tahun 2003
3. Tamat SMA Negeri 1 Kahu pada tahun 2006
4. Kemudian pada tahun 2006 melanjutkan Pendidikan Program Strata Satu (S1) reguler jurusan Keperawatan Pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Melalui PMJK (Penerimaan Mahasiswa Jalur Khusus).