

**FORMULASI TABLET MENGAMBANG ASIKLOVIR
MENGUNAKAN MATRIKS SELULOSA NATA KELAPA**



Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri
Alauddin Makssar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh


NUR WAHYUNI SYAM

NIM. 70100106017

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Formulasi Tablet Mengambang Asiklovir Menggunakan Matriks Selulosa Nata Kelapa” yang disusun oleh Nur Wahyuni Syam NIM: 70100106017, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari senin 18 Agustus 2010 M, yang bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1431 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Agustus 2010
07 Ramadhan 1431 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua Penguji : **Nur Ida, S.Si, M.Si, Apt.** (.....)

Sekretaris Penguji : **Isriany Ismail, S.Si.M.Si.Apt** (.....)

Penguji I : **Haeria, S.Si.** (.....)

Penguji II : **Drs. H.Muh.Saleh Ridwan, M.Ag** (.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

dr. H. M. Furqaan Naiem, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19580404 198903 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah sehingga Penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi junjungan kita Muhammad SAW, para sahabat, serta keluarganya yang membawa kita kepada kebaikan.

Skripsi yang disusun dengan judul **“Formulasi Tablet Mengembang Asiklovir Menggunakan Matriks Selulosa Nata Kelapa”** ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi Program Studi Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil serta kemauan yang keras dari penulis akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Nur Ida S.Si., M.Si., Apt selaku pembimbing utama dan Ibu Isriany Ismail S.Si.,M.Si., Apt selaku pembimbing kedua atas segala jeripayah dan keiklasannya memberikan bimbingan, motivasi, serta meluangkan waktu, tenaga, pikiran demi kelancaran penyelesaian studi penulis, sejak rencana penelitian sampai tersusunnya skripsi

ini. Semoga Allah swt memberikan kemudahan dalam hidupnya dan membalas semua kebaikannya.

Terkhusus ucapan terima kasih dan hormat penulis ucapkan kepada kedua orang tua yang mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis dari buaian hingga saat ini, kepada Ayahanda Samsuddin Spd (Alm) yang masih sempat memberikan doa dan semangat kepada penulis diakhir hidupnya saat penulis merencanakan penelitian ini dan kepada Ibunda Dra. Sitti Aisyah D yang selalu memberikan dukungan, nasehat dan doa yang tulus, adikku satu – satunya Nurul Qadri Syam, Paman tercinta bapak Patta Lolo Dm. BA serta kakek tercinta bapak H. Harun Demma dan ibu Hj. Andi Nur, dan seluruh keluarga besar yang selalu dan senantiasa memberi dukungan baik moral maupun material selama menjalankan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
3. Bapak Pembantu Dekan Bidang Akademik, Bidang Administrasi dan keuangan, dan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Ibu Gemy Nastity Handayani S.Si,.M.Si,.Apt selaku ketua jurusan prodi farmasi
5. Ibu Haeria,S.Si selaku penguji pertama
6. Bapak Drs. H. Muh.Saleh Ridwan, M.Ag selaku penguji kedua
7. Ibu Dra H. Faridha Yenny Nonci Apt selaku koordinator seminar mahasiswa

8. Bapak-Bapak dan ibu-ibu dosen serta staf dalam lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas jeripayah mendidik selama di bangku kuliah
9. Bapak Drs. Abdul Manan selaku Plan Manager PT Kimia Farma atas bantuan bahan baku Asiklovir sebagai bahan penelitian penulis
10. Kak Hendra Stevani selaku laboran Laboratorium Kimia Analitik Farmasi Politeknik Kementrian Kesehatan RI yang mendampingi penulis pada saat penggunaan alat disolusi
11. Kak Febianthy selaku laboran Laboratorium Kimia Analitik Universitas Hasanuddin yang mendampingi penulis pada saat penggunaan alat Spektrofotometer UV-Vis
12. Budhy Sentosa Putra, yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi, setia menemani selama di bangku kuliah hingga penyusunan skripsi ini
13. Sahabat-sahabatku tersayang, Jumriani Jafar dan Abdul Azis , Mariam, Khaerani, Ahmad Hamdan Al-jami, Fatimah Az-zahra, Asriana Sultan, Rahmayani, dan Fitri Sulfiani Rusli yang senantiasa memberi motivasi dan dukungan sejak awal di bangku kuliah hingga penyelesaian skripsi
14. Saudariku tersayang yang menjabat sebagai ketua angkatan 06 St. Rachmatulla, yang selalu menyempatkan waktunya serta memberikan dukungan moral, material maupun tenaganya selama di bangku kulia
15. Teman seperjuangan di laboratorium penelitian farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Abdul Wahid Jamaluddin, Arifuddin Yunus, Hardianti Rahman, Jayadi Jaharman, Mus Ifayah, Mifta Fauzia, A. Dian

Astriani, Hastina Rahim, Rati Fitriani, Karnila Darajat yang senantiasa memberikan bantuannya selama penelitian sampai tersusunnya skripsi ini.

16. Kanda Muh. Rusydi S.Farm., dan A. Armisman Edy Paturusi S.Farm yang senantiasa membantu Penulis di laboratorium selama penelitian.
17. Teman-teman jurusan farmasi angkatan 2006, yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu per satu, yang selalu memberikan motivasi selama penelitian.
18. Adik-adik jurusan farmasi angkatan 2007, 2008, dan 2009 yang selalu memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
19. Teman-teman KKN dusun Pao Desa Betteng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama penulis menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi bagi yang membacanya dan memberi manfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahuwata'ala.

Makassar, Juli 2010

Nur Wahyuni Syam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1 - 4
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5 - 39
A. Selulosa	5
B. Asiklovir	8
C. Sediaan lepas lambat	9
D. Floating tablet.....	15

E.	Formulasi tablet mengambang	18
1.	Metode pembuatan sediaan tablet	21
2.	Evaluasi tablet	22
F.	Tinjauan islam tentang ilmu pengetahuan dan teknologi	26-39
a.	Islam dan ilmu pengetahuan teknologi	26
b.	Islam dan pengobatan	29
c.	Islam dan kesehatan	36
d.	Ciptaan Allah dan manfaatnya	38
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	40 - 50
A.	Alat dan Bahan	40
1.	Alat-alat	40
2.	Bahan-bahan	40
B.	Prosedur Kerja	40
1.	Pembuatan matriks selulosa nata	40
2.	Pembuatan sediaan tablet mengambang Asiklovir	41
a.	Perhitungan dosis Asiklovir	41
b.	Rancangan formula	42
c.	Granulasi	42
3.	Evaluasi granul	43
a.	Uji kadar air dan susut pengeringan	44
b.	Uji sudut diam	44

c. Uji kecepatan alir.....	44
d. penetapan bobot jenis.....	45
4. Evaluasi tablet	46
5. Uji laju disolusi tablet mengambang.....	47
6. Uji disolusi	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50- 60
A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan	53
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Komposisi tablet mengambang	41
2. Penyimpangan bobot rata-rata tablet.....	45
3. Hasil kadar air	49
4. Hasil analisis susut pengeringan	49
5. Hasil analisis sudut istirahat	50
6. Hasil analisis kecepatan alir	50
7. Hasil analisis bobot jenis mampat.....	50
8. Hasil evaluasi tablet.....	51
9. Hasil uji disolusi.....	52
10. Data perbandingan formula I dan formula II.....	52
11. Persentase penyimpangan bobot rata-rata	68
12. Data pengukuran kurva baku Asiklovir.....	69
13. Nilai serapan hasil disolusi tablet mengambang Asiklovir	70
14. Hasil perhitungan persentase terdisolusi tiap satuan waktu	71
15. Jumlah Asiklovir yang terdisolusi	75
16. Pengujian faktor kemiripan Asiklovir dengan penjerapan	76
17. Pengujian faktor kemiripan Asiklovir dengan campuran fisik.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Rumus struktur selulosa.....	6
2. Kurva baku asiklovir.....	70
3. Profil disolusi formula dengan penjerapan.....	73
4. Profil disolusi dengan campuran fisik.....	73
5. Profil disolusi formula I dan formula II.....	74
6. Profil disolusi Asiklovir orde nol.....	74
7. Profil disolusi formula penjerapan, campuran fisik dan orde nol.....	75
8. Asiklovir kering setelah penjerapan.....	79
9. Asiklovir campuran fisik.....	79
10. Granul kering asiklovir campuran fisik.....	81
11. Granul kering asiklovir tanpa penjerapan.....	81
12. Tablet asiklovir campuran fisik.....	82
13. Tablet asiklovir dengan penjerapan.....	82
14. Waktu laten pengembangan tablet Asiklovir dengan penjerapan.....	82
15. Waktu laten pengembangan tablet asiklovir campuran fisik.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema Kerja pembuatan Matriks	62
2. Skema Kerja Pembuatan Sediaan	63
3. Perhitungan	64
4. Tabel Data Hasil Penelitian.....	69
5. Contoh Perhitungan	76
6. Gambar	79



ABSTRAK

Nama penyusun : Nur Wahyuni Syam
NIM : 70100106017
Judul Skripsi : Formulasi Tablet Mengambang Asiklovir Menggunakan
Selulosa Nata Kelapa

Telah dilakukan penelitian tentang formulasi tablet mengambang asiklovir menggunakan matriks selulosa nata kelapa. Asiklovir merupakan obat anti virus dosis pemberian berulang 4-5 kali sehari 200 atau 400 mg. Penelitian ini bertujuan menentukan profil disolusi pelepasan asiklovir dari matriks nata kelapa dan membandingkan profil disolusi asiklovir dengan metode penjerapan dan campuran fisik. Tablet dibuat dengan metode granulasi basah dengan dua formula beda perlakuan, untuk formula I dilakukan penjerapan dan formula II dengan campuran fisik, menggunakan matriks selulosa nata kelapa serta natrium bikarbonat sebagai komponen pembentuk gas yang mempersingkat waktu laten pengambangan. Evaluasi tablet mengambang meliputi uji keseragaman bobot, uji waktu laten pengambangan, dan uji disolusi *in vitro* dalam media cairan lambung buatan tanpa pepsin pH $\pm 1,2$ pada suhu $37 \pm 0,5$ % menggunakan pengaduk tipe I dengan kecepatan putaran 50 rpm selama 8 jam dengan 10 kali pengambilan sampel. Jumlah asiklovir yang terdisolusi ditetapkan dengan spektrofotometer UV-Vis. Hasil penelitian diperoleh bahwa profil disolusi asiklovir dari matriks nata kelapa tidak mengikuti kinetika orde nol dan formula dengan penjerapan lebih mendekati orde nol dibandingkan formula campuran fisik berdasarkan nilai faktor kemiripan (f_2).

Kata kunci : Asiklovir, selulosa, nata kelapa, tablet mengambang

ABSTRACT

Name of author : Nur Wahyuni Syam
NIM : 70100106017
Title of thesis : Acyclovir Floating Tablet Formulation Using Coconut
Nata
Cellulose

The formulation of acyclovir floating tablet use a matrix of coconut nata cellulose have been conducted by research. Acyclovir is an antiviral drug which giving in recurring dose of 200 or 400 mg for 4-5 times a day. This research aim to determine the dissolution profile of acyclovir release from matrix of coconut nata and compare the dissolution profile of acyclovir with the adsorption method and physical mixture. Tablet made with the wet granulation method in two different formulas, for the formula I get the adsorption treatment and formula II with the physical mixture, using matrix of cellulose coconut nata and also natrium bicarbonate as component of gas forming which taking a short cut time of latent sill. Evaluate the floating tablet cover the test of weight uniformity, test the time of latent sill, and *in vitro* dissolution test in simulated gastric fluid without pepsin pH \pm 1,2 at temperature $37 \pm 0,5$ % using basket stirrer of speed crate 50 rpm during 8 clock with 10 times of intake sample. Amount acyclovir which release measured by spectrophotometer UV-Vis. Result of research obtained that the dissolution profile of acyclovir from coconut nata matrix do not follow the zero kinetics order and formulation by adsorption is more coming near to zero kinetics order compared to formulation of physical mixture based on value of looking like factor (f2).

Key word : Acyclovir, cellulose, coconut nata, floating tablet

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air kelapa mempunyai potensi yang baik untuk dibuat minuman ataupun makanan fermentasi, karena kandungan gizinya yang kaya dan relatif lengkap sehingga sesuai untuk pertumbuhan mikroba. Air kelapa mengandung sejumlah zat gizi, yaitu protein, lemak, sejumlah vitamin, asam amino, hormon pertumbuhan dan gula. Kandungan gula maksimal 3 gram per 100 ml air kelapa. Jenis gula yang terkandung dalam air kelapa adalah glukosa, sukrosa, fruktosa dan sorbitol. Dari kandungan gula ini air kelapa dapat dimanfaatkan dalam pembuatan produk minuman dan makanan fermentasi, salah satunya adalah nata (Dimaguilla, 1967).

Nata berasal dari bahasa spanyol “nature” yang berarti terapung – apung, yaitu suatu produk fermentasi oleh bakteri *Acetobacter xylinum*. Pada kondisi yang sesuai bakteri ini dapat memecahkan 19 % gula dalam substrat menjadi polisakarida. Serat ini merupakan selulosa yang memiliki sifat kimia yang hampir sama dengan selulosa yang dihasilkan oleh tanaman. Gel selulosa bakteri ini menyerupai selulosa yang terdapat pada tanaman (Valla and Kjosbakken, 1981).

Selulosa bakteri identik dengan selulosa yang berasal dari tumbuhan. Kelebihan selulosa dari nata kelapa dibandingkan dengan sumber selulosa lain, karena tidak bercampur dengan lignin dan hemiselulosa . (Yanuar, dkk, 2003).

Selulosa banyak digunakan untuk bahan tambahan dalam pembuatan obat, salah satunya yaitu sebagai matriks pada sediaan *floating*. Turunan selulosa yang biasa digunakan sebagai matriks untuk sediaan *floating* yaitu Microcrystalline Cellulose, Carboxymethyl cellulose, Methyl cellulose dan hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC). Salah satu sifatnya yaitu terjadi hidrasi sehingga densitasnya menjadi rendah menyebabkan matriks mengembang, dengan daya mengembang yang tinggi maka selulosa dapat digunakan sebagai matriks pada sediaan *floating*.

Floating system, pertama kali diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1968, merupakan system dengan densitas yang kecil yang memiliki kemampuan mengembang kemudian mengapung di lambung, obat dilepaskan perlahan pada waktu yang dapat ditentukan, hasil yang diperoleh adalah peningkatan waktu tinggal di dalam lambung dan pengurangan fluktuasi konsentrasi obat dalam plasma (Chawla, 2003).

Asiklovir merupakan obat anti virus yang paling banyak digunakan karena efektif terhadap virus herpes. Obat ini memiliki pKa 2,27, hanya larut pada pH asam dan absorpsi yang terbatas pada duodenum dan jejunum, memiliki waktu paruh eliminasi yang relative singkat yaitu 2 ½ jam, obat dengan waktu paro pendek proses absorpsi dan waktu eliminasinya berlangsung relatif cepat sehingga bioavaibilitasnya rendah dan biasanya diberikan secara berulang untuk pengaturan dosis, contohnya pemberian dosis Asiklovir untuk infeksi herpes 5 kali sehari 200 mg (Ganiswarna G, Sulistia, 1995, 617). Telah dilakukan penelitian sebelumnya

mengenai formulasi dan evaluasi *in vitro* tablet mengambang Asiklovir (Marwati, 2007).

Waktu eliminasi yang pendek memungkinkan Asiklovir dibuat sediaan dengan system *floating* agar waktu tinggal di dalam lambung lama dan obat bertahan untuk diabsorpsi di lambung, mengurangi frekuensi pemberian, meningkatkan kenyamanan pasien dan menjaga konsentrasi obat dalam darah tetap dalam kondisi terapeutik. Adanya daya mengambang yang baik sehingga selulosa nata kelapa memungkinkan untuk dibuat dalam sediaan tablet mengambang. Berdasarkan hal tersebut diatas maka akan dilakukan penelitian tentang formulasi tablet mengambang Asiklovir dengan menggunakan matriks selulosa nata kelapa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka:

1. Apakah selulosa dari nata kelapa dapat digunakan sebagai matriks untuk sediaan tablet mengambang?
2. Bagaimana profil disolusi pelepasan Asiklovir dari sediaan tablet mengambang yang diformulasikan dengan menggunakan matriks selulosa dari nata kelapa?
3. Apakah ada perbedaan profil disolusi antara bahan obat yang dicampur secara fisik dan yang dijerap dengan selulosa?

C. Tujuan Penelitian

1. Memformulasi selulosa dari nata kelapa sebagai matriks pada sediaan tablet mengambang.
2. Menentukan profil disolusi pelepasan Asiklovir dari sediaan tablet mengambang yang diformulasikan dengan menggunakan matriks selulosa dari nata kelapa.
3. Membandingkan profil disolusi antara bahan yang dicampur secara fisik dan yang dijerap dengan selulosa.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dapat memanfaatkan nata kelapa sebagai bahan tambahan, pada suatu sediaan tablet.
2. Dapat mengurangi frekuensi pemberian, dengan adanya sistem floating tablet

BAB II


TINJAUAN PUSTAKA

A. *Selulosa*

Selulosa adalah polisakarida yang merupakan komponen utama yang menyusun dinding sel dalam tanaman. Melekul selulosa dari lebih seribu satuan glukosa yang berhubungan satu sama lain secara hubungan beta dan membentuk rantai lurus. Selulosa diperoleh dari ekstraksi kayu atau bahan lain menggunakan bantuan alkali kuat atau kalium sulfit yang dapat melarutkan lignin, selanjutnya selulosa dilarutkan dalam pereaksi Schweitzer (larutan tembaga amoniak) membentuk larutan kompleks tembaga selulosa yang pada penambahan asam akan memberi endapan selulosa. Selulosa merupakan serat tanaman yang berasal dari karbohidrat rantai panjang (Gunawan, Didit, dkk, 45, 2004).

Selulosa merupakan polimer polisakarida yang tidak bercabang mengandung β -1,4 poli glukosa, merupakan hablur tidak berbau, berwarna putih praktis tidak larut dalam air dan sebagian besar pelarut organik, bersifat inert, tidak mudah dihidrolisis, tetapi hidrolisis dapat terjadi apabila digunakan suhu tinggi, tekanan tinggi dan kadar asam tinggi (Gunawan, dkk, 2004). Sejumlah besar rantai selulosa bergabung membentuk mikrofibril selulosa dan saling berikatan membentuk fibril (Morrison, 1986). Rantai selulosa dapat mempunyai residu lebih dari 1500 residu β -glukosa. Rantainya mengandung gugus OH- disepanjang rantainya yang menyebabkan selulosa bermuatan

negatif. Dengan demikian, selulosa memiliki kemampuan dalam mengikat ion positif seperti pada mineral (Hernaman Iman dkk, 2004. Anonim, 2006).



Gambar 1. Rumus struktur selulosa (Kibbe, 2000).

Penggunaan terbesar selulosa di dalam industri adalah berupa serat kayu dalam industri kertas dan karton serta digunakan dalam dunia kesehatan dalam bentuk serabut – serabut kapas. Penggunaan lainnya adalah sebagai serat tekstil yang bersaing dengan serat sintetis. Untuk aplikasi lebih luas, selulosa dapat diturunkan menjadi beberapa produk, antara lain Microcrystalline Cellulose, Carboxymethyl cellulose, Methyl cellulose dan hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC). Produk-produk tersebut dimanfaatkan untuk eksipien farmasi sebagai bahan antigumpal, emulsifier, stabilizer, dispersing agent, pengental, *gelling agent* pengisi, desintegran, pengikat bahkan sebagai matriks dalam sediaan lepas lambat mengembang atau *FDSS* (Saifullah, 2007).

Pada umumnya selulosa diperoleh dari tumbuhan. Namun demikian, bakteri tertentu juga mampu memproduksi selulosa. *Acetobacter xylinum* adalah salah satu spesies bakteri yang dapat menghasilkan mikrofibril selulosa ekstraselular dan identik dengan selulosa dari tanaman. Arry Yanuar dkk,

(2003) telah melakukan preparasi dan karakterisasi selulosa mikrokrystal dari nata de coco dimana hasil karakterisasi mikrokrystalin selulosa nata de coco dibandingkan dengan Avicel ® pH 102 mempunyai spektrum infra merah dan sinar-x yang mirip serta rumus kimia yang sama yaitu $C_6H_{10}O_5$. Ia menambahkan kelebihan selulosa yang berasal dari *nata de coco* atau *bakterial selolusa* dibandingkan sumber selulosa lain, karena tidak bercampur dengan lignin dan hemiselulosa sehingga cocok sebagai sumber selulosa alternatif (Jamal, 1986; Yanuar, 2003).

Nata berasal dari bahasa spanyol “nature” yang berarti terapung-apung, yaitu suatu produk fermentasi oleh bakteri *Acetobacter xylinum*, pada media yang mengandung gula dan menyukai lingkungan asam serta membutuhkan sumber nitrogen untuk aktifitasnya. Pada kondisi yang sesuai bakteri ini dapat memecahkan 19 % gula dalam substrak menjadi polisakarida. Serat ini merupakan selulosa yang memiliki sifat kimia yang hampir sama dengan selulosa yang dihasilkan oleh tanaman. Selulosa ini membentuk massa yang menggumpal dipermukaan medium, setelah menerima mekul – mekul glukosa bergabung dengan lemak membentuk penyokong yang terdapat pada membran sel, lalu keluar bersama enzim yang menggabungkan sisa heksosa menjadi serat, kemudian lemaknya diserap kembali oleh sel bakteri. Gel selulosa bakteri ini menyerupai selulosa tanaman (Valla and Kjosbakken, 1981).

Isolasi selulosa nata de coco dilakukan dengan metode ekstraksi menggunakan natrium hidroksida 18% menghasilkan α -selulosa dengan

rendemen sebesar 93,48 %, kemudian hidrolisa α -selulosa menggunakan asam klorida 2,5 N menghasilkan mikrokristalin selulosa dengan rendemen 78,79%. Dari percobaan daya serap air terlihat serbuk selulosa mempunyai daya serap air 7 kali berat keringnya, α -selulosa dan selulosa mikrokristal masing-masing 7 kali dan 1,8 kali berat keringnya. Avicel PH-102 menyerap air hingga 2,7 kali berat keringnya (Yanuar, dkk, 2003).

B. Asiklovir

Asiklovir merupakan obat sintetis jenis analog nekleosida purin. Sifat antivirus Asiklovir terbatas pada kelompok virus herpes (Ganiswarna G, Sulistia, 1995). Asiklovir merupakan obat pilihan pada ensefalitis herpes simpleks pada peningkatan kesembuhan dan penggunaan paling banyak pada pengobatan infeksi herpes genital (pada semua kasus Acyclary menghambat virus yang membela aktif dan tidak bekerja pada virus laten) (Mycek, Mary J , 2002, 370).

Asiklovir dapat diberikan secara intra vena, oral, ataupun topikal. Efektifitas pemberian topikal diragukan. Obat tersebar keseluruhan tubuh, termasuk cairan serebrospinal, Asiklovir bersifat konsisten mengikuti model dua-kompartemen, volume distribusi taraf mantap sama dengan volume cairan tubuh. Kadar di cairan serebrospinal mencapai setengah kadar plasma, lebih dari 80 % dosis obat dieliminasi melalui filtrasi glomerulus ginjal dan sebagian kecil melalui sekresi tubuli. Hanya sekitar 15 % dosis obat yang diberikan dapat ditemukan kembali di urin sebagai metabolik inaktif (Ganiswarna G, Sulistia, 1995, 617).

Asiklovir memiliki waktu paro yang pendek kira-kira 2 ½ jam, obat dengan waktu paro pendek proses absorpsi dan waktu eliminasinya berlangsung relatif cepat dan biasanya diberikan secara berulang sebagai pengaturan dosis. Sedangkan obat dengan waktu paro panjang, dengan sendirinya akan melepaskan obatnya dalam waktu yang lama. Pemberian dosis Asiklovir untuk infeksi herpes 5 kali sehari 200 mg, (Ganiswarna G, Sulistia, 1995, 617).

Asiklovir 200 mg dan 400 mg digunakan untuk pengobatan herpes simplek, herpes zoster (cacar air), dan varisella. Varisella adalah penyakit akut menular yang ditandai oleh vesikel dikulit dan selaput lendir yang disebabkan oleh virus varisella. Varisella disebabkan oleh herpes virus varisella atau disebut juga virus varisella zoster (cacar air).

C. Sediaan lepas lambat

Sediaan lepas lambat adalah bentuk sediaan yang dirancang untuk melepaskan obatnya ke dalam tubuh secara perlahan-lahan atau bertahap supaya penglepasannya lebih lama dan memperpanjang aksi obat (Ansel, dkk, 2005). Untuk beberapa keadaan penyakit bentuk sediaan obat yang ideal adalah mampu memberikan konsentrasi obat pada tempat aksi dicapai secara tepat dan kemudian secara konstan dipertahankan selama waktu pengobatan yang diinginkan. Pemberian obat dalam dosis yang cukup dan frekuensi yang benar maka konsentrasi obat *terapeutik steady state* di plasma dapat dicapai secara tepat dan dipertahankan dalam pemberian berulang dengan bentuk sediaan

conventional peroral. Namun terdapat keterbatasan dalam bentuk konvensional peroral. (Collett, dan Moraton, 2002).

Sediaan lepas lambat yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

a. Repeat action

Repeat action adalah bentuk sediaan oral yang dirancang untuk melepaskan dosis awal dengan dosis tunggal biasa obat dan dosis tunggal lain dari obat pada waktu berikutnya, bahkan beberapa produk mempunyai bagian ketiga yaitu dosis yang baru dilepaskan setelah bagian kedua dilepaskan. Pelepasan yang berurutan diatur oleh “*time barer*” atau *interic coating* (Ansel, 1995).

b. Sustained release

Sustained release dirancang untuk melepaskan suatu dosis terapi awal obat (*loading dose*) secara tepat dan diikuti pelepasan obat secara konstan, konsentrasi obat dalam plasma yang konstan dapat dipertahankan dengan fluktuasi yang minimal. Kecepatan pelepasan obat dirancang sedemikian rupa agar jumlah obat yang hilang dalam tubuh karena eliminasi diganti secara konstan. Keunggulannya adalah dihasilkan kadar obat dalam darah yang merata tanpa perlu mengulangi pemberian dosis (Shargel, dkk, 2005).

c. *Prolonged action*

Prolonged action dirancang untuk melepaskan obat secara lambat dan memberi cadangan obat secara terus-menerus selama selang waktu yang panjang, mencegah absorpsi yang sangat cepat sehingga dapat mengakibatkan konsentrasi puncak obat dalam plasma sangat tinggi (shangel, dkk, 2005). Bentuk sediaan awal *prolonged action* diawali dengan membuat obat tersedia dalam tubuh sejumlah yang dibutuhkan untuk menghasilkan respon farmakologi yang diinginkan. Peningkatan pemasukan obat dalam tubuh pada kecepatan yang lebih lama mempunyai respon farmakologi, disbanding obat dosis biasa (lee dan Robinson, 1978).

Keuntungan sediaan lepas lambat dibandingkan sediaan lain (Ansel,dkk, 1995, Simon, 2001 dan shargel, 2005) adalah :

1. Mengurangi fluktuasi kadar obat dalam darah sehingga efek farmakologinya lebih stabil.
2. Mengurangi frekuensi pemberiaan.
3. Dapat menghindari pemakaian obat pada malam hari.
4. Meningkatkan kenyamanan kepuasan pasien.
5. Mampu membuat lebih rendah biaya harian bagi pasien karena lebih sedikit satuan dosis yang harus digunakan.

6. Secara keseluruhan memungkinkan peningkatan kepercayaan terapi

Adapun kerugian sediaan lepas lambat (Shargel, dkk. 2005 dan lachman, 1995) :

1. Tidak dapat digunakan untuk sediaan dosis besar (lebih besar dari 500 mg).
2. Efektifitas pelepasan obat dipengaruhi dan dibatasi oleh lama obat disaluran cerna.
3. Sering terjadi skema pelepasan zat aktif bila obat tidak seluruhnya ditelan melainkan dipecah, digerus, atau dikunyah dengan resiko terjadi lewat dosis, pelepasan tidak pada tempatnya dan sangat berbahaya terutama saat obat sangat aktif dan selanjutnya terjadi keadaan kurang dosis.
4. Harga obat biasanya lebih mahal karena biaya pengembangan dan produksi lebih tinggi.
5. Jika penderita mengalami reaksi samping atau secara tiba-tiba mengalami keracunan maka untuk menghentikan obat dari system tubuh akan lebih sulit dibandingkan sediaan konvensional.

Bentuk sediaan dengan pelepasan terkendali atau diperlambat dapat mengurangi frekuensi pemberian obat. Bentuk sediaan pelepasan terkendali yang ideal tidak sekedar dapat melepaskan bahan aktif obat dalam waktu yang diperlama, terkendali dan dapat diprediksi, tetapi juga harus dapat

mempertahankan keberadaan sediaan pada lokasi absorpsinya. Waktu tinggal obat di dalam usus halus sukar untuk diubah atau dipengaruhi, maka usaha yang dapat dilakukan mengontrol waktu tinggal obat di dalam lambung. Kebanyakan obat sangat sedikit diabsorpsi di dalam lambung tetapi bila bentuk sediaan bertahan lama di dalam lambung dan melepaskan obat secara sinambung dalam waktu yang cukup lama, maka akan dapat menyalurkan obat ke dalam usus halus dengan cara sinambung pula. Oleh karena itu obat dapat diabsorpsi dalam usus halus dengan lebih baik, dan meningkatkan ketersediaan hayati pada pemberian secara oral. Beberapa pendekatan yang telah dilakukan untuk memperpanjang waktu tinggal dalam lambung antara lain dengan mekanisme pengapungan (Arora, et al, 2005).

Beberapa sifat fisika kimia yang berpengaruh dalam sediaan lepas lambat adalah sebagai berikut (Lee dan Robinson 1979 dan Ansel, 1989) :

- a. Produk oral yang mempunyai dosis lebih besar dari 0,6 gr sangat sulit untuk sediaan lepas lambat, karena dosis yang lebih besar akan diperoleh volume sediaan yang lebih besar pula yang tidak dapat diterima sebagai produk oral.
- b. Suatu sifat fisika kimia yang penting dari suatu zat obat adalah kelarutan, terutama kelarutan sistem dalam air, suatu obat harus mempunyai kelarutan dalam air agar manjur secara terapi, agar suatu obat masuk ke sistem sirkulasi dan menghasilkan efek terapeutik ia pertama-tama harus berada dalam larutan. Jika kelarutan dari obat kurang dari yang diinginkan pertimbangan harus diberikan untuk memperbaiki kelarutannya. Obat

dengan kelarutan dalam air rendah atau tinggi, tidak cocok untuk sediaan lepas lambat, batas terendah untuk sediaan pada sediaan lepas lambat ini adalah 0,1 mg/ml, obat yang kelarutannya tergantung pH , fisiologis, akan menimbulkan masalah yang lain karena variasi pH pada saluran cerna (GIT) yang dapat mempengaruhi kecepatan disolusi.

- c. Melekul obat pertama-tama harus melintasi suatu membran biologis sebagai suatu pembatas lemak untuk kebanyakan obat-obat dan mengizinkan absorpsi zat-zat yang larut yang larut dalam lemak dengan difusi pasif, sedangkan zat-zat yang tidak larut dalam lemak dapat mendifusi menyebrangi pembatasan hanya dengan kesulitan yang besar. Obat yang mudah larut dalam air kemungkinan tidak mampu menembus membran biologis sehingga obat tidak mampu bertahan hingga ketahap aksi, sebaliknya untuk obat tidak mencapai sel target kedua kasus diatas tidak diinginkan untuk sediaan dengan pelepasan terkendali.
- d. Bahan aktif yang yang tidak stabil pada lingkungan yang bervariasi disepanjang saluran cerna (enzim, variasi pH, flora usus) tidak dapat diformulasikan untuk sediaan lepas lambat.
- e. Melekul obat yang besar menunjukkan koefisien difusi yang kecil dan kemungkinan sulit dibuat sediaan lepas lambat.

Beberapa sifat biologi yang perlu diperhatikan di dalam sediaan lepas lambat adalah (Lee dan Robinson 1979) :

- a. Obat yang lambat diabsorpsi atau memiliki kecepatan absorpsi yang bervariasi sulit untuk dibuat sediaan lepas lambat.
- b. Obat dengan volume distribusi yang tinggi dapat mempengaruhi kecepatan eliminasinya sehingga tidak cocok untuk sediaan lepas lambat.
- c. Obat dengan waktu paro panjang dan dosis besar tidak cocok untuk sediaan lepas lambat, obat dengan waktu paro yang panjang dengan sendirinya akan dapat mempertahankan kadar obat dalam indeks terapeutiknya sehingga tidak perlu dibuat sediaan lepas lambat.
- d. Obat dengan indeks terapeutik yang sempit memerlukan kontrol yang teliti terhadap kadar obat yang dilepaskan dalam darah, sediaan lepas lambat berperan dalam mengontrol pelepasan obat agar tetap dalam indeks terapeutiknya.
- e. Sediaan lepas lambat dapat digunakan pada obat yang metabolismenya secara luas, asalkan kecepatan metabolismenya tidak terlalu tinggi.

D. Floating tablet

Tablet merupakan bentuk sediaan farmasi yang paling banyak tantangannya didalam mendesain dan membuatnya. Misalnya kesukaran untuk memperoleh bioavailabilitas penuh dan dapat dipercaya dari obat yang sukar dibasahi dan melarutnya lambat, begitu juga kesukaran untuk memperoleh

kekompakan kohesi yang baik dari zat amorf atau gumpalan (Lachman, Leon, 1994). Dari jenis sediaan yang ada, tablet dan jenis-jenis modifikasinya tidak asing lagi dan merupakan sediaan yang paling populer. Dewasa ini diperkirakan paling tidak 40 % dari sediaan obat diracik dalam bentuk tablet, bentuk sediaan tablet terbukti sangat menguntungkan karena massanya dapat dibuat secara masinel dan harganya murah (Voigt, Rudolf, 1995, 165).

Banyak metode yang digunakan untuk pembuatan sediaan lepas lambat salah satunya adalah sediaan yang dirancang untuk tetap tinggal dilambung. Bentuk sediaan yang dapat dipertahankan tetap tinggal dilambung disebut *Gastroretentive Drug Delevery System* (GRDDS). GRDDS dapat memperbaiki pengontrolan penghantaran obat yang memiliki jendela terapeutik sempit, dan absorpsinya baik dilambung. Hal-hal yang dapat meningkatkan waktu tinggal dilambung meliputi: sistem penghantaran bioadheseive yang melekat pada permukaan mukosa, sistem penghantaran yang dapat meningkatkan ukuran obat sehingga tertahan karena tidak dapat melewati pirolus, dan sistem penghantaran dengan mengontrol densitas termasuk *floating system* dalam cairan lambung (Gohel dkk, 2004).

Floating system merupakan sistem dengan densitas yang kecil, yang memiliki kemampuan mengembang kemudian mengapung dan tinggal dilambung untuk beberapa waktu. Pada saat sediaan mengapung dilambung, obat dilepaskan perlahan pada kecepatan yang dapat ditentukan. System pengapungan di lambung berisi obat yang pelepasannya perlahan – lahan dari sediaan yang memiliki densitas yang rendah atau *floating drug delivery system*

(FDDS). FDDS memiliki bulk density yang lebih rendah dari cairan lambung. Hasil yang diperoleh adalah peningkatan *gastric residence time* (GRT) dan pengurangan fluktuasi konsentrasi obat dalam plasma. Bentuk *floating system* didesain dengan menggunakan matiks–matriks hidrofilik karena mampu mempertahankan densitasnya secara rendah selagi polimer berhidrasi serta membangun penghalang yang membentuk gel dipermukaan bagian luar. Bentuk ini diharapkan tetap dalam keadaan mengapung selama 3 atau 4 jam di dalam lambung dan tidak dipengaruhi oleh pengosongan lambung karena mempunyai densitas yang lebih rendah daripada kandungan gastrik (Sulaeman, 2007).

Floating system dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu :

a. *Non effervescent system*

Pada *non effervescent system* biasanya menggunakan matriks yang memiliki daya mengembang tinggi seperti selulosa, hidrokoloid, polisakarida, dan polimer seperti polikarbonat, poliakrilat, polimetakrilat, dan polistiren. Salah satu cara bentuk sediaan floating yaitu dengan cara mencampurkan zat aktif dengan hidrokoloid gel. Hidrokoloid akan mengembang ketika kontak dengan cairan lambung setelah pemberian oral, tinggal dalam bentuk utuh dan bulk densitynya lebih kecil dari satuan lapisan luar gel. Struktur gel akan bertindak sebagai reservoir untuk obat yang akan dilepaskan perlahan dan dikontrol oleh difusi melalui gel.

b. Effervescent system

System penghantaran polimer ini dipersiapkan dengan polimer yang dapat mengembang seperti mithocel, polisakarida, chitosan dan komponen effervescent (missal : natrium bikarbonat, dan asam sitrat atau tatra). Matriks ketika kontak dengan cairan lambung akan membentuk gel, dengan adanya gas yang dihasilkan dari system effervescent, maka gas akan terperangkap dalam gelyieldhydrocolloid, akibat tablet akan mengapung, meningkatkan pergerakan sediaan, sehingga akan mempertahankan daya mengapungnya (Sulaeman, 2007).

E. Formulasi Tablet Mengambang

Untuk pembuatan tablet mengapung bertujuan untuk melepaskan obat secara cepat pada dosis awal dan melepaskan obat berikutnya secara perlahan-lahan (Tjanrawinata, 2002). Untuk formulasi sediaan tablet mengapung digunakan suatu barrier kimia atau fisika untuk mendapatkan pelepasan yang lambat dari dosis yang terdapat pada sediaan, diantaranya ialah dengan penyalutan, matriks lemak atau plastik, mikroenkapsulasi, ikatan kimia dengan resin penukar ion, dan system pompa osmotik (Collett dan Moriton, 2002).

Teknologi yang sering digunakan untuk pembuatan sediaan lepas lambat adalah system matriks, penyalutan, dan pompa osmotik (Simon, 2001). System matriks adalah system yang paling sederhana dalam pembuatan tablet mengembang, bahan aktif didispersikan secara homogen di dalam pembawa. Bahan pembawa yang sering digunakan digolongkan menjadi bahan pembawa

tidak larut air bersifat lilin / wax dan hidrofilik pembuatan gel. Matriks adalah zat pembawa padat yang didalamnya obat tersuspensi secara merata, zat pembawa ini umumnya memperpanjang laju pelepasan obat. Obat berada dalam persen yang lebih kecil dari matriks, sehingga matriks dapat memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap air dan akan berdifusi keluar secara lambat. (Shargel, dkk, 2005).

Dikenal ada beberapa beberapa bentuk matriks penghalang yang dapat digunakan untuk memformulasikan tablet dengan matriks yaitu:

1. Golongan matriks penghalang dari bahan yang tidak larut (skeleton matriks), dirancang utuh dan tidak pecah dalam saluran pencernaan. Zat aktif dibuat tablet dengan berbagai cara, salah satunya zat aktif dicampur dengan satu atau lebih bahan tambahan dengan tidak larut dalam saluran cerna, misalnya polietilen, polifinil klorida, etil selulosa kemudian digranul. Tahap yang menentukan laju pelepasan dari obat ini adalah penetrasi cairan dalam matriks yang dapat dinaikkan dengan menggunakan bahan pembasah sehingga dapat menambah perembesan air kedalam matriks yang menyebabkan disolusi dan difusi dari saluran – saluran yang dibentuk dalam matriks (Ansel, 1995, 295).
2. Golongan matriks yang tidak larut dalam air tetapi dapat terkikis oleh medium elusi, golongan berupa lilin, lemak, asam stearat, polietilen glikol. Pelepasan obat melalui proses difusi, erosi dan lepasnya obat lebih cepat dibandingkan polimer yang tidak larut. Pelepasan zat aktif dari matriks

hidrofob ditentukan oleh sifat dan prosentase bahan pembawa berlemak, jumlah granometer, ukuran ganda, kelarutan zat aktif dan daya kempa, pH saluran cerna dan reaksi enzimatik (Ansel,dkk,1995,295).

3. Golongan pembentuk matriks yang tidak dapat dicerna dan dapat membentuk gel didalam saluran pencernaan. Contoh bahan ini adalah natrium alginat, metil selulosa, galaktomenosa. Pelepasan obat dikendalikan melalui penetrasi air, melalui lapisan yang terbentuk karena hidrasi polimer dan difusi obat melalui polimer yang terhidrasi (Ansel, dkk, 1995, 295).

Untuk penyalutan, secara teoritis tablet menawarkan pendekatan yang paling murah terhadap bentuk obat padat yang melepaskan kandungannya dalam jangka waktu yang lama dan terkendali. Telah dilaporkan suatu sistem tablet bersalut yang bertahan lama dalam lambung, tablet ini menggunakan salut polimer dengan pautan silang (*cross-linked polymer*) yang mampu menggelembung menjadi besar dengan cepat dalam lambung, dan terbatas sampai disitu oleh karena ukuran fisiknya. Cairan lambung yang menembus lapisan cairan yang menggelembung tadi melarutkan obat yang ada di dalam tablet yang kini terbentuk seperti kantung berlapis, dan obat ini dilepaskan dari larutan dengan cara difusi melintasi membran atau lapisan yang telah terhidrasi tadi. Pengelepasan obat akan terjadi pada kecepatan yang tetap, selama konsentrasi obat dalam kantung tadi melampaui kapasitas membran untuk mengeluarkan obat, dengan demikian membran merupakan tahap yang membatasi laju. Bila ukuran kantung yang membatasi tadi melebihi 2 cm

maka obat ini akan secara konsisten akan tetap ada dalam lambung paling sedikit selama 6–8 jam, melepaskan obat ke dalam cairan lambung dengan laju yang tetap (Lachman, Leon, 1994, 720 – 721).

Sistem pompa osmotik memiliki ciri yaitu penyalutan tabletnya mengandung bahan aktif dengan membran semipermeabel, membran ini hanya dapat dilalui molekul–molekul air tetapi tidak oleh bahan aktif terlarut. Membran tersebut dilubangi oleh Bor laser. Melalui lubang ini inilah larutan bahan aktif didorong keluar dari tablet bersalut oleh tekanan osmosa yang berasal dari bahan aktif osmosis (Simon, 2001).

1. Metode pembuatan sediaan tablet

Pada umumnya sebelum tabletasi dilakukan, bahan obat dan bahan pembantu yang diperlukan digranulasi, artinya partikel–partikel serbuk diubah menjadi butiran granulat. Dalam hal ini diperoleh butiran, dimana partikel–partikel serbuknya memiliki daya lengket. Disamping itu daya alirnya menjadi lebih baik. Dengan daya alir tersebut pengisian ruang cetak dapat berlangsung secara kontinyu dan homogen. Keseragaman bentuk granulat menyebabkan pula keseragaman bentuk tablet. Dengan demikian akan dihasilkan massa tablet yang tetap dan ketetapan takaran yang tinggi (Voigt, Rudolf, 1995, 171).

Massa kempa adalah massa tablet yang terdiri dari campuran fase dalam dan fase luar yang telah diproses untuk siap dikempa menjadi tablet. Fase dalam adalah massa utama tablet yang terdiri dari massa campuran zat aktif dan bahan tambahan yang diproses menjadi granul secara

basah atau kering atau tergantung pembuatan. Fase luar adalah campuran beberapa bahan tambahan saja yaitu penghancur luar, glidan, dan lubrikan yang ditambahkan ke fase dalam untuk memudahkan pengempaan tablet dan untuk menunjang mutu tablet yang memenuhi syarat. Granulasi adalah proses pembuatan ikatan partikel-partikel kecil membentuk padatan yang lebih besar dan agregat permanen melalui pengumpulan massa, sehingga dapat dibuat granul yang lebih homogen dari segi kadar, massa jenis, ukuran serta bentuk partikel. Adapun fungsi granulasi adalah untuk memperbaiki sifat aliran dan kompressibilitas dari massa tablet, memadatkan bahan-bahan, menyediakan campuran seragam yang tidak memisah, mengendalikan kecepatan pelepasan zat aktif, mengurangi debu, dan memperbaiki penampakan tablet. perbedaaan dalam efek pemisahan yang tergantung kepada cara pembuatannya.

Pada proses granulasi, luas permukaan total seluruh partikel serbuk berkurang, yang diikuti dengan penurunan gaya adhesi. Pada saat pencetakan berlangsung akan terjadi peningkatan daya lekat masing-masing partikel melalui intersepsi gerigi yang terdapat pada permukaan butiran granulat. Dengan intersepsi tersebut, cetakan kecil memperoleh kekompakan. Pada saat proses tabletasi berlangsung dihasilkan bodi cetakan dengan adanya tekanan dan memiliki karakteristik kekompakan dan kehancuran tertentu, jika di dalam bahan yang ditabletasi terdapat kerja gaya ikatan yang cukup kuat (Voigt, Rudolf, 1995, 172).

2. Evaluasi tablet

Untuk mendesain tablet serta selanjutnya memantau kualitas produk obat, evaluasi secara kuantitatif serta penetapan sifat kimia, fisika dan bioavailabilitas tablet harus dibuat. Ketiga sifat diatas memiliki profil stabilitas yang nyata, tetapi profil stabilitas itu dapat saling berpengaruh, misalnya kerusakan kimia atau interaksi antara komponen-komponen tablet akan mempengaruhi sifat fisika tablet dan sangat mempengaruhi bioavailabilitas dari system tablet itu.

1. Penampilan umum

Penampilan umum suatu tablet sangat penting bagi penerimaan konsumen, bagi pengontrolan keseragaman antar bahan, antara tablet yang satu dengan yang lainnya, serta untuk memantau pembuatan yang bebas kesalahan. Mengontrol penampilan umum tablet, melibatkan pengukuran sejumlah perlengkapan seperti ukuran tablet, bentuk, warna, ada tidak adanya bau, rasa, bentuk permukaan konsistensi dan cacat fisik, dan membaca tanda-tanda pengenalan.

2. Ukuran dan bentuk

Ukuran dan bentuk tablet dapat dituliskan, dipantau dan dikontrol. Ketebalan tablet adalah satu-satunya variabel dimensi yang berhubungan dengan proses pengempaan. Pada beban kempa yang konstan ketebalan tablet bervariasi dengan berubahnya pengisian *die* yang konstan, ketebalan bervariasi dengan berubahnya beban kompresi. Ketebalan tablet harus terkontrol sampai perbedaan

kurang lebih 5 % dari nilai standar. Tiap perbedaan ketebalan tablet pada *lot* tertentu atau antar *lot* tidak boleh sampai terlihat dengan mata telanjang.

3. Kekerasan dan kerenyahan

Tablet harus mempunyai kekuatan atau kekerasan serta tahan atas kerenyahan agar dapat bertahan terhadap berbagai guncangan mekanik pada saat pembuatan, pengepakan. Kekerasan tablet seperti juga ketebalannya merupakan fungsi dari isi *die* dan gaya kompresi. Pada penambahan tekanan kompresi, nilai kekerasan tablet meningkat, sedangkan ketebalan tablet berkurang, hubungan ini berlangsung sampai tercapai kekerasan maksimum dan ketebalan minimum. Bila digunakan alat keseragaman, maka hubungan isi *die* dan tekanan akan menentukan kekerasan tablet. Ini adalah metode pengontrolan fisik yang baik, terutama bila pengukuran ini dikombinasikan dengan pengukuran ketebalan tablet.

4. Kandungan obat dan pelepasannya

Sebuah tablet yang kuat yang kuat secara fisik dapat saja tidak memberikan efek yang diharapkan. Untuk mengevaluasi hal tersebut maka jumlah obat dalam tablet harus dipantau pada setiap tablet atau *batch*, begitu juga kemampuan tablet untuk melepaskan zat yang dibutuhkan harus dipastikan.

5. Variasi berat

Pada tablet yang didesain mengandung sejumlah obat di dalam sejumlah formula, berat tablet yang dibuat harus secara rutin diukur untuk membantu memastikan bahwa setiap tablet mengandung sejumlah obat yang tepat. Di dalam tablet yang berat rata-ratanya memenuhi syarat, mungkin ada tablet yang beratnya melebihi atau kurang dari persyaratan. Untuk mengatasi masalah ini USP memberikan batasan-batasan penyimpangan berat yang masih diizinkan dari setiap tablet, yang dinyatakan sebagai persen berat rata-rata sampel. Uji penyimpangan berat USP dilakukan dengan menimbang 20 tablet satu per satu, menghitung berat rata-rata, kemudian membandingkan berat tablet dengan berat rata-rata. Tablet memenuhi syarat USP bila 2 buah tablet yang beratnya di luar batasan persentase, serta tidak satupun tablet yang beratnya lebih dari dua kali batasan persentase yang diizinkan.

6. Disintegrasi

Bagi tablet langkah penting pertama sebelum melarut adalah pecahnya tablet menjadi partikel-partikel atau granul, langkah ini disebut disintegrasi. Waktu yang diperlukan oleh tablet untuk hancur ditentukan oleh alat yang dinyatakan dalam USP / NF. agar syarat USP terpenuhi, tablet harus hancur dan semua partikel harus menembus saringan mesh-10 dalam waktu yang sudah ditentukan.

Bila ada sisa yang tertinggal, maka sisa itu harus mempunyai massa yang lunak dan tidak boleh ada inti tablet yang tumpah.

7. Disolusi

Penaksiran pelepasan langsung obat dari formula diperoleh dengan mengukur bioavailabilitas *in vivo*, namun karena beberapa alasan maka penggunaan *in vivo* menjadi sangat terbatas. Akibatnya uji disolusi secara *in vitro* dipakai dan dikembangkan secara luas dan secara tidak langsung digunakan untuk mengukur bioavailabilitas suatu obat. Dua sasaran dalam mengembangkan uji disolusi *in vitro* yaitu untuk menunjukkan pelepasan obat dari tablet mencapai 100 % dan laju pelepasan obat seragam pada setiap *batch* dan harus sama yang telah dibuktikan bioavailabilitasnya dan efektif secara klinis. Sejak tahun 1970 USP dan FN telah dilengkapi dengan cara-cara untuk melakukan uji disolusi (Voigt, Rudolf, 1995, 648 – 659).

F. Tinjauan Islam tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Pengobatan

A. Islam dan Ilmu Pengetahuan Teknologi

Bumi diciptakan sebagai suatu sistem yang kompleks, tersusun dari beberapa sistem kecil yang belum tentu diketahui secara pasti oleh manusia. Oleh karena itu, Allah swt. selalu memerintahkan kepada hambaNya untuk menuntut ilmu secara tersirat maupun tersurat sesuai firmanNya dalam Q.S. al-Baqarah (2) : 269 sebagai berikut :

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ^ج وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ
فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا^ط وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو

الْأَلْبَابِ ﴿٢٦٩﴾

Terjemahnya :

Allah menganugerahkan Al Hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah) (Q.S. 2 : 269)

Dalam ayat ini Allah swt. tidak memaksakan manusia untuk belajar atau menuntut ilmu, tapi Allah swt. memberi keleluasaan pada manusia untuk memilih kebaikan untuk dirinya sendiri dengan cara menuntut ilmu dan cara yang jayyid (baik) yaitu dengan berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadits.

Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh manusia untuk menemukan berbagai hal yang mungkin sebelumnya belum pernah terpikirkan oleh manusia itu sendiri. Seharusnya hal ini bisa menjadi dasar untuk tiap-tiap manusia menyadari kekuasaan dan kebesaran Allah swt. karena sesungguhnya terdapat pelajaran disetiap bidang kehidupan. Pelajaran itu ada pada alam bahkan ada pada diri kita sendiri seperti dalam Q.S. fushshilat (41) : 53 sebagai berikut :

سَنُرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ
لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۖ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

Terjemahnya :

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? (Q.S. 41 : 53)

Penafsiran ilmiah al-Qur'an adalah asumsi bahwa banyak temuan ilmu alam modern yang telah diantisipasi dalam al-Qur'an dan banyak referensi yang dapat ditemukan di dalamnya. Banyak penulis islam, klasik dan modern, percaya bahwa semua ilmu terkandung dalam al-Qur'an (Wikipedia, 2010).

Tempat ilmu pengetahuan adalah akal dan hati. Pengetahuan Allah adalah tidak terbatas, sedangkan pengetahuan manusia sangat terbatas. Setiap orang memiliki pengetahuan yang berbeda-beda. Pengetahuan adalah milik umum yang tidak bisa disembunyikan atau dimonopoli. Manusia, malaikat, jin dan makhluk hidup lainnya mempunyai jumlah pengetahuan yang bervariasi. Pengetahuan bisa menjadi abadi, contohnya ilmu yang diwahyukan. Jenis-jenis lain pengetahuan bersifat relatif, nisbiyat al haqiqat. Hakikat yang mungkin dari ilmu pengetahuan muncul

dari keterbatasan pengamatan manusia dan interpretasi dari fenomena fisik.

Al Qur'an menyediakan prinsip-prinsip umum yang membimbing dan bukan pengganti penelitian empiris. Kitab ini menggabungkan pengamatan empiris; membebaskan pikiran dari keragu-raguan, taklid buta, ketergantungan intelektual, dan hawa nafsu. Paradigma tauhidnya menjadi dasar dari hubungan sebab akibat (kausalitas), rasionalitas, perintah, prediksi, penemuan, obyektivitas, dan hukum alam. Hukum bisa diketahui melalui wahyu, pengamatan empiris dan eksperimen (Kasule, 2009).

B. Islam dan Pengobatan

Berbagai macam penyakit merupakan bagian dari cobaan Allah swt. yang diberikan kepada hambaNya. Sesungguhnya, cobaan-cobaan itu merupakan Sunnatullah yang telah ditetapkan berdasarkan rahmat dan hikmahNya. Perlu diketahui bahwa Allah swt. tidak menetapkan sesuatu, baik berupa takdir kauni (takdir yang pasti berlaku di alam semesta ini) atau syar'i, melainkan di dalamnya terdapat hikmah yang amat besar, sehingga tidak mungkin bisa dinalar oleh akal manusia. Berbagai cobaan, ujian, penderitaan, penyakit dan kesulitan, semua itu mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat banyak. Pada zaman sekarang, banyak penyakit yang menimpa manusia. Ada yang sudah diketahui obatnya, dan ada pula yang belum diketahui obatnya. Hal ini merupakan cobaan dari Allah, yang juga akibat dari perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan manusia.

Allah swt. Berfirman dalam Q.S. as-Syura'(42) : 30 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ
وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya :

Dan apa saja musibah yang menimpa kamu Maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu). (Q.S. 42 : 30)

Keinginan untuk terlepas dari segala macam penyakit inilah yang mendorong manusia untuk membuat upaya menyingkap berbagai metode pengobatan, mulai dari mengkonsumsi berbagai jenis obat-obatan, baik berupa tumbuh-tumbuhan secara tunggal maupun yang sudah terkomposisikan, yang diyakini berkhasiat menyembuhkan jenis penyakit tertentu, atau sistim pijatan, pembekaman, hingga operasi pembedahan. Semua dilakukan dengan trial and error (Nursyifa', 2009). Begitu pentingnya soal upaya penyembuhan penyakit dalam Islam, sehingga Rasulullah saw. pun sangat menganjurkan umatnya agar senantiasa merawat tubuh untuk menjaga kesehatan. Jika sakit, berobatlah sekuatmu, yang artinya menurut kadar kemampuan masing-masing. Islam juga menganjurkan umatnya untuk membantu meringankan beban penderitaan orang mengidap sesuatu penyakit. Salah satu bentuk penekanan anjuran ini adalah agar menjenguk orang sakit dan sekaligus memanjatkan doa.

Seperti inilah terapi penyembuhan yang diajarkan dalam Islam, yang diyakini masih dan akan tetap populer saat ini dan masa mendatang (Potretnews, 2010).

Cara yang paling sering digunakan manusia dalam usaha penyembuhan adalah pengobatan fisik. Rasulullah saw. mengatakan sebuah prinsip dasar dalam pengobatan untuk setiap penyakit adalah perawatan (*ma anzala allahu daa; illa anzala lahu shifa'a*. Kitaab al Tibb, al Bukhari). Hal ini mendorong kita untuk mencari cara pengobatan. Dengan demikian, tradisi pengobatan ala Nabi tidak hanya berhenti pada pengajaran pengobatan oleh Rasulullah, melainkan untuk mendorong manusia agar terus mencari dan bereksperimen dengan ilmu pengobatan baru. Hal tersebut merupakan implikasi bahwa pengobatan ala Nabi tidaklah statis. Ada ruang untuk berkembang, bahkan memunculkan dasar ilmu yang baru. Implikasi-implikasi lainnya dari hadist ini adalah pengobatan tidak bertentangan dengan qadar (ketentuan awal). Keduanya baik penyakit maupun penyembuhannya adalah bagian dari qadar.

Pengobatan fisik biasanya melalui pemeriksaan medis dan pemberian obat. Pengetahuan dalam dunia medis adalah salah satu contoh penerapan ilmu teknologi. Sekarang, Ada beberapa pengobatan yang dapat dilakukan antara lain, dengan menggunakan obat-obatan sintesis maupun obat-obatan tradisional (Kasule, 2008). Begitu banyak jenis obat yang tersebar di pasaran yang digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit manusia. Obat-obat ini muncul sebagai bukti dari sabda

Rasulullah saw., tidak ada penyakit yang tidak dapat diobati. Dunia pengobatan sejak dulu selalu berjalan seiring dengan kehidupan umat manusia. Karena sebagai makhluk hidup, manusia sudah akrab dengan berbagai macam penyakit ringan maupun berat. Teknologi pengobatan manusiapun semakin disibukkan dengan berbagai penelitian untuk menemukan berbagai formula obat-obatan baru untuk mengatasi berbagai macam penyakit aneh yang muncul belakangan (Nursyifa', 2009). Sesuai dengan sabda Rasulullah saw. yang artinya :

ALLAH telah menurunkan penyakit dan penawarnya dan Dia telah menentukan setiap penawar untuk setiap penyakit. Jadi rawatlah dirimu sendiri dengan menggunakan obat-obatan sekuatmu, tetapi jangan menggunakan sesuatu yang jelas-jelas dilarang. (HR. Abu Dawud dari Abu Al-Darda).

Selain itu, Rasulullah saw. juga mengajarkan banyak doa kesembuhan yang diriwayatkan dalam berbagai hadis, yang antara lain: "Ya Allah, Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah penyakit ini karena hanya Engkau lah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkannya kecuali ijin Engkau." (HR. Bukhari dan Muslim).

Doa dan pengobatan fisik perlu disinergikan, karena keduanya saling mendukung satu sama lain. Makanya, alangkah baiknya, banyak rumah sakit dalam prakteknya tidak saja mengandalkan tentang ilmu kedokteran dan farmasi dalam upaya penyembuhan penyakit si pasien, tetapi juga dibekali kekuatan keyakinan dan doa. Artinya, selain selalu menyiapkan juru doa yang memandu si pasien dan keluarga untuk berdoa bersama, juga menyediakan fasilitas ekstra kepada pasien berupa buku-

buku bermuatan soal agama (Potretnews, 2010). Semua jenis pengobatan dan obat-obatan tersebut hanya terasa khasiatnya bila disertai dengan sugesti dan keyakinan. Disinilah kekuatan Do'a - Dzikir, maka Islam mengenal istilah do'a dan keyakinan. Dengan pengobatan yang tepat (tentunya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman puluhan tahun), dosis obat yang sesuai disertai doa dan keyakinan, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan terkecuali maut.

Disitulah akan terlihat korelasi yang erat antara sistem pengobatan Ilahi dengan sistem pengobatan manusia. Karena Allah telah menegaskan : *" Telah diciptakan bagi kalian semua segala apa yang ada dimuka bumi ini "*. Untuk itu mari kita tidak boleh mengabaikan tentang kepercayaan/keyakinan terhadap metode pengobatan Ilahiyah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah saw, sebagai metode terbaik yang mujarab untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, hingga penyakit yang sulit disembuhkan oleh Medis sekalipun (Nursyifa', 2009).

Soal penyakit sesungguhnya bukanlah sesuatu yang luar biasa, karena setiap orang pasti ada penyakitnya termasuk para dokter dan paramedis. Adalah suatu pembohongan jika ada seseorang yang mengaku tidak mengidap suatu penyakit, karena penyakit itu sengaja diciptakan Allah swt., sesuai dengan firmanNya Q.S al-Baqarah (2) : 10 sebagai berikut :

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya :

Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. (QS. Al-Baqarah : 10).

Manusia yang memiliki kewajiban untuk berupaya mencari atau melakukan pengobatan, karena obat setiap penyakit pasti ada. Kalaupun ada penyakit yang belum ada obatnya, itu tidak lain karena ilmu manusia yang bergerak di bidang itu masih terbatas. Makanya, agar setiap hamba diperintahkan oleh Allah swt. agar belajar dan belajar terus. Dan hal ini sekaligus sebagai bukti kebesaran Allah swt., bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan manusia itu adalah sangat-sangat sedikit jika dibanding ilmu yang dimiliki Allah swt.

Soal penyakit adalah salah satu bentuk dinamika kehidupan yang diciptakan Allah swt. Ketika seseorang jatuh sakit, sesuatu yang amat didambakan adalah nikmatnya kesehatan. Untuk ini, ada proses berikutnya, yaitu perintah untuk berobat. Obat penawar setiap penyakit sudah disediakan Allah swt. Dan inilah tugas para ilmuwan (dokter, paramedis dan farmasis) untuk meneliti, melakukan diagnosa dan merancang formula obat yang sesuai dengan kondisi dan penyakit pasien.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
 بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika seseorang terjangkit suatu penyakit Allah memerintahkan untuk tidak tinggal diam merenungi penyakit yang dideritanya, lebih dari itu Allah memerintahkan untuk bergerak mencari obat atau solusi dari penyakit yang dideritanya. Allah tidak akan merubah nasib maksudnya disini bahwa sebelum kita tinggal diam dan pasrah menunggu ketentuan dari Allah sebaiknya kita berusaha terlebih dahulu mencari pengobatan dari penyakit yang diderita dan setelah itu kita berdo'a memohon kesembuhan dari Allah. Ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir r.a bahwa Rasulullah saw bersabda:

Artinya :

Dari Jabir dari Rasulullah Saw. bersabda: Setiap penyakit ada obatnya, maka apabila didapati obat yang cocok untuk menyembuhkan sesuatu penyakit itu akan hilang dengan seizin Allah 'Azza wajallah (H.R. Muslim).

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah bersabda:

Artinya:

Dari Abu Hurairah Ra. dari Nabi Saw. bersabda; Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia Juga menurunkan obatnya. (H.R. Al-Bukhari).

Hadits tersebut menjelaskan bahwa disisi lain Allah swt menurunkan penyakit dan diapun menurunkan penawar dari penyakit tersebut. Setiap penyakit itu ada obatnya, akan tetapi kita tetap dianjurkan untuk terus berusaha dan setelah berusaha hasilnya kita serahkan pada Allah swt.

C. Islam dan Kesehatan

Ajaran islam diturunkan ke muka bumi untuk mengatur kehidupan dunia dan akhirat, mengatur hubungan manusia dengan penciptanya (Allah swt) serta hubungan manusia dengan alam sekitarnya, oleh sebab itu dapat ditegaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang paling sempurna syariatnya. Islam mengatur profesi kedokteran, pengobatan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan sebagainya. Sebagaimana dalam surah Al-Mudatsir yang menegaskan perintah Tuhan untuk membersihkan diri.

فَطَهِّرْ وَثِيَابَكَ ﴿٤﴾

Terjemahnya:

Dan pakaianmu bersihkanlah (Q.S. Al-Mudatsir:4).

Maksud dari ayat di atas adalah Allah swt menganjurkan kita untuk selalu menjaga kebersihan karena kebersihan sangat dekat dengan yang namanya kesehatan. Selain itu kesehatan sangatlah penting untuk dijaga. Memelihara kesehatan dan membudayakan hidup sehat berarti melaksanakan sebagian dari syariat Islam.

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا
وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu (Q.S. Al-Baqarah: 168).

Ayat tersebut menganjurkan kita untuk makan makanan yang baik lagi halal agar terhindar dari kemudharatan dan agar kita tidak termasuk

orang-orang yang mengikuti langkah syaithan. Makanan yang baik maksudnya makanan yang bergizi dan sehat.

D. Ciptaan Allah dan Manfaatnya

Betapa bernilainya akal adalah hal yang tak dapt dipungkiri oleh siapapun. Dan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan akal yang diberikan kepada kita. Salah satu penggunaan akal yang utama adalah memikirkan dan merenungi ayat-ayat Allah swt.

Allah berfirman dalam Q.S Ali Imran : 191 sebagai berikut:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ

Artinya:

.....” Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.

Berdasarkan ayat di atas Allah swt memberitahukan bahwa apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia, semuanya memberikan manfaat bagi kaum yang berfikir. Adalah celaka bagi orang-orang yang tidak menggunakan akalnya untuk berfikir karena segala sesuatu yang Allah ciptakan di bumi ini member manfaat, hanya saja ada yang mengetahui dan ada yang tak mengetahui. Dan kewajiban bagi orang-orang berilmu untuk member penjelasan kepada masyarakat awam.

Seperti yang terdapat dalam Q.S An-Nahl/16 : 11, yang berbunyi:

يُنَبِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ
وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.

Dari ayat di atas jelaslah Allah swt telah menyiapkan tanaman dan beraneka ciptaan-Nya untuk kita manusia dan mengembangkannya bagi orang-orang yang berilmu hingga dapat diambil manfaatnya seperti dalam ilmu pengobatan yang berasal dari alam, baik itu berasal dari tumbuhan maupun yang berasal dari hewan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Alat dan Bahan*

1. Alat-alat

Alat-alat gelas, Alat uji kekerasan tablet (Stokes Monsanto), blender (National), *dissolution tester* (Umron E5CS), jangka sorong (Tricle Brant), mesin cetak tablet (Korch), Oven (Mommert), *stopwatch* (Nokia), spektrofotometer UV-VIS (JENWAY 6505), timbangan gram, pengayak mesh 100, timbangan analitik (Precissa XB 220A).

2. Bahan-bahan

Asiklovir (buatan China yang merupakan pemberian dari PT kimia farma plant Jakarta), Nata kelapa, Asam klorida (HCl 0,1 N), Magnesium stearat, Natrium bikarbonat, Polivinil pirolidon (PVP) dan Talk.

B. *Prosedur Kerja*

1. Pembuatan matriks selulosa dari nata

Nata kelapa sebanyak 5 kg ditimbang, dicuci hingga pH netral, kemudian dihaluskan menggunakan blender, diperas kemudian dikeringkan menggunakan oven pada suhu 60⁰C selama 24 jam. Hasil pengeringan kemudian dihaluskan kembali menggunakan blender dan

diayak dengan menggunakan ayakan mesh 60, sehingga diperoleh selulosa dari nata kelapa.

2. Pembuatan sediaan tablet mengambang Asiklovir

a. Perhitungan dosis Asiklovir

Tablet mengambang Asiklovir yang akan dibuat ditujukan untuk pemakaian dua kali sehari. Bila diharapkan pelepasan Asiklovir dari tablet mengambang mengikuti orde nol maka harga konstanta kecepatan pelepasan orde nol (Kr_0) dihitung dengan rumus :

$$Kr_0 = \text{kecepatan adsorpsi} = \text{kecepatan eliminasi} = k_e \cdot C_d \cdot V_d$$

$$Kr_0 = k_e \cdot C_d \cdot V_d$$

$$\text{Dosis tablet mengambang} = Kr_0 \cdot t / F$$

Data – data farmakokinetik Asiklovir adalah sebagai berikut :

Waktu paruh eliminasi ($t_{1/2}$) = 2,9 jam, konsentrasi dalam darah pada keadaan tunak (C_d) = 0,55 mg/ml, volume distribusi (V_d) = 49,1 liter, Kr_0 = 6,454, ketersediaan hayati Asiklovir (F) = 20 %.

Dosis atau jumlah Asiklovir yang harus tersedia dalam setiap satuan tablet mengambang adalah:

$Kr_0 \cdot t / F = 6,454 \text{ mg / jam} \times 12 \text{ jam} / 20 \% = 387,24 \text{ mg}$ (dibulatkan menjadi 400 mg). Jadi setiap tablet mengambang yang dibuat

mengandung 400 mg Asiklovir, dan pemakaian tablet mengambang ini adalah dua kali sehari (setiap 12 jam).

b. Rancangan formula

Tablet mengambang Asiklovir dibuat dalam dua formula dimana pada formula I dilakukan dengan pencampuran fisik selulosa dan bahan obat sedangkan formula II bahan obat terlebih dahulu dilakukan penjerapan ke dalam sel selulosa selanjutnya dibuat granul.

Tabel 1. Komposisi tablet mengambang Asiklovir

Nama Bahan	Khasiat/penggunaan	Konsentrasi
Asiklovir	Zat Aktif	400 mg
Natium Bikarbonat	Penghancur	5%
PVP	Pengikat	2%
Magnesium Stearat	Pelincir	0,5%
Talk	Pelicin	1%
Selulosa Nata	Matriks	200 mg

c. Granulasi

Pembuatan tablet mengambang Asiklovir dilakukan dengan metode granulasi basah dengan penggunaan pengikat PVP 2 % dalam alkohol 70 % dengan cara disemprot sampai terbentuk massa granul yang memenuhi syarat. Massa granul selanjutnya diayak dengan pengayak granul nomor 14 dan dikeringkan dalam lemari pengering pada suhu 50°C selama 30 menit. Granul kering selanjutnya diayak

dengan pangayak no.16, ditambahkan natrium bikarbonat, magnesium stearat dan talk dan dicampur secara manual, selanjutnya dilakukan evaluasi granul dan massa siap dicetak dengan menggunakan alat pencetak tablet.

3. Evaluasi granul tablet

a. Uji kadar air dan susut pengeringan

Kandungan lembab dinyatakan sebagai “ Moisture Content” (MC) dimana ditentukan dengan cara ditimbang granul (W_0) dan granul yang telah dikeringkan hingga bobot tetap (W_1) yang dihitung menggunakan rumus :


$$\%MC = \frac{W_0 - W_1}{W_1} \times 100\%$$

Susut saat pengeringan dinyatakan sebagai “ Loss On Drying “, yaitu suatu pernyataan kadar kelembaban berdasarkan berat granul yang dihitung menggunakan rumus :

$$\%LOD = \frac{W_0 - W_1}{W_0} \times 100\%$$

b. Uji sudut diam

Granul yang telah ditimbang sebanyak 50 gram, dimasukkan dalam corong yang lubang bawahnya ditutup. Tutup bawah corong dibuka sehingga granul dapat mengalir ke meja yang telah dilapisi kertas grafik. Diukur tinggi (h) dan diameter (d) dasar timbangan granul yang terbentuk. Sudut diam dihitung dengan rumus:



Keterangan:

α : Sudut diam

h : tinggi timbunan granul

d : diameter timbunan granul

Nilai $\alpha \leq 30^\circ$ akan menghasilkan granul yang dapat mengalir bebas.

c. Uji kecepatan alir

Granul yang telah ditimbang sebanyak 50 gr, lalu dilakukan pengujian seperti pada pengujian sudut istirahat dengan waktu alir ditentukan dengan menggunakan “ stopwatch “ dihitung pada saat granul mulai mengalir hingga granul berhenti mengalir.

Kecepatan alir dihitung dengan rumus :

$$\text{Kecepatan alir} = \frac{\text{Bobot granul (gr)}}{\text{Waktu alir (detik)}}$$

d. Penetapan bobot jenis

1. Bobot jenis nyata

Beberapa bagian massa cetak ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml. Volume awal granul dicetak. BJ nyata adalah berat granul (m) dibagi dengan volume awal granul (V_o)

$$\text{Bj nyata} = \frac{m}{V_o}$$

2. Bobot jenis mampat

Sebanyak 25 gram granul (m) dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml dan dicatat volumenya (V_m). Kemudian dilakukan pengetukan dengan alat dan dicatat volume ketukan ke-10, ke-50, ke-100, dan ke 500 ,lalu dilakukan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Bobot jenis mampat} = \frac{m}{V_m}$$

3. Evaluasi tablet

a. Uji keseragaman bobot

Timbang 20 tablet, hitung bobot rata-rata tiap tablet. Jika ditimbang satu persatu, tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih besar dari harga yang ditetapkan dari kolom A. Dan tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya lebih dari harga yang ditetapkan kolom B.

Tabel 2. Penyimpangan Bobot Rata-rata Tablet

Bobot rata-rata	Penyimpangan bobot rata-rata dalam %	
	A	B
25 mg atau kurang	15%	30%
26 mg sampai dengan 150 mg	10%	20%
151 mg sampai dengan 300 mg	7,5%	15%
Lebih dari 300 mg	5%	10%

b. Uji keseragaman ukuran

Sebanyak 20 tablet dipilih secara acak, kemudian di ukur diameter dan tebalnya $1\frac{1}{3}$ menggunakan jangka sorong. Kecuali

dinyatakan lain, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari tebal tablet.

c. Uji kekerasan tablet

Diambil 10 tablet secara acak, diletakkan diantara plat alat penguji kekerasan satu persatu lalu tekanan diatur sedemikian rupa sehingga tablet stabil ditempatnya dan jarum menunjukkan skala 0. Tekanan lalu dinaikkan dengan memutar ulir pada alat hingga pecah. Satuan kekerasan yang dilakukan adalah kg. kekerasan tablet biasanya 4–8 kg/cm² (Parrot, 1971, 89).

4. Uji laju disolusi tablet mengembang

a. Pengujian sifat pengapungan

Pengujian sifat pengapungan ditentukan dengan menghitung waktu laten pengapungan dan lama pengapungan. Tablet dimasukkan ke dalam gelas kimia 50 ml yang berisi 50 ml larutan HCl 0,1 N, waktu yang diperlukan tablet dari mulai di masukkan ke dalam gelas kimia sampai dapat mengambang dipermukaan larutan dicatat sebagai waktu laten pengapungan, sedangkan waktu yang diperlukan tablet selama mengambang disebut lama pengambangan Uji lama pengapungan dilakukan bersamaan dengan uji disolusi *in vitro* (selama uji disolusi 12 jam tablet masih terapung atau sudah tenggelam).

5. Uji disolusi

a. Pembuatan larutan disolusi

Pembuatan cairan lambung buatan tanpa pepsin dilakukan dengan melarutkan 20 gram natrium klorida P dalam 70 ml asam klorida P dan air secukupnya hingga 1000,0 ml. pH larutan lebih kurang 1,2.

b. Pembuatan larutan baku Asiklovir

Sebanyak 100 mg Asiklovir ditimbang, kemudian dilarutkan dengan cairan lambung buatan hingga 100,0 ml, diperoleh konsentrasi sebesar 1000 ppm. Selanjutnya dibuat pengenceran hingga diperoleh, 4 ppm, 8 ppm, 10 ppm, 12 ppm, dan 20 ppm, kemudian diambil salah satu hasil pengenceran untuk ditentukan λ maksimumnya dengan spektrofotometri UV–VIS pada kisaran 200–400 nm.

c. Penentuan kurva baku

Nilai serapan dari masing–masing pengenceran diukur pada λ maksimumnya, kemudian dibuat persamaan kurvanya, dengan membuat persamaan garis lurus antara konsentrasi (x) dan serapan (y).

d. Pengujian disolusi *in vitro* dalam larutan HCl 0,1 N

Pengujian disolusi *in vitro* tablet mengambang asiklovir dilakukan sesuai persyaratan yang ditetapkan untuk pengujian disolusi tablet Asiklovir yang tertera pada USP 28. Pengujian dilakukan dengan pengaduk dayung dengan putaran 50 rpm, menggunakan medium 900 ml larutan HCl 0,1 N bersuhu 37°C. pengujian dilakukan selama 12 jam dengan pengambilan sampel setiap jam sebanyak 10 ml, dan setiap selesai pengambilan sampel ditambahkan 10 ml medium ke dalam labu disolusi. Sampel yang sudah diambil disaring, diencerkan dengan medium disolusi dan diukur serapannya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang maksimum.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Matrik selulosa nata kelapa

Matriks Selulosa nata kelapa yang diperoleh dari hasil pengeringan 5 kg nata kelapa basah, diperoleh 57 gram serbuk selulosa kering atau 1,14 % b/b dari bobot nata basah.

2. Granul sediaan tablet mengambang Asiklovir

a. Penentuan Kadar air dan susut pengeringan

Tabel 3. Hasil analisis kadar air

Formula	Bobot granul (gr)	Bobot granul tetap (gr)	MC(%)
Penjerapan	42,7254	41,9458	1,8
Fisik	39,4367	39,2248	0,5

Tabel 4. Hasil analisis susut pengeringan

Formula	Bobot granul (gr)	Bobot granul tetap (gr)	LOD(%)
Penjerapan	42,7254	41,9458	1,8
Fisik	39,4367	39,2248	0,5

b. Penentuan Sudut Istirahat

Tabel 5. Hasil analisis sudut istirahat

Formula	Tinggi (h) timbunan granul (mm)	Diameter (d) timbunan granul (mm)	Tan α	α°
Penjerapan	5,83	46	0,25	14°
Fisik	6,26	38	0,32	17,7°

c. Penentuan Kecepatan Alir

Tabel 6. Hasil analisis kecepatan alir

Formula	Bobot granul (gr)	Waktu alir (detik)	Kecepatan alir (g/detik)
Penjerapan	1,67	1,3	1,28
Fisik	1,30	1,5	0,86

d. Penentuan Bobot Jenis Mampat

Tabel 7. Hasil analisis bobot jenis mampat

Formula	Volume granul	Volume mampat	Bobot Jenis mampat
Penjerapan	10 ml	8,0 ml	2,84 mg/ml
Fisik	10 ml	8,6 ml	3,39 mg/ml

3. Tablet Mengambang Asiklovir

a. Evaluasi Tablet Asiklovir

Untuk evaluasi tablet mengambang Asiklovir meliputi, uji keseragaman bobot, uji keseragaman ukuran, uji kekerasan dan uji

pengapungan tablet. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tablet berikut:

Tabel 8. Hasil evaluasi tablet

Parameter	Hasil	
	Penjerapan	Fisik
Bobot rata-rata (mg)	402,5	320,1
Tebal rata-rata (cm)	0,38	0,44
Diameter rata-rata (cm)	1,31	1,31
Kekerasan tablet (kg/cm²)	4	4,2
Waktu laten pengembangan (detik)	54	4

b. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum

Pada penentuan panjang gelombang maksimum larutan Asiklovir dalam cairan lambung buatan pH 1,2 diperoleh nilai serapan maksimumnya pada panjang gelombang 295 nm.

c. Pembuatan Kurva Baku Asiklovir

Pada pembuatan kurva baku larutan Asiklovir dalam cairan lambung buatan pH 1,2 diperoleh persamaan garis lurus $Y = 0,0522x + 0,1129$ dengan koefisien regresi (R^2) = 0,9791.

d. Uji Disolusi

Hasil uji disolusi dari tablet Asiklovir dengan cara penjerapan dan cara fisik dapat dilihat pada tabel :

Tabel 9. Hasil uji disolusi

Waktu	Asiklovir yang terdisolusi (%)	
	Formula I	Formula II
15	59,66	75,67
30	78,57	80,76
60	79,80	82,74
120	80,91	83,60
180	81,49	83,65
240	82,06	86,39
300	84,75	86,77
360	85,14	87,21
420	85,28	87,98
480	88,17	89,51

Tabel 10. Data perbandingan formula formula I dan formula II

	Profil Orde Nol	Campuran fisik	Penjerapan
% Asiklovir terdisolusi dalam 8 jam	64,54	89,51	88,17
Fitting ke orde nol			
Faktor kemiripan (f2)	-	9,44	13,55
$Y = A + BX$			
A	0,00	81,17	78,269
B	8,067	1,0448	1,453
r	1000	0,974	0,9794
R^2	-	0,9502	0,9592

B. Pembahasan

Pada penelitian ini dibuat tablet mengambang Asiklovir dengan menggunakan dua formula yaitu metode penjerapan dan campuran fisik, dimana matriks yang digunakan adalah matriks selulosa dari nata kelapa. Formula ini dirancang dengan harapan sediaan tablet dapat mengambang pada lambung dengan bantuan matriks selulosa yang sifatnya sangat ringan dan juga dengan *system effervescen* dengan bantuan natrium bikarbonat yang terdapat dalam formula tersebut. Natrium bikarbonat dalam sediaan ketika kontak cairan lambung akan bereaksi dengan HCL membentuk gas karbodioksida dan pada akhirnya melepaskan gas CO₂. Gas inilah yang membantu pengambangan tablet berdasarkan reaksi sebagai berikut:



Gas ini sebagian keluar dari permukaan tablet dan sebagian lagi terjepit di dalam matriks yang menyebabkan tablet tersebut dapat mengambang pada cairan lambung.

Selulosa yang diperoleh dari hasil pengeringan nata kelapa diformulasikan dalam sediaan tablet, dimana selulosa nata tersebut digunakan sebagai matriks. Matriks adalah zat pembawa padat yang didalamnya obat tersuspensi secara merata, zat pembawa ini umumnya memperpanjang laju pelepasan obat. Obat berada dalam persen yang lebih kecil dari matriks, sehingga matriks dapat memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap air dan akan berdifusi keluar secara lambat. Matriks selulosa nata ini termasuk golongan matriks yang tidak dapat dicerna

karena selulosa nata dalam bentuk serat dan sifatnya dapat menyerap air sehingga mengambang pada cairan lambung.

Pada penelitian ini dibuat dua formula Asiklovir, dimana formula campuran fisik merupakan granul hasil campuran fisik dari asiklovir dan selulosa nata dan digranulasi basah menggunakan PVP 2% hingga terbentuk granulat. Sedangkan untuk formula penjerapan dilakukan penjerapan Asiklovir ke dalam sel nata kelapa dengan bantuan polysorbat 80, dengan cara bahan obat dilarutkan dengan pelarut yang sesuai agar obat dapat larut dengan sempurna dan memudahkan obat masuk ke dalam sel selulosa.

Hasil evaluasi granul tablet mengambang Asiklovir dapat dilihat pada tabel 3 dan 4, dimana susut pengeringan untuk formula I dengan campuran fisik diperoleh 0,54 %, dan untuk formula II dengan penjerapan diperoleh 1,82 % dalam hal ini susut pengeringan dinyatakan dengan *Lost On Drying* (LOD). Sedangkan untuk uji kadar air dalam granul, persentase yang didapatkan untuk Formula I dengan campuran fisik 0,54 % dan formula penjerapan 1,85 % dimana kadar air untuk suatu granul dinyatakan dalam *Moisture Content* (MC) dengan persyaratan 0,53 sampai 0,7% pada granul *effervescent*. Dari kedua formula hanya formula campuran fisik yang memenuhi persyaratan, kadar air granul sangat mempengaruhi daya alir dari suatu massa granul, dimana setiap partikel mempunyai daya lekat sehingga dengan daya alir yang baik maka pada

saat pencetakan, pengisian ruang cetak dapat berlangsung secara kontinyu dan homogen untuk menghasilkan tablet yang seragam.

Hasil evaluasi untuk nilai sudut istirahat masing-masing formula dapat dilihat pada tabel 5. Nilai sudut istirahat untuk formula campuran fisik dan Nilai sudut istirahat untuk formula penjerapan berturut-turut adalah 17,7 dan 14. Dimana persyaratan untuk uji sudut istirahat adalah granul yang dihasilkan akan dapat mengalir bebas apabila nilai sudut istirahatnya (α) kurang dari 30° sehingga akan dihasilkan granul yang dapat mengalir bebas, karena sudut istirahat mempengaruhi daya alir granul. Dari hasil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kedua formula tersebut memenuhi persyaratan. Sedangkan untuk laju alir untuk masing-masing formula penjerapan dan formula fisik adalah 1,23 g/detik, 0,86 g/detik. Indeks kompresibilitas masing-masing formula campuran fisik dan formula dengan penjerapan adalah 14 % dan 20 %. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa massa kedua formula tersebut memenuhi persyaratan kompresibilitas yang baik untuk dikempa karena tidak melebihi 20 % dari persyaratan yang ditentukan.

Evaluasi untuk tablet yang telah dikempa meliputi parameter untuk bobot rata-rata tablet, kekerasan tablet dan uji sifat laten pengembangan. Pada uji kekerasan tablet diperoleh kekerasan masing-masing tablet untuk formula dengan penjerapan dan formula campuran fisik berturut-turut 4,2 kg/cm² dan 4 kg/cm². Kekerasan tablet yang diperoleh memenuhi syarat yaitu kekerasan tablet yang ditetapkan 4-8 kg/cm².

Dari hasil evaluasi tablet diperoleh bobot rata-rata tablet dari kedua formula yaitu untuk Formula dengan penjerapan bobot rata-ratanya 399,35 dan formula campuran fisik bobot rata-ratanya 303,65 mg, dimana masing-masing formula tidak satupun yang menyimpang dari persyaratan bobot tablet yang ditetapkan yaitu tidak boleh lebih dari dua tablet yang bobotnya menyimpang dari 5% dan tidak satupun yang bobotnya menyimpang 10% dari bobot rata-rata. Hasil penyimpangan dapat dilihat pada tabel 10. Bobot rata-rata yang diperoleh pada penelitian ini tidak sesuai bobot untuk formula yang dirancang, hanya diperoleh seperdua dari bobot awal, ini disebabkan karena matriks selulosa nata mempunyai berat jenis kecil sehingga pada pencetakan ruang pengisian granul hanya mengisi seperdua dari bobot formula yang dirancang. Sedangkan untuk tebal rata-rata masing-masing tablet campuran fisik dan dengan penjerapan berturut-turut adalah 0,38 dan 0,44 cm dengan diameter 1,31 cm.

Untuk waktu laten pengambangan dapat dilakukan bersamaan dengan uji disolusi, dimana waktu yang diperlukan tablet dari mulai di masukkan ke dalam gelas kimia sampai dapat mengambang dipermukaan larutan dicatat sebagai waktu laten pengambangan. Waktu laten pengambangan untuk masing-masing formula campuran fisik dan formula penjerapan adalah 4 dan 54 detik. Dari hasil tersebut terdapat perbedaan yang sangat jauh antara formula fisik dan penjerapan, ini disebabkan karena formula fisik tidak terisi dengan obat, sehingga ruang

kosong di dalam matriks membuat bobotnya ringan karena berisi udara, sehingga waktu laten pengembangannya lebih singkat.

Selanjutnya dilakukan uji disolusi untuk mengetahui pelepasan zat aktif dari matriks untuk setiap jam dengan menggunakan medium cairan lambung buatan tanpa pepsin pH 1,2. Pengujian dilakukan selama 8 jam dan disetiap waktu dilakukan pengambilan sampel, kemudian diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum. Pengukuran yang dilakukan untuk panjang gelombang maksimum bertujuan untuk memperoleh kepekaan analisis yang optimal. Karena perubahan absorpsi untuk setiap satuan konsentrasi paling besar terletak pada panjang gelombang maksimum. Pada pengukuran serapan maksimum Asiklovir baku tercapai pada panjang gelombang 295 nm dengan medium cairan lambung buatan tanpa pepsin pH 1,2. Peristiwa pelepasan obat dari polimer dapat terjadi melalui tiga mekanisme yaitu difusi, degradasi, dan pengembangan (*swelling*). Pada penelitian ini pelepasan obat terjadi secara difusi karena menggunakan matriks yang tidak dapat dicerna. Difusi terjadi ketika sebuah obat atau zat aktif mengalir melalui pori-pori yang terdapat pada matriks polimer, ukuran pori dalam matriks polimer yang seragam serta ketebalan matriks yang tidak berubah menyebabkan proses pelepasan obat berjalan konstan sesuai periode waktu tertentu.

Hasil uji disolusi *in vitro* menunjukkan bahwa pelepasan Asiklovir dari sediaan tablet mengembang untuk formula dengan penjerapan, pelepasannya lebih lambat dibandingkan dengan pelepasan Asiklovir pada

sediaan formula campuran fisik, hal ini disebabkan karena formula dengan penjerapan terlebih dahulu dilakukan penjerapan ke dalam sel matriks sehingga obat terperangkap di dalam sel dan menghambat pelepasan zat aktif dan matriks mengambang pada cairan lambung, yang mengakibatkan penetrasi cairan untuk berdifusi lebih lambat.

Formula terbaik yang diharapkan pada penelitian ini formula yang memenuhi kriteria melepaskan obat secara bertahap seiring berjalannya waktu, menunjukkan profil disolusi yang lebih linear yang ditunjukkan dengan harga koefisien korelasi (R^2) yang paling tinggi antara Asiklovir yang terdisolusi dalam (%) dengan waktu, dapat melepaskan sekitar 96% Asiklovir dalam 12 jam dan pelepasan obat yang mengikuti orde nol dan formula yang memberikan harga faktor kemiripan >50 yang maksimal. Dari hasil penelitian diperoleh harga koefisien korelasi (R^2) untuk formula penjerapan 0,959 dan formula campuran fisik 0,950, dimana yang lebih mendekati orde nol adalah formula dengan penjerapan, hasil ini dapat dilihat pada tabel 16. Pada jam ke 8 Asiklovir melepaskan obat sebanyak 88,17% untuk penjerapan dan 89,51% untuk fisik sehingga kedua obat ini memenuhi kriteria, Akan tetapi tingginya kadar terdisolusi di menit pertama disebabkan tidak dilakukannya pencucian matriks hasil penjerapan larutan obat sehingga diluar matrik masih terdapat obat yang tidak terjerap sehingga obat inilah yang ikut terdisolusi di menit pertama. Untuk faktor kemiripan kedua formula mempunyai faktor kemiripan dibawah 50 yaitu untuk formula campuran fisik 9,44 dan

formula dengan penjerapan 13,55 sehingga kedua formula tersebut tidak memenuhi kriteria.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Matriks selulosa nata kelapa kurang efektif digunakan sebagai matrik pada sediaan tablet mengambang Asiklovir.
2. Harga koefisien korelasi (R^2) untuk formula dengan penjerapan 0,959 dan formula campuran fisik 0,950 dan faktor kemiripan dari kedua formula < 50 sehingga tidak mengikuti kinetika orde nol.
3. Dari kedua formula, formula dengan penjerapan lebih mendekati kinetika orde nol.

B. Saran

Dapat dibuat formula tablet dengan dosis yang lebih kecil menggunakan matriks selulosa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansel, Howard C. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi* edisi IV, Jakarta: Penerbit UI Press, 1989
- Atih, S.H. 1979. "*Pengolahan Air Kelapa*", *Buletin Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia*, Bogor: Balai Penelitian Kimia Bogor, 1979
- Arora s., Ali j, Ahuja RK, Baboota S. *Floating Drug Delivery System*, AAPS PharmSciTech: A Review, 2005
- Chawla, G, Gupta, P, koradadadia, V, Bansal S, A. K, Gastroretantion: A Means to Address Regional Variability in Intestinal Drug Absorption, *pharmaceutical Technology*, <http://www.pharmtech.com>, 2003
- Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. *Farmakope Indonesia* edisi IV, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1995
- Dimagulla, L.A. . *Nata de coco 2. Chemical Nature and Properties of Nata*. Philippine Agriculture, 1967
- Ganiswarna, Sulistia G. *Farmakologi dan Terapi* edisi 4, Jakarta: Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1995
- Gennaro, Alfonso R., et al. *Remington's Pharmaceutical Science* 18th edition, Pennsylvania: Mack Publishing Company, 1990
- Gunawan Didit. *Ilmu Obat Alam (farmakognosi)* jilid 1, Jakarta: 2004
- Herman , Kurnia A dkk. *Dampak Nata De Coco dalam Ransum Mencit (Mus musculus) terhadap Metabolisme lemak dan Penyerapan Mineral*: http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2009/09/dampak_nata_de_coco_dalam_ransum_mencit.pdf
- Irawan M.B, *Terapi pengobatan dan do*. <http://www.potretnews.com> 2 januari 2010
- Kibbe Artur H, *Handbook Of Pharmaceutical Exipient*, USA: America Pharmaceutikal Assyiaton and Pharmaceutikal Press, 2000

- Kasule, O.H, *Epistemologi Islam dan Intergrasi Ilmu Pengetahuan*.:http://pustaka.universitasislam.tripod.com/januari2009/pengobatan_ala_nabi
- Gohel, M. C, Mehta, P.R, Dave, R.K., Bariya, N. H., a More Relevant Dissolution Method For Evaluation of Floating Drug Delivery System, *Dissolution Technologies*, Vol 11, Issue 4,22 – 26, 2004
- Lachman, Leon dkk. *Teori dan Praktek Farmasi Industri* Edisi 2, Jakarta: UI Press,1994
- Mycek, Mary J dkk, *Farmakologi Ulasan Bergambar* Edisi 2, Jakarta: Widya Medika, 2002
- Marwati, *Formulasi dan Evaluasi in vitro Tablet Mengapung Acyclovir*, Kelompok keahlian Farmasetik, Bandung: ITB, 2007
- Ngastiyah. *Perawatan Anak Sakit* Edisi 2, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2005
- Nursyifa, *berdasarkan Al-quran dan assunnah* <http://www.nursyifa.com>. 23 maret 2010.
- Robinson, J. R., Eriken, S. p., *Theoretical Formulation of Sustained Release Dosege Forms*. J.Pharm. Sci, Vol. 55, No. 11, 1254 – 1263, 1966
- Sharger, dkk. *Biofarmasetik dan Farmakokinetik Terapan*, Surabaya : Airlangga University Press, 2005
- Serajuddin ATM. *Solid Dispersion Of Poorly Water-Soluble Drugs: Early Promises, Subsequent Problems, And Recent Breakthroughs*, Journal of Pharmaceutical Science, 1999
- Saifullah, S.T.N, dkk. *Profil pelepasan propranolol HCL dari tablet lepas lambat dengan system floating menggunakan matriks methocel K15M*: Majalah Farmasi Indonesia,18(1), 48 – 55, 2007
- Tjay, Tan H., dan Raharja K. *Obat-obat Penting, Khasiat, Penggunaan dan Efek-efek Sampingnya* edisi IV, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1986


Yanuar, Arry, Iman santoso, dan Iskandarsyah. Jurnal: *Pemanfaatan Nata de Coco Sebagai Sumber Alternatif Mikrokrystal Selulosa Untuk Bahan Pembantu Pembuatan Tablet*, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia:2003

Voigt, Rudolf, *Buku Pelajaran Tehnologi Farmasi*, Jakarta: Gadjah Mada University Press, 1995




Lampiran I. Skema Kerja

1. Skema Kerja Pembuatan Matriks



2. Skema Kerja Pembuatan sediaan



Lampiran 2. Perhitungan

1. Uji kadar air dan susut pengeringan

a. Uji kadar air

Rumus :

1. Granul dengan penjerapan

= 1,8585 %

2. Granul fisik

= 0,5402 %

b. Uji susut pengeringan

Rumus :

1. Granul dengan penjerapan

$$= 1,8246 \%$$

2. Granul fisik

$$= 0,5375\%$$



c. Uji sudut istirahat

Rumus :

$$\tan \alpha = \frac{h}{r}$$

1. Granul dengan penjerapan

2. Granul fisik

d. Uji kecepatan alir

Rumus :

Kecepatan alir =

1. Granul dengan penjerapan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

2. Granul fisik

e. Uji bobot jenis mampat

Rumus :

1. Granul dengan penjerapan


2. Granul fisik



2. Pengenceran Larutan Baku

Larutan baku Asiklovir 1000 bpj diencerkan sampai diperoleh konsentrasi 4, 8, 10, 12, dan 20 bpj menggunakan cairan lambung buatan tanpa pepsin (HCl 0.1N).

1. Konsentrasi 8 dan 20 bpj



2. Konsentrasi 10, 12 dan 20 bpj



Lampiran 3. Tabel data hasil penelitian

Tabel 11. Persentase penyimpangan bobot rata-rata tablet

Tabel	Formula I (Penjerapan)			Formula II (Fisik)		
	Bobot (mg)	Penyimpangan		Bobot (mg)	Penyimpangan	
		394,35-404,35 (5%)	389,35-409,35 (10%)		298,65-308,65 (5%)	293,65-313,65 (10%)
1	397	+	+	304	+	+
2	397	+	+	308	+	+
3	404	+	+	300	+	+
4	403	+	+	300	+	+
5	400	+	+	304	+	+
6	401	+	+	306	+	+
7	395	+	+	304	+	+
8	397	+	+	305	+	+
9	398	+	+	300	+	+
10	401	+	+	306	+	+
11	404	+	+	303	+	+
12	398	+	+	303	+	+
13	404	+	+	300	+	+
14	400	+	+	299	+	+
15	400	+	+	305	+	+
16	404	+	+	306	+	+
17	400	+	+	301	+	+
18	396	+	+	308	+	+
19	395	+	+	305	+	+
20	395	+	+	306	+	+
Σ		399,35			303,65	

Keterangan:

+ : tablet yang tidak menyimpang


_ : tablet yang menyimpang

Hasil penetapan kurva baku Asiklovir

Tabel. 12. Data pengukuran kurva baku Asiklovir

Konsentrasi (ppm)	Å
4	0.29
8	0.501
10	0.676
12	0.797
20	1.121

Gambar. 2. Kurva baku Asiklovir




Tabel 13. Nilai serapan hasil disolusi tablet mengambang Asiklovir


Waktu (menit)	Perlakuan	Nilai serapan	
		Penjerapan	Campuran fisik
15	1	0,756	0,874
	2	0,709	0,924
Rata-rata		0,732	0,889
30	1	0,902	0,979
	2	0,971	0,925
Rata-rata		0,936	0,952
60	1	0,906	0,109
	2	0,978	0,926
Rata-rata		0,942	0,517
120	1	0,915	0,103
	2	0,992	0,933
Rata-rata		0,953	0,517
180	1	0,922	1,031
	2	0,099	0,932
Rata-rata		0,510	0,981
240	1	0,93	1,009
	2	1,001	0,98
Rata-rata		0,965	0,994
300	1	0,983	1,009
	2	1,004	0,98
Rata-rata		0,993	0,994
360	1	0,99	1,05
	2	1,005	0,980
Rata-rata		0,997	1,015
420	1	0,991	1,052
	2	1,007	1,022
Rata-rata		0,999	1,037
480	1	1,023	1,055
	2	1,035	1,031
Rata-rata		1,029	1,043

Tabel 14. Hasil perhitungan persentase terdisolusi tiap satuan waktu


Waktu (menit)	Perlakuan	Persen (%) terdisolusi	
		Penjerapan	Campuran fisik
15	1	61,923	73,269
	2	57,403	78,076
Rata-rata		59,663	75,674
30	1	74,557	83,365
	2	82,595	78,173
Rata-rata		78,576	80,769
60	1	76,346	87,211
	2	83,769	78,269
Rata-rata		78,807	82,74
120	1	77,211	88,269
	2	84,615	78,942
Rata-rata		80,913	83,605
180	1	77,884	88,365
	2	85,096	78,942
Rata-rata		81,49	83,653
240	1	78,653	88,846
	2	85,480	83,942
Rata-rata		82,066	86,392
300	1	83,75	90,096
	2	85,769	83,461
Rata-rata		84,759	86,778
360	1	84,423	90,192
	2	85,865	84,230
Rata-rata		85,144	87,211
420	1	84,519	90,394
	2	86,056	85,576
Rata-rata		85,287	87,98
480	1	87,596	90,673
	2	88,75	88,65
Rata-rata		88,174	89,519




Gambar 3. Profil disolusi formula dengan penjerapan




Gambar 4. Profil disolusi formula campuran fisik



Gambar 5. Profil disolusi formula I dan formula II



Gambar 6. Profil disolusi Asiklovir orde nol



Gambar 7. Profil disolusi formula penjerapan, formula campuran fisik dan Asiklovir orde nol

Lampiran 4. Contoh perhitungan

Tabel 15. jumlah Asiklovir yang terdisolusi (data diperoleh dari formula FI replikasi pertama)

T (menit)	Serapan	Konsentrasi (bpj)	Konsentrasi dalam ml (mg)	Konsentrasi dalam 10ml (mg)	Konsentrasi dalam 900ml (mg)	Koreksi	Konsentrasi dalam 900ml (mg)
15	0.756	12.38	0.012385	0.123846	11.14615	1.24	61.92
30	0.902	15.19	0.015192	0.151923	13.67308	1.52	74.56
60	0.906	15.27	0.015269	0.152692	13.74231	1.53	76.35
120	0.915	15.44	0.015442	0.154423	13.89808	1.54	77.21
180	0.922	15.58	0.015577	0.155769	14.01923	1.56	77.88
240	0.93	15.73	0.015731	0.157308	14.15769	1.57	78.65
300	0.983	16.75	0.01675	0.1675	15.075	1.675	83.75
360	0.99	16.88	0.016885	0.168846	15.19615	1.69	84.42
420	0.991	16.90	0.016904	0.169038	15.21346	1.69	84.52
480	1.023	17.52	0.017519	0.175192	15.76731	1.75	87.59

Keterangan:

Persamaan garis regresi untuk kurva baku

$$Y = 0,052x + 0,112$$

Dengan koefisien relasi (r) = 0,979

Dimana x adalah konsentrasi

y adalah serapan

Sehingga:

$$x = \text{———}$$

Tabel 16. Pengujian faktor kemiripan Kadar disolusi Asiklovir formula penjerapan terhadap kadar disolusi orde nol menurut USP 30

Waktu (jam)	kadar dis. Orde nol (R)	kadar dis. F. penjerapan (T)	(R-T) ²
0.25	2,01675%	56,663%	3323,09
0.5	4,0335%	78,576%	5556,584
1	8,067%	79,807%	5146,628
2	16,134%	80,913%	4196,319
3	24,201%	81,49%	3282,03
4	32,268%	82,066%	2479,841
5	40,335%	84,759%	1973,492
6	48,402%	85,144%	1349,975
7	56,469%	85,287%	830,4771
8	64,536%	88,173%	558,7078
	Σ		28697,16

Perhitungan faktor kemiripan kadar disolusi formula penjerapan terhadap kinetika orde nol.

$$f_2 = 50 \times \log \left\{ \left[1 + \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (R_t - T_t)^2 \right]^{-0.5} \times 100 \right\}$$

$$f_2 = 50 \times \log \left\{ \left[1 + \frac{1}{10} \times (28697.16)^2 \right]^{-0.5} \times 100 \right\}$$

$$f_2 = 50 \times \log \{ 0.271005 \times 100 \}$$

$$f_2 = 50 \times \log 1.86$$

$$f_2 = 13.55$$

Tabel 17. Pengujian faktor kemiripan Kadar disolusi Asiklovir formula campuran fisik terhadap kadar disolusi orde nol menurut USP 30

waktu (jam)	kadar dis. Orde nol (R)	kadar dis. F. camp. fisik (T)	(R-T) ²
0.25	2,01675%	75,674%	5425,39
0.5	4,0335%	80,769%	5888,337
1	8,067%	82,74%	5576,057
2	16,134%	83,605%	4552,336
3	24,201%	83,683%	3538,108
4	32,268%	86,392%	2929,407
5	40,335%	86,778%	2156,952
6	48,402%	87,211%	1506,138
7	56,469%	87,298%	992,94
8	64,536%	89,519%	624,15
Σ			33189,82

Perhitungan faktor kemiripan kadar disolusi formula campuran fisik terhadap kinetika orde nol.

$$f_2 = 50 \times \log \left\{ \left[1 + \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (R_t - T_t)^2 \right]^{-0.5} \times 100 \right\}$$

$$f_2 = 50 \times \log \left\{ \left[1 + \frac{1}{10} \times (33189.82)^2 \right]^{-0.5} \times 100 \right\}$$

$$f_2 = 50 \times \log \{ 0.3212 \times 100 \}$$

$$f_2 = 50 \times \log 1.5$$

$$f_2 = 9,44$$

Keterangan :

n = jumlah waktu pengujian


R_t = rata-rata kadar terdisolusi referensi tiap satuan waktu (%)

T_t = rata-rata kadar terdisolusi yang diuji tiap satuan waktu (%)

f₂ = faktor kemiripan.




Gambar 8. Asiklovir kering setelah penjerapan



Gambar 9. Asiklovir dengan campuran fisik



Gambar 10. Granul kering Asiklovir campuran fisik



Gambar 11. Granul kering Asiklovir dengan penyerapan



Gambar 12. Granul Asiklovir dengan metode penjerapan



Gambar 13. Granul Asiklovir dengan campuran fisik



Gambar 14. Tablet Asiklovir campuran fisik



Gambar 15. Tablet Asiklovir dengan penjerapan