

**HUBUNGAN POLA ASUHAN GIZI DENGAN STATUS GIZI BALITA
USIA 6-24 BULAN DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS TINGGIMONCONG
KAB. GOWA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :
HJ. NUR RAHMA DEWI
NIM. 70200106060

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2010**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Hubungan Pola Asuhan Gizi dengan Status Gizi balita Usia 6-24 Bulan di Wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa Tahun 2010” yang disusun oleh Nur Rahma Dewi, NIM: 70200106060, mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 16 September 2010 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, September

2010 M

Syawal 1431 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Drs. H. Stang, M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Ir. Agustian Ipa, M.Kes	(.....)
Penguji I	: dr. H. M. Furqaan Naiem, M. Sc., Ph.D	(.....)
Penguji II	: Drs. H. Syamsul Bahri, M. Si	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

dr. H. M. Furqaan Naiem, M. Sc., Ph. D
Nip. 19580404 198903 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, September 2010

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HJ. NUR RAHMA DEWI

Nim:70200106060

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada yang paling utama penulis panjatkan selain puja dan puji syukur kehadirat Allah Swt karena atas berkat, rahmat, dan segala karunia-Nya sehingga penulis masih diberi kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan suatu hasil karya berupa skripsi yang berjudul “*Hubungan Pola Asuhan Gizi dengan Status Gizi Balita Usia 6-24 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa tahun 2010*”.

Shalawat dan salam selalu turunkan kepada junjungan besar Sang Rahmatan lil Alamin Rasulullah saw beserta sahabat, dan setiap yang masih berada pada jalur siar Islam menuju masa kecerahannya seperti yang pernah dirasakan umat.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari berbagai pihak yang senantiasa menghiasi segala peluh yang harus diungkapkan. Atas terselesainya skripsi ini, maka izinkanlah penulis menghaturkan sembah sujud sedalam-dalamnya serta terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda H. Sewang (Alm) dan Ibunda Hj. Halikah Dg. Jintu yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, dorongan moril dan materi, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan tiada henti, yang hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya

Terselesaikannya penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Sehingga perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Drs. H. Stang, M.Kes. selaku Pembimbing I dan

Bapak Ir. Agustian Ipa, M.Kes. selaku Pembimbing II. Yang dengan keikhlasan, kesabaran dan ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis untuk hasil karya yang terbaik. Kepada Bapak dr. H. M. Furqaan Naiem, M. Sc., Ph. D selaku Penguji I dan Bapak Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si selaku Penguji II terima kasih atas saran, kritikan, arahan serta bimbingannya yang diberikan kepada penulis sehingga menghasilkan karya yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat.

Penulis juga merasa sangat pantas untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, MA, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak dr. H. M. Furqaan Naiem, M. Sc., Ph. D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu A. Susilawaty, S.Si, M.Kes selaku Ketua Jurusan Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Kesehatan Masyarakat yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis dari awal pendidikan hingga penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muh. Arifuddin, SKM selaku Kepala Puskesmas Tinggimoncong.
6. Teman-teman di Kesehatan Masyarakat khususnya jurusan Gizi yang selalu memberikan motivasi serta ide kepada penulis selama ini serta sahabat-sahabatku: Ika Auliani, Ariyanti Husain, Rasdiana, Firdhayani dan Miftahul Jannah.

7. Sahabat terbaikku *Backstreet*: Salmawati, Ika Auliani, Risnawati Anwas, Ferawati dan Wahida Irzad. Serta teman-teman SMAN I Tinggimoncong atas keceriaan dan dukungannya.
8. Seluruh keluarga dan sahabat yang kesemuanya tak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak ada artinya tanpa bantuan dan pengorbanan dari berbagai pihak, hanya doa yang penulis dapat panjatkan semoga amal ibadah serta niat yang ikhlas akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Amin.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari penyempunaan skripsi ini selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Makassar, September 2010



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
1. Tujuan Umum	5
2. Tujuan Khusus	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Status Gizi.....	6
B. Tinjauan tentang Gizi	11
C. Tinjauan tentang Pola Asuhan Gizi	18
BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Dasar Pemikiran Variabel yang diteliti.....	28
B. Bagan Kerangka Konsep.....	30
C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif	30
D. Hipotesis	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Populasi dan Sampel	33
D. Instrumen Penelitian	33
E. Metode Pengumpulan Data.....	34
F. Pengolahan dan Analisis Data	34
G. Pengujian Hipotesis	35

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	36
B. Pembahasan	42

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Implikasi	49

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur di Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa	36
Tabel 5.2	Distribusi Responden Menurut Pekerjaan di Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa	37
Tabel 5.3	Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin Balita Usia 6-24 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa	37
Tabel 5.4	Distribusi Responden Menurut Umur Balita Usia 6-24 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa.	38
Tabel 5.5	Distribusi Responden Menurut Status Gizi Balita Usia 6-24 Bulan Menurut BB/U di Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa	38
Tabel 5.6	Distribusi Responden Berdasarkan Pemberian Kolostrum Pada Balita Usia 6-24 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa	39
Tabel 5.7	Distribusi Responden Berdasarkan Pemberian ASI Eksklusif Pada Balita Usia 6-24 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa.....	39
Tabel 5.8	Distribusi Responden Berdasarkan Pemberian MP-ASI Pada Balita Usia 6-24 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa	40
Tabel 5.9	Distribusi Hubungan Pemberian Kolostrum dengan Status Gizi Balita Usia 6-24 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa	40
Tabel 5.10	Distribusi Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Status Gizi Balita Usia 6-24 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa	41
Tabel 5.11	Distribusi Hubungan Pemberian MP-ASI Dengan Status Gizi Balita Usia 6-24 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kuesioner

Lampiran 2: Pengantar Izin Penelitian Dari UIN Alauddin Makassar

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Badan Penelitian dan Pengembangan daerah
2. Pemerintah Kabupaten Gowa Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
3. Pemerintah Kabupaten Gowa Dinas Kesehatan

Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Melakukan penelitian

Lampiran 5: Tabel Buku Rujukan Penilaian Status Gizi Anak

Perempuan dan Laki-laki Usia 0-59 Bulan Menurut Berat Badan dan Umur (BB/U)

Lampiran 6: Output Analisis Hasil Penelitian Mengenai Hubungan Pola Asuhan Gizi dengan Status Gizi Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa

Lampiran 7: Riwayat Hidup

Abstrak

Nama : Nur Rahma Dewi

Nim : 70200106060

Judul : Hubungan Pola Asuh Gizi dengan Status Gizi Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa

Gizi merupakan salah satu komponen dari lingkungan yang memegang peranan penting dalam kesehatan dan tumbuh kembang anak. Apabila gizi menurun maka kesehatan anak akan menurun, sedangkan angka mortalitas dan morbiditas akan meningkat. Masa balita sangat tergantung pada Ibu sehingga pertumbuhan dan perkembangannya sangat tergantung pada pola asuh gizinya.

Status Gizi adalah keadaan Tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Status gizi dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain asupan makanan, penyakit infeksi dan pola asuhan gizi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Pola Asuhan Gizi dengan Status Gizi Balita usia 6-24 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong Kab. Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian survey Analitik dengan rancangan "*Cross Sectional Study*", dengan populasi semua balita usia 6-24 bulan yang berada di wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong Kab. Gowa tahun 2010, sampel diperoleh 55 anak dengan metode *Accidental sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner dan pengukuran berat badan menurut umur (BB/U) dan diolah dengan program SPSS yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi disertai narasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan pemberian kolostrum dengan status gizi balita usia 6-24 bulan, di mana hasil uji chi-square diperoleh nilai $p = 0,003 < 0,05$, ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Ada hubungan pemberian ASI eksklusif dengan status gizi balita usia 6-24 bulan, diperoleh nilai $P = 0,000 < 0,05$, ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Ada hubungan pemberian MP-ASI dengan status gizi balita usia 6-24 bulan, di mana diperoleh nilai $P = 0,000 < 0,005$, ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima.

Di harapkan kepada para ibu untuk memberikan kolostrum dan ASI eksklusif pada bayinya dan juga memberikan MP-ASI tepat pada waktunya. Diharapkan kepada ibu agar selalu memperhatikan pola asuhan gizi anaknya untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Bagi ibu yang memiliki balita, disarankan agar rutin membawa anaknya ke tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti posyandu sehingga status kesehatan anaknya dapat dikontrol oleh ibunya sendiri dan juga oleh petugas kesehatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gizi merupakan salah satu komponen dari lingkungan yang memegang peranan penting dalam kesehatan dan tumbuh kembang anak. Apabila gizi menurun maka kesehatan anak akan menurun, sedangkan angka mortalitas dan morbiditas akan meningkat (Sediaoetama, 1999:76).

Secara nasional ada empat masalah gizi utama di Indonesia yaitu: (1) Kurang kalori dan protein, (2) Kekurangan vitamin A, (3) Kekurangan garam besi dan anemia gizi, dan (4) gondok endemik (gangguan akibat kekurangan yodium). Ditinjau dari sudut masalah kesehatan dan gizi, anak balita termasuk golongan masyarakat yang paling mudah menderita kelainan gizi, sedangkan pada saat ini mereka sedang mengalami proses pertumbuhan yang relatif pesat, dan memerlukan zat-zat gizi dalam jumlah yang relatif besar. Khususnya untuk masa balita merupakan masa perkembangan (nonfisik) dimana sedang dibina untuk mandiri, berperilaku menyesuaikan dengan lingkungan, peningkatan berbagai kemampuan, dan berbagai perkembangan lain yang membutuhkan fisik yang sehat. Maka kesehatan yang baik ditunjang oleh keadaan gizi yang baik, merupakan hal yang utama untuk tumbuh kembang yang optimal bagi seorang anak. Kondisi ini hanya dapat dicapai melalui proses pendidikan dan pembiasaan serta penyediaan kebutuhan yang sesuai khususnya melalui makanan sehari-hari bagi seorang anak (Santoso, 1999:88).

Pengasuhan anak merupakan sebuah interaksi yang terjadi antara pengasuh (orang tua dan orang dewasa) dengan anak-anak yang diasuh. Pengasuhan merupakan usaha yang diarahkan untuk mengubah tingkah lakunya sesuai dengan keinginan pengasuh. Pengasuhan anak menjadi sangat penting karena melalui

proses pengasuhan itulah anak tumbuh dan berkembang menjadi sosok individu dengan seperangkat karakteristik sejalan dengan yang diterima selama proses pengasuhan berlangsung (Hamzah, 2000: 27).

Kasus gizi buruk saat ini menjadi sorotan utama pada masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Berbagai upaya sudah dilakukan bahkan salah satu tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005– 2009 bidang kesehatan adalah menurunkan prevalensi gizi kurang menjadi setinggi-tingginya 20%, termasuk prevalensi gizi buruk menjadi setinggi-tingginya 5% pada 2009. Indonesia sebenarnya sudah banyak membuat kemajuan dalam menekan angka gizi buruk dan gizi kurang pada anak balita, sebanyak 37,5% (1989), 35,5% (1992), 31,6% (1995), 29,5% (1998), 26,4% (1999), dan 24,6% (2000). Namun sejak tahun 2000, angka gizi buruk dan gizi kurang kembali meningkat, menjadi 26,1% (2001), 27,3% (2002), 27,5% (2003), dan 29% (2005) (Masidu, 2009).

Sementara pada awal 2005, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), jumlah kasus gizi buruk dan gizi kurang berturut-turut 8,8 persen dan 19,20 persen. Jumlah balita yang menderita gizi kurang dikatakan menurun menjadi 4,6 juta balita. Demikian pula balita yang menderita gizi buruk menurun menjadi 1,2 juta balita, dan balita yang menderita gizi buruk tingkat berat (busung lapar) menurun menjadi 120.000 balita. Pada akhir 2005, ditemukan 1,8 juta balita dengan status gizi buruk, dalam jangka waktu yang sangat singkat menjadi 2,3 juta balita menderita gizi buruk, sementara masih ada 5 juta lebih anak balita lainnya yang mengalami status gizi kurang (Samhadi, 2006). Pada 2006, selama periode Januari– Oktober, jumlah total kasus gizi buruk yang dilaporkan dan ditangani petugas kesehatan sebanyak 20.580 kasus dan 186 di antaranya menyebabkan kematian. Jumlah tersebut menurun jauh dibandingkan pada

2005, yang mencapai 76.178 kasus. Pada tahun 2007, sekitar 5.543.944 balita dari 19.799.874 balita yang ada di seluruh Indonesia diperkirakan menghadapi masalah gizi buruk dan gizi kurang (Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2007).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, status gizi kurang pada balita tahun 2005 sebesar 12.762 balita (20,3%), pada tahun 2006 turun sebanyak 8.654 balita (15,3%) dan pada tahun 2007 ini menjadi 9.485 balita. Balita yang mengalami gizi buruk sebanyak 934 (4,6%) pada tahun 2005, dan 2021 (3,44%) pada tahun 2007, kejadian gizi buruk pada tahun 2008 adalah sebanyak 1.348 balita dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 3.594 balita. (Profil Kesehatan Sulawesi Selatan Tahun 2009).

Dari data yang diperoleh di Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa, pada tahun 2008 terdapat 417 anak dengan status gizi baik, terdapat 17 berstatus anak gizi lebih dan 52 anak berstatus gizi kurang. Pada tahun 2009 terdapat 459 anak berstatus gizi baik, 15 anak berstatus gizi lebih dan 45 anak menderita gizi kurang.

Faktor yang menyebabkan kurang gizi telah diperkenalkan UNICEF dan telah digunakan secara internasional, yang meliputi beberapa tahapan penyebab timbulnya kurang gizi pada anak balita, baik penyebab langsung maupun tidak langsung, akar masalah dan pokok masalah. Berdasarkan Soekirman dalam materi Aksi Pangan dan Gizi nasional penyebab kurang gizi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, penyebab langsung yaitu makanan anak dan penyakit infeksi yang diderita anak. Penyebab gizi kurang tidak hanya disebabkan makanan yang kurang tetapi juga karena penyakit. Anak yang mendapat makanan yang baik

tetapi karena sering sakit diare atau demam dapat menderita kurang gizi. Demikian pada anak yang makannya tidak cukup baik maka daya tahan tubuh akan melemah dan mudah terserang penyakit. Kenyataannya baik makanan maupun penyakit secara bersama-sama merupakan penyebab kurang gizi.

Kedua, penyebab tidak langsung yaitu ketahanan pangan di keluarga, pola pengasuhan anak, serta pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Ketahanan pangan adalah kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh anggota keluarga dalam jumlah yang cukup dan baik mutunya. Pola pengasuhan adalah kemampuan keluarga untuk menyediakan waktunya, perhatian dan dukungan terhadap anak serta memperhatikan pemberian kolostrum, ASI eksklusif dan MP-ASI agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Pelayanan kesehatan dan sanitasi lingkungan adalah tersedianya air bersih dan sarana pelayanan kesehatan dasar yang terjangkau oleh seluruh keluarga (Depkes RI, 2006).

Berdasarkan kenyataan tersebut, masalah pengasuhan bayi dan balita dalam aspek pemberian makanan dan menyusui, perawatan dasar, *hygiene* perorangan dan perlindungan lainnya perlu mendapat perhatian guna membina kehidupan yang sehat utamanya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana hubungan pemberian kolostrum, ASI eksklusif dan pemberian MP-ASI dengan status gizi balita usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Tinggamoncong Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui hubungan pola asuhan gizi terhadap status gizi balita usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupten Gowa.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui hubungan pemberian kolostrum dengan status gizi balita usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
- b. Untuk mengetahui hubungan pemberian ASI eksklusif terhadap status gizi balita usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
- c. Untuk mengetahui hubungan pemberian MP-ASI terhadap status gizi balita usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait, khususnya Dinas kesehatan dalam mengambil kebijakan untuk menanggulangi masalah gizi pada anak balita.
2. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai salah satu sumber informasi dan bacaan bagi peneliti selanjutnya.
3. Bagi peneliti sendiri merupakan pengalaman berharga dalam memperluas wawasan tentang pola asuhan gizi terhadap status gizi balita usia 6-24 bulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Status Gizi

1. Pengertian

Status gizi adalah keadaan individu atau kelompok yang ditentukan oleh derajat kebutuhan fisik akan energi dan zat gizi lain yang diperoleh dari pangan dan makanan yang dampak fisiknya diukur secara antropometri. Untuk memperkirakan status gizi seseorang, suatu kelompok atau suatu masyarakat perlu dilaksanakan pengukuran-pengukuran untuk menilai berbagai tingkatan gizi (Suyatno, 2009).

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi (Almatsier, 2001: 3).

Ditinjau dari sudut masalah kesehatan dan gizi, maka balita termasuk dalam golongan masyarakat kelompok rentan gizi, yaitu kelompok masyarakat yang paling mudah menderita kelainan gizi, sedangkan pada saat inilah mereka sedang mengalami proses pertumbuhan (Santoso, 2003: 88).

Penilaian status gizi dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu penilaian status gizi secara langsung dan penilaian status gizi secara tidak langsung.

a. Penilaian Status Gizi secara langsung

Penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi menjadi 4 penilaian, yaitu: klinis, biokimia dan biofisik dan antropometri.

1) Klinis

Pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk menilai status gizi masyarakat. Metode ini didasarkan atas perubahan-perubahan yang terjadi yang dihubungkan dengan ketidakcukupan zat gizi. Umumnya untuk survei klinis secara cepat. Survei ini dirancang

untuk mendeteksi secara cepat tanda-tanda klinis umum dari kekurangan salah satu atau lebih zat gizi.

2) Biokimia

Pemeriksaan biokimia yaitu pemeriksaan spesimen yang diuji secara laboratoris yang dilakukan pada berbagai macam jaringan tubuh. Digunakan untuk suatu peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi keadaan malnutrisi yang lebih parah lagi.

3) Biofisik

Pemeriksaan biofisik adalah metode penentuan status gizi dengan melihat kemampuan fungsi dan melihat perubahan struktur dan jaringan. Umumnya digunakan dalam situasi tertentu seperti kejadian buta senja epidemik.

4) Antropometri

Antropometri artinya ukuran tubuh manusia. Dari sudut pandang gizi, maka antropometri gizi berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Antropometri digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Antropometri sebagai indikator status gizi dapat dilakukan dengan mengukur beberapa parameter. Parameter adalah ukuran tunggal dari tubuh manusia, antara lain : umur, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul dan tebal lemak di bawah kulit.

b. Penilaian Status Gizi secara tidak langsung

Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dibagi menjadi 3 penilaian yaitu: survey konsumsi makanan, statistik vital dan faktor ekologi.

1) Survei konsumsi makanan

Survei konsumsi yaitu metode penentuan status gizi dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Penggunaannya dapat untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi.

2) Statistik vital

Dengan menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan lain-lain. Penggunaan dipertimbangkan sebagai bagian dari indikator tidak langsung pengukuran status gizi masyarakat.

3) Faktor ekologi

Penilaian yang didasarkan pada hasil interaksi beberapa faktor fisik, biologis dan lingkungan budaya. Untuk mengetahui penyebab malnutrisi disuatu masyarakat sebagai dasar untuk melakukan program intervensi gizi (Supariasa, 2002: 18).

Penentuan berat badan dilakukan dengan cara menimbang. Alat yang digunakan di lapangan sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mudah digunakan dan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain.
- b. Mudah diperoleh dan relatif murah harganya.
- c. Ketelitian penimbangan sebaiknya maksimum 0,1 kg.
- d. Skalanya mudah dibaca.
- e. Cukup aman untuk menimbang anak balita.

Alat yang dapat memenuhi persyaratan dan kemudian dipilih dan dianjurkan untuk digunakan dalam penimbangan anak balita adalah dacin. Penggunaan dacin mempunyai beberapa keuntungan antara lain dacin sudah dikenal umum sampai di pelosok pedesaan, dibuat di Indonesia, bukan impor, ketelitian dan ketepatannya cukup baik.

Dacin yang digunakan sebaiknya minimum 20 kg dan maksimum 25 kg. Alat yang diperlukan adalah kantong celana timbang atau kain sarung, yang tidak membahayakan anak terjatuh pada saat ditimbang. Diperlukan pula tali atau sejenisnya yang cukup kuat untuk menggantungkan dacin.

Dalam buku kader (1995), diberikan petunjuk bagaimana menimbang balita dengan menggunakan dacin. Langkah-langkah tersebut dikenal dengan 9 langkah penimbangan, yaitu:

1. Gantungkan dacin pada dahan, palang rumah atau penyangga kaki tiga.
2. Periksa apakah dacin sudah tergantung kuat. Tarik batang dacin ke bawah kuat-kuat.
3. Sebelum dipakai letakkan bandul geser pada angka 0 (nol). Batang dacin dikaitkan dengan tali pengaman.
4. Pasanglah celana timbang atau sarung timbang yang kosong pada dacin. Ingat bandul geser pada angka 0 (nol).
5. Seimbangkan dacin yang sudah dibebani celana timbang atau sarung timbang dengan cara memasukkan pasir ke dalam kantong plastik.
6. Anak ditimbang dan seimbangkan dacin.
7. Tentukan berat badan anak, dengan membaca angka di ujung bandul geser.
8. Catat hasil penimbangan di atas secarik kertas.
9. Geserlah bandul ke angka 0 (nol), setelah itu bayi atau anak dapat diturunkan.

2. Standar Nasional Center For Health Statistik (NCHS)

Pada tahun 1975 suatu kelompok kerja diberikan tugas untuk membuat suatu masukan kepada WHO tentang penggunaan indikator antropometri untuk kepentingan survei status gizi dalam survailans gizi. Rekomendasi yang dihasilkan berupa penggunaan berat badan dan tinggi badan yang akan dipergunakan sebagai suatu standar internasional (Sudarianto, 2008).

Berat badan dan tinggi badan adalah dua jenis antropometrik yang sering kali digunakan dalam survei gizi. Pengukuran ini dalam kombinasi dengan umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk tiga indikator yaitu BB/TB, BB/U dan TB/U. Ketiga jenis indikator antropometri ini ditemukan pada sebagian besar data yang ada dibanyak populasi dibanding dengan indikator status gizi individu atau populasi (Atmarita, 2007).

a. Berat badan per tinggi badan (BB/TB)

Indikator ini digunakan untuk kekurusan (*wasting*) maupun obesitas (*stunting*). Seseorang dengan BB/TB di bawah standar (*cut-off* spesifik) dapat dikatakan "*wasted*" sedang pengukuran diatas standar menunjukkan obesitas. Indikator BB/TB merupakan yang terbaik untuk mengetahui malnutrisi yang terjadi sekarang atau akut.

b. Tinggi badan per umur (TB/U)

Indikator ini tidak begitu sensitif untuk kurangnya *intake* makanan seperti pada BB/TB dan tampaknya sebagai indikator terakhir yang dipengaruhi.

c. Berat badan per umur (BB/U)

BB/U adalah salah satu parameter antropometrik yang memberi gambaran tentang massa tubuh (otot dan lemak), dan indeks BB/U paling banyak digunakan untuk menentukan status gizi individu atau populasi. BB/U memberikan gambaran yang sangat penting karena merupakan indikator komposit dari BB/TB dan TB/U. Sebaliknya anak yang tinggi dan BB/TB yang rendah akan memberikan BB/U normal (Atmarita, 2007).

B. Tinjauan Tentang Gizi

Gizi berasal dari bahasa arab “*gizza*” yang artinya makanan dan manfaatnya bagi kesehatan (Irianto, 2004: 16).

Al *gizza* juga dapat diartikan sebagai sari makanan yang bermanfaat untuk kesehatan. Dalam bahasa inggris disebut *nutrition* yang berarti suatu proses pada makhluk hidup untuk mengambil dan mengubah zat-zat padat atau cair dari luar yang digunakan untuk memelihara kehidupan, pertumbuhan, fungsi-fungsi normal organisme dan menghasilkan energi atau tenaga (Satriono, 1996: 27).

Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan yang optimal. Disatu sisi, ilmu gizi berkaitan dengan makanan dan di sisi lain dengan tubuh manusia (Almatsier, 2003: 1).

Seseorang perlu makan untuk menjaga agar tubuhnya tetap dapat melakukan segala aktifitas. Makanan selain berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup juga berfungsi sebagai sumber tenaga pembangun dan pelindung atau pengatur segala proses tubuh. Makanan yang di makan sehari-hari hendaknya merupakan makanan yang seimbang, terdiri atas bahan-bahan makanan yang tersusun secara seimbang baik kualitas maupun kuantitas untuk memenuhi syarat hidup sehat (Irianto, 2004: 16).

Apabila makanan tidak memenuhi kebutuhan akan zat gizi maka akan terjadi masalah kekurangan zat gizi. Makanan adalah salah satu kunci dari kesehatan khususnya bagi anak, dimana makanan tidak hanya menentukan kesehatan masa kini. Fungsi dari makanan itu sendiri terhadap tubuh adalah sebagai sumber tenaga, memenuhi keperluan pertumbuhan, pemeliharaan dan mengganti bagian-bagian tubuh yang rusak. Selain itu dalam memilih makanan

yang akan dikonsumsi harus juga memperhatikan kehalalan makanan tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah/5: 88.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Ayat ini menegaskan perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal lagi baik. *Dan makanlah makanan yang halal*, yakni bukan yang haram *lagi baik*, lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan *dari apa yang Allah telah rezezikikan kepada kamu*, dan bertakwalah kepada Allah dalam segala aktivitas kamu yang kamu beriman kepada-Nya adalah *mu'minin*, yakni orang-orang yang mantap keimanannya (Shihab, 2002: 188).

Ayat di atas memberikan tuntunan makanan: “*Dan makanlah olehmu apa yang telah direzezikikan kepadamu oleh Allah, yang halal lagi baik*”. Oleh sebab itu pilihlah makanan yang halal lagi baik, *Halaalan*, yang halal. *Thaiyyiban*, yang baik. Selain daripada yang ditentukan oleh Allah dalam Al-quran diserahkan pulalah dalam ijtihad kita sendiri melilih mana yang halal lagi baik, itu sebabnya maka ujung ayat ini berbunyi: “*Dan bertakwalah kepada Allah, dan kepada-Nyalah kamu beriman*”. Dengan ketentuan Allah tentang halal dan baik lalu diserahkan kepada pertimbangan batin, yaitu takwa dan iman, bertambah pentinglah jadinya memilih makanan dan minuman yang layak. Itulah sebabnya apabila memakan sesuatu, ditekankan agar membaca *Basmalah* dan sehabis makan membaca *hamdalah* (Hamka, 1982: 1853).


Persyaratan makanan yang baik (*Thaiyyib*) menurut gizi ialah yang dapat memenuhi fungsi-fungsi dalam tubuh. Semakin banyak fungsi yang dapat

dipenuhi oleh suatu bahan pangan, semakin baik sifatnya. Dari sudut agama Islam ada beberapa jenis makanan dan bahan makanan yang jelas-jelas haram yang tidak boleh dimakan. Sesungguhnya larangan terhadap beberapa makanan seperti bangkai, daging babi, darah dan binatang yang disembelih disebut nama selain Allah merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah swt kepada makhluk-Nya agar sehat jasmani maupun rohani (Ahsin, 2007: 88).

Konsumsi makanan sangat berpengaruh terhadap status gizi seseorang karena tujuan akhir dari konsumsi dan penggunaan makanan oleh tubuh adalah tercapainya status gizi yang optimal. Jadi makanan yang dikonsumsi harus selalu diperhatikan nilai gizinya dan tidak lupa memerhatikan halal atau tidaknya makanan tersebut tentunya didukung dengan pengetahuan tentang gizi.

Masalah kekurangan gizi dapat terjadi akibat faktor dari luar dan dari dalam keluarga itu sendiri. Mengenai faktor di dalam keluarga sendiri, selain ketersediaan pangan yang rendah, juga distribusi makanan antar anggota keluarga yang sering tidak seimbang, terutama bagi bayi dan anak. Keterbatasan kemampuan bayi dan anak membuat mereka tidak mempunyai akses langsung terhadap makanan sehingga kecukupan pangannya tergantung pada perhatian anggota keluarga terutama ibu. Masalah gizi kurang pada bayi dapat terjadi setelah bayi berumur di atas 6 bulan akibat ASI yang diberikan tidak lagi mencukupi kebutuhan fisiologis bayi untuk tumbuh dan berkembang. (Taufing, 2005: 11).

Adapun faktor penyebab gizi kurang dapat dilihat pada bagan 2.1.



Bagan 2.1. Faktor penyebab gizi kurang

Masalah gizi merupakan masalah yang multidimensi, dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab. Penyebab langsung gizi kurang adalah makanan yang tidak seimbang, baik jumlah maupun mutu asupan gizinya, disamping itu asupan zat gizi tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh secara optimal karena gangguan penyerapan akibat adanya penyakit infeksi (Akhmadi, 2008).

Penyebab tidak langsung adalah tidak cukup tersedianya pangan di rumah tangga, kurang baiknya pola pengasuhan anak terutama dalam pola pemberian makanan pada balita, kurang memadainya sanitasi dan kesehatan lingkungan serta kurang baiknya pelayanan kesehatan. Semua keadaan ini berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan kemiskinan. Akar masalah

gizi adalah terjadinya krisis ekonomi, politik dan sosial termasuk kejadian bencana alam, yang mempengaruhi ketidakseimbangan antara asupan makanan dan adanya penyakit infeksi, yang pada akhirnya mempengaruhi status gizi balita. Kemiskinan dan kurang gizi merupakan suatu fenomena yang saling terkait, oleh karena itu untuk meningkatkan status gizi suatu masyarakat erat kaitannya dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat (Akhmadi, 2008).

Selain itu pemberian MP-ASI harus tepat waktu. Setelah usia 6 bulan, ASI hanya memenuhi sekitar 60-70% kebutuhan gizi bayi. Jadi, bayi mulai membutuhkan makanan pendamping ASI (MP-ASI). Pemberian makanan padat pertama ini harus memperhatikan kesiapan bayi, antara lain, keterampilan motorik, keterampilan mengecap dan mengunyah, plus penerimaan terhadap rasa dan bau. Pada usia 6 bulan, secara fisiologis bayi telah siap menerima makanan tambahan. Secara keseluruhan, fungsi saluran cerna sudah berkembang (Wijayadi, 2008).

Anak pada usia balita juga membutuhkan gizi seimbang yaitu makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh sesuai umur. Zat gizi tersebut adalah karbohidrat, lemak, protein dan mineral. (Septianti, 2007).

Menurut Anggraini Septianti (2007), dengan bertambahnya umur bayi serta perkembangan dan kemampuan menerima makanan, maka makanan bayi umur 0-24 bulan dibagi dalam beberapa tahap yaitu:

- a. Makanan bayi berumur 0-6 bulan
 1. Berikan ASI saja (ASI Eksklusif sampai umur 6 bulan sesuai keinginan anak).
 2. Berikan kolostrum
 3. Jangan berikan makanan/minuman selain ASI
 4. Berikan ASI dari kedua payudara

- b. Makanan bayi berumur 6-9 bulan
 - 1. Pemberian ASI diteruskan sesuai keinginan anak
 - 2. Berikan makanan lumat 2 kali sehari
- c. Makanan bayi berumur 9-12 bulan
 - 1. Teruskan pemberian ASI sesuai keinginan anak
 - 2. Berikan makanan lunak 3 kali sehari dengan takaran yang cukup
 - 3. Berikan makanan selingan 1 kali sehari
 - 4. Perkenalkan bayi dengan beraneka bahan makanan
- d. Makanan anak berumur 12-24 bulan
 - 1. Teruskan pemberian ASI sesuai keinginan anak
 - 2. Berikan makanan keluarga 3 kali sehari
 - 3. Berikan makanan selingan 2 kali sehari
 - 4. Gunakan beraneka ragam bahan makanan setiap hari

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gizi buruk pada anak usia 0-4 bulan yaitu:

- a. Jumlah ASI yang dapat diberikan ibu tidak sesuai dengan kebutuhan bayi dan akibatnya bayi akan menderita gangguan gizi.
- b. Dalam usia ini anak sangat peka terhadap penyakit infeksi dan penyakit tersebut akan menjadikan gizi anak semakin buruk, bahkan anak yang keadaan gizinya baik sekalipun apabila terserang penyakit infeksi seperti campak atau diare akan mengakibatkan memburuknya gizi anak tersebut.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gizi buruk pada anak usia 5-8 bulan yaitu:

- a. Jumlah ASI yang dihasilkan oleh ibu sudah tidak mencukupi kebutuhan bayi akan zat gizi, akan tetapi ibunya tidak mengetahui keadaan itu.

- b. Berat badan bayi tidak diawasi secara teratur dan terus menerus sehingga tidak dapat diketahui apakah makanan bayi cukup atau tidak.
- c. Bayi diberi tambahan makanan yang mutu gizinya tidak baik, seperti nasi yang hanya dilumatkan dan diberi kecap atau nasi yang dilumatkan dengan pisang dan sebagainya yang lazim diberikan kepada bayi.
- d. Produksi ASI terhenti karena berbagai sebab dan anak diberikan makanan pengganti yang tidak memenuhi syarat gizi.
- e. Daya kekebalan anak sudah mulai menurun sedangkan anak semakin terbuka terhadap penyakit infeksi.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gizi buruk pada anak usia 9-24 bulan yaitu:

- a. Produksi ASI menurun secara drastis terutama setelah bayi mencapai usia 12 bulan. Selain itu ada kaseganan ibu untuk tetap menyusui anaknya setelah anak mencapai usia 12 bulan.
- b. Makanan yang diberikan kepada anak tidak dapat memenuhi kebutuhan anak akan berbagai zat gizi yang diperlukan, padahal kebutuhan anak akan berbagai zat gizi semakin meningkat.
- c. Pertumbuhan anak yang dapat diawasi dengan menimbang berat badannya setiap bulan, lalai dilakukan.
- d. Anak sangat terbuka terhadap berbagai penyakit infeksi, terlebih jika faktor lingkungan memberikan peluang bagi berbagai bibit penyakit untuk menyerang anak.
- e. Penghasilan keluarga yang terbatas sehingga tidak memungkinkan keluarga untuk memberikan bahan makanan sumber protein hewani kepada anak secara teratur .

- f. Anak yang berhenti menyusu sebagai gantinya diberi susu buatan (susu sapi). Cara pencairan susu sapi dan kebersihan peralatan untuk membuat susu botol sering kurang diperhatikan. Penggunaan alat yang tidak bersih akan menyebabkan anak menderita diare (mencret) dan akan terjadi dehidrasi, karena itulah gizi anak akan menjadi buruk.

C. Tinjauan Tentang Pola Asuhan Gizi

Secara etimologi, pola berarti bentuk, tata cara. Sedangkan asuh berarti menjaga, merawat dan mendidik. Sehingga pola asuh berarti bentuk atau sistem dalam menjaga, merawat dan mendidik. Jika ditinjau dari terminologi, pola asuh anak adalah suatu pola atau sistem yang diterapkan dalam menjaga, merawat dan mendidik seorang anak yang bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu (Asfiriati, 2009).

Pengasuhan anak pada dasarnya adalah aktivitas yang berhubungan dengan pemenuhan pangan, pemeliharaan fisik dan perhatian terhadap anak. Pengasuhan meliputi aktivitas perawatan terkait gizi atau persiapan makanan dan menyusui, pencegahan dan pengobatan penyakit (Herawati, 2008).

Menurut Soetjiningsih (1999), pengasuhan adalah suatu praktek yang dijalankan oleh orang yang lebih dewasa terhadap anak. Praktek ini meliputi pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, perawatan dasar (termasuk imunisasi dan pengobatan balita sakit), tempat tinggal yang layak, *hygiene* perorangan, sanitasi lingkungan, sandang dan kesegaran jasmani.

Pola asuh adalah praktek di rumah tangga yang diwujudkan dengan tersedianya pangan dan perawatan kesehatan serta sumber lainnya untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pola asuh terdiri atas:

1. Pemberian Kolostrum
2. Pemberian ASI Eksklusif
3. Pemberian MP-ASI

Pengasuhan yang baik sangat penting untuk dapat menjamin tumbuh kembang anak yang optimal. Sebagai contoh yaitu menyusui anak adalah praktek pemberian makanan, kesehatan dan pengasuhan yang terjadi secara bersamaan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuhan gizi pada anak menurut UNICEF (1996) adalah:

1. Perawatan terhadap ibu, hal ini akan memengaruhi kemampuan ibu dalam mengasuh anak-anaknya. Perawatan terhadap ibu disini berupa perawatan terhadap kesehatan fisik dan mental ibu, dukungan dari orang lain di masyarakat, beban kerja dan waktu yang tersedia dalam mengasuh.
2. Kebiasaan dalam penyediaan makanan yaitu merupakan kebiasaan ibu yang berhubungan dengan proses pengolahan dan penyimpanan makanan.
3. Kebiasaan dalam pemberian makanan merupakan kebiasaan makan yang sering dihubungkan dengan asuhan gizi anak, seperti memberikan ASI yang cukup, menentukan kapan anak akan diberikan makanan tambahan sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi anak yang adekuat.
4. Perilaku sosial. Hal ini sering dikaitkan dengan kemampuan orang tua untuk memberi perhatian, kasih sayang dan keterlibatan dalam pemberian nutrisi. Perilaku sosial ini akan berdampak pada status gizi anak serta perkembangan sosial anak dan emosional anak.
5. Perilaku kebersihan orang tua dalam masalah *hygiene* perorangan dimana hal ini akan mempengaruhi risiko terjadinya infeksi.

6. Perilaku untuk hidup sehat termasuk di dalamnya merawat anak apabila sakit dan upaya pencarian pelayanan bagi sang anak.

1. Tinjauan Tentang Kolostrum

Kolostrum adalah ASI yang keluar pertama kali, berwarna jernih kekuning-kuningan dan kaya akan zat anti bodi. Kolostrum dikeluarkan pada hari-hari pertama sampai kira-kira hari kelima setelah bayi dilahirkan. Produksi kolostrum untuk setiap ibu tidak sama, karena tergantung dari reaksi yang disebabkan oleh hisapan bayi. Warna kolostrum yang kekuningan berbeda dengan ASI biasanya menyebabkan para ibu enggan memberikan kolostrum pada bayinya, bahkan sengaja membuangnya. (Arisman, 2007).

Adapun manfaat kolostrum sebagai berikut:

- a. Kolostrum mengandung zat kekebalan terutama IgA untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi terutama diare.
- b. Jumlah kolostrum yang diproduksi bervariasi tergantung dari hisapan bayi pada hari-hari pertama kelahiran. Walaupun sedikit namun cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi.
- c. Kolostrum mengandung protein, vitamin A yang tinggi dan mengandung karbohidrat dan lemak rendah, sehingga sesuai dengan kebutuhan gizi bayi pada hari-hari pertama kelahiran.
- d. Membantu mengeluarkan melenium yaitu kotoran bayi yang pertama berwarna hitam kehijauan (Sejogyo dkk, 1994: 274)

Konsentrasi kadar immunoglobulin terdapat dalam kolostrum dan ASI, ibu-ibu yang menyusui berasal dari masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, demikian juga perbedaan geografi dan suku, ternyata kurang lebih sama untuk jangka waktu berapa bulan menyusui. Alasan utama menyusui bayi karena adanya sifat anti infeksi dalam ASI yang melindungi bayi

terhadap infeksi terutama diare dalam lingkungan yang kurang sehat. Kolostrum dapat memberikan efek perlindungan pada bayi sampai 6 bulan pertama kehidupannya. Pemberian kolostrum mempunyai implikasi terhadap kesehatan bayi (Sutanto, 1996).

2. Tinjauan tentang ASI eksklusif

ASI merupakan makanan berstandar emas yang tak bisa dibandingkan dengan susu formula atau makanan buatan apapun yang didalamnya terdapat zat kekebalan yang dapat melindungi bayi dari segala penyakit (Sumarjatih, 2007).

Menurut Departemen Kesehatan RI, ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman tambahan lain pada bayi berumur 0-6 bulan. Ketentuan sebelumnya bahwa ASI eksklusif cukup 4 bulan. Namun, pada tahun 1999 UNICEF memberikan klarifikasi tentang rekomendasi terbaru UNICEF bersama *World Health Assembly* (WHA) dan banyak Negara lainnya adalah menetapkan jangka waktu pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan.

Pemberian ASI secara penuh sangat dianjurkan oleh para ahli gizi di seluruh dunia. Tidak satupun susu buatan manusia (Susu formula) dapat menggantikan perlindungan kekebalan tubuh seorang bayi, seperti yang diperoleh dari kolostrum, yaitu ASI yang dihasilkan selama beberapa hari pertama setelah kelahiran. Disamping itu ASI juga mengandung semua zat gizi seperti lemak, protein, mineral dan vitamin (Krisnatuti, 2000: 27).

Bayi yang mengkonsumsi air susu ibu (ASI) sedini mungkin akan terhindar dari kematian akibat dari penyakit infeksi usus. Hal ini dikarenakan ASI mengandung kuman khusus, yaitu *lactobacillus bifidus*. Selain itu kolostrum atau ASI yang baru pertama keluar, yang berbentuk cairan agak kental dan berwarna kekuningan juga mengandung zat antibodi terhadap berbagai penyakit,

diantaranya penyakit pencernaan, batuk rejan, radang paru dan radang otak (Aswin, 2007).

Komposisi zat gizi ASI sangat ideal untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Namun, setelah usia 6 bulan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, ASI saja tidak lagi mencukupi kebutuhan gizi tapi sebaiknya anak tetap diberi ASI hingga usia dua tahun, Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Ini berarti bahwa al-Qur'an sejak dini telah menggariskan bahwa air susu ibu adalah makanan terbaik bagi bayi hingga usia dua tahun. Namun demikian, tentunya air susu ibu lebih baik dari selainnya. Dengan menyusui anak merasa lebih tenang, sebab menurut penelitian ilmuwan, ketika itu bayi telah mendengar suara detak

jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus dalam perut. Detak jantung itu berbeda antara seorang wanita dengan wanita yang lain. Sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dari kesempurnaan penyusuan.

Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan, tetapi bukanlah kewajiban. Ini dipahami dari penggalan ayat yang menyatakan, *bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*. namun demikian ini adalah anjuran yang sangat ditekankan. Jika ibu bapak sepakat untuk mengurangi masa tersebut, maka tidak mengapa (Shihab, 2002).

Dalam dekade beberapa tahun terakhir ini, firman Allah tersebut menjadi program baku badan kesehatan sedunia (WHO) dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan umat manusia di seluruh dunia. Hal ini penting agar seorang ibu benar-benar menyadari betapa pentingnya manfaat ASI bagi bayi (Minarno, 2008: 256).

Ayat di atas memberikan petunjuk tentang kewajiban dan tanggung jawab seorang ibu. Kalau penyusuan disia-siakan, berdosa dia dihadapan Allah. Ayat inipun diakui oleh ilmu ketabiban modern bahwasanya ASI lebih baik dari segala air susu yang lain. Disebut pula bahwa pengasuhan penyusuan itu yang sebaik-baiknya disempurnakan 2 tahun (Hamka, 1982: 232).

H. Salim Bahreisy dalam terjemahan singkat tafsir Ibnu Katsie dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233 menjelaskan bahwa tuntunan Allah supaya para ibu menyusui bayinya disaat bayinya benar-nenar membutuhkan air susu ibunya, yaitu hingga usia dua tahun cukup, adapun selebihnya dari itu, maka sudah tidak dihajatkan oleh bayi, yakni bayi sudah harus diberi makanan tambahan untuk pertumbuhan badannya (Bahreisy, 1988:422).

Ahsin w. alhafidz, dalam bukunya Fikih Kesehatan menjelaskan Q.S. Al-Baqarah/2: 233 bahwa dapat dipahami keharusan seorang ibu menyusui anaknya selama dua tahun penuh, tetapi diperbolehkan kurang dari masa itu apabila kedua orang tua memandang adanya kemaslahatan (Alhafidz, 2007: 262)

Masa penyusuan tidak harus selalu 24 bulan, seperti firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ahqaf/46: 15.

وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ط

Terjemahnya

Kandungan dan penyapihannya adalah tiga puluh bulan

Ayat di atas menjelaskan, bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan. Ini berarti jika janin dikandung selama sembilan bulan maka penyusuannya selama duapuluh satu bulan, sedangkan jika dikandung hanya enam bulan, maka ketika itu masa penyusuannya adalah 24 bulan. betapapun, ayat di atas menunjukkan betapa pentingnya ibu menyusukan anak dengan ASI dan betapa pentingnya ibu mengandung memberi perhatian yang cukup terhadap anak-anaknya, khususnya pada masa-masa pertumbuhan dan perkembangan jiwanya. Sikap kejiwaan seorang dewasa banyak sekali ditentukan oleh perlakuan yang dialaminya pada saat kanak-kanak, karena itu tidaklah tetap membiarkan mereka hidup terlepas dari ibu bapak kandungnya (Shihab, 2002: 89).

Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar dalam Q.S. al-Ahqaf/46: 15 bahwa anak itu baru dilepaskan dari bedungan ibu setelah 30 bulan, sebab secepat-cepat masa mengandung ialah enam bulan ditambah 24 bulan masa mengasuh. Tetapi dalam lanjutan ayat yang berbunyi, “Bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan”, teranglah pengasuhan yang dua tahun itu adalah yang sebaik-baiknya. Bagi siapa yang ingin mencapai kesempurnaan (Hamka,1982: 232).

Pemberian ASI masa dua tahun pertama sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Selama masa menyusui anak mendapat dua hal yang sangat

berarti bagi pertumbuhannya. Yang pertama anak mendapatkan makanan yang berkualitas prima karena ASI mengandung semua zat yang diperlukan anak untuk pertumbuhan sekaligus mengandung antibodi yang membuat anak tahan terhadap serangan penyakit. Yang kedua anak mendapat dekapan kehangatan, kasih sayang dan ketentraman.

Air susu ibu atau ASI adalah susu yang diproduksi oleh manusia untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. ASI adalah makanan/minuman alamiah untuk bayi, memenuhi seluruh kebutuhan bayi terhadap zat-zat gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan sampai usia 4-6 bulan. Sesudah itu, ASI tidak dapat lagi memenuhi seluruh kebutuhan bayi, karena itu bayi memerlukan makanan pendamping ASI (MP-ASI) untuk menunjang pertumbuhannya dan mencukupi kebutuhan gizinya (Wikipedia, 2010).

3. Tinjauan Tentang MP-ASI

Makanan pendamping ASI adalah makanan yang diberikan kepada bayi/anak disamping ASI untuk memenuhi kebutuhan gizinya. MP-ASI diberikan mulai umur 6 sampai 24 bulan dan MP-ASI merupakan makanan peralihan dari makanan ASI ke makanan keluarga. Pengenalan dan pemberian MP-ASI harus dilakukan secara bertahap baik bentuk maupun jumlahnya. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan kemampuan alat cerna bayi/anak dalam menerima MP-ASI. Pemberian MP-ASI yang cukup dalam hal kualitas dan kuantitas penting untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan anak yang bertambah pesat pada periode ini (Arfiana, 2009).

MP-ASI dikenal pula dalam istilah makanan pelengkap, makanan tambahan, makanan padat, makanan sapihan, makanan peralihan, *beiskot* yang istilah dalam

bahasa Jerman yang berarti makanan selain dari susu yang diberikan pada bayi (Susanti, 2010).

MP-ASI bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi/anak, dan merupakan masa peralihan dari ASI ke makanan keluarga. Selain untuk memenuhi kebutuhan bayi terhadap zat-zat gizi, pemberian makanan tambahan merupakan suatu proses pendidikan, dimana bayi diajar mengunyah dan menelam makanan padat dan membiasakannya kepada selera-selera baru (Anggraeni, 2009).

Tujuan pemberian makanan pendamping ASI adalah :

1. Melengkapi zat-zat gizi yang kurang karena kebutuhan zat gizi yang semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya juga umur bayi/anak.
2. Mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam-macam makanan dengan berbagai bentuk/tekstur dan rasa.
3. Melakukan adaptasi terhadap makanan yang mengandung kadar energi tinggi (Depkes RI, 1992).

Makanan pendamping ASI dapat dibuat secara manual di rumah atau secara komersial. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi adalah aman untuk dikonsumsi, memiliki nilai suplementasi yang baik, mengandung vitamin dan mineral cukup, formula harus sesuai dengan kemampuan pencernaan anak, mempunyai keawetan yang tinggi, biaya produksi relatif murah, mudah diproduksi secara massal, dapat diterima oleh ibu dan bayi serta tidak membutuhkan keterampilan dan peralatan khusus dalam penyajiannya. Makanan pendamping ASI buatan sendiri masih lebih sering digunakan dibandingkan dengan produksi pabrik (Arfiana, 2009).

Menurut Hadju (1998), secara umum pemberian makanan pendamping ASI dipengaruhi oleh berbagai segi, yaitu ekonomi, sosial maupun budaya.

Dilihat dari segi ekonomi, ibu terpaksa memberikan MP-ASI kepada bayi/anak dengan prinsip asal kenyang tanpa mementingkan pemenuhan kebutuhan zat gizi bayi/anak yang disebabkan kemampuan daya beli kurang apalagi diperparah dengan keadaan krisis ekonomi seperti sekarang ini.

Dari segi sosial, kurangnya pengetahuan ibu tentang MP-ASI sehingga cara pemberian dan kapan waktu pemberian yang tepat tidak diketahui oleh ibu balita sehingga terkadang pemberian MP-ASI terlalu dini atau terlambat. Frekuensi pemberian tiap hari tidak sesuai dengan anjuran, kurangnya kandungan zat gizi yang adekuat dalam MP-ASI tersebut dan cara pengolahan/penyajian yang tidak diketahui. Kesemua hal tersebut dapat mempengaruhi status gizi bayi atau anak.

Dari segi budaya, penundaan pemberian ASI setelah lahir, pemberian makanan serta pembuangan kolostrum yang justru sangat dibutuhkan oleh bayi, penundaan pemberian MP-ASI setelah anak usia 4-6 bulan dan adanya pantangan terhadap jenis makanan tertentu, faktor ini sangat erat kaitannya dengan budaya setempat yang sangat sulit dihilangkan dengan penyuluhan/pendidikan gizi masyarakat yang ada pada saat ini.

BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar pemikiran variabel yang diteliti

Masa balita adalah masa pertumbuhan dan perkembangan yang memerlukan perhatian khusus dalam hal massa dan jumlah kecukupan gizi. Pengaruh gizi dan kesehatan pada pertumbuhan dan perkembangan bayi serta anak balita sudah banyak dibuktikan. Pemberian makanan dengan gizi seimbang akan memberikan kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan fisik anak (Soetjiningsih, 1999: 19).

Menurut UNICEF, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan seorang anak tidak hanya tergantung dari asupan makanan dan kesehatan, tetapi juga oleh perilaku pengasuhan.

Dalam upaya peningkatan status gizi dan kesehatan balita maka ibu harus mempunyai pengetahuan tentang gizi dan cara pengasuhan anak. Pengasuhan yang dimiliki diharapkan dapat diaplikasikan melalui pola asuh ibu terhadap anaknya (Martini, 2009).

Pola Asuh dalam penelitian ini merupakan sikap dan perilaku seorang ibu dalam hal pemenuhan gizi anaknya dengan cara pemberian Kolostrum, pemberian ASI dan pemberian MP-ASI:

Pola asuh ibu terdiri dari:

a. Pemberian kolostrum

Pemberian kolostrum pada bayi sangat penting karena Kolostrum mengandung banyak gizi dan zat-zat pertahanan tubuh. Kolostrum menyuplai berbagai faktor kekebalan (faktor imun) dan faktor pertumbuhan pendukung kehidupan dengan kombinasi zat gizi (nutrien)

yang sempurna untuk menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan dan kesehatan bagi bayi yang baru lahir. Ada lebih dari 90 bahan bioaktif alami dalam kolostrum.

b. Pemberian ASI eksklusif

Asi eksklusif adalah pemberian Air Susu Ibu saja (tanpa makanan) minuman pendamping termasuk air putih maupun susu formula) umur 0-6 bulan. Pemberian ASI eksklusif (6) enam bulan, mengingat ASI merupakan hak anak yang paling hakiki dan merupakan investasi awal anak untuk tumbuh kembang dengan baik.

c. Pemberian MP-ASI

Setelah usia 6 bulan, ASI hanya memenuhi sekitar 60-70% kebutuhan gizi bayi. Jadi, bayi mulai membutuhkan makanan pendamping ASI (MP-ASI). Pemberian makanan padat pertama ini harus memperhatikan kesiapan bayi, antara lain, keterampilan motorik, keterampilan mengecap dan mengunyah, plus penerimaan terhadap rasa dan bau.

Cara pemberian MP-ASI pada bayi:


1. Berikan secara hati-hati sedikit demi sedikit dari bentuk encer kemudian yang lebih kental secara berangsur-angsur.
2. Makanan diperkenalkan satu persatu sampai bayi benar-benar dapat menerimanya.
3. Makanan yang dapat menimbulkan alergi diberikan paling terakhir dan harus dicoba sedikit demi sedikit misalnya telur, cara pemberiannya kuningnya lebih dahulu setelah tidak ada reaksi alergi, maka hari berikutnya putihnya.
4. Pada pemberian makanan jangan dipaksa, sebaiknya diberikan pada waktu lapar (Notoatmodjo, 1998: 138).

5. Jangan memberikan makanan pendamping dekat dengan waktu menyusui.
6. Berikan makanan yang bervariasi agar tidak bosan.

B. Bagan Kerangka Konsep

Hubungan pengetahuan ibu dan pola Asuhan Gizi dengan status Gizi anak

Usia 6-24 bulan:



Ket:

- = Variabel yang diteliti
- = Variabel Independen
- = Variabel Dependen

C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

a. Pemberian kolostrum

Pemberian kolostrum yaitu pemberian ASI yang keluar pada hari-hari pertama pada bayi setelah bayi lahir yang berwarna kekuning-kuningan.

Kriteria objektif:

Baik : Apabila diberi kolostrum.

Kurang : Apabila tidak diberi kolostrum.

b. Pemberian ASI eksklusif

Pemberian ASI eksklusif yaitu memberikan ASI saja selama usia 0-6 bulan.

Kriteria Objektif:

Baik : Apabila bayi diberi ASI 0-6 bulan.

Kurang : Apabila bayi diberi ASI < 6 bulan.

c. Pemberian MP-ASI

Pemberian MP-ASI yaitu memberikan makanan pendamping air susu ibu pada usia 6 bulan keatas.

Kriteria objektif:

Baik : Apabila diberikan MP-ASI \geq 6 bulan.

Kurang : Apabila diberikan MP-ASI $<$ 6 bulan.

d. Status gizi

Status gizi dalam penelitian ini adalah gambaran keadaan gizi anak yang ditentukan setelah pengukuran secara antropometri dengan pengukuran berat badan menurut umur (BB/U), yang hasilnya dibandingkan dengan standar baku WHO-NCHS dengan simpangan baku atau Z-Score (Supriasa dkk, 2002: 18).

Kriteria objektif :

Status gizi baik : -2 SD sampai dengan +2 SD Z score

Status gizi kurang : $<$ -2 SD sampai dengan -3SD Z score

D. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (Ho)

- a. Tidak ada hubungan pemberian kolostrum dengan status gizi balita usia 6-24 bulan di Wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
- b. Tidak ada hubungan pemberian ASI dengan status gizi balita usia 6-24 bulan di Wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
- c. Tidak ada hubungan pemberian MP-ASI dengan status gizi balita usia 6-24 bulan di Wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

1. Hipotesis alternatif (Ha)

- a. Ada hubungan pemberian kolostrum dengan status gizi balita usia 6-24 bulan di Wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
- b. Ada hubungan pemberian ASI dengan status gizi balita usia 6-24 bulan di Wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
- c. Ada hubungan pemberian MP-ASI dengan status gizi balita usia 6-24 bulan di Wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa.



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah *survey analitik* dengan rancangan ”*Cross Sectional Study*“. Ini merupakan suatu rancangan yang mengkaji dinamika hubungan variabel independen (pola asuhan gizi) dengan variabel dependen (status gizi anak) yang diambil dalam waktu yang bersamaan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa. Puskesmas Tinggimoncong merupakan salah satu puskesmas yang berada di kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah semua balita usia 6-24 bulan yang berada di Wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

2. Sampel

Sampel adalah balita 6-24 bulan yang diambil dengan metode *Accidental Sampling* yaitu sampel yang ada pada saat penelitian.

3. Responden dalam penelitian ini adalah ibu dari anak usia 6-24 bulan.

D. Instrumen Penelitian

1. Kuesioner pola asuh ibu.
2. Timbangan dacin

E. Metode Pengumpulan Data

1. Data primer diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan responden yang menjadi sampel dengan menggunakan kuisisioner yang telah disediakan. Untuk mendapatkan informasi tentang status gizi, indikator berat badan anak diperoleh dengan menggunakan timbangan dacin.
 - a. Kuisisioner pola asuh ibu
Responden diminta menjawab pertanyaan yang tertera pada kuesioner penelitian dan memiliki salah satu jawaban dengan cara melingkari jawaban yang dianggap paling benar.
 - b. Pengukuran status gizi (BB/U)
Pengukuran status gizi anak dilakukan dengan pengukuran antropometri yaitu dengan pengukuran berat badan anak dengan menggunakan timbangan dacin.
2. Data Sekunder diperoleh di Puskesmas melalui kegiatan posyandu di wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa.

F. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi program computer SPSS for windows versi 15,0 dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Data yang diperoleh akan dianalisa secara univariat dan bivariat, yaitu:

- 1) Analisa Univariat
Analisa univariat dilakukan terhadap tiap-tiap variabel penelitian terutama untuk melihat tampilan distribusi frekuensi dan persentase dari tiap-tiap variabel.
- 2) Analisis Bivariat
Analisis bivariat dilakukan terhadap tiap-tiap variable dependen dan independen dengan menggunakan uji *Chi-square*.

G. Pengujian Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui hubungan Pola asuhan gizi terhadap status gizi balita usia 6-24 bulan, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji *Chi-square* pada tingkat kemaknaan (α)= 0,05.

$$X^2 = \sum \frac{(o-E)^2}{E}, \text{ dimana}$$

\sum = jumlah

o = Nilai yang diamati

E = Nilai diharapkan

Penilaian/interpretasi:

- Jika nilai $p > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi, tidak terdapat hubungan yang bermakna.
- Jika nilai $p < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi, tidak terdapat hubungan yang bermakna.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa, mulai tanggal 2 Agustus sampai tanggal 14 September 2010, dimana sampel yang diperoleh sejumlah 55 balita usia 6-24 bulan. Metode penelitian yang digunakan adalah *survey analitik* dengan rancangan ”*Cross Sectional Study*“. Ini merupakan suatu rancangan yang mengkaji dinamika hubungan variabel independen (pola asuhan gizi) dengan variabel dependen (status gizi anak) yang diambil dalam waktu yang bersamaan.

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *Accidental Sampling* selama 14 kali posyandu. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung terhadap ibu balita usia 6-24 bulan (responden). Sedangkan untuk mengetahui status gizi balita usia 6-24 bulan dilakukan dengan cara mengukur berat badan dan umur anak kemudian menghitung Z-skornya yang dibandingkan dengan Standar Deviasi menurut WHO-NCHS.

1. Analisis Univariat

a. Umur responden

Tabel 5.1
Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur di Wilayah Kerja
Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa

Umur Ibu	Frekuensi	Persentase (%)
15-20	3	5.5
21-25	16	29.1
26-30	23	41.8
31-35	13	23.6
Total	55	100.0

Sumber : Data Primer, 2010

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari 55 responden terdapat 23 responden (41,8%) yang berumur antara 26-30 tahun dan hanya terdapat 3 (5,5%) responden berumur antara 15-20 tahun.

b. Pekerjaan responden

Tabel 5.2
Distribusi Responden Menurut Pekerjaan di Wilayah Kerja Puskesmas
Tinggimoncong Kabupaten Gowa

Pekerjaan ibu	Frekuensi	Persentase (%)
PNS	9	16.4
Wiraswasta	7	12.7
IRT	39	70.9
Total	55	100.0

Sumber : Data Primer, 2010

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa dari 55 responden didapatkan persentase tertinggi yaitu 39 responden (70,9%) berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

c. Jenis kelamin balita usia 6-24 bulan

Tabel 5.3
Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin Balita Usia 6-24 Bulan di
Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa

Jenis kelamin balita	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	33	60.0
Perempuan	22	40.0
Total	55	100.0

Sumber : Data Primer, 2010

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa dari 55 responden terdapat 33 responden (60,0%) yang memiliki balita yang berjenis kelamin laki-laki dan 22 responden (40,0%) yang memiliki balita yang berjenis kelamin perempuan.

d. Umur sampel

Tabel 5.4
Distribusi Responden Menurut Umur Balita Usia 6-24 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa

Umur balita	Frekuensi	Persentase (%)
6-12	40	72.7
13-24	15	27.3
Total	55	100.0

Sumber: Data Primer, 2010

Tabel 5.4 menunjukkan dari 55 responden terdapat 40 responden (72,7%) yang memiliki balita yang berusia antara 6-12 bulan dan 15 responden (27,3%) yang memiliki balita yang berusia antara 13-24 bulan.

e. Status gizi balita usia 6-24 bulan

Tabel 5.5
Distribusi Responden Berdasarkan Status Gizi Balita Usia 6-24 Bulan Menurut BB/U di Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa

Status gizi balita	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	49	89.1
Kurang	6	10.9
Total	55	100.0

Sumber : Data Primer, 2010

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari 55 responden terdapat 49 responden (89,1%) yang memiliki balita yang berstatus gizi baik dan 6 responden (10,9%) memiliki balita yang berstatus gizi kurang.

f. Pemberian kolostrum

Tabel 5.6
Distribusi Responden Berdasarkan Pemberian Kolostrum Pada Balita
Usia 6-24 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong
Kabupaten Gowa

Pemberian kolostrum	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	53	96.4
Kurang	2	3.6
Total	55	100.0

Sumber : Data Primer, 2010

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa dari 55 responden terdapat 53 responden (96,4%) yang memberi kolostrum kepada balitanya dan 2 responden (3,6%) yang tidak memberi kolostrum.

g. Praktek pemberian ASI eksklusif

Tabel 5.7
Distribusi Responden Berdasarkan Pemberian ASI Eksklusif Pada Balita
Usia 6-24 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong
Kabupaten Gowa

Pemberian ASI eksklusif	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	40	72.7
Kurang	15	27.3
Total	55	100.0

Sumber : Data Primer, 2010

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa dari 55 responden terdapat 40 responden (72,7%) yang memberi ASI eksklusif kepada balitanya dan 15 responden (27,3%) yang tidak memberi ASI eksklusif.

h. Pemberian MP-ASI

Tabel 5,8
Distribusi Responden Berdasarkan Pemberian MP-ASI Pada Balita Usia
6-24 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong
Kabupaten Gowa

Pemberian MP-ASI	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	40	72.7
Kurang	15	27.3
Total	55	100.0

Sumber : Data Primer, 2010

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa dari 55 responden terdapat 40 responden (72.7%) yang memberi MP ASI pada balitanya dengan kategori baik dan 15 responden (27,3%) yang memberi MP ASI pada balitanya dengan kategori kurang.

2. Analisis Bivariat

a. Hubungan pemberian kolostrum dengan status gizi balita usia 6-24 bulan

Tabel 5.9
Distribusi Hubungan Pemberian Kolostrum dengan Status Gizi Balita
Usia 6-24 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong
Kabupaten Gowa

Pemberian Kolostrum	status gizi anak				Total		p
	Baik		Kurang		n	%	
	N	%	n	%			
Baik	49	92,5	4	7,5	53	100.0	0,000
Kurang	0	.0	2	100.0	2	100.0	
Total	49	89.1	6	10.9	55	100.0	

Sumber : Data Primer, 2010

Dari tabel 5.9 menunjukkan bahwa dari 55 responden terdapat 53 responden yang memberikan kolostrum kepada anaknya dengan kategori baik terdapat 49 responden (92,5%) yang memiliki balita berstatus gizi baik dan 4 responden (7,5%) yang memiliki balita yang berstatus gizi kurang. sedangkan dari 2 responden yang dalam kategori kurang dalam pemberian

kolostrum terdapat 2 responden yang memiliki balita berstatus gizi kurang dengan persentase 100%.

Hasil uji chi-square diperoleh nilai $p = 0,003 < 0.05$, ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi, dari hasil penelitian terdapat hubungan antara pemberian kolostrum dengan status gizi balita usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa Tahun 2010.

b. Hubungan pemberian ASI eksklusif dengan status gizi balita usia 6-24 bulan

Tabel 5.10
Distribusi Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Status Gizi Balita
Usia 6-24 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong
Kabupaten Gowa

Pemberian ASI eksklusif	status gizi anak				Total		P
	Baik		Kurang		n	%	
	n	%	n	%			
Baik	40	100.0	0	.0	40	100.0	0,000
Kurang	9	60.0	6	40.0	15	100.0	
Total	49	89.1	6	10.9	55	100.0	

Sumber : Data Primer, 2010

Tabel 5.10 menunjukkan bahwa dari 55 responden terdapat 40 responden yang memberikan ASI eksklusif dengan kategori baik kepada anaknya kesemuanya berstatus gizi baik. Sedangkan dari 15 responden yang termasuk dalam kategori kurang dalam pemberian ASI eksklusif kepada anaknya terdapat 9 responden (60,0%) yang memiliki anak berstatus gizi baik dan 6 responden (10,9%) yang memiliki anak yang berstatus gizi kurang.

Hasil uji chi-square diperoleh nilai $P = 0,000 < 0.05$, ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi, dari hasil penelitian didapatkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara praktek pemberian ASI eksklusif dengan status gizi balita usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa Tahun 2010.

c. Hubungan frekuensi pemberian MP-ASI dengan status gizi

Tabel 5.11

Distribusi Hubungan Pemberian MP-ASI Dengan Status Gizi Balita Usia 6-24 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa

Pemberian MP-ASI	status gizi anak				Total		p
	Baik		Kurang		n	%	
	n	%	n	%			
Baik	40	100.0	0	.0	40	100.0	0,000
Kurang	9	60.0	6	40.0	15	100.0	
Total	49	89.1	6	10.9	55	100.0	

Sumber : Data Primer, 2010

Tabel 5.12 menunjukkan bahwa dari 55 responden terdapat 40 responden (100%) yang memberikan MP-ASI kepada anaknya dengan kategori baik yang kesemuanya berstatus gizi baik. Sedangkan dari 15 responden yang frekuensi pemberian MP-ASI dengan kategori kurang baik terdapat 9 responden (60,0%) yang memiliki anak yang berstatus gizi baik dan 6 responden (40,0%) yang memiliki anak yang berstatus gizi kurang.

Hasil uji chi-square diperoleh nilai $P = 0,000 < 0,005$, ini berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi, terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi pemberian MP-ASI dengan status gizi balita usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa Tahun 2010.

B. Pembahasan

1. Status gizi balita

Status gizi adalah keadaan individu atau kelompok yang ditentukan oleh derajat kebutuhan fisik akan energi dan zat gizi lain yang diperoleh dari pangan dan makanan yang dampak fisiknya diukur secara antropometri. (Suyatno, 2009: 5).

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi (Almatsier, 2001: 3).

Penilaian status gizi balita yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penilaian secara antropometri dengan menggunakan indeks antropometri Berat Badan menurut Umur (BB/U) selanjutnya hasil indeks BB/U dihitung Z-skornya untuk menentukan keadaan gizi balita. penimbangan berat badan dilakukan dengan menggunakan timbangan dacin.

Berdasarkan hasil penelitian, khususnya untuk di wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa tahun 2010, dari 55 responden terdapat 49 responden yang memiliki balita yang berstatus gizi baik dengan persentase 89,1 dan terdapat 6 responden memiliki balita yang berstatus gizi kurang dengan persentase 10,9%.

Dari hasil penelitian, terdapat balita yang berstatus gizi kurang dapat disebabkan oleh berbagai faktor bukan hanya disebabkan oleh pola asuhan saja. Terjadinya gizi kurang juga dapat disebabkan oleh rendahnya intake makanan terhadap kebutuhan gizi balita. Menurut Supriasa (2002: 12) bahwa status gizi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor lain yaitu penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung yaitu asupan makanan dan penyakit infeksi sedangkan penyebab tidak langsung yaitu persediaan makanan di rumah, perawatan anak dan pelayanan kesehatan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asta Qauliyah yang berjudul Pola Asuh dalam hubungan dengan status gizi anak balita ditinjau dari pekerjaan, pendapatan, pengeluaran orang tua di daerah Sulawesi selatan Tahun 2006 bahwa masih banyaknya balita di Makassar yang berstatus gizi kurang disebabkan oleh masalah ekonomi, karena ternyata, sebagian

besar penderita gizi kurang berasal dari keluarga kurang mampu, oleh karena itu untuk meningkatkan status gizi suatu masyarakat erat kaitannya dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa status gizi balita tidak hanya dipengaruhi oleh pola asuhan gizi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan di wilayah kerja puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa Tahun 2010.

2. Pemberian kolostrum

Kolostrum adalah ASI yang keluar pertama kali, berwarna jernih kekuning-kuningan dan kaya akan zat anti bodi. Kolostrum dikeluarkan pada hari-hari pertama sampai kira-kira hari kelima setelah bayi dilahirkan. Produksi kolostrum untuk setiap ibu tidak sama, karena tergantung dari reaksi yang disebabkan oleh hisapan bayi. Warna kolostrum yang kekuningan berbeda dengan ASI biasanya menyebabkan para ibu enggan memberikan kolostrum pada bayinya, bahkan sengaja membuangnya. (Arisman, 2007).

Berdasarkan hasil penelitian dari 55 responden terdapat 53 responden yang memberikan kolostrum kepada anaknya dengan kategori baik terdapat 49 responden yang memiliki balita berstatus gizi baik dengan persentase 92,5% dan 4 responden yang memiliki balita yang berstatus gizi kurang dengan persentase 7,5% . Dari hasil tersebut dapat kita lihat bahwa status gizi pada balita tidak hanya dipengaruhi oleh pola asuh gizi tetapi dapat dipengaruhi oleh faktor lain, menurut Supariasa (2002: 12) mengatakan bahwa status gizi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung yaitu asupan makan dan penyakit infeksi sedangkan penyebab

tidak langsung yaitu persediaan makanan di rumah, perawatan anak dan pelayanan kesehatan. Sedangkan dari 2 responden yang dalam kategori kurang dalam pemberian kolostrum terdapat 2 responden yang memiliki balita berstatus gizi kurang dengan persentase 100%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dhia Anggraeni yang berjudul Hubungan pola asuh ibu dengan status gizi balita di desa lencoh wilayah kerja puskesmas selo boyolali yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pola asuh gizi pada balita dari indikator pemberian kolostrum dengan status gizi balita ditunjukkan dari harga p-value yang diperoleh yaitu $0,001 < 0,05$.

3. Pemberian ASI eksklusif

Menurut Departemen Kesehatan RI, ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman tambahan lain pada bayi berumur 0-6 bulan. Pemberian ASI secara penuh sangat dianjurkan oleh para ahli gizi di seluruh dunia. Disamping itu ASI juga mengandung semua zat gizi seperti lemak, protein, mineral dan vitamin (Krisnatuti, 2000: 27). Jadi pemberian ASI kepada bayi itu sangat penting sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik.

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ رَضَاعَةَ إِيَّاهُ مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ وَإِيَّاهُ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالذَّمَّ

Artinya

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id ia berkata; Aku mendengar Sa'id bin Musayyab berkata; "Tidak berlaku hukum penyusuan kecuali pada bayi yang masih dalam gendongan. Jika tidak, maka apa yang akan menumbuhkan darah dan daging.

Selain bayi diberi ASI sampai berusia 6 bulan yang disebut dengan ASI Eksklusif sebaiknya tetap tetap dilanjutkan sampai umur 2 tahun jika

ingin melanjutkan penyusannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-baqarah/2:233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Terjemahnya

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

Dari hadist dan firman Allah SWT di atas bahwa ASI sangat dibutuhkan oleh bayi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh sebab itu para ibu hendaknya memberikan ASI kepada bayinya sebagai suatu kewajiban dan tanggung jawab. Jika ingin menyempurnakan penyusuan, itu juga dibolehkan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 55 responden terdapat 40 responden yang memberikan ASI eksklusif dengan kategori baik kepada anaknya kesemuanya berstatus gizi baik. Sedangkan dari 15 responden yang termasuk dalam kategori kurang dalam pemberian ASI eksklusif kepada anaknya terdapat 9 (60,0%) anak yang berstatus gizi baik dan 6 (10,9%) anak yang berstatus gizi kurang. Dari hasil tersebut dapat kita lihat bahwa status gizi pada balita tidak hanya dipengaruhi oleh pola asuh gizi tetapi dapat dipengaruhi oleh faktor lain, menurut Supariasa (2002: 12) mengatakan bahwa status gizi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung yaitu asupan makan dan penyakit infeksi sedangkan penyebab tidak langsung yaitu persediaan makanan di rumah, perawatan anak dan pelayanan kesehatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ninik Rokhana yang berjudul hubungan antara pendapatan keluarga dan pola asuh gizi dengan status gizi anak balita di betokan demak menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara pola asuh gizi pada balita dari indikator pemberian ASI Eksklusif dengan status gizi balita ditunjukkan dari harga p-value yang diperoleh yaitu $0,001 < 0,05$.

4. Pemberian MP-ASI

Makanan pendamping ASI adalah makanan yang diberikan kepada bayi/anak disamping ASI untuk memenuhi kebutuhan gizinya. MP-ASI diberikan mulai umur 6 bulan. Dan MP-ASI merupakan makanan peralihan dari makanan ASI ke makanan keluarga, pengenalan dan pemberian MP-ASI harus dilakukan secara bertahap baik bentuk maupun jumlahnya.s

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 55 responden yang memberikan MP-ASI kepada anaknya dengan kategori baik terdapat 40 (57,0%) responden yang memiliki anak yang kesemuanya status gizi baik. Sedangkan dari 15 responden yang pemberian MP-ASI dengan kategori kurang baik kepada anaknya terdapat 9 (60,0%) responden yang memiliki anak yang berstatus gizi baik dan 6 (40,0%) responden yang memiliki anak yang berstatus gizi kurang. Dari hasil tersebut dapat kita lihat bahwa status gizi pada balita tidak hanya dipengaruhi oleh pola asuh gizi tetapi dapat dipengaruhi oleh faktor lain, menurut Supariasa (2002: 12) mengatakan bahwa status gizi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung yaitu asupan makan dan penyakit

infeksi sedangkan penyebab tidak langsung yaitu persediaan makanan di rumah, perawatan anak dan pelayanan kesehatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Endang Suwiji yang berjudul Faktor yang mempengaruhi status gizi pada balita usia 4-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Medang Kabupaten Blora dari indikator pemberian makanan pendamping ASI dengan status gizi balita ditunjukkan dari harga p-value yang diperoleh yaitu $0,001 < 0,05$.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai Hubungan Pola Asuhan Gizi dengan Status Gizi Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa tahun 2010, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Ada hubungan pemberian kolostrum dengan status gizi balita usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
- b. Ada hubungan pemberian ASI eksklusif terhadap status gizi balita usia 6-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa.
- c. Ada hubungan pemberian MP-ASI terhadap status gizi balita usia 6-24 di wilayah kerja Puskesmas Tinggimoncong Kabupaten Gowa

B. Implikasi

- a. Diharapkan kepada para ibu agar memberikan kolostrum kepada bayinya karena merupakan cairan emas kaya antibodi yang pertama kali keluar dari puting payudara ibu setelah melahirkan.
- b. Diharapkan kepada para ibu agar memberikan ASI karena memiliki banyak manfaat yang terutama berperan dalam menyehatkan dan mencerdaskan bayi.
- c. Diharapkan kepada para ibu agar memberikan MP-ASI tepat pada waktunya, yaitu umur ≥ 6 bulan agar dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi.

- d. Diharapkan kepada ibu agar selalu memperhatikan pola asuhan gizi anaknya untuk perkembangan dan pertumbuhannya.
- e. Diharapkan kepada ibu yang memiliki balita agar rutin membawa anaknya ke tempat-tempat pelayanan kesehatan seperti posyandu sehingga status kesehatan anaknya dapat dikontrol terus oleh ibunya sendiri dan juga oleh petugas kesehatan.



Umur Ibu	Frekuensi	Persentase
15-20	3	5.5
21-25	16	29.1
26-30	23	41.8
31-35	13	23.6
Total	55	100.0

pendidikan ibu

pendidikan ibu	Frekuensi	Persentase
sd	1	1.8
smp	10	18.2
sma	36	65.5
pt	8	14.5
Total	55	100.0

pekerjaan ibu

pekerjaan ibu	Frekuensi	Persentase
pns	9	16.4
wiraswasta	7	12.7
irt	39	70.9
Total	55	100.0

jenis kelamin balita

jenis kelamin balita	Frekuensi	Persentase
laki-laki	33	60.0
perempuan	22	40.0
Total	55	100.0

Umur Balita

Umur balita	Frekuensi	Persentase
6-12	40	72.7
13-24	15	27.3
Total	55	100.0

status gizi balita

status gizi balita	Frekuensi	Persentase
baik	49	89.1
kurang	6	10.9
Total	55	100.0

pemberian kolostrum

pemberian kolostrum	Frekuensi	Persentase
baik	53	96.4
kurang	2	3.6
Total	55	100.0

pemberian ASI eksklusif

pemberian ASI eksklusif	Frekuensi	Persentase
baik	40	72.7
kurang	15	27.3
Total	55	100.0

pemberian MP-ASI

pemberian MP-ASI	Frekuensi	Persentase
baik	40	72.7
kurang	15	27.3
Total	55	100.0

pemberian colostrum * status gizi anak Crosstabulation

pemberian colostrum	status gizi anak				Total	
	baik		kurang		n	%
	n	%	n	%		
baik	49	92.5%	4	7.5%	53	100.0%
kurang	0	.0%	2	100.0%	2	100.0%
Total	49	89.1%	6	10.9%	55	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	16.950(b)	1	.000		
Continuity Correction(a)	8.772	1	.003		
Likelihood Ratio	9.545	1	.002		
Fisher's Exact Test				.010	.010
Linear-by-Linear Association	16.642	1	.000		
N of Valid Cases	55				

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .22.

pemberian ASI eksklusif * status gizi anak Crosstabulation

pemberian ASI eksklusif	status gizi anak				Total	
	baik		kurang		n	%
	n	%	n	%		
baik	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%
kurang	9	60.0%	6	40.0%	15	100.0%
Total	49	89.1%	6	10.9%	55	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	17.959(b)	1	.000		
Continuity Correction(a)	14.079	1	.000		
Likelihood Ratio	17.717	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	17.633	1	.000		
N of Valid Cases	55				

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.64.

pemberian MP-ASI * status gizi anak Crosstabulation

pemberian MP-ASI	status gizi anak				Total	
	baik		kurang		n	%
	n	%	n	%		
baik	40	100.0%	0	.0%	40	100.0%
kurang	9	60.0%	6	40.0%	15	100.0%
Total	49	89.1%	6	10.9%	55	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	17.959(b)	1	.000		
Continuity Correction(a)	14.079	1	.000		
Likelihood Ratio	17.717	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	17.633	1	.000		
N of Valid Cases	55				

a Computed only for a 2x2 table

b 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.64.