

**HUBUNGAN PERAWATAN PAYUDARA DENGAN PRODUKSI ASI
PADA IBU NIFAS DI RSUD SINJAI**



***Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Keperawatan
Jurusan Keperawatan Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar***

Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
70300106053
M A K A S S A R**

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 09 Agustus 2010

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
NITA HAERIATY

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Hubungan Perawatan Payudara dengan Produksi ASI Pada Ibu Nifas di RSUD Sinjai**” yang disusun oleh Nita Haeriaty, Nim: 70300106053, mahasiswa Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 25 Agustus 2010 M, bertepatan dengan 15 Ramadhan 1431 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan (dengan berbagai perbaikan).

Makassar, 25 Agustus 2010 M
15 Ramadhan 1431 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Risnah, SKM, S.Kep.Ns.M.Kes (.....)
Sekretaris : Nur Hidayah, S.Kep.Ns.M.Kes (.....)
Penguji I : Prof. Dr.M.Irfan Idris, M.Ag (.....)
Penguji II : Hasnah, S.SIT,M.Kes (.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

dr. H. M. Furqaan Naiem, M.Sc, Ph.D
NIP. 19580404 198903 1 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir saya yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan (S.Kep) pada program studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Hubungan Perawatan Payudara Dengan Produksi ASI Pada Ibu Nifas di RSUD Sinjai”.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun merupakan input dalam penyempurnaan selanjutnya. Semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang dan masyarakat pada umumnya.

Mengawali ucapan terima kasih ini disampaikan penghargaan yang teristimewa kepada ayahanda dan ibunda tercinta atas segala perhatian, kasih sayang, do'a restu serta pengorbanannya yang tak terhingga. Ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak prof.Dr.H.Azhar Arsyad,MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak dr. H. M. Furqan Naiem, M. Sc, P.hD selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.

3. Ibu Nur Hidayah, S.Kep, Ns, M.Kes selaku ketua Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan bimbingan selama masa pendidikan.
4. Ibu Risnah, SKM, S.Kep, Ns, M.Kes dan Ibu Nur Hidayah, S.Kep,Ns, M.Kes selaku dosen pembimbing yang dengan kerelaan dan keikhlasannya memberikan bimbingan dari awal hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Hasnah,S.SIT,M.Kes, selaku penguji yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Prof.Dr.M.Irfan idris, M.Ag, selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Direktur RSUD Sinjai, dan Kepala Instalasi Nifas yang telah memberikan ijin penelitian penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh teman-teman yang banyak membantu dan memberikan motivasi serta kebersamaan menghadapi tantangan dan cita-cita.
9. Seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis berharap panelitian ini dapat berguna bagi kita semua khususnya perkembangan ilmu keperawatan.

Makassar, 3 Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Masa Nifas	10
B. Perawatan Payudara	13
C. Produksi ASI	20
BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti.....	34
B. Kerangka Konsep Penelitian	35
C. Kerangka Kerja	36
D. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif	36
E. Hipotesis Penelitian	37

BAB IV METODELOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
C. Populasi dan Sampel	38
D. Prosedur Perawatan Payudara	41
E. Pengumpulan Data	44
F. Etika Penelitian	48

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN


A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan.....	54

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Distribusi Ibu Nifas Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Berdasarkan Usia	50
Tabel 5.2	Distribusi Ibu Nifas Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Berdasarkan Agama	51
Tabel 5.3	Distribusi Ibu Nifas Di Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai berdasarkan Pendidikan	51
Tabel 5.4	Distribusi Ibu Nifas Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Berdasarkan Perawatan Payudara	52
Tabel 5.5	Distribusi Ibu Nifas Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Berdasarkan Produksi	52
Tabel 5.6	Distribusi Ibu Nifas Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Berdasarkan Perawatan Payudara Dengan Hubungan Produksi ASI	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	35
Gambar3.2	36



ABSTRAK

Nama : Nita Haeriaty
Nim : 70300106053
Judul : Hubungan Perawatan Payudara Dengan Produksi ASI Pada Ibu Nifas Di RSUD Sinjai.

Berdasarkan data Medical Record RSUD Sinjai, pasien yang dirawat di ruang perawatan nifas tahun 2008 sebanyak 1.272 orang dan tahun 2009 sebanyak 1.419 orang. Berdasarkan angka tersebut dilihat cukup tinggi maka peranan rumah sakit dalam memberi pelayanan kepada masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak dalam hal ini bayi perlu ditingkatkan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan perawatan payudara dengan produksi ASI pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan *cross sectional*. dengan populasinya adalah ibu nifas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai mulai pada bulan Juli - Agustus 2010 dan Pengambilan besaran sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Stanley Lameshow (1982), dan dengan derajat kepercayaan 95% dengan data prevalensi Berdasarkan data Medical Record RSUD Sinjai tahun tahun 2009 sebanyak 1.419 orang, dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode check list.

Dari hasil analisis statistik pada hasil *uji chi-square* dengan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ pada hubungan antara perawatan payudara dengan produksi ASI diperoleh $p = 0,041$ ($p < \alpha$) yang berarti H_0 ditolak yang berarti ada hubungan antara perawatan payudara dengan produksi ASI.

Sebaiknya ibu pada masa nifas dapat mempersiapkan nutrisi bayi berupa ASI sedini mungkin sehingga kebutuhan nutrisi bayi terpenuhi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah gizi yang paling banyak terjadi di Indonesia pada saat ini adalah kurangnya kalori dan protein, hal ini banyak ditemukan pada bayi dan anak-anak. Terjadinya kerawanan gizi pada bayi lebih banyak disebabkan karena selain makanan yang kurang, juga karena Air Susu Ibu (ASI) banyak diganti dengan susu botol, dengan cara dan jumlah yang tidak memenuhi kebutuhan. Hal ini merupakan bukti adanya perubahan sosial dan budaya yang berdampak negatif yang dapat mempengaruhi perkembangan bayi dan perkembangan generasi muda di Indonesia selanjutnya.

Sejumlah riset terhadap sejumlah bayi di lingkungan yang berbeda, termasuk kota – kota industri di barat menunjukkan bahwa bayi yang diberi ASI lebih jarang terkena infeksi pernafasan, infeksi telinga, infeksi saluran kemih, alergi, asma dan lain – lain. Dalam suatu percobaan sejumlah bayi hanya diberi ASI tanpa tambahan susu formula atau makanan padat lain hingga mereka berusia 15 minggu. Ternyata, hingga usia tujuh tahun mereka terhindar dari penyakit radang saluran pernafasan. Sejumlah bayi yang diberi ASI dini hingga mereka berusia 13 minggu ternyata terhindar dari penyakit radang usus sampai mereka berusia 18 bulan atau dua tahun. Pada riset di atas dengan memperhitungkan latar belakang social yang terlihat dari pengambilan sampel dari lingkungan yang

berbeda menunjukkan bahwa perbedaan dalam pemberian ASI akan menunjukkan perbedaan kesehatan bayi tersebut. Dengan demikian disimpulkan bahwa penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan antara pemberian ASI terhadap kehidupan terutama kesehatan bayi.

Peningkatan pemberian ASI perlu dilakukan dalam upaya peningkatan kesehatan bagi bayi dan ibu, upaya tersebut dapat dilakukan antara lain dengan cara pemberian ASI dini (Kepmenkes, 2002). Pemerintah telah berupaya dalam mensosialisasikan pemberian ASI termasuk ASI dini. Hal ini terbukti dengan telah dicanangkan Gerakan Nasional Peningkatan Penggunaan Air Susu Ibu (GNPPASI) oleh Presiden RI pada peringatan Hari Ibu tanggal 22 Desember 1990 yang bertemakan ” Dengan ASI kaum ibu memelopori peningkatan kualitas manusia Indonesia ”. Pemberian ASI tanpa makanan lain khususnya pada enam bulan pertama setelah kelahiran disebut dengan menyusui secara eksklusif. Selanjutnya bayi perlu mendapatkan makanan pendamping ASI, sedangkan pemberian ASI diteruskan sampai anak berusia dua tahun (Siregar, M., 2004). Dan dirumuskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999 / 2004 dan Program Pembangunan Nasional (Propenas) mengamanatkan bahwa pembangunan diarahkan pada peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM). Modal dasar pembentukan manusia berkualitas tersebut dimulai sejak masa bayi dalam kandungan sampai masa pemberian Air Susu Ibu (ASI) sejak usia dini.

Air susu ibu (ASI) merupakan makanan alamiah yang pertama dan utama bagi bayi baru lahir. Air susu ibu dapat memenuhi kebutuhan bayi atau energi dan

gizi selama empat sampai enam bulan pertama kehidupan, sehingga dapat mencapai tumbuh kembang yang optimal. Selain sebagai sumber energi dan zat gizi pemberian ASI juga merupakan media untuk menjalin hubungan psikologi antara ibu dan bayinya. Hubungan ini akan menghantarkan kasih sayang dan perlindungan ibu terhadap bayinya serta memikat dan perlindungan ibu terhadap bayinya serta memikat kemesraan bayi terhadap ibunya, sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan erat (Oswari E. Dr. OPH, 2004).

Hasil penelitian yang dilakukan Swasono (2002) mengatakan bahwa pemberian ASI tak lepas dari tatanan budaya, dimana perilaku menyusui pada masyarakat tidak terlepas dari kebiasaan, adat (budaya), tatanan norma yang berlaku dimasyarakat (sosial) serta kepercayaan (agama). Hasil pengamatan Swasono tersebut, bahwa dalam menyusui bayinya, ibu tidak memilih tempat dan saat yang khusus untuk menyusui, kecuali atas alasan kesopanan, dan ketika bayi mulai menangis karena lapar. Selain itu, setiap kali hendak menyusui, ibu tidak merasa perlu membersihkan dirinya atau payudaranya terlebih dahulu, karena hal itu dianggap terlalu merepotkan. Bahkan ibu kadang tidak memperhatikan tentang, lama, teknik dan cara menyusui, posisi saat menyusui serta kesiapan ibu menyusui (Alimul A, 2003).

Berdasarkan *Konvensi Hak-Hak Anak* Tahun 1990 menegaskan bahwa tumbuh kembang secara optimal merupakan salah satu hak anak. Untuk mendukung tumbuh kembang anak, ASI adalah salah satu faktor yang berperan dalam tumbuh kembang tersebut. Dimana ASI merupakan makanan yang paling sempurna, dengan kandungan gizi sesuai kebutuhan untuk pertumbuhan dan

perkembangan yang optimal bayi, perkembangan kecerdasan, zat kekebalan (mencegah dari berbagai penyakit) serta dapat menjalin hubungan cinta antara bayi dengan ibu. Selain merupakan kebutuhan, juga sebagai hak asasi bagi bayi yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Hal ini sejalan dengan program yang telah dipopulerkan pada pekan ASI Sedunia Tahun 2000 dengan tema “ Memberi ASI adalah Hak Asasi Ibu; Mendapat ASI adalah Hak Asasi bayi”.

Dalam mendukung pemenuhan ASI bagi bayi sesuai dengan yang diharapkan maka kualitas menyusui merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh ibu sehingga produksi ASI bisa baik. Namun bagi sebagian ibu dalam memberikan ASI kualitas menyusui kurang diperhatikan tentang lama, frekuensi, teknik, cara, posisi dan kesiapan ibu saat menyusui. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh pengetahuan yang kurang memadai. Faktor budaya, persepsi yang keliru tentang payudara dan menyusui atau pemahaman yang kurang tentang peran dan fungsi ibu saat menyusui. Akibatnya Air Susu Ibu (ASI) kadang terbuang percuma atau tidak dimanfaatkan (Alimul A, 2003).

Guna menjamin pemenuhan ASI bagi bayi secara optimal, maka faktor yang sangat menentukan dalam pemberian ASI adalah kualitas menyusui bagi ibu, yang mencakup lama dan frekuensi menyusui, teknik dan cara menyusui, posisi dan pelekatan menyusui serta kesiapan ibu menyusui. Dengan memperhatikan kualitas menyusui tersebut diharapkan dapat meningkatkan kelancaran ASI (Alimul A, 2003).

Kelancaran ASI juga dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk makanan yang ibu konsumsi, psikologis ibu, obat-obatan dan perawatan payudara sejak kehamilan dan setelah melahirkan. Untuk perawatan payudara ibu dapat dilaksanakan oleh perawat selama ibu masih di rawat di rumah sakit ataupun dapat dilakukan oleh ibu sendiri.

Meskipun ASI begitu penting bagi bayi, namun masih banyak Ibu yang tidak memberikan ASI pada bayinya. Beberapa faktor penyebab yang berhubungan dengan tidak tercapainya pemberian ASI pada bayi antara lain : puting susu tidak menonjol sehingga bayi sulit menghisap, produksi ASI sedikit sehingga tidak cukup dikonsumsi bayi, infeksi pada payudara, payudara bengkak atau bernanah, muncul benjolan di payudara, gizi kurang, puting tidak menonjol dan lain - lain. Akumulasi permasalahan tersebut berawal dari perawatan secara totalitas semasa kehamilan.

Perawatan payudara selama kehamilan adalah salah satu bagian penting yang harus diperhatikan sebagai persiapan untuk menyusui nantinya. Payudara perlu dipersiapkan sejak masa kehamilan sehingga bila bayi lahir dapat segera berfungsi dengan baik pada saat diperlukan. Pengurutan payudara untuk mengeluarkan sekresi dan membuka duktus dan sinus lactiferiforus sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan benar karena pengurutan yang salah dapat menimbulkan kontraksi pada rahim sehingga terjadi kondisi seperti pada uji kesejahteraan janin menggunakan uterotonika. Basuhan lembut setiap hari pada areola dan puting susu akan dapat mengurangi retak dan lecet pada area tersebut tetapi perlu diingat setelah usia kehamilan lebih 34 minggu. Untuk sisa sekresi

ASI yang mengering pada puting susu, lakukan pembersihan dengan menggunakan campuran gliserin dan alkohol. Karena payudara menegang, sensitif dan menjadi lebih berat maka sebaiknya gunakan penopang payudara yang sesuai (*brassiere*).

Saat kehamilan payudara akan membesar dan daerah sekitar puting akan lebih gelap warnanya (*hyperpigmentasi*) dan juga lebih sensitif. Semua ini terjadi untuk persiapan ibu hamil untuk memberikan ASI pada bayinya kelak. Disamping perawatan payudara dengan perlakuan massase, ibu hamil juga memerlukan istirahat yang cukup, mengendalikan tingkat emosional, dan makan makanan dengan gizi seimbang terutama mengkonsumsi tablet Fe secara rutin.

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa dalam satu tahun rata-rata empat juta jiwa bayi berusia 28 hari meninggal. Jika semua bayi di dunia segera diberi kesempatan menyusu sendiri dengan membiarkan kontak kulit ibu ke kulit bayi setidaknya selama satu jam maka satu juta nyawa ini dapat diselamatkan (Roesli U., 2002).

Peningkatan pemberian ASI perlu dilakukan dalam upaya peningkatan kesehatan bagi bayi dan ibu, upaya tersebut dapat dilakukan antara lain dengan cara pemberian ASI dini (Kepmenkes, 2002). Pemerintah telah berupaya dalam mensosialisasikan pemberian ASI termasuk ASI dini. Hal ini terbukti dengan telah dicanangkan Gerakan Nasional Peningkatan Penggunaan Air Susu Ibu (GNPPASI) oleh Presiden RI pada peringatan Hari Ibu tanggal 22 Desember

1990 yang bertemakan ” Dengan ASI kaum ibu mempelopori peningkatan kualitas manusia Indonesia ”.

Karena pentingnya ASI dan banyak manfaatnya maka di pibung perlu untuk melakukan penelitian tentang “ Hubungan Perawatan Payudara dengan Produksi ASI pada Ibu Nifas di RSUD Sinjai ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut “Apakah Ada Hubungan Perawatan Payudara dengan Produksi ASI pada Ibu Nifas di RSUD Sinjai ? “.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Diketuinya hubungan perawatan payudara dengan produksi ASI pada ibu nifas di RSUD Sinjai.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuinya produksi ASI pada ibu nifas di RSUD Sinjai.
- b. Diketuinya jumlah produksi ASI pada ibu nifas yang melakukan perawatan payudara di RSUD Sinjai.
- c. Diketuinya jumlah produksi ASI pada ibu nifas yang tidak melakukan perawatan payudara di RSUD Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

1. Terhadap Institusi Pendidikan

- a. Sebagai bahan masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ibu masa nifas tentang pentingnya perawatan payudara demi kelancaran produksi ASI.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan informasi bagi kepentingan pendidikan dan tambahan kepustakaan dalam pengembangan ilmu di Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan keperawatan.

2. Terhadap Rumah Sakit (Pelayanan Kesehatan)

- a. Sebagai bahan masukan yang bermakna dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kepada ibu-ibu yang menyusui bayinya.
- b. Sebagai bahan input untuk evaluasi program peningkatan pemberian ASI khususnya dan perawatan payudara ibu saat hamil dan melahirkan, dalam rangka membantu program pemerintah. Untuk mensukseskan keberhasilan pemberian ASI Eksklusif.

3. Terhadap Masyarakat

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui tata cara perawatan payudara dan pengaruhnya terhadap kelancaran produksi ASI pada ibu nifas.

4. Terhadap Peneliti

Merupakan pengalaman yang sangat berharga dalam rangka menambah wawasan pengetahuan mengenai perawatan payudara dengan kelancaran produksi ASI pada ibu nifas serta pengembangan diri dalam bidang penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Masa Nifas

1. Pengertian

Masa nifas (puerperium) adalah masa yang dimulai setelah plasenta keluar dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan semula (sebelum hamil). Masa nifas berlangsung selama kira-kira enam minggu.

Pada jam-jam pertama setelah melahirkan, seorang ibu akan segera beradaptasi mencakup semua sistem di dalam tubuh. Kebanyakan wanita masa nifas mempunyai pengalaman sedikit mengalami gangguan rasa nyaman sehubungan dengan perubahan-perubahan fisik dan cenderung lebih tertarik untuk istirahat, merasakan sakitnya perineum dan belajar tentang bayinya (Ari sulistyawati, 2009).

2. Involusi

Involusi adalah proses perubahan pada organ-organ reproduksi. Organ reproduksi yang mengalami involusi adalah :

a. Tinggi fundus uteri

- 1) Setelah bayi lahir setinggi pusat

- 2) Setelah plasenta lahir dua jari di bawah pusat
- 3) 5 hari masa nifas setengah simpisis pusat
- 4) Setelah 10 sampai dengan 12 hari post partum tidak teraba

b. Serviks

Setelah persalinan ostium eksterna dapat dimasuki oleh dua hingga tiga jari tangan, dan setelah enam minggu nifas serviks menutup. Karena robekan-robekan kecil yang terjadi selama dilatasi, serviks tidak pernah kembali ke keadaan sebelum hamil (nullipara) yang berupa lubang kecil seperti mata jarum. Serviks hanya kembali pada keadaan tidak hamil yang berupa lubang yang sudah sembuh, tertutup tapi berbentuk celah. Dengan demikian os serviks wanita yang sudah pernah melahirkan merupakan salah satu tanda yang menunjukkan riwayat kelahiran bayi lewat vagina

c. Endometrium (tempat plasenta)

Segara setelah plasenta dan ketuban, kontraksi muskuler dan trombosis menurunkan tempat plasenta ke suatu area yang meninggi dan bernodul tidak teratur, pertumbuhan endometrium ke atas menyebabkan pelepasan jaringan karakteristik penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka ini memungkinkan endometrium menjalankan siklusnya seperti biasa dan memungkinkan implantasi dan plasentasi untuk kehamilan di masa yang akan datang. Regenerasi endometrium selesai pada akhir minggu ketiga masa nifas, kecuali pada bekas tempat plasenta. Regenerasi pada tempat ini biasanya tidak sesuai sampai 6 minggu setelah melahirkan.

d. Topangan Otot Panggul

Struktur penopang uterus dan vagina bisa mengalami cedera sewaktu melahirkan dan masalah ginekologi dapat timbul di kemudian hari. Jaringan penopang dasar panggul yang terobek atau teregang saat ibu melahirkan memerlukan waktu sampai enam bulan untuk kembali ke tonus semula. Istilah relaksasi panggul berhubungan dengan pemajangan dan melemahnya topangan permukaan struktur panggul. Struktur ini terdiri atas uterus, dinding vagina posterior atas, kandung kemih rekrum. Walaupun relaksasi dapat terjadi pada setiap wanita, tetapi biasanya merupakan komplikasi langsung yang timbul terlambat akibat melahirkan.

3. Hemokonsentrasi

Pada masa hamil didapat hubungan pendek yang dikenal sebagai shunt antara sirkulasi ibu dan plasenta. Setelah melahirkan shunt akan hilang dengan tiba-tiba, volume darah pada ibu relative akan bertambah. Keadaan ini menimbulkan beban pada jantung sehingga dapat menimbulkan dekompensasi cordis pada penderita-penderita vitium cordis. Untungnya keadaan ini dapat diatasi dengan mekanisme kompensasi dengan timbulnya hemokonsentrasi sehingga volume darah kembali seperti semula. Umumnya hal ini terjadi pada hari-hari ketiga sampai lima hari masa nifas (Ferer, 2001).

B. Perawatan Payudara

1. Pengertian

Perawatan payudara adalah suatu tindakan perawatan khusus dengan pemberian rangsangan otot – otot buah dada untuk memperlancar pengeluaran ASI.

Selama sembilan bulan kehamilan, jaringan payudara tumbuh dan menyiapkan fungsinya menyediakan makanan bagi bayi baru lahir, setelah melahirkan ketika hormon yang dihasilkan placenta tidak lagi ada untuk menghambatnya, kelenjar pituitaria mengeluarkan prolaktin, sampai hari ketiga setelah melahirkan, terbukti adanya efek prolaktin pada payudara. Pembuluh darah payudara menjadi bengkak berisi darah menyebabkan hangat, bengkak dan rasa sakit. Sel-sel yang menghasilkan ASI mulai berfungsi dan ASI mulai mencapai puting melalui saluran susu, menghasilkan kolostrum yang telah mendahuluinya, kemudian laktasi dimulai, Perawatan payudara merupakan hal yang sangat penting bagi ibu nifas. Payudara harus dibersihkan dengan teliti setiap hari dengan pemijatan selama mandi dan dimulai pada hari kedua setelah melahirkan dan ketika hendak menyusui secara rutin. Hal ini akan mengangkat kolostrum yang kering atau sisa susu dan membantu mencegah akumulasi dan masuknya bakteri baik keputing maupun kemulut bayi (Bobak, 2005).

Dengan perawatan payudara yang dilakukan, akan memberikan manfaat antara lain : melancarkan refleks pengeluaran ASI atau refleks let down, meningkatkan volume ASI dan mencegah bendungan pada payudara yang bisa menyebabkan payudara bengkak.

Puting susu tidak boleh disentuh dengan tangan yang belum dicuci bersih dan saputangan tidak boleh digunakan sebagai ganjal dibalik BH untuk menghentikan perembesan ASI. Bantalan disposable kini sudah tersedia untuk keperluan ini dan dapat dikenakan dalam waktu relative singkat jika perembesan ASI menimbulkan masalah. Ibu harus menggunakan pakaian yang tidak menghalangi pemberian ASI.

Prosedur membersihkan puting berbeda antara rumah sakit yang satu dan rumah sakit lainnya. Namun selama puting berada dalam keadaan bersih, apakah dibersihkan dengan cara mengusapkan memakai air yang steril ataukah dibersihkan secara khusus dengan larutan pembersih, caranya tidak menjadi masalah. Setiap kerak atau air susu yang mengering dan setiap bekas krim/salep yang dioleskan sebelumnya harus dibersihkan dengan hati-hati. Larutan alcohol tidak boleh dipakai untuk membersihkan puting karena dapat membuat puting menjadi kering dan mudah pecah-pecah (Ferrer H, 2001).

Demi keberhasilan menyusui, payudara memerlukan perawatan sejak dini secara teratur. Perawatan selama kehamilan bertujuan agar selama masa menyusui kelak produksi ASI cukup, tidak terjadi kelainan pada payudara dan agar bentuk payudara tetap baik setelah menyusui. Pada umumnya, wanita

dalam kehamilan enam sampai dengan delapan minggu akan mengalami pembesaran payudara. Payudara akan terasa lebih padat, kencang, sakit dan tampak jelas di permukaan kulit adanya gambaran pembuluh darah yang bertambah serta melebar. Kelenjar Montgomery pada daerah areola tampak lebih nyata dan menonjol.

Sejak usia kehamilan dua bulan, sebaiknya wanita hamil mulai mengganti pakaian dalam (BH / bra) nya dengan ukuran yang lebih sesuai, dan dapat menopang perkembangan payudaranya. Biasanya diperlukan BH ukuran dua kali lebih besar dari ukuran yang biasa dipakai. Di samping pemakaian BH yang sesuai, untuk menunjang produksi ASI dan membantu mempertahankan bentuk payudara setelah selesai masa menyusui, perlu dilakukan latihan gerakan otot-otot badan yang berfungsi menopang payudara. Misalnya gerakan untuk memperkuat otot pektoralis : kedua lengan disilangkan di depan dada, saling memegang siku lengan lainnya, kemudian lakukan tarikan sehingga terasa tegangan otot-otot di dasar payudara.

Kebersihan / hygiene payudara juga harus diperhatikan, khususnya daerah papila dan areola. Pada saat mandi, sebaiknya papila dan areola tidak disabuni, untuk menghindari keadaan kering dan kaku akibat hilangnya lendir pelumas yang dihasilkan kelenjar Montgomery. Areola dan papila yang kering akan memudahkan terjadinya lecet dan infeksi.

Selama kehamilan, papila harus disiapkan agar menjadi lentur, kuat dan tidak ada sumbatan. Persiapan dilakukan setiap hari sebanyak dua kali

sehari setelah usia kehamilan tujuh bulan. Caranya dengan kompres masing-masing puting susu selama dua sampai tiga menit dengan kapas yang dibasahi minyak, kemudian tarik dan putar puting ke arah luar 20 kali, ke arah dalam 20 kali. Pijat daerah areola untuk membuka saluran susu. Bila keluar cairan, oleskan ke papila dan sekitarnya. Kemudian payudara dibersihkan dengan handuk yang lembut. Puting susu yang terbenam atau datar perlu dikoreksi agar dapat menonjol keluar sehingga siap untuk disusukan kepada bayi. Masalah ini dapat diatasi dengan bantuan pompa puting ("*nipple puller*") pada minggu terakhir kehamilan.

2. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Selama Perawatan payudara

Perawatan Payudara mempunyai pengaruh yang besar pada pengalaman menyusui dari ibu-ibu nifas. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Kaji keadaan payudara, areola dan putingnya. Tangani bagian yang keras dengan lap hangat dan lakukan masage.
- b. Memberikan dorongan pada ibu untuk mengenakan BH yang pas dan penyangga payudara dengan baik.
- c. Mengajarkan ibu untuk memasage payudara dari dinding dada dan mengarah keareola, hal ini mempermudah gerakan ASI atau kolostrum dari kelenjar penghasil ASI kesinus-sinus pengumpul dibawah areola.

- d. Apabila puting susu lecet oleskan kolostrum atau ASI yang keluar pada sekitar puting susu setiap selesai menyusui, menyusui tetap dilakukan dimulai dari puting yang tidak lecet.
 - e. Apabila lecet sangat berat dapat diistirahatkan selama 24 jam ASI dikeluarkan dan diminumkan dengan menggunakan sendok.
 - f. Perawatan dikerjakan secara teratur.
 - g. Kebersihan sehari-hari harus dipelihara.
 - h. Gizi ibu harus lebih baik dan lebih banyak dibandingkan pada waktu hamil.
 - i. Ibu harus percaya diri akan kemampuan menyusui bayinya.
 - j. Rasa cemas dan stress harus dihindari (Saifuddin 2001).
3. Tujuan perawatan payudara
 - a. Memperlancar sirkulasi darah
 - b. Mencegah terjadinya bendungan ASI
 - c. Memperlancar pengeluaran ASI
 4. Cara perawatan payudara pada masa nifas.
 - a. Membersihkan puting susu
 - a) Pengertian
Suatu cara untuk membersihkan puting susu dari kotoran sehingga terangkat dan tidak masuk kemulut dan tertelan oleh bayi.

b) Persiapan alat

- Kapas.
- Air masak
- Gelas.
- Kain (handuk bersih).

c) Cara kerja

- Kapas direndam dengan air masak
- Puting susu dibersihkan dengan kapas basah
- Kemudian dikeringkan dengan kain yang bersih
- Dilakukan pada saat sebelum dan sesudah menyusui.

b. Pengurutan atau massage

Pengurutan dilakukan dengan tujuan memberikan rangsangan pada kelenjar air susu ibu agar dapat memproduksi ASI, pengurutan dilakukan pada pagi dan sore hari, sebaiknya sebelum mandi dan diteruskan dengan penyiraman yang dilakukan sebelum mandi.

1) Persiapan alat.

- Minyak kelapa / olium 10 cc
- Pompa susu
- Gelas / botol susu.
- Air panas dalam baskom.
- Air dingin dalam baskom
- Handuk bersih / waslap.

2) Cara kerja

- a. Alat – alat disiapkan dekat ibu, cuci tangan dan melakukan pengurutan.
- b. Kedua telapak tangan diberi Oil.
- c. Buah dada kiri diurut dengan tangan kiri dan buah dada kanan diurut dengan tangan kanan bila ibu mengerjakan sendiri, bila dikerjakan oleh Bidan atau Perawat buah dada kiri diurut dengan tangan kanan dan buah dada kanan diurut dengan tangan kiri.
- d. Pengurutan dari tengah berputar kesamping, terus kebawah kerjakan berulang-ulang antara 10-15 kali.
- e. Bagian samping buah dada diurut dari pangkal keputing dilakukan 10- 15 kali.
- f. Pengurutan bagian bawah buah dada kearah puting dilakukan 15-20 kali.
- g. Pengetokan dengan buku-buku jari tangan dengan cepat dan teratur.

Setelah pengurutan diteruskan dengan penyiraman yaitu dengan cara

:

- a) Ibu duduk atau berdiri, pakaian bagian atas dibuka punggung ditutup dengan handuk.
- b) Kom air hangat dan dingin disediakan sebaiknya dikamar mandi.

- c) Mula-mula disiram air hangat dilakukan dengan cepat sampai 10 kali kemudian cepat diganti dengan air dingin sampai 10 kali penyiraman terakhir dengan air hangat setelah itu ibu mandi (Susilawati, 2008).

C. Produksi ASI

Jumlah ASI yang dikeluarkan tergantung dari frekuensi dan lamanya bayi mengisap payudara. Makin banyak dan lama ia mengisapnya makin banyak ASI yang diproduksi dan dikeluarkan. Jika bayi tersebut mendapatkan ASI yang cukup, ia akan buang air kecil setidaknya enam atau delapan kali selama 24 jam, jika bayi mendapatkan kalori yang cukup, ia akan buang air besar setidaknya dua sampai lima kali sehari.

Secara alamiah ASI di produksi secara berkesinambungan setelah payudara disusukan, maka terasa kosong dan lunak. Pada keadaan ini ASI tetap diproduksi dan tidak akan kekurangan sesuai dengan kebutuhannya asal bayi tetap mengisap dan menyusui. Perlu diketahui oleh ibu, bahwa bayi harus dibiarkan menyusui sepuasnya dan sesering mungkin tanpa jadwal yang ketat.

Menyusui yang dijadwalkan akan berakibat kurang baik, karena isapan bayi sangat berpengaruh pada rangsangan produksi ASI selanjutnya. Dengan menyusui tanpa dijadwal, sesuai kebutuhan bayi, akan mencegah banyak masalah yang mungkin timbul.

Begitu besarnya manfaat ASI sehingga dianjurkan bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun.

Allah SWT berfirman dalam Q.S al Baqarah (2) ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ^ط

Terjemahan :

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, (Q.S. Al Baqarah : 233).

Dalam ayat lain dijelaskan bahwa waktu menyapih selambat – lambatnnya selama dua tahun.

Allah SWT berfirman dalam surah al luqman (31) ayat 14 :

وَوَصَّيْنَا فِي ذَٰلِكَ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي غَمٍّ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Terjemahan :

Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya Telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun,(al luqman.14).

Semakin sering bayi menyusu, semakin kuat isapannya dan membuat proses menyusu semakin mantap dan lancar dan produksi ASI semakin banyak pula. Bahkan ada ibu yang bisa memproduksi dua liter susu perhari (Susilawati, 2008).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran produksi ASI, diantaranya :

1. Makanan

Agar produksi ASI meningkat, ibu yang menyusui dianjurkan untuk selalu mengkonsumsi makanan yang mengandung zat-zat gizi yang cukup, terutama sayuran hijau.

Selama kehamilan metabolisme ibu berubah sehingga terjadi penimbunan energi dalam bentuk lemak sebagai cadangan. Pada wanita hamil yang sehat penimbunan lemak ini kira-kira sebanyak 4 kg sesuai dengan penyimpangan sebanyak 35.000 kkal yang cukup untuk menyusui setiap hari. Selama menyusui lemak di ubah menjadi energi dalam air susu.

Energi dibutuhkan menutupi kandungan energi dari ASI yang disekresikan, ditambah lagi dengan energi yang diperlukan untuk memproduksi ASI. Ibu dengan gizi yang baik dapat memberikan ASI kepada bayinya pada bulan pertama kurang lebih 600 cc perhari, untuk itu nutrisi yang baik untuk ibu menyusui sangat diperlukan. Kebutuhan protein pada ibu menyusui pada enam bulan pertama memerlukan tambahan 16 gram perhari.

Pada enam bulan kedua 12 gram perhari, lemak diperlukan 25 % - 40 %, karbohidrat 55 - 75%, cairan minimal 10 gelas perhari dan vitamin.

Menu sehari ibu menyusui :

- a. Nasi / pengganti : 5 - 6 piring
- b. Lauk hewan : 3 - 4 potong dengan berat @ 50 gr
- c. Lauk nabati : 2 - 4 potong
- d. Sayuran : 1,5 - 2 potong
- e. Buah : 2 - 3 potong
- f. Ditambah 1 gelas susu jika memungkinkan
- g. Minum kurang lebih 10 gelas/hari

2. Psikologis

Selain mengkonsumsi makanan yang bergizi, kelancaran produksi ASI juga ditemukan oleh kondisi psikologi ibu saat menyusui. ASI yang keluar dari puting bukan hanya karena hisapan mulut bayi, melainkan ada refleks-refleks tertentu yang saling berhubungan antara otak (hypothalamus hipofisi), kelenjar bawah otak, dengan kelenjar susu yang menghasilkan susu. Jika ibu dalam kondisi stress saat menyusui, akan menyebabkan jalur neuro hormonal terganggu, sehingga kelenjar susu pun tidak akan memproduksi ASI dengan baik.

Ibu yang selalu sedih, kesal bingung dan tidak tenang, tidak dapat memberikan ASI-nya secara benar kepada si kecil. Banyak penelitian

membuktikan kondisi psikologis ibu berhubungan dengan jumlah ASI yang dikeluarkan. Di sinilah pentingnya mengatasi kondisi psikis ibu agar si kecil tidak terkena dampaknya dan segera mendapat ASI yang lancar sesuai yang dibutuhkan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan guna mendukung psikologis ibu antara lain dukung ibu melewati masa-masa kehamilan dan persalinan, suami dan keluarga dekat membangun hubungan yang lebih dekat, hindari konflik antara suami istri dan upayakan selalu suasana tenang serta relaks. Selain itu, suami dapat menemani istri selama menyusui sehingga dukungan ayah dirasakan oleh si ibu. Dengan demikian kewajiban menyusui dapat dijalankan dengan baik.

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi produksi ASI adalah sebagai berikut :

1. Umur dan paritas Ibu :

ibu menyusui usia remaja dengan gizi baik, intik ASI mencukupi berdasarkan pengukuran pertumbuhan 22 bayi dari 25 bayi. Pada ibu yang melahirkan lebih dari satu kali, produksi ASI pada hari keempat setelah melahirkan lebih tinggi dibanding ibu yang melahirkan pertama kali.

2. Umur Kehamilan (masa gestasi)

Umur kehamilan dan berat lahir mempengaruhi intik ASI. Hal ini disebabkan bayi yang lahir prematur (umur kehamilan kurang dari 34 minggu) sangat

lemah dan tidak mampu mengisap secara efektif sehingga produksi ASI lebih rendah daripada bayi yang lahir tidak prematur. Lemahnya kemampuan mengisap pada bayi premature dapat disebabkan berat badan yang rendah dan belum sempurnanya fungsi organ.

4. Penyakit infeksi

Penyakit infeksi baik yang kronik maupun akut yang mengganggu proses laktasi dapat mempengaruhi produksi ASI.

5. Berat bayi lahir

hubungan berat lahir bayi dengan volume ASI, Hal ini berkaitan dengan kekuatan untuk mengisap, frekuensi, dan lama penyusuan dibanding bayi yang lebih besar. Berat bayi pada hari kedua dan usia satu bulan sangat erat berhubungan dengan kekuatan mengisap yang mengakibatkan perbedaan intik yang besar dibanding bayi yang mendapat formula. Bayi berat lahir rendah (BBLR) mempunyai kemampuan mengisap ASI yang lebih rendah dibanding bayi yang berat lahir normal (> 2500 gr). Kemampuan mengisap ASI yang lebih rendah ini meliputi frekuensi dan lama penyusuan yang lebih rendah dibanding bayi berat lahir normal yang akan mempengaruhi stimulasi hormon prolaktin dan oksitosin dalam memproduksi ASI.

3. Metode Perawatan Payudara

Hal yang tidak boleh dilupakan untuk persiapan menyusui adalah perawatan payudara selama masa kehamilan (bukan setelah persalinan).

Beberapa tips perawatan payudara selama kehamilan :

- 1) Bila BH ibu sudah mulai terasa sempit, sebaiknya mengantinya dengan BH yang pas dan sesuai dengan ukuran ibu untuk memberikan kenyamanan dan juga support yang baik untuk ibu.
- 2) Bila ibu berencana untuk menyusui, ibu dapat memulai menggunakan BH untuk menyusui pada akhir kehamilan ibu. Pilihlah BH yang ukurannya sesuai dengan payudara ibu, memakai BH yang mempunyai ukuran yang tidak sesuai dengan ukuran payudara diantaranya dapat menyebabkan infeksi seperti mastitis (suatu infeksi pada kelenjar susu di payudara).
- 3) Persiapan puting susu ibu. Dengan lembut putar puting antara telunjuk dan ibu jari ibu sekitar 10 detik sewaktu ibu mandi. Jika ibu mendapatkan kesulitan atau puting susu ibu rata atau masuk kedalam, konsultasikan ke dokter atau bidan, sehingga hal ini dapat diatasi dini untuk mencegah kesulitan nantinya.
- 4) Pada tahap akhir bulan kehamilan, cobalah untuk memijat lembut payudara didaerah aerola dan puting susu, mungkin akan

mengeluarkan beberapa tetes kolustrum (cairan kental bewarna kekuningan dari puting). Untuk membantu membuka saluran susu.

- 5) Bersihkan payudara dan puting, jangan menggunakan sabun didaerah puting dapat menyebabkan daerah tersebut kering. Gunakan air saja lalu keringkan dengan handuk.

Dengan melakukan perawatan payudara dengan benar dan teratur, selain memudahkan bayi menghisap ASI juga menjaga kebersihan payudara sehingga mencegah penyumbatan. Selain itu juga bermanfaat untuk memperkuat kulit sehingga mencegah terjadinya luka/ lecet pada saat mulai menyusui. Timbulnya luka ini merupakan gangguan yang sering terjadi dan berpotensi mengganggu pemberian ASI pada bayi seterusnya.

Perawatan payudara ini sebaiknya dimulai begitu memasuki masa stabil kehamilan, yaitu pada usia kehamilan setelah 34 minggu. Hal-hal yang perlu diperhatikan setiap kali sebelum dan selama melakukan perawatan adalah :

- 1) Potong kuku tangan sependek mungkin, serta kikir agar halus dan tidak melukai payudara.
- 2) Cuci bersih tangan dan terutama jari tangan.
- 3) Lakukan pada suasana santai, misalnya setelah mandi sore atau sebelum berangkat tidur.

- 4) Apabila kandungan terasa menegang/kencang segera hentikan. Hindari melakukan perawatan payudara terlalu berlebihan. Lakukan setiap hari secara teratur. Pada saat kondisi badan tidak enak tidak perlu dipaksakan.

Di beberapa klinik persalinan sering diadakan program perawatan payudara dengan bimbingan instruktur khusus. Program ini bertujuan meningkatkan produksi ASI. Meski demikian disarankan untuk tidak melakukan pijat payudara dengan cara sendiri pada kehamilan masih kurang dari 34 minggu karena berpotensi merangsang terjadinya kelahiran prematur. Sebenarnya ada cara yang lebih praktis dan dengan risiko yang lebih rendah untuk meningkatkan produksi ASI. Yang sering dianjurkan adalah gerakkan badan secara alami. Misalnya lakukan pekerjaan rumah seperti biasa (asal bukan yang mengangkat beban berat) seperti menyapu, menjemur baju, dan lain-lain. Gerakan-gerakan dalam melakukan pekerjaan rumah ini memiliki efek sama dengan pijat payudara.

Yang perlu melakukan pijat payudara terutama adalah yang memiliki bentuk puting yang agak sulit dihisap oleh bayi atau puting tenggelam. Hanya perlu diingat, bahwa pijat disini berbeda dengan pijat untuk merangsang produksi ASI, tetapi lebih ditekankan pada bagian puting saja.

a) Puting kecil

Karena bagian puting menonjol dan keluar, tipe ini mudah untuk dibuat agar mudah dihisap bayi. Pada prinsipnya harus dibuat agar puting semakin menonjol keluar. Ini bisa dilakukan dengan memakai alat penghisap puting, atau dengan memegang puting dan lingkaran puting dan menariknya. Ini sebaiknya dilakukan setiap hari.

b) Puting besar

Ini merupakan tipe puting yang paling mudah dihisap bayi. Meski demikian, adakalanya karena ukurannya yang besar menimbulkan keraguan ibu butuh penyesuaian, pada bayi untuk menghisapnya. Namun biasanya bayi akan segera terbiasa sehingga tidak ada masalah. Meski demikian, lakukan pijat ringan di bagian puting dan lingkaran puting sehingga menjadi lunak dan mudah dihisap bayi.

c) Puting datar

Meski puting menonjol dan keluar namun permukaannya datar (pendek dan kaku). Ini termasuk tipe puting yang susah dihisap. Untuk itu dianjurkan membuat puting dan lingkaran puting menjadi lunak dengan melakukan pijatan ringan setiap hari.

d) puting tenggelam

Puting seolah tenggelam atau terbenam di dalam payudara. Ini merupakan tipe puting yang paling sulit dihisap bayi. Selain itu, karena kurangnya rangsangan pada puting karena posisinya yang tenggelam, cenderung lebih mudah mengalami luka atau lecet pada saat mulai menyusui. Untuk itu dianjurkan melakukan pijat di lingkaran puting agar menjadi lunak serta meningkatkan kekuatan kulit agar tidak mudah terluka saat dihisap bayi. Tentu saja perlu dilakukan pijatan atau tarikan agar puting semakin menonjol keluar.

Cara paling praktis melakukan terapi untuk membentuk puting agar mudah dihisap adalah dengan memakai alat penghisap. Atau memakai pelapis payudara yang berlubang di tengahnya dan dipasang antara payudara dan BH. Yang terpenting adalah dilakukan setiap hari. Pelapis payudara meski praktis dan bisa dipakai lama dan dengan sendirinya lebih efektif, memiliki kelemahan terlalu menekan payudara dan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi pemakainya. Untuk itu tidak dianjurkan memakainya terlalu lama setiap hari.

Cara lain adalah melakukan pijatan dengan tangan terhadap kedua puting (kanan dan kiri). Untuk selain tipe puting tenggelam atau datar bisa dibedakan menjadi tipe puting tenggelam atau datar, tahan dan angkat payudara dengan salah satu telapak tangan dan tekan tepat pada bagian puting dengan telunjuk sampai dua hitungan kemudian lepas.

Segera setelah dilepas tarik puting dengan ibu jari dan telunjuk sampai dua hitungan dan lepas. Tahan dan angkat payudara dengan salah satu telapak tangan dengan posisi payudara diantara ibu jari dan telunjuk serta telapak sedikit menekan dasar payudara seperti. Letakkan puting diantara ibu jari dan telunjuk serta jari tengah. Arahkan puting ke arah atas sehingga anda bisa melihat ujung punting. Bila keluar cairan dari puting, segera bersihkan dengan lap bersih. Pijat sekeliling lingkaran puting memakai ujung jari seolah membentuk lingkaran selama sekitar satu sampai dengan menit. Bila lingkaran puting sudah terasa lunak, lakukan pada puting sebelahnya. Tarik ujung puting memakai ujung jari, serta putar ke kiri atau ke kanan selama dua sampai dengan tiga menit. Lakukan tarikan atau putaran ini sejauh tidak sampai terasa sakit. Terutama setelah memasuki usia kehamilan 36 minggu lakukan pijatan ini untuk membuka saluran susu.

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperbanyak pengeluaran ASI, antara lain :

- a. Mengusahakan agar setiap kali bayi menyusui, payudara isinya betul-betul menjadi kosong, karena pengosongan payudara dengan waktu tertentu itu merangsang kelenjar-kelenjar payudara untuk memproduksi susu lebih banyak.
- b. Minumlah susu setiap hari satu liter.

- c. Perbanyak mengkonsumsi sayuran hijau, seperti daun katuk, daun oyong dan daun pepaya
- d. Ibu yang hidup tenang lebih banyak mengeluarkan susu daripada ibu yang sedang dalam kesedihan.
- e. Melakukan perawatan payudara dua kali sehari

6. Kegunaan Perawatan Payudara

Perawatan payudara selama hamil memiliki banyak manfaat, antara lain:

- 1) Menjaga kebersihan payudara terutama kebersihan puting susu.
- 2) Melenturkan dan menguatkan puting susu sehingga memudahkan bayi untuk menyusui.
- 3) Merangsang kelenjar-kelenjar air susu sehingga produksi ASI banyak dan lancar.
- 4) Dapat mendeteksi kelainan-kelainan payudara secara dini dan melakukan upaya untuk mengatasinya.
- 5) Mempersiapkan mental (psikis) ibu untuk menyusui.

Bila seorang ibu hamil tidak melakukan perawatan payudara dengan baik dan hanya melakukan perawatan menjelang melahirkan atau setelah melahirkan maka sering dijumpai kasus-kasus yang akan merugikan ibu dan bayi. Kasus-kasus yang sering terjadi antara lain :

- 1) ASI tidak keluar. Hal ini sering terjadi dengan keluarnya ASI setelah hari kedua atau lebih.
- 2) Puting susu tidak menonjol sehingga bayi sulit menghisap.
- 3) Produksi ASI sedikit sehingga tidak cukup dikonsumsi bayi.
- 4) Infeksi pada payudara, payudara bengkak atau bernanah.
- 5) Muncul benjolan di payudara, dan lain - lain.

7. Obat-Obatan

Seorang ibu menyusui yang membutuhkan terapi dengan obat-obatan dapat menemui kesulitan. Walaupun hampir semua obat-obatan disekresi dalam ASI, konsentrasinya dan kemungkinan efeknya terhadap bayinya sangat beragam. Konstrasi obat dalam ASI bergantung kepada sifat karakteristik dan farmakokinetik obat dan buah-buahan yang terkandung dalam ASI manusia.

Terapi obat-obatan pada ibu menyusui sedapat mungkin dihindari. Apabila akhirnya pemberian obat merupakan indikasi yang harus dilakukan, pertama-tama harus dipilih obat yang mempunyai dampak negatif terkecil terhadap bayi. Namun, bila ada indikasi kuat untuk memberikan pada ibu obat yang telah diketahui akan membahayakan bagi bayi yang susuinya, menyusui harus dihentikan sementara tetapi laktasi harus terus dipertahankan.

Penggunaan kontrasepsi hormonal oleh seorang ibu hamil dapat menimbulkan masalah-masalah khusus. Obat yang mengandung estrogen sering menyebabkan penurunan jumlah sekresi ASI yang mencolok, sedangkan obat yang mengandung progesteron ditemukan dapat menyebabkan penurunan konsentrasi lemak dalam ASI.

Secara umum, dapat disebutkan bahwa sebagian besar obat dapat diekskresikan melalui air susu ibu. Walaupun demikian obat yang harus diberikan pada ibu yang menyusui hendaknya dipilih yang relatif aman, serta diberikan paling lambat 30-60 menit setelah menyusui atau tiga sampai dengan empat jam sebelum ibu menyusui yang berikutnya, agar diperoleh ekskresi ke dalam air susu yang terendah. Bila kita ragu-ragu maka sebaiknya obat tersebut tidak diberikan atau dipilih obat yang setara yang diketahui lebih aman (Susilawati, 2008).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III

KERANGKA KONSEP


A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti

Air susu ibu (ASI) merupakan makanan alamiah yang pertama dan utama bagi bayi baru lahir. Air susu ibu dapat memenuhi kebutuhan bayi atau energi dan gizi selama empat sampai enam bulan pertama kehidupan, sehingga dapat mencapai tumbuh kembang yang optimal. Selain sebagai sumber energi dan zat gizi pemberian ASI juga merupakan media untuk menjalin hubungan psikologis antara ibu dan bayinya. Hubungan ini akan menghantarkan kasih sayang dan perlindungan ibu terhadap bayinya serta memikat dan perlindungan ibu terhadap bayinya serta memikat kemesraan bayi terhadap ibunya, sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan erat.

Guna menjamin pemenuhan ASI bagi bayi secara optimal, maka faktor yang sangat menentukan dalam pemberian ASI adalah kelancaran produksi ASI. Dengan perawatan payudara diharapkan dapat meningkatkan kelancaran produksi ASI.

B. kerangka konsep penelitian

Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI



Gambar 3.1

Keterangan :


□ : Variabel Dependen

○ : Variabel Independen

→ : Penghubung Variabel

- - - - - → : Variabel yang tidak diteliti

C. Kerangka Kerja



Gambar 3.2

C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Perawatan Payudara

Perawatan payudara adalah suatu kegiatan melakukan perawatan pada kedua payudara yang dilakukan oleh ibu masa nifas dalam rangka menyiapkan diri agar produksi ASI cukup.

Kriteria Obyektif :

- a. Melakukan : Bila responden melakukan secara benar dengan total skor $> 7,5$.
- b. Tidak Melakukan : Jika kurang dari 3 aspek perawatan payudara dinilai kurang $\leq 7,5$.

2. Produksi ASI

Produksi ASI dalam penelitian ini adalah Keadaan yang menunjukkan keluarnya ASI setelah 30 jam pasca persalinan yang dikeluarkan setelah 30 menit tidak dihisap oleh bayi dengan menggunakan breast pump pada Payudara kanan dan kiri masing-masing 5 menit secara bergantian dan diukur dengan gelas ukur.

Kriteria Obyektif :

Cukup : bila jumlah ASI \geq 1,56 ml per 10 menit.

Kurang : bila jumlah ASI $<$ 1,56 ml per 10 menit.

C. Hipotesis Penelitian

1. Hipotesis Alternatif (Ha)

Ada hubungan perawatan payudara dengan produksi ASI Ibu Masa nifas di RSUD Sinjai.

2. Hipotesis Nol (Ho)

Tidak ada hubungan perawatan payudara dengan produksi ASI Ibu Masa nifas di RSUD Sinjai.

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan *cross sectional*, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan perawatan payudara dengan produksi ASI pada ibu nifas di RSUD sinjai.

B. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di RSUD sinjai, dan dilaksanakan pada bulan juli sampai dengan agustus 2010.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu nifas yang melahirkan dan menjalani perawatan di RSUD Sinjai pada tahun 2009 sebanyak 1.419 orang atau rata – rata 118 orang per bulan.

2. Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah ibu primipara yang melahirkan secara normal (pervaginam) yang dirawat di perawatan nifas RSUD Sinjai dengan

jumlah responden ditentukan dengan menggunakan rumus Stanley Lameshow (1982).

Pengambilan sample menggunakan rumus Stanley Lameshow (1982), adalah sebagai berikut :

$$n = NZ\alpha P(1 - P) / (N - 1)G^2 + Z\alpha P(1 - P)$$

Keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah anggota populasi

P = proporsi dari ibu yang memberikan ASI dengan jumlah cukup = 0,50 dan yang memberikan ASI dengan jumlah kurang dari 0,50

Z = 1,96 (nilai baku normal)

G = d = galat pendugaan = 0,15

Untuk nilai P = 0,35 – 0,65

Di RSUD Sinjai dari data tahun 2009 rata-rata ada 118 ibu yang melahirkan per bulan, maka sampel dapat dihitung dalam rumus sebagai berikut :

$$N = 118$$

$$n = NZ^2\alpha P(1 - P) / (N - 1)D^2 + Z^2\alpha P(1 - P)$$

$$n = 118 \times (1,96)^2 \times 0,50 \times (1 - 0,50) / (118 - 1) \times (0,15)^2 + (1,96)^2 \times 0,50 \times (1 - 0,50)$$

$$n = 118 \times 3,84 \times 0,50 \times 0,50 / 117 \times 0,0225 + 3,84 \times 0,50 \times 0,50$$

$$n = 113,2 / 2,6 + 0,96$$

$$n = 43,2 / 3,59$$

n = 12,03 atau dibulatkan 12 sampel

Dalam penelitian ini akan menggunakan 24 ibu bersalin yang akan dipilih sebagai responden, kemudian dari 24 responden akan dijadikan dua kelompok pengamatan yang masing-masing anggotanya berjumlah 12 ibu bersalin.

Kelompok pertama melaksanakan perawatan payudara dan kelompok kedua tidak melakukan perawatan payudara, kemudian setelah 30 jam persalinan kedua kelompok pengamatan akan diukur produksi ASI nya menggunakan breastpump dan gelas ukur.

Pemilihan anggota sampel harus memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut :

a. Kriteria Inklusi

- 1). Ibu nifas yang dirawat di RSUD Sinjai.
- 2). Merupakan persalinan normal/ fisiologis

3). Bersedia dijadikan responden

4). Ibu primipara

b. Kriteria Eksklusi

1). Ibu nifas yang mengalami mastitis/kelainan puting

2). Persalinan dengan tindakan/ pathologis

3). Tidak bersedia dijadikan responden.

C. **Prosedur Perawatan Payudara**

Perawatan Payudara mempunyai pengaruh yang besar pada pengalaman menyusui dari ibu-ibu nifas. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- 1) Kaji keadaan payudara, areola dan putingnya. Tangani bagian yang keras dengan lap hangat dan lakukan masage.
- 2) Memberikan dorongan pada ibu untuk mengenakan BH yang pas dan penyangga payudara dengan baik.
- 3) Mengajarkan ibu untuk memasage payudara dari dinding dada dan mengarah keareola, hal ini mempermudah gerakan ASI atau kolostrum dari kelenjar penghasil ASI kesinus-sinus pengumpul dibawah areola.

- 4) Apabila puting susu lecet oleskan kolostrum atau ASI yang keluar pada sekitar puting susu setiap selesai menyusui, menyusui tetap dilakukan dimulai dari puting yang tidak lecet.
- 5) Apabila lecet sangat berat dapat diistirahatkan selama 24 jam ASI dikeluarkan dan diminumkan dengan menggunakan sendok.
- 6) Perawatan dikerjakan secara teratur.
- 7) Kebersihan sehari-hari harus dipelihara.
- 8) Gizi ibu harus lebih baik dan lebih banyak dibandingkan pada waktu hamil.
- 9) Ibu harus percaya diri akan kemampuan menyusui bayinya.
- 10) Rasa cemas dan stress harus dihindari.

a. Cara perawatan payudara pada masa nifas.

- 1) Membersihkan puting susu
 - a) Pengertian
Suatu cara untuk membersihkan puting susu dari kotoran sehingga terangkat dan tidak masuk kemulut dan tertelan oleh bayi.
 - b) Persiapan alat
 - Kapas.
 - Air masak
 - Gelas.
 - Kain (handuk bersih).

c) Cara kerja

- Kapas direndam dengan air masak
- Puting susu dibersihkan dengan kapas basah
- Kemudian dikeringkan dengan kain yang bersih
- Dilakukan pada saat sebelum dan sesudah menyusui

2) Pengurutan atau massage

Pengurutan dilakukan dengan tujuan memberikan rangsangan pada kelenjar air susu ibu agar dapat memproduksi ASI, pengurutan dilakukan pada pagi dan sore hari, sebaiknya sebelum mandi dan diteruskan dengan penyiraman yang dilakukan sebelum mandi.

a) Persiapan alat.

- Minyak kelapa / olium 10 cc
- Pompa susu
- Gelas / botol susu.
- Air panas dalam baskom.
- Air dingin dalam baskom
- Handuk bersih / waslap.

b) Cara kerja

- Alat – alat disiapkan dekat ibu, cuci tangan dan melakukan pengurutan.
- Kedua telapak tangan diberi Oil.

- Buah dada kiri diurut dengan tangan kiri dan buah dada kanan diurut dengan tangan kanan bila ibu mengerjakan sendiri, bila dikerjakan oleh Bidan atau Perawat buah dada kiri diurut dengan tangan kanan dan buah dada kanan diurut dengan tangan kiri.
- Pengurutan dari tengah berputar kesamping, terus kebawah kerjakan berulang-ulang antara 10-15 kali.
- Bagian samping buah dada diurut dari pangkal keputing dilakukan 10- 15 kali.
- Pengurutan bagian bawah buah dada ke arah puting dilakukan 15-20 kali.
- Pengetokan dengan ruas-ruas jari tangan dengan cepat dan teratur.

Setelah pengurutan diteruskan dengan penyiraman yaitu dengan cara

- :
- Ibu duduk atau berdiri, pakaian bagian atas dibuka punggung ditutup dengan handuk.
 - Baskom air hangat dan dingin disediakan sebaiknya dikamar mandi.
 - Mula-mula disiram air hangat dilakukan dengan cepat sampai 10 kali kemudian cepat diganti dengan air dingin sampai 10

kali penyiraman terakhir dengan air hangat setelah itu ibu mandi

D. Pengumpulan Data

1. Instrumen Pengumpulan Data

a. Buku pedoman pelatihan perawatan payudara

Digunakan untuk bahan pengajaran bagi responden yang menjadi kelompok perlakuan.

Metode pelatihan : ceramah, tanya jawab dan demonstrasi

Pelaksana : Peneliti dibantu 2 orang petugas RSUD Sinjai.

b. Chek List, digunakan untuk mengukur :

- 1) Perawatan payudara adalah suatu kegiatan melakukan perawatan pada kedua payudara yang dilakukan oleh ibu masa nifas, caranya dengan melakukan pengamatan langsung (observasi) pelaksanaan perawatan payudara yang sesuai dengan prosedur pada ibu nifas.
- 2) Produksi ASI dalam penelitian ini adalah Keadaan yang menunjukkan keluarnya ASI setelah 30 jam pasca persalinan yang dikeluarkan setelah 30 menit tidak dihisap oleh bayi dengan menggunakan borspump pada Payudara kanan dan kiri masing-masing 7,5 menit secara bergantian dan diukur dengan gelas ukur., caranya dengan melakukan pemompaan pada salah satu payudara setelah tidak dihisap oleh bayi selama 10 menit.

- c. Alat bantu lain yang digunakan adalah breast pump, gelas ukur, stopwacth, buku catatan lapangan, alat tulis, tape recorder dan kamera. Instrumen yang di gunakan dalam penelitian adalah lembar kuesioner untuk kedua variabel penelitian.

2. Prosedur Pengumpulan Data

a. Metode Pengumpulan Data

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui lembar cek list.

Data akan diambil dengan prosedur sebagai berikut ;

- a) Peneliti mengajukan permohonan izin penelitian dari institusi yaitu UIN Makassar ke Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kab. Sinjai untuk mendapatkan rekomendasi izin penelitian, dan selanjutnya akan mengadakan penelitian di RSUD Sinjai.
 - b) Setelah mendapat izin dari instansi tersebut, maka peneliti mengadakan pendekatan dengan calon responden, kemudian memberikan penjelasan tentang penelitian ini. Dan jika calon responden bersedia, maka peneliti akan mempersilahkan menandatangani lembar persetujuan responden.
 - c) Setelah responden menandatangani lembar persetujuan, maka proses penelitian mulai dilaksanakan.
- 2) Data sekunder, berupa data yang diperoleh dengan cara menelusuri dan memilah literatur, serta data yang diperoleh dari RSUD Sinjai.

b. Pengolahan Data

Data hasil pengamatan sebelum dianalisa perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu, yaitu melalui tahapan sebagai berikut :

1) Editing

Pengecekan, Memeriksa data yang dikumpulkan dari cek list, untuk mengecek kebenarannya dan pengkoreksian data untuk melengkapi data yang masih kurang atau kurang lengkap.

2) Koding

Pengkodean lembar cek list dan observasi, pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kode yang disediakan pada lembar cek list dan observasi sesuai dengan respon klien.

Pemberian kode pada variable yang diteliti, yaitu :

1) Perawatan payudara pada ibu nifas : Dilakukan perawatan dengan benar diberi kode 1, dan yang tidak dilakukan dengan benar diberi kode 0

2) Produksi ASI : cukup kode 1 dan kurang/ tidak cukup kode 0

3) Tabulasi

Setelah pemberian kode, selanjutnya dengan pengolahan data ke dalam tabel menurut sifat yang dimilikinya.

b. Analisa Data

Setelah memperoleh nilai-nilai dari tiap tabel, selanjutnya data di analisa dengan menggunakan komputer program *SPSS for Windows versi 15.00*.

1) Analisa Univariat

Analisa ini dilakukan untuk tiap-tiap variabel yang diteliti dari hasil penelitian, yang kemudian akan mendapatkan gambaran dari kedua variabel penelitian.

2) Analisa Bivariat

Analisa bivariat dilakukan untuk melihat hubungan variabel independent dengan dependent dalam bentuk tabulasi silang antara kedua variabel tersebut. Menggunakan uji statistik dengan tingkat kemaknaan 0,05 (5%) dengan menggunakan rumus *Chi-Square* (Eko Budiarto, 2001), yaitu :

$$X^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

Keterangan :

X^2 = Chi-square

O = Nilai observasi

E = Nilai yang diharapkan

Σ = Jumlah data

Analisa bivariat dilakukan untuk melihat hubungan variabel independen dengan dependen dalam bentuk tabulasi silang antara kedua

variebal tersebut. Menggunakan uji statistik *Chi-Square* dengan *Fisher Exact Test*, dengan rumus sebagai berikut:

$$\rho = \frac{(a+b)!(c+d)!(a+c)!(b+d)!}{n!a!b!c!d!}$$

a. Etika Penelitian

Etika penelitian bertujuan untuk melindungi hak-hak subjek antara lain menjamin kerahasiaan identitas, hak privasi dan martabat responden. Penelitian menekankan masalah etika yang meliputi :

1. Informed Consent

Lembar persetujuan ini diberikan kepada responden yang diteliti yang memenuhi kriteria inklusi dan disertai judul penelitian, bila responden menolak maka peneliti tidak akan memaksakan dan tetap menghormati hak-hak responden.

2. Anonimity

Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan mencantumkan nama responden, tetapi lembaran tersebut diberikan kode.

3. Confidentiality

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti. Hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Hasil Pengujian Kualitas Data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh melalui check list yang diberikan kepada 24 orang ibu dengan kehamilan pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai. Data tentang perlakuan perawatan payudara ibu nifas dan produksi ASI berupa skor.

2. Analisis Univariat

a. Distribusi Responden Berdasarkan Umur

Data Penelitian diperoleh dari check list yang dilihat pada 24 pasien di Rumah Sakit Umum Daerah sinjai yang bertindak sebagai sampel. Berdasarkan hasil check list yang diperoleh, dapat diketahui jenis kelamin responden sebagai berikut :

Tabel 5.1
Distribusi Ibu nifas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Berdasarkan Usia

Usia (Tahun)	Jumlah	Persentase (%)
15 – 19	2	8,3
20 – 24	11	45,8
25 – 29	7	29,2
30 – 34	2	8,3
35 – 39	2	8,3
Total	24	100

Sumber : Analisis data primer 2010

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa frekuensi terbanyak adalah ibu nifas yang berusia antara 20 hingga 24 Tahun sebanyak 45,8%, sedangkan 29,2% adalah ibu nifas yang berusia antara 25 hingga 29 tahun dan tiga kelas dalam tabel frekuensi lainnya memiliki besaran yang sama, yaitu 8,3%. Artinya mayoritas ibu nifas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai sebagai responden didominasi oleh usia antara 20 hingga 24 tahun dan dalam kategori usia produktif.

b. Distribusi Responden Berdasarkan Agama

Tabel 5.2
Distribusi Ibu nifas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah	Persentase
Islam	24	100
Total	24	100

Sumber : analisis data primer 2010

Tabel 5. 2 menunjukkan bahwa semua responden beragama islam

c. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 5.3
Distribusi Ibu nifas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD/Sederajat	3	12,5
SMP/Sederajat	4	16,7
SMA/Sederajat	12	50
Perguruan Tinggi	5	20,8
Total	24	100

Sumber : analisis data primer 2010

Table 5.3 menunjukkan mayoritas tingkat pendidikan pada ibu nifas yang menjadi responden adalah pada tingkat pendidikan SMA/ sederajat sejumlah 50%. Kemudian pada tingkat pendidikan perguruan tinggi 20,8%, kemudian pada tingkat pendidikan SMP/ sederajat 16,7% dan pada tingkat pendidikan SD/ sederajat 12,5%. Artinya ibu nifas yang menjadi responden adalah orang yang memiliki tingkat pendidikan yang baik.

d. Distribusi Responden Berdasarkan Perawatan Payudara

Tabel 5.4

Distribusi Ibu nifas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Berdasarkan Perawatan Payudara

Perawatan Payudara	Jumlah	Persentase
Melakukan	12	50%
Tidak Melakukan	12	50%
Total	24	100,0%

Sumber : analisis data primer 2010

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa frekuensi antara yang melakukan perawatan payudara dengan yang tidak melakukan sebanyak 50%.

e. Distribusi Responden Berdasarkan Produksi ASI

Tabel 5.5

Distribusi Ibu nifas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Berdasarkan Produksi ASI

Produksi ASI	Jumlah	Persentase
Cukup	13	54,2%
Kurang	11	45,8%
Total	24	100%

Sumber : analisis data primer 2010

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa frekuensi terbanyak adalah ibu nifas yang produksi ASI kurang dari 1,56 mL yaitu sebanyak 45,8%, sedangkan sisanya adalah ibu nifas dengan produksi ASI cukup.

3. Analisis Bivariat

a. Analisis Chi-Square

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Chi-square.

1) Distribusi Responden Berdasarkan Perawatan Payudara dengan Hubungan Produksi ASI

Tabel 5.6
Distribusi Ibu nifas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai Berdasarkan Perawatan Payudara dengan Produksi ASI

Perawatan Payudara	Produksi Asi		Produksi Asi		Total	%
	Cukup	%	Kurang	%		
Melakukan	9	75	3	25	12	50
Tidak Melakukan	4	33,3	8	66,7	12	50
Total	13	100	11	100	24	100

Sumber : analisis data primer 2010

Tabel 5.6 menunjukkan dari 9 responden yang melakukan perawatan payudara memiliki produksi ASI cukup yaitu sebanyak 75% dan 25% dengan produksi ASI kurang. Sedangkan 4 responden lainnya yang tidak melakukan perawatan payudara dengan produksi ASI cukup yaitu sebanyak 33,3% dan 66,7% dengan produksi ASI kurang. Dari hasil uji Chi square menunjukkan bahwa nilai $p : 0,04$ dengan taraf signifikansi $\alpha : 0,05$ yang berarti nilai $p < \alpha$, dengan demikian maka H_0 ditolak. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara perawatan payudara dengan produksi ASI pada ibu nifas di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

B. Pembahasan

Berdasarkan data Medical Record RSUD Sinjai tahun 2008 pasien yang dirawat di ruang perawatan nifas sebanyak 1.272 orang dan tahun 2009 sebanyak 1.419 orang. Berdasarkan angka tersebut dilihat cukup tinggi maka peranan rumah sakit dalam memberi pelayanan kepada masyarakat khususnya kesehatan ibu dan anak. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan 24 orang responden ibu nifas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, dimana 12 responden yang melakukan perawatan payudara dan sebahagian responden lainnya tidak melakukan perawatan payudara.

pada hasil uji chi-square dengan taraf signifikansi $\alpha : 0,05$ pada hubungan perawatan payudara dengan produksi ASI diperoleh $p : 0,041$ yang berarti nilai $p < \alpha$, maka H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan perawatan payudara dengan produksi asi ibu nifas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Eti Rochaeti pada tahun 2009. Dimana Ibu yang melakukan perawatan payudara ternyata semua menunjukkan produksi ASI kategori cukup. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara perawatan payudara dengan produksi ASI di peroleh $p= 0,01 < 0,05$.

Pada ibu menyusui usia remaja dengan gizi baik, intik ASI mencukupi berdasarkan pengukuran pertumbuhan 22 bayi dari 25 bayi. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai.

Menurut teori Alimul Azis (2003) yang mengatakan bahwa kelancaran ASI dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk makanan yang ibu konsumsi, psikologis ibu, obat-obatan dan perawatan payudara sejak kehamilan dan setelah melahirkan. Untuk perawatan payudara ibu dapat dilaksanakan oleh perawat selama ibu masih di rawat di rumah sakit ataupun dapat dilakukan oleh ibu sendiri.

Peneliti dalam hal ini menganggap perawatan payudara berhubungan dengan produksi ASI, karena pada saat peneliti melakukan observasi, 4 responden atau ibu nifas yang melakukan perawatan payudara secara teratur, dan 3 dari mereka menghasilkan produksi ASI yang produktif.

Selain hal tersebut, tingkat pendidikan juga ikut berpengaruh dalam perlakuan perawatan payudara. Dengan kesadaran akan pentingnya ASI sebagai nutrisi bayi, maka para ibu berusaha untuk meningkatkan produksi ASI mereka. Dan salah satu cara dalam meningkatkan produksi ASI adalah perawatan payudara.

Pada dasarnya ibu yang telah melahirkan, secara naluri setiap ibu mampu menjalankan tugas untuk menyusui bayinya. Namun, untuk mempraktekkan bagaimana menyusui yang baik dan benar, setiap ibu perlu mempelajarinya. Bukan saja ibu-ibu yang baru pertama kali hamil dan melahirkan, tetapi juga ibu-ibu yang baru melahirkan anak yang kedua dan seterusnya. Karena setiap bayi lahir merupakan individu tersendiri, yang mempunyai variasi dan spesifikasi sendiri. Dengan demikian ibu perlu belajar berinteraksi dengan bayi yang baru lahir ini, agar dapat berhasil dalam menyusui. Untuk itu diperlukan motivasi yang tinggi sejak dini dan dukungan serta bimbingan yang optimal dari keluarga, lingkungan dan tenaga kesehatan yang merawat ibu selama hamil, bersalin dan masa nifas.

Dengan mengikuti dan mempelajari segala pengetahuan mengenai laktasi, diharapkan setiap ibu hamil, bersalin dan menyusui dapat memberikan ASI secara optimal, sehingga bayi dapat tumbuh kembang normal sebagai calon sumber daya manusia yang berkualitas tinggi.

Demi keberhasilan menyusui, payudara memerlukan perawatan secara teratur. Perawatan payudara bertujuan agar selama masa menyusui produksi ASI cukup, tidak terjadi kelainan pada payudara dan agar bentuk payudara tetap baik selama menyusui. Pada umumnya, wanita dalam kehamilan 6 - 8 minggu akan mengalami pembesaran payudara. Payudara akan terasa lebih padat, kencang, sakit dan tampak jelas di permukaan kulit adanya gambaran

pembuluh darah yang bertambah serta melebar. Kelenjar Montgomery pada daerah areola tampak lebih nyata dan menonjol.

Guna menunjang produksi ASI dan membantu mempertahankan bentuk payudara selama masa menyusui, perlu dilakukan latihan gerakan otot-otot badan yang berfungsi menopang payudara. Misalnya gerakan untuk memperkuat otot pektoralis : kedua lengan disilangkan di depan dada, saling memegang siku lengan lainnya, kemudian lakukan tarikan sehingga terasa tegangan otot-otot di dasar payudara. Kebersihan / hygiene payudara juga harus diperhatikan, khususnya daerah papila dan areola. Pada saat mandi, sebaiknya papila dan areola tidak disabuni, untuk menghindari keadaan kering dan kaku akibat hilangnya lendir pelumas yang dihasilkan kelenjar Montgomery. Areola dan papila yang kering akan memudahkan terjadinya lecet dan infeksi.

Papila harus disiapkan agar menjadi lentur, kuat dan tidak ada sumbatan. Persiapan dilakukan setiap hari sebanyak 2 kali sehari. Caranya dengan kompres masing-masing puting susu selama 2-3 menit dengan kapas yang dibasahi minyak, kemudian tarik dan putar puting kearah luar 20 kali, kearah dalam 20 kali. Pijat daerah areola untuk membuka saluran susu. Bila keluar cairan, oleskan kepapila dan sekitarnya. Kemudian payudara dibersihkan dengan handuk yang lembut. Puting susu yang terbenam atau datar perlu dikoreksi agar dapat menonjol keluar sehingga siap untuk

disusukan kepada bayi. Masalah ini dapat diatasi dengan bantuan pompa puting.

Pijat payudara tidak hanya terbatas bagi anda yang menginginkan produksi ASInya meningkat. Secara umum, pijat payudara sangat berguna untuk kesehatan payudara. Karena sesungguhnya payudara yang tidak pernah dilatih, akan memiliki potensi terjadinya penumpukan cairan toxin yang berujung pada berbagai masalah kesehatan pada payudara. Ada beberapa manfaat perawatan payudara, diantaranya adalah memperbaiki dan meningkatkan peredaran darah, mengurangi gejala kram akibat menstruasi, mengurangi ketidaknyamanan selama kehamilan, meningkatkan kekencangan kulit payudara dan sekitarnya, meningkatkan produksi ASI, mempercepat proses pengosongan kantung ASI, mencegah sumbatan ASI di saluran dan kelenjar susu, mempercepat kesembuhan saat terjadi pembengkakan, relaksasi payudara dan area dada, mengencangkan otot penggantung payudara (otot pektoralis) hingga payudara menjadi lebih kencang dan terangkat, mengencangkan payudara dan meningkatkan keindahannya secara menyeluruh, mencegah kanker payudara (karena ini menjadi metode SADARI), meningkatkan pengeluaran cairan limfe yang akan mencegah timbulnya kanker dan membuang toksin yang tidak bermanfaat dari dalam tubuh, SADARI (PeriksaPayudaraSendiri) yang akan membantu deteksi dini

adanya benjolan di payudara, dan mengurangi munculnya guratan dan stretchmark payudara.

Kemudian ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam keberhasilan menyusui di mana tergantung oleh beberapa hal, diantaranya adalah keadaan fisik dan mental sang ibu yang ditunjang oleh keadaan nutrisi, istirahat yang cukup serta beberapa faktor lainnya, termasuk dukungan dari suami, keluarga dan lingkungannya.

Dengan mempertimbangkan betapa pentingnya menyusui bayi dengan ASI, Islam pun memerintahkan untuk mencari ibu susu lain dengan membayarnya secara patut, seperti difirmankan Allah dalam Q.S At-thalaq (65) ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَتَمَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

Terjemahan :

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Hikmah ayat yang terkandung dalam ayat tersebut adalah, Dalam Al-Qur'an diatur berbagai aspek kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya dalam hal berkeluarga. Dimana dalam keluarga itu terjalin silaturahmi antara dua keluarga yang terikat melalui hubungan pernikahan. Namun, hubungan itu dapat terputus karena adanya perceraian atau yang lebih dikenal dengan istilah thalaq. Dalam keluarga, hal yang paling penting diantaranya adalah mengenai pemeliharaan anak. Dimana anak merupakan hasil hubungan suami istri yang harus diperlihara sebaik-baiknya karena akan melanjutkan atau sebagai generasi penerus keluarga. Olehnya itu, jika sampai terjadi perceraian pemeliharaan anak tetap harus diutamakan oleh pasangan suami istri yang telah bercerai tersebut. Sang ayah harus tetap memberikan nafkah kepada anak mereka, begitu juga dengan sang ibu yang memberikan kasih sayang. Karena pentingnya pemeliharaan anak ini maka meskipun terjadi perceraian antara suami istri, mereka harus tetap memikirkan mengenai anak mereka, atau hak asuhnya. Seperti yang terdapat dalam surat At-thalaq ayat 6. Meskipun hak asuh sering diberikan kepada ibu, ayah tetap memiliki peranan memberikan nafkah kepada anak karena itu merupakan hasil dari hubungan pernikahan mereka. M A K A S S A R

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Ada hubungan perawatan payudara dengan produksi ASI pada ibu nifas di RSUD sinjai.
2. Diketuainya produksi ASI pada ibu nifas di RSUD Sinjai.
3. Diketuainya jumlah produksi ASI pada ibu nifas yang melakukan perawatan payudara di RSUD Sinjai.
4. Diketuainya jumlah produksi ASI pada ibu nifas yang tidak melakukan perawatan payudara di RSUD sinjai.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Para ibu harus mempersiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan bayi, pada khususnya kebutuhan nutrisi bayi berupa ASI.
2. Para ibu nifas baiknya melakukan perawatan payudara agar dapat merangsang produksi ASI yang cukup.
3. Bagi penelitian berikutnya hendaknya hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengadakan penelitian lanjutan karena masih banyak faktor yang mempengaruhi produksi ASI.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimun A, 2007.”*Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*”, Edisi I. Jakarta: Salemba Medika.
- Alimun A, 2003.” *Ilmu Keperawatan Anak*”. Jakarta: Salemba Medika.
- Ari sulistyawati, 2009.” *Buku ajar asuhan kebidanan pada ibu nifas*”. Edisi I. Yogyakarta: ANDI.
- Bobak, dkk, 2005.”*Buku ajar Keperawatan Maternitas*”, Edisi 4. Jakarta: EGC.
- Budiarto, Eko, 2001. “*Biostatistik Untuk Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat*”. Jakarta: EGC.
- Eti Rochaeti. 2009. *Hubungan Perawatan Payudara Terhadap Produksi Asi Pada Ibu Pasca Bersalin Spontan di Rumah Sakit Bersalin Annisa Boyolali*. Diakses: Makassar. 18 Agustus 2010. 14.00 pm. <http://eprints.undip.ac.id>
- Ferrer H, 2001. “*Perawatan Meternitas*”, Edisi 2. Jakarta: EGC.
- Hullyana. 2007. *Produksi ASI dan Faktor Yang Mempengaruhinya*. Diakses : Makassar. 16 juni 2010. Jam 15.00 pm. <http://www.dinkesjateng.org/profil2005/bab5.htm>.
- Mochtar, Rustam, 2002. “*Sinopsis Obstetri; Obstetri Fisiologi, Obstetri Patologi*”. Edisi 2. Jakarta: EGC.
- Roesli Utami, 2002. *Asi Eksklusif*. Jakarta : Trubus Agrundaya.
- Saifuddin, 2001. “*Buku Acuan Nasional, Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*”, edisi I. Jakarta: Yayasan Bina pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Solihin Pujiadi, 2001, *Ilmu Gizi Klinis Pada Anak*, Jakarta : FKUI.
- Susilawati, 2008. *ASI*. Diakses : Makassar. 16 juni 2010. Jam 17.00 pm. <http://www.wati.telkom.net/2008/air-susu-ibu>.

Oswari E. Dr. DPH, 2004.”*Perawatan Ibu Hamil dan Bayi*”. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Nursalam, 2008. “*Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan; Pedoman Skripsi, tesis, dan Instrumen Penelitian Keperawatan*”. Jakarta: Medika Salemba.

Winarno F.G, 2000. *Gizi dan Makanan Bagi Bayi dan Anak Sapihan*. Jakarta: Sinar Harapan.



CHEK LIST PENELITIAN

A. Identitas Responden

1. Inisial responden :
2. Umur :
3. Agama :
4. Alamat :
5. Pendidikan terakhir :
6. Status obstetri : G (), P (), A ()

1. Perawatan payudara adalah suatu kegiatan melakukan perawatan pada kedua payudara yang dilakukan oleh ibu masa nifas.

PROSEDUR PELAKSANAAN	DILAKUKAN	TIDAK DILAKUKAN
	1	0
1. Membersihkan puting susu		
2. Mencuci tangan dan melakukan pengurutan.		
3. Buah dada kiri diurut dengan tangan kiri dan buah dada kanandiurutdengan tangan kanan bila ibu mengerjakan sendiri, bila dikerjakan oleh Bidan atau Perawat buah dada kiri diurut dengan		

tangan kanan dan buah dada kanan diurut dengan tangan kiri.		
4. Pengurutan dari tengah berputar kesamping, terus kebawah kerjakan berulang-ulang antara 10-15 kali.		
5. Bagian samping buah dada diurut daripangkal keputing dilakukan 10- 15 kali.		
6. Pengurutan bagian bawah buah dada kearah putting dilakukan 15-20 kali.		
7. Pengetokan dengan ruas-ruas jari tangan dengan cepat dan teratur.		

2. Produksi ASI dalam penelitian ini adalah keadaan yang menunjukkan keluarnya ASI setelah 30 jam pascapersalinan yang dikeluarkan setelah 30 menit tidak dihisap oleh bayi dengan menggunakan breastpump pada payudara kanan dan kiri masing-masing 5 menit secara bergantian dan diukur dengan gelas ukur.

PRODUKSI ASI	CUKUP	TIDAK CUKUP
	1	0
Produksi ASI setelah melakukan pemompaan pada payudara kanan dan kiri setelah tidak dihisap oleh bayi selama 30 menit dan diukur dengan menggunakan gelas ukur.		

RIWAYAT HIDUP



Nita Haeriaty, lahir di Sinjai pada tanggal 29 Desember 1987, penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara, buah kasih dari Muh.Tahir dan Haniah.

Penulis menempuh pendidikan dasar diawali pada Sekolah Dasar yakni SDN 04 Balangnipa Sinjai pada tahun 1994 dan tamat pada tahun 2000. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang SLTP Negeri 1 Sinjai Utara dan tamat pada tahun 2003. Kemudian, penulis melanjutkan ke SMU Negeri 1 Tompo'bulu Bantaeng dan berhasil lulus pada tahun 2006 di SMU Negeri 1 Sinjai Utara. Pada tahun 2006 penulis memasuki bangku kuliah di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur PMJK di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan menjadi mahasiswa pada Fakultas Kesehatan, Jurusan Keperawatan Program Studi Keperawatan S1. Syukur Alhamdulillah berkat pertolongan Allah SWT, perjuangan keras yang disertai iringan doa dari orang tua dan saudara, perjuangan panjang penulis dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dapat berhasil dengan tersusunnya skripsi yang berjudul : “Hubungan Perawatan Payudara dengan Produksi ASI Pada Ibu Nifas di RSUD Sinjai”.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R