

**Skrining Senyawa Antimitosis Ekstrak Daun Turi (*Sesbania grandiflora* L.) Berdasarkan Penghambatan Pembelahan Sel Telur Bulubabi**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi  
pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh

Nisaul Hasanah  
NIM. 70100106059

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2010

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**


Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Desember 2010

Penyusun,

**NISAUL HASANAH**

NIM. 70100106059



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Skrining Senyawa Antimitosis Ekstrak Daun Turi (*Sesbania grandiflora* L) Berdasarkan Penghambatan Pembelahan Sel Telur Bulubabi” yang disusun oleh Nisaul Hasanah, NIM: 70100106059, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2010 M bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1431 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 04 Desember 2010 M  
27 Dzulhijjah 1431 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. DR. Gemini Alam, M.Si., Apt ( )  
Sekretaris : Abdul Rahim, S.Si., M.Si., Apt ( )  
Penguji I : Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt ( )  
Penguji II : Prof. Dr. M. Irfan Idris, M.Ag ( )

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar,

**dr.H.M.FurqaanNaiem,M.Sc.,Ph.D**

**Nip. 19580404 198903 1 001**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah swt. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Segala puji kepada Yang Maha Mengetahui dan Maha Cerdas Allah swt. yang telah menganugerahkan sedikit ilmu yang dimiliki-Nya, Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Skripsi ini dapat terselesaikan tak hanya berkat hasil usaha dan kerja keras yang penulis lakukan tetapi juga dengan doa dan bantuan dari segala pihak yang InsyaAllah mendapat berkah dan rahmat-Nya.

Oleh karenanya, dengan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya terkhusus kepada yang tercinta, Ayahanda M. Ya'kub dan Ibunda St. Zaenab atas doa dan motivasi serta limpahan kasih sayang yang diberikan pada anakda. Terimakasih pada kakak-kakak dan adik-adikku serta keluarga besar yang selalu menjadi penyemangat dalam hidup.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Gemini Alam, M.Si., Apt. selaku pembimbing pertama, Abdul Rahim, S.Si., M.Si., Apt selaku pembimbing kedua, Prof. Dr. Irfan Idris, M.Ag. selaku pembimbing agama, serta Ibu Isriany Ismail S.Si, M.Si., Apt selaku penguji, atas waktunya, segala kebijaksanaan, tenaga, motivasi, dan ilmu yang telah dibagi.

2. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dr.H.Furqaan Naiem, M.sc, Ph.D,  
Pembantu Dekan dan staf tata usaha Fakultas Ilmu Kesehatan atas segala bantuannya
3. Ketua program Studi Farmasi ibu Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si.,  
Apt,  
serta seluruh bapak dan ibu dosen yang pernah mendidik penulis selama ini yang namanya tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas ilmu yang telah diberikan selama ini.
4. Muh.Rusydi, S.Farm dan A. Armisman E.P, S.Farm atas segala bantuannya.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2006 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kepada segenap angkatan 2005, adik-adik angkatan 2007, 2008, dan 2009. Terima kasih atas semuanya.

Demikian skripsi ini dipersembahkan, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menambah wahana ilmu walaupun dengan segenap kekurangan yang dimiliki. Oleh kiranya dengan segenap kerendahan hati agar memberikan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Makassar, Desember 2010


Penulis

## DAFTAR ISI

Daftar isi	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1-3
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	3
D. Manfaat.....	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	4-17
A. Uraian Tanaman Turi.....	4
1. Taksonomi.....	4
2. Nama Daerah.....	4
3. Morfologi Tanaman.....	4
4. Kandungan Kimia.....	5
5. Kegunaan Tanaman.....	5
B. Uraian <i>Tripneustus gratilla</i> Linn.....	6

1. Klasifikasi.....	6
2. Morfologi.....	6
C. Ekstraksi, Fraksinasi dan Identifikasi Senyawa Bioaktif.....	8
1. Ekstraksi.....	8
a. Tujuan ekstraksi.....	9
b. Jenis-jenis ekstraksi.....	9
c. Ekstraksi secara maserasi.....	9
2. Fraksinasi dengan Kromatografi Cair Vakum.....	10
3. Identifikasi Senyawa Bioaktif.....	12
D. Uji Antimitosis.....	12
E. Tinjauan Islam Mengenai Penelitian Tanaman Obat.....	14
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>18-22</b>
A. Alat dan Bahan yang Digunakan.....	18
B. Penyiapan Sampel.....	18
1. Pengambilan sampel.....	18
2. Pengolahan sampel.....	18
C. Ekstraksi Sampel.....	19
D. Uji Efek Antimitosis Terhadap Sel Telur Bulubabi.....	19
1. Penyiapan Sel Telur dan Sperma Bulubabi.....	19
2. Pembuatan Konsentrasi Sampel dan Kontrol.....	19
3. Pengujian Antimitosis.....	20
E. Fraksinasi Komponen Kimia.....	20
1. Persiapan Kolom Kromatografi Cair Vakum.....	20
2. Pemisahan Komponen Kimia.....	21
F. Identifikasi Senyawa Aktif.....	21
G. Analisis dan Pengolahan Data.....	22

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	23-29
<i>A. Hasil Penelitian</i> .....	23
1. Determinasi Tumbuhan.....	23
2. Ekstraksi Sampel dan Uji Antimitosis.....	23
3. Fraksinasi Sampel dan Uji Antimitosis Hasil fraksinasi.....	24
<i>B. Pembahasan</i> .....	26
BAB V. PENUTUP.....	30
DAFTAR PUSTAKA.....	31-33
LAMPIRAN.....	34-50




## DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Hasil uji antimitosis ekstrak n-heksan dan ekstrak metanol daun turi berdasarkan penghambatan pembelahan sel telur bulubabi	23
2.	Hasil uji antimitosis ekstrak metanol daun turi hasil fraksinasi Berdasarkan penghambatan sel telur bulubabi	25
3.	Hasil respon fraksi C terhadap beberapa pereaksi	26
4.	Data hasil pengamatan penghambatan pembelahan sel telur bulubabi dari ekstrak n-heksan dan metanol daun turi	36
5.	Data hasil pengamatan penghambatan pembelahan sel telur bulubabi dari hasil fraksinasi KCV ekstrak metanol daun turi	37
6.	Harga probit sesuai persentasinya	39

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Foto KLT hasil fraksinasi ekstrak metanol daun turi	24
2. Foto KLT ekstrak metanol dan n-heksan daun turi	47
3. Foto KLT hasil respon fraksi C terhadap beberapa pereaksi	48
4. Pembelahan sel telur bulubabi	49
5. Foto tumbuhan turi ( <i>Sesbania grandiflora</i> L.)	50
6. Foto daun tumbuhan turi ( <i>Sesbania grandiflora</i> L.)	50



## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1a. Skema kerja skrining senyawa antimitosis ekstrak daun turi ( <i>Sesbania grandiflora</i> L.) berdasarkan penghambatan pembelahan sel telur bulubabi	34
1b. Pelaksanaan uji antimitosis berdasarkan penghambatan pembelahan sel telur bulubabi	35
2. Tabel 4. Data hasil pengamatan penghambatan pembelahan sel telur bulubabi dari ekstrak n-heksan dan metanol daun turi	36
3. Tabel 5. Data hasil pengamatan penghambatan pembelahan sel telur bulubabi dari hasil fraksinasi KCV ekstrak metanol daun turi	37
4. Harga probit sesuai persentasenya	39
5a. Data hasil perhitungan nilai $IC_{50}$ ekstrak n-heksan daun turi ( <i>Sesbania grandiflora</i> L.)	40
5b. Data hasil perhitungan nilai $IC_{50}$ ekstrak metanol daun turi ( <i>Sesbania grandiflora</i> L.)	41
5c. Data hasil perhitungan nilai $IC_{50}$ fraksi A ekstrak metanol daun turi ( <i>Sesbania grandiflora</i> L.)	42
5d. Data hasil perhitungan nilai $IC_{50}$ fraksi B ekstrak metanol daun turi ( <i>Sesbania grandiflora</i> L.)	43
5e. Data hasil perhitungan nilai $IC_{50}$ fraksi C ekstrak metanol daun turi ( <i>Sesbania grandiflora</i> L.)	44
5f. Data hasil perhitungan nilai $IC_{50}$ fraksi D ekstrak metanol daun turi ( <i>Sesbania grandiflora</i> L.)	45
5g. Data hasil perhitungan nilai $IC_{50}$ fraksi E ekstrak metanol daun turi ( <i>Sesbania grandiflora</i> L.)	46
6. Gambar 2. Hasil KLT ekstrak metanol dan n-heksan daun turi	47
7. Gambar 3. Foto hasil respon fraksi C terhadap beberapa pereaksi	48
8. Gambar 4. Pembelahan sel telur bulubabi	49
9. Gambar 5 : Foto tumbuhan Turi ( <i>Sesbania grandiflora</i> L. Pers.) Gambar 6 : Foto daun tumbuhan Turi ( <i>Sesbania grandiflora</i> L. Pers.)	50

## ABSTRAK

Nama : Nisaul Hasanah  
NIM : 70100106059  
Jurusan : Farmasi  
Judul Skripsi : “Skrining Senyawa Antimitosis Ekstrak Daun Turi (*Sesbania grandiflora* L.) Berdasarkan Penghambatan Pembelahan Sel Telur Bulubabi”

---

Telah dilakukan skrining senyawa antimitosis ekstrak n-heksan dan ekstrak metanol Daun turi (*Sesbania grandiflora* L.) berdasarkan penghambatan pembelahan sel telur bulubabi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antimitosis dari ekstrak daun turi (*Sesbania grandiflora* L.). 300 gram daun turi diekstraksi secara maserasi dengan n-heksan dan selanjutnya ampas diekstraksi kembali dengan metanol. Ekstrak yang diperoleh diuji lebih lanjut efek antimitosisnya berdasarkan penghambatan pembelahan sel telur bulubabi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak metanol lebih aktif daripada n-heksan sebagai antimitosis dengan nilai  $IC_{50}$  3,776  $\mu\text{g/ml}$ . Ekstrak metanol difraksinasi dengan kromatografi kolom cair vakum dan diperoleh 5 fraksi gabungan yaitu fraksi A, B, C, D dan E. Fraksi C merupakan fraksi teraktif dengan nilai  $IC_{50}$  0.033  $\mu\text{g/ml}$ . Fraksi teraktif diidentifikasi mengandung senyawa golongan triterpenoid.

Kata kunci : daun turi, antimitosis, sel telur bulubabi

## ABSTRACT

Name : Nisaul Hasanah  
Reg. No. : 70100106059  
Department : Pharmacy  
Title of Thesis : “Screening Antimitotic Compound Of Extract of Turi leaves (*Sesbania grandiflora* L.) Based on Inhibition of Sea Urchin Eggs Development”

---

Screening antimitotic compound of extract of Turi Leaves (*Sesbania grandiflora* L.) based on inhibition of sea urchin eggs development have been done. The aim of this research was to know antimitotic effect from extract of Turi leaves (*Sesbania grandiflora* L.). 300 gram the leaves of Turi was extracted by maceration method with n-hexane and than the pulp was extracted again with methanol. The extracts obtained were tested further antimitotic effect based on inhibition of sea urchin eggs development. The result indicated that methanol extract was active as antimitotic with  $IC_{50}$  3,776  $\mu\text{g/ml}$  than n-heksan. The methanol extract was fractionated by vacuum liquid column chromatography, and get 5 fractions as A, B, C, D and E fraction. Fraction C was the active fraction with  $IC_{50}$  0,033  $\mu\text{g/ml}$ . The active fraction was identified as triterpenoida class compounds.

Key word : The leaves of turi, antimitotic, sea urchin eggs

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia sangat kaya dengan tumbuhan obat yang dimanfaatkan untuk obat tradisional dan telah lama digunakan secara empirik yang memberi manfaat dalam meningkatkan kesehatan tubuh dan pengobatan berbagai penyakit (Wibisana, 1990).

Allah swt. berfirman dalam surah Asy Syu'araa' ayat 7

Terjemahnya: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ أَخْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾  
“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuhan yang baik?”

Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan (Thalbah, 2009). Salah satu tumbuhan obat yang digunakan adalah tumbuhan turi (*Sesbania grandiflora* L).

Tumbuhan turi (*Sesbania grandiflora* L) yang termasuk dalam famili Papilionaceae dapat digunakan untuk mengobati keseleo, memar akibat terpukul (hematoma), luka, keputihan, batuk, hidung berlendir, sakit kepala, memperbanyak produksi ASI, beri-beri, demam nifas, radang tenggorokan. Bagian daun tumbuhan ini mengandung komponen kimia seperti saponin, tanin, glikosida, peroksidase, vitamin A dan B (Yuniarti, 2008).

Senyawa Saponin telah dilaporkan memiliki aktivitas biologi yang luas, antara lain sebagai hemolitik, antiinflamasi, antifungi, antimikroba, antiprotozoa, antivirus, antikanker atau sitotoksik (Deore, 2009). Saponin dalam air mempunyai sifat menurunkan tegangan permukaan, dan bila

dikocok akan timbul busa. Senyawa saponin triterpenoid bersifat sitotoksik (Manitto,1981). Hal ini memungkinkan adanya efek antimitosis dari daun turi.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain penelitian terhadap aktivitas antiulcer dari ekstrak etanol kulit daun turi dimana dari hasil penelitian tersebut menyatakan pada dosis 36,75 mg/kg (ED<sub>50</sub>, p.o) ekstrak etanol memiliki potensi antiulcer (Sertie, 2001). Selain itu telah dilakukan penelitian efek antioksidan dari tanaman turi terhadap paru-paru tikus yang telah diinduksi asap rokok, dimana suspensi daun turi (1000 mg/kg b.w./day, p.o) telah memberikan efek antioksidan (Ramesh, 2007). Penelitian tentang efek antimitosis dari daun turi sampai saat ini belum pernah dilaporkan.

Studi penghambatan pada perkembangan sel telur bulubabi merupakan model yang cocok untuk mendeteksi aktivitas sitotoksik, teratogenik, dan antineoplastik dari senyawa baru. Sel telur bulubabi juga digunakan secara luas sebagai model untuk mengevaluasi perkembangan toksikologi (Malpezzi, 1994). Penghambatan pembelahan sel merupakan suatu ukuran aktivitas antimitotik dari senyawa kimia. Metode bioassay ini merupakan metode yang mudah untuk mendeteksi aktivitas senyawa kimia (Thomson, 2001).

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ekstrak daun turi (*Sesbania grandiflora* L) dapat menghambat pembelahan sel telur bulubabi?
2. Ekstrak daun turi (*Sesbania grandiflora* L) manakah yang dapat menghambat pembelahan sel telur bulubabi paling besar?

3. Berapakah nilai  $IC_{50}$  ekstrak n-heksan, metanol, dan hasil fraksinasi ekstrak teraktif daun turi (*Sesbania grandiflora* L)?

**C. Maksud dan Tujuan**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui efek antimitosis dari ekstrak daun turi (*Sesbania grandiflora* L). Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan skrining senyawa antimitosis ekstrak daun turi (*Sesbania grandiflora* L) berdasarkan penghambatan pembelahan sel telur bulubabi.

**D. Manfaat**

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah data ilmiah tentang efek antimitosis dari ekstrak daun turi (*Sesbania grandiflora* L) untuk kemudian dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk mempelajari sifat sitotoksik dari daun turi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Uraian Tumbuhan Turi

##### 1. Taksonomi

Regnum	:	Plantae
Divisi	:	Spermatophyta
Anak divisi	:	Angiospermae
Kelas	:	Dicotyledoneae
Anak kelas	:	Dialypetalae
Bangsa	:	Rosales
Suku	:	Papilionaceae
Marga	:	Sesbania
Jenis	:	<i>Sesbania grandiflora</i> L. Pers.
Sinonim	:	<i>Agati grandiflora</i> Desv (Khare, 2007)

##### 2. Nama Daerah

Jawa: Turi, Toroy. Sumatera : Turi. Sulawesi : Suri, Uliango, gongo gua, kajujawa, ajutaluma, turing. Bali : Tuwi. Nusa Tenggara : Gala – gala, tuwi, palawu, tanumu, ghunga, kalala. Maluku: Tun (Yuniarti, 2008)

##### 3. Morfologi Tumbuhan

Pohon turi kecil berumur pendek, tinggi 5 -12 m dengan ranting menggantung. Kulit luar berwarna kelabu hingga kecoklatan, tidak rata, dengan alur membujur dan melintang tidak beraturan, lapisan gabus mudah, terkelupas. Pada bagian dalam berair dan sedikit berlendir. Percabangan baru keluar setelah tinggi tanaman sekitar 5 m. Berdaun majemuk yang letaknya tersebar dengan daun penumpu yang panjangnya

0,5 – 1 cm. Panjang daun 20 – 30 cm, menyirip genap, dengan 20 – 40 pasang anak daun yang bertangkai pendek. Helai anak daun berbentuk jorong memanjang, tepi rata, panjang 3 – 4 cm, lebar 0,8 – 1,5 cm. Bunganya besar dalam tandan yang keluar dari ketiak daun, letaknya menggantung dengan 2 – 4 bunga yang bertangkai, kuncupnya berbentuk sabit, panjangnya 7 – 9 cm, bila mekar bunganya berbentuk kupu – kupu. Ada 2 varietas, yang berbunga putih dan berbunga merah. Buah bentuk polong yang menggantung, berbentuk pita dengan sekat antara panjang 20 – 55 cm, lebar 7 – 8 mm. Biji 15 – 50, letak melintang didalam polong. Akarnya berbintil – bintil, berisi bakteri yang dapat memanfaatkan nitrogen sehingga bisa menyuburkan tanah (Steenis, 2006).

#### 4. Kandungan Kimia

Tanaman turi mengandung saponin, tanin, glikosida, peroksidase, vitamin A, vitamin B, egatin, zantoaetin, basorin, resin, kalsium oksalat, sulfur, peroksida, zat warna getah (gom) dan zat merah (adstringen), Kalsium, zat besi, zat gula, vitamin A dan B (Hariana, 2006).

#### 5. Kegunaan Tumbuhan

Tumbuhan turi (*Sesbania grandiflora* L.) digunakan dalam pengobatan tradisional sebagai obat demam nifas setelah melahirkan, keputihan, kuku jari bengkak karena terpukul atau terantuk, hidung berlendir dan sakit kepala, radang tenggorakan dan juga rebusan dari daun yang digunakan sebagai air kumur dapat menyembuhkan amandel yang bengkak, obat sariawan, pembunuh kuman, disentri, berak darah, cacar air dan batuk, pelembut kulit, pencahar dan penyejuk ( Sastroamidjojo, 2001).

## **B. Uraian *Tripneustus gratilla* Linn**

### **1. Klasifikasi**

Kingdom	: Protista
Filum	: Echinodermata
Kelas	: Echinoidea
Subkelas	: Regularia
Bangsa	: Aulodonta
Suku	: Toxopneustidae
Marga	: <i>Tripneustus</i>
Jenis	: <i>Tripneustus gratilla</i> Linn (Radiopoetra, 1983)

### **2. Morfologi**

Bulubabi atau Landak laut hidup di atas batu karang atau dalam lumpur pada daerah pantai atau di dasar laut pada kedalaman sampai 5000 m. Hewan ini bergerak dengan menggunakan duri yang bersendi dan kaki ambulakral. Kecuali itu kaki juga berfungsi meraba objek pada waktu berada di dasar laut.

Pada umumnya landak laut mempunyai jerohan atau vicera tersimpan dalam cangkok yang tersusun menurut 10 jajaran lempengan kapur yang tersambung bersama membentuk bola. Pada cangkok terdapat tonjolan atau tuberculum sebagai tempat persendian duri-duri. Tiap duri merupakan bentuk kristal dari  $\text{CaCO}_3$  yang ujung pangkalnya agak melebar tempat sendi dengan tuberculum. Pangkal duri ini terikat dengan otot sehingga duri dapat digerakkan. Di antara duri terdapat tantakel. Tantakel berfungsi menjaga tubuh agar selalu bersih dan untuk menangkap makanan yang kecil-kecil.

Saluran pencernaan yang panjang melingkar di dalam cangkang. Saluran pencernaan dimulai dari mulut terus ke oesophagus, lambung yang diperluas dengan kantung-kantung, intestinum yang bagian akhir disebut

rectum, dan berakhir dengan anus. Pada oesophagus terdapat saluran siphon yang memiliki silia kuat yang menghubungkan oesophagus dengan intestinum.

Anus terletak di pusat tubuh pada permukaan aboral, terletak di antara lempengan kapur yang besar yang mengandung 5 atau 4 atau 2 lubang genital. Mulut yang besar terletak di daerah oral dikelilingi oleh 5 buah gigi yang kuat dan tajam. Gigi tersebut disokong oleh 5 rangka samping di sebelah dalam cangkok yang terkenal sebagai "Lentera aristoteles".

Terdapat 10 insang yang menjorok dari membran peritoneum. Madreporit terdapat di daerah aboral, sedang saluran cincin melingkar esophagus dan saluran radial tetap dalam interior cangkok yang terhubung dengan kaki ambulakral. Saraf cincin melingkari mulut.

Terdapat 5 gonad yang menempel mesenteris ke bagian permukaan aboral. Dari masing-masing gonad terdapat saluran ke lubang genital. Telur-telur dan sperma dilepaskan ke dalam air laut, kemudian terjadi pembuahan yang selanjutnya tumbuh menjadi larva plutea yang akan mengalami metamorphosis setelah 5 atau 6 minggu.

Semua Echinoidea membersihkan tubuh dengan jalan menggerakkan duri-duri dan tantakel. Bersama gerakan itu sisa-sisa bahan makanan dikeluarkan dari anus. Hewan ini memakan bermacam makanan di laut, misalnya hewan lain yang telah mati, organisme kecil lainnya, rumput laut, di samping itu juga mencerna lumpur atau pasir yang mengandung bahan organis (Jasin, 1992).

Proses pembelahan sel setelah terjadi fertilisasi terdiri dari beberapa tahap. Pembelahan sel pertama terjadi kira-kira 2-3 jam setelah terjadinya fertilisasi (Thomson, 2001). Selanjutnya pembelahan tambahan terjadi dengan interval sekitar 20 menit untuk membentuk 4 sel, 8 sel, 16

sel, dan seterusnya. Setelah 6 jam, akan terbentuk blastula. Perkembangan selanjutnya akan menampakkan terbentuknya gastrula pada 1 atau 2 hari kemudian (Sumich, 1992)

### **C. Ekstraksi, Fraksinasi dan Identifikasi Senyawa Bioaktif**

#### **1. Ekstraksi**

Proses untuk mendapatkan ekstrak disebut ekstraksi, yaitu penyarian zat berkhasiat atau zat aktif dari bagian tanaman obat, hewan dan beberapa jenis ikan termasuk biota laut (Anonim, 1986).

Ragam ekstraksi yang tepat sudah tentu bergantung pada tekstur dan kandungan air bahan tumbuhan yang diekstraksi dan pada jenis senyawa yang diisolasi. Umumnya kita perlu ‘membunuh’ jaringan tumbuhan untuk mencegah terjadinya oksidasi enzim atau hidrolisis. Bila ampas jaringan, pada ekstraksi ulang, sama sekali tak berwarna hijau lagi, dapat dianggap semua senyawa berbobot molekul rendah telah terekstraksi (Harborne, 1987).

##### **a. Tujuan Ekstraksi**

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik komponen kimia dari tanaman. Ekstrak adalah senyawa aktif dari tanaman atau jaringan hewan, dengan menggunakan pelarut yang selektif. Proses ekstraksi ini berdasarkan pada kemampuan pelarut organik untuk menembus dinding sel dan masuk dalam rongga sel yang mengandung zat aktif (Anonim, 1986).

##### **b. Jenis-Jenis Ekstraksi**

Proses ekstraksi dapat dilakukan secara panas dan secara dingin. Ekstraksi secara panas yaitu dengan metode refluks dan

destilasi uap air, sedangkan ekstraksi dingin yaitu dengan maserasi, perkolasi dan soxhletasi (Sudjadi, 1988)

**c. Ekstraksi secara Maserasi**

Umumnya zat aktif yang terkandung dalam tanaman maupun hewan lebih larut dalam pelarut organik. Proses terekstraksinya zat aktif dalam tanaman adalah sebagai berikut, pelarut organik akan menembus dinding sel dan masuk kedalam rongga sel tanaman atau hewan yang mengandung zat-zat aktif. Zat –zat aktif tersebut akan terlarut sehingga akan terjadi perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan pelarut organik diluar sel. Maka larutan terpekat akan berdifusi keluar sel, dan proses ini berulang terus sampai terjadi kesetimbangan antara konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel (Anonim, 1986).

Maserasi merupakan jenis ekstraksi yang sangat sederhana yang dilakukan dengan cara merendam bahan simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan terlarut dan adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dan di luar sel, maka zat aktif (zat terlarut) ditarik keluar. Peristiwa tersebut terjadi berulang kali hingga terjadi kesetimbangan konsentrasi antara larutan di luar dan di dalam sel.

Maserasi dilakukan dengan cara memasukkan 10 bagian simplisia dengan derajat halus yang cocok ke dalam bejana, kemudian dituangi dengan cairan penyari 75 bagian, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari, terlindung dari cahaya sambil sesekali diaduk (Anonim, 1986).

## 2. Fraksinasi dengan Kromatografi Kolom Cair Vakum

Kromatografi adalah suatu metode fisik, dimana komponen-komponen yang dipisahkan didistribusikan diantara 2 fasa, salah satu fasa tersebut adalah fasa stasioner dengan permukaan yang luas, yang lainnya sebagai fluida yang mengalir lembut di sepanjang landasan stasioner. Dalam semua teknik kromatografi, zat-zat terlarut yang dipisahkan bermigrasi sepanjang kolom, dan tentu saja dasar pemisahan terletak dalam laju perpindahan sebuah zat terlarut sebagai hasil dua faktor, yang satu cenderung menggerakkan zat terlarut itu, dan yang lain menahannya (Day, 2002)

Solut akan terelusi menurut perbandingan distribusinya. Jika perbedaan perbandingan distribusi solut cukup besar maka campuran-campuran solut akan mudah dan cepat dipisahkan. Solut yang tidak tertahan akan bermigrasi dengan kecepatan yang sama dengan fase gerak, karena perbandingan distribusi dan faktor retensinya sama dengan fase gerak. Nilai minimum  $R_f$  adalah 0 dan ini teramati jika solut tertahan pada posisi titik awal di permukaan fase diam (Rahman, 2007).

Kromatografi cair vakum memiliki kekuatan melarutkan yang bagus, mudah diaplikasikan dalam kromatografi skala besar (sampai 100 g) dan cepat. Teknik ini ekonomis dan secara signifikan mengurangi penggunaan pelarut dan jumlah silika yang digunakan. Artinya setiap komponen akan terdapat di sedikit fraksi dan mengurangi tercampurnya setiap fraksi jika diamati (Pedersen, 2009).

Kromatografi kolom cair vakum menggunakan corong Buchner kaca masir atau kolom pendek dan dapat pula menggunakan kolom yang lebih panjang. Kolom kromatografi dikemas kering (biasanya dengan

penjerap KLT 10-40 mikrometer) dalam keadaan vakum agar diperoleh kerapatan kemasan maksimum. Vakum dihentikan, pelarut yang kepolarannya rendah dituangkan ke permukaan penyerap lalu divakumkan lagi. Kolom dihisap sampai kering dan siap digunakan. Sampel dilarutkan dalam pelarut yang cocok kemudian dimasukkan pada bagian atas kolom atau pada lapisan prapenyerap (tanah diatomae, celite) dan dihisap perlahan-lahan ke dalam kemasan dengan menvakumkannya. Kolom dielusui dengan campuran pelarut yang cocok, mulai dengan pelarut yang kepolarannya rendah lalu kepolaran ditingkatkan perlahan-lahan, kolom dihisap sampai kering pada setiap pengumpulan fraksi. Oleh karena itu kromatografi cair vakum menggunakan tekanan rendah untuk meningkatkan laju aliran fase gerak (Hostetmann, 1985).

### **3. Identifikasi Senyawa Bioaktif**

Sebelum melakukan isolasi terhadap suatu senyawa kimia yang diinginkan dalam suatu tumbuhan maka perlu dilakukan identifikasi pendahuluan kandungan senyawa metabolit sekunder yang ada pada masing-masing tumbuhan, sehingga dapat diketahui kandungan senyawa yang ada secara kualitatif dan mungkin juga secara kuantitatif golongan senyawa yang dikandung oleh tumbuhan tersebut (Darwis, 2000)

Pada identifikasi suatu kandungan tumbuhan, setelah kandungan itu diisolasi dan dimurnikan, pertama-tama harus kita tentukan dahulu golongannya, kemudian barulah ditentukan senyawa dalam golongan tersebut. Sebelum itu, keserbasamaan senyawa tersebut harus diperiksa secara cermat, artinya senyawa harus membentuk bercak tunggal dalam beberapa sistem KLT dan atau KKt (Harborne, 1987).

Terdapat berbagai kemungkinan untuk deteksi senyawa tanpa warna pada kromatogram. Deteksi paling sederhana adalah jika senyawa menunjukkan penyerapan di daerah UV gelombang pendek (radiasi utama pada kira-kira 254 nm) atau jika senyawa itu dapat dieksitasi ke fluoresensi radial UV gelombang pendek dan atau gelombang panjang (365 nm). Jika dengan kedua cara itu senyawa tidak dapat dideteksi, harus dicoba dengan pereaksi kimia; pertama tanpa dipanaskan, kemudian bila perlu dengan dipanaskan ( Stahl, 1985).

#### **D. Uji Antimitosis**

Mitosis merupakan satu bagian dari siklus sel. Sebenarnya fase mitotik (M), yang mencakup mitosis dan sitokinesis, biasanya merupakan bagian tersingkat dari siklus sel tersebut. Pembelahan sel mitotik yang berurutan bergantian interfase yang jauh lebih lama, yang seringkali meliputi 90% dari siklus ini. Selama interfase inilah sel tumbuh dan menyalin kromosom dalam persiapan untuk pembelahan sel. Interfase dapat dibagi menjadi subfase : fase  $G_1$  ("gap pertama"), fase S, dan fase  $G_2$  ("gap kedua"). Selama ketiga subfase ini sel tumbuh dengan menghasilkan protein dan organel dalam sitoplasma. Kromosom diduplikasi hanya selama fase S (S singkatan untuk sintesa DNA). Dengan demikian, suatu sel tumbuh ( $G_1$ ), terus tumbuh begitu sel tersebut sudah menyalin kromosomnya (S), dan tumbuh lagi sampai sel tersebut menyelesaikan persiapannya untuk pembelahan sel ( $G_2$ ), dan membelah (M). Sel anak kemudian dapat mengulangi siklus ini (Campbell, 1999).

Penghambatan pembelahan sel merupakan suatu ukuran aktivitas antimitotik dari senyawa kimia. Senyawa kimia yang bersifat antimitotik seperti vinblastine dan podophyllotoxin telah menunjukkan penghambatannya terhadap pembelahan sel telur bulubabi setelah fertilisasi. Metode bioassay ini merupakan metode yang mudah untuk mendeteksi aktivitas senyawa kimia (Thomson, 2001).

Perkembangan telur bulubabi laut menunjukkan beberapa dugaan yang mengenai bagaimana aksi bahan-bahan uji. Siklus sel bulubabi secara dramatis dikurangi, siklus esensial dari S (sintesis) sampai M (mitosis) (Jacobs, 1986). Penghambatan pertama sel dihubungkan dengan DNA dan atau sintesis protein atau pembentukan mikrotubula, karena sintesis RNA adalah sangat lambat atau tidak ada setelah fertilisasi (Gross, 1964).

Pemilihan sel telur bulu babi untuk evaluasi aktivitas antimitosis dimana merupakan sebuah sistem selektif terhadap zat yang mengganggu peran dalam fungsi proses mitosis, dengan demikian mengidentifikasi zat yang berpotensi antikanker. Dibandingkan kultur sel kanker mamalia, pengujian sel bulubabi praktis dan mampu memberikan alternatif untuk skrining bahan antimitosis. Pengujiannya menggunakan air laut sebagai medium kultur dan tidak membutuhkan kondisi steril. Penghambatan pada pertumbuhan sel menunjukkan aktifitas antimitosis (Jacobs, 1986).

Studi perubahan pada perkembangan sel telur bulubabi merupakan model yang cocok untuk mendeteksi aktivitas sitotoksik, teratogenik, dan antineoplastik dari senyawa baru. Sel telur bulubabi juga digunakan secara luas sebagai model untuk mengevaluasi perkembangan toksikologi (Siswandono, 1995).

#### ***E. Tinjauan Islam Mengenai Penelitian Tanaman Obat***

Islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasari oleh ilmu pengetahuan, penelitian, dan eksperimen ilmiah. Oleh karena itu setiap pengobatan hendaklah ditangani oleh para ahlinya (Qaradhawi 2001, 159).

Islam menentang pengobatan versi dukun dan para tukang sihir, atau yang sering sekali disebut dengan pengobatan alternatif. Sebaliknya Islam sangat menghargai bentuk – bentuk pengobatan yang didasarkan oleh ilmu pengetahuan, penelitian eksperimen ilmiah, dan hukum sebab-akibat. Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wasallam* Bersabda

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ قَبْلُ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ

Artinya :

“Barang siapa yang mengobati, namun ia tidak menguasai ilmu pengobatan, maka ia harus bertanggung jawab”

Dalam hal ini Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wasallam* dengan ucapan, tindakan, dan keputusannya merupakan teladan yang menunjukkan bagaimana pengobatan yang baik. Pengobatan versi Beliau adalah pengobatan yang merujuk pada ilmu pengetahuan dan eksperimen, bukan pada perkiraan ataupun fatamorgana belaka.

Obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan dapat berasal dari bahan sintetik maupun dari bahan alam. Dewasa ini bahan alam khususnya tumbuhan telah banyak diteliti oleh para ahli untuk dikembangkan menjadi suatu bahan obat, mengingat bahwa Negara Indonesia kaya akan berbagai jenis tumbuhan yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, salah satu diantaranya adalah dalam pengobatan yang biasa dikenal dengan obat tradisional (Abdushshamad 2002, 141).

Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah banyak digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pengobatan maupun kecantikan. Dunia kedokteran juga banyak mempelajari obat tradisional dan hasilnya mendukung bahwa tumbuhan obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis yang bermanfaat bagi kesehatan. Allah swt. berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 10

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ

زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

Terjemahnya :

“Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di Permukaan ) bumi supaya bumi itu tidak mengoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala yang diciptakan di bumi ini termasuk tumbuh – tumbuhan ada manfaatnya, termasuk tumbuhan Turi memiliki banyak manfaat antara lain dapat digunakan untuk mengobati keseleo, memar akibat terpukul (hematoma), luka, keputihan, batuk, hidung berlendir, sakit kepala, memperbanyak produksi ASI, beri-beri, demam nifas, radang tenggorokan.

Dalam *Al-Qur'an* terdapat isyarat ilmiah tentang bagaimana tumbuh-tumbuhan dapat mengandung tenaga yang muncul sebagai api atau tenaga kalori ketika bahan tersebut dibakar. Hal ini terdapat dalam surah Yasin ayat 80.

الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٠﴾

Terjemahnya:

“(Allah) yang menjadikan untuk kamu api dari kayu yang hijau, maka (kamu) dapat menyalakan (api) darinya (kayu hijau itu)”

Istilah “Asy-syajar al-akhdar” menurut para ahli adalah “zat hijau daun” atau yang dikenal dengan klorofil. Klorofil terdiri dari ikatan zat-zat karbon, hidrogen, nitrogen, dan magnesium. Aktivitas utama klorofil adalah membentuk zat organik dari zat anorganik sederhana dengan bantuan sinar matahari. Proses ini disebut fotosintesis. Jelasnya klorofil mengubah mengubah tenaga radiasi matahari menjadi tenaga kimiawi melalui proses fotosintesis atau dengan kata lain menyimpan tenaga matahari dalam tumbuh-tumbuhan berupa makanan dan bahan bakar yang nantinya akan muncul

sebagai api atau tenaga kalori sewaktu terjadi pembakaran. Proses ini disebut respirasi (Shihab, 1999).

Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 59.

﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعَلِّمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا

تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا

يَأْسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang gaib; tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata.”

*Al-Qur'an* menggunakan benda-benda alam, sebagai tali penghubung untuk mengingatkan manusia akan kehadiran Allah swt. dan bahwa segala sesuatu yang terjadi sekecil apa pun adalah di bawah kekuasaan, pengetahuan, dan pengaturan Tuhan Yang Maha Kuasa (Shihab, 1996)

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Alat dan Bahan yang Digunakan***

Alat-alat yang digunakan adalah aerator, cawan porselin, chamber, corong, gelas Erlenmeyer (*Pyrex*), gelas ukur, lampu UV 254 nm, lampu UV 366 nm, mikropipet (*Socorex*), mikroskop, neraca analitik, oven, pipet tetes, pipet ukur, rotavapor, sendok tanduk, sentrifuge (*K*), seperangkat alat kromatografi cair vakum (*Thomas*), spatel besi, syringe 1 ml, syringe 4 ml, tabung Eppendorf, timbangan kasar (*O'Hauss*), vial, wadah maserasi.

Bahan-bahan yang digunakan adalah air laut, air suling, kloroform, lempeng silika gel 60 F<sub>254</sub> (*E.Merck*), metanol, pereaksi AlCl<sub>3</sub> 5%, Dragendorf, FeCl<sub>3</sub> 5 %, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 10 %, KCl 10%, Liebermann Bouchard, n-heksan, sampel daun turi (*Sesbania grandiflora* L), silika gel GF<sub>254</sub> (*E.Merck*),

##### ***B. Penyiapan Sampel***

###### **1. Pengambilan Sampel**

Sampel daun turi (*Sesbania grandiflora* L.) diambil dari Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Pengambilan dilakukan pada saat proses fotosintesis berlangsung maksimal dengan cara memetik daun kelima dari pucuk hingga ke bawah.

###### **2. Pengolahan Sampel**

Sampel yang telah dikumpulkan kemudian dibersihkan dari kotoran, lalu dicuci dengan air bersih. Setelah itu sampel dikeringkan dengan cara diangin-anginkan tanpa pemaparan sinar matahari kemudian dipotong-potong kecil dan selanjutnya dihaluskan, sampel siap diekstraksi.

### **C. Ekstraksi Sampel**

Sampel daun turi (*Sesbania grandiflora* L) yang telah kering ditimbang sebanyak 300 g dimasukkan ke dalam wadah maserasi, kemudian dibasahi dengan pelarut n-heksan, diamkan selama 1 jam. Selanjutnya ditambahkan pelarut n-heksan hingga sampel terendam sempurna. Wadah maserasi ditutup dan disimpan selama 24 jam di tempat yang tanpa pemaparan sinar matahari sambil sesekali diaduk, selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtrat. Ampas diekstraksi kembali dengan pelarut n-heksan. Hal ini dilakukan selama 3 x 24 jam. Filtrat yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diuapkan menggunakan rotavapor hingga diperoleh ekstrak n-heksan yang kental. Dengan cara yang sama, ampas diekstraksi kembali dengan pelarut metanol sehingga diperoleh ekstrak metanol. Masing-masing ekstrak diuji efek antimitosisnya terhadap sel telur bulubabi dan ekstrak yang paling aktif difraksinasi lebih lanjut.

### **D. Uji Efek Antimitosis terhadap Sel Telur Bulu Babi**

#### **1. Penyiapan Sel Telur dan Sperma Bulu Babi**

Bulubabi jantan dan betina diinduksi dengan menyuntikkan 3 ml KCl 10 % ke dalam bagian gonad. Sperma yang berwarna putih susu dan sel telur yang berwarna kuning keemasan ditampung pada gelas kimia yang berbeda. Setelah itu dimasukkan pada lemari pendingin. Fertilisasi dilakukan dengan cara 1 ml suspensi sperma ( 50  $\mu$ l sperma ditambah 2,95 ml air laut) ditambahkan 4 ml sel telur dalam gelas kimia yang berisi 50 ml air laut.

#### **2. Pembuatan Konsentrasi Sampel dan Kontrol**

Ekstrak metanol dan n-heksan daun turi ditimbang sebanyak 10 mg, kemudian dilarutkan dengan DMSO sebanyak 100  $\mu$ l sehingga

diperoleh konsentrasi 100.000 µg/ml sebagai stok. Dari stok tersebut dipipet ke dalam tabung eppendorf masing-masing 10µl, 1µl, 0,1µl sehingga diperoleh konsentrasi 1000µg/ml, 100µg/ml, dan 10µg/ml. Kontrol dibuat 2 jenis, yaitu kontrol air laut dan kontrol dengan DMSO.

Untuk fraksi-fraksi hasil fraksinasi ditimbang sebanyak 1 mg kemudian dilarutkan dengan DMSO sebanyak 1ml, sehingga diperoleh konsentrasi 1000 µg/ml sebagai stok. Dari stok tersebut dipipet ke dalam tabung eppendorf masing-masing 10 µl, 1 µl, 0,5 µl, 0,1 µl dan 0,01 µl sehingga diperoleh konsentrasi 10 µg/ml, 1 µg/ml, 0,5 µg/ml, 0,1µg/ml dan 0,01 µg/ml.

### 3. Pengujian Antimitosis

Masing-masing konsentrasi sampel uji dan kontrol dimasukkan 100µl zigot. Dilakukan pengulangan 3 kali untuk tiap sampel uji dan kontrol. Dibiarkan selama 2-3 jam pada suhu kamar dan terlindung dari sinar. Masing-masing sampel uji dipipet sebanyak 100 µl atau secukupnya, diletakkan di atas objek glass, diamati di bawah mikroskop jumlah sel yang membelah. Dihitung % jumlah sel telur yang tidak membelah dengan rumus:

$$\% \text{ sel telur } \neq \text{ membelah} = \frac{\text{jumlah sel telur } \neq \text{ membelah}}{\text{Jumlah total sel telur}} \times 100 \%$$

Kemudian dihitung nilai IC<sub>50</sub> dengan analisis probit.

## E. Fraksinasi Komponen Kimia

### 1. Persiapan Kolom Kromatografi Cair Vakum

Kolom kromatografi cair vakum dibersihkan kemudian dipasang tegak lurus. Adsorben (silika gel GF<sub>254</sub> ) dimasukkan dalam kolom

kemudian ditambahkan cairan pengelusi n-heksan, selanjutnya pompa vakum dijalankan hingga adsorben (silika gel) rapat.

## 2. Pemisahan Komponen Kimia

Ekstrak yang memiliki efek antimitosis paling besar ditimbang sebanyak 3 g. Kemudian ditimbang silika gel GF<sub>254</sub> sebanyak 20 g. Ditambahkan sedikit silika gel dan n-heksan, kemudian diaduk hingga homogen, didiamkan hingga kering. Setelah kering dimasukkan ke dalam kolom dan bagian atasnya ditutup dengan kertas saring.

Ekstrak metanol difraksinasi menggunakan kromatografi kolom cair vakum (KCV) memakai fase diam silika gel GF<sub>254</sub> dan fase gerak dengan gradien kepolaran yang meningkat yaitu berturut-turut n-heksan:etil asetat (18:1), (15:1), (12:1), (9:1), (6:1), (3:1), (1:1), (1:3), (1:6), etil asetat:metanol (6:1), (3:1), (1:1), metanol, metanol:As.asetat (10:1). Hasil fraksinasi diperoleh 14 fraksi. Masing-masing fraksinasi dimonitor komponen kimianya dengan KLT menggunakan fase diam silika gel 60 F<sub>254</sub> dan fase gerak n-heksan:etil (3:1). Fraksi yang memiliki profil KLT yang sama digabung hingga diperoleh 5 fraksi yaitu fraksi A (Fraksi 1-2), B (fraksi 3-4), C (5-7), D (8-9), dan E (10-14), Masing-masing fraksi kemudian diuji efek antimitosisnya.

### F. Identifikasi Senyawa Aktif

Fraksi dengan IC<sub>50</sub> paling rendah diidentifikasi dengan berbagai pereaksi penampak noda pada KLT.

1. Pereaksi H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 10 %: kromatogram dipanaskan pada 105 °C selama 5 menit dan diamati. Kebanyakan senyawa organik memberikan warna kuning, coklat, hitam.

2. Pereaksi Dragendorf : akan dihasilkan warna jingga dengan latar belakang kuning untuk senyawa golongan alkaloida.
3. Pereaksi  $\text{FeCl}_3$  5 % : akan dihasilkan warna hitam-biru atau hijau untuk senyawa golongan fenol.
4. Pereaksi Liebermann-Bouchard : kromatogram terlebih dipanaskan, kemudian diamati di lampu UV. Munculnya noda berfluoresensi merah menunjukkan adanya triterpen, sedangkan munculnya noda berfluoresensi hijau atau biru menunjukkan adanya sterol.
5. Pereaksi  $\text{AlCl}_3$  5% : diamati di lampu UV, akan dihasilkan noda berfluoresensi kuning untuk senyawa golongan flavonoid.

***G. Analisis dan Pengolahan Data***

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan dihitung dengan menggunakan analisis probit untuk mendapatkan  $\text{IC}_{50}$

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

**1. Determinasi Tumbuhan**

Hasil determinasi tumbuhan yang dilakukan di laboratorium farmakognosi-fitokimia Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dengan acuan buku Flora of Java diperoleh hasil sebagai berikut:

Famili: Papilionaceae

1c, 13b, 23a, 24b, 26b, 27b, 28c, 29b, 32a, 33b, 34b, 35a...Sesbania

Sesbania L:

1a...*Sesbania grandiflora* L. Press

**2. Ekstraksi Sampel dan Uji Antimitosis**

Hasil maserasi 300 g daun turi (*Sesbania grandiflora* L.) yang telah kering diperoleh ekstrak n-heksan sebanyak 15,5 g dan ekstrak metanol kental sebanyak 30,6 g. Ekstrak n-heksan dan metanol diuji efek antimitosisnya dengan konsentrasi 10, 100, 1000 µg/ml. Hasil tercantum pada tabel 1.


Tabel 1. Hasil uji antimitosis ekstrak n-heksan dan ekstrak metanol daun turi berdasarkan penghambatan pembelahan sel telur bulubabi

No	Ekstrak	Konsentrasi (µg/ml)	% Penghambatan	Nilai probit	IC <sub>50</sub> (µg/ml)
1	n-heksan	1000	100	8,09	6,076
		100	86,324	6,08	
		10	70,344	5,52	
2	metanol	1000	100	8,09	3,776
		100	89,803	6,28	
		10	75,789	5,71	

Ekstrak daun turi yang memiliki nilai  $IC_{50}$  paling rendah adalah ekstrak metanol. Ekstrak tersebut kemudian difraksinasi dengan metode kromatografi cair vakum (KCV).

### 3. Fraksinasi Sampel dan Uji Antimitosis Hasil Fraksinasi

Ekstrak metanol daun turi sebanyak 3 g difraksinasi menggunakan kromatografi kolom cair vakum (KCV) diperoleh 14 fraksi. Fraksi yang memiliki kesamaan profil KLT digabung sehingga diperoleh 5 fraksi gabungan yaitu fraksi A, B, C, D, dan E seperti terlihat pada gambar 1. Berat masing-masing berturut-turut 0,098g; 0,078 g; 0,853 g; 0,265 g dan 0,989 g.



Gambar 1. Foto KLT hasil fraksinasi ekstrak metanol daun turi. Fase gerak: n-heksan:etilasetat(3:1),(a) UV 254 nm; (b) UV 366 nm; (c) H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 10%

Masing-masing fraksi diuji kembali efek antimitosisnya dengan konsentrasi yang lebih kecil yaitu 0,01; 0,1; 0,5; 1 dan 10  $\mu\text{g/ml}$ . Diperoleh hasil seperti tercantum pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil uji antimitosis ekstrak metanol daun turi hasil fraksinasi berdasarkan penghambatan sel telur bulubabi

No	Ekstrak	Konsentrasi ( $\mu\text{g/ml}$ )	% penghambatan	Nilai probit	IC <sub>50</sub> ( $\mu\text{g/ml}$ )
1	Fraksi A	10	75.258	5.67	0,487
		1	56.074	5.15	
		0,5	50.573	5	
		0,1	33.871	4.59	
		0,01	22.22	4.23	
2	Fraksi B	10	85.756	6.08	0,087
		1	70.948	5.55	
		0,5	67.013	5.44	
		0,1	49.319	4.97	
		0,01	32.186	4.53	
3	Fraksi C	10	94.978	6.64	0,033
		1	84.03	5.99	
		0,5	64.01	5.36	
		0,1	57.051	5.18	
		0,01	45.524	4.87	
4	Fraksi D	10	92.421	6.41	0,048
		1	72.284	5.58	
		0,5	67.792	5.47	
		0,1	50.171	5	
		0,01	42.758	4.82	
5	Fraksi E	10	80.431	5.84	0,246
		1	64.694	5.36	
		0,5	57.498	5.18	
		0,1	46.959	4.92	
		0,01	29.23	4.12	

Hasil uji efek antimitosis 5 fraksi ekstrak metanol berdasarkan penghambatan pembelahan sel telur bulubabi menunjukkan bahwa fraksi C memiliki efek antimitosis paling besar.

#### 4. Identifikasi Senyawa Bioaktif

Hasil respon fraksi C pada lempeng KLT terhadap beberapa macam pereaksi tercantum pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Respon fraksi C pada lempeng KLT terhadap beberapa penampak bercak

Nilai Rf	Penampak Bercak						
	UV 254 nm	UV 366 nm	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 10%	Dragendordorf	FeCl <sub>3</sub> 5%	LB	AlCl <sub>3</sub> 5%
0,78	+	+	+	-	-	+	-
0,72	+	+	+	-	-	+	-
0,66	-	-	+	-	-	-	-
0,6	+	+	+	-	-	+	-
0,54	+	+	+	-	-	+	-
0,48	-	-	+	-	-	-	-
0,44	+	+	+	-	-	+	-
0,36	-	-	+	-	-	-	-

#### B. Pembahasan

Skrining senyawa antimitosis dari daun turi dilakukan dengan melihat kemampuan ekstrak untuk menghambat pembelahan sel telur bulubabi, sehingga diperoleh fraksi yang memiliki efek antimitosis yang paling tinggi. Pengujian aktivitas antimitosis merupakan sistem selektif terhadap zat yang mengganggu proses mitosis, sehingga memiliki korelasi positif dengan zat yang berpotensi sebagai antikanker. Penggunaan sel telur bulubabi lebih mudah dan praktis dimana pengujiannya menggunakan air laut sebagai medium kultur dan tidak membutuhkan kondisi steril.

Sampel daun turi mula-mula diserbukkan untuk memperbesar luas permukaan sehingga kontak dengan cairan penyari lebih besar sehingga memudahkan penyarian komponen kimia yang terdapat pada sampel. Sampel diekstraksi dengan menggunakan metode maserasi dengan pelarut n-heksan, kemudian ampasnya diekstraksi kembali dengan menggunakan pelarut

metanol. Komponen kimia yang memiliki kepolaran yang rendah akan larut pada n-heksan dan komponen kimia yang kepolarannya lebih tinggi akan larut pada metanol. Proses maserasi ini juga berguna sebagai fraksinasi awal. Dari hasil ekstraksi diperoleh 15,5 g ekstrak n-heksan dan 30,6 g ekstrak metanol. Hal ini menunjukkan bahwa komponen kimia dari daun turi lebih banyak yang larut metanol atau tingkat kepolarannya lebih tinggi.

Ekstrak yang diperoleh diuji efek antimitosisnya dengan menggunakan konsentrasi 10, 100 dan 1000  $\mu\text{g/ml}$ . Hal ini dimaksudkan untuk melihat variasi respon yang diberikan. Selain itu digunakan kontrol negatif berupa air laut dan DMSO untuk melihat apakah respon penghambatan sel telur bulubabi benar-benar berasal dari sampel dan bukan dari medium air laut atau pelarut yang digunakan. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa ekstrak metanol daun turi memiliki nilai  $\text{IC}_{50}$  3,776  $\mu\text{g/ml}$ , sedangkan ekstrak n-heksan daun turi memiliki nilai  $\text{IC}_{50}$  6,076  $\mu\text{g/ml}$ . Semakin rendah nilai  $\text{IC}_{50}$  yang dimiliki suatu sampel semakin tinggi efek antimitosisnya. Dengan demikian, ekstrak metanol daun turi memiliki efek antimitosis yang lebih besar dibandingkan dengan ekstrak n-heksan.

Ekstrak metanol daun turi selanjutnya difraksinasi dengan metode kromatografi cair vakum (KCV). Metode ini dipakai karena cepat dan mudah dalam proses pemisahan komponen kimia. Metode ini dilakukan menggunakan fase diam silika gel dan fase gerak dengan gradient kepolaran yang semakin meningkat. Hasil fraksinasi diperoleh 14 fraksi. Fraksi-fraksi yang memiliki kesamaan profil KLT digabung hingga diperoleh 5 fraksi yaitu fraksi A, B, C, D dan E.


Fraksi yang diperoleh diuji kembali efek antimitosisnya, namun dengan konsentrasi yang lebih kecil yaitu 0,01  $\mu\text{g/ml}$ , 0,1  $\mu\text{g/ml}$ , 0,5  $\mu\text{g/ml}$ , 1

$\mu\text{g/ml}$  dan  $10 \mu\text{g/ml}$ . Hal ini dilakukan untuk mengetahui efek antimitosis hasil fraksinasi lebih besar atau kecil dibandingkan efek antimitosis ekstrak awal. Dari hasil pengujian diperoleh nilai  $\text{IC}_{50}$  dari fraksi A sebesar  $0,487 \mu\text{g/ml}$ , fraksi B sebesar  $0,087 \mu\text{g/ml}$ , fraksi C sebesar  $0,033 \mu\text{g/ml}$ , fraksi D sebesar  $0,048 \mu\text{g/ml}$ , dan fraksi E sebesar  $0,246 \mu\text{g/ml}$ . Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa fraksi C memiliki efek antimitosis lebih tinggi dibandingkan fraksi lainnya dengan nilai  $\text{IC}_{50}$  yang lebih rendah dari ekstrak awal. Hal ini dapat disebabkan senyawa yang memiliki efek antimitosis pada fraksi C lebih murni daripada ekstrak awal.

Untuk mengetahui senyawa yang terkandung dalam fraksi C dilakukan penyemprotan dengan beberapa pereaksi pada kromatogram. Fraksi C ditotolkan pada lempeng KLT dan dielusi dengan n-heksan:etil asetat (3:1), Kromatogramnya disemprot dengan menggunakan pereaksi penampak noda seperti  $\text{H}_2\text{SO}_4$  10% sebagai pereaksi penampak umum, dragendorf untuk golongan alkaloid atau komponen kimia yang mengandung nitrogen,  $\text{FeCl}_3$  5% untuk senyawa golongan fenol, pereaksi Liebermann-Burchard untuk golongan senyawa terpenoid seperti triterpen dan sterol dan pereaksi  $\text{AlCl}_3$  5% untuk senyawa golongan flavonoid. Fraksi C menunjukkan hasil positif terhadap adanya senyawa terpenoid, hal ini tampak dengan adanya perubahan warna noda dari hijau ke biru setelah diberi pereaksi Liebermann-Burchard. Pada pengamatan dengan lampu UV 366 nm, noda berfluorensi merah, hal ini menunjukkan hasil positif terhadap golongan triterpen.

Senyawa Triterpenoid dapat dibagi menjadi empat golongan yaitu: triterpen sebenarnya, steroid, saponin dan glikosida jantung (Harbone, 1987). Senyawa triterpen mempunyai peran sebagai sitotoksik, antibakteri, herbisida, anti inflamasi, spermisida serta mempengaruhi dan menghambat aktivitas

biosintesis sel (Okabe, 1980). Peran triterpen tersebut dapat diduga kuat berperan dalam penghambatan pembelahan sel telur bulubabi, dan hal ini dapat menjadi alasan efek antimiosis yang tinggi pada fraksi C.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ekstrak daun turi (*Sesbania grandiflora* L.) dapat menghambat pembelahan sel telur bulubabi.
2. Ekstrak metanol daun turi (*Sesbania grandiflora* L.) memiliki efek antimitosis yang lebih besar dengan nilai  $IC_{50}$  3,776  $\mu$ g/ml dibandingkan dengan ekstrak n-heksan yang memiliki nilai  $IC_{50}$  6,076  $\mu$ g/ml dan dari hasil fraksinasi diperoleh fraksi C sebagai fraksi teraktif dengan nilai  $IC_{50}$  = 0,033  $\mu$ g/ml.
3. Fraksi C mengandung senyawa golongan triterpen.

#### **B. Saran**

Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk memperoleh isolat murni aktif dari daun turi (*Sesbania grandiflora* L.) dan mengetahui pada fase mana senyawa aktif menghambat pembelahan sel telur bulubabi.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al Qur'an dan Terjemahannya*

Abdushshamad, Muhammad. *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002, 141.

Anonim. *Sediaan Galenik*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 1986.

Darwis, D. *Teknik Dasar Laboratorium Dalam Penelitian Senyawa Bahan Alam Hayati*. Padang: FMIPA Universitas Andalas, 2000.

Day, R.A dan Underwood A.L. *Analisa Kimia Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.

Deore, S. L. Khadabadi S. S., K.P.Chittam. Properties and Pharmacological Applications of Saponins. *Pharmacologyonline* 2. 2009. 61-84.

Gross PR, Malkin JL. Moyer WA. *Templates for the first proteins of embryonic development*. USA: Proceedings of the National Academy of Sciences ,vol 15, 1964: 407-414.

Harbone, J.B. *Metode Fitokimia, Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*. Terbitan Kedua. Bandung: Penerbit ITB, 1987.

Hariana arief, H, *Tumbuhan Obat dan Khasiatnya seri 3*, Penerbit Penebar Swadaya, 2006. 150.

Hostetmann, K., M. Hostetmann dan A. Marston. *Cara Kromatografi Preparatif, Penggunaan Pada Isolasi Senyawa Alam*. Penerjemah Dr. Kosasih Padmawinata. Bandung: Penerbit ITB, 1985.

Jacobs RS & Wilson L. Fertilized sea urchin egg as a model for detecting cell division inhibitors. *Moderen Analysis of Antibiotic*. New York: Marcel Dekker Inc., 1986.

Jasin, M. *Zoologi Invertebrata*. Surabaya: Sinar Wijaya, 1992 . 265-267.

Khare, C. P. *Indian Medical Plants*, New Delhi: Janak Puri, 2007.

Malpezzi ELA, Davino SC, Costa LV, Freitas JC, Giesbrecht AM dan Roque NF. Antimitotik action of extracts of *Petiveria alliacea* on sea urchin egg development. *Brazilian Journal of Medica and Biological Research*. Vol 27, 1944, 749.

Manitto, P. *Biosynthesis of Natural Products*. England: Ellis Horwood Limited, 1981.

- Mursyidi, A. *Statistik Farmasi Dan Biologi*. Cetakan I. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984. Hal. 157.
- Okabe, H., Miyahara, Y., Yamauchi, T. Studies on the Constituents of *Momordica charantia* L. Isolation and Characterization of Momordicosides A and B, Glycosides of a Pentahydroxy-cucurbitane Triterpen. *Chemical Pharmacology Bulletin*, vol 28. 1980. 2753-2762.
- Pedersen, D.S dan Rosenbohm. *Dry Column Vacuum Chromatography*. [www.rhodium.com](http://www.rhodium.com).
- Radiopoetra. *Zoologi*. Cet.2. Jakarta Pusat: Erlangga, 1983. 391-385
- Qaradhawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002, 157.
- Rahman, A. *Kimia Farmasi Analisis*. Jakarta : Pustaka Pelajar, 2007.
- Ramesh, T, R. Mahesh, V.Hazeena Begum. Effect OF *Sesbania grandiflora* on Lung Antioxidant Defense System in Cigarette Smoke Exposed Rats. *Academy Journals*. 2007. 141-148.
- Sastroamidjojo S, *Obat Asli Indonesia*, Penerbit Dian Rakyat, 2001.
- Sertie, Jayme Antonio Aboin. Antiulcer activity of the ethanol extract of *sesbania grandiflora*. *Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences*, vol. 37, 2001.107-112
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Quran*. Jakarta: Penerbit Mizan. 1996.
- \_\_\_\_\_. *Mukjizat Al-Quran*. Jakarta: Penerbit Mizan. 1999.
- Siswandono, Soekardjo B. *Kimia Medisinal*. Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1995, 407.
- Stahl, E. *Analisis Obat Secara Kromatografi dan Mikroskopi*. Penerjemah Dr. Kosasih Padmawinata. Bandung: Penerbit ITB, 1985.
- Steenis, Van, dkk. *Flora*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006. 232.
- Sudjadi. *Metode Pemisahan* Edisi I. Yogyakarta: Kanisius, 1988. 60.
- Sumich, J.L, Dudle, G.H. *Laboratory and Field Investigation In Marine Biologi*. Ed.4. W.M.C Brown Publishers, 1992, 106.

Thalbah, Hisham. *Ensiklopedia Mukjizat Alquran dan Hadist*. Perpustakaan Nasional RI. 2009.

Thomson, W.J., Rahman, A., Ginoudhary, M. I.2001. *Bioassay Techniques For Drug Development*. Australia: Harword academic Publisher, 2001, 39-41.


Yuniarti, Titin. *Ensiklopedi Tanaman Obat Tradisional*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2008.

Wibisana, W. *Luas Penggunaan Obat Tradisional*. Kumpulan Makalah pada Seminar Penggunaan Obat Tradisional di FK-UI. 6 September 1990.




## LAMPIRAN

Lampiran 1a. Skema kerja skrining senyawa antimitosis ekstrak daun turi (*Sesbania grandiflora* L.) berdasarkan penghambatan pembelahan sel telur bulubabi



Lampiran 1b. Pelaksanaan uji antimitosis berdasarkan penghambatan pembelahan sel telur bulubabi



Lampiran 2.

Tabel 4. Data hasil pengamatan penghambatan pembelahan sel telur bulubabi dari ekstrak n-heksan dan metanol daun turi

Sampel	Konsentrasi µg/ml	Jumlah sel		Σ sel	% Hambatan	% Rata2
		Membelah	≠ Membelah			
n-heksan	1000	0	159	159	100	100
		0	125	125	100	
		0	138	138	100	
	100	13	101	114	88,596	86,324
		16	112	128	87,5	
		25	121	146	82,876	
	10	32	82	114	71,929	70,344
		34	77	111	69,369	
		33	79	112	70,535	
Methanol	1000	0	139	139	100	100
		0	145	145	100	
		0	109	109	100	
	100	9	87	96	90,625	89,803
		14	116	130	89,231	
		14	120	134	89,552	
	10	24	81	105	77,143	75,789
		27	71	98	72,448	
		20	70	90	77,777	
Kontrol air laut		123	2	125	1,6	-
		115	0	115	0	
		103	0	103	0	
DMSO		108	0	108	0	-
		115	1	116	0	
		118	0	118	0	

Lampiran 3.

Tabel 5. Data hasil pengamatan penghambatan pembelahan sel telur bulubabi dari hasil fraksinasi KCV ekstrak metanol daun turi

Sampel	Konsentrasi	Jumlah sel		$\Sigma$ sel	% Hambatan	% Rata2
		Membelah	≠ Membelah			
fraksi A	10	31	98	129	75.968	75.258
		43	119	162	73.456	
		35	113	148	76.351	
	1	63	99	162	61.111	56.074
		82	94	176	53.409	
		75	87	162	53.703	
	0.5	61	73	134	54.477	50.573
		54	51	105	48.571	
		58	55	113	48.672	
	0.1	73	33	106	31.132	33.871
		98	50	148	33.783	
		69	40	109	36.697	
	0.01	97	32	129	24.806	22.22
		87	19	106	17.924	
		89	28	117	23.931	
fraksi B	10	21	122	143	85.314	85.756
		18	121	139	87.05	
		24	135	159	84.905	
	1	43	129	172	75	70.948
		48	120	168	71.428	
		45	89	134	66.417	
	0.5	44	93	137	67.883	67.013
		41	84	125	67.2	
		48	93	141	65.957	
	0.1	80	66	146	45.205	49.319
		76	79	155	50.967	
		81	87	168	51.785	
	0.01	98	44	142	30.985	32.186
		84	41	125	32.8	
		80	39	119	32.773	
fraksi C	10	7	193	200	96.5	94.978
		11	127	138	92.028	
		6	161	167	96.407	
	1	22	136	158	86.075	84.03
		33	107	140	76.428	
	13	112	125	89.6		

Sampel	Konsentrasi	Jumlah sel		Σ sel	% Hambatan	% Rata2
		Membelah	≠ Membelah			
Fraksi C	0.5	58	112	170	65.882	64.01
		52	78	130	60	
		46	92	138	66.666	
	0.1	68	78	146	53.424	57.051
		64	85	149	57.046	
		46	71	117	60.683	
	0.01	85	78	163	47.852	45.524
		84	69	153	45.098	
fraksi D		84	65	149	43.624	
	10	19	202	221	91.402	92.421
		18	263	281	93.594	
		15	179	194	92.268	
	1	34	93	127	73.228	72.284
		46	95	141	67.375	
		38	122	160	76.25	
	0.5	65	174	239	72.803	67.792
		55	103	158	65.189	
		45	85	130	65.384	
	0.1	75	79	154	51.298	50.171
		57	56	113	49.557	
		74	73	147	49.659	
	0.01	87	62	149	41.611	42.758
		87	65	152	42.763	
	92	72	164	43.902		
fraksi E	10	34	110	144	76.388	80.431
		22	114	136	83.823	
		28	120	148	81.081	
	1	66	103	169	60.946	64.694
		55	110	165	66.666	
		57	113	170	66.471	
	0.5	45	57	102	55.882	57.498
		47	64	111	57.657	
		55	79	134	58.955	
	0.1	64	65	129	50.387	46.959
		61	46	107	42.991	
		63	57	120	47.5	
	0.01	80	37	117	31.623	29.23
		97	41	138	29.711	
		95	34	129	26.356	

Lampiran 4.


Tabel 6. Harga Probit Sesuai Persentasenya

Persentase	Probit									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	-	2,67	2,95	3,12	3,25	3,36	3,45	3,52	3,59	3,66
10	3,72	3,77	3,82	3,87	3,92	3,95	4,01	4,05	4,08	4,12
20	4,17	4,19	4,23	4,26	4,29	4,33	4,36	4,39	4,42	4,45
30	4,48	4,50	4,53	4,56	4,59	4,61	4,64	4,67	4,69	4,72
40	4,75	4,77	4,80	4,82	4,85	4,87	4,90	4,92	4,95	4,97
50	5,00	5,03	5,05	5,08	5,10	5,13	5,15	5,18	5,20	5,23
60	5,25	5,28	5,31	5,33	5,36	5,39	5,41	5,44	5,47	5,50
70	5,52	5,55	5,58	5,61	5,64	5,67	5,71	5,74	5,77	5,81
80	5,84	5,88	5,92	5,95	5,99	6,04	6,08	6,13	6,18	6,23
90	6,28	6,34	6,41	6,48	6,55	6,64	6,75	6,88	7,05	7,33
	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
99	7,33	7,37	7,41	7,46	7,51	7,58	7,66	7,75	7,88	8,09

Sumber : Mursyidi, A. *Statistik Farmasi Dan Biologi*. Cetakan I. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984. Hal. 157.

Lampiran 5a. Data hasil perhitungan nilai IC<sub>50</sub> ekstrak n-heksan daun turi  
(*Sesbania grandiflora* L.)

Konsentrasi	Log kons. (X)	% hambatan	Probit (Y)
1000	3	100	8.09
100	2	89,803	6.08
10	1	70,344	5.52



Persamaan garis linear :

$$y = a + bx$$

y = Persentase respon kematian dalam satuan probit

x = Log-konsentrasi ekstrak n-heksan daun turi

a = Intersep

b = Slope

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diperoleh :

$$a = 3,993$$

$$b = 1,285$$

$$r = 0,904$$

sehingga diperoleh persamaan regresi:

$$y = 3,993 + 1,285x$$

untuk log IC<sub>50</sub> y = 5, maka


$$x = \frac{5 - 3,993}{1,285} = 0,783$$

Sehingga IC<sub>50</sub> = 6,076 µg/ml

Lampiran 5b. Data hasil perhitungan nilai IC<sub>50</sub> ekstrak metanol daun turi

(*Sesbania grandiflora* L.)

Konsentrasi	Log kons. (X)	% hambatan	Probit (Y)
1000	3	100	8.09
100	2	89,803	6.28
10	1	76	5.71



Persamaan garis linear :

$$y = a + bx$$

y = Persentase respon kematian dalam satuan probit

x = Log-konsentrasi ekstrak metanol daun turi

a = Intersep

b = Slop

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diperoleh :

$$a = 4,313$$

$$b = 1,19$$

$$r = 0,917$$

sehingga diperoleh persamaan regresi:

$$y = 4,313 + 1,19x$$

untuk log IC<sub>50</sub> y = 5, maka


$$x = \frac{5 - 4,313}{1,19} = 0,577$$

Sehingga IC<sub>50</sub> = 3,776 µg/ml

Lampiran 5c. Data hasil perhitungan nilai IC<sub>50</sub> fraksi A ekstrak metanol daun turi

(*Sesbania grandiflora* L.)

Konsentrasi	Log kons. (X)	% Hambatan	Probit (Y)
10	1	75.258	5.67
1	0	56.074	5.15
0.5	-0.301	50.573	5
0.1	-1	33.871	4.59
0.01	-2	22.22	4.23



Persamaan garis linear :

$$y = a + bx$$

y = Persentase respon kematian dalam satuan probit

x = Log-konsentrasi fraksi A

a = Intersep

b = Slop

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diperoleh :

$$a = 5,152$$

$$b = 0,487$$

$$r = 0,992$$

sehingga diperoleh persamaan regresi:

$$y = 5,152 + 0,487x$$

untuk log IC<sub>50</sub> y = 5, maka


$$x = \frac{5 - 5,152}{0,487} = -0,312$$

Sehingga IC<sub>50</sub> = 0,487 μg/ml

Lampiran 5d. Data hasil perhitungan nilai IC<sub>50</sub> fraksi B ekstrak metanol daun turi

(*Sesbania grandiflora* L.)

Konsentrasi	Log kons. (X)	% Hambatan	Probit (Y)
10	1	85.756	6.08
1	0	70.948	5.55
0.5	-0.301	67.013	5.44
0.1	-1	49.319	4.97
0.01	-2	32.186	4.53



Persamaan garis linear :

$$y = a + bx$$

y = Persentase respon kematian dalam satuan probit

x = Log-konsentrasi fraksi B

a = Intersep

b = Slop

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diperoleh :

$$a = 5,555$$

$$b = 0,524$$

$$r = 0,995$$

sehingga diperoleh persamaan regresi:

$$y = 5,555 + 0,524x$$

untuk log IC<sub>50</sub> y = 5, maka


$$x = \frac{5 - 5,555}{0,524} = -1,059$$

Sehingga IC<sub>50</sub> = 0,087 µg/ml

Lampiran 5e. Data hasil perhitungan nilai IC<sub>50</sub> fraksi C ekstrak metanol daun turi

(*Sesbania grandiflora* L.)

Konsentrasi	Log kons. (X)	% Hambatan	Probit (Y)
10	1	94.978	6.64
1	0	84.03	5.99
0.5	-0.301	64.01	5.36
0.1	-1	57.051	5.18
0.01	-2	45.524	4.87



Persamaan garis linear :

$$y = a + bx$$

y = Persentase respon kematian dalam satuan probit

x = Log-konsentrasi fraksi C

a = Intersep

b = Slop

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diperoleh :

$$a = 5,883$$

$$b = 0,598$$

$$r = 0,900$$

sehingga diperoleh persamaan regresi:

$$y = 5,883 + 0,598x$$

untuk log IC<sub>50</sub> y = 5, maka


$$x = \frac{5 - 5,883}{0,598} = -1,476$$

Sehingga IC<sub>50</sub> = 0,033 µg/ml

Lampiran 5f. Data hasil perhitungan nilai IC<sub>50</sub> fraksi D ekstrak metanol daun turi

(*Sesbania grandiflora* L.)

Konsentrasi	Log kons. (X)	% Hambatan	Probit (Y)
10	1	92.421	6.41
1	0	72.284	5.58
0.5	-0.301	67.792	5.47
0.1	-1	50.171	5
0.01	-2	42.758	4.82



Persamaan garis linear :

$$y = a + bx$$

y = Persentase respon kematian dalam satuan probit

x = Log-konsentrasi fraksi D

a = Intersep

b = Slop

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diperoleh :

$$a = 5,700$$

$$b = 0,532$$

$$r = 0,926$$

sehingga diperoleh persamaan regresi:

$$y = 5,700 + 0,532x$$

untuk log IC<sub>50</sub> y = 5, maka


$$x = \frac{5 - 5,700}{0,532} = -1,317$$

Sehingga IC<sub>50</sub> = 0,048 µg/ml

Lampiran 5g. Data hasil perhitungan nilai IC<sub>50</sub> fraksi E ekstrak metanol daun turi

(*Sesbania grandiflora* L.)

Konsentrasi	Log kons. (X)	% Hambatan	Probit (Y)
10	1	80.431	5.84
1	0	64.694	5.36
0.5	-0.301	57.498	5.18
0.1	-1	46.959	4.92
0.01	-2	29.23	4.12



Persamaan garis linear :

$$y = a + bx$$

y = Persentase respon kematian dalam satuan probit

x = Log-konsentrasi fraksi E

a = Intersep

b = Slop

Berdasarkan hasil perhitungan regresi diperoleh :

$$a = 5,341$$

$$b = 0,560$$

$$r = 0,979$$

sehingga diperoleh persamaan regresi:


$$y = 5,341 + 0,560x$$

untuk log IC<sub>50</sub> y = 5, maka

$$x = \frac{5 - 5,341}{0,560} = -0,608$$

Sehingga IC<sub>50</sub> = 0,246 µg/ml

Lampiran 6. Gambar 2. Foto Hasil KLT ekstrak metanol dan n-heksan daun turi



UV 254



UV 366



H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 10%

Ket:


A= Ekstrak Metanol

B = Ekstrak n-Heksan

Fase diam= Silika gel 60 F<sub>254</sub>

Fase gerak= n-Heksan : etil asetat (6:1)

Lampiran 7. Gambar 3. Foto hasil respon fraksi C terhadap beberapa pereaksi.



Keterangan :

Fase diam= Silika gel 60 F<sub>254</sub>

Fase gerak= n-Heksan : etil asetat (3:1)

(a) tanpa perlakuan (b) UV 254nm (c) UV 366 nm (d) H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 10%

(e) Dragendorff (f) FeCl<sub>3</sub> 5 % (g) AlCl<sub>3</sub> 5 % pada UV 366nm

(h) Liebermann-Bouchard sebelum pemanasan

(i) Liebermann-Bouchard setelah dipanaskan


(j) Liebermann-Bouchard pada UV 366nm

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Lampiran 8. Gambar 4. Pembelahan sel telur bulubabi



Ket:

A = pembelahan sel menjadi 4

B = Sel tidak membelah

C = Pembelahan sel menjadi 2

D = Pembelahan sel menjadi 8

Lampiran 9. Foto tumbuhan Turi (*Sesbania grandiflora* L. Pers.)



Gambar 5 : Foto tumbuhan Turi (*Sesbania grandiflora* L. Pers.)



Gambar 6 : Foto daun tumbuhan Turi (*Sesbania grandiflora* L. Pers.)