

**GAMBARAN FAKTOR PREDISPOSISI MIOMA UTERI
DI RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR PERIODE
JANUARI 2009 SAMPAI JUNI 2010**



KARYA TULIS ILMIAH

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Ahlimadya Kebidanan Jurusan Kebidanan
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

oleh

**DEBY GITA PANCAWATI
NIM : 70400007007**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2010

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KTI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka karya tulis ilmiah ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 Agustus 2010

Penyusun



Deby Gita Pancawati
NIM : 70400007007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

Kampus II : Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata – Gowa Telp. 824835 Fax. 424836

PERSETUJUAN JUDUL KTI

NAMA : DEBY GITA PANCAWATI
NIM : 70400007007
JUDUL : GAMBARAN FAKTOR PREDISPOSISI MIOMA UTERI DI
RSUD LABUANG BAJI MAKASSAR PERIODE JANUARI
2009 SAMPAI JUNI 2010

Makassar, 07 Juli 2010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
Mengetahui
M A K A S S A R

PEMBIMBING

KETUA PRODI

SITTI SALEHA, S.SiT, SKM, M.Keb
M.Keb

SITTI SALEHA, S.SiT, SKM,

NIP. 19760126 200604 2 001

NIP. 19760126 200604 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang berjudul "Gambaran Faktor Predisposisi Mioma Uteri di RSUD Labuang Baji Makassar Periode Januari 2009 sampai Juni 2010" yang disusun oleh Deby Gita Pancawati, NIM: 70400007007, mahasiswi jurusan DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang karya tulis ilmiah (KTI) yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan 08 Ramadhan 1431 Hijriah. Telah diperiksa dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahlimadya Kebidanan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Agustus 2010 M

08 Ramadhan 1431 H

Tim Penguji

1. Pembimbing : Sitti Saleha, S.SiT, SKM, M. Keb (.....)
2. Penguji I : dr. Rini Fitriani, S. Ked (.....)
3. Penguji II : Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si (.....)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar

dr. H.M.Furqaan Naiem, M.Sc, Ph.D

NIP. 19580404 198903 1 0

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan KTI ini yang berjudul **“Gambaran Faktor Predisposisi Mioma Uteri di RSUD Labuang Baji Makassar Periode Januari 2009 sampai Juni 2010”** dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin.

Dengan selesainya KTI ini, maka dengan segala kerendahan hati atas segala dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda Patta Gau' dan Ibunda tercinta Sitti Intang serta saudarku tersayang Dewi, Dedy, Devy, Desy, Deny, Ima atas segala perhatian, kasih sayang, doa restu serta pengorbanannya yang tak terhingga.
2. Bapak Prof. Dr. Azhar Arsyad, MA Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
3. Bapak dr. M. Furqaan Naiem, M. Sc, Ph. D. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.

4. Ibu Sitti Saleha, S,Si.T, SKM, M.Keb selaku ketua prodi kebidanan dan juga dosen pembimbing yang dengan kerelaan dan keikhlasannya kepada penulis membimbing dari awal hingga penyelesaian KTI ini.
5. Ibu dr. Rini Fitriani, S.Ked selaku penguji yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingannya dalam menyusun KTI ini.
6. Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si selaku penguji agama yang senantiasa memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan KTI ini.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alaudin Makassar yang telah memberikan bimbingan dalam mendidik penulis selama masa pendidikan.
8. Kepada DR. H. Bambang Arya, M. KES. Selaku Direktur RSUD Labuang Baji Makassar dan beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam membantu menyelesaikan KTI ini.
9. Kepada seluruh teman-teman jurusan kebidanan Angkatan 07 khususnya sahabatku (Nila, Ninda, Uni, Eka, Isra, Irha, Dewy dan Encenk) terima kasih atas dukungan dan motivasinya serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan mencapai cita-cita.
10. Seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung, tidak langsung dalam penyusunan KTI ini.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya, penulis berharap hasil penelitian ini dapat berguna bagi kita semua, Amin.

Maha suci engkau Allah tidaklah ada yang kami ketahui selain engkau yang beritahukan kepada kami, sesungguhnya engkau yang maha mengetahui segala hikmah kepada siapa saja yang dianugerahi karunia yang banyak dan hanya orang-orang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. Wallahu a'lam.

Makassar, 07 Juli 2010

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KTI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
1. Tujuan Umum	4
2. Tujuan Khusus	4

D.	Manfaat Penelitian	4
	1. Manfaat Praktis	4
	2. Manfaat Ilmiah	5
	3. Manfaat Institusi.....	5
	4. Manfaat Penulis.....	5
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	6
A.	Tinjauan Umum Tentang Mioma Uteri	6
	1. Defenisi Mioma Uteri	6
	2. Klasifikasi Mioma Uteri	6
	3. Perubahan Sekunder	9
	4. Etiologi dan Patogenesis	11
	5. Komplikasi	12
	6. Gejala Klinik	13
	7. Diagnosis	14
	8. Penanganan	17
B.	Tinjauan Umum Tentang Faktor Predisposisi Mioma Uteri.....	21
	1. Umur Penderita	21
	2. Paritas Penderita	22

3. Faktor Genetik.....	23
4. Faktor Hormonal.....	23
C. Pandangan Islam Tentang Mioma Uteri	23
BAB III KERANGKA KONSEP.....	25
A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti	25
B. Kerangka Konsep.....	27
C. Defenisi Operasional dan Kriteria Penelitian.....	28
BAB IV METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Populasi dan Sampel.....	31
1. Populasi.....	31
2. Sampel.....	31
D. Teknik Pengambilan Sampel.....	31
E. Pengumpulan Data	31
F. Pengolahan Data	32
G. Analisa Data	32
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Hasil Penelitian.....	33
B. Pembahasan	38

BAB VI PENUTUP	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN PRODI KEBIDANAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KARYA TULIS ILMIAH AGUSTUS 2010

DEBY GITA PANCAWATI, 70400007007

Pembimbing: Sitti Saleha, S.SiT, SKM, M.Keb

**“Gambaran Faktor Predisposisi Mioma Uteri di Rumah Sakit Umum Daerah
Labuang Baji Makassar”**

xiv + VI BAB+ 43 Halaman + 1 Gambar + 5 Tabel + 4 lampiran

Wanita lebih rentan terkena berbagai penyakit daripada laki-laki. Salah satu penyakit yang ditakutkan oleh para wanita adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ reproduksi wanita, seperti mioma yang biasa orang kenal dengan sebutan mioma uteri. Kejadian mioma uteri sukar ditetapkan karena tidak semua mioma uteri memberikan keluhan dan memerlukan tindakan operatif.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara umum tentang pengaruh faktor predisposisi terhadap mioma uteri di Rumah Sakit Labuang Baji Makassar Periode Januari 2009 sampai Juni 2010. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan jumlah populasi 516 penderita dan didapatkan sampel 80 penderita yang dipilih secara purposive sampling serta pengumpulan data menggunakan pendataan berdasarkan rekam medik.

Hasil penelitian didapatkan gambaran penderita mioma uteri yang terbanyak terjadi pada kelompok umur berisiko tinggi 20 – 45 tahun sebanyak 59 orang (73,75%). penderita mioma uteri menurut paritas sebanyak 45 orang (56,25%). penderita mioma uteri menurut riwayat genetik/keluarga, pada kelompok berisiko rendah sebanyak 67 orang (83,75%) penderita mioma uteri menurut riwayat hormonal, berisiko rendah sebanyak 62 orang (77,55%). Oleh karena itu masalah mioma uteri merupakan hal penting yang menyangkut kualitas kesehatan reproduksi wanita yang sampai saat ini belum ditemukan faktor penyebabnya secara pasti sehingga pentingnya upaya pencegahan atau penanganan mioma uteri sejak dini

Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu mioma uteri dipengaruhi oleh beberapa faktor, tertinggi terjadi pada faktor umur 20-45 tahun (73,75%), pada nullipara (56,25%), tidak ada riwayat keluarga (83,75%), serta tidak ada riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal (77,55%).

Kata Kunci : Mioma uteri, umur, paritas, genetik, hormonal

Daftar Pustaka : 17 (2000-2010)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan saat ini merupakan hal yang mahal bagi manusia. Khususnya pada wanita. Menurut penelitian, wanita lebih rentan terkena berbagai penyakit daripada laki-laki. Salah satu penyakit yang ditakutkan oleh para wanita adalah penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ reproduksi wanita, seperti mioma yang biasa orang kenal dengan sebutan mioma uteri. Kejadian mioma uteri sukar ditetapkan karena tidak semua mioma uteri memberikan keluhan dan memerlukan tindakan operatif. Walaupun kebanyakan mioma uteri muncul tanpa gejala tetapi sekitar 60% ditemukan secara kebetulan pada laparatomi daerah pelvis. (Setiati, 2009)

Resiko yang paling ditakuti dari mioma uteri yaitu mengalami keganasan atau disebut kanker. Menurut laporan World Health Organization (WHO) pada tahun 2008 yaitu 10 juta kasus kanker pertahun, dimana di dalamnya termasuk mioma uteri. Saat ini terdapat \pm 22 juta penderita kanker dan 6 juta meninggal karena kanker. Sehingga peningkatan penyakit ini menjadi sekitar 19% pertahun. (<http://litbang.depkes.go.id/online>, diakses 21 April 2010).

Sebagian besar mioma uteri ditemukan pada masa reproduksi, karena diduga berhubungan dengan aktivitas estrogen. Mioma uteri ditemukan pada wanita berumur 20 tahun, paling banyak pada umur 35 - 44 tahun. Selain itu mioma uteri juga sering terjadi pada wanita nullipara atau wanita yang relatif

infertil. Terlepas dari faktor ras, kejadian tumor ini tinggi pada wanita dengan riwayat keluarga ada yang menderita mioma. Dari angka tersebut masih terlihat kurangnya kepedulian kaum hawa terhadap kesehatan reproduksinya sendiri. (Setiati, 2009)

Di Amerika Serikat diperkirakan setiap 4-5 wanita mengidap mioma uteri dan cenderung mengalami peningkatan pada usia 35-45 tahun dalam kurun kronologis kehidupan wanita. Usia termuda yang pernah dijumpai adalah 13 tahun, tumor jinak ini mempunyai kecenderungan untuk regresi pada masa post menopause. (Setiati, 2009)

Di Indonesia, Mioma Uteri ditemukan 2,39%–11,7% pada semua penderita ginekologi yang dirawat. Berdasarkan otopsi, Novak menemukan 27% wanita berumur 25 tahun mempunyai sarang mioma pada wanita yang berkulit hitam ditemukan lebih banyak. Mioma Uteri belum pernah dilaporkan terjadi sebelum minarce. Setelah menopause kira-kira hanya 10% mioma yang masih bertumbuh. (Hanifa, 2005. hal 338)

Kebanyakan mioma uteri tumbuh tanpa menimbulkan keluhan/ gejala. Pada perempuan lain mungkin mengeluh perdarahan menstruasi lebih banyak dari biasa, nyeri sewaktu menstruasi, perasaan penuh dan tekanan pada rongga perut, keluhan anemi karena kurang darah, nyeri pada waktu berhubungan seksual ataupun nyeri pada waktu bekerja. (Faisal, 2005)

Data yang diperoleh dari medical record di Rumah Sakit Labuang baji periode Januari sampai dengan Desember 2008 sebanyak 43 penderita, yaitu umur 25-29 tahun sebanyak 5 penderita (11,62%) umur 30-34 tahun sebanyak

4 penderita (9,30%), umur 35-39 tahun sebanyak 9 penderita (20,93%), umur 40-44 tahun sebanyak 9 penderita (20,93%), umur 45-49 tahun sebanyak 11 penderita (25,58%), umur 50-54 tahun sebanyak 2 penderita (4,65%) dan umur 56-59 tahun sebanyak 3 penderita (6,97%).

Oleh karena itu masalah mioma uteri merupakan hal penting yang menyangkut kualitas kesehatan reproduksi wanita yang sampai saat ini belum ditemukan faktor penyebabnya secara pasti. Dan pentingnya upaya pemecahan masalah tersebut maka perlu dilakukan suatu identifikasi berbagai faktor melalui suatu penelitian tentang faktor predisposisi mioma uteri yang dibatasi pada faktor umur, paritas, riwayat keluarga dan fungsi hormonal .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran faktor predisposisi mioma uteri berdasarkan umur ibu?
2. Bagaimana gambaran faktor predisposisi mioma uteri berdasarkan paritas ibu?
3. Bagaimana gambaran faktor predisposisi mioma uteri berdasarkan riwayat keluarga ?
4. Bagaimana gambaran faktor predisposisi mioma uteri berdasarkan riwayat hormonal?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Diperolehnya gambaran secara umum tentang pengaruh faktor predisposisi terhadap mioma uteri di Rumah Sakit Labuang Baji Periode Januari 2009 sampai Juni 2010

2. Tujuan Khusus

- a. Diperolehnya gambaran faktor predisposisi mioma uteri berdasarkan umur penderita.
- b. Diperolehnya gambaran faktor predisposisi mioma uteri berdasarkan paritas penderita.
- c. Diperolehnya gambaran faktor predisposisi mioma uteri berdasarkan riwayat keluarga.
- d. Diperolehnya gambaran faktor predisposisi mioma uteri berdasarkan riwayat hormonal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu sumber informasi bagi setiap kebijakan dan pelaksana program baik di Departemen Kesehatan maupun pihak Rumah Sakit Labuang Baji Makassar dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sebagai upaya pencegahan atau penanganan mioma uteri sejak dini.

2. Manfaat Ilmiah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

3. Manfaat Institusi

Diharapkan dapat berguna sebagai salah satu hasil penemuan dan kajian serta bahan acuan atau pedoman bagi institusi jurusan Kebidanan untuk penulisan karya tulis ilmiah lainnya.

4. Manfaat bagi Penulis

- 1) Sebagai salah persyaratan dalam menyelesaikan ujian akhir di jenjang pendidikan Diploma III Kebidanan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- 2) Merupakan sumbangsih pemikiran bagi penulis dalam proses penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh khususnya tentang mioma uteri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Mioma Uteri

1. Definisi Mioma Uteri

- a. Mioma Uteri merupakan tumor jinak miometrium dengan ciri tersendiri, bulat, keras, berwarna putih hingga merah muda pucat, sebagian besar terdiri dari otot polos dengan beberapa jaringan ikat. (Benson and pernoll's. 2008 hal. 546)
- b. Mioma Uteri merupakan bungkus otot rahim yang berubah menjadi tumor jinak. (Setiati. 2009. Hal 81)
- c. Mioma Uteri adalah neoplasma jinak yang berasal dari otot uterus dan jaringan ikat sehingga dalam kepustakaan disebut juga leiomioma, fibroid dan fibromioma. (Mansjoer. 2001. hal 387)
- d. Mioma Uteri atau fibroid uterus adalah pertumbuhan jaringan jinak dalam uterus, pertumbuhan tersebut tidak mengakibatkan keganasan dan hampir tidak berkembang menjadi kanker. (<http://id.wikipedia.org> online diakses tanggal 20 Mei 2010)

2. Klasifikasi Mioma (Setiati. 2009. Hal 89)

Mioma dapat diklasifikasikan berdasarkan Lokasi dan lapisan uterus yang terkena :

a. Berdasarkan Lokasi

- 1) Cervical (2,6%), umumnya tumbuh ke arah vagina dan menyebabkan infeksi.
- 2) Isthmica (7,2%), lebih sering menyebabkan nyeri dan gangguan traktus urinaria
- 3) Corporal (91%), merupakan lokasi paling lazim dan sering kali tanpa gejala.

b. Berdasarkan Lapisan Uterus

1) Mioma Uteri Subserosa

Lokasi tumor subserosa korpus uteri dapat hanya sebagai tonjolan saja, dapat pula sebagai satu masa yang dihubungkan dengan uterus melalui tangkai. Pertumbuhan ke arah lateral dapat berada di dalam ligamentum latum dan disebut sebagai mioma intra ligamenter. Mioma yang cukup besar akan mengisi rongga peritoneal sebagai suatu massa. (Setiati. 2009. hal 89).

Perlengketan dengan usus, omentum atau mesenterium di sekitarnya menyebabkan sistem peredaran darah diambil alih dari tangkai ke omentum. Akibatnya, tangkai semakin mengecil dan terputus sehingga mioma akan terlepas dari uterus sebagai massa tumor yang bebas dalam rongga peritoneum. Mioma jenis ini dikenal sebagai jenis parasitik (Setiati. 2009. hal 89)

2) Mioma Uteri Intramural

Mioma ini disebut juga sebagai mioma intra ephitelial. Biasanya, multiple apabila masih kecil tidak merubah bentuk uterus, tetapi bila besar akan menyebabkan uterus berbenjol-benjol, bertambah besar, dan berubah bentuknya. Mioma sering tidak memberikan gejala klinis yang berarti, kecuali rasa tidak enak karena adanya massa tumor di daerah perut sebelah bawah. Kadang kala tumor tumbuh sebagai mioma subserosa dan kadang-kadang sebagai mioma submukosa. Di dalam otot rahim, mioma ini dapat besar, padat (jaringan ikat dominan) dan lunak (jaringan otot rahim dominan). (Setiati, 2009).

3) Mioma Uteri Submukosa

Mioma ini terletak di bawah endometrium. Mioma ini dapat tumbuh bertangkai menjadi polip kemudian dilahirkan melalui saluran serviks (myomgebur). Mioma bertangkai dapat menonjol melalui kanalis servikalis dan pada keadaan ini mudah terjadi torsi atau infeksi. Mioma ini memperluas permukaan ruangan rahim. (Sarwono, 2007. hal 338)

4) Mioma Intraligamenter


Mioma subserosa yang tumbuh menempel pada jaringan lain, misalnya ligamentum atau omentum kemudian membebaskan diri dari uterus sehingga disebut *wondering parasitis fibroid*.

(<http://pdfoundmioma.com>),online diakses tanggal 12 mei 2010)

5) Mioma Pendicularis

Mioma yang tumbuh yang menjadi massa sendiri di dalam rongga perut. (<http://Mr.s'Blog.com>, online diakses 08 juli 2010)

Klasifikasi mioma uteri dapat dilihat seperti gambar di bawah ini:



Gambar 2.1 Lokasi Mioma Uteri

Sumber <http://yayanakhyar.files.wordpress.com.online>

3. Perubahan Sekunder

Pada mioma uteri, perubahan sekunder yang sebagian besar bersifat degenerasi dapat terjadi. Hal ini disebabkan berkurangnya pemberian darah pada sarang mioma, perubahan ini terjadi secara sekunder. Berikut beberapa perubahan yang dapat terjadi pada mioma uteri :

- a. Atrofi : sesudah menopause ataupun sesudah kehamilan mioma uteri menjadi kecil
- b. Degenerasi hialin: perubahan ini sering terjadi pada wanita usia lanjut. Tumor kehilangan struktur aslinya menjadi homogen.

- c. Degenerasi kistik: dapat meliputi daerah kecil maupun luas, dimana sebagian mioma menjadi cair, sehingga terbentuk ruangan-ruangan yang tidak teratur, berisi seperti agar-agar yang tidak teratur.
- d. Degenerasi membantu : Terutama terjadi pada wanita berusia lanjut oleh karena adanya gangguan pada sirkulasi. Yang diakibatkan adanya timbunan kalsium pada mioma uteri, bersifat padat, keras dan berwarna putih
- e. Degenerasi merah (carneous degeneration):
- 1 Paling sering terjadi pada masa kehamilan
 - 2 Estrogen merangsang tumbuh kembang mioma
 - 3 Aliran darah tidak seimbang karena terjadi edema sekitar tungkai dan tekanan hamil
 - 4 Terjadi kekurangan darah yang menimbulkan nekrosis, pembentukan thrombus, bendungan darah dalam mioma, warna merah hemosiderosis/ hemofusin
 - 5 Biasanya disertai rasa nyeri, tetapi dapat hilang sendiri
- f. Degenerasi lemak : ditemukan di dalam serat otot polos, namun jarang terjadi yang merupakan kelanjutan degenerasi hialin. (Wiknjosastro. 2008. hal 340)

4. Etiologi dan Patogenesis

Etiologi yang pasti terjadinya mioma uteri sampai saat ini belum diketahui. Stimulasi estrogen diduga sangat berperan untuk terjadinya

mioma uteri. Hipotesis ini sangat di dukung oleh adanya mioma uteri yang banyak ditemukan pada usia reproduksi dan kejadiannya rendah pada saat menopause. (Saifuddin, 2008 hal 891)

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumor pada mioma, disamping faktor predisposisi genetik :

1) Estrogen

Mioma uteri dijumpai setelah menarche. Seringkali, pertumbuhan tumor yang cepat selama kehamilan terjadi dan dilakukan terapi estrogen eksogen. Mioma uteri mengecil pada saat menopause dan oleh pengangkatan ovarium. Mioma uteri banyak ditemukan bersamaan dengan anovulasi ovarium dan wanita dengan sterilitas. Enzim hidroxydesidrogenase mengubah estradiol (sebuah estrogen kuat) menjadi estron (estrogen lemah). Aktivitas enzim ini berkurang pada jaringan miomatous, yang juga mempunyai jumlah reseptor estrogen yang lebih banyak daripada miometrium normal. (Setiati, 2009. Hal 87)

2) Progesteron

Progesteron merupakan antagonis natural dari estrogen. Progesteron menghambat pertumbuhan tumor dengan dua cara, yaitu mengaktifkan hidroxydesidrogenase dan menurunkan jumlah reseptor estrogen pada tumor. (Setiati, 2009. Hal 87)

3) Hormon pertumbuhan (*growth hormone*)

Level hormon pertumbuhan menurun selama kehamilan, tetapi hormon yang mempunyai struktur dan aktivitas biologik serupa, yaitu HPL (Human Placenta Lactogen), terlihat pada periode ini dan memberi kesan bahwa pertumbuhan yang cepat dari leiomioma selama kehamilan mungkin merupakan hasil dari aksi sinergistik antara HPL dan Estrogen. (Setiati, 2009. Hal 87)

5. Komplikasi

- a. Degenerasi ganas
- b. Torsi tangkai mioma
 - 1) Mioma uteri subserosa
 - 2) Mioma uteri submukosa
- c. Nekrosis dan Infeksi : Setelah torsi dapat diikuti infeksi dan nekrosis
- d. Pengaruh timbal balik mioma uteri dan kehamilan
 - 1) Pengaruh mioma uteri terhadap terhadap kehamilan :
 - a) Menimbulkan infertility
 - b) Meningkatkan kemungkinan abortus
 - c) Saat kehamilan dapat terjadi persalinan prematuritas dan kelainan letak
 - d) Pada saat inpartu akan terjadi insersia uteri dan gangguan jalan persalinan
 - e) Pascapartum terjadi perdarahan dan retensio plasenta

- 2) Pengaruh kehamilan dalam mioma uteri :
 - a) Mioma uteri cepat membesar karena pengaruh estrogen.
 - b) Terjadi red degeneration mioma uteri.
 - c) Kemungkinan torsi mioma uteri bertangkai. (Manuaba 2001. hal 601)

6. Gejala Klinik

Sebagian besar (sekitar dua pertiga) wanita lemioma tidak menunjukkan gejala. Munculnya gejala tergantung pada jumlah, ukuran, letak, keadaan dan kondisi (biasanya suplai pembuluh darah) tumor. (Benson and pernoll 2009. Hal 48). tetapi yang paling sering ditemukan pada penderita mioma uteri adalah gejala-gejala berikut.:

- a. Perdarahan yang lama selama masa menstruasi ataupun diluar masa mens. Rasa nyeri muncul karena tekanan tumor dan terputusnya tangkai tumor, serta adanya infeksi di dalam rahim.
- b. Terjadi penekanan pada organ di sekitar tumor, seperti gangguan buang air besar dan buang air kecil. Pelebaran pembuluh darah vena dalam panggul, gangguan ginjal karena pembengkakan tangkai tumor.
- c. Gangguan sulit hamil karena terjadipenekanan pada saluran indung telur.
- d. Bagian bawah perut dekat rahim terasa kenyal.
- e. Nyeri menstruasi hebat dan terus-menerus.

- f. Pembesaran di perut. Kadang-kadang kalau tumor belum teraba karena ukurannya yang masih kecil. Namun, jika tumor membesar, benjolan terasa saat diraba.
- g. Muncul gejala-gejala penekanan akibat pembesaran/mioma, misalnya penekanan ke depan menekan kandung kencing, penekanan ke belakang menekan rektum. Akibatnya, muncul gangguan buang air besar dan buang air kecil.
- h. Pada mioma uteri, jika ukurannya besar, mioma dapat menekan organ-organ sekitarnya.
- i. Perdarahan saat mens lebih banyak. (Setiati. 2009. Hal 101)

7. **Diagnosis**

Dalam hal pemeriksaan, diagnosis mioma uteri diberikan berdasarkan hal-hal berikut :

a. Anamnesis

Timbul benjolan diperut bagian bawah dalam waktu yang relatif lama. Kadang-kadang, gangguan haid, buang air kecil, atau buang air besar pun terjadi. Nyeri perut muncul jika mioma terinfeksi, terpuntir, atau pecah.

b. Pemeriksaan fisik

Palpasi abdomen digunakan untuk mendapatkan tumor di abdomen bagian bawah.

c. Pemeriksaan ginekologi

Dengan pemeriksaan bimanual, tumor tersebut didapatkan menyatu dengan rahim atau mengisi kavum Douglasi. Konsistensinya padat, kenyal, bergerak, dan permukaan tumor pada umumnya rata. Gejala klinisnya adalah adanya rasa penuh pada perut bagian bawah, tanda massa yang padat kenyal, terjadi perdarahan abnormal, dan muncul rasa nyeri, terutama saat menstruasi.

d. Pemeriksaan luar

Teraba massa tumor pada abdomen bagian bawah serta pergerakan tumor dapat terbatas atau bebas.

e. Pemeriksaan dalam

Teraba tumor yang berasal dari rahim dan pergerakan tumor dapat terbatas atau bebas. Tumor ini biasanya ditemukan secara kebetulan.

f. Pemeriksaan penunjang

Dapat dilakukan dengan USG, untuk menentukan jenis tumor, lokasi mioma ketebalan endometrium dan keadaan adnexa dalam rongga pelvis. Mioma juga dapat dideteksi dengan CT scan ataupun MRI (Magnetik Resona Imaging), tetapi kedua pemeriksaan itu lebih mahal dan tidak memvisualisasi uterus sebagian jasa USG.

Pada sebagian besar kasus, mioma sudah dikenali karena pola gemanya pada beberapa bidang tidak hanya menyerupai, tetapi juga bergabung dengan uterus. pada stadium lanjut, uterus membesar dan berbentuk tak teratur.

g. Pemeriksaan Laparaskopi

Dilakukan untuk mengevaluasi massa pada pelvis.

h. Pemeriksaan Laboratorium

Dilakukan pemeriksaan darah lengkap, urine lengkap, gula darah, tes fungsi hati, ureum, dan kreatinin darah.

i. Pemeriksaan tes kehamilan

Beberapa gejala yang dapat muncul sebagai tanda komplikasi yang mungkin terjadi.

1. Terjadi perdarahan sampai terjadi anemia.
2. Terdapat torsi tangkai mioma dari Mioma Uteri subserosa dan mioma uteri submukosa.
3. Terjadi infeksi. Setelah torsi, nekrosis dan infeksi dapat terjadi.
4. Terjadi pengaruh timbal balik mioma dan kehamilan.

Sementara itu, pada wanita, mioma membawa beberapa pengaruh sebagai berikut :

1. Dapat menyebabkan infertilitasi.
2. Dapat menyebabkan abortus.
3. Dapat menyebabkan persalinan prematuritas dan kelainan fisik.
4. Dapat menyebabkan inersia uteri.
5. Dapat menyebabkan gangguan jalan persalinan.
6. Dapat menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum
7. Dapat menyebabkan terjadi retensi plasenta.

Sedangkan pengaruh kehamilan terhadap mioma uteri juga dapat terjadi seperti hal-hal berikut ini.

1. Mioma cepat membesar karena rangsangan estrogen.
2. Ada kemungkinan torsi mioma uteri bertangkai. (Setiati, 2009)

8. Penanganan

Penanganan mioma uteri dilakukan tergantung pada sejumlah variable termasuk jumlah ukuran, lokasi, gejala, degenerasi, keinginan reproduksi (umur, paritas, harapan untuk melahirkan), kesehatan umum, dekatnya dengan menopause dan kemungkinan keganasan. (Benson and Pernoll's. 2008 hal 550) Oleh karena itu, penanganan mioma uteri terbagi atas kelompok-kelompok berikut :

- a. Penanganan konservatif, dilakukan jika mioma yang kecil muncul pada pra dan postmenopause tanpa adanya gejala. Cara penanganan atas kelompok-kelompok berikut:
 - 1) Observasi dengan pemeriksaan pelvis secara periodic setiap 3-6 bulan.
 - 2) Jika terjadi anemia, maka Hb kurang.
 - 3) Pemberian zat besi
 - 4) Penggunaan agonis GnRH leuprolid asetat 3,75 mg IM pada hari pertama sampai ketiga menstruasi setiap minggu, sebanyak tiga kali. Obat ini menyebabkan pengerutan tumor dan menghilangkan gejala. Obat ini menekan sekresi gonadotropin dan menciptakan

keadaan hipoestrogenik yang serupa yang ditemukan pada periode postmenopause. Efek maksimum dalam mengurangi ukuran tumor diobservasi dalam 12 minggu.

Terapi agonis GnRH ini dapat pula diberikan sebelum pembedahan karena memberikan beberapa keuntungan, antara lain mengurangi hilangnya darah selama pembedahan dan mengurangi kebutuhan akan transfusi darah.

b. Penanganan operatif, dilakukan jika terjadi hal-hal berikut :

- 1) Ukuran tumor lebih besar dari ukuran uterus 12-14 minggu.
- 2) Pertumbuhan tumor cepat.
- 3) Mioma subserosa bertangkai dan torsi.
- 4) Dapat mempersulit kehamilan berikutnya.
- 5) Hipermenorea pada mioma submukosa.
- 6) Penekanan pada organ sekitarnya.

Jenis operasi yang dilakukan untuk mengatasinya dapat berupa langkah-langkah berikut :

- 1) Enukleasi Mioma

Enukleasi mioma dilakukan pada penderita yang infertil, masih menginginkan anak, atau mempertahankan uterus demi kelangsungan fertilitas. Sejauh ini, tampaknya langkah ini aman, efektif dan masih menjadi pilihan terbaik.

Enukleasi sebaiknya tidak dilakukan jika ada kemungkinan terjadinya karsinoma endometrium atau sarkoma uterus dan

dihindari pada masa kehamilan. Tindakan ini seharusnya dibatasi dengan tumor dengan tangkai dan tumor yang dengan mudah dapat dijepit dan diikat. Bila miomektomi menyebabkan cacat yang menembus atau sangat berdekatan dengan endometrium, maka kehamilan berikutnya harus dilahirkan dengan seksio sesarea.

Menurut *American College of Obstetricians Gynecologists* (ACOG), kriteria preoperasi adalah sebagai berikut :

- a. Kegagalan untuk hamil atau keguguran berulang.
- b. Terdapat leiomioma dalam ukuran yang kecil dan berbatas tegas.
- c. Alasan yang jelas dari penyebab kegagalan kehamilan dan keguguran yang berulang tidak ditemukan.

2) Histerektomi

Histerektomi dilakukan jika pasien tidak menginginkan anak lagi dan pada pasien yang memiliki leiomioma yang simptomatik atau yang sudah bergejala. Kriteria ACOG untuk histerektomi adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat satu sampai tiga leiomioma asimptomatik atau yang dapat teraba dari luar dan dikeluhkan oleh pasien.
- b. Perdarahan uterus berlebihan.
- c. Perdarahan yang banyak, bergumpal-gumpal, atau berulang-ulang selama lebih dari delapan hari.
- d. Anemia akut atau kronis akibat kehilangan darah.

Rasa tidak nyaman pada bagian pelvis akibat mioma meliputi hal-hal berikut :

- a. Nyeri hebat atau akut.
- b. Rasa tertekan yang kronis di bagian punggung bawah atau perut bagian bawah.
- c. Penekanan buli-buli dan frekuensi urine yang berulang-ulang dan tidak disebabkan infeksi saluran kemih.

3) Penanganan Radioterapi

Tujuan dari radioterapi adalah untuk menghentikan perdarahan. Langkah ini dilakukan sebagai penanganan dengan kondisi sebagai berikut :

- a. Hanya dilakukan pada pasien yang tidak dapat dioperasi (*bad risk patient*)
- b. Uterus harus lebih kecil dari usia kehamilan 12 minggu.
- c. Bukan jenis submukosa.
- d. Tidak disertai radang pelvis atau penekanan pada rectum.
- e. Tidak dilakukan pada wanita muda karena dapat menyebabkan menopause. (Setiati. 2009. Hal 97)

B. Tinjauan Umum Tentang Faktor Predisposisi Mioma Uteri

1. Umur Penderita

Mioma Uteri merupakan tumor pada pelvis yang sering dijumpai. Diperkirakan 1 dibanding 4 atau 5 wanita yang berumur lebih dari 35 tahun terdapat mioma uteri. Meskipun umumnya mioma tidak menunjukkan gejala. Diperkirakan 60% dari laparatomi pelvis pada wanita dikerjakan dengan alasan mioma uteri. Penyebabnya hingga kini masih belum diketahui dengan pasti. Namun diduga pertumbuhannya akibat rangsangan terus menerus oleh hormon estrogen. (<http://Pdf.wordpress.com>. Diakses 14 April 2010)

Umunya Mioma Uteri tidak akan terdeteksi sebelum masa pubertas dan tumbuh selama masa reproduksi. Jarang sekali Mioma Uteri ditemukan pada wanita berumur 20 tahun atau kurang, paling banyak pada umur 35-45 tahun yaitu kurang dari 25%. Dan setelah menopause banyak mioma menjadi lisut, hanya 10% saja yang masih dapat tumbuh lebih lanjut. (Setiati, 2009)

Wanita mencapai umur sekitar 45 tahun, mengalami penuaan indung telur sehingga tidak sanggup memenuhi hormon estrogen. Sistem hormon mengalami kemunduran dalam mengeluarkan hormonnya. Fungsi ovarium menurun pada masa hidup 46 tahun ke atas (klimakterium/menopause) sehingga berpotensi degenerasi keganasan. (<http://Pdf.wordpress.com>. Diakses 14 April 2010)

2. Paritas Penderita

Kebanyakan mioma uteri tumbuh tanpa menimbulkan keluhan atau gejala. Pada perempuan lain mungkin mengeluh perdarahan menstruasi lebih banyak dari biasanya atau nyeri sewaktu menstruasi, perasaan penuh dan ada tekanan pada rongga perut, atau keluhan anemia karena kurang darah atau nyeri pada waktu berhubungan seksual, atau nyeri pada waktu bekerja. Sehingga perempuan lain yang mengidap mioma mengeluh susah hamil atau mudah keguguran. (Yatim. 2005. hal 60)

Penderita merasa nyeri akibat mioma mengalami degenerasi atau kontraksi uterus berlebihan pada mioma yang tumbuh ke dalam rongga rahim. Pasangan suami isteri seringkali sulit untuk punya anak (infertil) disebabkan gangguan pada tuba, gangguan implantasi pada endometrium, penyumbatan dan sebagainya.

Lebih sering terjadi pada nullipara (tidak pernah atau tidak dapat hamil) atau pada wanita relatif infertile tetapi sampai saat ini belum diketahui apakah infertilitas menyebabkan mioma uteri atau sebaliknya, mioma uteri yang menyebabkan infertilitas atau apakah kedua keadaan ini dapat saling mempengaruhi. (Setiati. 2009. Hal 88)

3. Faktor genetik

Penyebab mioma sampai saat ini belum bisa diketahui secara pasti hanya saja diteliti ternyata bila satu keluarga menderita penyakit mioma bisa terjadi pada turunya tetapi bukan merupakan penyakit turunan. (Setiati. 2009. Hal 88)

4. Faktor hormonal

Diperkirakan ada korelasi antara hormon estrogen dengan pertumbuhan mioma, dimana pertumbuhan mioma uteri muncul setelah minarche, berkembang setelah kehamilan dan mengalami regresi etelah menopause, serta penggunaan obat yang mengandung hormonal. (<http://www.Mr'sBlog-Askeb/miomauteri.com.online>). Diakses tanggal 14 April 2010

C. Pandangan Islam Tentang Mioma Uteri

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman membuktikan bahwa ada beberapa penyakit yang telah muncul pada waktu tertentu. Yang tidak dapat sembuh dan kemudian penderita sembuh dalam waktu singkat atau lama. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor personal maupun kemajuan sarana dan prasarana. (Yusuf. 2005)

Berkaitan dengan pernyataan diatas, maka perlu diketahui bahwa jauh sebelum perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menemukan beberapa penyakit, Islam sudah lebih dulu mengenal beberapa penyakit salah satunya mioma yang merupakan penyakit jenis tumor jinak pada rahim yang berasal dari otot rahim. Hal ini terbukti dengan adanya firman Allah SWT sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Q. S. Ar-Ra'd (13) : 8

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ

بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾

Terjemahnya :

Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang Sempurna dan yang bertambah. dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya.

Selain itu, berdasarkan pemaparan sebelumnya bahwa ada beberapa cara dalam menangani mioma uteri yaitu penanganan konservatif dan penanganan operatif. Jadi sangatlah tepat jika dalam sebuah hadist Rasulullah menegaskan bahwa setiap suatu penyakit tidak diturunkan oleh Allah SWT kecuali Dia menurunkan penyembuhannya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam, salah satu dari ucapan beliau kepada seorang badui Arab yang bertanya kepadanya:

أنتدواى يا رَسُولَ الله؟ قَالَ ص.م نَعَمْ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَنْزِلْ
دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عِلْمُهُ مَنْ عِلْمُهُ وَجَهْلُهُ مَنْ جَهْلُهُ
(رواه أحمد)

Artinya :

Apakah kita perlu berobat Rasulullah? Ya, sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali Dia menurunkan penyembuhannya dan tidak diketahui oleh siapa yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh siapa yang tidak mengetahuinya.

Sebagai kesimpulan, Al-qur'an dan Hadist merupakan gudang ilmu yang sangat komplit karena sebelum ilmu kedokteran mengungkapkan semua yang berkaitan tentang suatu penyakit, baik itu penyebab, maupun pengobatannya Islam sudah lebih tedahulu mengajarkan kita bagaimana mencegah dan mengobatinya.

BAB III

KERANGKA KONSEPTIONAL

A. Dasar Pemikiran Variabel Penelitian

Sebagai besar mioma uteri ditemukan pada masa reproduksi karena diduga berhubungan dengan aktifitas estrogen. Dengan demikian mioma uteri tidak dijumpai sebelum menarche dan akan mengalami regresi setelah menopause. Akan tetapi jika mioma uteri tidak mengalami regresi setelah menopause atau bahkan bertambah besar maka kemungkinan besar mioma uteri tersebut telah mengalami degenerasi keganasan atau menjadi sarkoma uteri. Oleh karena itu mioma uteri dalam penelitian ini dijadikan sebagai variabel dependen.

Faktor-faktor predisposisi yang diperkirakan memiliki keterkaitan dengan mioma uteri adalah sebagai berikut:

1. Umur penderita

Sebagian besar penderita mioma uteri ditemukan pada masa reproduksi karena adanya rangsangan estrogen. Dengan demikian mioma uteri tidak dijumpai sebelum datang haid (menarche yang biasanya terjadi pada umur ≥ 12 tahun) dan akan mengalami pengecilan setelah mati haid (menopause). Mioma uteri ditemukan paling banyak pada umur 30-45 tahun (kurang lebih 25%). Setelah menopause banyak mioma uteri mengecil, hanya 10% saja yang masih dapat tumbuh lanjut. Mioma yang

masih tetap besar pada masa menopause kemungkinan degenerasi keganasan atau sarkoma uteri. Fungsi ovarium menurun pada masa hidup 46 tahun ke atas (klimakterium /menopause) sehingga berpotensi degenerasi keganasan.

2. Paritas penderita

Seringkali penderita merasa nyeri akibat mioma mengalami degenerasi atau kontraksi uterus berlebihan pada mioma yang tumbuh ke dalam rongga rahim. Pasangan suami isteri seringkali sulit untuk punya anak (infertilitas) disebabkan gangguan pada tuba, gangguan implantasi pada endometrium, penyumbatan dan sebagainya.

3. Riwayat genetik/keluarga


Penyebab mioma sampai saat ini belum bisa diketahui secara pasti hanya saja diteliti ternyata bila satu keluarga mengidap hal ini bisa terjadi pada turunya tetapi bukan merupakan penyakit turunan. Kejadian tumor ini tinggi pada wanita dengan riwayat keluarga ada yang menderita mioma.

4. Riwayat penggunaan Hormonal

Diperkirakan ada korelasi antara hormon estrogen dengan pertumbuhan mioma, dimana pertumbuhan mioma uteri muncul setelah minarke, berkembang setelah kehamilan dan mengalami regresi etelah menopause,serta penggunaan obat yang berkhasiat hormonal.

B. Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan pemikiran yang telah dirumuskan maka disusunlah variabel yang diteliti.



Keterangan :

————— : Variabel yang diteliti

□ : Variabel Independen

○ : Variabel Dependen

C. Defenisi Operasional Dan Kriteria Penelitian

1. Mioma Uteri

Mioma Uteri merupakan tumor jinak miometrium dengan ciri tersendiri, yaitu bulat, keras, berwarna putih hingga merah muda pucat, sebagian besar terdiri dari otot polos dengan beberapa jaringan ikat. Mioma Uteri merupakan hasil diagnosa penderita gangguan sistem reproduksi yang dilayani di bagian kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Labuang Baji Makassar Tahun Januari 2009 sampai Juni 2010.

2. Umur penderita

Umur penderita adalah usia wanita pada saat menderita Mioma Uteri yang diukur dalam tahun berdasarkan hasil pencatatan yang tertera dalam buku register Rumah Sakit Labuang Baji Makassar periode 01 Januari s/d Desember 2009 yang di kategorikan sebagai berikut :

- a) Risiko tinggi, apabila 20-45 tahun
- b) Risiko rendah, apabila umur < 20 tahun dan >45 tahun

3. Paritas penderita

Paritas penderita adalah jumlah atau banyaknya anak yang telah dilahirkan oleh ibu tanpa memandang apakah anak yang dilahirkan hidup atau mati. Nilai paritas diambil dari status ibu dengan melihat GPA (Gravid, Para, Abortus) yang tercantum dalam status pasien dan buku register kebidanan Rumah Sakit Labuang Baji Makassar periode Januari 2009 sampai Juni 2010 yang di kategorikan sebagai berikut :

- a) Risiko tinggi, apabila paritas 0 (nullipara)
- b) Risiko rendah, apabila paritas ≥ 1

4. Faktor genetik/keluarga

Faktor genetik/keluarga adalah adanya riwayat atau salah satu keluarga yang pernah menderita mioma uteri yang tercantum dalam status pasien atau buku register kebidanan Rumah Sakit Umum Labuang Baji Makassar periode Januari 2009 sampai Juni 2010

- a) Risiko tinggi, apabila ada riwayat keluarga yang menderita mioma uteri
- b) Risiko rendah apabila tidak ada riwayat keluarga yang menderita mioma uteri

5. Riwayat Hormonal

Faktor hormonal yaitu adanya riwayat mengkonsumsi obat hormonal yang tercantum dalam status pasien atau buku register kebidanan Rumah Sakit Umum Labuang Baji Makassar periode Januari 2009 sampai Juni 2010

- a) Risiko tinggi, apabila ada riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal
- b) Risiko rendah apabila tidak ada riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan deskriptif yang bermaksud untuk mendapatkan gambaran pengaruh faktor-faktor predisposisi terhadap kejadian mioma uteri di Rumah Sakit Labuang Baji Makassar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari buku ginekologi Rumah Sakit Labuang Baji Makassar periode Januari 2009 sampai Juni 2010

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Labuang Baji Makassar Propinsi Sulawesi Selatan yang bertempat di Jln. DR. Ratulangi no. 81. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kel. Mamajang
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kel. Labuang Baji
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kel. Kampung Parang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kel. Mamajang Dalam

2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 10-17 Juli 2010

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian adalah semua wanita yang menderita gangguan saluran reproduksi yang berkunjung dan dilayani di bagian kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Labuang Baji Makassar Periode Januari 2009 sampai Juni 2010 dengan jumlah 516 penderita.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah penderita mioma uteri yang dilayani di bagian kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Labuang Baji Makassar Periode Januari 2009 sampai Juni 2010 dengan jumlah 80 penderita.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu sampel yang dipilih sesuai dengan objek yang akan diteliti saja agar relevan dengan desain penelitian sehingga memperoleh data tentang angka kejadian mioma uteri yang valid. (Setiawan, 2010. hal 97)

E. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data di dapatkan melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dengan cara melakukan pengumpulan status pasien pada bagian rekam medik di Rumah Sakit Labuang Baji Makassar.

F. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan secara manual dengan menggunakan kalkulator berdasarkan variabel yang diteliti.

G. Analisa Data

Data yang telah diolah selanjutnya di analisa secara deskriptif dan ditampilkan dalam bentuk tabel frekuensi dan presentase, disertai dengan rumus:

$$p = f / n \times 100\%$$

Keterangan:

p : Presentase data yang dicari

f : frekuensi variabel

n : Jumlah sampel

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar dengan besar sampel yang diobservasi adalah 80 responden. Setelah dilakukan pemeriksaan hasil observasi buku ginekologi pada rekam medik maupun pada saat dilakukan pengolahan data, ternyata ditemukan kasus mioma uteri dengan jumlah 80 kasus yang kemudian dimasukkan dalam analisis data.

1. Kejadian mioma uteri

Distribusi penderita gangguan saluran reproduksi menurut kejadian mioma uteri di RSUD Labuang Baji Makassar periode Januari 2009 sampai Juni 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1
Distribusi Penderita Gangguan Saluran Reproduksi
Di RSUD Labuang Baji Makassar Periode
Januari 2009 s/d Juni 2010

Gangguan Saluran Reproduksi	Frekuensi	Presentase
Mioma Uteri	80	18,34
Non Mioma Uteri	436	81,66
Jumlah	516	100

Sumber : Data Sekunder dari buku ginekologi RSUD Labuang Baji Makassar

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa sebanyak 80 orang yang menderita mioma uteri atau sekitar 18,34% dari 516 orang yang menderita gangguan saluran reproduksi dan sebanyak 436 orang atau 81,66 % yang menderita gangguan saluran reproduksi selain mioma uteri.

2. Umur Penderita

Distribusi penderita mioma uteri menurut umur penderita di RSUD Labuang Baji Makassar periode Januari 2009 s/d Juni 2010 dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.2
Distribusi Penderita Mioma Uteri Menurut Umur
di RSUD Labuang Baji Makassar Periode
Januari 2009 s/d Juni 2010

Umur Penderita	Frekuensi	Presentase
Risiko tinggi 20 - 45 tahun	59	73,75
Risiko rendah < 20 tahun dan >45 tahun	21	26,25
Jumlah	80	100

Sumber : Data Sekunder dari buku ginekologi RSUD Labuang Baji Makassar

Berdasarkan tabel 5.2 diatas menunjukkan bahwa sebanyak 80 orang yang menderita mioma uteri ditemukan pada kelompok umur 20 - 45 tahun yang berisiko tinggi menempati frekuensi tertinggi dengan jumlah sebanyak 59 orang (73,75%). Disusul oleh kelompok umur yang

berisiko rendah yaitu umur < 20 tahun dan > 45 tahun sebanyak 21 orang (26,25%).

3. Paritas Penderita

Distribusi penderita mioma uteri menurut paritas penderita di RSUD Labuang Baji Makassar periode Januari 2009 s/d Juni 2010 dapat dilihat pada tabel 5.3 sebagai berikut:

Tabel 5.3
Distribusi Penderita Mioma Uteri Menurut Paritas
di RSUD Labuang Baji Makassar Periode
Januari 2009 s/d Juni 2010

Paritas Penderita	Frekuensi	Presentase
Risiko tinggi (paritas 0)	45	56,25%
Risiko rendah (paritas ≥ 1)	35	43,75%
Jumlah	80	100

Sumber : Data Sekunder dari buku ginekologi RSUD Labuang Baji Makassar

Dari tabel 5.3 diatas menggambarkan bahwa sebanyak 45 orang (56,25%) yang mengalami risiko tinggi atau paritas 0 lebih tinggi dibanding dengan jumlah penderita yang paritasnya ≥ 1 atau yang berisiko rendah yaitu sebanyak 35 orang (43,75%)

4. Riwayat genetik/keluarga

Distribusi penderita mioma uteri menurut riwayat genetik/keluarga di RSUD Labuang Baji Makassar periode Januari 2009 s/d Juni 2010 dapat dilihat pada tabel 5.4 sebagai berikut :

Tabel 5.4
Distribusi Penderita Mioma Uteri Menurut Genetik/Keluarga
di RSUD Labuang Baji Makassar Periode
Januari 2009 s/d Juni 2010

Riwayat keluarga	Frekuensi	Presentase
Risiko tinggi (ada riwayat genetik)	13	16,25%
Risiko rendah (tidak ada riwayat genetik)	67	83,75%
Jumlah	80	100

Sumber : Data Sekunder dari buku ginekologi RSUD Labuang Baji Makassar

Dari tabel 5.4 menggambarkan bahwa sebanyak 13 orang (16,25%) penderita mioma uteri yang mengalami risiko tinggi atau ada riwayat keluarga yang menderita mioma uteri lebih rendah apabila dibandingkan jumlah penderita yang tidak ada riwayat keluarga yang menderita mioma uteri atau berisiko rendah yaitu sebanyak 67 orang (83,75%)

5. Riwayat Hormonal

Distribusi penderita mioma uteri menurut riwayat hormonal di RSUD Labuang Baji Makassar periode Januari 2009 s/d Juni 2010 dapat dilihat pada tabel 5.5 sebagai berikut :

Tabel 5.5
Distribusi Penderita Mioma Uteri Menurut Riwayat Hormonal
di RSUD Labuang Baji Makassar Periode
Januari 2009 s/d Juni 2010

Riwayat Hormonal	Frekuensi	Presentase
Risiko tinggi (ada riwayat hormonal)	18	22,55
Risiko rendah (tidak ada riwayat hormonal)	62	77,55
Jumlah	80	100

Sumber : Data Sekunder dari buku ginekologi RSUD Labuang Baji Makassar

Dari tabel 5.5 menggambarkan bahwa sebanyak 18 orang (22,55%) penderita mioma uteri yang mengalami risiko tinggi atau ada riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal lebih rendah apabila dibandingkan dengan jumlah penderita yang tidak ada riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal atau berisiko rendah yaitu sebanyak 62 orang (77,55%)

B. Pembahasan

Untuk mengetahui lebih lanjut pengumpulan data yang diperoleh setelah dilakukan pengolahan, penyajian data maka akan dibahas sesuai dengan variabel yang diteliti sebagai berikut :

1. Gambaran Kejadian Mioma Uteri

Dari hasil olah data yang telah dilakukan maka didapatkan kejadian mioma uteri sebanyak 18,34% atau sejumlah 80 orang dari 516 penderita

gangguan saluran reproduksi yang dirawat dibagian ginekologi RSUD Labuang Baji Makassar periode Januari 2009 s/d Juni 2010.

Walaupun mioma uteri sukar ditetapkan karena tidak semua penderita mioma memberikan keluhan, namun dapat disimpulkan bahwa dari sekian banyaknya penderita mioma uteri ada beberapa yang menjadi penyebab. Diantaranya umur, paritas, riwayat genetik, dan riwayat hormonal penderita. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya bahwa faktor-faktor tersebut memiliki kontribusi yang sangat tinggi terhadap angka kejadian mioma uteri.

2. Gambaran Umur Penderita

Menurut data yang diperoleh dari RSUD Labuang Baji Makassar berdasarkan umur penderita dengan kejadian mioma uteri pada tabel 02 menunjukkan bahwa dari 80 penderita mioma uteri sebanyak 59 penderita (73,75%) yang mengalami risiko tinggi dan berisiko rendah sebanyak 21 orang (26,25%).

Berdasarkan data di atas, faktor umur penderita merupakan penyebab utama dari mioma uteri. Dimana pada umur 20-45 tahun merupakan risiko tinggi terhadap kejadian mioma uteri karena pada usia ini merupakan usia reproduktif bagi wanita. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya bahwa mioma disebabkan rangsangan terus menerus oleh hormon estrogen. Dimana hormon ini sangat banyak diproduksi pada usia reproduktif.

Dengan demikian didapatkan kesesuaian dengan teori yang dipaparkan sebelumnya.

3. Gambaran Paritas Penderita Dengan Kejadian Mioma uteri

Dari data yang diperoleh paritas 0 berisiko tinggi terhadap kejadian mioma uteri sebanyak 45 orang (56,25%). Angka ini relative lebih besar dibanding jumlah penderita yang mengalami risiko rendah (paritas ≥ 1) sebesar 35 orang (43,75%).

Berdasarkan data di atas, pada nullipara yang relatif infertile ditemukan 56,25% yang menderita mioma uteri. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu syarat dari terjadinya kehamilan adalah dibutuhkannya uterus yang sehat karena jika terdapat kelainan yaitu adanya massa pada uterus maka akan menyebabkan situasi endometrium tidak siap menjadi tempat nidasi hasil konsepsi, mengurangi tempat berimplantasi dan akan mengganggu perkembangbiakan dari hasil konsepsi. Hal ini menyebabkan pada penderita yang mengidap mioma uteri relatif infertil.

Dengan demikian didapatkan kesesuaian data dengan teori yang dipaparkan sebelumnya.

4. Gambaran Riwayat Genetik/Keluarga Dengan Kejadian Mioma Uteri

Berdasarkan data yang telah diolah, kejadian penderita mioma uteri menurut riwayat genetik/keluarga sebanyak 13 orang (16,25%) yang mengalami risiko tinggi (ada riwayat keluarga yang menderita mioma

uteri) dan yang tidak ada riwayat keluarga menderita mioma uteri atau berisiko rendah sebesar 67 orang (83,75%).

Walaupun sampai saat ini belum ada teori yang mampu menjelaskan peranan riwayat genetik terhadap mioma uteri secara pasti. Namun pada penelitian ini didapatkan sebanyak 16,25% penderita mioma uteri memiliki riwayat keluarga mengidap penyakit ini walaupun sangat minim.

Hal ini menunjukkan terjadinya kesenjangan antara data yang telah diolah dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu pada teori dikemukakan kejadian mioma uteri terjadi lebih tinggi pada wanita dengan riwayat keluarga menderita mioma uteri, sebaliknya pada data didapatkan kejadian mioma uteri lebih tinggi pada wanita dengan tidak ada riwayat keluarga yang menderita mioma uteri.

5. Gambaran Riwayat Hormonal Dengan Penderita Mioma

Berdasarkan data yang telah diolah kejadian penderita mioma uteri menurut riwayat hormonal sebanyak 18 orang (22,55%) yang mengalami risiko tinggi (ada riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal) dan yang tidak ada riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal atau berisiko rendah sebesar 62 orang (83,75%).

Berdasarkan keterangan di atas, didapatkan bahwa penderita mioma yang memiliki riwayat hormonal lebih sedikit dibandingkan penderita yang tidak memiliki riwayat hormonal. Sedangkan pada pemaparan sebelumnya menerangkan bahwa adanya korelasi antara

hormon estrogen dengan pertumbuhan mioma uteri dimana pertumbuhan mioma uteri salah satu penyebabnya yaitu adanya obat yang berkhasiat hormonal.

Hal ini menunjukkan terjadinya kesenjangan antara data yang telah diolah dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya. Namun, kesenjangan ini terjadi karena ada beberapa faktor, diantaranya karena pada penelitian ini memiliki sampel yang terbatas dan pada status pasien/rekam medik yang merupakan data primer sangat sedikit yang mencantumkan riwayat pengguna hormonal.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisa data tentang kejadian mioma uteri di RSUD Labuang Baji Makassar pada periode Januari 2009 s/d Juni 2010 maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kejadian mioma uteri di RSUD Labuang Baji Makassar periode Januari 2009 s/d Juni 2010 sebesar 80 penderita atau sekitar 18,34% dari 516 penderita gangguan saluran reproduksi.
2. Gambaran penderita mioma uteri menurut umur, dimana presentase yang mengalami mioma uteri risiko tinggi ditemukan pada golongan umur 20 - 45 tahun dengan jumlah kasus terbanyak sebesar 59 orang (73,75%)
3. Gambaran penderita mioma uteri menurut paritas, dimana presentase mioma uteri lebih besar pada kelompok berisiko tinggi (paritas 0) yaitu 45 orang (56,25%).
4. Gambaran penderita mioma uteri menurut riwayat genetik/keluarga, dimana presentase mioma uteri lebih besar pada kelompok berisiko rendah (tidak ada riwayat keluarga yang menderita mioma uteri) sebesar 67 orang (83,75%) dibanding dengan jumlah penderita yang mempunyai riwayat keluarga menderita mioma uteri.
5. Gambaran penderita mioma uteri menurut riwayat hormonal, dimana presentase mioma uteri lebih besar pada kelompok berisiko rendah (tidak

ada riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal) sebesar 62 orang (77,55%) dibanding dengan jumlah penderita yang mempunyai riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal.

B. Saran

1. Diharapkan tenaga kesehatan tidak hanya mampu melakukan upaya kuratif terhadap kasus mioma tetapi juga pro aktif dalam upaya preventif untuk meningkatkan pengetahuan wanita reproduktif tentang mioma uteri melalui penyuluhan sehingga dapat menekan angka morbiditas dan mortalitas akibat mioma uteri.
2. Dengan semakin meningkatnya angka kejadian mioma uteri dari tahun ke tahun, maka perlu adanya peran aktif dari pemerintah untuk menekan angka kejadian tersebut.
3. Perlu adanya registrasi lengkap pada Rumah Sakit maupun Dinas Kesehatan tentang mioma uteri agar mempermudah peneliti untuk pengambilan data berikutnya.
4. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mendalami tentang metodologi penelitian agar bisa menghasilkan suatu penelitian yang variatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azazi. 2007. *Hadist tentang kehamilan dan janin menurut islam*. Cetakan pertama. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. Hal 35
- Al-Muyassar, *Al-Quran dan terjemahannya*. Departemen Agama RI. Cetakan kedua. 2007. diterjemahkan oleh Anwar abu bakar. Bandung : Sinar baru algensindo. Hal 486
- Benson, Ralph C. & Pernoll, Martin L. 2008. *Buku Saku Obstetri & Ginekologi*. Cetakan pertama. Jakarta : EGC. Hal 546
- Hendarta. 2009. *Gejala penyakit mioma uteri*. Available : [http://id.wikipedia.org/wiki/mioma-uteri.\(online\)](http://id.wikipedia.org/wiki/mioma-uteri.(online)). Diakses tanggal 20 April 2010).
- Hidayat, A. Azis Alimul. 2009. *Metode Penelitian Kebidanan & Teknik Analisis Data*. Cetakan ketiga. Jakarta : Salemba Medika. Hal 67-71
- Idman. 2008. *All About Miomectomy*. [http://yayanakhyar.wordpress.com/2008/10/04/mioma-uteri.\(online\)](http://yayanakhyar.wordpress.com/2008/10/04/mioma-uteri.(online)). Diakses tanggal 17 Mei 2010
- Llewellyn, Derek & Jones. 2002. *Dasar-Dasar Obstetri & Ginekologi*. Edisi keenam. Jakarta : Hipokrates. Hal 263
- Mansjoer, Arif. 2001. *Kapita Selekta Kedokteran*. Edisi ketiga. Jakarta : Aesculapus.
- Manuaba, I, B, G. 2001. *Kapita Selekta Penatalaksanaan Rutin Obstetri ginekologi dan KB*. Jakarta : EGC. Hal 60
- Nurdin. 2009. *Kumpulan Askeb Mioma Uteri*. [http://www.Mr'sBlog-Askeb/miomauteri.com.\(online\)](http://www.Mr'sBlog-Askeb/miomauteri.com.(online)). Diakses tanggal 14 April 2010
- Saifuddin, Abdul Bari. 2008. *Ilmu Kebidanan*. Edisi keempat. Jakarta : PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Hal 891
- Setiati, Eni. 2009. *Waspada 4 Kanker Ganas Pembunuh Wanita*. Edisi pertama. Yogyakarta : Andi. Hal 82-102
- Setiawan, Ari & Saryono. 2010. *Metodologi penelitian kebidanan*. Edisi pertama. Yogyakarta: Mulia Medika. Hal 97
- Wiknojosastro, Hanifa. 2008. *Ilmu kandungan*. Edisi kedua. Jakarta : PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Hal 340

Wiknojosastro, Hanifa. 2005. *Ilmu kandungan*. Edisi kedua. Jakarta : PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.335

Yatim, Faisal. 2005. *Penyakit Kandungan*. Jakarta : Pustaka Populer Obor. Hal 60

Zukma. 2009. All About

MiomaUteri.<http://www.pdfound.com/download.phpaHR0cDov.mioma-uteri.pdf>(online). Diakses tanggal 14 April 2010



**DAFTAR NAMA PENDERITA MIOMA UTERI DI RSUD LABUANG BAJI
MAKASSAR PERIODE JANUARI 2009 SAMPAI JUNI 2010**

No	No. Reg	Tgl Masuk	Nama	Faktor predisposisi mioma uteri			
				Umur	Paritas	Genetik	Hormonal
1	155099	09/01/09	Ny "H"	35	P0		
2	158173	09/01/09	Ny "S"	36	PIII	✓	✓
3	156535	12/01/09	Ny "D"	48	PVII		
4	154162	13/01/09	Ny "S"	45	P0		
5	155719	24/01/09	Ny "U"	41	P0		
6	159057	25/01/09	Ny "I"	31	PI	✓	✓
7	169798	27/01/09	Ny "N"	41	P0		
8	158892	27/01/09	Ny "M"	30	P0		
9	158238	01/02/09	Ny "R"	40	P0		
10	158143	01/02/09	Ny "S"	42	P0		
11	160569	09/02/09	Ny "N"	39	P0		
12	159636	17/02/09	Ny "S"	47	P0		
13	058919	20/02/09	Ny "S"	38	PI		
14	160698	29/02/09	Ny "S"	47	PI		✓
15	161531	09/03/09	Ny "N"	42	P0		
16	160993	13/03/09	Ny "S"	41	PI	✓	
17	162678	28/03/09	Ny "Y"	27	P0		
18	164839	29/03/09	Ny "M"	32	P0		
19	165895	21/04/09	Ny "M"	33	P0		
20	161701	21/04/09	Ny "K"	45	PI		✓
21	160880	27/04/09	Ny "M"	41	P0		
22	166581	09/05/09	Ny "S"	44	PI		

23	168201	01/05/09	Ny "F"	40	PIII	✓	
24	066075	11/05/09	Ny "A"	45	P0		
25	167392	12/05/09	Ny "S"	41	PII		✓
26	168822	22/05/09	Ny "M"	23	P0		
27	028062	25/05/09	Ny "H"	44	P0		
28	171712	13/06/09	Ny "S"	43	P0		
29	169224	17/06/09	Ny "S"	39	P0		
30	164027	21/06/09	Ny "S"	38	PI		✓
31	144175	22/06/09	Ny "J"	38	PII	✓	✓
32	170214	22/06/09	Ny "R"	47	PVI		✓
33	164055	26/06/09	Ny "S"	46	PI		
34	172909	29/06/09	Ny "R"	37	P0		
35	172257	02/07/09	Ny "P"	47	P0		
36	173100	02/07/09	Ny "S"	35	P0		
37	172924	30/06/09	Ny "J"	40	P0		
38	174016	22/07/09	Ny "N"	45	PI		✓
39	173702	23/07/09	Ny "S"	46	PVIII		
40	142253	11/08/09	Ny "S"	21	PII	✓	✓

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

Nama : Deby Gita Pancawati
Nim : 70400007007
Tempat/tanggal lahir : Laloasa, 12 September 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Perumnas Antang Blok V No. 1

B. Riwayat pendidikan

1. Tamat SD Inpres Laloasa tahun 2000
2. Tamat SLTP Negeri 2 Bontomanai tahun 2003
3. Tamat SMA Negeri 1 Benteng tahun 2006
4. Mengikuti pendidikan AKMI Dipanegara Tahun 2006 sampai 2007
5. Mengikuti pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan D₃ Kebidanan tahun 2007 sampai tahun 2010.