

**UJI AKTIVITAS INFUSA DAUN UBI JALAR (*Ipomea batatas* L)
TERHADAP PENINGKATAN TROMBOSIT MENCIT (*Mus musculus*)**



Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Oleh

KHAERANI

NIM : 70100106036

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 21 Juli 2010

Penulis,

KHAERANI
NIM : 70100106036

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Maha Suci Allah yang menghadirkan siang dan malam dalam kehidupan manusia di muka bumi sehingga sampai pada saat ini tidak henti-hentinya diucapkan syukur atas rahmatNya. Dengan siklus yang senantiasa berputar itu Allah swt. memberi kesempatan perbaikan bagi siapa saja yang menghendaknya, termasuk kesempatan perbaikan yang didapatkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., karena beliau sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan ini.

Skripsi dengan judul “Uji Aktivitas Infusa Daun Ubi Jalar (*Ipomea batatas* L) Terhadap Peningkatan Trombosit Mencit (*Mus musculus*)”, ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.


Pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih yang kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta jajarannya.
2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta jajarannya.
3. Bapak Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III.

4. Ibu Gemy Nastity H., S.Si., M.Si., Apt., selaku Ketua Jurusan Farmasi yang selama ini telah banyak memberikan bantuan dalam membimbing sampai selesainya penulisan skripsi ini.
5. Ibu Haeria, S.Si., selaku Sekretaris Jurusan dan Pembimbing Akademik yang selama ini telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan.
6. Bapak Drs H.Hasyim Bariun, M.Si., Apt. selaku Pembimbing Utama, yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dra Hj.Faridha Yenny Nonci, Apt. selaku Pembimbing kedua yang telah memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Farmasi baik yang berada di luar maupun di dalam lingkup Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
10. Orang tua tercinta, Ayahanda H.Mukhtar Genda, B.A dan Ibunda Hj.Ruhana, atas segala curahan cinta dan kasih sayang serta do`a restu yang diberikan selama ini hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan.
11. Kakak-kakakku tersayang, Hj.Haniah M.A dan Irfan S.E yang tidak sedikit memberikan dorongan dalam tiap langkah penyelesaian studi selama ini.

12. Rekan-rekan seperjuangan dalam bidang biofarmasi Asrul Ihsan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi. Sahabat-sahabatku, Mirna, Anna, Asriana Sultan, Nur Wahyuni Syam, Jumriyani, Fatimah Az-zahrah dan Maryam serta Arifuddin dan Hermin, maupun seluruh teman-teman angkatan 2006 yang telah bersama-sama melewati masa-masa perkuliahan pada prodi farmasi UIN Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah swt., namun penulis masih tetap berharap semoga skripsi yang jauh dari kesempurnaan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amiin



Makassar, Juli 2010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-5
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJUAN PUSTAKA	6-42
A. Uraian Tanaman.....	6
1. Klasifikasi Tanaman	6
2. Morfologi Tanaman	6
3. Kandungan Kimia	7

4. Kegunaan	8
B. Metode Ekstraksi	9
C. Uraian Hewan Uji	11
1. Klasifikasi Hewan Uji.....	11
2. Karakteristik Hewan Uji	12
D. Darah	14
1. Trombosit.....	15
2. Kelainan Sumsum Tulang Belakang.....	17
3. Trombositemia	18
4. Trombositopenia	19
5. Pengobatan.....	23
6. Tinjauan Islam tentang Darah.....	24
7. Hitung Darah dan Pemeriksaan Sediaan Apus Darah.....	27
E. Uraian Anilin.....	29
F. Tinjauan Islam Mengenai Penelitian Tanaman Obat.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36-42
A. Alat dan Bahan yang Digunakan	36
1. Alat-alat yang digunakan	36
2. Bahan-bahan yang digunakan	36
B. Penyiapan Bahan Penelitian.....	36
1. Pengambilan sampel	36
2. Pengolahan simplisia	37

3. Pembuatan infusa	37
4. Penyiapan hewan coba	38
C. Pelaksanaan Percobaan	38
1. Pembagian kelompok mencit	38
2. Pengambilan darah mencit	39
3. Penyuntikan anilin 0,05 ml/kg BB	39
D. Penghitungan dan Pemeriksaan Trombosit	40
1. Penyiapan cat	40
2. Pelaksanaan uji	40
E. Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43-53
A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan	45
BAB V PENUTUP	54-55
A. Kesimpulan	54
B. Implikasi	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	59-65
SKEMA KERJA	66
PETA	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pengaruh pemberian infusa daun ubi jalar (<i>Ipomea batatas</i> L) terhadap peningkatan trombosit peningkatan trombosit mencit (<i>Mus musculus</i>) 43	
2. Waktu pembekuan darah mencit hari ke0, ke1, ke2 59	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Perhitungan rata-rata waktu pembekuan darah mencit	59
2. Perhitungan trombosit pada pemeriksaan hari ke0	60
3. Penghitungan dosis infusa terhadap manusia	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Zona pemeriksaan sediaan apus darah tepi	59
2. Trombosit dengan pembesaran 40x	60
3. Pemeriksaan apusan untuk mencit anemia pembesaran 40x	60
4. Pemeriksaan apusan untuk mencit yang sudah diberi infusa pembesaran 40x	61
5. Foto daun ubi jalar (<i>Ipomea batatas</i> L.)	62



ABSTRAK

Nama Penulis : Khaerani
NIM : 70100106036
Judul Skripsi : “Uji Aktivitas Infusa Daun Ubi Jalar (*Ipomea Batatas* L) terhadap Peningkatan Trombosit pada Mencit (*Mus musculus*)”

Daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L) merupakan salah satu jenis tumbuhan yang terdapat di Indonesia yang secara tradisional dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengobati berbagai penyakit, diantaranya sebagai peningkat trombosit. Telah dilakukan penelitian uji aktivitas infusa daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L) terhadap peningkatan trombosit mencit (*Mus musculus*) dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan infusa daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L) dalam meningkatkan jumlah trombosit pada mencit (*Mus musculus*). Infusa daun ubi jalar dibuat dalam 3 konsentrasi yaitu 0,25%; 0,5% dan 1 %. Pemberian infusa daun ubi jalar dilakukan untuk mencit yang telah mengalami anemia aplastik dengan pemberian anilin dosis 0,05 ml/kg BB. Penghitungan jumlah trombosit dilakukan dengan penghitungan langsung metode kamar hitung dan pemeriksaan morfologi trombosit dengan metode hapusan darah tepi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah trombosit sudah dapat dilihat pada konsentrasi infusa 0,25% dan peningkatan yang cukup pesat sekitar 50% setelah penurunan jumlah trombosit pada konsentrasi infusa 1% dan terbukti juga bahwa waktu pembekuan darah lebih cepat pada konsentrasi infusa 1% yang hanya berkisar 202 detik yang tidak jauh beda dengan kelompok kontrol yang hanya berkisar 181,3 detik.

Kata Kunci : Ubi jalar (*Ipomea batatas* L), Trombosit, Kamar Hitung, Mencit (*Mus musculus*).

ABSTRACT

Name : Khaerani
NIM : 70100106036
Judul Skripsi : “Activity Test infusa Leaf Sweet Potato (*Ipomea batatas* L)
againts the increase Platelets in Mice (*Mus musculus*)”

Sweet potato leaves (*Ipomea batatas* L.) is one of the plant species found in Indonesia which is traditionally used by communities in treating various diseases, such as enhancing thrombocyte. Test the activity of the research done infusa sweet potato leaves (*Ipomea batatas* L.) on the increase of thrombocyte mice (*Mus musculus*) where the purpose of this study is to determine the ability infusa sweet potato leaves (*Ipomea batatas* L.) in increasing platelet count in mice (*Mus musculus*). Infusa sweet potato leaves are made in three concentrations of 0.25%, 0.5% and 1%. Granting leaves of sweet potato infusa done for mice that have undergone aplastic anemia by giving aniline dose 0.05 ml / kg BW. Platelet counts done by direct counting method, morphological examination rooms and thrombocyte count with peripheral blood smear method. The results showed that the increase in platelet count can already be seen at a concentration of 0.25% infusa and increased rapidly approximately 50% after a decline in platelet count at a concentration of 1% and proven infusa also that faster blood clotting time at a concentration of 1% is only infusa around 202 seconds which is not much different from the control group which only around 181,3 seconds.

Keywords: Sweet potato (*Ipomea batatas* L), Platelets, Room Count, mice (*Mus musculus*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan tanaman obat sebagai alternatif dalam pengobatan untuk masyarakat semakin meningkat, sehingga diperlukan penelitian untuk membuktikan khasiat tanaman obat tersebut, ini disebabkan dari pengobatan obat herba yang terbukti lebih ampuh. Pengalaman sebelumnya telah membuktikan bahwa untuk beberapa penyakit, ternyata pengobatan herba lebih efektif memberikan solusi penyembuhan dibandingkan dengan pengobatan menggunakan bahan kimia. Keunggulan pengobatan herba terletak pada bahan dasarnya yang bersifat alami sehingga efek sampingnya dapat ditekan seminimal mungkin (Agromedia, 2008).

Ubi jalar merah (*Ipomea batatas L*) merupakan salah satu tumbuhan yang berkhasiat obat. Beberapa bagian dari ubi jalar dapat berkhasiat sebagai obat. Terutama bagian daun banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti obat penyakit kuning, pembengkakan, rematik, asam urat, rabun senja. Menurut Shahidul Islam, peneliti dari Universitas Arkansas, Amerika Serikat, daun ubi jalar dapat berfungsi sebagai antioksidan, antiperadangan bahkan antikanker dan saat ini ditemukan dapat berfungsi sebagai peningkat trombosit (Wahyudi, 2009).

Musim hujan adalah musim yang rawan dengan wabah demam berdarah. Demam berdarah *dengue* (DBD) bukan penyakit baru di Indonesia. Cikal bakal munculnya penyakit DBD, sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1779. Namun

demikian, wabah DBD bukan dimulai di Indonesia, melainkan di Yunani, Amerika Serikat, Australia dan Jepang yang terjadi pada sekitar tahun 1920 (Nadesul, 2007).

Penyakit ini ditularkan melalui nyamuk *Aedes aegypti* yang membawa virus *dengue*. Bagian tubuh yang paling disoroti mengalami dampak akibat virus adalah sumsum tulang yang merupakan tempat produksi sel-sel darah, mengalami depresi sehingga produksi sel darah menurun dan berkualitas rendah, termasuk trombosit dan leukosit. Turunnya trombosit mengancam terjadinya pendarahan. Oleh karena itu, kekurangan trombosit perlu diperhatikan (Nadesul, 2007).

Kasus demam berdarah akan mengakibatkan nilai trombosit menurun sehingga terjadi trombositopenia yang menyebabkan terjadinya peningkatan permeabilitas pembuluh darah dan memanjangnya masa pendarahan. Jika ini terus berlanjut dapat mengakibatkan terjadinya syok dan fatal (Hendarwanto, 1996). Sejauh ini, mekanisme patogenesis demam berdarah belum diketahui dengan jelas, sehingga belum ada vaksin maupun obat yang efektif untuk mencegah atau mengatasi penyakit ini. Dewasa ini penanganan pasien demam berdarah masih bersifat suportif, yaitu dengan mengatasi kehilangan cairan plasma sebagai akibat peningkatan permeabilitas pembuluh darah kapiler, dan pemberian suspensi trombosit pada kasus pendarahan (Siswono, 2004).

Kemampuan daun ubi jalar untuk meningkatkan jumlah trombosit dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk pengobatan demam berdarah. Pengobatan demam berdarah tidak hanya membutuhkan peningkat trombosit tapi ada beberapa alternatif lain untuk pengobatan misalkan dengan meningkatkan respon

imun spesifik, karena respon inilah yang dapat menyerang infeksi yang bersifat intraseluler. Dibutuhkan peningkat trombosit untuk menghindari transfusi trombosit yang pada umumnya membutuhkan biaya yang banyak dan pada umumnya pasien demam berdarah tidak diutamakan untuk mendapatkan transfusi trombosit, sehingga disamping hal tersebut, daun ubi jalar dapat dikembangkan sebagai alternatif peningkat trombosit untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kekurangan trombosit karena kekurangan trombosit tidak hanya pada pasien demam berdarah tapi ada pada beberapa jenis penyakit yang diakibatkan oleh kekurangan trombosit.

Penelitian di bidang biofarmasi sangat banyak, dalam al-Qur'an segala sesuatunya telah difirmankan oleh Allah swt. dan diperjelas dengan hadits Rasulullah saw. Peneliti islam yang baik adalah yang mampu mengaitkan bidang penelitian dengan dalil-dalil baik dari ayat al-Qur'an maupun dari hadits. Seorang ilmuwan yang penemuannya sehebat Gallileo, Newton dan Einstein yang berhasil membuktikan tentang keterkaitan antara Al Qur'an dan rancang struktur tubuh manusia adalah Ahmad Khan. Ayat pertama yang mendorong penelitiannya adalah Q.S. Fussilat (41) : 53 yang berbunyi :

سُرِّيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ
 أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

Terjemahnya :

Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka

bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? (Q.S. 41 : 53)

Maka jelaslah kekuasaan Allah swt. yang ada pada setiap bidang di dunia ini (Nit, 2010). Sebagai manusia seharusnya kita terus belajar dan belajar menelusuri kebesarannya melalui alam, semakin banyak dipelajari semakin banyak dibaca maka akan memusnahkan kesombongan yang ada dalam hati. Semakin kita menyadari bahwa manusia hanyalah makhluk kecil ciptaannya (Yousif, 2002). Kita sebagai mahasiswa berusaha mengkaji kebesarannya melalui penelitian yang dilakukan walaupun penelitian yang dilakukan hanya tergolong sebagai penelitian kecil dibandingkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para Doktor ataupun Profesor.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah ada aktivitas peningkat trombosit dari daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L) pada mencit (*Mus musculus*)?
2. Pada konsentrasi berapa infusa daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L) dapat meningkatkan trombosit mencit (*Mus musculus*)?
3. Apakah penelitian tentang aktivitas peningkat trombosit daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L) sesuai dengan syariat agama?

C. Tujuan Penelitian

1. Membuktikan apakah daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L) dapat berfungsi sebagai peningkat trombosit.

2. Menentukan konsentrasi infusa daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L) yang dapat meningkatkan trombosit mencit (*Mus musculus*).
3. Mengkaji tinjauan Islam tentang aktivitas peningkat trombosit daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L).

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan daun ubi jalar sebagai peningkat trombosit sehingga dapat memberikan pilihan obat alternatif oleh masyarakat untuk penyakit yang berhubungan dengan trombositopenia.
3. Menemukan tanaman yang dapat menjadi cikal bakal penemuan obat peningkat trombosit yang baru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tanaman

1. Klasifikasi Tanaman (Steenes, 2006)

- Kerajaan : Plantae
- Divisi : Magnoliophyta
- Anak divisi : Spermatophyta
- Kelas : Magnoliopsida
- Anak kelas : Asteridae
- Bangsa : Solanales
- Suku : Convolvulaceae
- Marga : Ipomea
- Jenis : *Ipomea batatas* L

2. Morfologi Tanaman

Nama lain dari ubi jalar adalah ketela rambat, telo rambat (jawa), patatas (papua), mantang (sunda), lame kalolo (bugis) (plantamor, 2010). Ubi jalar merupakan tanaman ubi-ubian dari tumbuhan semak bercabang dan tergolong tanaman semusim (berumur pendek). Tanaman ubi jalar tumbuh menjalar pada permukaan tanah dengan panjang tanaman dapat mencapai 3 meter. Batangnya gundul, dan terkadang saling membelit. Dari batangnya terdapat getah. Ubi jalar berbentuk lunak, tidak berkayu, berbentuk bulat dan teras bagian tengah bergabus. Batang ubi jalar beruas-ruas dengan panjang

antar ruas 1-3 cm. Daun ubi jalar berbentuk bulat hati, bulat lonjong dan bulat runcing, tergantung pada varietasnya. Daun yang berbentuk bulat hati memiliki tepi daun rata, berlekuk dangkal atau menjari. Daun yang berbentuk bulat lonjong (oval) memiliki tepi daun rata, berlekuk dangkal atau berlekuk dalam. Bentuk segitiga berlekuk yang menjadi 3-5 lekukan dengan tangkai yang panjang (Wahyudi, 2009).

Di dunia terdapat berbagai jenis ubi jalar. Ada yang kulitnya putih, merah, ungu, kuning dan kecokelatan. Warna ubinya pun beragam, ada putih, kuning, oranye, putih keunguan, hingga ungu tua. Dari sekian jenis itu, ubi jalar putihlah yang paling banyak dijumpai (Nashihah, 2007).

3. Kandungan Kimia

Seperti ubi-ubian yang lain, ubi jalar merupakan sumber karbohidrat yang baik. Ia juga kaya akan protein, lemak, kalori, serat, abu, kalsium, fosfor, zat besi, karoten, vitamin B1, B2, C dan asam nikoninat. Semua kandungan itu terdapat dalam umbi maupun daunnya (Nashihah, 2007).

Hasil riset Shahidul Islam, peneliti dari Universitas Arkansas, Amerika Serikat menunjukkan setiap 100 g daun ubi jalar 117 mg kalsium, 1,8 mg besi, 3,5 mg karoten. Selain itu juga mengandung 7,2 mg vitamin C, 1,6 mg vitamin E dan 0,5 mg vitamin K, vitamin B, betakaroten serta protein. Hasil riset itu juga membuktikan bahwa daun ubi jalar kaya akan kandungan 15 antosianin dan 6 jenis polifenol dan asam fenolik. Asam fenolik yang

terkandung seperti dicaffeoilquinat, asam dicaffeoilquinat, mokodaffeoilquinat dan kaffeat (Wahyudi, 2009).

4. Kegunaan

Selain digunakan sebagai pangan, ubi jalar juga sering digunakan sebagai obat, baik obat luar maupun dalam. Pengobatan luar memanfaatkan umbi dan daunnya dilakukan dengan memarut atau menghaluskan bahan dari ubi jalar, lalu ditempel ke bagian sakit. Penyakit yang bisa disembuhkan antara lain keseleo, luka terpukul, eksim, bisul, dan herpes (Nashihah, 2007).

Ubi jalar dapat digunakan untuk pengobatan dalam dengan cara ubi jalar direbus dan dibuat masakan sesuai selera, atau diambil tepungnya. Beberapa penyakit yang bisa diobati antara lain sakit tenggorokan, kencing manis, perut kembung, penyakit kuning (lever), pembengkakan, rematik, asam urat, pegal linu, dan rabun senja (Nashihah, 2007).

Ubi jalar juga berkhasiat melancarkan peredaran darah dan buang air besar, mengatasi cacangan, bisa menurunkan kolesterol, membuat kita awet muda, mencegah kemerosotan daya ingat dan kepikunan, jantung koroner, hingga kanker (Nashihah, 2007).

Daun ubi bisa digunakan untuk mengatasi cacangan dan melancarkan buang air besar, dengan mencuci daunnya kemudian dijus lalu diminum. Dapat pula direbus dan airnya diminum (Nashihah, 2007).

Dari riset terbaru, dikemukakan bahwa kandungan polifenol dalam daun ubi jalar berperan sebagai antioksidan yang mampu memperbaiki sistem imun atau kekebalan tubuh (Wahyudi, 2009).

B. Metode ekstraksi

Simplisia merupakan suatu bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga kecuali berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia terbagi dari simplisia nabati, simplisia hewani dan simplisia mineral (pelikan) (Felter, 1995).

Metode ekstraksi menggunakan pelarut dapat dilakukan secara dingin yaitu maserasi dan perkolasi, dan secara panas yaitu refluks, soxhlet, digesti, infus, dan dekok (Dirjen POM, 2000).

a. Cara dingin

1) Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama dan seterusnya (Dirjen POM, 2000).

2) Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna (exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada

temperatur ruangan. Proses terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetapan/penampungan ekstrak) yang jumlahnya 1 – 5 bahan (Dirjen POM, 2010).

b. Cara panas

1) Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3 – 5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna.

2) Soxhlet

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik.

3) Digesti

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar), yaitu secara umum dilakukan pada temperatur 40 – 50⁰C (Dirjen POM, 2000).

Infusa merupakan sediaan galenika cair yang dibuat dengan mengekstraksi simplisia nabati dengan air pada suhu 90⁰C selama 15 menit, jika lebih 15 menit dan mencapai waktu 30 menit disebut dekokta (Felter, 1995).

Cara pembuatan infusa cukup mudah dan praktis. Alat yang digunakan pun cukup sederhana. Caranya yaitu simplisia yang memiliki derajat halus yang sesuai dicampurkan ke dalam panci air secukupnya, dipanaskan di atas tangas air selama 15 menit terhitung mulai suhu mencapai 90⁰C sambil sekali-sekali diaduk. Serkai (saring) selagi panas melalui kain flanel, tambahkan air panas secukupnya melalui ampas hingga diperoleh volume infusa yang dikehendaki (Felter, 1995).

Bentuk infusa merupakan solusi untuk membuat obat-obatan dengan cara cepat dan mudah. Sebagian besar konstituen aktif yang dikehendaki diperoleh dengan cara ini. Hampir semua obat-obatan nabati kadang-kadang diberikan dalam bentuk infusa agar memudahkan dalam pemberian. Kekurangannya adalah sulit mempertahankan kestabilannya dalam jangka waktu yang lama, sehingga hanya dibuat secukupnya saat hendak dipakai. Infusa sebaiknya tidak disimpan dalam wadah yang berbahan metal untuk menghindari reaksi kimia dengan logam yang dapat mengganggu kestabilan bahan yang dipersiapkan. Infusa yang mengandung asam atau garam sebaiknya disimpan dalam gelas porselen (Felter, 1995).

C. Uraian Hewan Uji

1. Klasifikasi Hewan Uji (Wikipedia, 2010)

- Kerajaan : Animalia

- Filum : Chordata
- Kelas : Mammalia
- Bangsa : Rodentia
- Suku : Muridae
- Anak suku : Murinae
- Marga : Mus
- Jenis : *Mus musculus*

2. Karakteristik Hewan Uji

Mencit (*Mus musculus*) adalah anggota Muridae (tikus-tikusan) yang berukuran kecil. Mencit mudah dijumpai di rumah-rumah dan dikenal sebagai hewan pengganggu karena kebiasaannya menggigiti mebel dan barang-barang kecil lainnya, serta bersarang di sudut-sudut lemari. Hewan ini diduga sebagai mamalia terbanyak kedua di dunia, setelah manusia. Mencit sangat mudah menyesuaikan diri dengan perubahan yang dibuat manusia, bahkan jumlahnya yang hidup liar di hutan barangkali lebih sedikit daripada yang tinggal di perkotaan (Ariani, 2008).

Ada lebih 500 galur murni jenis mencit di dunia. Mencit dewasa biasanya memiliki berat antara 25-40 gram dan mempunyai berbagai macam warna, antara lain albino, hitam, coklat, dan abu-abu. Mayoritas mencit laboratorium adalah strain albino yang mempunyai warna bulu putih dan mata merah muda (Ariani, 2008).

Mencit merupakan hewan yang tidak mempunyai kelenjar keringat. Jantung terdiri dari empat ruang dengan dinding atrium yang tipis dan dinding ventrikel yang lebih tebal. Mencit mempunyai karakter lebih aktif daripada malam hari (nocturnal). Beberapa strain mencit antara lain swiss, bulb-C, DDY (Ariani, 2008).

Mencit laboratorium adalah hewan yang masih satu kerabat dengan mencit liar atau mencit rumah. Semua galur mencit laboratorium yang ada merupakan keturunan dari mencit liar sesudah melalui peternakan selektif. Bulu mencit liar berwarna keabu – abuan dan warna perut sedikit lebih pucat, mata berwarna hitam dan kulit berpigmen. Berat badan pada umur empat minggu mencapai 18 – 20 gram, berat dewasa sekitar 30 – 40 gram. Mencit liar termasuk omnivorus, meskipun mencit liar lebih suka suhu lingkungan tinggi tetapi mencit liar dapat hidup terus pada suhu rendah (Wahyudi, 2010).

Data biologis Mencit (Ariani, 2008)

1. Lama hidup : 1-2 tahun, biasa sampai 3 tahun
2. Lama produksi ekonomis : 9 bulan
3. Lama bunting : 19-21 hari
4. Kawin sesudah beranak : 1-24 jam
5. Umur disapih : 21 hari
6. Umur dewasa : 35 hari
7. Umur dikawinkan : 8 minggu (jantan dan betina)
8. Siklus kelamin : poliestrus

9. Siklus estrus : 4-5 hari
10. Lama estrus : 12-14 jam
11. Berat dewasa : 20-40 g jantan; 18-35 g betina
12. Berat lahir : 1,5-1,0 g
13. Jumlah trombosit : $5 - 7 \times 10^{-5} / \text{ml}$

D. Darah

Darah adalah suatu suspensi partikel dalam suatu larutan koloid cair yang mengandung elektrolit. Darah berperan sebagai medium pertukaran antar sel yang terfiksasi dalam tubuh dan lingkungan luar serta memiliki sifat protektif terhadap organisme dan khususnya terhadap darah sendiri.

Darah terdiri dari dua bagian besar yaitu plasma darah yang merupakan bagian darah yang cair dan bagian korpuskuli yang diistilahkan untuk unsur sel darah terdiri dari sel darah merah (eritrosit), beberapa jenis sel darah putih (leukosit) dan fragmen sel yang disebut trombosit. Eritrosit berfungsi sebagai transpor atau pertukaran oksigen (O_2) dan karbondioksida (CO_2), leukosit berfungsi untuk mengatasi infeksi dan trombosit untuk hemoistatis. Sel-sel ini mempunyai umur yang terbatas sehingga diperlukan pembentukan optimal yang konstan untuk mempertahankan jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan jaringan (Price, 2004).

Sumsum tulang adalah tempat yang paling penting sejak usia 6-7 bulan kehidupan janin dan merupakan satu-satunya sumber sel darah baru selama masa anak dan dewasa yang normal (Hoffbrand, 2005).

Pembentukan sel darah disebut hematopoiesis, terjadi dalam sumsum tulang tengkorak, vertebra, pelvis, sternum, iga-iga dan epifisis proksimal tulang-tulang panjang. Apabila kebutuhan meningkat, misalnya pada perdarahan atau penghancuran sel (hemolisis), maka dapat terjadi pembentukan lagi dalam seluruh tulang panjang, seperti yang terjadi pada anak-anak.

Sel induk sumsum dalam keadaan normal terus mengganti sel yang mati dan memberi respons terhadap perubahan akut seperti perdarahan infeksi dengan berdiferensiasi menjadi sel tertentu yang dibutuhkan (Price, 2004).

1. Trombosit

Trombosit bukan merupakan sel, tetapi merupakan fragmen-fragmen sel granular, berbentuk cakram, tidak berinti, bentuknya tampak tidak teratur. Trombosit merupakan unsur selular sumsum tulang terkecil dan penting untuk homeostasis dan koagulasi. Trombosit berasal dari sel induk pluripoten yang tidak terikat (*noncommitted pluripotent stem cell*), yang jika ada permintaan dan dalam keadaan adanya faktor perangsang trombosit (Mk-CSF[faktor perangsang-koloni megakariosit]). Hemostasis dan koagulasi adalah serangkaian kompleks reaksi yang menyebabkan pengendalian perdarahan melalui pembentukan trombosit dan bekuan fibrin pada tempat cedera. Pada

keadaan homeostatik, hemostatik dan koagulasi melindungi individu dari perdarahan masif akibat trauma (Price, 2004).

Trombosit dihasilkan dalam sumsum tulang melalui fragmentasi sitoplasma megakariosit. Tiap megakariosit bertanggung jawab untuk menghasilkan sekitar 4000 trombosit. Interval waktu semenjak diferensiasi sel induk manusia sampai produksi trombosit berkisar sekitar 10 hari (Hoffbrand, 2005).

Trombosit berdiameter 1 sampai 4 μm . Kira-kira sepertiga berada di dalam lien sebagai sumber cadangan dan sisanya berada dalam sirkulasi (Price, 2004). Jumlah trombosit normal adalah sekitar $250 \times 10^9/l$ (rentang $150-400 \times 10^9/l$) dan lama hidup trombosit yang normal adalah 7-10 hari. Hingga sepertiga trombosit keluaran sumsum tulang dapat terperangkap dalam limpa yang normal. Pendarahan yang abnormal bisa terjadi pada $200 \times 10^9/l$ meskipun biasanya gangguan baru timbul jika jumlah trombosit mencapai kurang $100 \times 10^9/l$ (Hoffbrand, 2005).

Granula mengandung serotonin, vasokonstriktor yang kuat, fibrinogen, faktor von Willebrand, faktor penetralisir heparin (Price, 2004). Di bagian dalam trombosit terdapat kalsium, nukleotida terutama adenosin difosfat (ADP) dan adenosin trifosfat (ATP) dan serotonin. Organel spesifik lain meliputi lisosom yang mengandung enzim hidrolitik dan peroksisom yang mengandung katalase (Hoffbrand, 2005).

2. Kelainan Sumsum Tulang Belakang

Kelainan primer sumsum tulang adalah mieloproliferatif yang merupakan polisitemia vera, trombositemia primer, mielofibrosis dan leukemia mieloid kronis. Penyakit ini saling terkait secara klonal karena berasal dari sel batang hematopoietik dalam sumsum tulang, masing-masing bisa berubah menjadi lain. Mieloproliferatif kronis biasanya menyebabkan trombositosis bukan trombositopenia.

Polisitemia (meningkatnya haemoglobin) bisa terjadi secara primer (polisitemia vera, leukosit dan trombosit biasanya meningkat juga). Polisitemia vera biasanya terjadi pada akhir usia paruh baya (50-60 tahun), paling sering ditemukan secara tidak sengaja. Jika sistematik, biasanya gejala yang timbul adalah sumbatan pembuluh darah, arteri atau vena, atau lebih jarang, disertai gout, pruritus atau menemukan splenomegali. Adanya dua kriteria minor (trombositosis, leukositosis neutrofil, splenomegali pada ultrasonografi) bisa menegaskan diagnosis jika tidak ada kedua kriteria mayor. Pada polisitemia vera semua elemen meningkat (Rubenstein, 2005).

Polisitemia bisa pula dalam bentuk sekunder (misalnya akibat peningkatan produksi eritropoietin pada hipoksia atau penyakit ginjal). Pada polisitemia sekunder hanya eritrosit yang meningkat. Trombositopenia sekunder, jika tidak ditemukan secara kebetulan, timbul dengan gejala sumbatan pembuluh darah kecil. Ditemukan dengan jumlah trombosit di atas $600 \times 10^9/L$ (Rubenstein, 2005).

3. Trombositemia

Trombosit yang terlalu banyak atau terlalu sedikit mengganggu koagulasi darah. Keadaan yang ditandai dengan trombosit yang berlebihan dinamakan trombositemia. Umumnya didefinisikan sebagai peningkatan jumlah trombosit lebih dari $400.000 / \text{mm}^3$.

Trombositemia primer terjadi poliferasi abnormal megakariosit dengan jumlah trombosit melebihi satu juta. Trombositopenia primer juga ditemukan dengan gangguan mieloproliferatif, seperti polisitemia vera atau leukemia granulostik kronis (Price, 2004).

Trombositemia sekunder terjadi sebagai akibat adanya penyebab lain, baik secara sementara setelah stress atau olahraga dengan pelepasan trombosit dari sumber cadangan (dari lien) atau dapat menyertai keadaan meningkatnya permintaan sumsum tulang seperti pendarahan, anemia hemolitik atau defisiensi besi. Peningkatan tajam jumlah trombosit terjadi pada pasien pasien yang liennya sudah dibuang secara pembedahan. Karena lien merupakan tempat primer penyimpana dan penghancuran trombosit, maka pengangkatan (splenektomi) tanpa disertai pengurangan produksi di dalam sum-sum tulang akan mengakibatkan trombositosis, yang sering melebihi $1 \text{ juta}/\text{mm}^3$. Pengobatan trombositosis sekunder atau reaktif umumnya tidak diindikasikan (Price, 2004).

4. Trombositopenia

Trombositopenia didefinisikan sebagai jumlah trombosit yang sangat rendah dari batas normal, kurang dari $150.000 / \text{mm}^3$. (Williams, 2003).

Jumlah trombosit yang rendah ini dapat merupakan akibat berkurangnya produksi (aplasia sumsum tulang, leukemia atau infiltrasi) atau meningkatnya penghancuran trombosit (purpura trombositopenik idiopatik, hipersplenisme dan koagulopati intravascular difus) (Rubenstein, 2005).

Penurunan produksi trombosit, dibuktikan dengan aspirasi dan biopsi sumsum tulang, dijumpai pada segala kondisi yang mengganggu atau menghambat fungsi sumsum tulang. Kondisi ini meliputi anemia aplastik, mielofibrosis (penggantian unsur-unsur sumsum tulang dengan jaringan fibrosa, leukimia akut dan karsinoma merastik lain yang mengganti unsur-unsur sumsum normal). Agen-agen kemoterapeutik terutama bersifat toksik terhadap sumsum tulang, menekan produksi trombosit (Price, 2004).

Trombositopenia dapat terjadi karena beberapa keadaan :

1. Penurunan produksi (megakariositopeni), terjadi bila fungsi sumsum tulang terganggu.
2. Meningkatnya destruksi (megakariositosis), terjadi akibat trombosit yang beredar berhubungan dengan mekanisme imun.
3. Akibat pemakaian yang berlebihan (megakariositosis), misalnya pada DIC (Disseminated Intravascular Coagulation), kebakaran, trauma.

4. Pengenceran trombosit.
5. Dapat terjadi oleh karena transfusi yang dibiarkan dalam waktu singkat dengan memakai darah murni yang disimpan sehingga dapat mengakibatkan kegagalan hemostatik pada resipien (Purwanto, 2009).

Keadaan trombositopenia dengan produksi trombosit normal biasanya disebabkan oleh penghancuran atau penyimpanan yang berlebihan. Segala kondisi yang menyebabkan splenomegali dapat disertai trombositopenia, meliputi keadaan seperti sirosis hati, limfoma, dan penyakit mieloproliferatif. Lien secara normal menyimpan sepertiga trombosit yang dihasilkan, tetapi dengan splenomegali, sumber ini dapat meningkatkan sampai 80 %, dan mengurangi sumber sirkulasi yang tersedia. Trombosit juga dapat dihancurkan oleh produksi antibodi yang diinduksi oleh obat atau oleh autoantibodi. Antibodi-antibodi ini ditemukan pada penyakit-penyakit seperti lupus eritematosus, leukemia limfositik kronis, limfoma tertentu, dan purpura trombositopenik idiopatik (Price, 2004).

Keadaan kekurangan trombosit ini juga terjadi pada pasien demam berdarah. Sumsum tulang yang mengalami depresi mengakibatkan produksi sel darah menurun dan berkualitas rendah. Termasuk turunnya trombosit dan leukosit. Selain itu dinding pembuluh darah bocor, sehingga cairan darah berkurang dan reaksi zat kekebalan tubuh dengan virusnya, menimbulkan

peperangan dalam darah yang beresiko mencetuskan terjadinya syok. Organ hati mungkin mengalami kerusakan (Nadesul, 2007).

Terjadinya syok memunculkan perdarahan. Bila sudah terjadi perdarahan, transfusi darah perlu diberikan. Pada kebocoran darah yang hebat dan trombosit turun terus, perlu diberikan cairan plasma atau mungkin perlu diberikan transfusi trombosit saja (Nadesul, 2007).

Bila pemberian infus belum terlambat, pasien demam berdarah umumnya tertolong. Kematian khusus demam berdarah sering karena terlambat mendapatkan infus, jenis virusnya lebih ganas dan demam berdarah dengan kerusakan hati dan atau ginjal. Pendarahan yang terjadi pada kelenjar adrenal (anak ginjal), beresiko cenderung langsung jatuh ke dalam syok (Nadesul, 2007).

Anemia Aplastik

Merupakan keadaan yang disebabkan berkurangnya sel hematopoetik dalam darah tepi seperti eritrosit, leukosit dan trombosit akibat terhentinya pembentukan sel hemopoetik dalam sumsum tulang. Anemia ini ditandai oleh penurunan eritroid, mieloid dan megakariosit dalam sumsum tulang dengan akibatnya ada pansitopenia pada darah tepi, serta tidak dijumpai ada sistem keganasan hematopoetik atau kanker metastatik yang menekan sumsum tulang (Mansjoer, 2000).

Penyakit ini dapat dibagi menjadi dua golongan besar secara etiologik, yaitu

1. Faktor kongenital merupakan anemia aplastik yang diturunkan.
2. Faktor didapat, sebagian anemia aplastik didapat bersifat idiopatik (Aghe, 2009).

Leukimia Akut

Merupakan suatu keganasan pada alat pembuat sel darah berupa proliferasi patologis sel hemopoetik muda yang ditandai oleh adanya kegagalan sumsum tulang dalam membentuk sel darah normal dan adanya infiltrasi ke jaringan tubuh lain. Suatu keganasan primer sumsum tulang yang berakibat terdesaknya komponen darah abnormal (blastosit), disertai penyebaran ke organ-organ lain (Mansjoer, 2000).

Mielofibrosis

Gambaran mielofibrosis yang utama adalah fibrosis generalisata progresif pada sumsum tulang disertai hemopoiesis di limpa dan hati atau merupakan kelainan mieloproliferatif, yaitu suatu keadaan yang ditandai proliferasi endogen satu atau lebih komponen hemopoetik dalam sumsum tulang dan secara umum di limpa dan hati. Secara klinis, hal ini menyebabkan anemia dan hepatosplenomegali masif (Hoffbrand, 2005).

Mielofibrosis jarang ditemukan, merupakan suatu kelainan yang dihubungkan dengan adanya timbunan substansi kolagen berlebihan dalam sumsum tulang. Biasanya terjadi pada anak-anak. Kurang dari 100 kasus telah dijelaskan dalam literatur medis. Mayoritas dari kasus yang berkembang merupakan sekunder dari penyakit lainnya. Sebagai contohnya, mielofibrosis

biasanya terjadi berhubungan dengan proses keganasan (seperti misalnya leukemia megakariosit akut).

Kelainan ini secara definitif merupakan kelainan stem sel hematopoiesis klonal, dihubungkan dengan *chronic myeloproliferative disorders (CMPD)*, dimana adanya hematopoiesis ekstramedular merupakan gambaran mencolok (Hoffbrand, 2005).

5. Pengobatan

1. Medikamentosa : kombinasi prednison (2-5mg/kgBB/hari peroral) dan testosterone (1-2 mg/kgBB/hari parenteral) memberikan angka mortalitas 40-50%, sedangkan angka ini dengan pemberian kombinasi prednison dengan oksimetolon (1-2 mg/kgBB/hari peoral) adalah 30-40%. Pada pemberian oksimetolon perlu dilakukan pemeriksaan fungsi hati secara berkala. Pengobatan biasanya berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bila terjadi relaps, dosis harus diberikan penuh kembali (Mansjoer, 2000).
2. Pridnison merupakan golongan steroid yang memiliki aktivitas metabolic yang berfungsi memblok respons alergi dan imunologi (Stringer, 2008).
3. Terapi immunoglobulin intravena dosis tinggi dapat cepat meningkatkan hitung trombosit pada sebagian besar pasien. Dosis yang dianjurkan sebesar 400 mg/ kg /hari selama 5 hari atau 1 g/ kg/hari selama 2 hari. Mekanisme kerjanya mungkin berupa hambatan terhadap reseptor Fc pada makrofag atau modifikasi produksi antibody.

4. Obat-obat immunosupresif, misal vinkristin, siklofosamid, azatiopin atau siklosporin secara sendiri atau dalam kombinasi, biasanya dicadangkan untuk pasien-pasien yang tidak berespons baik terhadap steroid dan splenektomi.
5. Pengobatan lain yang dapat mencetuskan remisi adalah danazol (androgen yang dapat menyebabkan virilisasi pada wanita) dan immunoglobulin anti-D
6. Transfusi trombosit. Konsentrat trombosit berguna bagi penderita pendarahan akut yang mengancam jiwa. Khasiatnya hanya akan bertahan beberapa jam (Hoffbrand, 2005).

6. Tinjauan Islam tentang Darah

Penjelasan tentang aliran darah ini sudah tertera dengan jelas dalam al-Quran yang dapat dilihat dalam Q.S. al-Alaq (96) : 2 yang berbunyi sebagai berikut :



Terjemahnya :

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (Q.S. 96 : 2)

Ayat ini menjelaskan kata “alaq” sebagai darah yang merupakan bahan yang siap menjadi embrio, dimana sebelumnya darah ini terbentuk dari air mani dan telur perempuan. Setelah pembuahan, kedua sumber ini akan mengalami perubahan sampai pembentukan “alaq” dalam rahim terjadi. Segumpal darah dalam rahim ibu ini merupakan dasar bentuk jantung dan jaringan pembuluh darah. Dasar

jantung dan jaringan pembuluh darah penuh dengan darah, namun dalam tahap ini belum dijelaskan adanya detakan jantung.

Ayat lain yang menjelaskan tentang darah ini terdapat dalam Q.S. at-Thaariq (86) : 5-8 sebagai berikut

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٦﴾ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٧﴾ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ
وَالْتَّرَائِبِ ﴿٨﴾ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٩﴾

Terjemahnya :

Maka hendaklah manusia memperhatikan dari Apakah Dia diciptakan. (6) Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. (7) yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. (8) Sesungguhnya Allah benar-benar Kuasa untuk mengembalikannya (hidup sesudah mati). (Q.S. 86 : 5-8)

Ayat ini dijelaskan oleh Bait seorang ahli sains, bahwa air yang dimaksud adalah cairan yang menyembur dari rongga tertutup yaitu hati, rongga yang dibentuk oleh tulang rusuk dan tulang belakang . Darah bersikulasi dan memberi kehidupan kepada embrio setelah jantung ikut berdetak. Ketika darah berhenti memancar maka kehidupan akan berhenti. Darah mulai memancar 4 minggu setelah pembuahan. Darah akan terus mengalir sampai organ embrio berbentuk manusia yang jelas pada akhir minggu ke 8.

Tanpa darah yang mengalir, embrio tidak akan berkembang menjadi bayi dan mampu melihat dunia dan terus hidup didalamnya. Bahkan setelah kelahiran, darah terus mengalir sampai bayi berkembang menjadi manusia dewasa. Darah yang mengalir ini mendukung setiap kerja sel tubuh dengan teratur dan memasok

oksigen dan makanan serta metabolismenya. Tanpa darah, kehidupan tidak akan ada.

Sesungguhnya semua ilmu sains yang diterapkan sekarang sampai teknologi yang paling berkembang sudah dijelaskan dalam al-Qur'an, akan tetapi manusia masih kurang menyadari dan mempelajari al-Qur'an sehingga seharusnya kaum muslim pada khususnya bisa lebih maju daripada kaum yahudi yang justru sekarang kaum yahudi lebih banyak menguasai perkembangan zaman dan menguasai teknologi dunia.

Hal ini sudah diperingatkan oleh Allah swt. dalam firmanNya Q.S. al-Baqarah (2) : 171 sebagai berikut :

صُمُّوا بِكُمْ عُمَىٰ فَهَمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾

Terjemahnya :

Mereka tuli, bisu dan buta, Maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti.(Q.S 2 : 171)

Tidak akan ada lagi keraguan bahwa al-Qur'an kitab Allah swt. dan sudah menjelaskan semuanya kepada umat manusia melalui ayat-ayatnya. Sungguh beruntungnya umat manusia yang mampu berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah tertera dalam al-Qur'an (Aga, 2007).

7. Hitung Darah dan Pemeriksaan Sediaan Apus Darah

Trombositopenia merupakan penyebab lazim dari perdarahan abnormal, sehingga pasien-pasien dengan kecurigaan kelainan darah awalnya harus diperiksa hitung darahnya, termasuk hitung trombosit dan pemeriksaan sediaan apus darah. Selain untuk memastikan adanya trombositopenia, tindakan ini mungkin dapat menemukan penyebabnya, misalnya leukimia akut (Hoffbrand, 2005).

Pemeriksaan retikulosit darah tepi dengan flowcytometer untuk prediksi trombopoiesis merupakan metode non invasive dibanding fungsi sumsum tulang. Flowcytometer tidak tersedia pada semua laboratorium, sehingga dilakukan pemeriksaan retikulosit trombosit pada preparat apus darah.

Sediaan apus darah tepi (*A peripheral blood smear / peripheral blood film*) merupakan slide untuk mikroskop (kaca objek) yang pada salah satu sisinya dilapisi dengan lapisan tipis darah vena yang diwarnai dengan pewarnaan (biasanya Giemsa, Wright) dan diperiksa dengan menggunakan mikroskop.

Sediaan apus yang baik adalah yang ketebalannya cukup dan bergradasi dari kepala (awal) sampai ke ekor (akhir). Zona morfologi sebaiknya paling kurang 2 cm (Ai, 2009).

Gambaran apus darah tepi ada beberapa antara lain, retikulosit (sum-sum tulang aktif) yaitu gambaran untuk hemolisis atau kehilangan darah kronis. Anisositosis (ukuran eritrosit bervariasi) atau poiklositosis (bentuk eritrosit bervariasi) merupakan gambaran untuk defisiensi Fe. Sel target (sel 'topi Meksiko') untuk penyakit talasemia. Pembentukan *rouleau* (eritrosit yang

bertumpuk dan menempel satu sama lain) yaitu gambaran SADT untuk peningkatan LED (periksa adanya mieloma). Sel Burr (membran eritrosit 'keriput' ireguler) merupakan gambaran untuk gagal ginjal maupun kanker (Rubenstein, 2005).


Pemeriksaan hitung jumlah trombosit dalam laboratorium dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung menggunakan metoda Rees Ecker, metoda Brecher Cronkite dan Cell Counter Automatic Metode Rees Ecker. Darah diencerkan dengan larutan BCB (Brilliant Cresyl Blue), sehingga trombosit akan tercatat terang kebiruan. Trombosit dihitung dengan bilik hitung di bawah mikroskop, kemungkinan kesalahan metode Rees Ecker 16-25%. Metode Brecher Cronkite Darah diencerkan dengan larutan amonium oksalat 1% untuk melisiskan sel darah merah, trombosit dihitung pada bilik hitung menggunakan mikroskop fase kontras. Kemungkinan kesalahan Brecher Cronkite 8-10%. Metode Cell Counter Automatic. Metode ini menggunakan prinsip flow cytometri. Prinsip tersebut memungkinkan sel-sel masuk flow chamber untuk dicampur dengan diluent kemudian dialirkan melalui aperture yang berukuran kecil yang memungkinkan sel lewat satu per satu. Aliran yang keluar dilewatkan medan listrik untuk kemudian sel dipisah-pisahkan sesuai muatannya. Teknik dasar pengukuran sel dalam flow cytometri ialah impedansi listrik (electrical impedance) dan pendar cahaya (light scattering). Teknik impedansi berdasar pengukuran besarnya resistensi elektronik antara dua elektrode. Teknik pendar cahaya akan menghamburkan, memantulkan atau membiaskan cahaya yang berfokus pada sel,

oleh karena tiap sel memiliki granula dan indek bias berbeda maka akan menghasilkan pendar cahaya berbeda dan dapat teridentifikasi. Pada cell counter automatic masih terdapat kelemahan apabila ada trombosit yang bergerombol, trombosit besar (giant) serta adanya kotoran, pecahan eritrosit, pecahan leukosit sehingga cross check menggunakan sediaan apus darat tepi (SADT) sangat berarti. Sedangkan hitung trombosit secara tidak langsung menggunakan metode Fonio dan melakukan estimasi metode Barbara Brown. Metode ini dilakukan dengan menggunakan darah kapiler pada ujung jari dicampur dengan larutan magnesium sulfat 14% kemudian dibuat SADT dan dilakukan pengecatan giemsa. Jumlah trombosit dihitung dalam 1000 eritrosit, jumlah mutlak trombosit dapat diperhitungkan dari jumlah mutlak eritrosit. Cara ini lebih kasar daripada cara langsung (Purwanto, 2009).

Penghitungan trombosit lebih sulit dilakukan daripada eritrosit maupun leukosit karena ukurannya yang kecil dan cenderung menempel dengan benda lain atau beragregasi (Kumala, 2010).

E. Uraian Anilin (Wikipedia, 2010)

Nama resmi	: Phenylamine
Nama lain	: anilin, aminobenzen, benzenamine
Rumus kimia	: C_6H_7N
BM	: 93,13 g/mol



Pemerian : cairan berwarna coklat kemerahan, berbau, mudah terbakar

Kelarutan : dalam air 3,6 g/100 ml pada suhu 20°C, larut dalam metanol dengan 10,97 M

Efek samping : mengkatalisis pembentukan methemoglobin, bersifat toksik pada limfa

Penyimpanan : dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya.

F. Tinjauan Islam tentang Penggunaan Obat-obatan dari Bahan Alam

Kebutuhan akan obat-obatan di era modern seperti sekarang ini sangat besar seiring dengan munculnya berbagai macam penyakit di kalangan masyarakat. Di era modern ini, semakin banyak penyakit yang bermunculan akan tetapi penyakit itu juga masih bisa diobati mulai dari obat-obatan herbal sampai penanganan dengan operasi. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw. (Al-Ju'aisin, 2001).

Diriwayatkan oleh Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah saw. bersabda :

Artinya :

Allah yang menurunkan penyakit, dan Dia juga yang menurunkan obatnya.”(HR. Bukhari).

Sejak Allah swt. menciptakan Adam, manusia berusaha mengetahui jenis tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan serta cara pengobatan terhadap berbagai penyakit yang menimpa manusia. Sejak itu, dimulainya peperangan antara kehidupan dan perkara alami melawan berbagai penyakit dan kondisi peperangan tersebut begitu pahit dan buruk di setiap kasus.

Manusia telah mampu berpikir dan mengkaji objek alam natural di sekitarnya dan mampu menemukan keajaiban ciptaan Allah swt. sejak dulu, sebagai upaya menemukan makanan dan obat-obatan serta pakaian yang digunakan mereka. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Luqman (31) : 20 sebagai berikut :

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ
ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Terjemahnya :

Tidakkah kamu perhatikan Sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. dan di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. (Q.S. 31 ; 20)

Obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan dapat berasal dari bahan sintetik maupun dari bahan alam. Dewasa ini bahan alam khususnya tumbuhan telah banyak diteliti oleh para ahli untuk dikembangkan menjadi suatu bahan obat,

mengingat bahwa negara kita kaya akan berbagai jenis tumbuhan yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, salah satu diantaranya adalah dalam pengobatan yang biasa dikenal dengan obat tradisional (Abdushshamad, 2002).

Ayat lain dalam surah yang sama, Allah berfirman dalam Q.S. Luqman (31) : 10 sebagai berikut :

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۚ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوْسِيًّا أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا
 مِن كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

Terjemahnya :

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.(Q.S. 31 : 10)

Ayat ini membuktikan bahwa Allah swt. menciptakan tumbuh-tumbuhan itu bukan sebagai sesuatu yang sia-sia dan dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup.

Islam mengajarkan individu dan masyarakat bagaimana hidup secara fisik, mental dan kehidupan moral yang tegak. Sistem hukum islam, berasal dari al-Qur'an dan sunnah (tradisi nabi), bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan akan memberikan dampak positif pada individu baik dari segi fisik, mental maupun pengembangan spiritual.

Pada tingkat fisik, al-Qur'an dan sunnah mendorong makan sehat dan pada saat yang sama melarang semua zat yang dapat menimbulkan penyakit serta

segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit, seperti minuman keras, obat-obatan, dan sebagainya. Buah-buahan dan sayuran, yogurt, susu unta, madu alami, biji hitam, dan sejenisnya sangat ditekankan untuk kualitas gizi dan manfaat kesehatan. Al-Qur'an juga membahas berbagai penyakit, khususnya jantung, yang sering mengakibatkan langsung atau tidak langsung penyakit fisik dan mental, yang menyebutkan kebutaan, ketulian, ketimpangan, lepra, serta gangguan mental, termasuk psikosis, dan penyakit neurotik, seperti kesedihan dan kecemasan. Dan dalam al-Qur'an sendiri menyebutkan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Tetapi fokus utama adalah pada penyakit moral dan etika. Al-Qur'an itu sendiri disebut sebagai sebuah buku tentang penyembuhan.

Perkembangan seluruh disiplin dikenal sebagai *al-Tibb al-Nabawi* (Obat Nabi). Imam Bukhari, kolektor yang paling otentik dari perkataan kenabian, meriwayatkan 129 *hadis* langsung berhubungan dengan obat-obatan dan mencurahkan dua buku untuk obat-obatan, seperti "Tidak ada penyakit yang Allah telah ciptakan, kecuali Dia juga telah menciptakan pengobatannya" memberikan dorongan yang kuat untuk sarjana Muslim untuk melakukan investigasi medis. Dari abad kesembilan sampai abad ketiga belas Masehi, para sarjana Muslim memberikan kontribusi banyak untuk lapangan.

Selain menjadi praktisi medis, para ahli ini memiliki pengetahuan ensiklopedis teologi, hukum, dan filsafat. Sistem medis tradisional Islam yang berkembang pada periode klasik mengandung campuran unsur spiritual dan fisik, termasuk penggunaan bahan alami dan doa tertentu untuk penyembuhan dan

pengobatan. Hal ini termasuk tindakan preventif, kuratif obat, penyembuhan mental, operasi, dan yang paling penting, obat rohani baik bagi tubuh dan jiwa. Prestasi ilmiah dan kedokteran yang dilakukan selama periode Islam klasik memiliki pengaruh signifikan pada pembentukan dan pengembangan obat modern di Eropa.

Praktisi medis dan pasien harus mengetahui batas-batas kemampuannya masing-masing. Dari sudut pandang Islam, hidup dan mati pada akhirnya berasal dari Allah. Tidak ada manusia yang bisa memberikan kehidupan atau memanggil kematian. Dengan demikian, tenaga medis tidak memiliki hak istimewa untuk mengatakan hal pasti tentang prognosis masa depan. Sebaliknya, mereka berkewajiban untuk membantu pasien dengan kemampuan terbaik mereka dan menyerahkan sisanya kepada Allah swt. (Yousif, 2002). Begitupun juga jika kita dalam posisi sebagai seorang pasien, seorang hamba wajib memasrahkan dirinya, takut, berharap dan berkeinginan hanya ditujukan kepada Allah swt. saja. Rasulullah saw. pernah mengucapkan dalam doanya antara lain :

Artinya :

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan ridha-Mu dari murka-Mu, dengan pemeliharaan-Mu dari siksa-Mu. Dan aku berlindung dengan-Mu dari-Mu. (HR. Muslim dan Abu Dawud)

Artinya :

Tak ada tempat selamat dari Dzat-Mu kecuali kepada Dzat-Mu. (HR. Muslim)

Doa-doa ini merupakan doa yang seharusnya kita panjatkan sebagai upaya ikhtiar kita dan tanda berserah diri kita sebagai manusia, makhluk yang tiada berdaya tanpa izin dan kekuatan dariNya (Nurma, 2010).

Akibat yang membutuhkan sebab adalah kesembuhan. Kesembuhan datang dengan sebab berobat, tapi apakah semua yang berobat akan sembuh? Jawabannya tentu tidak karena kesembuhan itu datangnya dari Allah swt., bukan dari obat atau orang yang mengobati. Obat akan manjur dan mengantarkan pada kesembuhan jika Allah swt. menghendaki. Oleh karena itu, orang yang sakit tidak boleh menyandarkan diri pada obat atau orang yang mengobati tetapi semuanya tetap dikembalikan kepadaNya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Alat dan Bahan yang Digunakan*

1. **Alat-alat yang Digunakan**

Ayakan, Beker gelas 100 dan 250 ml, batang pengaduk, blender kering, cawan petri, gunting, kain putih, kandang mencit, kamar hitung, kanula, kompor, mikro pipet, mikroskop, handskun, objek dan dek glas, panci infusa, pipet eritrosit, pipet tetes, sendok tanduk, spoit 1 dan 5 ml, termometer, toples, timbangan elektrik, timbangan kasar, wadah isolasi, vial.

2. **Bahan-bahan yang Digunakan**

Air suling, Alkohol 70 %, anilin, aquadest steril, Brilliant Cresyl Blue, formaldehid, Giemsa azur, larutan fiksatif, mencit jantan (*Mus musculus*), natrium sitrat, oil emersi, simplisia daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L).

B. *Penyiapan Bahan Penelitian*

1. **Pengambilan Sampel**

Sampel daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L) diperoleh di daerah Lajoa, Kelurahan Jennae, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Daun herba diambil pada saat tanaman sedang berumbi. Daun yang diambil adalah daun yang tidak tua dan yang tidak terlalu muda. Dipilih daun yang masih berwarna hijau segar, tidak memiliki warna berbeda misalnya warna kuning atau yang ditumbuhi jamur.

2. Pengolahan Simplisia

Daun yang telah diambil dibersihkan terlebih dahulu dengan air yang mengalir hingga bersih dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung kemudian dipotong kecil-kecil.

Daun yang sudah mengering, dihaluskan dengan alat blender kemudian diayak dengan ayakan tepung untuk menyeragamkan ukuran serbuknya. Serbuk yang tersisa di ayakan, dihaluskan lagi kemudian disimpan dalam toples untuk menjaga kontaminasi dan keamanan simplisia.

3. Pembuatan Infusa

Dibuat infusa dalam 3 konsentrasi, konsentrasi 0,25% dengan menimbang 0,25 g kemudian ditambahkan dengan air suling sebanyak 2 kali bobot sampel untuk membasahi sampel, didiamkan selama beberapa menit kemudian dicukupkan 100 ml air suling, dimasukkan dalam panci infusa. Dilakukan pembasahan sampel sebelum dibuat infusa. Begitu pula untuk konsentrasi 0,5 % dengan menimbang simplisia 0,5 g kemudian ditambahkan dengan 100 ml air suling serta 1 % dengan menimbang 1 g simplisia kemudian ditambahkan dengan 100 ml air suling. Dibuat infusa, dengan melakukan pemanasan pada suhu 90°C dan dipertahankan selama 15 menit, setelah itu barulah disaring dengan kain putih. Dimasukkan dalam Beker gelas yang berbeda kemudian masing-masing konsentrasi infusa diberikan kepada kelompok uji mencit yang telah ditentukan sebelumnya. Pengambilan darah untuk pemeriksaan kedua setelah pemberian infusa sekitar 12 jam. Pemberian infusa secara oral selama 2 hari berturut-turut

untuk melihat pada hari keberapa infusa daun ubi jalar ini dapat berefek pada mencit.

4. Penyiapan Hewan Coba

Dipilih mencit jantan (*Mus musculus*) jenis mencit liar dengan berat rata-rata 25-30 gram. Dilakukan pengadaptasian selama kurang lebih 2 minggu. Pada tahap ini dilakukan pengamatan umum dengan penimbangan berat setiap hari, mencit yang sakit dipisahkan dan hanya digunakan mencit yang masih sehat.

C. Pelaksanaan percobaan

1. Pembagian Kelompok Mencit

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan 18 ekor mencit yang dibagi secara acak ke dalam 6 kelompok. Setiap kelompok menggunakan 3 ekor mencit.

Skema percobaan sebagai berikut :

1. Kontrol normal, mencit dalam keadaan normal tidak diberi perlakuan apapun.
2. Kontrol perlakuan, mencit dibuat anemia tanpa diberi infusa daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L).
3. Kontrol infusa, mencit diberi infusa daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L) dosis 1 %.
4. Kelompok uji, mencit dibuat anemia kemudian diberi infusa daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L) dosis 0,25 %.

5. Kelompok uji, mencit dibuat anemia kemudian diberi infusa daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L) dosis 0,5 %.
6. Kelompok uji, mencit dibuat anemia kemudian diberi infusa daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L) dosis 1 %.

2. Pengambilan Darah Mencit

Disiapkan objek gelas sebelum dilakukan pengambilan darah. Darah diambil dari ekor mencit, mencit dimasukkan ke dalam wadah isolasi sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan adanya pergerakan dari mencit. Ekor tikus dibersihkan dengan kapas yang sudah dibasahi dengan air hangat. Selain dengan tujuan membersihkan, berfungsi juga untuk merangsang kelancaran aliran darah kemudian dibersihkan lagi dengan alkohol. Ekor tikus digunting tidak lebih 1 cm atau berkisar 0,5 cm dari ujung. Darah diambil dengan pipet eritrosit untuk penghitungan jumlah trombosit dan darah diteteskan di atas objek gelas kemudian diratakan dengan dek gelas untuk pengamatan sediaan apus darah tepi, pengambilan darah dilakukan sebelum dan sesudah penyuntikan anilin 0,05ml/kg BB. Pengambilan darah sesudah penyuntikan anilin dilakukan pada hari ke-0, hari ke-1 dan hari ke-2.

3. Penyuntikan Anilin 0,05 ml/kg BB

Sebelumnya anilin yang dibuat adalah anilin 10%. Sebanyak 1 ml anilin dilarutkan dengan 10 ml aquadest mendidih, lalu diaduk. Pembuatan anilin sesaat sebelum penyuntikan kepada mencit. Anilin yang digunakan harus dibuat segar

(recentus paratus). Anilin yang sudah dibuat tidak boleh dipakai lagi pada hari lain.

Mencit dimasukkan kedalam kandang isolasi kemudian ekornya dibersihkan dengan air hangat agar pembuluh darah venanya terlihat. Setelah terlihat, pada lokasi penyuntikan diberi alkohol 70% untuk mencegah infeksi, lalu disuntikkan anilin.

D. Penghitungan dan Pemeriksaan Trombosit

1. Penyiapan Cat

Cat dibuat dari larutan Giemsa azur dan aquadest steril dengan perbandingan 1 : 3. Dibuat sesuai kebutuhan.

Larutan Rees Ecker dibuat dengan komposisi sebagai berikut, natrium sitrat 3,8 g; formaldehid 40% 2 ml; Brilliant Cresyl Blue 30 mg; aquadest ad 100 ml. Harus disaring sebelum dipakai.

2. Pelaksanaan Uji

Darah diambil dengan pipet eritrosit sebanyak 50 μ l kemudian diencerkan dengan larutan Rees Ecker sekitar 10,1 ml (pengenceran 200x). Mulai saat ini trombosit harus selesai dihitung dalam waktu 30 menit, agar tidak terjadi disintegrasi sel-sel trombosit. Pipet dikocok 3-5 menit kemudian kamar hitung dibersihkan, disiapkan cawan petri bagian dalam, dasar dan tutupnya ditemplei kapas yang ukurannya sama dan sebelumnya telah dibasahi air. Setelah pipet tersebut dikocok, dibuang 4 tetes pertama dan tetesan ke lima diisikan ke dalam

kamar hitung. Dimasukkan kamar hitung tersebut ke dalam cawan petri yang telah disiapkan tadi. Biarkan selama 15 menit, agar trombosit mengendap dan tidak terjadi penguapan. Kamar hitung diletakkan di bawah mikroskop, Kondensor diturunkan atau diafragma dikecilkan dan posisi meja mikroskop dalam keadaan datar. Kamar hitung diletakkan dibawah lensa objektif. Perbesaran yang digunakan adalah 10x untuk melihat kamar hitung, kamar hitung yang digunakan untuk melihat sel trombosit adalah kamar hitung yang ditengah-tengah (25 bidang) dan untuk menghitung jumlah sel trombosit digunakan perbesaran 40x. Dihitung semua sel trombosit pada 25 bidang tersebut. Diperlukan pengamatan yang cukup teliti untuk menghitung jumlah trombosit karena trombosit biasanya tampak bergerombol. Hasil yang didapatkan dikalikan 2000, didapatkan jumlah sel trombosit per mL darah. Trombosit tampak refraktif dan mengkilat berwarna biru muda/nila, lebih kecil dari eritrosit serta bentuk bulat, lonjong atau tersebar atau bergerombol.

Pemeriksaan berikutnya darah menciit ditetaskan diatas objek gelas kemudian diratakan dengan dek gelas. Dilakukan pemeriksaan sediaan apusan darah tepi sebagai pemeriksaan ulang atau pemeriksaan semi kuantitatif tentang jumlah trombosit dan untuk mengamati morfologi trombosit. Darah yang sudah diratakan diatas objek gelas dikeringkan kemudian ditetesi dengan larutan fiksatif untuk mencegah tidak pecahnya sel darah. Didiamkan beberapa menit sampai mengering setelah kering (tidak ada lagi genangan air), digenangi dengan cat Giemsa yang sudah dibuat sebelumnya kurang lebih selama 20 menit kemudian

dibersihkan dengan air mengalir dan ditunggu sampai air yang digunakan mencuci ini kering. Didiamkan dalam keadaan miring agar air yang ada cepat menetes dan mengering. Sediaan apusan ditetesi dengan oil emersi kemudian diamati bentuk morfologinya secara lebih jelas dibawah mikroskop.

E. Pengolahan Data

Perhitungan jumlah trombosit sebagai berikut :

_____ x faktor pengenceran

Data dikumpulkan dari hasil perhitungan jumlah trombosit total selama 3 hari pengamatan atau dapat digunakan rumus lain untuk menghitung jumlah trombosit dengan rumus sebagai berikut :

Jumlah sel trombosit yang dihitung 25 bidang besar sama dengan N maka :

$$\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 200 = N \times 2000 \quad (\text{Gandasoebrata, 2004})$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Tabel 1 Pengaruh Pemberian Infusa Daun Ubi Jalar (*Ipomea batatas L*) terhadap

Jumlah Trombosit Mencit Putih

Kelompok	No	Pemeriksaan I (per ml)	Pemeriksaan II (per ml)
I	1	594000	-
	2	660000	-
	3	624000	-
II	1	314000	-
	2	302000	-
	3	380000	-
III	1	632000	-
	2	650000	-
	3	602000	-
IV	1	340000	528000
	2	328000	502000
	3	374000	604000
V	1	338000	562000
	2	316000	546000
	3	340000	588000
VI	1	320000	580000
	2	356000	608000
	3	380000	622000

Keterangan

Pemeriksaan I = pemeriksaan hari ke 0 setelah penyuntikan anilin

Pemeriksaan II = pemeriksaan hari ke 0 setelah pemberian infusa

Kelompok	No	Pemeriksaan III (per ml)	Pemeriksaan IV (per ml)
I	1	594000	606000
	2	672000	670000

	3	624000	622000
II	1	456000	620000
	2	440000	586000
	3	526000	656000
III	1	680000	682000
	2	600000	600000
	3	662000	662000
IV	1	628000	628000
	2	608000	620000
	2	642000	668000
V	1	620000	642000
	2	582000	610000
	3	645000	668000
VI	1	600000	608000
	2	644000	662000
	3	700000	700000

Keterangan :

Pemeriksaan III = pemeriksaan hari ke 1 setelah pemberian infusa

Pemeriksaan IV = pemeriksaan hari ke 2 setelah pemberian infusa

Kadar Rata-rata Trombosit

Hasil perhitungan kadar rata-rata trombosit untuk masing-masing kelompok pada pemeriksaan terakhir (IV) adalah :

Kelompok I : $6,33 \times 10^5$ /ml

Kelompok II : $6,21 \times 10^5$ /ml

Kelompok III : $6,48 \times 10^5$ /ml

Kelompok IV : $6,39 \times 10^5$ /ml

Kelompok V : $6,40 \times 10^5$ /ml

Kelompok VI : $6,57 \times 10^5$ /ml

B. Pembahasan

Sampel daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L) yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari desa Cacaleppeng kecamatan Liliriaja kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Ubi jalar yang digunakan di sini adalah ubi jalar merah karena di lokasi pengambilan jenis ubi ini yang paling banyak. Menurut beberapa data tentang ubi jalar, jenis ubi jalar merah yang mempunyai aktivitas peningkat trombosit walaupun ada beberapa data yang menyebutkan ubi jalar ungu memiliki aktivitas yang sama.

Daun ubi yang sudah diambil, terlebih dahulu dipisahkan dari ranting atau batangnya kemudian dikeringkan untuk mempermudah dalam menghaluskan simplisia. Simplisia yang dihaluskan ini dimaksudkan untuk memperbesar luas permukaan sehingga kontak antara cairan penyari dan sampel lebih besar yang akan memudahkan proses penyarian komponen kimia di dalam sampel. Pengekstraksian sampel menggunakan metode infusa. Penggunaan infusa dikarenakan adanya beberapa data empiris dari warga yang berada di beberapa daerah yang berbeda yang telah menggunakan daun ubi jalar ini sebagai ramuan peningkat trombosit pada pasien yang mengidap demam berdarah dengan menggunakan air rebusan dari daun ubi jalar yang prinsipnya hampir sama dengan infusa. Infusa adalah metode sederhana yang digunakan untuk menarik zat aktif dari tanaman dengan melakukan pemanasan selama kurang lebih 15 menit dengan suhu 90° C. Metode ini digunakan untuk melindungi zat aktif yang terdapat dalam tumbuhan sebaik mungkin agar tetap baik dan tidak rusak dengan pemanasan. Oleh karena itu suhu yang digunakan hanya

sampai 90° C dan suhu ini tetap dipertahankan dalam waktu yang cukup singkat kurang lebih 15 menit. Infusa yang dibuat ada 3 konsentrasi antara lain, 0,25 %, 0,5 %, dan 1 %. Infusa yang digunakan selalu dibuat segar (*recentus paratus*) setiap hari selama masa pengamatan.

Cairan infusa yang dibuat ada 3 konsentrasi, yang diberikan pada 4 kelompok mencit yang berbeda. Satu konsentrasi yaitu 1 % digunakan sebagai kontrol infusa dan diberikan pada mencit kelompok uji. Mencit yang digunakan diadaptasikan terlebih dahulu selama 2 minggu untuk penyesuaian diri dengan lingkungan baru, agar semua mencit dalam keadaan yang sama. Selain itu, pengadaptasian ini bertujuan untuk memilih mencit yang pantas untuk digunakan dalam penelitian ini, yaitu mencit yang sehat.

Hewan uji yang digunakan pada penelitian ini adalah mencit jantan. Tujuannya adalah untuk menyeragamkan hewan uji dalam penelitian serta karena sifat anatomi dan fisiologi mencit hampir sama dengan manusia. Rata-rata berat badan mencit jantan lebih berat dibanding mencit putih sehingga lebih memudahkan dalam pengambilan darah yang merupakan komponen utama yang dibutuhkan pada penelitian ini. Selain itu, mudah diperoleh, terjangkau dengan harga murah serta mudah ditangani.

Mencit dibuat anemia dengan menggunakan anilin dosis 0,05 ml/kg BB. Melalui uji pendahuluan diketahui bahwa mencit yang dibuat anemia dengan penyuntikan dosis tersebut akan kembali ke keadaan normal setelah 3 hari.

Pemberian anilin dapat mulai mengakibatkan anemia 5-6 jam setelah pemberian. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anilin sebagai penurun trombosit adalah efektif.

Mencit kelompok I merupakan kontrol normal, mencit dalam keadaan normal, tidak dibuat anemia maupun diberi cairan infusa yang tetap dilakukan pengukuran yang sama untuk kelompok II, III, IV, V dan VI. Mencit kelompok II merupakan mencit kontrol anemia, mencit dibuat anemia tanpa diberi infusa untuk mengamati pemulihan jumlah trombosit tanpa adanya pemberian obat atau zat yang dapat memulihkan jumlah trombosit. Mencit kelompok III, mencit yang tidak dibuat anemia tapi diberi infusa 1 % sebagai kontrol infusa. Mencit kelompok IV, disuntikkan anilin 0,05 ml/kg BB secara intravena dan diberi infusa dengan konsentrasi 0,25%. Mencit kelompok V, kelompok uji infusa 0,5%, mencit diberi infusa konsentrasi 0,5%. Mencit kelompok VI, kelompok uji infusa 1 %, mencit diberi infusa konsentrasi 1%. Pemeriksaan trombosit dilakukan 4 kali. Pemeriksaan pertama dilakukan setelah 5 jam mencit dibuat anemia dan sebelum diberikan infusa. Pemeriksaan kedua dilakukan 12 jam setelah mencit anemia dan setelah pemberian infusa. Pemeriksaan ketiga dilakukan 24 jam setelah pemeriksaan kedua dan pemeriksaan keempat dilakukan 24 jam setelah pemeriksaan ketiga. Pemeriksaan ini dilakukan juga untuk mencit kelompok V dan kelompok VI. Pemeriksaan rutin secara berturut-turut ini berfungsi untuk mengamati perubahan jumlah trombosit yang berarti. Anemia yang terjadi pada mencit karena anilin yang menyebabkan defisiensi enzim glukose-6-fosfat dehidrogenase merupakan enzim yang berfungsi menjaga atau memelihara kadar methemoglobin yaitu hemoglobin yang tidak

mengikat oksigen tetapi mengikat air. Kekurangan enzim ini dapat menyebabkan kadar methemoglobin dalam darah melebihi kadar normalnya yang dapat mengakibatkan anemia aplastik. Jumlah eritrosit, leukosit dan trombosit berkurang dan untuk penelitian ini dimanfaatkan fungsinya yang menurunkan jumlah trombosit.

Pengambilan darah dilakukan pada bagian ekor. Cara memotong ekor mencit diperkenalkan pertama kali oleh Dottl dan Ripke (1936) dan merupakan cara yang paling umum digunakan pada percobaan farmakologi. Pada cara ini ekor mencit dipotong sepanjang 5 mm, pemilihan lokasi pengambilan darah karena darah yang dibutuhkan hanya sedikit. Beda halnya jika darah yang dibutuhkan banyak, dapat dilakukan pengambilan darah pada bagian sinus orbitalis. Pengambilan darah pada bagian ekor dapat dilakukan dengan menggunakan jarum hematokrit atau dapat dilakukan dengan menekan-nekan bagian ekornya sampai darahnya keluar. Darah ditampung dalam tabung aerotube sampai darah berhenti menetes. Volume darah maksimal yang dapat diambil setiap pengambilan 6 - 7 % berat badan mencit dan untuk penelitian ini cukup membutuhkan 50 μ l darah mencit untuk kamar hitung dan cukup 1 tetes untuk pemeriksaan sediaan apus darah tepi.

Pemeriksaan darah pertama yang dilakukan adalah dengan menghitung jumlah trombosit dengan metode kamar hitung. Metode ini merupakan metode penghitungan langsung. Penghitungan trombosit dengan cara Rees-Ecker, yaitu darah diencerkan ke dalam larutan yang mengandung Brilliant Cresyl Blue. Cat ini berfungsi untuk mewarnai sel trombosit menjadi biru muda. Sel trombosit dihitung dengan menggunakan kamar hitung standar dan mikroskop. Di bawah lensa

mikroskop, trombosit terlihat refraktil dan mengkilat dengan warna biru muda dengan ukuran yang lebih kecil dari eritrosit serta berbentuk bulat, lonjong atau koma tampak tersebar tapi ada juga beberapa yang tampak bergerombol. Metode ini dipilih karena faktor kesalahan yang dapat ditimbulkan apabila menggunakan metode ini sekitar 16 – 25 % jika dibandingkan dengan metode penghitungan trombosit secara langsung maupun secara tidak langsung. Kesalahan itu dapat disebabkan karena faktor teknik pengambilan sampel yang biasanya menyebabkan trombosit bergerombol sehingga sulit dihitung, pengenceran yang dilakukan tidak akurat dan penyebaran trombosit yang tidak merata. Pengamatan dan pengambilan darah dilakukan selama 3 hari berturut-turut terutama untuk kelompok mencit yang dibuat anemia.

Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan sediaan apus darah tepi. Tujuan dari pemeriksaan metode ini cenderung untuk melihat bentuk morfologi dari sel darah, terutama trombosit, akan tetapi pemeriksaan ini dapat berfungsi sebagai pemeriksaan semikuantitatif tentang jumlah trombosit sebagai pemeriksaan penyaring. Sediaan apus darah tepi merupakan pembentukan slide untuk mikroskop (kaca objek) yang pada salah satu sisinya dilapisi dengan lapisan tipis darah vena yang diwarnai dengan cat Giemsa kemudian diamati di bawah mikroskop.

Pada pemeriksaaan ini dilakukan juga pengamatan terhadap lamanya darah yang keluar dari ekor mencit untuk berhenti menetes. Waktu ini disebut sebagai waktu pembekuan darah, dimana kita ketahui bahwa trombosit merupakan komponen darah yang berfungsi dalam proses pembekuan darah. Semakin lama

waktu mengalir darah atau waktu pembekuan darah, maka semakin sedikit jumlah trombosit yang terdapat dalam darah. Sebaliknya, semakin cepat waktu pembekuan darah, maka semakin banyak pula jumlah trombosit dalam darah. Hal ini dapat membuktikan, bahwa kondisi mencit anemia sangat berbeda setelah diberikan infusa daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L) dilihat dari waktu pembekuan ini.

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L) dapat berfungsi sebagai peningkat trombosit dilihat dari hasil penghitungan jumlah trombosit, terjadi peningkatan jumlah trombosit yang bermakna dimulai pada konsentrasi 0,25% dan terjadi pula sampai konsentrasi 1 % yang diberikan pada mencit yang sudah mengalami penurunan trombosit sebelumnya. Dilihat dari hasil penurunan trombosit untuk kelompok mencit mulai dari kelompok IV dengan jumlah trombosit awal setelah dibuat anemia $3,47 \times 10^5/\text{ml}$ dan mengalami peningkatan jumlah trombosit setelah 12 jam pemberian infusa konsentrasi 0,25% dengan rata-rata $5,43 \times 10^5/\text{ml}$. Kelompok V dengan rata-rata jumlah trombosit pada pemeriksaan pertama $3,31 \times 10^5/\text{ml}$ dan jumlah rata-rata trombosit pada pemeriksaan kedua adalah $5,65 \times 10^5/\text{ml}$ dan untuk kelompok VI dengan jumlah rata-rata trombosit setelah pemeriksaan pertama adalah $3,52 \times 10^5/\text{ml}$ dan jumlah rata-rata setelah pemeriksaan kedua adalah $6,03 \times 10^5/\text{ml}$. Data ini menunjukkan peningkatan yang terus terjadi untuk setiap tingkat konsentrasi yang lebih tinggi. Selain data jumlah trombosit yang diperoleh sebagai hasil penelitian, diperoleh juga waktu pembekuan darah pada pemeriksaan II (12 jam setelah pemberian infusa) yang dibutuhkan lebih mendekati pembekuan darah rata-rata untuk mencit normal yang berkisar 181,3 detik hampir

sama dengan pemberian infusa konsentrasi 1 % yang mempunyai waktu pembekuan rata-rata 202 detik dibandingkan pembekuan darah dari tiap kelompok mencit yang masih selisih lebih dari 30 detik dengan waktu pembekuan rata-rata darah mencit normal.

Hasil penelitian yang menunjukkan data dari infusa daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L) yang mampu meningkatkan jumlah trombosit sehingga daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L) dapat disimpulkan dan diperkenalkan kepada masyarakat sebagai salah satu obat alternatif untuk penyakit yang berhubungan dengan kekurangan trombosit yang dikenal dengan trombositopenia, terutama dapat digunakan untuk penyakit demam berdarah yang sudah umum mewabah dan dikenal oleh masyarakat, membuktikan kekuasaan Allah swt. yang telah menciptakan segala sesuatunya di dunia ini sebagai sesuatu yang bermanfaat yang dapat digunakan umat manusia. Sesuatu yang biasanya kita hanya anggap sebagai rerumputan ternyata mengandung komponen yang dapat bermanfaat untuk tubuh manusia. Tumbuhan yang selama ini ubinya dimakan ternyata daunnya dapat juga dimanfaatkan sebagai obat. Penelitian akan terus berlanjut terutama dalam dunia medis yang meneliti tentang obat-obatan, tidak akan berhenti untuk membuktikan hadits Rasulullah saw. bahwa setiap penyakit ada obatnya. Dari Jabir bin ‘Abdullah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda :

Artinya :

Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. (HR. Muslim)

Dalam hadith lain yang diriwayatkan Usamah bin Syarik ra., bahwa beliau berkata :

:

:

Artinya :

Aku pernah berada di samping Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?" Beliau menjawab: "Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit." Mereka bertanya: "Penyakit apa itu?" Beliau menjawab: "Penyakit tua." (HR. Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, beliau berkata bahwa hadits ini hasan shahih. Syaikhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i menshahihkan hadits ini dalam kitabnya Al-Jami' Ash-Shahih mimma Laisa fish Shahihain, 4/486)

Hadits-hadits ini cukuplah membuktikan kekuasaan Allah swt. Yang digambarkan oleh Rasulullah pada beberapa kasus. Ada akibat tentu dengan sebab, yang demikian merupakan ketentuan Allah swt. yang berlaku di jagad raya ini. Perkara-perkara ini memang tidak mutlak terjadi, namun mayoritas urusan makhluk tidak lepas dari hukum sebab dan akibat. Hukum ini merupakan hikmah Allah swt. yang lengkap dengan kebaikan. Makhluk mana pun tidak bisa menggapai keinginannya kecuali dengan hukum sebab dan akibat. Di alam nyata ini tidak ada sebab yang sempurna dan bisa melahirkan akibat dengan sendirinya kecuali

kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Menguasai segala sesuatunya di jagad raya ini, termasuk segala sesuatu yang ada dan terjadi pada makhluk ciptaanNya termasuk manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan bahkan makhluk gaibNya.

Obat-obatan dalam bentuk bahan kimia yang mendominasi pasaran mulai tersingkirkan dengan bahan tradisional. Masyarakat mulai menggunakan obat-obatan herbal yang dipercaya dan diyakini lebih ampuh dan aman karena kealamiannya. Manusia-manusia terdahulu juga sudah menggunakanNya. Para dokter pada zaman Rasulullah juga sudah menggunakannya, yang berkesimpulan bahwa tumbuh-tumbuhan mengandung zat-zat yang bermanfaat yang merupakan karunia, kekuasaan, hikmah dan ketentuan Allah swt., tumbuh-tumbuhan ini berfungsi tidak hanya pada saat sakit tetapi pada saat sehat juga. Begitu banyak yang dapat kita pelajari di dunia ini, Semua kembali kepada individu yang hendak mendekatkan diri dengan mempelajari alam ciptaanNya yang merupakan tanda bukti kebesarannya.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Infusa daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L) mempunyai efek meningkatkan trombosit terhadap mencit.
2. Infusa daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L) mulai menunjukkan peningkatan trombosit pada konsentrasi 0,25% dan mengembalikan jumlah trombosit mencit 50 % setelah mengalami anemia dengan infusa daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L) pada konsentrasi 1% serta waktu pembekuan darah rata-rata lebih cepat pada konsentrasi infusa 1% yang hanya berkisar 202 detik yang tidak jauh beda dengan kelompok kontrol yang hanya berkisar 181,3 detik.
3. Terbukti ayat Allah swt. yang menyebutkan bahwa tumbuhan yang diciptakanNya terdapat kebaikan dimana ubi jalar (*Ipomea batatas* L) dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk orang-orang yang sakit dan sebagai makanan berkarbohidrat bagi orang-orang yang sehat serta hadits Rasulullah yang menyebutkan setiap penyakit ada obatnya.

B. Implikasi

1. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap komponen aktif yang terdapat dalam daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L) yang berefek untuk meningkatkan trombosit serta melakukan pengisolasian senyawa.
2. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mencari bentuk sediaan yang sesuai untuk ekstrak daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L) sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat dengan mudah serta dapat dilakukan penelitian tentang waktu pembekuan darah dan waktu pendarahan lebih mendetail untuk mendukung data konkrit tentang aktivitas peningkat trombosit dari daun ubi jalar (*Ipomea batatas* L)
3. Pengkajian tentang ayat al-Qur'an dan hadits dapat dilakukan lebih jauh lagi tentang darah dan tentang pengobatan alami menggunakan herba yang belum digunakan dalam tulisan ini. Serta pengkajian ayat dan hadits yang sudah dipakai dalam tulisan ini namun belum terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2006, Departemen Agama RI. Bandung : CV.Penerbit Diponegoro.
- Abdushshamad, M., 2002. *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Qur'an*. Jakarta : Akbar Media Eka Sarana, 141-142.
- Aghe. *Anemia Aplastik*. <http://one.indoskripsi.com/node/8497> (20 Februari 2009)
- Ai, Yayan. *Sediaan Apus Darah Tepi*. www.BelibisA-17.com (30 juli 2009)
- Ali Ju'asain, A., 2009. *Kado untuk Orang Sakit*. Yogyakarta : Mitra Pustaka. 59-60.
- Ariani. *Mencit*. <http://www.Dreams Blog.htm>. (25 November 2008).
- Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, 2000, *Sediaan Galenik*, Edisi II. D Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Bhakti Husada.
- Felter, H.W, John U.L. *King's American Dispensatory*. <http://www.Henriettesherbal.com> . (1995-2010)
- Gandasoebrata, R. 1992, *Penuntun Laboratorium Klinik*. Bandung : Dian Rakyat, 67-69.
- Hendarwanto, 1998, "Dengue", *Ilmu Penyakit Dalam*, Jilid 1. Jakarta : Balai Penerbit FKUI, 18.
- Hoffbrand, A.V, J.E Pettit, P.A.H. Moss, 2005, *Kapita Selekt Hematologi*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran, 218-219, 221-222, 238.
- Kee, J.L, 2007, *Pedoman Pemeriksaan Laboratorium dan Diagnostik* Edisi 6. Jakarta : EGC, 312-313.
- Kumala, F. *Pemeriksaan Laboratorium Hemostasis dan Hati*. Frasisca's Blog.com. (11 May 2010)
- Litchman, M. et al, 2003, *Williams Manual of Hematology*. North America : McGrawl-Hill, 395.
- Mansjoer, A. Dkk, 2000, *Kapita Selekt Kedokteran* Jilid 2. Jakarta : Media Aesculapius, 494-495.

- Muhammad, M.H.M, 2006, *Mukjizat Kedokteran Nabi*. Jakarta Selatan : Qultummedia, 66-67, 72-73.
- Nadesul, H, 2007, *Cara Mudah Mengalahkan Demam Berdarah*. Jakarta : Kompas, 1, 6-8.
- Nashihah, M. *Dibalik kesan “ndesa” Ubi Jalar*. Jawa Tengah : Harian Suara Merdeka.(07 Mei 2007).
- Neal, M. J, 2006, *At A Glance Medicine*. Jakarta : Erlangga, 41, 43.
- Nurma, *Tata Cara Pengobatan Rasulullah saw.* <http://www.almawaherb.tokobersama.com> (19 Maret 2010)
- Price, S.A, Lorraine M, Wilson, 2002, *Patofisiologi : Konsep Klinis Proses-Proses Penyakit*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran, 247, 292, 298-300.
- Purwanto. *Pemeriksaan Jumlah Trombosit dalam Diagnosis Laboratorium*. <http://www.jayaputra.co.id> (1 januari 2009)
- Redaksi Agromedia, 2008, *Buku Pintar Tanaman Obat*. Jakarta : PT. Agromedia Pustaka, 1-2.
- Rubenstein, D, Wayne D, Bradley J, 2005, *Lecture Notes : Kedokteran Klinik*. Jakarta : Erlangga Medical Series, 352-353, 362, 364-365.
- Sayyid, A.B, 2007, *Pola Makan Rasulullah*. Jakarta : Penerbit almahira, 1-2.
- Sacher, R.A, Mcpherson, R.A, 2004, *Tinjauan Klinis Hasil Pemeriksaan Laboratorium edisi II*. Jakarta : EGC,
- Steenis, V.C.G.G.J., Hoed, G.D., 2006, Bloembergen, S., Eyma, P.J. *Flora*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Stringer, J.L, 2008, *Konsep Dasar Farmakologi*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran, 251.
- Syaik, H, 2009, *Keajaiban Pengobatan Herbal*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 5, 44, 47.
- Virella, G., 2007, *Medical Immunology*, Sixth Edition. Informa Healthcare USA : Inc.New York.

Wahyudi, F. 2009, *Daun Ubi Jalar Untuk Mendongkrak Trombosit*. Jakarta : Trubus Edisi 475, 105, 135.

Yousif, A, 2002, *Islam Kedokteran dan Kesehatan*. Chicago : Centre Park Ridge, 36.



LAMPIRAN

Tabel 2. Waktu pembekuan darah mencit putih pada hari ke0, ke1 dan ke2

Waktu Hari Ke-	Kelompok					
	I	II	III	IV	V	VI
0	179 dtk	293,4 dtk	177 dtk	254,5 dtk	231 dtk	203 dtk
	185 dtk	293 dtk	175 dtk	257 dtk	233 dtk	202,5 dtk
	180 dtk	298,8 dtk	178,8 dtk	250 dtk	230 dtk	200,5 dtk
1	178 dtk	255 dtk	179 dtk	235,2 dtk	212,2 dtk	195 dtk
	185 dtk	250 dtk	175 dtk	238 dtk	214 dtk	190 dtk
	179 dtk	257,5 dtk	180 dtk	229,7 dtk	210 dtk	187 dtk
2	179,2 dtk	208 dtk	178 dtk	189 dtk	183 dtk	180,5 dtk
	185,8 dtk	201 dtk	175 dtk	187 dtk	185 dtk	182 dtk
	179 dtk	212,8 dtk	179 dtk	181,8 dtk	182,1 dtk	179,2 dtk

Penghitungan Rata-Rata Waktu Pembekuan Darah Mencit

Penghitungan waktu pembekuan darah dilakukan pada hari pertama pemeriksaan kedua :

Untuk Kelompok 1, kelompok normal (mencit dalam keadaan normal) adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Untuk Kelompok 2, Kontrol anemia (mencit dibuat anemia tanpa diberi infusa adalah

M A K A S S A R

Untuk kelompok 3, Kontrol infusa (mencit normal diberi infusa konsentrasi 1%) adalah

Untuk Kelompok 4, kelompok uji (mencit diberi infusa 0,25%) adalah

Untuk kelompok 5, kelompok uji (mencit diberi infusa 0,5%) adalah

Untuk kelompok 6, kelompok uji (mencit diberi infusa 1%) adalah

Penghitungan trombosit

Penghitungan trombosit pada hari ke 0 pada pemeriksaan pertama

Jumlah sel trombosit yang dihitung 25 bidang besar sama dengan N maka :

$$\text{—} \times 200 = N \times 2000$$

Untuk kelompok 1, kelompok normal (mencit dalam keadaan normal)

$$N = 297 \quad 297 \times 2000 = 594000$$

$$N = 330 \quad 330 \times 2000 = 660000$$

$$N = 312 \quad 312 \times 2000 = 624000$$

Untuk kelompok 2, kelompok kontrol anemia (mencit dibuat anemia tanpa pemberian infusa)

$$N = 157 \quad 157 \times 2000 = 314000$$

$$N = 151 \quad 151 \times 2000 = 302000$$

$$N = 190 \quad 190 \times 2000 = 380000$$

Untuk kelompok 3, kontrol infusa (mencit diberi infusa tanpa dibuat anemia)

$$N = 316 \quad 316 \times 2000 = 632000$$

$$N = 325 \quad 325 \times 2000 = 650000$$

$$N = 301 \quad 301 \times 2000 = 602000$$

Untuk kelompok 4, kelompok mencit dengan pemberian infusa konsentrasi 0,25%

N = 170	$170 \times 2000 = 340000$
N = 164	$164 \times 2000 = 328000$
N = 187	$187 \times 2000 = 374000$

Untuk kelompok 5, kelompok mencit dengan pemberian infusa konsentrasi 0,5%


N = 169	$169 \times 2000 = 338000$
N = 158	$158 \times 2000 = 316000$
N = 170	$170 \times 2000 = 340000$

Untuk kelompok 6, kelompok mencit dengan pemberian infusa konsentrasi 1 %


N = 160	$160 \times 2000 = 320000$
N = 178	$178 \times 2000 = 356000$
N = 190	$190 \times 2000 = 380000$

Penghitungan dosis untuk sediaan infusa terhadap manusia


Untuk penghitungan dosis manusia diambil dari data empiris masyarakat dikonsumsi 50 g (3-5 lembar) daun ubi jalar dalam 400 ml (2 gelas) air.



Gambar 1. Zona pemeriksaan sediaan apus darah tepi
(Sumber : VCU Department of Pathology, About.com)




Gambar 2. Trombosit dengan pembesaran 40 kali



Gambar 3. Sediaan hapusan untuk mencit anemia pembesaran 40 x

(Sumber : Khaerani)





Gambar 4. Sediaan Hapusan untuk mencit yang sudah diberi infusa pembesaran 40 x
(Sumber : Khaerani)

Gambar 5. Daun ubi jalar







(Sumber : Khaerani)



SKEMA KERJA


Skema kerja Uji Aktivitas Daun Ubi Jalar (*Ipomea batatas* L) terhadap Peningkatan Trombosit Mencit (*Mus musculus*)





Peta Pengambilan Sampel

Lokasi : Kabupaten Soppeng



Ket : Bujung Pangri merupakan nama tempat pengambilan sampel

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Khaerani, lahir pada tanggal 9 Juni 1988 di Cacaleppeng, Kabupaten Soppeng, Makassar. Penulis merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan H.Mukhtar Genda B.A dan Hj.Ruhana. Memulai untuk mengenal dunia pendidikan di taman kanak-kanak Aisiyah Lajoa kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD Inpres 85 Cacaleppeng pada tahun 1994-2000, pada tahun 1998-2000 sambil melewati pendidikan sore di Madrasah Ibtidaiyah Lajoa, Soppeng. Pada tahun 2000, melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Yayasan St.Hadijah Pondok Madinah Makassar selama 3 bulan (1 cawu) kemudian pindah pada cawu ke dua di pesantren DDI cabang Pattojo, kabupaten Soppeng sampai tahun 2003. Melanjutkan pendidikan tingkat atas di SMAN 1 Liliraja, lebih dikenal dengan SMA Cangadi pada tahun 2003-2006 di Cangadi Kabupaten Soppeng. Pada tahun 2006, melanjutkan pendidikan di UIN Alauddin Makassar di jurusan Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan.