

UJI EFEK EKSTRAK ETANOL DAUN CEREMAI (*Phyllanthus acidus* [L.] Skeels) TERHADAP PENURUNAN KADAR GLUKOSA DARAH MENCIT JANTAN (*Mus musculus*)



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
Oleh
MAKASSAR

MASNAH

NIM. 70100106038

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITA ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperolehnya batal demi hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Uji Efek Ekstrak Etanol Daun Ceremai (*Phyllanthus acidus* [L.] Skeels) Terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah Mencit Jantan (*Mus musculus*)” yang disusun oleh Masnah, NIM: 70100106038, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2010 M, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1431 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar, 30 Agustus 2010 M.
20 Ramadhan 1431 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt. ()

Sekretaris : Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, Apt. ()

Penguji I : Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt. ()

Penguji II : Drs. Azman Arsyad, M.Ag. ()

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,

dr. H. M. Furqaan Naiem, M.Sc., Ph.D.
Nip. 19580404 198903 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah swt. atas segala rahmat dan hidayah-NYA yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penghargaan dan rasa terima kasih yang tiada tara penyusun persembahkan kepada kedua orang tua penyusun yakni Ayahanda tercinta H. Jani dan Ibunda terkasih Hj. Sitti Amina yang telah mendoakan dan membesarkan serta menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi. serta kakak dan adik-adik tercinta (Nurmiani, Amd.kes, Hamka dan Anisa) serta keluarga besar penyusun yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak dr. M. Furqaan Naiem M. Sc., Ph. D., selaku Dekan Fakultas Imu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Drs. Stang M.Kes., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Imu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Imu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

4. Bapak Drs. Supardin M. HI., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Ibu Gemy Nastity Handayani S Si. M S Si., Apt., Selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar sekaligus selaku pembimbing pertama
6. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, Apt. selaku pembimbing kedua
7. Bapak/Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasa-jasanya mendapatkan balasan dari Allah swt. Serta seluruh staf Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
8. Seseorang yang sangat berjasa dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Amin,

Wassalam Wr. Wb.



Masnah
NIM: 70100106038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Rumusan masalah</i>	3
C. <i>Tujuan Penelitian.....</i>	3
D. <i>Kegunaan Penelitian.....</i>	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
A. <i>Uraian Tanaman Ceremai</i>	4
B. <i>Uraian Hewan Uji</i>	7
C. <i>Kadar Gula Darah</i>	8
D. <i>Tinjauan Islam Mengenai Daun Ceremai</i>	14
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. <i>Alat dan Bahan</i>	19
B. <i>Penyiapan Sampel Penelitian</i>	19
C. <i>Penyiapan Hewan Uji</i>	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	24
A. <i>Hasil Penelitian</i>	24
B. <i>Pembahasan.....</i>	25
BAB V PENUTUP	30

A. Kesimpulan	30
B. Saran	30

**KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Golongan senyawa hipoglikemik oral beserta mekanisme Kerjanya	13
Tabel 2.	Data kadar glukosa darah mencit dengan pemberian larutan koloidal Na.CMC 10 mg/ml.....	35
Tabel 3.	Data kadar glukosa darah mencit dengan pemberian ekstrak etanol daun ceremai dengan konsentrasi 50 mg/ml.	35
Tabel 4.	Data kadar glukosa darah mencit dengan pemberian ekstrak etanol daun ceremai dengan konsentrasi 100 mg/ml.	35
Tabel 5.	Data kadar glukosa darah mencit dengan pemberian ekstrak etanol daun ceremai dengan konsentrasi 200 mg/ml.	35
Tabel 6.	Data kadar glukosa darah mencit dengan pemberian suspensi Glibenklamid	36
Tabel 7.	Pengaruh pemberian Na.CMC 10 mg/ml, ekstrak etanol daun ceremai 50 mg/ml, 100 mg/ml, 200 mg/ml dan suspensi Glibenklamid terhadap penurunan kadar glukosa darah mencit pada jam ke 1	37
Tabel 8.	Pengaruh pemberian Na.CMC 10 mg/ml, ekstrak etanol daun ceremai 50 mg/ml, 100 mg/ml, 200 mg/ml dan suspensi Glibenklamid terhadap penurunan kadar glukosa darah mencit pada jam ke 2	37
Tabel 9.	Pengaruh pemberian Na.CMC 10 mg/ml, ekstrak etanol daun ceremai 50 mg/ml, 100 mg/ml, 200 mg/ml dan suspensi Glibenklamid terhadap penurunan kadar glukosa darah mencit pada jam ke 3	37
Tabel 10.	Pengaruh pemberian Na.CMC 10 mg/ml, ekstrak etanol daun ceremai 50 mg/ml, 100 mg/ml, 200 mg/ml dan suspensi Glibenklamid terhadap penurunan kadar glukosa darah mencit pada jam ke 4.....	38
Tabel 11.	Pengaruh pemberian Na.CMC 10 mg/ml, ekstrak etanol daun ceremai 50 mg/ml, 100 mg/ml, 200 mg/ml dan suspensi Glibenklamid terhadap penurunan kadar glukosa darah mencit pada jam ke 5.....	38

Tabel 12. Perhitungan RAK antara Na.CMC 10 mg/ml, ekstrak etanol 50 mg/ml, 100 mg/ml, 200 mg/ml, dan suspensi Glibenklamid terhadap penurunan kadar glukosa darah mencit jantan.	39
Tabel 13. Tabel Anava	41
Tabel 14. Tabel Uji Duncan	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema kerja	33
Lampiran 2. Perhitungan dosis Glibenklamid.....	34
Lampiran 3. Data kadar glukosa darah	35
Lampiran 4. Data penurunan kadar glukosa darah.....	37
Lampiran 5. Perhitungan statistik dengan rancangan acak kelompok	39
Lampiran 6. Perhitungan Anava	41
Lampiran 7. Uji Duncan.....	42
Lampiran 8. Gambar	43



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRAK

Nama Penyusun : **MASNAH**
NIM : 70100106038
Judul Skripsi : Uji efek ekstrak etanol daun ceremai (*Phyllanthus acidus* [L.] Skeels) terhadap penurunan kadar glukosa darah mencit jantan (*Mus musculus*).

Telah dilakukan penelitian tentang uji efek ekstrak etanol daun ceremai (*Phyllanthus acidus* [L.] Skeels) terhadap penurunan kadar glukosa darah mencit (*Mus musculus*). Penelitian ini menggunakan 15 ekor mencit jantan yang dibagi menjadi 5 kelompok yang masing-masing terdiri dari 3 ekor. Kelompok I sebagai kontrol menggunakan larutan koloidal Na.CMC 10 mg/30 g BB mencit, kelompok II diberi suspensi ekstrak etanol daun ceremai dengan 50 mg/ 30 g BB mencit, kelompok III diberi suspensi ekstrak etanol daun ceremai dengan dosis 100 mg/ 30 g BB mencit, kelompok IV diberi suspensi ekstrak etanol daun ceremai dengan dosis 200 mg/ 30 g BB mencit dan kelompok V diberi suspensi Glibenklamid 0,02 mg/30 g BB. Sebelum perlakuan, semua mencit dipuaskan selama 8 jam kemudian diinduksi menggunakan larutan glukosa 200 mg/ 30 g BB. Pemberian dilakukan per oral. Pengamatan penurunan kadar glukosa darah mencit dilakukan setiap 1 jam selama 5 jam menggunakan Glukometer. Efek penurunan kadar glukosa darah terbesar pada suspensi Glibenklamid kemudian ekstrak etanol daun ceremai dengan dosis 200 mg/ 30 g BB. Analisis statistik menggunakan rancangan acak kelompok yang dilanjutkan dengan uji Duncan.

ALAUDDIN

Kata kunci : Ceremai, etanol, kadar glukosa darah

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Kadar glukosa darah, atau jumlah glukosa dalam darah merupakan suatu indikator yang dapat menjadi penentu apakah seseorang menderita penyakit tertentu atau tidak. Kadar glukosa darah yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya diabetes mellitus. Meningkatnya kadar glukosa darah dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena pola makan, stress, kegemukan, ataupun karena pengaruh obat-obatan (Hembing, 2004).

Penurunan kadar glukosa dapat dilakukan dengan diet, olahraga, maupun dengan obat-obatan tetapi harga obat-obatan yang mahal, menyebabkan tidak semua orang dapat menjangkaunya. Selain itu pemakaian obat sintesis sering menimbulkan efek samping dan adanya kontra indikasi terhadap penyakit tertentu yang juga diderita oleh orang yang kadar glukosa darahnya tidak normal, sehingga tidak semua orang dapat menggunakannya (Mutschler, 1991).

Pemakaian tumbuh-tumbuhan obat sebagai obat tradisional untuk mencegah dan mengobati penyakit dirasakan semakin meningkat sementara itu pengujian dan penelitian secara ilmiah terhadap obat tradisional masih kurang

sehingga pemakaianya secara medis belum dapat dipertanggung jawabkan untuk menunjang secara ilmiah. Agar mendapat tempat yang lebih luas dalam masyarakat maka perlu diadakan tahap-tahap penelitian terhadap obat tradisional (Wiryowidagdo, 2008).

Daun ceremai merupakan tanaman yang mempunyai banyak khasiat yang mengandung, saponin, tannin, flavonoid dan isoflavon. Flavonoid dan polifenol merupakan sterol tumbuhan yang mampu menurunkan kadar glukosa darah.

Penelitian mengenai daun ceremai (*Phyllanthus acidus* [L.] Skeels) sudah pernah dilakukan dan diperoleh informasi bahwa rebusan daun ceremai mampu menurunkan bobot badan mencit serta menurunkan kadar kolesterol total darah tikus putih jantan (Syaiful, 2004; Rusmiati, 2006).

Sedangkan berdasarkan informasi dari masyarakat di daerah Pinrang dikatakan bahwa daun ceremai mampu menurunkan kadar glukosa darah dengan cara merebus 3 genggam daun ceremai dalam 3 gelas air hingga airnya tersisa 2 gelas, setelah dingin air rebusan tersebut diminum. Tetapi belum pernah dibuktikan secara ilmiah, jadi penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa daun ceremai memang mampu menurunkan kadar glukosa darah.

B. Rumusan Masalah


Pemberian ekstrak etanol daun ceremai (*Phyllanthus acidus* [L.] Skeels) mampu menurunkan kadar glukosa darah pada mencit jantan (*Mus musculus*).

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek ekstrak etanol daun ceremai (*Phyllanthus acidus* [L.] Skeels) terhadap penurunan kadar glukosa darah mencit jantan (*Mus musculus*).

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa daun ceremai (*Phyllanthus acidus* [L.] Skeels) selain sebagai obat sariawan, mual ataupun penurun berat badan ternyata dapat digunakan sebagai penurun kadar glukosa darah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Uraian Tanaman Ceremai*

1. Klasifikasi Tanaman (Hariana, 2004).

Regnum	:	Plantae
Divisio	:	Spermatophyta
Sub divisio	:	Angiospermae
Class	:	Dicotyledonae
Sub class	:	Monoclamydeae
Ordo	:	Euphorbiales
Familia	:	Euphorbiaceae
Genus	:	Phyllanthus
Spesies	:	<i>Phyllanthus acidus</i>

2. Nama lain

Nama Indonesia : Ceremai

Nama ilmiah : *Phyllanthus acidus* (L.) Skeels

Nama daerah : Calamere (Pinrang), Caramele (Makassar), Carameng (Wajo), Ceremoi, (Aceh), Cerme (Jawa), Careme (Madura), Ceremin (Ternate) (Hariana, 2004).

3. Morfologi Tanaman (Yahana, 2006).

Pohon ini berasal dari India, tahan akan kekurangan sampai kelebihan air. Ceremai banyak ditanam orang dihalaman, diladang dan ditempat lain sampai ketinggian 1.000 m dari permukaan laut.

Ciri pohon kecil, tinggi sampai 10 m kadang lebih, percabangan banyak, dan kulit kayu tebal. Daun tunggal, bertangkai pendek, tersusun dalam tangkai membentuk rangkaian seperti daun majemuk. Helai daun bundar telur sampai jorong, ujung runcing, pangkal tumpul sampai bundar, tepi rata, pertulangan menyirip, permukaan licin tidak berambut, panjang 2 cm hingga 7 cm, lebar 1,5 cm hingga 4 cm, warna hijau muda.

Bila tangkai gugur akan meninggalkan bekas yang nyata pada cabang. Perbungaan berupa tandan yang panjang 1,5 cm hingga 12 cm, keluar disepanjang cabang, kelopak bentuk bintang, mahkota merah muda. Terdapat bunga betina dan jantan dalam satu tandan. Buahnya buah batu, bentuknya bulat pipih, berlekuk 6 cm hingga 8 cm, panjang 1,25 cm hingga 1,5 cm, lebar 1,75 cm hingga 2,5 cm, warnanya kuning muda, berbiji 4 hingga 6 , rasanya asam. Biji bulat pipih berwarna cokelat muda.

Daun muda bisa dimakan sebagai sayuran. Buah muda bisa dimasak bersama sayuran untuk menyedapkan masakan karena memberi rasa asam. Buah masak dapat dimakan langsung setelah diremas dengan air garam untuk mengurangi rasa sepat dan asam, dimakan setelah dibuat manisan atau selai. Perbanyak dengan biji atau okulasi.

4. Kandungan Kimia

Daun ceremai mengandung saponin, flavonoid, tannin, dan polifenol. Akar mengandung saponin, asam galus, zat samak, dan zat beracun (toksik). Sedangkan buah mengandung vitamin C (Yahana, 2006).

5. Penggunaan

Daun berkhasiat untuk batuk berdahak, menguruskan badan, mual, sariawan dan dapat menurunkan kadar gula darah (Yahana, 2006).

6. Ekstraksi

Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Ekstraksi menggunakan pelarut didasarkan pada kelarutan komponen terhadap komponen lain dalam campuran. Pelarut polar akan melarutkan solut yang polar dan pelarut non polar akan melarutkan solut yang non polar atau disebut dengan “like dissolve like” (Ditjen POM, 1986).

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simpisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari. Ekstrak kering harus mudah digerus menjadi serbuk (Ditjen POM, 1979).

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik dan memisahkan senyawa yang mempunyai kelarutan berbeda-beda dalam berbagai pelarut komponen kimia yang terdapat dalam bahan alam baik dari tumbuhan, hewan, dan biota laut dengan menggunakan pelarut organik tertentu. Proses ekstraksi ini didasarkan pada kemampuan pelarut organik untuk menembus dinding

sel dan masuk kedalam rongga sel secara osmosis yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dalam pelarut organik dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara di dalam dan di luar sel mengakibatkan terjadinya difusi pelarut organik yang mengandung zat aktif keluar sel. Proses ini berlangsung terus menerus sampai terjadi keseimbangan konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel (Harbone, 1987).

Pembuatan ekstrak dari sampel daun biasanya menggunakan metode maserasi yang merupakan cara penyarian sederhana. Maserasi dilakukan dengan merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Remaserasi adalah cairan penyari dibagi 2 seluruh serbuk simplisia dimerasasi dengan cairan penyari pertama, sesudah diendap tuangkan dan diperas, ampas dimerasasi dengan cairan penyari kedua (Ditjen POM, 1986).

B. Uraian Hewan Uji (Malole, 1989).

1. Taksonomi hewan uji

Kingdom : Animalia

Divisio : Vertebrata

Class : Mamalia

Sub class : Theria

Ordo : Rodentia

Familia : Muridae

Genus : Mus

Spesies : *Mus musculus*


2. Karakteristik hewan uji

- a. Hewan pengerat yang cepat berbiak, mudah dipelihara dalam jumlah banyak, variasi genetik cukup besar
- b. Denyut jantung 600/ menit
- c. Berat lahir 0,5 – 1,5 gram, berat jantan dewasa 20- 40 gram, berat betina dewasa 25- 40 gram.
- d. Luas permukaan tubuh 20 gram adalah 36 cm^2
- e. Kadar normal glukosa darah mencit adalah 62-175 mg/dL.

3. Sifat hewan uji

- a. Mudah ditangani
- b. Penakut
- c. Cenderung berkumpul sesamanya
- d. Bersembunyi
- e. Fotofobik (takut cahaya)
- f. Lebih aktif pada malam hari dari pada siang hari

C. Kadar Gula Darah



1. Defenisi

Gula darah adalah istilah yang mengacu kepada tingkat glukosa di dalam darah. Konsentrasi gula darah, atau tingkat glukosa serum, diatur dengan ketat di dalam tubuh. Glukosa yang dialirkkan melalui darah adalah sumber utama energi untuk sel-sel tubuh.

Kadar glukosa di dalam darah dimonitor oleh pankreas. Bila konsentrasi glukosa menurun, karena dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh maka pankreas melepaskan glukagon kemudian sel-sel ini mengubah glikogen menjadi glukosa. Glukosa dilepaskan ke dalam aliran darah, hingga meningkatkan kadar glukosa darah. Sedangkan apabila kadar glukosa darah meningkat karena perubahan glikogen, atau karena pencernaan makanan maka hormon insulin dilepaskan dari butir-butir sel yang terdapat di dalam pankreas yang menyebabkan hati mengubah lebih banyak glukosa menjadi glikogen yang dapat mengurangi kadar glukosa dalam darah (Ganiswarna, 1995).

2. Faktor penyebab

Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kadar glukosa darah antara lain:

a. Pola makan

Kadar insulin oleh sel β pankreas mempunyai kapasitas maksimum untuk disekresikan. Oleh karena itu, mengonsumsi makanan secara berlebihan yang tidak diimbangi oleh sekresi insulin dalam jumlah memadai dapat menyebabkan kadar glukosa dalam darah meningkat (Hembing, 2004).

b. Stress

Tingkat glukosa darah tergantung pada kegiatan hormon yang diikeluarkan oleh kelenjar adrenal, yaitu adrenalin dan kortikosteroid. Kedua hormon tersebut mengatur kebutuhan ekstra energi tubuh dalam

menghadapi keadaan darurat. Adrenalin akan memacu kenaikan kebutuhan glukosa darah dan kortikosteroid akan menurunkannya kembali. Adrenalin yang dipacu terus menerus akan mengakibatkan kewalahan mengatur kadar glukosa darah yang ideal jadi kadar glukosa darah akan naik secara drastis (Lanny, 2004).

c. Kegemukan (obesitas)

Makin banyak jaringan lemak, jaringan tubuh dan otot akan semakin resisten terhadap kerja insulin terutama bila lemak tubuh terkumpul didaerah sentral atau perut. Lemak ini memblokir kerja insulin sehingga glukosa tidak dapat diangkut kedalam sel dan menumpuk di dalam peredaran darah (Tandra, 2009).

d. Bahan kimia dan obat-obatan

Bahan kimia tertentu dapat mengiritasi pankreas yang menyebabkan radang pankreas. Peradangan pada pankreas dapat menyebabkan pankreas tidak berfungsi secara optimal dalam mensekresikan hormon yang diperlukan untuk metabolisme dalam tubuh, termasuk hormon insulin (Hembing, 2004).

e. Infeksi pada pankreas

Mikroorganisme seperti bakteri dan virus dapat menginfeksi pankreas sehingga menimbulkan radang pankreas. Hal itu menyebabkan sel β pada pankreas tidak bekerja optimal dalam mensekresi insulin (Hembing, 2004).

3. Kadar glukosa darah normal (Tandra, 2008).

Kadar glukosa dalam darah biasanya berfluktuasi, naik turun sepanjang hari dan setiap saat, tergantung pada makanan yang masuk dan aktifitas fisik seseorang.

Apabila puasa semalam, normal glukosa darah adalah 70-110 mg/dL. Pada 2 jam sesudah makan, glukosa darah bisa mencapai 140 mg/dL, menjelang tidur biasanya di bawah 120 mg/dL.

4. Gejala (Bustan, 2007).

a. Banyak kencing

Gejala awalnya berhubungan dengan efek langsung dari kadar glukosa darah yang tinggi. Jika kadar glukosa darah sampai diatas 160-180 mg/dL, maka glukosa akan sampai ke urine. Jika kadarnya lebih tinggi lagi, ginjal akan membuang air tambahan untuk mengencerkan sejumlah besar glukosa yang hilang. Karena ginjal menghasilkan air kemih dalam jumlah yang berlebihan, maka penderita sering berkemih dalam jumlah yang banyak (poliuria).

b. Rasa haus

Akibat poliuri maka penderita merasakan haus yang berlebihan sehingga banyak minum (polidipsia).

c. Banyak makan

Sejumlah besar kalori hilang ke dalam air kemih, penderita mengalami penurunan berat badan. Untuk mengkompensasikan hal ini

penderita seringkali merasakan lapar yang luar biasa sehingga banyak makan (polifagia).

d. Berat badan turun

Awalnya berat badan makin meningkat karena sering makan, tetapi lama kelamaan otot tidak mendapatkan cukup glukosa untuk tumbuh dan mendapatkan energi, maka jaringan otot dan lemak harus di pecah untuk memenuhi kebutuhan energi. Berat badan menjadi turun, meskipun semakin banyak makan.

5. Pemeriksaan

a. Tes kadar gula darah sewaktu

Kadar gula darah yang diuji setiap waktu sepanjang hari tanpa memperhatikan waktu makan terakhir. (Hembing, 2004).

b. Tes kadar gula darah puasa

Tes ini memerlukan puasa 12 sampai 14 jam sebelum darah diambil untuk pemeriksaan (Hembing, 2004).

c. Tes toleransi glukosa

Test ini dilakukan setelah 10 jam puasa kemudian diperiksa kadar glukosa awalnya, lalu minum gula 75 gram, 2 jam kemudian diperiksa lagi kadar glukosa darahnya (Tandra, 2008).

6. Penanganan

- a. Tindakan umum (Tan, 2002).

1) Diet

Makanan perlu dipilih secara seksama, terutama pembatasan lemak total dan lemak jenuh untuk mencapai normalisasi kadar glukosa dan lipid darah.

2) Olahraga

Bila terdapat resistensi insulin, olahraga secara teratur dapat menguranginya. Hasilnya insulin dapat dipergunakan secara lebih baik oleh sel tubuh.

3) Berhenti merokok

Nikotin dapat mempengaruhi secara buruk penyerapan glukosa oleh sel.

- b. Pengobatan

Beberapa golongan senyawa hipoglikemik oral beserta mekanisme kerjanya

Tabel. 1. Golongan senyawa hipoglikemik oral

(Ganiswarna, 1995).

Golongan	Contoh senyawa	Mekanisme Kerja
Sulfonilurea	Gliburida/Glibenklamida Glipizida Glikazida Glimepirida Glikuidon	Merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas, sehingga hanya efektif pada penderita diabetes yang sel-sel β pankreasnya masih berfungsi dengan baik

Lanjutan Tabel 1.

Golongan	Contoh senyawa	Mekanisme kerja
Meglitinida	Repaglinide	Merangsang sekresi insulin di kelenjar pankreas
Biguanida	Metformin	Bekerja langsung pada hati (hepar), menurunkan produksi glukosa hati. Tidak merangsang sekresi insulin oleh kelenjar pankreas.
Tiazolidindion	Rosiglitazone Troglitazone Pioglitazone	Meningkatkan kepekaan tubuh terhadap insulin. Berikatan dengan PPAR γ (peroxisome proliferator activated receptor-gamma) di otot, jaringan lemak, dan hati untuk menurunkan resistensi insulin
Inhibitor α -Glukosidase	Acarbose Miglitol	Menghambat kerja enzim-enzim pencernaan yang mencerna karbohidrat, sehingga memperlambat absorpsi glukosa ke dalam darah

D. Tinjauan Islam Mengenai Daun Ceremai

Banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Rasulullah yang memberi motivasi agar manusia belajar meneliti tentang alam semesta dan isinya seperti tumbuhan-tumbuhan, hewan, dan makhluk ciptaanNya yang lain, karena tidak ada yang diciptakan oleh Allah swt. dengan sia-sia.

Q.S. Al-Baqarah (2) / 164:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافِ الْلَّيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَحْرِي فِي
الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الْرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٦٤﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.”

Ayat ini mengundang manusia berfikir dan merenung tentang sekian banyak hal. Pertama: berfikir dan merenung tentang penciptaan langit dan bumi, Kedua: merenungkan pergantian siang dan malam, Ketiga: merenungkan tentang bahtera-bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia, Keempat: merenungkan tentang apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Yakni memperhatikan proses turunnya hujan dalam siklus yang berulang-ulang, bermula dari air laut yang menguap dan berkumpul menjadi awan, menebal, menjadi dingin dan akhirnya turun menjadi hujan, serta memperhatikan pula angin dan fungsinya, yang kesemuanya merupakan kebutuhan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. (M. Quraish; 2002)

Q.S. Ar-rad (13): 4

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَبٍ وَرَزْعٍ وَخَيْلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ
صِنْوَانٍ يُسَقَى بِمَاءٍ وَحَدِ وَنَفَضِّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ
ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya :

“Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

Ayat ini menjelaskan bahwa dan di bumi tempat kamu semua memijakkan kaki dan menghirup udara, kamu semua melihat dengan sangat nyata ada kepingan-kepingan tanah yang saling berdekatan dan berdampingan namun demikian kualitasnya berbeda-beda. Ada yang tandus ada pula yang subur dan ada juga yang jenisnya sama yang ditumbuhi oleh tumbuhan yang berbeda. Ada yang menjadi lahan kebun-kebun anggur, dan tanaman-tanaman persawahan dan ada juga yang menjadi lahan bagi perkebunan pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang. Semua kebun dan tumbuhan itu disirami dengan air yang sama lalu tumbuh berkembang dan berbuah pada waktu tertentu. Namun demikian kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian yang lain dalam rasanya demikian juga dalam besar dan kecilnya, warna dan bentuknya serta perbedaan-perbedaan yang lain. Sesungguhnya

pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Keanekaragaman tumbuhan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan pengobatan, segala sesuatu yang diciptakan Allah swt. memiliki fungsi sehingga dihamparkan di bumi. Sehingga salah satu fungsinya adalah bahan pengobatan. Hanya saja untuk mengetahui fungsi dari aneka macam tumbuhan yang telah diciptakan diperlukan ilmu pengetahuan dalam mengambil manfaat tumbuhan tersebut. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Asy-Syuara/26: 7.

أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang baik?”

Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan. Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat berbagai macam penyakit dan ini merupakan anugrah Allah swt. (Evika, 2008)

Diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir r a bahwa Rasulullah bersabda:

•••

Terjemahnya :

“... Setiap penyakit ada obatnya. Dan jika suatu obat mengenai tepat pada penyakitnya, ia akan sembuh dengan izin Allah Ta`ala.” (HR. Muslim).

Jadi setiap penyakit yang diturunkan oleh Allah swt. ada obatnya, dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan penyakitnya. Kesembuhan seseorang dari penyakit yang diderita memang Allah swt. yang menyembuhkan, akan tetapi Allah swt. menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Alat dan Bahan

1. Alat Penelitian

Alat glukometer (Easy touch), batang pengaduk, cawan porselin, Erlenmenyer 100 ml (Pyrex), gelas ukur 100 ml (Pyrex), jarum oral, labu tentukur 100 ml (Pyrex), lumpang dan alu, pipet, spoit, timbangan analitik, timbangan kasar, toples dan vial.

2. Bahan Penelitian

Air suling, daun ceremai, etanol 70%, glukosa, mencit jantan (*Mus musculus*), Na.CMC dan tablet Glibenklamid.

B. Penyiapan Sampel Penelitian

1. Pengambilan Sampel

Sampel penelitian daun ceremai (*Phyllanthus acidus* [L.] Skeels) diambil dari Kabupaten Pinrang Kecamatan Mattiro Bulu Desa Padakkalawa Dusun Tanreassona pada pagi hari sekitar jam 09.00 WITA.

2. Pengolahan Sampel

Daun ceremai (*Phyllanthus acidus* [L.] Skeels) dikeringkan tanpa terkena cahaya matahari kemudian di tumbuk hingga diperoleh serbuk setara dengan ukuran 4/18.

3. Pembuatan Sampel Penelitian

Sebanyak 150 gram simplisia dimasukkan ke dalam wadah maserasi kemudian ditambahkan pelarut etanol 70% sebanyak 300 ml dan dibiarkan selama 1 jam. Selanjutnya ditambahkan kembali pelarut etanol 70% sampai serbuk simplisia terendam seluruhnya (\pm 2 cm di atas permukaan sampel). Disimpan ditempat yang terlindung dari sinar matahari sambil sesekali diaduk. Setelah 24 jam disaring, dipisahkan antara filtrat dan ampas. Selanjutnya dengan cara yang sama ampas diekstraksi kembali dengan pelarut etanol 70%. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Ekstrak etanol yang diperoleh diuapkan pelarutnya hingga diperoleh ekstrak kering.

4. Pembuatan larutan koloidal Na. CMC 10 mg / 30 g BB

Sebanyak 1 gram Na.CMC dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam 100 ml air suling panas (70°C) sambil diaduk hingga terbentuk larutan koloidal, kemudian dicukupkan volumenya hingga 100 ml.

5. Pembuatan larutan glukosa 200 mg/ 30 g BB

Glukosa sebanyak 20 gram ditimbang kemudian dilarutkan dengan air suling sebanyak 50 ml, dikocok hingga larut. Kemudian dicukupkan volumenya hingga 100 ml.

6. Pembuatan Suspensi Glibenklamid 0,02 mg/ 30 g BB

Suspensi Glibenklamid dibuat dengan menimbang sebanyak 20 tablet Glibenklamid. Kemudian dihitung bobot rata-rata tiap tablet. Dimasukkan dalam lumpang dan di gerus hingga halus dan homogen. Kemudian ditimbang setara 2 mg (81,5 mg) Glibenklamid, dimasukkan kembali dalam lumpang lalu ditambahkan larutan koloidal Na.CMC sedikit demi sedikit sambil digerus hingga homogen. Hasilnya dimasukkan kedalam labu tentukur 100 ml dan dicukupkan volumenya menggunakan larutan koloidal Na.CMC hingga 100 ml.

7. Pembuatan dosis ekstrak etanol daun ceremai

a. Ekstrak daun ceremai 50 mg / 30 g BB

Ditimbang sebanyak 5 gram ekstrak etanol daun ceremai, didispersikan kedalam larutan koloidal Na.CMC, kemudian dicukupkan volumenya dengan larutan Na.CMC hingga 100 ml.

b. Ekstrak daun ceremai 100 mg / 30 g BB

Ditimbang 10 gram ekstrak etanol daun ceremai, didispersikan kedalam larutan koloidal Na.CMC, kemudian dicukupkan volumenya dengan larutan Na.CMC hingga 100 ml.

c. Ekstrak daun ceremai 200 mg / 30 g BB

Ditimbang 20 gram ekstrak etanol daun ceremai, didispersikan kedalam larutan koloidal Na.CMC, kemudian dicukupkan volumenya dengan larutan Na.CMC hingga 100 ml.

C. Penyiapan Hewan Uji

1. Pemilihan Hewan Uji

Hewan uji yang digunakan adalah mencit jantan (*Mus musculus*) yang dewasa dan sehat dengan berat rata-rata 20- 30 g.

2. Pengelompokan Hewan Uji

Hewan uji yang digunakan sebanyak 15 ekor dibagi menjadi 5 kelompok yang masing-masing terdiri atas 3 ekor, dengan pembagian kelompok sebagai berikut :

- a. Kelompok I :Kontrol negatif dengan pemberian larutan koloidal Na.CMC 10 mg / 30 g BB secara oral.
- b. Kelompok II :Diberikan ekstrak etanol daun ceremai dengan dosis 50 mg / 30 g BB secara oral.
- c. Kelompok III :Diberikan ekstrak etanol daun ceremai dengan dosis 100 mg / 30 g BB secara oral.
- d. Kelompok IV :Diberikan ekstrak etanol daun ceremai dengan dosis 200 mg / 30 g BB secara oral.
- e. Kelompok V :Pembanding dengan pemberian larutan suspensi Glibenklamid 0,02 mg / 30 g BB secara oral.

3. Perlakuan hewan uji

Hewan uji dipuaskan selama 6 jam sebelum diperlakukan. Bobot badannya ditimbang dan kadar glukosa darahnya di ukur sebagai kadar gula puasa. Diberikan larutan glukosa 200 mg/ ml sebanyak 1 ml/30 g BB secara oral, 60 menit kemudian diambil darahnya melalui vena marginalis

untuk ditentukan kadar glukosa darah awal. Kemudian kelompok 1 diberi Na. CMC 10 mg/ 30 g BB mencit sebagai kontrol negatif, kelompok 2 diberi ekstrak daun ceremai dengan dosis 50 mg/ 30 g BB mencit, kelompok 3 diberi ekstrak daun ceremai dengan dosis 100 mg/ 30 g BB mencit, kelompok 4 diberi ekstrak daun ceremai dengan dosis 200 mg/ 30 g BB mencit, kelompok 5 diberi suspensi Glibenklamid 0,02 mg/ 30 g BB mencit sebagai pembanding. Masing-masing pemberian dilakukan secara oral. Setelah itu diambil darahnya melalui vena marginalis dan ditentukan kadar glukosa darahnya dengan menggunakan alat glukometer tiap interval 1 jam selama 5 jam.

4. Penentuan kadar glukosa

Penentuan kadar glukosa dilakukan pada tiap interval 1 jam selama 5 jam. Pengukuran dilakukan dengan cara mengambil darah pada pembuluh darah vena yang terletak pada ujung ekor mencit. Sampel darah yang diperoleh dimasukkan dalam strip yang terpasang pada glukometer. Secara otomatis hasil pengukuran akan di tampilkan pada alat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian pengaruh pemberian Na.CMC dengan dosis 10 mg/ 30 g BB, ekstrak etanol daun ceremai (*Phyllanthus acidus* [L.] Skeels) dengan dosis 50 mg/ 30 g BB, 100 mg/ 30 g BB, 200 mg/ 30 g BB dan suspensi Glibenklamid pada mencit menunjukkan :

1. Kelompok I, yaitu pemberian larutan koloidal Na.CMC 10 mg/ 30 g BB sebagai kontrol memiliki rata-rata kadar glukosa darah puasa sebesar 126,67 mg/dL, rata-rata kadar glukosa darah awal sebesar 189 mg/dL dan rata-rata penurunan kadar glukosa darah pada jam ke 1, 2, 3, 4 dan 5 masing-masing sebesar 3,52%; 6,34%; 7,75%; 9,52% dan 12,16%
2. Kelompok II, yaitu pemberian ekstrak etanol daun ceremai dengan dosis 50 mg/ 30 g BB memiliki rata-rata kadar glukosa darah puasa sebesar 130,34 mg/dL, rata-rata kadar glukosa darah awal sebesar 182 mg/dL dan rata-rata penurunan kadar glukosa darah pada jam ke 1, 2,

3, 4 dan 5 masing-masing sebesar 10,62%; 19,41%; 25,82%; 37,91% dan 43,41%

3. Kelompok III, yaitu pemberian ekstrak etanol daun ceremai dengan dosis 100 mg/ 30 g BB memiliki rata-rata kadar glukosa darah puasa sebesar 122,67 mg/dL, rata-rata kadar glukosa darah awal sebesar 194 mg/dL dan rata-rata penurunan kadar glukosa darah pada jam ke 1, 2, 3, 4 dan 5 masing-masing sebesar 17,22%; 26,80%; 31,78%; 44,33%; dan 52,75%
4. Kelompok IV, yaitu pemberian ekstrak etanol daun ceremai dengan dosis 200 mg/ 30 g BB memiliki rata-rata kadar glukosa darah puasa sebesar 126 mg/dL, rata-rata kadar glukosa darah awal sebesar 195 mg/dL dan rata-rata penurunan kadar glukosa darah pada jam ke 1, 2, 3, 4 dan 5 masing-masing sebesar 21,20%; 28,55%; 34,36%; 47,18% dan 55,2%
5. Kelompok V, yaitu pemberian suspensi Glibenklamid sebagai pembanding memiliki rata-rata kadar glukosa darah puasa sebesar 114,67 mg/dL, rata-rata kadar glukosa darah awal sebesar 222 mg/dL dan rata-rata penurunan kadar glukosa darah pada jam ke 1, 2, 3, 4 dan 5 masing-masing sebesar 40,84%; 46,85%; 51,19%; 58,10% dan 64,56%

B. Pembahasan

Pengujian efek anti hiperglikemik dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode toleransi glukosa oral dan pengukuran kadar glukosa darah dengan glukometer yang menggunakan metode elektrokimia, yaitu berdasarkan pada pengukuran potensial (daya listrik) yang disebabkan oleh reaksi dari glukosa dengan bahan pereaksi glukosa pada elektroda strip. Sampel darah diserap masuk ke dalam ujung strip uji berdasarkan reaksi kapiler. Apabila darah mengisi ruangan reaksi pada strip uji, kalium ferisianida diuraikan dan glukosa sampel dioksidasi oleh enzim glukosa oxidase, menyebabkan penurunan bilangan oksidasi (kalium heksasianoferat (III) menjadi kalium heksasianoferat (II)). Aplikasi jumlah voltase yang konstan dari meteran mengoksidasi kalium heksasianoferat (II) kembali pada kalium heksasianoferat (III), dan memberikan elektron. Elektron yang dihasilkan untuk menimbulkan arus sebanding dengan kadar glukosa pada sampel. Setelah waktu 10 detik, konsentrasi glukosa dalam sampel ditayangkan pada layar monitor.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat efek ekstrak daun ceremai (*Phyllanthus acidus* [L.] Skeels) terhadap penurunan kadar glukosa darah pada hewan coba yang digunakan yaitu mencit. Adapun dosis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 50 mg/ 30 g BB, 100 mg/ 30 g BB dan 200 mg/ 30 g BB. Selain itu digunakan juga 2 kelompok hewan coba untuk kontrol, yaitu kontrol positif dan kontrol negatif.

Sebagai kontrol positif digunakan Glibenklamid yang memiliki efek anti hiperglikemik yang kuat dengan dosis yang rendah. Kontrol positif ini digunakan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang penurunan kadar glukosa darah pada saat menggunakan ekstrak daun ceremai. Sedangkan kontrol negatif yang digunakan adalah Na.CMC 10 mg/ 30 g BB untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pensuspensi dalam penurunan kadar glukosa darah.

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit jantan karena memiliki sistem hormonal dan faktor psikologis yang lebih stabil dibanding mencit betina sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian.

Sebelum perlakuan, mencit dipuaskan terlebih dahulu selama 6 jam dengan maksud untuk menghindari pengaruh makanan pada saat dilakukan pengukuran glukosa darah.

Larutan glukosa 200 mg/ 30 g BB diberikan pada mencit 1 jam sebelum pemberian sediaan uji yang bertujuan untuk menaikkan kadar glukosa darah yang merupakan kadar glukosa awal, sehingga kemampuan menurunkan glukosa darah dari sediaan uji dapat diamati. Dalam penelitian ini penurunan kadar glukosa darah mencit diukur selama 5 jam dengan interval waktu 1 jam. Hal ini dikarenakan waktu yang diperlukan oleh glukosa untuk terabsorbsi dalam tubuh adalah sekitar 40 menit sampai 1 jam dan untuk melihat efek penurunan kadar glukosa yang lebih jelas maka digunakan jangka waktu selama 5 jam setelah pemberian ekstrak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh penurunan kadar glukosa darah mencit untuk tiap perlakuan pada jam ke 1, 2, 3, 4, dan 5 yaitu pada kelompok hewan coba yang diberikan Na.CMC 10 mg/ 30 g BB menunjukkan penurunan kadar glukosa darah sebesar 3,52%; 6,34%; 7,75%; 9,52% dan 12,16%. Pada kelompok hewan coba yang diberikan ekstrak etanol daun ceremai dengan dosis 50 mg/ 30 g BB mengalami penurunan kadar glukosa darah sebesar 10,62%; 19,41%; 25,82%; 37,91% dan 43,41%. Pada kelompok hewan coba yang diberikan ekstrak etanol daun ceremai dengan dosis 100 mg/ 30 g BB, mengalami penurunan kadar glukosa darah sebesar 17,22%; 26,80%; 31,78%; 44,33%; dan 52,75%. Pada kelompok hewan coba yang diberikan ekstrak etanol daun ceremai dengan dosis 200 mg/ 30 g BB, mengalami penurunan kadar glukosa darah sebesar 21,20%; 28,55%; 34,36%; 47,18% dan 55,2%. Dan kadar glukosa darah kelompok hewan coba yang diberikan suspensi Glibenklamid mengalami penurunan sebesar 32,75%; 39,58%; 44,53%; 52,38% dan 59,71%. Penurunan kadar glukosa darah yang terjadi pada kelompok kontrol negatif selama rentang waktu 5 jam disebabkan karena adanya penggunaan glukosa oleh mencit dalam pembentukan energi dan terjadinya absorpsi glukosa ke dalam sel yang disimpan sebagai gula cadangan.

Hasil analisis statistika dengan menggunakan RAK (Rancangan Acak Kelompok) pada perlakuan hewan uji selama 5 jam dengan interval waktu 1 jam, memperlihatkan perbedaan yang nyata. Hal ini dapat dilihat pada tabel ANAVA dimana nilai F hitung > F tabel pada taraf 5% dan 1%. Dari hasil

analisis statistika, juga diperoleh koefisien keseragaman (KK) sebesar 14,56% sehingga dengan nilai KK sebesar ini maka dilanjutkan dengan Uji Duncan.

Pada uji lanjutan dengan menggunakan uji Duncan menunjukkan perbedaan yang tidak nyata antara perlakuan dosis 200 mg/ 30 g BB dengan suspensi Glibenklamid, dengan kata lain memiliki efek yang hampir sama dengan Glibenklamid. Sedangkan dosis 100 mg/ 30 g BB dan ekstrak 50 mg/ 30 g BB dibandingkan dengan Glibenklamid menunjukkan perbedaan yang nyata dan jika dibandingkan dengan Na.CMC 10 mg/ 30 g BB menunjukkan perbedaan yang sangat nyata, dengan kata lain ekstrak daun ceremai dengan dosis 100 mg/ 30 g BB dan 50 mg/ 30 g BB mempunyai efek yang sangat berbeda dengan Na. CMC 10 mg/ 30 g BB.

Setiap penyakit ada obatnya begitupun dengan hiperglikemik, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka telah ditemukan lagi salah satu obat yang telah diturunkan oleh Allah swt. yaitu daun ceremai sebagai tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai penurun kadar glukosa darah.



BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun ceremai (*Phyllanthus acidus* [L.] Skeels) dapat menurunkan kadar glukosa darah mencit jantan dengan dosis 50 mg/ 30 g BB, 100 mg/ 30 g BB dan 200 mg/ 30 g BB.

B. Saran

Disarankan untuk melakukan penelitian tentang efek penurunan kadar glukosa darah secara klinis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR


DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Syariful. 2002. *Uji Efek Rebusan Daun Ceremai Terhadap Kadar Kolesterol Total Darah Tikus Putih*. Makassar: Universitas Hasanuddin,
- Al- Qur'an dan terjemahnya Departeman Agama. 2002 Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Aryani, Rusmiati. 2006. *Uji Efek Ekstrak Metanol Daun Ceremai Terhadap Penurunan Bobot Badan Mencit*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Bustan, M. N. 2007. *Epidemiologi penyakit tidak menular*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Hal. 107
- Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. 1979. *Farmakope Indonesia*, edisi 3. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Hal. 9
- Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. 1986. *Sediaan Galenik*. Jakarta: Depatemen Kesehatan Republik Indonesia. Hal. 8-12, 16, 25-26
- Ganiswarna, Sulistia G. 1995. *Farmakologi dan Terapi*, Edisi 4. Jakarta: Bagian Farmakologi FKUI. Hal. 469
- Harbone, J. B. 1987. *Metode Fitokomia Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan*. Bandung: ITB. Hal. 6
- Hariana, Arief. 2004. *Tumbuhan Obat Dan Khasiat seri 1*. Jakarta: Penebar Swadaya. Hal. 83
- Hartini, Sri. 2009. *Diabetes ? Siapa Takut !!: Panduan Lengkap Untuk Diabetisi, Keluarganya, Dan Profesional Medis*. Bandung : PT. Mizan pustaka. Hal. 33
- Heyne. 1989. *Tumbuhan Berguna Indonesia*, edisi 2. Jakarta : Yayasan Sarana Wana Jaya. Hal 1136.
- Malole, M.B.M., Pramono, C. Sri Utami. 1989. *Penggunaan Hewan-Hewan Percobaan Di Laboratorium*. Bogor: Ditelaah oleh: Masduki Partadiredja. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Pusat Antar Universitas Bioteknologi Institut Pertanian Bogor. Hal. 94-100
- Mutshcler, Ernst. 1991. *Dinamika Obat*,Edisi V. Bandung: Penerbit ITB. Hal 542, 572
- Sandi, Evika. 2008. *Rahasia Tumbuhan Berkhasiat Obat Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang Press. Hal. 3-5

- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati. Hal. 374-375
- Stang. 2005. *Biostatistik*. Makassar: Universitas Hasanuddin. Hal. 21
- Sustrani, Lanny. 2004. *Diabetes*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka utama. Hal. 37
- Tjay, Tan H. 2002. *Obat-Obat Penting Khasiat Penggunaan dan Efek-Efek Sampingnya*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo. Hal. 696
- Tjitosoepomo,G. 1994. *Taksonomi Tumbuhan Obat-Obatan*. Jakarta : Gadjah Mada University Press.
- Wijayakusuma, Hembing. 2004. *Bebas Diabetes Mellitus Ala Hembing*. Jakarta : Puspa swsara, anggota IKAPI. Hal. 6, 7, 11
- Yahana, Arisandi dan Yovita Andriani. 2006. *Khasiat Tanaman Obat*. Jakarta: Buku Murah. Hal. 69-70



LAMPIRAN 1



LAMPIRAN 2

1. Perhitungan Dosis dan Pemberian Glibenklamid

Konversi dosis manusia ke mencit

- Dosis lazim untuk manusia = 5 mg
- Faktor konversi untuk mencit = 0,0026
- dengan bobot 20 g
- Dosis untuk mencit 20 g = $5 \text{ mg} \times 0,0026 = 0,013 \text{ mg}$

2. Penyediaan Sediaan Glibenklamid

- Volume pemberian untuk mencit = 1 ml untuk 30 g BB mencit
- Dosis untuk mencit 30 g = $\frac{0,013 \text{ mg}}{30 \text{ g}} = 0,0195 \text{ mg}$
- Dibuat stok sebanyak 100 ml = 100 ml
- Jumlah glibenklamid yang dibuat = $0,0195 \text{ mg} \times 100 \text{ ml} = 1,95 \text{ mg} \approx 2 \text{ mg.}$

3. Perhitungan glibenklamid yang setara dengan 2 mg

- Berat rata-rata 20 tablet = 203,77 mg
- Berat yang ditimbang = $\frac{203,77 \text{ mg}}{20 \text{ tablet}} = 10,1885 \text{ mg}$
- = 81,5 mg

Jadi untuk mendapatkan glibenklamid 2 mg ditimbang bobot tablet sebanyak 81,5 mg yang disuspensikan hingga 100 ml menggunakan Na.CMC 10 mg/ 30 g BB.

LAMPIRAN 3

Tabel 2. Data kadar glukosa darah mencit dengan pemberian larutan koloidal Na.CMC 10 mg/ 30 g BB.

Mencit	Kadar glukosa darah mencit					
	Puasa	Awal	Setelah jam ke			
			1	2	3	4
I	113	177	172	168	165	161
II	123	185	181	176	173	169
III	144	205	194	187	185	183
Jumlah	380	567	547	531	523	513
Rata-rata	126,67	189	182,34	177	174,34	171
						176

Tabel 3. Data kadar glukosa darah mencit dengan pemberian ekstrak etanol daun ceremai dengan dosis 50 mg/ 30 g BB.

Mencit	Kadar glukosa darah mencit					
	Puasa	Awal	Setelah jam ke			
			1	2	3	4
I	120	180	169	154	163	131
II	122	176	141	134	104	91
III	149	190	178	152	138	117
Jumlah	391	546	488	440	405	339
Rata-rata	130,34	182	162,67	146,67	135	113
						103

Tabel 4. Data kadar glukosa darah mencit dengan pemberian ekstrak etanol daun ceremai dengan dosis 100 mg/ 30 g BB.

Mencit	Kadar glukosa darah mencit					
	Puasa	Awal	Setelah jam ke			
			1	2	3	4
I	117	175	132	113	94	87
II	125	198	162	159	140	108
III	126	209	188	154	163	129
Jumlah	368	582	482	426	397	324
Rata-rata	122,67	194	160,6	142	132,34	108
						91,67

Tabel 5. Data kadar glukosa darah mencit dengan pemberian ekstrak etanol daun ceremai dengan dosis 200 mg/ 30 g BB.

Mencit	Kadar glukosa darah mencit					
	Puasa	Awal	Setelah jam ke			
			1	2	3	4
I	109	177	134	129	121	102
II	128	193	155	133	126	82
III	141	215	172	156	137	125
Jumlah	378	585	461	418	384	309
Rata-rata	126	195	153,67	139,34	128	103
						87,34

Tabel 6. Data kadar glukosa darah mencit dengan pemberian suspensi Glibenklamid.

Mencit	Kadar glukosa darah mencit						
	Puasa	Awal	Setelah jam ke				
			1	2	3	4	5
I	107	193	103	120	115	99	86
II	110	177	113	93	103	94	81
III	127	216	178	141	107	86	69
Jumlah	344	586	394	354	325	279	236
Rata-rata	114,67	195,33	131,34	118	108,34	93	78,67



LAMPIRAN 4

Tabel 7. Pengaruh pemberian Na.CMC 10 mg/ 30 g BB, ekstrak daun ceremai dengan dosis 50 mg/ 30 g BB, 100 mg/ 30 g BB, 200 mg/ 30 g BB dan suspensi Glibenklamid terhadap penurunan kadar glukosa darah mencit pada jam ke 1.

No.	Perlakuan	Kadar glukosa darah rata-rata (mg/dl)		Penurunan kadar glukosa darah rata-rata (mg/dl)	Penurunan kadar glukosa darah rata-rata (%)
		Awal	Jam 1		
1.	Na.CMC 10 mg/ml	189	182,34	6,66	3,52
2.	Ekstrak etanol 50 mg/ml	182	162,67	19,33	10,62
3.	Ekstrak etanol 100 mg/ml	194	160,6	33,4	17,22
4.	Ekstrak etanol 200 mg/ml	195	153,67	41,33	21,20
5.	Suspensi Glibenklamid	195,33	131,34	63,99	32,75

Tabel 8. Pengaruh pemberian Na.CMC 10 mg/ 30 g BB, ekstrak daun ceremai dengan dosis 50 mg/ 30 g BB, 100 mg/ 30 g BB, 200 mg/ 30 g BB dan suspensi Glibenklamid terhadap penurunan kadar glukosa darah mencit pada jam ke 2.

No.	Perlakuan	Kadar glukosa darah rata-rata (mg/dl)		Penurunan kadar glukosa darah rata-rata (mg/dl)	Penurunan kadar glukosa darah rata-rata (%)
		Awal	Jam 2		
1.	Na.CMC 10 mg/ml	189	177	12	6,34
2.	Ekstrak etanol 50 mg/ml	182	146,67	35,33	19,41
3.	Ekstrak etanol 100 mg/ml	194	142	52	26,80
4.	Ekstrak etanol 200 mg/ml	195	139,33	55,67	28,55
5.	Suspensi Glibenklamid	195,33	118	77,33	39,58

Tabel 9. Pengaruh pemberian Na.CMC 10 mg/ 30 g BB, ekstrak daun ceremai dengan dosis 50 mg/ 30 g BB, 100 mg/ 30 g BB, 200 mg/ 30 g BB dan suspensi Glibenklamid terhadap penurunan kadar glukosa darah mencit pada jam ke 3

No.	Perlakuan	Kadar glukosa darah rata-rata (mg/dl)		Penurunan kadar glukosa darah rata-rata (mg/dl)	Penurunan kadar glukosa darah rata-rata (%)
		Awal	Jam 3		
1.	Na.CMC 10 mg/ml	189	174,34	14,66	7,75
2.	Ekstrak etanol 50 mg/ml	182	135	47	25,82
3.	Ekstrak etanol 100 mg/ml	194	132,34	61,66	31,78
4.	Ekstrak etanol 200 mg/ml	195	128	67	34,36
5.	Suspensi Glibenklamid	195,33	108,34	86,99	44,53

Tabel 10. Pengaruh pemberian Na.CMC 10 mg/ 30 g BB, ekstrak daun ceremai dengan dosis 50 mg/ 30 g BB, 100 mg/ 30 g BB, 200 mg/ 30 g BB dan suspensi Glibenklamid terhadap penurunan kadar glukosa darah mencit pada jam ke 4

No.	Perlakuan	Kadar glukosa darah rata-rata (mg/dl)		Penurunan kadar glukosa darah rata-rata (mg/dl)	Penurunan kadar glukosa darah rata-rata (%)
		Awal	Jam 4		
1.	Na.CMC 10 mg/ml	189	171	18	9,52
2.	Ekstrak etanol 50 mg/ml	182	113	69	37,91
3.	Ekstrak etanol 100 mg/ml	194	108	86	44,33
4.	Ekstrak etanol 200 mg/ml	195	103	92	47,18
5.	Suspensi Glibenklamid	195,33	93	102,33	52,38

Tabel 11. Pengaruh pemberian Na.CMC 10 mg/ 30 g BB, ekstrak daun ceremai dengan dosis 50 mg/ 30 g BB, 100 mg/ 30 g BB, 200 mg/ 30 g BB dan suspensi Glibenklamid terhadap penurunan kadar glukosa darah mencit pada jam ke 5

No.	Perlakuan	Kadar glukosa darah rata-rata (mg/dl)		Penurunan kadar glukosa darah rata-rata (mg/dl)	Penurunan kadar glukosa darah (%)
		Awal	Jam 5		
1.	Na.CMC 10 mg/ml	189	166	23	12,16
2.	Ekstrak etanol 50 mg/ml	182	103	79	43,41
3.	Ekstrak etanol 100 mg/ml	194	91,67	102,34	52,75
4.	Ekstrak etanol 200 mg/ml	195	87,34	107,66	55,2
5.	Suspensi Glibenklamid	195,33	78,67	116,65	59,71


LAMPIRAN 5

Perhitungan Statistik dengan Rancangan Acak Kelompok

Tabel 12. Perhitungan RAK antara Na.CMC 10 mg/30 g BB, ekstrak daun ceremai 50 mg/30 g BB, 100 mg/30 g BB, 200 mg/30 g BB dan suspensi Glibenklamid terhadap penurunan kadar glukosa darah mencit.

Perlakuan	Replikasi	Kadar glukosa darah (mg/dl)						ΣX	
		B0	B1	B2	B3	B4	B5		
A1	I	177	172	168	165	161	157	1000	166.67
	II	185	181	176	173	169	163	1047	174.5
	III	205	194	187	185	183	178	1132	188.67
	ΣX	567	547	531	523	513	498	3179	
		189	182,34	177	174,34	171	166		176.61
A2	I	180	169	154	163	131	123	920	153.33
	II	176	141	134	104	91	85	731	121.83
	III	190	178	152	138	117	101	876	146
	ΣX	546	488	440	405	339	309	2527	
		182	162,67	146,67	135	113	103		140.39
A3	I	175	132	113	94	87	71	672	112
	II	198	162	159	140	108	92	859	143.17
	III	209	188	154	163	129	112	955	159.17
	ΣX	582	482	426	397	324	275	2486	
		194	160,67	142	132.34	108	91,67		138.11
A4	I	177	134	129	121	102	90	753	125.5
	II	193	155	133	126	82	69	758	126.33
	III	215	172	156	137	125	103	908	151.33
	ΣX	585	461	418	384	309	262	2419	
		195	153,67	139,34	128	103	87,34		134,28
A5	I	193	103	120	115	99	86	716	119.33
	II	177	113	93	103	94	81	661	110.17
	III	216	178	141	107	86	69	797	132.83
	ΣX	586	394	354	323	279	236	2174	
		195,33	131,34	118	108,34	91	78,67		120.78
	Total	2868	2372	2169	2032	1764	1580	12785	
Rata-rata		191	158,14	144,6	135,6	117,2	105,34		142,06

Ket. :	A1	= Larutan koloidal NaCMC 10 mg/ 30 g BB
	A2	= Ekstrak etanol 50 mg/ 30 g BB
	A3	= Ekstrak etanol 100 mg/ 30 g BB
	A4	= Ekstrak etanol 200 mg/ 30 g BB
	A5	= Suspensi Glibenklamid
	B0	= Kadar glukosa darah awal
	B1	= Kadar glukosa darah pada jam ke 1
	B2	= Kadar glukosa darah pada jam ke 2
	B3	= Kadar glukosa darah pada jam ke 3
	B4	= Kadar glukosa darah pada jam ke 4
	B5	= Kadar glukosa darah pada jam ke 5



LAMPIRAN 6

1. Perhitungan Anava

$$\begin{aligned}
 \text{Faktor Koreksi (FK)} &= \frac{\sum 2785}{90} \\
 &= 1816180,27 \\
 \\
 \text{JK Total} &= (177)^2 + (172)^2 + (168)^2 + \dots + (69)^2 - \text{FK} \\
 &= 1951493 - 1816180,27 \\
 &= 135312,7 \\
 \\
 \text{JK A (Perlakuan)} &= \frac{\sum 179 + \sum 427 + \dots + \sum 174}{18} - \text{FK} \\
 &= \frac{33249803}{18} - 1816180,27 \\
 &= 1847211,27 - 1816180,27 \\
 &= 31031 \\
 \\
 \text{JK B (Kelompok)} &= \frac{\sum 866 + \sum 372 + \dots + \sum 580}{15} - \text{FK} \\
 &= \frac{28293489}{15} - 1816180,27 \\
 &= 1886232 - 1816180,27 \\
 &= 70052,32 \\
 \\
 \text{JK Galat} &= \text{JK Total} - \text{JK A} - \text{JK B} \\
 &= 135312,7 - 31031 - 70052,32 \\
 &= 34229,4 \\
 \\
 \text{Koefisien Keseragaman (KK)} &= \frac{\sqrt{KTG}}{y} \times 100\% \\
 &= \frac{\sqrt{427,86}}{142,06} \times 100\% \\
 &= 14,56\%
 \end{aligned}$$

Tabel 13: Tabel Anava

Sumber variasi	JK	DB	KT	F Hitung	F Tabel	
					0,05	0,01
Perlakuan	31031	4	7757,75	18,13*	2,48	5,58
Kelompok	70052,32	5	14010,46	32,74**	2,33	3,25
Galat	34229,4	80	427,86			
Total	135312,7	89				

(**) Fh>Ft artinya sangat signifikan

(*) Fh> Ft dan Fh< Ft artinya signifikan

LAMPIRAN 7

2. Uji Duncan

$$S_{\bar{y}} = \text{---}$$

$$S_{\bar{y}} = \text{---}$$

$$= 5,34$$

Tabel 14: Tabel Uji Duncan


Perlakuan	Rerata	Beda riel pada jarak P			
		2	3	4	5
Gliben 0,02 mg/ 30 g BB	120,78				
200 mg/ 30 g BB	134,28	13,5 _{NS}			
100 mg/30 g BB	138,11	3,83 _{NS}	17,33*		
50 mg/ 30 g BB	140,39	2,28 _{NS}	6,11 _{NS} **	19,61*	
Na.CMC 10 mg/ 30 g BB	176,61	26,22	28,5**	32,33**	55,83**
P _{0,05 (P,80)}		2,83	2,98	3,08	3,14
0,01 (P,80)		3,76	3,92	4,03	4,12
BJND _{0,05 (P,80)} = (P.S _{\bar{y}})		15,11	15,43	16,46	16,76
0,01 (P,80)		20,07	20,93	21,52	22

Ket: NS = Non Signifikan


* = Signifikan

** = Sangat Signifikan

LAMPIRAN 8



Gambar 1 : Grafik Penurunan Kadar Glukosa Darah Mencit



Gambar 2 : Grafik Histogram Penurunan Kadar Glukosa Darah Mencit



Gambar 3: Daun ceremai



Gambar 4: Perlakuan