

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN  
KOMPLIKASI PERSALINAN DI RSIA SITI FATIMAH  
MAKASSAR TAHUN 2009**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu syarat meraih gelar Ahli Madya  
Kebidanan Jurusan Kebidanan Pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas  
Islam Negeri Alauddin Makassar**

Oleh

**Nur Inaya**

**NIM:70400007038**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2010**


## HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing institusi untuk diajukan dalam ujian Karya Tulis Ilmiah Program DIII Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang dilaksanakan pada bulan Juli 2010.



## **PERNYATAAN KEASLIAN KTI**

Dengan penuh kesabaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa KTI ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuatkan oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka KTI dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



## KATA PENGANTAR

Segala puji milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya serta meminta perlindungan kepada-Nya dari kejahatan jiwa dan keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah SWT. Maka tak seorang pun yang menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah SWT. Maka tak seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Kita bersaksi bahwa tiada Ilah (yang hak) kecuali Allah SWT. Satu-satunya tiada sekutu bagi-Nya dan Kita bersaksi bahwa Muhammad SAW. Adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amma Ba'du.

Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang karena atas rahmat-Nya dengan kenikmatan yang tak terhingga dibalik segala ujian yang diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Karya Tulis Ilmiah ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program DIII Kebidanan pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Secara khusus, lewat kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda A.Bachri dan almarhumah Nur Dewi yang senantiasa mengiringi langkahku dengan do'a disetiap shalat dan hembusan nafasnya dan selalu rela berkorban lahir dan batin demi terwujudnya cita-cita dan harapanku serta kepada kaka-kakakku

tersayang Nur Alim Bachri dan Khaerul Bachri yang setia memberikan semangat dan dukungan serta kepada seluruh keluargaku yang memberikan dukungan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan Karya Tulis Ilmiah ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A, selaku rektor UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN Alauddin Makassar agar lebih berkualitas sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lainnya.
3. Bapak dr. Furqaan Naiem, M.Sc. Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
4. Ibu Sitti Saleha, S.Si.T, SKM. M.Keb selaku ketua jurusan kebidanan yang telah memberikan kontribusi yang besar kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan memperoleh gelar A.Md.Keb.
5. Ibu dr. Rini Fitriani S.Ked selaku pembimbing Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan bimbingan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
6. Ibu dr. Nadyah S.Ked selaku penguji Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.

7. Dra. Supardin, M. HI selaku penguji Karya Tulis Ilmiah yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi sehingga penulis sapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
8. Para dosen Program Studi Kebidanan yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Program studi Kebidanan.
9. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan yang telah memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada penulis.
10. dr. H. leo Prawirodihardjo, Sp. OG (K), M.Kes, M.M, PhD selaku Direktur RSIA Siti Fatimah Makassar beserta seluruh pegawai dan staf Rumah Sakit yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan.
11. Terkhusus buat A. Tenry Tompo yang selama ini atas segenap kasih dan pengorbanan yang dengan setia, sabar menemani dan mendukung setiap kegiatan penulis hingga detik ini.
12. Sahabat seperjuanganku Linda, Idha, Inha, Uus, Isni dan semua teman-teman mahasiswa angkatan 2007 prodi Kebidanan UIN Alauddin Makasar yang tidak bisa disebut satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan motivasinya dalam rangka penyelesaian studi ini.
13. Spesial thanks untuk K'Kiki, a'da dan K'Imma, atas do'a, perhatian serta bantuannya hingga detik ini.

Terakhir penulis menyadari bahwa Karya Tulis ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan yang ada didalamnya, olehnya itu penulis berharap Karya Tulis ini menjadi acuan bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah ini bermanfaat buat semua pihak. AMIN....

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Makassar, September 2010

**PENULIS**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Keaslian .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Biodata Penulis .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak .....	x
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Lampiran .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Persalinan .....	7
B. Tinjauan Umum Tentang Komplikasi Persalinan .....	11
C. Tinjauan Umum Tentang Usia Ibu .....	19
D. Tinjauan Umum Tentang Paritas Ibu .....	22
E. Tinjauan Umum Tentang Jarak Kehamilan Ibu .....	24



F. Tinjauan Umum Tentang Kelengkapan Pelayanan ANC.....	28
<b>BAB III KERANGKA KONSEP .....</b>	<b>36</b>
A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti .....	32
B. Bagan Pola Pikir Variabel Yang Diteliti.....	34
C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif .....	34
<b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	37
C. Populasi Dan Sampel .....	38
D. Teknik Pengambilan Sampel.....	38
E. Tekhnik Pengumpulan Data .....	38
F. Pengolahan dan Penyajian data .....	38
G. Analisa Data.....	38
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Hasil Penelitian .....	39
B. Pembahasan .....	45
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 5.1 Distribusi Ibu Bersalin Menurut Jenis Komplikasi Persalinan Di Rsia Siti Fatimah Makassar Tahun 2009 .....	45
Tabel 5.2 Distribusi Kejadian Komplikasi Persalinan Berdasarkan Kelompok Umur Ibu Di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009 .....	46
Tabel 5.3 Distribusi Kejadian Komplikasi Persalinan Berdasarkan Kelompok Paritas Ibu Di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009 .....	46
Tabel 5.4 Distribusi Kejadian Komplikasi Persalinan Berdasarkan Kelompok Jarak Kehamilan Ibu Di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009 .....	47
Tabel 5.5 Distribusi Kejadian Komplikasi Persalinan Berdasarkan Kelompok Kelengkapan Pelayanan ANC Di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009 .....	47

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar kegiatan konsul

Lampiran 2 : Master Tabel

Lampiran 3 : Surat permohonan izin pengambilan data

Lampiran 4 : Surat izin penelitian



## ABSTRAK

**Nama** :Nur Inaya,  
**NIM** :70400007038  
**Judul** :Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Kejadian  
Komplikasi Persalinan di RSIA Siti Fatimah Makassar  
Tahun 2009

---

Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih menempati urutan tertinggi jika dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN. Penyebab kematian ibu di antaranya adalah pendarahan, eklampsia, infeksi, partus lama dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara usia ibu, paritas, jarak kehamilan dan kelengkapan pelayanan ANC dengan kejadian komplikasi persalinan di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan pengambilan sampel secara purposive sampling yaitu 220 orang. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang diperoleh dari rekam medik. Kemudian diolah secara manual dengan bantuan kalkulator dan disajikan dalam bentuk tabel.

Penelitian yang dilakukan mulai tanggal 05 Juli 2010 sampai tanggal 16 Juli 2010 diperoleh bahwa populasi sebanyak 3.998 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari jumlah sampel 220 kasus komplikasi persalinan mayoritas pada umur <20 dan >30 tahun sebanyak 114 orang (51, 82%), berdasarkan paritas didapatkan mayoritas dengan paritas 1 dan  $\geq 4$  sebanyak 164 orang (74, 55%), berdasarkan jarak kehamilan didapatkan mayoritas dengan jarak kehamilan <2 tahun dan >4 tahun sebanyak 57 orang (55, 34%), dan berdasarkan kelengkapan pelayanan ANC didapatkan mayoritas memeriksakan kehamilannya secara lengkap sebanyak 133 orang (60, 45%).

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah usia, paritas, jarak kehamilan dan kelengkapan pelayanan ANC pada ibu bersalin berhubungan dengan kejadian komplikasi pada saat persalinan. Jenis komplikasi persalinan yang paling banyak diderita pada ibu bersalin di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009 adalah Pre-eklamsia.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Semua ibu hamil berpotensi mempunyai risiko-risiko atau bahaya terjadinya komplikasi dalam persalinan yang berdampak 5D/5K, yaitu Kematian (*Death*), Kesakitan (*Disease*), Kecacatan (*Disability*), Ketidaknyamanan (*Discomfort*) dan Ketidakpuasan (*Dissatisfaction*) baik pada ibu maupun pada bayi baru lahir. Untuk itu, pemberian asuhan kehamilan perlu dilakukan. Pemberian asuhan kehamilan tidak hanya dilakukan di klinik saja, tetapi dapat dimulai dari subsistem dan sistem yang ada di masyarakat, yaitu keluarga. Bidan, khususnya bidan yang ada di desa (BDD) sebagai salah satu tenaga kesehatan terdepan yang ada di masyarakat diharapkan dapat memberikan asuhan ibu hamil yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang berlaku (Ambarawati, Yulifiah dan Yuswanto, 2006).

Setiap tahun sekitar 160 juta perempuan di seluruh dunia hamil. Sebagian besar kehamilan ini berlangsung dengan aman. Namun, sekitar 15% menderita komplikasi berat, dengan sepertiganya merupakan komplikasi yang mengancam jiwa ibu. Komplikasi ini mengakibatkan kematian lebih dari setengah juta ibu setiap tahun. Dari jumlah ini diperkirakan 90% terjadi di Asia dan Afrika subsahara, 9% di Negara berkembang lainnya, dan kurang dari 1% di Negara-negara maju. Di beberapa negara resiko kematian ibu lebih

tinggi dari 1 dalam 10 kehamilan, sedangkan di Negara maju resiko ini kurang dari 1 dalam 6000 (Prawirohardjo, 2008).

Data organisasi kesehatan dunia (WHO) memperkirakan bahwa setiap tahun sejumlah 500 orang perempuan meninggal dunia akibat kehamilan dan persalinan, fakta ini mendekati terjadinya satu kematian setiap menit. Diperkirakan 99% kematian tersebut terjadi di negara-negara berkembang (WHO, 2007). Indonesia adalah salah satu negara yang masih belum bisa lepas dari belitan angka kematian ibu (AKI) yang tinggi, bahkan jumlah perempuan Indonesia yang meninggal saat melahirkan mencapai rekor tertinggi di Asia. Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, angka kematian maternal di Indonesia mencapai 248/100.000 kelahiran hidup, itu berarti setiap 100.000 kelahiran hidup masih ada sekitar 248 ibu yang meninggal akibat komplikasi kehamilan dan persalinan (<http://himapid.blogspot.com>, diakses pada tanggal 15 maret 2010).

Penyebab kematian ibu di antaranya adalah pendarahan (42%), eklampsia (13%), aborsi (11%), infeksi (10%), partus lama (9%) dan lain-lain (15%). Belum banyak kemajuan yang dicapai, AKI masih 230 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI, 2004), AKB 42 per 1.000 kelahiran hidup (UNDP, 2004). Angka-angka tersebut masih jauh dari kesepakatan Millenium Development Goal (DMG) pada tahun 2015 dimana AKI menjadi 115/100.000 kelahiran hidup dan AKB 25/1.000 kelahiran hidup (Ambarawati, Yulifiah dan Yuswanto, 2006).

Faktor reproduksi ibu turut menambah besar risiko kematian maternal. Jumlah paritas satu dan paritas diatas tiga telah terbukti meningkatkan angka kematian maternal dibanding paritas 2-3, selain itu faktor umur ibu melahirkan juga menjadi faktor risiko kematian ibu, dimana usia muda yaitu < 20 tahun dan usia tua >30 tahun pada saat melahirkan menjadi faktor risiko kematian maternal, sedangkan jarak antara tiap kehamilan yang dianggap cukup aman adalah 3-4 tahun (<http://himapid.blogspot.com>, diakses pada tanggal 15 maret 2010).

*Antenatal Care* dapat menurunkan angka kejadian komplikasi persalinan karena sangat berpengaruh dengan kematian maternal dan prenatal. Kebutuhan akan pelayanan kesehatan bagi seorang wanita akan meningkat dan mencapai puncaknya pada saat kehamilan dan menjelang persalinan (Saifuddin, 2006).

Angka Kematian Ibu (AKI) telah mengalami penurunan, hal ini terlihat dari 425 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1986 turun menjadi 373 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1992, menurun menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI, 2007). Sedangkan laporan dari Sub Dinas Kesejahteraan Keluarga Dinas Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008 menunjukkan kematian ibu sebesar 97, 12 per 100.000 kelahiran hidup (data terekap pada sarana kesehatan). Penyebab kematiannya rata-rata disebabkan oleh sebab langsung seperti perdarahan, eklampsia, infeksi dan lainnya (Profil Dinkes, 2009).

Data di Sulawesi Selatan pada tahun 2009 jumlah ibu yang mengalami komplikasi persalinan sebanyak 18.104 ibu, sedangkan di Makassar sendiri jumlah ibu yang mengalami komplikasi persalinan sebanyak 7.280 ibu. Berdasarkan data yang diperoleh dari rekam medik RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009 dari 3.998 persalinan yang ditolong, 220 diantaranya mengalami komplikasi persalinan (Rekam medik RSIA. St. Fatimah, 2009).

Berdasarkan data diatas, penulis menganggap perlu dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian komplikasi persalinan di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana hubungan antara usia ibu dengan kejadian komplikasi persalinan di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009?
2. Bagaimana hubungan antara paritas ibu dengan kejadian komplikasi persalinan di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009?
3. Bagaimana hubungan antara jarak kehamilan dengan kejadian komplikasi persalinan di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009?
4. Bagaimana hubungan antara kelengkapan pelayanan ANC dengan kejadian komplikasi persalinan di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009?



### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan umum

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian komplikasi persalinan di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009.

#### 2. Tujuan khusus

- a. Mengetahui hubungan antara usia ibu dengan kejadian komplikasi persalinan di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009.
- b. Mengetahui hubungan antara paritas ibu dengan kejadian komplikasi persalinan di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009.
- c. Mengetahui hubungan antara jarak kehamilan dengan kejadian komplikasi persalinan di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009.
- d. Mengetahui hubungan antara kelengkapan pelayanan ANC dengan kejadian komplikasi persalinan di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi dinas yang terkait dalam merumuskan program pelayanan untuk mengurangi angka kematian ibu akibat komplikasi persalinan.

## 2. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah ilmu pengetahuan serta dapat bermanfaat bagi peneliti berikutnya sebagai bahan acuan untuk meneliti lebih lanjut.

## 3. Manfaat bagi peneliti

Bagi peneliti sendiri merupakan sebuah pengalaman yang sangat berharga dalam memperluas wawasan pengetahuan tentang kesehatan masyarakat khususnya masalah komplikasi persalinan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Persalinan**

Persalinan adalah rangkaian proses yang berakhir dengan pengeluaran hasil konsepsi oleh ibu. Proses ini dimulai dengan kontraksi persalinan sejati, yang ditandai oleh perubahan progresif pada serviks, dan di akhiri dengan kelahiran plasenta. Penyebab awitan persalinan spontan tidak diketahui, walaupun sejumlah teori menarik telah dikembangkan dan professional perawatan kesehatan mengetahui cara menginduksi persalinan pada kondisi tertentu (Varney, Kriebs dan Gegor, 2007).

Persalinan dan kelahiran normal adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan (37-42 minggu), lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung dalam 24 jam pada primigravida dan 18 jam pada multigravida (Winkjosastro, 2006).

Lama rata-rata gestasi manusia adalah 39,6 minggu dan mayoritas persalinan terjadi antara 38 dan 42 minggu (Steer dan Johnson, 1998). Waktu gestasi yang bervariasi pada kehamilan normal ini mengisyaratkan mekanisme penentuan waktu persalinan tidaklah pasti, mungkin karena hal tersebut dipengaruhi oleh hal eksternal. Janin tampaknya mempertahankan kehamilan secara aktif. Persalinan akan tetap berlangsung setelah janin meninggal, walaupun mungkin tertunda beberapa minggu. Faktor penting

yang memungkinkan kelangsungan hidup ekstra uterus adalah tingkat kematangan paru dan sistem saraf janin yang memadai. Otak janin dapat memantau pematangan ini dan mengendalikan mekanisme penentuan saat persalinan (Coad dan Dunstall, 2006).

Bentuk-bentuk persalinan, yaitu (Bandiyah, 2009):

1. Persalinan spontan

Bila persalinan seluruhnya berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri.

2. Persalinan buatan

Bila proses persalinan dengan bantuan tenaga dari luar, misalnya ekstraksi dengan proses *forceps*, atau dilakukan operasi *section caesaria*.

3. Persalinan anjuran

Bila kekuatan yang diperlukan untuk persalinan ditimbulkan dari luar dengan jalan rangsangan, misalnya dengan amniotomi (pemecahan ketuban), pemberian pitocin atau prostaglandin.

Persalinan dibagi dalam 4 kala, yaitu (Winkjosastro, 2006):

1. Kala I

Dimulai dari saat persalinan mulai sampai pembukaan lengkap (10 cm).

Proses ini terbagi dalam 2 fase, fase laten (8 jam) serviks membuka sampai 3 cm dan fase aktif (7 jam) serviks membuka dari 3 sampai 10 cm. Kontraksi lebih kuat dan sering selama fase aktif.

2. Kala II

Dimulai dari pembukaan lengkap (10 cm) sampai bayi lahir. Proses ini biasanya berlangsung 2 jam pada primi dan 1 jam pada multi.

### 3. Kala III

Dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta, yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit.

### 4. Kala IV

Dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam post partum.

Teori tentang dimulainya persalinan setelah janin cukup bulan, masih merupakan teori yang kompleks dan sulit dicari mana sebenarnya yang paling dominan. Besar kemungkinan adalah semua teori yang dikemukakan oleh para ahli, merupakan satu kesatuan dengan hasil persalinan dapat dimulai. Beberapa teori persalinan adalah (Manuaba, 2008):

1. Teori penurunan kadar keseimbangan estrogen dan progesteron yang menimbulkan *Braxton Hicks*, yang selanjutnya akan bertindak sebagai kontraksi persalinan. Kenyataan menunjukkan bahwa saat menjelang persalinan, tidak terjadi penurunan konsentrasi progesteron.
2. Teori keregangan otot rahim  
Seperti halnya dengan kandung kencing dan lambung, bila dindingnya tegang oleh karena isinya bertambah maka timbul kontraksi untuk mengeluarkan isinya. Demikian pula dengan rahim, maka dengan majunya kehamilan makin teregang otot-otot dan otot-otot rahim makin rentan.
3. Teori janin

Sinyal yang diarahkan kepada maternal sebagai tanda bahwa janin telah siap lahir, belum diketahui dengan pasti. Kenyataan menunjukkan, bila terdapat anomali hubungan hipofisis dan kelenjar suprarenal sangat penting walaupun belum diketahui bentuk sinyalnya.

#### 4. Teori prostaglandin

Menjelang persalinan, diketahui bahwa prostaglandin sangat meningkat pada cairan amnion dan desidua. Prostaglandin dapat melunakkan serviks dan merangsang kontraksi bila diberikan dalam bentuk infus, per os, atau secara intravaginal.

Tanda-tanda persalinan (Kamus Kebidanan, 2009):

##### 1. Keluar lendir bercampur darah

Karena sumbatan yang tebal pada mulut rahim terlepas sehingga menyebabkan keluarnya lendir yang berwarna kemerahan karena bercampur darah.

##### 2. Air ketuban pecah.

Kantung ketuban yang mengelilingi bayi pecah sehingga air ketuban keluar (air ketuban normal adalah cairan yang bersih, jernih dan tidak berbau).

##### 3. Kontraksi yang teratur.

Tidak seperti kontraksi *Braxton hick*, kontraksi timbul secara teratur, mula-mula kontraksi hanya sebentar kemudian bertambah lama dan bertambah kuat, dan kontraksi terjadi simetris di kedua sisi perut mulai

dari bagian atas dekat saluran telur keseluruhan rahim, dan nyeri tidak hilang/kurang dengan istirahat atau elusan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Komplikasi Persalinan**

Sebagian besar kehamilan dan persalinan akan mempunyai hasil yang menggembirakan yaitu ibu dan bayi lahir sehat. Namun sebagian ibu hamil akan menghadapi kegawatan dengan derajat ringan sampai berat yang dapat memberikan bahaya terjadinya ketidaknyamanan, ketidakpuasan, kesakitan, kecacatan bahkan kematian bagi ibu dan atau bayinya, terutama pada kelompok ibu hamil risiko tinggi, maupun ibu hamil risiko rendah yang mengalami komplikasi pada persalinan.

Besarnya kemungkinan terjadinya komplikasi persalinan pada setiap ibu tidak sama, tergantung keadaan selama kehamilan apakah ibu hamil tersebut tanpa masalah termasuk kelompok kehamilan risiko rendah, atau ibu hamil dengan masalah/faktor risiko, yaitu kehamilan risiko tinggi dan kehamilan risiko sangat tinggi.

Selama kehamilan, persalinan dan nifas, kedua kelompok tersebut membutuhkan perhatian yang sama, untuk melakukan pencegahan dan pengenalan dini terjadinya komplikasi persalinan (Komplikasi obstetrik). Selanjutnya apabila memang terjadi komplikasi obstetrik maka dapat ditemukan dini dan segera ditangani, atau diberikan pertolongan pertama sebagai persiapan rujukan ke tempat dimana pertolongan dapat diberikan

secara adekuat dan komprehensif/tuntas, yaitu ke Puskesmas dengan Rawat Inap atau Rumah Sakit Kabupaten.

Komplikasi persalinan adalah semua masalah yang membahayakan ibu yang terjadi selama persalinan sampai dengan masa nifas. Sebagian komplikasi persalinan, kejadiannya tidak dapat diduga sebelumnya ataupun tidak dapat dihindari. Komplikasi yang sering terjadi adalah perdarahan pasca persalinan (perdarahan PP), persalinan macet/persalinan lama serta infeksi (Rochjati, 2003).

#### 1. Perdarahan Post partum

Istilah pendarahan post partum digunakan apabila pendarahan setelah anak lahir melebihi 500 ml (Prawirohardjo, 2005).

Pada periode pasca persalinan, sulit untuk menentukan terminologi berdasarkan batasan kala persalinan yang terdiri dari 1 hingga 4. Definisi perdarahan pascapersalinan adalah perdarahan yang melebihi 500 ml. Kondisi dalam persalinan menyebabkan kesulitan untuk menentukan jumlah perdarahan yang terjadi karena bercampur dengan air ketuban dan serapan pakaian atau kain alas tidur.

Oleh sebab itu, maka batasan operasional untuk periode pasca persalinan adalah setelah bayi lahir. Sedangkan tentang jumlah perdarahan, disebutkan sebagai perdarahan yang lebih dari normal di mana telah menyebabkan perubahan tanda vital (pasien mengeluh lemah, limbung, berkeringat dingin, menggigil, hiperpnea, sistolik <90 mmHg, nadi >100 x/mnt dan kadar Hb <8 g%) (Winkjosastro, 2006).



a. Klasifikasi klinis pendarahan postpartum (Ambarawati dan Wulandari, 2009):

1) Pendarahan post partum primer (*early postpartum hemorrhage*) yang terjadi pada 24 jam pertama.

Penyebab pendarahan postpartum primer adalah atonia uteri, retensio plasenta, sisa-sisa plasenta, laserasi jalan lahir dan inversio uteri.

2) Pendarahan postpartum sekunder (*late postpartum hemorrhage*) yang terjadi setelah 24 jam.

Penyebab pendarahan postpartum sekunder adalah sub involusio, retensi sisa plasenta, infeksi nifas.

b. Diagnosis pendarahan postpartum:

Diagnosis biasanya tidak sulit, terutama apabila timbul pendarahan banyak dalam waktu pendek. Tetapi bila pendarahan sedikit dalam waktu lama, tanpa disadari penderita telah kehilangan banyak darah sebelum ia tampak pucat. Nadi serta pernapasan menjadi lebih cepat dan tekanan darah menurun. Seorang wanita hamil yang sehat dapat kehilangan darah sebanyak 10% dari volume total tanpa mengalami gejala-gejala klinik, gejala-gejala baru tampak pada kehilangan darah 20%. Jika perdarahan berlangsung terus, dapat timbul syok. Diagnosis perdarahan postpartum dipermudah apabila pada tiap-tiap persalinan setelah anak lahir secara rutin diukur pengeluaran darah dalam kala III dan satu jam sesudahnya.

c. Komplikasi perdarahan pasca persalinan

Di samping menyebabkan kematian, perdarahan postpartum memperbesar kemungkinan infeksi puerperal karena daya tahan penderita berkurang. Pendarahan banyak kelak bisa menyebabkan sindroma Sheehan sebagai akibat nekrosis pada hipofisis pars anterior sehingga terjadi insufisiensi bagian tersebut. Gejalanya-gejalanya ialah asthenia, hipotensi, anemia, turunnya berat badan sampai menimbulkan kakeksia, penurunan fungsi seksual dengan atrofi alat-alat genital, kehilangan rambut pubis dan ketiak, penurunan metabolisme dengan hipotensi, amenore dan kehilangan fungsi laktasi (Winkjosastro, 2006).

d. Penyebab perdarahan post partum

1) Atonia uteri

Atonia uteri adalah keadaan lemahnya tonus/kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir (Winkjosastro, 2008).

Pendarahan postpartum dapat terjadi bila uterus atonik atau tidak dapat berkontraksi dengan baik setelah kelahiran. Tujuan asuhan adalah melahirkan plasenta, bila *in situ*, dan meyakinkan bahwa uterus berkontraksi baik. Faktor risiko meliputi polihidramniom, kehamilan ganda, paritas tinggi, persalinan lama/induksi/augmentasi, kelahiran instrumental, hipertensi akibat

kehamilan, abrupsio plasenta, plasenta previa dan perdarahan postpartum sebelumnya (Chapman, 2006).

Perdarahan oleh karena atonia uteri dapat dicegah dengan (Winkjosastro, 2006):

- a) Melakukan secara rutin manajemen aktif kala III pada semua wanita yang bersalin karena hal ini dapat menurunkan insidens perdarahan pasca persalinan akibat atonia uteri.
  - b) Pemberian misoprostol peroral 2-3 tablet (400-600 µg) segera setelah bayi lahir.
- 2) Robekan jalan lahir

Robekan jalan lahir merupakan penyebab tersering kedua hemoragi pasca partum. Robekan dapat menyertai atonik uterus. Pendarahan pascapartum dengan uterus yang berkontraksi biasanya disebabkan oleh robekan serviks atau vagina.

Untuk komplikasi ini, biasanya kejadiannya tidak terduga. Dalam waktu yang cepat, bidan harus melakukan tindakan penyelamatan sebelum ia mengalami syok *hypovolemik*. Deteksi yang dapat dilakukan adalah senantiasa siaga ketika melakukan pertolongan persalinan. Bidan dapat melakukan beberapa pengkajian yang dapat mendukung ke arah kemungkinan terjadinya komplikasi robekan jalan lahir (Pamilih, 2005).

- 3) Retensio plasenta

Apabila plasenta belum lahir dalam waktu setengah jam setelah janin lahir, hal itu dinamakan retensio plasenta. Sebab-sebabnya ialah (Winkjosastro, 2006):

- a) Plasenta belum lepas dari dinding uterus;
- b) Plasenta sudah lepas, akan tetapi belum dilahirkan.

Jika plasenta belum lepas sama sekali, tidak terjadi pendarahan; jika lepas sebagian, terjadi perdarahan yang merupakan indikasi untuk mengeluarkannya. Plasenta belum lepas dari dinding uterus karena (Winkjosastro, 2006):

- (1) Kontraksi uterus kurang kuat untuk melepaskan plasenta (plasenta adhesive).
- (2) Plasenta melekat erat pada dinding uterus oleh sebab villi korialis menembus desidua sampai miometrium sampai di bawah peritoneum (plasenta akreta).

Plasenta yang sudah lepas dari dinding uterus akan tetapi belum keluar, disebabkan oleh tidak adanya usaha untuk melahirkan atau salah penanganan kala III, sehingga terjadi lingkaran konstiksi pada bagian bawah uterus yang menghalangi keluarnya plasenta (inkarserasio plasenta) (Winkjosastro, 2006).

- 4) Tinggalnya sebagian plasenta (sisa plasenta)

Penemuan secara dini, hanya dimungkinkan dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan plasenta setelah dilahirkan. Pada kasus sisa plasenta dengan perdarahan pasca persalinan lanjut, sebagian

besar pasien-pasien akan kembali lagi ke tempat bersalin dengan keluhan perdarahan setelah 6-10 hari pulang ke rumah dan subinvolusi uterus (Winkjosastro, 2006).

#### 5) Inversio uteri

Pada inversio uteri bagian atas uterus memasuki kavum uteri, sehingga fundus uteri sebelah dalam menonjol ke dalam kavum uteri. Peristiwa ini jarang sekali ditemukan, terjadi tiba-tiba dalam kala III atau segera setelah plasenta keluar (Winkjosastro, 2006).

Inversio uteri pada waktu persalinan biasanya disebabkan oleh kesalahan dalam memberi pertolongan pada kala III. Kejadian inversio uteri sering disertai dengan adanya syok. Perdarahan merupakan faktor terjadinya syok, tetapi tanpa terjadinya perdarahan syok tetap dapat terjadi karena tarikan kuat pada peritoneum, kedua *ligamentum infundibulo-pelvikum*, serta *ligamentum rotundum*. Syok dalam hal ini lebih banyak bersifat neurogenik. Pada kasus ini, tindakan operasi biasanya lebih dipertimbangkan, meskipun tidak menutup kemungkinan dilakukan reposisi uteri terlebih dahulu (Pamilih, 2005).

#### 2. Persalinan lama

Persalinan dikatakan lama jika berlangsung lebih dari 24 jam untuk primigravida dan atau 18 jam bagi multigravida. Persalinan harus

dikatakan lama jika terjadi keterlambatan 2-3 jam di belakang partogram normal. Definisi ini menarik perhatian yang lebih dini terhadap terjadinya abnormalitas (Liu, 2007).

Persalinan yang lama disebabkan oleh (Liu, 2007):

- a. Kontraksi (*power*) abnormal.
- b. Defisiensi/keterlambatan dilatasi (*passage*) serviks.
- c. Abnormalitas penurunan bagian presentasi janin (*passenger*).

Akibat persalinan yang lama, yaitu (Liu, 2007):

- a. Pada janin:

Akibat untuk janin meliputi trauma, asidosis, kerusakan hipoksik, infeksi dan peningkatan morbiditas perinatal.

- b. Pada ibu:

Akibat untuk ibu adalah penurunan semangat, kelelahan, dehidrasi, asidosis, infeksi dan risiko ruptur uterus. Perlunya intervensi bedah meningkatkan mortalitas dan morbiditas. Ketoasidosis dengan sendirinya dapat mengakibatkan aktivitas uterus yang buruk dan memperlama persalinan.

## 2. Infeksi

Infeksi nifas mencakup semua peradangan yang disebabkan oleh masuknya kuman-kuman ke dalam alat genital pada waktu persalinan dan nifas. Menurut John Committee on Maternal Welfare (Amerika Serikat),

definisi *morbidity puerperalis* adalah kenaikan suhu sampai 38<sup>0</sup>C atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama postpartum, dengan mengecualikan hari pertama. Suhu harus diukur dari mulut setidaknya 4 kali sehari.

Nifas adalah masa sesudah melahirkan. Hal paling membahayakan pada masa ini adalah jika organ reproduksi terkena infeksi bakteri. Ini bisa mengancam hidup ini, bahkan bisa membawa kepada kematian.

Gejala klinis tergantung keganasan kumannya serta masa inkubasi. Gejalanya ada reaksi radang seperti suhu tubuh naik (panas tinggi) dan badan terasa nyeri, menggigil dan nafsu makan menurun. Kemudian keluarlah nanah yang berbau dari vagina/jalan lahir. Jika berlanjut, kuman bisa masuk dalam aliran darah dan terjadi sepsis sehingga harapan hidup si ibu kemungkinan sangat kecil (Lamadhah, 2009).

### **C. Tinjauan Umum Tentang Usia Ibu**

Usia ibu sangat berpengaruh dalam suatu kehamilan dan persalinan. Dalam kurun reproduksi sehat dianjurkan agar usia ibu hamil antara 20-30 tahun karena dianggap paling ideal untuk menjalani kehamilan, persalinan dan nifas. Dientang usia ini kondisi wanita dalam keadaan prima dan optimal sehingga ibu dan bayinya berada dalam keadaan sehat. Disamping itu, rahim sudah mampu memberi perlindungan yang maksimal untuk kehamilan. Umumnya secara mentalpun siap yang berdampak pada perilaku merawat dan menjaga kehamilannya secara hati-hati (<http://www.Repository.usu.ac.id>, diakses pada tanggal 26 april 2010).

Umur ibu < 20 tahun belum cukup matang dalam menghadapi kehidupan sehingga belum siap secara fisik dan mental dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. Pada umur tersebut rahim dan panggul ibu belum berkembang dengan baik hingga perlu diwaspadai kemungkinan mengalami persalinan yang sulit dan keracunan kehamilan atau gangguan lain karena ketidaksiapan ibu untuk menerima tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua.

Pengawasan pada ibu hamil dengan usia di bawah 18 tahun perlu diperhatikan karena sering terjadi anemia, hipertensi menuju preeklamsia/eklamsia, persalinan dengan berat badan lahir rendah, kehamilan disertai infeksi dan penyulit proses persalinan yang diakhiri dengan tindakan operasi. Aspek sosial yang sering menyertai ibu hamil dengan usia muda adalah kehamilan yang belum diinginkan, kecanduan obat dan atau perokok, arti dan manfaat *antenatal care* yang kurang diperhatikan. Aspek sosial dapat menimbulkan kesulitan tumbuh kembang janin dan penyulit saat proses persalinan berlangsung (<http://www.pdf-searc-engine.com>, diakses pada tanggal 26 April 2010).

Sedangkan usia tua atau >30 tahun sebagian wanita digolongkan pada kehamilan berisiko tinggi. Di kurun usia ini, angka kematian ibu melahirkan dan bayi meningkat. Meskipun ada beberapa referensi yang mengatakan bahwa usia 35 tahun masih dianggap cukup aman untuk hamil dan melahirkan karena merupakan masa transisi.

Dr. Delyuzar, Dokter ahli patologi mengungkapkan bahwa, proses melahirkan pada perempuan berusia di atas 30 tahun berisiko



menyebabkan terjadinya pendarahan. Biasanya, kondisi ini rentan terjadi pada ibu-ibu yang melahirkan anak pertama atau bagi ibu yang melahirkan anak ketiga atau keempat. Pada usia tersebut rahim sudah mulai kaku. Sederhananya peregangan rahim sudah tak fleksibel lagi, sehingga dapat menyebabkan pendarahan. Namun, tak semua perempuan yang memahami hal tersebut, sehingga banyak kasus perempuan hamil di usia di atas 30 tahunan tak begitu peduli dengan kehamilannya. Padahal sebaiknya, kehamilan di rentang usia tersebut memerlukan pengontrolan yang tepat ke dokter-dokter kandungan selama masa kehamilannya. Dengan begitu dokter dapat mengarahkan si ibu hamil untuk menjaga kehamilannya. World Health Organisation (WHO) memberikan rekomendasi, bahwa usia yang dianggap paling aman menjalani kehamilan dan persalinan adalah 20 hingga 30 tahun (<http://eprints.undip.ac.id>, diakses pada tanggal 1 April 2010 ).

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2003) yang mengatakan bahwa umur ibu yang <20 tahun atau >30 tahun dikenal sebagai ibu dengan risiko tinggi sebagai salah satu batasan kelompok risiko ibu. Ibu yang berumur <20 tahun dianggap berisiko karena organ reproduksinya dianggap belum begitu sempurna/siap untuk menerima kehamilan, disamping secara kewajiban ibu muda relative belum siap untuk hamil. Sedangkan ibu yang berumur diatas 30 tahun, dianggap sudah terlalu tua, sehingga secara fisik sudah lemah untuk menanggung beban kehamilan, ditambah apabila ibu dengan paritas banyak, maka secara mental penghargaan terhadap kehadiran anak agak berkurang.

Semakin bertambah usia, semakin sulit hamil karena sel telur yang siap dibuahi semakin sedikit. Selain itu, kualitas sel telur juga semakin menurun. Itu sebabnya, pada kehamilan pertama di usia lanjut, risiko perkembangan janin tidak normal dan timbulnya penyakit kelainan bawaan juga tinggi, terutama sindroma Down.

Meningkatnya usia juga membuat kondisi dan fungsi rahim menurun. Salah satu akibatnya adalah jaringan rahim tak lagi subur. Padahal, dinding rahim tempat menempelnya plasenta. Kondisi ini memunculkan kecenderungan terjadinya plasenta previa atau plasenta tidak menempel di tempat semestinya. Selain itu, jaringan rongga panggul dan otot-ototnya pun melemah sejalan pertambahan usia. Hal ini membuat rongga panggul tidak mudah lagi menghadapi dan mengatasi komplikasi yang berat, seperti perdarahan. Pada keadaan tertentu, kondisi hormonalnya tidak seoptimal usia sebelumnya. Itu sebabnya, risiko keguguran, kematian janin, dan komplikasi lainnya juga meningkat (<http://eprints.undip.ac.id>, diakses pada tanggal 1 April 2010 ).

Dalam 3 dekade terakhir, terdapat kenaikan jumlah wanita yang memilih untuk menunda memiliki anak hingga berusia 35 – 40 tahun. Hal ini berhubungan dengan meningkatnya penurunan kesuburan dan risiko keguguran, namun hal ini dapat diimbangi dengan kemajuan dalam pengobatan reproduksi. (<http://www.Repository.usu.ac.id>, diakses pada tanggal 26 april 2010).

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Paritas**

Paritas secara luas mencakup gravida/jumlah kehamilan, prematur/jumlah kelahiran, dan abortus/jumlah keguguran. Sedang dalam arti khusus yaitu jumlah atau banyaknya anak yang dilahirkan. Paritas dikatakan tinggi bila seorang ibu/wanita melahirkan anak ke empat atau lebih. Seorang wanita yang sudah mempunyai tiga anak dan terjadi kehamilan lagi keadaan kesehatannya akan mulai menurun, sering mengalami kurang darah (anemia), terjadi perdarahan lewat jalan lahir dan letak bayi sungsang ataupun melintang (<http://digilib.unnes.ac.id>, pada tanggal 19 Maret 2010).

Paritas merupakan jumlah persalinan yang dialami oleh ibu. Paritas terdiri atas 3 kelompok yaitu:

1. Golongan primipara adalah golongan ibu dengan 0-1 paritas,
2. Golongan multipara adalah golongan ibu dengan paritas 2-6 dan
3. Golongan grande multipara adalah golongan ibu dengan paritas >6

Grande multipara kemunduran daya lentur (elastisitas) jaringan yang sudah berulang kali diregangkan oleh kehamilan membatasi kemampuan berkerut untuk menghentikan perdarahan sesudah persalinan. Disamping itu banyak pula dijumpai tidak cukupnya tenaga untuk mengeluarkan janin yang disebut dengan merits uteri. Keadaan ini akan lebih buruk lagi pada kasus dengan jarak kehamilan yang singkat.

Paritas satu dan paritas tinggi (lebih dari tiga) mempunyai angka kejadian perdarahan pascapersalinan lebih tinggi. Pada paritas yang rendah (paritas satu), ketidaksiapan ibu dalam menghadapi persalinan yang pertama

merupakan faktor penyebab ketidakmampuan ibu hamil dalam menangani komplikasi yang terjadi selama kehamilan, persalinan dan nifas (<http://www.scribd.com>, diakses pada tanggal 17 Maret 2010).

Paritas 2-3 merupakan paritas paling aman ditinjau dari sudut kematian maternal dan paritas tinggi (>4) mempunyai angka kematian maternal tinggi. Resiko pada paritas 1 dapat ditangani dengan asuhan obstetrik lebih baik, sedangkan resiko pada paritas tinggi dapat dikurangi dan dicegah dengan KB. Sebagian kehamilan pada paritas tinggi sering terjadi pendarahan pada saat melahirkan (<http://www.Repository.usu.ac.id>, diakses pada tanggal 23 Maret 2010).

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Jarak Kehamilan**

Menurut anjuran yang dikeluarkan oleh badan koordinasi keluarga berencana (BKKBN) jarak kelahiran yang ideal adalah 2 tahun atau lebih, karena jarak kelahiran yang pendek akan menyebabkan seorang ibu belum cukup untuk memulihkan kondisi tubuhnya setelah melahirkan sebelumnya. Ini merupakan salah satu faktor penyebab kelemahan dan kematian ibu serta bayi yang dilahirkan. Menurut Sitorus, (1999:16), bahwa risiko proses reproduksi dapat ditekan apabila jarak minimal antara kelahiran 2 tahun (<http://digilib.unnes.ac.id>, diakses pada tanggal 19 Maret 2010).

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. al-Ahqaaf (46): 15, yaitu:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۖ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ

عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥١﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفَصَّلُهِ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٥٢﴾

Terjemahnya:

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai, berilah kebaikan kepadaku dengan (member kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang yang berserah diri".

Ayat diatas bagaikan menyatakan: Sesungguhnya kami telah memerintahkan manusia, siapapun manusia itu selama dia benar-benar manusia agar taat kepada kami sepanjang hidup mereka dan kami telah mewasiatkan yakni memerintahkan dan berpesan kepada manusia itu juga dengan wasiat yang baik yaitu agar berbuat baik dan berbakti terhadap kedua orang tuanya siapapun dan apapun agama kepercayaan atau sikap dan kelakuan orang tuanya. Ini antara lain karena ayahnya terlibat dalam kejadiannya dan sang ayah mencampakkan sperma dalam rahim ibunya, sang ibu mengandungnya dengan susah payah, sambil mengalami aneka kesulitan bermula dari mengidam, dengan aneka gangguan fisik dan psikis dan melahirkannya dengan susah payah setelah berlalu masa kehamilan.

Penggalan ayat diatas yang menyatakan “ kandungan dan penyapihannya adalah tiga puluh bulan” mengisyaratkan bahwa masa kandungan adalah minimal enam bulan (Shihab, 2002).

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah(2): 233, yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Para ibu hendanya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya dan janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas menjelaskan bahwa sejak kelahiran hingga dua tahun penuh, para ibu diperintahkan untuk menyusukan anak-anaknya. Dua tahun adalah batas maksimal dalam kesempurnaan penyusuan. Penyusuan yang selama dua tahun itu, walaupun diperintahkan tetapi bukanlah kewajiban. Ini dipahami

dari penggalan ayat yang menyatakan “bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” (Shihab: 2002).

Kalau seorang wanita memberikan ASI secara sempurna hingga 2 tahun, artinya dia tidak hamil selama dalam proses tersebut. Kehamilan itu sendiri membutuhkan sebuah perjuangan yang akan merepotkan seorang ibu dalam menyapih bayinya. Setelah 2 tahun barulah seorang ibu boleh hamil kembali dan proses kehamilan itu sendiri membutuhkan waktu hingga 9 bulan, berarti jarak yang ideal bagi seorang ibu untuk mempunyai anak (melahirkan) adalah 2 tahun 9 bulan ([www. Mulyadinurdin. Wordpress. com](http://www.Mulyadinurdin.Wordpress.com), diakses tanggal 21 Agustus 2010).

Juga dijelaskan bahwa diwajibkanlah kepada seorang ayah menanggung kebutuhan hidup istrinya berupa makanan dan pakaian, dengan tujuan sang ibu bisa melakukan kewajibannya terhadap bayinya dengan sebaik-baiknya serta menjaga diri dan bayinya dari serangan penyakit. Jatuhnya kewajiban memberikan kebutuhan hidup sehari-hari bagi istri, dikarenakan anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak itu lahir untuk ayahnya, nama ayah pun akan disandang oleh sang anak, yakni dinisbahkan kepada ayahnya ([www.idb4.wikispaces.com](http://www.idb4.wikispaces.com), diakses pada tanggal 15 Juni 2010).

ayat diatas menjelaskan bahwa seorang ibu hendaknya menyusukan anaknya selama dua tahun, walaupun tidak diwajibkan tetapi sangat ditekankan. Menyusui selama dua tahun penuh dapat digunakan untuk mengatur jarak kehamilan karena jarak kehamilan yang ideal adalah 2-3

tahun. Dan seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada istrinya agar ia dapat melakukan kewajibannya sebagai seorang ibu dengan sebaik-baiknya.

Risiko terhadap kematian ibu dan anak meningkat jika jarak antara dua kehamilan <2 tahun atau >4 tahun. Jarak kehamilan yang aman ialah antara 2-4 tahun. Jarak antara dua kehamilan yang <2 tahun berarti tubuh ibu belum kembali ke keadaan normal akibat kehamilan sebelumnya sehingga tubuh ibu akan memikul beban yang lebih berat. Jarak kelahiran anak sebelumnya kurang dari 2 tahun, rahim dan kesehatan ibu belum pulih dengan baik, kehamilan dalam keadaan ini perlu diwaspadai karena adanya kemungkinan pertumbuhan janin yang kurang baik, mengalami persalinan yang lama dan perdarahan postpartum. Sebaliknya jika jarak kehamilan antara dua kehamilan >4 tahun, disamping usia ibu yang sudah bertambah juga mengakibatkan persalinan berlangsung seperti kehamilan dan persalinan pertama (<http://www.Repositori.usu.ac.id>, diakses pada tanggal 23 Maret 2010).

#### **F. Tinjauan Umum Tentang Kelengkapan Pelayanan ANC**

Pelayanan *antenatal care* adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga professional untuk ibu selama masa kehamilannya yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Pelayanan antenatal merupakan upaya penting untuk menjaga kesehatan ibu pada masa kehamilan sekaligus merupakan tempat melakukan konseling gizi dan pemantauan terhadap kenaikan berat badan semasa hamil (<http://www.Repositori.usu.ac.id>, diakses pada tanggal 23 Maret 2010).



Pelayanan Antenatal merupakan salah satu program kegiatan dari program kesehatan ibu dan anak, pelayanan ini bisa dilaksanakan oleh bidan di Poliklinik, BPS, dan Rumah Sakit. Selain itu, pelayanan antenatal juga bisa diberikan pada waktu pelaksanaan Posyandu, di tempat praktik dokter, di rumah bersalin atau di Puskesmas. Pelayanan antenatal diberikan selama masa hamil secara berkala sesuai dengan pedoman pelayanan antenatal yang telah ditentukan untuk memelihara serta meningkatkan selama hamil sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menyelesaikan kehamilan dengan baik dan melahirkan bayi sehat. Pelayanan antenatal yang berkualitas dimulai dari pelayanan di tempat pendaftaran, pelayanan kesehatan, meliputi anamneses, pelayanan fisik maupun laboratorium, penyuluhan perorangan atau konseling sampai dengan pelayanan obat dan atau rujukan. Proses pelayanan tersebut dipengaruhi tenaga professional, dana, sarana dan prosedur kerja yang tersedia agar mendapat kualitas yang baik .

Bidan memberikan sedikitnya 4 kali pelayanan Antenatal selama masa hamil. Pelayanan meliputi anamnesa dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung normal. Bidan juga harus mengenal kehamilan resiko tinggi atau adanya kelainan, khususnya anemia, kurang gizi, hipertensi, penyakit menular seksual (PMS) dan infeksi HIV/AIDS, memberikan pelayanan imunisasi, konseling dan penyuluhan kesehatan. Bidan juga harus mencatat data yang tepat untuk setiap kunjungan. Bila ditemukan kelainan, bidan harus mampu mengambil tindakan yang diperlukan dan melakukan rujukan (Sulistyawati, 2009).

Menurut Abdul Bari Saifuddin, kunjungan antenatal untuk pemantauan dan pengawasan kesejahteraan ibu dan anak minimal empat kali selama kehamilan dalam waktu sebagai berikut: kehamilan trimester pertama (<14 minggu) satu kali kunjungan, kehamilan trimester kedua (14-28 ) satu kali kunjungan dan kehamilan trimester ketiga (28-40) dua kali kunjungan. Walaupun demikian, disarankan kepada ibu hamil untuk memeriksa kehamilannya dengan jadwal sebagai berikut: sampai dengan kehamilan 28 minggu periksa empat minggu sekali, kehamilan 28-36 minggu perlu pemeriksaan dua minggu sekali, kehamilan 36-40 minggu satu minggu sekali. Bila ada masalah atau gangguan kehamilannya, ibu segera menemui petugas kesehatan profesional (bidan atau dokter) untuk penanganan lebih lanjut ( Salmah, at al, 2006).

Pelayanan/ asuhan standar minimal termasuk 7 T (Nugraheny, 2009), yaitu:

1. (Timbang) berat badan
2. Ukur ( Tekanan darah )
3. Ukur (Tinggi fundus uteri)
4. Pemberian imunisasi ( Tetanus Toxoid) TT lengkap
5. Pemberian (Tablet zat besi), minimum 90 tablet selama kehamilan.
6. (Tes) terhadap penyakit menular seksual
7. (Temu) wicara dalam rangka persiapan rujukan

Adapun tujuan dari pemeriksaan kehamilan yang disebut dengan Ante Natal Care (ANC) tersebut adalah (Maulana, 2008):

1. Memantau kemajuan kehamilan.
2. Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik dan mental ibu, karena dalam melakukan pemeriksaan kehamilan, petugas kesehatan (bidan atau dokter) akan selalu memberikan saran dan informasi yang sangat berguna bagi ibu dan janinnya.
3. Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan dengan melakukan pemeriksaan pada ibu hamil dan janinnya
4. Mempersiapkan ibu agar dapat melahirkan dengan selamat.
5. Mempersiapkan agar masa nifas berjalan normal.
6. Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima bayi.

Karena manfaat memeriksakan kehamilan sangat besar, maka dianjurkan kepada ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya secara rutin di tempat pelayanan kesehatan terdekat.

### **BAB III**

#### **KERANGKA KONSEP**

##### **A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti**

Ibu hamil merupakan golongan yang sangat rentang terhadap berbagai komplikasi persalinan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berasal dari diri ibu maupun yang berasal dari luar ibu. Atas dasar inilah peneliti mencoba melakukan penelitian dengan menganalisis Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian komplikasi persalinan.

##### **1. Umur ibu**

Umur yang paling ideal bagi seorang wanita untuk hamil dan melahirkan adalah 20-30 tahun. Apabila seorang wanita hamil pada umur <20 tahun memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami komplikasi kehamilan, karena secara fisik tubuh wanita belum sepenuhnya siap untuk menghadapi kehamilan dan menerima hasil konsepsi khususnya pada alat reproduksinya. Sedangkan, apabila seorang wanita mengalami kehamilan pada umur >30 tahun dianggap terlalu tua sehingga secara fisik sudah lemah untuk menanggung beban kehamilan sehingga memberikan kontribusi yang besar terhadap meningkatnya jumlah kejadian komplikasi persalinan.

##### **2. Paritas ibu**

Paritas 2 dan 3 merupakan kehamilan yang aman bagi seorang ibu untuk hamil dan melahirkan, sedangkan paritas >3 memberikan risiko

mengalami komplikasi persalinan lebih besar dari pada ibu dengan paritas rendah. Disamping itu, paritas tidak hanya menyebabkan komplikasi persalinan tapi juga kematian perinatal 4,5 kali.


### 3. Jarak kehamilan

Jarak kehamilan yang aman ialah antara 2-4 tahun. Risiko terhadap kematian ibu dan anak meningkat jika jarak antara dua kehamilan  $< 2$  tahun atau  $> 4$  tahun. Jarak antara dua kehamilan yang  $< 2$  tahun berarti tubuh ibu belum kembali ke keadaan normal akibat kehamilan sebelumnya, sebaliknya jika jarak kehamilan antara dua kehamilan  $> 4$  tahun, disamping usia ibu yang sudah bertambah juga mengakibatkan persalinan berlangsung seperti kehamilan dan persalinan pertama.

### 4. Kelengkapan Pelayanan ANC

Pelayanan antenatal adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu semasa kehamilannya sesuai dengan standar pelayanan antenatal seperti yang ditetapkan dalam buku Pedoman Pelayanan Antenatal bagi Petugas Puskesmas. Pelayanan antenatal diberikan dengan tujuan untuk mempersiapkan ibu agar berada pada keadaan yang normal sampai pada saat persalinan, sehingga kesulitan yang mungkin terjadi selama kehamilan dapat dikurangi dan dapat di deteksi sedini mungkin. Pelayanan antenatal harusnya diperoleh ibu hamil secara lengkap yaitu sebanyak 4 kali yaitu 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga.

## B. Bagan Pola Pikir Variabel Yang Diteliti



## C. Defenisi Operasional dan Kriteria Objektif

### 1. Kejadian komplikasi persalinan

Yang dimaksud dengan kejadian komplikasi persalinan adalah semua penyulit yang mengganggu selama proses persalinan seperti pendarahan post partum, partus lama, dan adanya infeksi pada saat persalinan berdasarkan catatan rekam medik.

Kriteria Objektif:

Ada komplikasi : Bila ibu menderita salah satu penyulit persalinan yang mengganggu selama proses persalinan

Tidak ada komplikasi : bila ibu tidak menderita salah satu penyulit persalinan yang mengganggu selama persalinan

## 2. Usia Ibu

Yang dimaksud dengan usia ibu adalah usia ibu pada waktu hamil dan melahirkan yaitu 20-30 tahun.

Kriteria Objektif:

Risiko rendah : bila umur ibu pada waktu hamil dan melahirkan <20 tahun atau >30 tahun.

Risiko tinggi : bila umur ibu pada waktu hamil dan melahirkan 20-30 tahun.

## 3. Paritas Ibu

Yang dimaksud dengan paritas ibu adalah jumlah persalinan yang dialami oleh ibu, baik lahir hidup maupun lahir mati.

Kriteria Objektif :

Risiko rendah : paritas 2 dan 3

Risiko tinggi : paritas 1 dan  $\geq 4$

## 4. Jarak Kehamilan

Yang dimaksud dengan jarak kehamilan dalam penelitian ini adalah Interval persalinan sebelumnya dengan awal kehamilan terakhir.

Kriteria Objektif :

Risiko rendah : 2 – 4 tahun

Risiko tinggi : <2 tahun atau >4 tahun

## 5. Pemanfaatan Pelayanan ANC

Yang dimaksud dengan pemanfaatan pelayanan ANC pada penelitian ini adalah ibu yang melakukan pemeriksaan selama masa kehamilannya yaitu mulai dari trimester I, trimester II dan trimester III yang diambil dari catatan medik pasien.

Kriteria Objektif :

Tidak lengkap : Bila ibu melakukan pemeriksaan ANC  $<4$  kali selama masa kehamilannya yaitu satu kali pada trimester I, satu kali pada trimester II dan dua kali pada trimester III.

Lengkap : Bila ibu melakukan pemeriksaan ANC  $\geq 4$  kali selama masa kehamilannya yaitu satu kali pada trimester I, satu kali pada trimester II dan dua kali pada trimester III.



## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Hal ini dimaksud untuk melihat hubungan antara umur, paritas, jarak kehamilan dan kelengkapan pelayanan ANC terhadap kejadian komplikasi persalinan.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di RSIA Siti Fatimah Makassar yang terletak di Jl. Gunung Merapi No. 75 Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dilaksanakan tanggal 05 Juli 2010 sampai tanggal 16 Juli 2010.

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu bersalin yang terdaftar di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009 sebanyak 3.998 orang.

## 2. Sampel

Sampel penelitian adalah semua ibu bersalin yang mengalami komplikasi persalinan di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009 sebanyak 220 orang.

### D. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling dimana variabel dependen adalah kejadian komplikasi persalinan dan variabel independennya adalah usia, paritas ibu, kelengkapan pelayanan ANC dan jarak kehamilan.

### E. Teknik pengumpulan data

Data yang dikumpulkan yaitu data yang diperoleh dari buku pencatatan dan pelaporan di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009.

### F. Pengolahan dan penyajian data

Pengolahan data dilakukan secara manual dengan menggunakan kalkulator berdasarkan variabel yang diteliti.

### G. Analisa data

Data dapat di analisa dengan menggunakan presentasi berdasarkan rumus (Sugiono, 2005):

$$P = \frac{f}{N} \times 100$$

Keterangan:

P = presentasi data yang dicari

f = frekuensi faktor variabel

N = jumlah sampel

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar tentang faktor yang berhubungan dengan kejadian komplikasi persalinan yang meliputi usia ibu, paritas ibu, jarak kehamilan dan kelengkapan pelayanan ANC. Pengumpulan data mulai dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2010 sampai tanggal 16 Juli 2010. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data pada bagian rekam medik tahun 2009. Dari hasil pengumpulan data didapatkan sampel sebanyak 220 ibu yang mengalami komplikasi persalinan. Data yang terkumpul kemudian diolah dan hasilnya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian dengan hasil sebagai berikut:

##### 1. Jenis Komplikasi Persalinan

Jenis komplikasi persalinan dalam penelitian ini terdiri atas 5 yaitu perdarahan, partus lama, Ketuban Pecah Dini (KPD), pre-eklampsia dan eklampsia.

Jenis-jenis komplikasi persalinan yang diderita oleh ibu bersalin bermacam-macam. Distribusi ibu bersalin menurut jenis komplikasi persalinan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1  
Distribusi Ibu Bersalin Menurut Jenis Komplikasi Persalinan  
di RSIA Siti Fatimah Makassar  
Tahun 2009

Jenis Komplikasi Persalinan	Frekuensi	Persentase
Perdarahan	29	13, 18
Partus lama	56	25, 45
KPD	43	19, 55
Pre-eklampsia	77	35
Eklampsia	15	6, 82
Total	220	100

Sumber: Rekam Medik RSIA Siti Fatimah Makassar, 2009

Tabel 1 menunjukkan bahwa jenis komplikasi persalinan yang paling banyak adalah pre-eklampsia yaitu 77 orang (35%) dan yang paling sedikit adalah eklampsia yaitu sebanyak 15 orang (6, 82%).

## 2. Umur Ibu

Umur ibu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah umur ibu pada saat melahirkan dalam kurun waktu 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 yang dikelompokkan dalam dua kategori yaitu kelompok umur berisiko rendah yaitu 20-30 tahun, sedangkan kelompok umur yang berisiko tinggi yaitu <20 tahun dan >30 tahun.

Distribusi kejadian komplikasi persalinan menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2  
Distribusi Kejadian Komplikasi Persalinan Berdasarkan Kelompok Umur Ibu di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009

Umur	Frekuensi	Persentase
<20 dan >30 tahun	114	51, 82
20-30 tahun	106	48, 18
Jumlah	220	100

Sumber: Rekam Medik RSIA Siti Fatimah Makassar, 2009

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa dari 220 kejadian komplikasi persalinan, mayoritas pada umur <20 dan >30 tahun yaitu sebanyak 114 orang (51, 82%) dan minoritas pada umur 20-30 tahun yaitu sebanyak 106 orang (48, 18%).

### 3. Paritas ibu

Paritas pada penelitian ini adalah jumlah anak yang pernah dilahirkan oleh ibu, baik lahir hidup maupun lahir mati. Paritas sangat berpengaruh dalam kehamilan dimana komplikasi akan meningkat dan akan terus meningkat dengan makin tingginya paritas. Distribusi kejadian komplikasi persalinan menurut kelompok paritas ibu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3  
 Distribusi Kejadian Komplikasi Persalinan Berdasarkan Kelompok  
 Paritas Ibu di RSIA Siti Fatimah Makassar  
 Tahun 2009

Paritas ibu	Frekuensi	Persentase (%)
1 dan $\geq 4$	152	69, 09
2 dan 3	68	30, 91
Total	220	100

Sumber: Rekam Medik RSIA Siti Fatimah Makassar, 2009

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa dari 220 kejadian komplikasi persalinan mayoritas dengan paritas 1 dan  $\geq 4$  yaitu sebanyak 152 orang (69, 09%) dan minoritas dengan paritas 2 dan 3 yaitu sebanyak 68 orang (30, 91%).

#### 4. Jarak kehamilan

Jarak kehamilan dalam penelitian ini adalah interval persalinan sebelumnya dengan awal kehamilan terakhir. Risiko terhadap kematian ibu dan anak meningkat jika jarak antara dua kehamilan  $< 2$  tahun atau  $> 4$  tahun. Jarak kehamilan yang aman ialah antara 2-4 tahun. Distribusi kejadian komplikasi persalinan menurut kelompok paritas ibu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4  
 Distribusi Kejadian Komplikasi Persalinan Berdasarkan Kelompok Jarak  
 Kehamilan Ibu Di RSIA Siti Fatimah Makassar  
 Tahun 2009

Jarak Kehamilan	Frekuensi	Persentase
<2 dan >4 tahun	57	55,34
2-4 tahun	46	44,66
Total	103	100

Sumber: Rekam Medik RSIA Siti Fatimah Makassar, 2009

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa dari 103 kejadian komplikasi persalinan pada multipara mayoritas dengan jarak kehamilan <2 tahun dan >4 tahun yaitu sebanyak 57 orang (55,34%) dan minoritas dengan jarak kehamilan 2-4 tahun yaitu sebanyak 46 orang (44,66%).

#### 5. Kelengkapan Pelayanan ANC

Pemanfaatan *antenatal care* (ANC) pada penelitian ini adalah ibu yang melakukan pemeriksaan selama kehamilannya minimal empat kali selama kehamilan dalam waktu sebagai berikut: satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga. Variabel pemanfaatan *antenatal care* (ANC) dibagi dalam dua kategori yaitu tidak lengkap bila ibu melakukan pemeriksaan *antenatal care* (ANC) <4 kali selama masa kehamilannya dan lengkap bila ibu

melakukan pemeriksaan *antenatal care* (ANC) >4 kali selama masa kehamilannya. Distribusi kejadian komplikasi persalinan menurut kelompok kelengkapan kunjungan ANC dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5  
Distribusi Kejadian Komplikasi Persalinan Berdasarkan Kelompok Kelengkapan Kunjungan ANC Di RSIA Siti Fatimah Makassar Tahun 2009

Kelengkapan kunjungan ANC	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak lengkap	96	43, 64
Lengkap	124	56, 36
Total	220	100

Sumber: Rekam Medik RSIA Siti Fatimah Makassar, 2009

Berdasarkan tabel 5 dapat disimpulkan bahwa dari 220 kejadian komplikasi persalinan mayoritas memeriksakan kehamilannya secara lengkap yaitu sebanyak 124 orang (56, 36%) dan minoritas memeriksakan kehamilan tidak lengkap yaitu sebanyak 96 orang (43, 64%).



## B. Pembahasan

Setelah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian komplikasi persalinan di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009, maka dapat dibahas sebagai berikut:

### 1. Umur ibu

Usia ibu sangat berpengaruh dalam suatu kehamilan dan persalinan. Dalam kurun reproduksi sehat dianjurkan agar usia ibu hamil antara 20-30 tahun karena dianggap paling ideal untuk menjalani kehamilan, persalinan dan nifas. Di rentang usia ini kondisi fisik wanita dalam keadaan prima dan optimal sehingga ibu dan bayinya berada dalam keadaan sehat. Disamping itu, rahim sudah mampu memberi perlindungan yang maksimal untuk kehamilan. Umumnya secara mental pun siap, yang berdampak pada perilaku merawat dan menjaga kehamilannya secara hati-hati.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data diperoleh bahwa dari 220 kejadian komplikasi persalinan mayoritas pada umur <20 dan >30 tahun yaitu sebanyak 114 orang (51, 82%) dan minoritas pada umur 20-30 tahun yaitu sebanyak 106 orang (48, 18%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komplikasi persalinan lebih banyak terjadi pada ibu yang berusia <20 dan >30 tahun, hal ini disebabkan karena pada umur <20 tahun, perkembangan organ-organ reproduksinya belum optimal dan jiwanya masih labil sehingga pada kehamilannya sering timbul komplikasi, sedangkan pada usia >30 tahun telah terjadi kemunduran

terhadap fungsi organ tubuh dan juga munculnya kelainan-kelainan yang bersifat degeneratif seperti hipertensi, diabetes mellitus dan lainnya.

Sesuai dengan penelitian Isanurung (2006) terhadap dampak kehamilan terhadap wanita usia muda di Thailand, menyebutkan ibu yang berusia <20 tahun dan >30 tahun memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami komplikasi persalinan.

Hal tersebut serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2002) yang menyatakan bahwa umur yang <20 tahun atau >30 tahun dikenal sebagai ibu dengan risiko tinggi sebagai sebagai salah satu batasan kelompok risiko ibu. Ibu yang berumur <20 tahun dianggap berisiko karena organ reproduksinya dianggap belum begitu sempurna/siap untuk menerima kehamilan, disamping secara kejiwaan ibu muda relatif belum siap untuk hamil. Sedangkan ibu yang berusia diatas 30 tahun, dianggap sudah terlalu tua, sehingga secara fisik sudah lemah untuk menanggung beban kehamilan, ditambah apabila ibu dengan paritas banyak, maka secara mental penghargaan terhadap kehadiran anak agak berkurang.

## 2. Paritas ibu

Paritas adalah jumlah anak yang telah dilahirkan oleh seorang ibu baik lahir hidup maupun lahir mati. Status paritas yang tinggi/jumlah anak yang lebih dari tiga dapat mempengaruhi status kesehatan ibu dan kesempatan untuk menyediakan waktu dalam upaya peningkatan derajat kesehatannya.

Semakin tinggi paritas artinya bahwa frekuensi melahirkan ibu semakin tinggi, maka akan semakin memperburuk keadaan kesehatan ibu dan anaknya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data diperoleh bahwa dari 220 kejadian komplikasi persalinan mayoritas dengan paritas 1 dan  $\geq 4$  yaitu sebanyak 164 orang (74, 55%) dan minoritas dengan paritas 2 dan 3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah paritas ibu sangat berpengaruh terhadap kejadian komplikasi persalinan. Paritas 2 dan 3 merupakan paritas paling aman ditinjau dari sudut kematian maternal akibat komplikasi persalinan, sedangkan paritas 1 dan  $\geq 4$  tergolong beresiko tinggi untuk mengalami komplikasi persalinan, hal ini disebabkan karena pada paritas  $>4$  kemunduran daya lentur (elastisitas) jaringan yang sudah berulang kali diregangkan oleh kehamilan membatasi kemampuan miometrium berkerut untuk menghentikan perdarahan sesudah persalinan. Disamping itu banyak pula dijumpai tidak cukupnya tenaga untuk mengeluarkan janin yang disebut dengan merits uteri, sedangkan pada paritas 1 adanya ketidaksiapan ibu dalam menghadapi persalinan yang pertama merupakan faktor penyebab ketidakmampuan ibu hamil dalam menangani komplikasi yang terjadi selama kehamilan, persalinan dan nifas.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Permata (2003) yang menyatakan bahwa tingkat paritas yang tinggi membuat ibu merasa sudah

berpengalaman dan menganggap bahwa untuk mendeteksi komplikasi persalinan harus memeriksakan diri ke tempat pelayanan kesehatan.

Menurut Huda (2005) proporsi ibu bersalin dengan paritas  $\geq 4$  kali memiliki risiko mengalami komplikasi persalinan lebih besar dari pada ibu dengan paritas rendah yang kurang dari 4 kali. Disamping itu, paritas tidak hanya menyebabkan komplikasi persalinan tapi juga bayi yang dilahirkan dari ibu yang paritas 1 atau  $\geq 4$  mempunyai risiko terjadinya kematian perinatal 4, 5 kali.

### 3. Jarak kehamilan

Jarak kehamilan adalah interval persalinan sebelumnya dengan awal kehamilan terakhir.

Hasil penelitian dan pengolahan data diperoleh bahwa dari 103 kejadian komplikasi persalinan mayoritas dengan jarak kehamilan  $< 2$  tahun dan  $> 4$  tahun yaitu sebanyak 57 orang (55, 34%) dan minoritas dengan jarak kehamilan 2-4 tahun yaitu sebanyak 46 orang (44, 66%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jarak kehamilan yang paling aman terhadap kejadian komplikasi persalinan ialah antara 2-4 tahun, sedangkan jarak kehamilan  $< 2$  tahun dan  $> 4$  tahun tergolong berisiko tinggi untuk mengalami komplikasi persalinan yang dapat berdampak buruk terhadap ibu maupun pada bayinya. Hal ini disebabkan karena jarak antara dua kehamilan  $< 2$  tahun berarti tubuh ibu belum kembali ke keadaan normal akibat kehamilan sebelumnya sehingga tubuh ibu akan memikul beban

yang lebih berat. Sebaliknya jika jarak kehamilan antara dua kehamilan >4 tahun, disamping usia ibu yang sudah bertambah juga mengakibatkan persalinan berlangsung seperti kehamilan dan persalinan pertama.

#### 4. Kelengkapan pelayanan ANC

Pemeriksaan kehamilan sebagai faktor penting dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak karena mempunyai peranan dalam upaya pencegahan komplikasi persalinan dan pengobatan dilakukan sedini mungkin. Kunjungan antenatal untuk pemantauan dan pengawasan kesejahteraan ibu dan anak minimal empat kali selama kehamilan, yaitu satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga.

Hasil penelitian dan pengolahan data diperoleh bahwa dari 220 kejadian komplikasi persalinan mayoritas memeriksakan kehamilannya secara lengkap yaitu sebanyak 133 orang (60,45%) dan minoritas memeriksakan kehamilan tidak lengkap yaitu sebanyak 87 orang (39,55%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komplikasi persalinan lebih banyak terjadi pada ibu yang memeriksakan kehamilannya secara lengkap, hal ini dapat disebabkan karena pada beberapa kasus komplikasi kehamilan masih dapat berlanjut sampai persalinan karena ibu kurang mengerti dengan penjelasan yang diberikan oleh tenaga kesehatan selama ia memeriksakan kehamilannya sehingga ia tidak mentaati anjuran yang diberikan oleh tenaga kesehatan agar komplikasi yang dialaminya selama hamil tidak berlanjut sampai persalinan.

Sedangkan hasil penelitian Permata (2003) pada sekelompok ibu hamil di Surabaya menyatakan bahwa ada hubungan antara pemanfaatan pelayanan antenatal dengan komplikasi persalinan, dimana ibu yang tidak lengkap pemanfaatan pelayanan antenatal selama kehamilan cenderung mengalami komplikasi.

Hasil serupa juga dikemukakan oleh Roeshadi (2004) yang dilakukan pada ibu hamil di Jawa Tengah mengatakan bahwa pada ibu hamil dan bersalin yang tidak memeriksakan kehamilannya pada tenaga kesehatan akan mengalami risiko kematian 3-7 kali dibandingkan dengan ibu yang memeriksakan kehamilannya. Sedangkan menurut Hanafiah (2005) pada penelitiannya di RS. Dr. Pirngani, Medan, ditemukan kematian maternal pada 93, 9% pada ibu yang memeriksakan dirinya kurang dari 4 kali selama masa kehamilannya, akibat kurangnya pemeriksaan antenatal yang dilakukan oleh tenaga medis terlatih dan banyaknya kasus dengan penyulit kehamilan tidak terdeteksi. Sehingga pada akhirnya akan mengakibatkan morbiditas dan mortalitas yang lebih besar pada ibu dan janin.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor yang berhubungan dengan kejadian komplikasi persalinan di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Usia, paritas, jarak kehamilan dan kelengkapan pelayanan ANC pada ibu bersalin berhubungan dengan kejadian komplikasi pada saat persalinan.
2. Jenis komplikasi persalinan yang paling banyak diderita pada ibu bersalin di RSIA Siti Fatimah Makassar tahun 2009 adalah Pre-eklamsia.

#### **B. Saran**

1. Usia ibu yang paling baik untuk hamil dan melahirkan sebaiknya usia 20-30 tahun yang merupakan usia reproduksi sehat.
2. Bagi ibu yang berada pada paritas  $\geq 2$  sebaiknya mengikuti program Keluarga Berencana (KB) untuk mengatur jumlah anak dan mengatur jarak kehamilan.
3. Ibu hamil sebaiknya melakukan pemeriksaan ANC secara teratur minimal 4 kali selama kehamilan guna mendeteksi apabila ada kelainan-kelainan atau penyakit yang timbul akibat dari kehamilan sehingga dapat ditanggulangi sedini mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia. 2005.
- Ambarwati, Eny Retna & Diah Wulandari: 2008, *Komplikasi Masa Nifas, Asuhan Kebidanan Nifas*, Mitra Cendikia Press Jogjakarta, hal: 126-127.
- Armawan: 2009, *Gambaran Jenis Persalinan Dan Hasil Luaran Bayi Pada Grand Multipara Di RSUD Swadana Daerah Sumedang Tahun 2008*, Univeritas Padjajaran Sumedang ,hal.1. <http://www.scribd.com>, diakses Tgl 1 April 2010.
- Artikasari, Kurniawati: 2009, *Hubungan Antara Primigravida Dengan Angka Kejadian Preeklamsia/Eklamsia Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta Periode 1 Januari – 31 Desember 2008*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal: 1. <http://www.pdf-searc-engine.com>, diakses Tgl, 26 Maret 2010.
- Coad, Jane & Melvyn Dunstall: 2006, *Fisiologi Persalinan, Anatomi dan Fisiologi Untuk Bidan*, buku kedokteran EGC Jakarta, hal: 280.
- Fahriansjah, Fika W: 2009, *Hubungan Karakteristik Ibu Hamil Dengan Kejadian Anemia Di Rumah Sakit Bersalin Sit I Khadijah IV Makassar Periode Januari-Desember 2008*, hal: 1. <http://www.asramamedicafkunhas.blogspot.com>, diakses Tgl.1 April 2010.
- Hanafiah, TM: 2005, *perawatan antenatal, Nusantara Vol. 36 (No. 2): 61-64*, FK USU Medan. <http://www.klikdokter.Com/illness/detail/25.html>, diakses tanggal 1 April 2010.
- Isaranurug, sirikul: 2006, *Difference in Socio-Economic Status, Service Utilization, and Pregnancy Outcomes Between Teenage And Adult Mother, J Med assoc Thai, Vol. 89, No. 2*, hal. 145. [www.internationalforresearch.com](http://www.internationalforresearch.com), diakses tanggal 4 Juni 2010.
- Lamadhah, Athif: 2009, *Puerperal Sepsis, Kehamilan dan Melahirkan*, DIVA Press Jogjakarta, hal:99-100.
- Liu, D.T.Y:2007, *Persalinan Abnormal, Manual Persalinan*, buku kedokteran EGC Jogjakarta, hal:169-170, 175.
- Maulana, Mirza: 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, Penyakit Kehamilan dan Pengobatannya*, Katahari Jogjakarta, hal.29-30.
- Mufdlilah: 2009, *Perdarahan Pervaginam Setelah Melahirkan, Panduan Asuhan Kebidanan Ibu Hamil*, Nuha Medika Press Jogjakarta, hal. 114.



- Nugraheny, Esti: 2009, *Deteksi Dini Ibu Dengan Kelainan, Komplikasi, Penyakit Dan Penyulit Kehamilan, Asuhan kebidanan patologi*, Pustaka Rihama Jogjakarta, hal: 2
- Pamilih: 2005, *Deteksi Dini Komplikasi Pada Masa Nifas dan Penanganannya, Manajemen Komplikasi Persalinan*, buku kedokteran EGC Jakarta, hal: 177, 180-181.
- Puadi, Asral: 2008, *Peranan Suami Dalam Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta, hal. 19. <http://www.idb4.wikispaces.com>, diakses Tgl. 15 Juni 2010.
- Rochjati, Poedji: 2003, *Bab 1 Pendahuluan, Skrining Antenatal Pada Ibu Hamil*, , motherhood-lab/smf obgin Surabaya, hal: 1-3.
- Roeshadi, Haryono: 2004, *gangguan dan penyulit pada masa kehamilan*, USU digital library. <http://www.Klikdokter.com/illness/detail/24.html>, diakses pada tanggal 5 Juli 2010.
- Saifuddin, Abdul Bari: 2005, *Perdarahan Setelah Bayi Lahir, Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo Jakarta, hal. 90,179,181,
- Salmah, at al: 2006, *Deteksi Dini komplikasi kehamilan, Asuhan Kebidanan Antenatal*, buku kedokteran EGC Jakarta, hal:94-95.
- Setianingrum, Susiana Iud Winanti: 2005, *Hubungan Antara Kenaikan Berat Badan, Lingkar Lengan Atas, Dan Kadar Hemoglobin Ibu Hamil Trimester Iii Dengan Berat Bayi Lahir di Puskesmas Ampel I Boyolali Tahun 2005*, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar, Hal. 17. <http://Digilib.Unnes.Ac.Id>, di Akses Tgl. 19 Maret 2010.
- Shihab, M. Quraish: 2002, *Tafsir Al-Mishbah, Lentera Hati* Jakarta, hal.86 & 504.
- Sudariato: 2010, *Situasi Angka Kematian Ibu di Indonesia dan Sulawesi Selatan*, DINKES Makassar, hal. 1. (<http://dinkes.sulsel.go.id/new/index.php?option=com>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2010).
- Sulistyawati, Ari: 2009, *Standar pelayanan kebidanan pada pelayanan antenatal, asuhan kebidanan pada ibu nifas*, ANDI Jogjakarta, hal. 1-4.
- Sulistyowati, Ning: 2003, *Kematian perinatal hubungannya dengan faktor praktek kesehatan ibu selama kehamilan*, Jurnal ekologi kesehatan, Vol. 2, No. 1, hal. 192-199.

- Suseno, Tutu A: 2009, *Kamus Kebidanan*, Cistra Pustaka Yogyakarta, hal:196-197.
- Wahyuni, Cut Sri:2009, *Hubungan Faktor Ibu dan Pelayanan Kesehatan Dengan Kematian Perinatal Di Kabupaten Pidie Tahun 2008*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara Medan, Hal. 24, diakses Tgl. 23 Maret 2010.
- Winkjosastro, Hanifa:2006, *Kematian Maternal, Gangguan Dalam Kala III Persalinan, Ilmu Kebidanan*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo Jakarta, hal.23,654,656-660.
- Yuliarti, Efi: 2009, *Determinan ibu memilih dukun sebagai penolong persalinan di wilayah kerja puskesmas bangko pusaka kab rokan hilir riau tahun 2008*, Universitas Sumatra Utara, hal:11,14. <http://www.Repositori.usu.id/betstream/1-9/14696/1/09E029.pdf>, diakses Tgl. 26 April 2010.



## **BIODATA PENULIS**

### **A. IDENTITAS**

NAMA : NURINAYA  
TEMPAT/ TANGGAL LAHIR : HILA-HILA, 02 JANUARI 1990  
AGAMA : ISLAM  
ASAL : BULUKKUMBA, SULAWESI  
SELATAN  
ALAMAT : JL. RAYA PENDIDIKAN, BLOG  
G1/1B

### **B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. SDN 97 PALAMPANG, TAHUN 2001
2. MTSN 1 HILA-HILA, TAHUN 2004
3. SMAN 1 RILAU ALE, TAHUN 2007
4. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,  
TAHUN 2010