

**IDENTIFIKASI SERANGGA TANAH DI PERKEBUNAN
PATTALLASSANG KECAMATAN PATTALLASSANG
KABUPATEN GOWA PROVINSI
SULAWESI SELATAN**



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana Sains
Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:
ANDI ASIS USMAN
NIM. 60300112055

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Asis Usman
NIM : 60300112055
Tempat/Tgl. Lahir : Kolikapa, 17 Mei 1993
Jur/Prodi : Biologi
Fakultas : Sains & Teknologi
Judul : Identifikasi Serangga Tanah Di Perkebunan
Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten
Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 Maret 2017
Penyusun,

Andi Asis Usman
NIM: 60300112055

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Identifikasi Serangga Tanah Di Perkebunan Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan**” disusun oleh Andi Asis Usman, NIM: 60300112055, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 20 bulan Maret tahun 2017 yang bertepatan dengan 21 Jumadil Akhir 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 20 Maret 2017 M
21 Jumadil Akhir 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Hj. Wasilah, S.T., M.T	(.....)
Sekretaris	: Hasyimuddin, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: St. Aisyah S., S. Pd., M. Kes.	(.....)
Munaqisy II	: Ar. Syarif Hidayat, S.Si., M.Kes.	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Muh. Saleh Ridwan, M. Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Syahribulan, S. Si., M. Si.	(.....)
Pembimbing II	: Hasyimuddin, S.Si., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 196912051993031001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullhahi Wabarakathu

Segala puji milik Allah Swt. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Rasulullah, keluarganya, para shahabatnya dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul ” **Identifikasi Serangga Tanah di Perkebunan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan**”, ini dengan sebaik-baiknya. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan strata 1 (S1) pada Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari banyak pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam menyelesaikan penulisan ini. Maka dari itu, secara khusus iringan doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Muthalib Usman dan Ibunda Nurhayati, saudara-saudaraku dan keluarga yang selalu menjadi kekuatan dalam diri dan doa setiap langkah, serta dengan sepenuh hati memberikan dukungan spiritual maupun materil, demi tercapainya harapan dari sang anak yang tidak akan pernah mampu untuk di balas. Semoga berkah dan hidayah Allah Selalu menaungi mereka.

Dalam melakukan penelitian maupun penyusunan skripsi ini penulis telah mendapatkan masukan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang sangat berguna dan bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini dengan berbesar hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) beserta sejarannya.

2. Prof. Dr. A. Qadir Gassing HT., MS., selaku Rektor periode 2011-2015 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM)
3. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes., selaku Ketua Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
5. Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
6. Dr. Syaribulan, S.Si., M.Si sebagai Pembimbing I dan Hasyimuddin, S.Si., M.Si selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi.
7. St. Aisyah Sijid, S.Pd., M.Kes., Ar. Syarif Hidayat M.Kes., dan Dr. Muh. Saleh Ridwan, M. Ag. , selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi penelitian dan penulisan skripsi penulis.
8. Seluruh Dosen Jurusan Biologi dan Staff Fakultas Sains dan Teknologi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan (*One Frekuensi*), terima kasih atas motivasi dan kesetianya menjadi sahabat yang hangat dan selalu penuh canda dan tawa. Semoga pertemanan kita akan abadi dan semoga kesuksesan menyertai kita.
10. Teman-teman Biologi, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu khususnya angkatan 2012 (*Ranvier*) yang memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini .
11. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, saran, dan pertisipasi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun ruang lingkup pembahasannya. Maka dengan kerendahan hati, segala bentuk koreksi, kritikan, dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya sekaligus dapat menjadi bahan acuan mahasiswa biologi, serta bagi pemerintah, dan masyarakat.

Makassar, 20 Maret 2017

Penulis



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv-vi
DAFTAR ISI	vii-viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1-5
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6-35
A. Tinjauan Umum Serangga	6
B. Morfologi Serangga Tanah	10
C. Klasifikasi Serangga Tanah	12
D. Peranan Fauna Tanah	21
G. Faktor Pengaruh Keanekaragaman Serangga Tanah	24
E. Tanah	26
F. Tinjauan Umum Kecamatan Pattalassang	28
G. Pandangan Islam Tentang Serangga Tanah	29
H. Kerangka Fikir	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36-39
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Variabel Penelitian	36
D. Definisi Operasional Penelitian	36
E. Populasi dan Sampel	37
F. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)	37

G. Prosedur Kerja	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40-67
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan	42
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Implikasi Penelitian (Saran).....	68
KEPUSTAKAAN	69-71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72-75



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Proses Dekomposisi Terhadap Kemantapan Struktur Tanah.....	23
Tabel 4.1 Hasil Identifikasi Serangga Tanah	40



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Belalang (<i>Dichromorpha viridis</i>)	11
Gambar 2.2 <i>Lepisma saccharina</i> (Kutu buku)	13
Gambar 2.3 <i>Campodea sp</i>	13
Gambar 2.4 <i>Acerentulus barberi Ewing</i>	14
Gambar 2.5 <i>Papirius fuscus</i> (Kutu Kebun)	15
Gambar 2.6 <i>Macrotermes gilvus</i> (Rayap)	16
Gambar 2.7 <i>Periplaneta sp</i> (Kecoak)	17
Gambar 2.8 <i>Drosophila melanogaster</i> (Lalat buah)	17
Gambar 2.9 <i>Maritime Earwig</i> (Cocopet)	18
Gambar 2.10 <i>Charidotella sexpunctata</i> (Kumbang daun)	19
Gambar 2.11 <i>Panorpa rufescens</i>	20
Gambar 2.12 <i>Dolichoderus thoracicus</i> (Semut hitam)	21
Gambar 3.1 Peta Kecamatan Pattallassang	38
Gambar 3.2 Desain Letak <i>Pitfall Trap</i>	39
Gambar 4.1 Kelimpahan Serangga Tanah	42
Gambar 6.1 Hasil Identifikasi	72
Gambar 6.2 Alat dan Bahan Penelitian	75
Gambar 6.3 Proses Penelitian	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 6.1 Hasil Identifikasi.....	72
Lampiran 6.2 Alat dan Bahan Penelitian	75
Lampiran 6.3 Proses Penelitian.....	75



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : ANDI ASIS USMAN
NIM : 60300112055
Judul Skripsi : “Identifikasi Serangga Tanah di Perkebunan Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan”

Serangga tanah merupakan serangga yang hidup di tanah, baik yang hidup di dalam maupun di permukaan tanah. Serangga tanah pada suatu komunitas berperan sebagai perombak bahan-bahan organik, yang mana hasil perombakan ini berupa humus yang nantinya humus tersebut bermanfaat sebagai nutrisi bagi tanaman. Selain itu serangga tanah juga dapat dijadikan sebagai indikator terhadap kesuburan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis serangga tanah yang terdapat di perkebunan Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober – Desember 2016. Penelitian ini bersifat deskriptif-eksploratif. Pengambilan data dilaksanakan dengan menggunakan metode absolut (pengamatan langsung) pada lahan perkebunan dengan 15 plot. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode *Pitfall trap*. Hasil penelitian yang di dapat 14 spesies yang tercakup kedalam 13 famili. Umumnya spesies yang ditemukan adalah spesies Gryllidae. Spesies serangga tanah yang ditemukan terdapat spesies serangga tanah yang berperan sebagai polinator, dekomposer, predator, parasitoid dan bioindikator.

Kata Kunci: Serangga, Identifikasi, Perangkap jebakan, Dekomposer, Tanah.

ABSTRACT

Nama : **ANDI ASIS USMAN**
NIM : **60300112055**
Judul Skripsi : **“Insect Identification Land in Plantation Pattalassang
Pattalassang District of Gowa in South Sulawesi”**

Soil insects are insects that live on land, either living in or on the soil surface. Insects land on a community role as decomposer of organic materials, which result reshuffle in the form of humus humus that will be useful as a nutrient for plants. In addition soil insects can also be used as an indicator of soil fertility. This study aims to determine the types of insects found in the plantation land Pattalassang Village, District Pattalassang, Gowa, South Sulawesi Province. The study was conducted in October-December 2016. This study is descriptive-explorative. Data retrieval is implemented using the absolute method (observation) on the plantation with 15 plots. The method used in this research is the method Pitfall trap. The results of research in the can 14 species included into 13 families. Generally the species found are species Gryllidae. Soil insect species were found to contain soil insect species that act as pollinators, decomposers, predators, parasitoids and bio-indicators.

Keywords: Insects, Identification, Pitfall Traps, Decomposers, Soil.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Serangga merupakan hewan yang sudah ada sejak zaman dahulu dan mendominasi bumi. Jumlah spesies yang telah teridentifikasi mencapai satu juta spesies dan diperkirakan masih ada sekitar 10 juta spesies yang belum diidentifikasi (Borror et al., 1997).

Serangga dapat ditemukan di berbagai tempat termasuk di permukaan tanah. Serangga permukaan tanah merupakan serangga pemakan tumbuhan hidup dan tumbuhan mati yang berada di atas permukaan tanah. Serangga tanah berperan dalam proses perombakan atau dekomposisi material organik tanah sehingga membantu dalam menentukan siklus material tanah sehingga proses perombakan di dalam tanah akan berjalan lebih cepat dengan adanya bantuan serangga permukaan tanah. Salah satu serangga tanah yang berperan dalam proses dekomposisi tanah adalah ordo Collembola (Borror et al., 1997).

Kehidupan serangga tanah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan antara lain faktor mikro dan makro lingkungan permukaan tanah. Faktor mikro yang mempengaruhi kehidupan serangga tanah adalah ketebalan serasah, kandungan bahan organik, pH, kesuburan, jenis tanah, kepadatan tanah, dan kelembaban tanah, sedangkan faktor makro adalah geologi, iklim, ketinggian tempat, jenis tumbuhan, dan penggunaan lahan (Purwawidodo, 2003).

Serangga tanah merupakan serangga yang hidup di tanah, baik yang hidup di dalam tanah maupun yang hidup di permukaan tanah. Serangga tanah pada suatu komunitas berperan sebagai perombak bahan-bahan organik, yang mana hasil perombakan ini berupa humus yang nantinya humus tersebut bermanfaat sebagai nutrisi bagi tanaman. Selain itu serangga tanah juga dapat dijadikan sebagai indikator terhadap kesuburan tanah. Keanekaragaman serangga tanah di setiap tempat berbeda-beda. Keanekaragaman akan tinggi apabila berada pada lingkungan optimum, misalnya tanah subur. Keanekaragaman cenderung akan rendah bila berada pada lingkungan yang ekstrim, misalnya tanah miskin. Keanekaragaman serangga (serangga tanah) yang terdapat di Indonesia \pm 200.000 jenis atau kurang lebih 17% serangga di dunia (Suin, 1997).

Serangga dibagi dalam dua kelompok besar yaitu Apterygota dan Pterygota. Serangga tanah juga berperan dalam proses pelapukan bahan organik dan keberadaan serta aktivitasnya berpengaruh positif terhadap sifat fisik tanah. Sumber daya tanah merupakan salah satu komponen lahan yang langsung berhubungan dengan pertumbuhan tanaman hutan yang memiliki kemampuan yang berbeda antara satu jenis dengan jenis yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh sifat fisik tanah, kimia tanah, faktor iklim, dan keberadaan organisme tanah termasuk di dalamnya serangga tanah (Herlinda et al., 2008).

Hutan homogen dan hutan heterogen sebagai ekosistem sumber daya alam yang sangat potensial dalam mendukung keanekaragaman flora dan fauna dari komunitas serangga (terrestrial). Salah satu sumberdaya hutan adalah serangga tanah.

Ekosistem hutan homogen dan heterogen secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia, baik segi ekonomi, sosial dan lingkungan (Suin, 1997).

Ada dua cara pengolahan lahan pertanian atau perkebunan yaitu secara anorganik atau konvensional dan organik. Sistem pertanian konvensional menggunakan pestisida dan pupuk kimia sehingga residunya dapat merusak habitat pertanian tersebut karena residu dari pestisida dan pupuk kimia tidak dapat terdegradasi oleh tanah. Sistem pertanian organik menggunakan bahan organik dan mengutamakan keseimbangan alami antara makhluk hidup dan lingkungannya. Pada sistem pertanian organik diharapkan dapat menjaga habitat makhluk hidup pada pertanian tersebut termasuk serangga tanah, mengingat peran serangga tanah yang cukup penting dalam siklus material tanah (Herlinda et al., 2008).

Mengingat pentingnya peranan serangga dalam menjaga keseimbangan ekosistem, yaitu sebagai perombak dan penyubur tanah, serta masih relatif terbatasnya informasi mengenai keberadaannya, maka serangga tanah perlu dieksplorasi. Serangga tanah ternyata memiliki keanekaragaman yang tinggi, termasuk di daerah pertanian. Beberapa penelitian tentang keanekaragaman jenis fauna dari berbagai kelas, seperti mammalia, aves dan reptilia telah banyak dilakukan namun untuk keanekaragaman serangga permukaan tanah belum banyak dilakukan.

Berdasarkan studi literatur maka peneliti bermaksud melakukan kajian penelitian untuk mengetahui jenis-jenis serangga tanah khususnya serangga tanah yang ada di Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.

B. Rumusan Masalah

Jenis-jenis serangga tanah apa saja yang terdapat di perkebunan Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perkebunan Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, dimana yang menjadi objek penelitian ini adalah serangga tanah. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2016 (pada musim hujan) di daerah perkebunan, Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.

D. Penelitian Terdahulu

1. Natsir (2013) tentang “Keanekaragaman Jenis Serangga Tanah di Areal kerja hutan kemasyarakatan Sesaot Lombok Barat Nusa Tenggara Barat”. Penelitian ini bertujuan mengetahui jenis-jenis serangga tanah yang terdapat di areal kerja hutan kemasyarakatan Sesaot dan indeks keanekaragaman serangga tanahnya. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian eksperimen sedangkan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Pitfall Trap*.
2. Elisa dkk (2013), dengan judul “Komposisi Serangga Tanah Pada Kebun Karet Di Nagari Padang Punggasan Kecamatan Linggo Saribaganti Kabupaten Pesisir Selatan”. Penelitian ini menggunakan metode survei deskriptif. Pengambilan sampel serangga tanah menggunakan modifikasi bor tanah

dengan diameter 10 cm, dimana sampel tanah yang diambil adalah setebal 10 cm untuk satu kali pengambilan sampel.

3. Indriyati dan Lestari Wibowo (2008), melakukan penelitian mengenai “Keragaman dan Kelimpahan Collembola serta Arthropoda Tanah di Lahan Sawah Organik dan Konvensional pada Masa Bera”. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel Collembola dan arthropoda tanah lainnya dilakukan dengan perangkat *Pitfall Trap* dan corong Berlese.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis serangga tanah yang terdapat di perkebunan Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian yang dilakukan ini yaitu:

1. Sebagai informasi yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam memperoleh gambaran tentang keanekaragaman serangga tanah kepada peneliti lain.
2. Sebagai informasi bagi pihak pengelola di wilayah perkebunan, Desa Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa yang berhubungan dengan keanekaragaman serangga tanah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Serangga

Insekta atau serangga merupakan spesies hewan yang jumlahnya paling dominan di antara spesies hewan lainnya dalam filum Arthropoda. Serangga dapat dijumpai di semua daerah di atas permukaan bumi baik di darat, laut, maupun udara. Mereka hidup sebagai pemakan tumbuhan, serangga, atau binatang lain, bahkan mengisap darah manusia dan mamalia. Serangga merupakan hewan beruas dengan tingkat adaptasi yang sangat tinggi. Fosil-fosilnya dapat dirunut hingga ke masa fosil raksasa primitif telah ditemukan. Sejumlah anggota Diptera seperti lalat dan nyamuk yang terperangkap pada getah juga ditemukan. Serangga mampu hidup dimanapun, bahkan ada serangga yang mampu hidup tanpa oksigen sekalipun. Hal ini dikarenakan serangga mampu beradaptasi dengan segala kondisi yang membuat variasi morfologi sesuai dengan cara adaptasi mereka dengan lingkungannya (Nasir, 2013).

Menurut Hanafiah (2006), ukuran tubuh fauna tanah dibagi menjadi 4 bagian yaitu:

1. Mikrofauna merupakan hewan yang mempunyai ukuran tubuhnya berkisar dari 0,2 mm, contohnya Protozoa, Nematoda yang menjadi mikropredator bagi mikroorganisme lain serta menjadi parasit pada tanaman.

2. Mesofauna adalah hewan yang mempunyai ukuran tubuhnya 0,2 – 2 mm, contoh Mikroarthropoda, Collembolan, Acarina, Termintes, Olgochaete dan Enchytreidae yang menjadi pengurai utama seresah atau bahan organik lain.
3. Makrofauna adalah hewan yang mempunyai ukuran tubuh berkisar 2 – 20 mm, yang terdiri dari herbivora (pemakan tanaman), dan karnivora (pemakan hewan kecil). Contoh Arthropoda yaitu *Crustacea* seperti kepiting, *Chilopoda* seperti kelabang, *Diplopoda* kaki seribu, *Arachnida* seperti laba-laba, kalajengking, dan serangga (*Insecta*), kumbang, rayap, lalat, jangkrik, lebah, semut, serta hewan-hewan kecil lainnya yang bersarang didalam tanah.
4. Megafauna adalah hewan yang mempunyai ukuran tubuh berkisar antara 20 – 200 mm, contoh Megascolicidae, insectivore, atau invertebrate besar lainnya yang dapat mengubah struktur tanah akibat dari pergerakan dan perilaku makan.

Menurut Adianto (1980), fauna tanah berdasarkan kehadirannya ditanah dibagi menjadi:

1. Temporer, yaitu hewan yang memasuki tanah dengan tujuan bertelur, setelah menetas dan berkembang menjadi dewasa, hewan akan keluar dari tanah, misalnya diptera.
2. Transien, yaitu hewan seluruh daur hidupnya berlangsung di atas tanah, misalnya kumbang.
3. Periodik, yaitu hewan yang seluruh daur hidupnya ada di dalam tanah, hanya sesekali hewan dewasa keluar dari tanah untuk mencari makanan dan setelah itu masuk kembali, misalnya Collembola dan Acarina.

4. Permanen, yaitu hewan yang seluruh daur hidupnya selalu di tanah dan tidak pernah keluar dari dalam tanah, misalnya Nematoda tanah dan Protozoa.

Menurut Adianto (1980), fauna tanah menurut sifat ketergantungan terhadap air dibagi menjadi:

1. Hidrobiontes, yaitu fauna tanah yang memerlukan air relatif banyak untuk aktifitas hidupnya, misalnya Ciliata dan Flagelata.
2. Higrofil, yaitu fauna tanah yang tidak menyukai air terlalu banyak untuk syarat hidup optimalnya, misalnya Collembola.
3. Xerofil, yaitu fauna tanah yang lebih menyukai habitat kering misalnya jenis-jenis laba-laba.

Menurut Ross (1965), fauna tanah menurut tempat hidupnya dibagi menjadi:

1. Treefauna, yaitu hewan yang hidup di pohon.
2. Epifauna, yaitu hewan yang hidup di permukaan tanah.
3. Infauna, yaitu hewan yang hidup di dalam tanah.

Serangga dapat ditemukan di berbagai tempat termasuk di permukaan tanah. Serangga permukaan tanah merupakan serangga pemakan tumbuhan hidup dan tumbuhan mati yang berada di atas permukaan tanah. Serangga tanah berperan dalam proses perombakan atau dekomposisi material organik tanah sehingga membantu dalam menentukan siklus material tanah sehingga proses perombakan di dalam tanah akan berjalan lebih cepat dengan adanya bantuan serangga

permukaan tanah. Salah satu serangga tanah yang berperan dalam proses dekomposisi tanah adalah ordo Collembola (Borror *et al.*, 1997).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan serangga tanah di hutan, adalah, struktur tanah berpengaruh pada gerakan dan penetrasi, kelembaban tanah dan kandungan hara berpengaruh terhadap perkembangan dalam daur hidup, suhu tanah mempengaruhi peletakan telur, cahaya dan tata udara mempengaruhi kegiatannya (Rahmawaty, 2000).

Berbagai macam kelompok hewan tanah, Arthropoda memiliki kepadatan dan kelimpahan yang tertinggi pada ekosistem tanah. Kelompok Arthropoda yang biasa dijumpai adalah Insekta, Arachnida dan Myriapoda. Kelompok Insekta yang paling banyak ditemukan adalah Collembola, sedangkan dari kelompok Arachnida yang paling banyak ditemukan adalah Acarnia (Wallwork, 1970).

Kurang lebih satu juta spesies serangga telah dideskripsi atau dikenalkan dalam ilmu pengetahuan, dan hal ini merupakan petunjuk bahwa serangga merupakan mahluk hidup yang mendominasi bumi. Diperkirakan, masih ada sekitar 10 juta spesies serangga yang belum dideskripsi. Peranan serangga sangat besar dalam menguraikan bahan-bahan tanaman dan binatang dalam rantai makanan ekosistem dan sebagai bahan makanan mahluk hidup lain (Anonim, 2008).

Perubahan vegetasi akan sangat berpengaruh terhadap komposisi faunanya, ini dapat dilihat juga pada Arthropoda. Arthropoda tanah seperti halnya serangga tanah yang hidup pada hutan berbeda komposisinya dari serangga yang hidup di

semak belukar dan ladang. Perbedaan distribusi dan kelimpahan hewan ini terutama adalah pengaruh dari perbedaan faktor fisika lingkungan (Suin,1991).

Menurut Sutedjo dan Kartasapoetro (1992), usaha memperbaiki tanah secara alami dapat dilakukan dengan mengistirahatkan tanah untuk beberapa waktu, tidak diolah, dan dibiarkan tertutup oleh rumput-rumputan. Pengolahan tanah yang keliru dan pengelolaan tanaman yang kurang baik, dapat menyebabkan menurunnya kesuburan dan produktivitas tanah sehingga tanah menjadi rusak. Untuk mengurangi dan mengantisipasi terjadinya kerusakan tanah, diperlukan langkah yang tepat, aman sekaligus tidak mengeluarkan banyak biaya, misalnya dengan pemberian bahan organik tanaman pada tanah. Pemberian bahan organik tanaman pada tanah dapat memperbaiki sifat fisika, kimia, dan biologi tanah.

B. Morfologi Serangga Tanah


Pada umumnya morfologi serangga tanah terbagi menjadi tiga bagian yaitu: kepala, toraks, dan abdomen. Ketiga bagian tersebut dilindungi oleh kutikula yang tersusun dari lapisan kitin yang keras. Bagian terluar serangga tanah terbagi menjadi beberapa buku-buku (Borror et al, 1997).

Kepala serangga tanah tersusun dari sepasang antena, sepasang mandibula (rahang belakang), sebuah hipofharing dan labium (Borror et al, 1997). Antena tersebut tersusun dari buku-buku yang mengandung bulu-bulu sensoris, mata

majemuk yang tersusun atas ommatidia, kecuali tiga mata sederhana yang disebut ocelli (Yasin, 1984).

Toraks terdiri atas tiga ruas yaitu prothorax (bagian depan), mesothorax (bagian tengah), dan metathorax (bagian belakang). Setiap masing-masing buku ini mempunyai sepasang kaki yang beruas-ruas dan pada mesothorax dan metathorax terdapat sayap. Sayap merupakan lembaran ganda yang banyak mengandung pembuluh darah (Campbell, 1999).

Abdomen adalah bagian ketiga dan paling posterior dari tubuh serangga tanah. Fungsi dari abdomen adalah untuk menampung saluran pencernaan dan alat reproduksi (Tarumingkeng, 2005). Alat reproduksi serangga biasanya terletak pada ruas-ruas abdomen ke 8 dan 9. Ruas abdomen pada serangga terdiri dari 11 ruas atau beberapa ruas saja (Anonim, 1978).



Gambar 2.1 Belalang (*Dichromorpha viridis*). a. Kepala, b. Thoraks, c. Abdomen, d. Antena, e. Mata Facet, f. Tarsus, g. Koksa, h. Tresrcusochanter, i. Hynmpanum, j. Spirakel, k. Femur, l. Tibia, m. Ovipositor, n. Cercus. (Sumber: Sebastian, 2017).

C. Klasifikasi Serangga Tanah

Serangga dibagi dalam dua kelompok besar yaitu Apterygota dan Pterygota, berdasarkan pada struktur sayap, bagian mulut, metamorfosis dan bentuk tubuh keseluruhan. Apterygota terbagi menjadi 4 ordo dan Pterygota terbagi menjadi 20 ordo dengan 14 ordo diantaranya sebagai serangga tanah, yaitu Ordo Thysanura, Ordo Diplura, Ordo Protura, Ordo Collembola, Ordo Isoptera, Ordo Orthoptera, Ordo Plecoptera, Ordo Dermaptera, Ordo Tysanoptera, Ordo Hemiptera, Ordo Coleoptera, Ordo Mecoptera, Ordo Diptera, dan Ordo Hymenoptera (Lilies, 1992).

Menurut Borror et al (1997), ciri-ciri serangga tanah berdasarkan klasifikasi yaitu:

1. Ordo Thysanura

Serangga yang berukuran sedang sampai kecil, biasanya bentuknya memanjang dan agak gepeng, mempunyai embelan-embelan seperti ekor pada ujung posterior abdomen. Tubuh hampir seluruh tertutupi oleh sisik-sisik. Bagian-bagian mulut adalah mandibula. Mata majemuk kecil dan sangat lebar terpisah, sedangkan mata tunggal dan atau tidak didapatkan. Tarsi 3-5, embelan-embelan seperti ekor terdiri dari sersi. Abdomen 11 ruas, tetapi ruas yang terakhir seringkali sangat menyusut. Anggota ordo Tysanura terbagi atas tiga famili yaitu: Lepidotrichidae, Lepismatidae dan Necoletiidae.



Gambar 2.2 *Lepisma saccharina* (Kutu buku). (Sumber: Sebastian, 2017).

2. Ordo Diplura

Ordo Diplura mempunyai dua filamen ekor atau embelan-embelan. Tubuh tidak tertutup dengan sisik-sisik, tidak terdapat mata majemuk dan mata tunggal, tarsi 1 ruas, dan bagian-bagian mulut adalah mandibula dan tertarik ke dalam kepala. Terdapat stili pada ruas-ruas abdomen 1-7 atau 2-7. Panjang kurang dari 7 mm dan warna pucat. Hidup di tempat lembab di dalam tanah, di bawah kulit kayu, pada kayu yang sedang membusuk, di gua-gua, dan di tempat lembab yang serupa. Serangga-serangga anggota ordo diplura terbagi atas beberapa famili yaitu: japygidae, Campodeidae, Procampodeidae, dan Anajapygidae.



Gambar 2.3 *Campodea sp.* (Sumber: Sebastian, 2017).

3. Ordo Protura

Dalam Ordo Protura mempunyai tubuh kecil berwarna keputih-putihan, panjang 0,6-1,5 mm. kepala agak bentuk konis, tidak memiliki mata maupun sungut. Bagian-bagian mulut tidak menggigit, tetapi digunakan untuk mengeruk partikel-partikel makanan yang kemudian dicampur dengan air liur dan dihisap masuk ke dalam mulut. Pasangan famili yaitu: Eosentomidae, Protentomidae, dan Acerentomidae.



Gambar 2.4 *Acerentulus barberi* Ewing. (Sumber: Sebastian, 2017).

4. Ordo Collembola

Abdomen mempunyai 6 segmen, tubuh kecil (panjang 2-5 mm), tidak bersayap, antena beruas 4, dan kaki dengan tarsus beruas tunggal. Pada tengah abdomen terdapat alat tambahan untuk meloncat yang disebut furcula. Mempunyai alat untuk mengunyah dan mata majemuk. Pembagian famili berdasarkan pada jumlah ruas abdomen, mata dan furcula. Serangga-serangga ordo Colembolla terbagi atas beberapa famili yaitu: Onychiuridae, Podiridae, Hypogastruridae, entomobrydae, Isotomidae, Sminthuridae, dan Neelidae.



Gambar 2.5 *Papirius fuscus* (Kutu Kebun). (Sumber: Firman, 2017).

5. Ordo Isoptera

Berasal dari kata iso yang berarti sama dan ptera yang berarti sayap. Isoptera hidup sebagai serangga sosial dengan beberapa golongan yang reproduktif, pekerja, dan serdadu. Golongan serdadu mempunyai ciri kepala yang sangat berskleretisasi, memanjang, hitam, dan besar yang berfungsi untuk pertahanan. Mandibula berukuran sangat panjang, kuat, berkait, dan dimodifikasi untuk memotong. Pada beberapa genus mempunyai kepala pendek dan persegi, bentuk seperti itu sesuai dengan fungsinya untuk menutup pintu masuk ke dalam sarang. Dalam sebuah koloni, biasanya jumlah golongan pekerja paling banyak. Golongan ini berwarna pucat dengan tubuh lunak, mulut bertipe pengunyah yang berfungsi untuk membuat dan memperbaiki sarang. Golongan pekerja ini juga memberi makan dan merawat anggota koloni. Ada beberapa ciri yang menjadi pembeda antara famili, yaitu Rhinotermitidae mempunyai ubun-ubun dan sayap yang tebal. Sisik sayap lebih panjang dari pronotum yang berbentuk datar. Jika sisik sayap depan lebih pendek dari pronotum, maka dimasukkan dalam family Termitidae. Mata tunggal dengan

sungut kurang dari 21 ruas, tanpa mata tunggal dimasukkan dalam famili Hodotermitidae (Dindal, 1991).



Gambar 2.6 *Macrotermes gilvus* (Rayap). (Sumber: Rudy, 2017).

6. Ordo Orthoptera

Orthoptera ada yang bersayap dan ada yang tidak bersayap, dan bentuk yang bersayap biasanya mempunyai empat buah sayap. Sayap-sayap memanjang, banyak rangka-rangka sayap, agak menebal dan disebut sebagai tegmina. Sayap-sayap belakang berselaput tipis, lebar, banyak rangka-rangka sayap, dan pada waktu istirahat mereka biasanya terlipat seperti kipas di bawah sayap depan. Tubuh memanjang, sersi bagus terbentuk, sungutnya relatif panjang, dan banyak ruas. Bagian-bagian mulut adalah tipe mengunyah. Serangga-serangga ordo orthoptera terbagi atas beberapa famili yaitu: Grillotalpidae, Tridactylidae, Tetrigidae, Eusmastracidae, dan Acrididae.



Gambar 2.7 *Periplaneta sp* (Kecoak). (Sumber: Nuriyanti, 2017).

7. Ordo Plecoptera

Serangga yang berukuran medium (kecil) agak gepeng, bertubuh lunak, dan berwarna agak kelabu yang terdapat di dekat aliran-aliran air yang berbatu. Sayap depan memanjang, agak sempit dan biasanya memiliki rangka-rangka sayap yang menyilang. Sungut panjang, ramping, dan banyak ruas. Tarsi beruas 3, terdapat sersi yang mungkin panjang atau pendek. Bagian-bagian mulut adalah tipe pengunyah, walaupun pada banyak serangga dewasa agak menyusut. Serangga-serangga ordo Plecoptera terbagi atas beberapa family yaitu: Pteronarcyidae, Capniidae, Leuctridae, dan periidae.



Gambar 2.8 *Drosophila melanogaster* (Lalat buah). (Sumber: Hasil Peneliti, 2017).

8. Ordo Dermaptera

Mempunyai tubuh yang memanjang, ramping, dan agak gepeng yang menyerupai kumbang-kumbang pengembara tetapi mempunyai sersi seperti apit. Yang dewasa bersayap atau tidak mempunyai sayap dengan satu atau 2 pasang sayap. Bila bersayap, sayap depan pendek, seperti kulit, tidak mempunyai rangka sayap, sayap belakang berselaput tipis dan membulat. Mempunyai perilaku menangkap mangsa dengan forcep yang diarahkan ke mulut dengan melengkungkan abdomen melalui atas kepala. Binatang ini aktif pada malam hari. Pembagian famili berdasarkan pada perbedaan antena. Serangga-serangga ordo Dermaptera terbagi atas beberapa famili yaitu: Forficulidae, Chelisochidae, Labiidae, dan Labiduridae.



Gambar 2.9 *Maritime Earwig* (Cocopet). (Sumber: Hasil Peneliti, 2017).

9. Ordo Coleoptera

Coleoptera berasal dari kata *coleo* yang berarti selubung dan *ptera* yang berarti sayap. Mempunyai 4 sayap dengan pasangan sayap depan menebal seperti kulit, atau keras dan rapuh, biasanya bertemu dalam satu garis lurus di bawah tengah punggung dan menutupi sayap-sayap belakang. Pembagian famili

berdasarkan perbedaan elytra, antena, tungkai, dan ukuran tubuh. Serangga-serangga ordo Coleoptera terbagi atas beberapa famili yaitu: Carabidae, Staphylinidae, Silphidae, dan Scarabaeidae.



Gambar 2.10 *Charidotella sexpunctata* (Kumbang daun). (Sumber: Hasil peneliti, 2017).

10. Ordo Mecoptera

Berasal dari kata meco yang berarti panjang dan ptera yang berarti sayap. Tubuh ramping dengan ukuran bervariasi. Kepala panjang, alat mulut penggigit, dan memanjang ke arah bawah berbentuk paruh. Sayap panjang, sempit, seperti selaput dengan bentuk, ukuran, dan susunan yang sama larva seperti ulat. Alat kelamin jantan seperti capit pada kala jengking dan terletak di ujung abdomen. Perbedaan antar famili yaitu tungkai dan sayap. Serangga-serangga ordo Mecoptera terbagi atas beberapa famili yaitu: Bittacidae, Boreidae, Meropeidae, Panorpididae, dan Panorpididae.



Gambar 2.11 *Panorpa rufescen*. (Sumber: Echo, 2017).

11. Ordo Diptera

Berasal dari kata di yang berarti dua dan ptera yang berarti sayap. Ukuran tubuh bervariasi. Mempunyai sepasang sayap di depan karena sayap belakang mereduksi, berfungsi sebagai alat keseimbangan. Larva tanpa kaki, kepala kecil, tubuh halus, dan tipis. Mulut bertipe penghisap dengan variasi struktur mulut seperti penusuk, penyerap dan seolah-olah berfungsi. Pembagian famili berdasarkan pada perbedaan sayap dan antena. Serangga-serangga ordo dipteral terbagi atas beberapa famili yaitu: Nymphomyiidae, Tricoceridae, Tanyderidae, Xylophagidae, dan Tipulidae.

12. Ordo Hymenoptera

Hymenoptera berasal dari kata Hymeno yang berarti selaput dan ptera yang berarti sayap. Ukuran tubuh bervariasi. Mempunyai dua pasang sayap yang berselaput dengan vena sedikit bahkan hampir tidak ada untuk yang berukuran kecil. Sayap depan lebih lebar dari pada sayap yang belakang. Antena 10 ruas atau lebih. Mulut bertipe penggigit dan penghisap.



Gambar 2.13 *Dolichoderus thoracicus* (Semut hitam). (Sumber: Hasil Peneliti, 2017).

D. Peranan Fauna Tanah

Salah satu organisme penghuni tanah yang berperan sangat besar dalam perbaikan kesuburan tanah adalah fauna tanah. Proses dekomposisi dalam tanah tidak akan mampu berjalan dengan cepat bila tidak ditunjang oleh kegiatan makrofauna tanah. Makrofauna tanah berperan penting dalam dekomposisi bahan organik tanah dalam penyediaan unsur hara. Makrofauna akan merombak substansi nabati yang mati, kemudian bahan tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk kotoran. Secara umum, keberadaan aneka macam fauna tanah pada tanah yang tidak terganggu seperti padang rumput, karena siklus hara berlangsung secara kontinyu (Arief, 2001).

Menurut Barnes (1997), fauna tanah memainkan peran penting dalam perombakan zat atau bahan-bahan organik yaitu:

1. Menghancurkan jaringan secara fisik dan meningkatkan ketersediaan daerah bagi aktifitas bakteri dan jamur.
2. Melakukan perombakan pada bahan pilihan seperti gula, sellulosa dan sejenis lignin.
3. Merubah sisa-sisa tumbuhan menjadi humus.
4. Menggabungkan bahan yang membusuk pada lapisan tanah bagian atas.
5. Membentuk bahan organik dan bahan mineral.

Menurut Setiadi (1989), peranan terpenting dari organisme tanah di dalam ekosistemnya adalah sebagai perombak bahan anorganik yang tersedia bagi tumbuhan hijau. Nutrisi tanaman yang berasal dari berbagai residu tanaman akan mengalami proses dekomposisi sehingga terbentuk humus sebagai sumber nutrisi tanah. Dapat dikatakan bahwa peranan ini sangat penting dalam mempertahankan dinamika ekosistem alam. Selain itu Suharjono (1997), menyebutkan beberapa jenis fauna permukaan tanah dapat digunakan sebagai petunjuk (indikator) terhadap kesuburan tanah atau keadaan tanah. Fauna tanah memperbaiki sifat fisik tanah dan menambah kandungan bahan organiknya (Borrordkk, 1992). Wallwork (1976), menegaskan bahwa fauna tanah juga berfungsi sebagai perombak material tanaman dan penghancur kayu.

Menurut Rahmawati (2006), faktor- faktor yang mempengaruhi keberadaan fauna tanah adalah:

1. Struktur tanah berpengaruh pada gerakan dan penetrasi fauna tanah.
2. Kelembaban tanah dan kandungan hara berpengaruh terhadap perkembangan dalam daur hidup.
3. Suhu tanah mempengaruhi peletakan telur.
4. Cahaya dan tata udara mempengaruhi kegiatannya.

Proses dekomposisi yang berlangsung menurut Notohadiprawiro (1999), dapat juga memberikan pengaruh terhadap kemantapan struktur tanah.

Tabel 2.1 Pengaruh Proses Dekomposisi terhadap Kemantapan Struktur Tanah

Organisme	Pendauran Hara	Struktur Tanah
Mikroflora	Katabolisme bahan organik, mineralisasi dan imobilisasi	Menghasilkan senyawa organik pengikat agregat, nymphae menjerat zarah menjadi agregat
Mikrofauna	Mengatur populasi bakteri dan fungi, mengubah perputaran hara	Dapat mendayai struktur agregat lewat saling tindak dengan mikroba
Mesofauna	Mengatur populasi fungi dan mikrofauna, mengubah perputaran hara, dan memotong sisa-sisa tumbuhan	Menghasilkan gentel tinja, menciptakan biofori, memajukan humifikasi
Makrofauna	Memotong sisa-sisa tumbuhan, merangsang kegiatan mikrobia	Mencampur zarah organik dan mineral, mengagihkan ulang bahan organik dan jasad renik, menciptakan biofori, memajukan humifikasi, menghasilkan gentel tinja

Selain dapat membentuk kemantapan struktur tanah, proses dekomposisi tersebut dapat pula menghasilkan berbagai zat kimia yang mempunyai efek positif sebagai zat perangsang pertumbuhan, dan yang mempunyai efek negatif sebagai penghambat pertumbuhan, zat yang dapat dihasilkan adalah Asam Indol Asetat (IAA) dan Gibberelin. Zat kimia ini disebut hormon lingkungan. Dengan demikian, banyak produk dekomposisi berfungsi bukan hanya sebagai bahan makanan, tetapi juga sebagai faktor kimiawi. Dapatlah diambil kesimpulan bahwa organisme pengurai mempunyai tiga fungsi utama dalam suatu ekosistem, selain mengatur keperluan dan kelangsungan hidup sendiri, yaitu: mineralisasi bahan-bahan organik yang telah mati, menghasilkan makanan untuk organisme lain dan menghasilkan zat-zat kimia yang disebut hormon lingkungan (Hanafiah, 2005).

E. Faktor Pengaruh Keanekaragaman Serangga

Keragaman jenis adalah sifat komunitas yang memperlihatkan tingkat keanekaragaman jenis organisme yang ada di dalamnya (Pelawi, 2009). Untuk memperoleh keragaman jenis ini cukup diperlukan kemampuan mengenal dan membedakan jenis meskipun tidak dapat mengidentifikasi jenis hama.

Menurut Pelawi (2009), ada 6 faktor yang saling berkaitan menentukan derajat naik turunnya keragaman jenis yaitu :

1. Waktu, keragaman komunitas bertambah seiring waktu. Sehingga komunitas tua yang sudah lama berkembang lebih banyak terdapat organisme dari pada

komunitas muda yang belum berkembang, Waktu dapat berjalan dalam ekologi lebih pendek atau sampai puluhan generasi.

2. Heterogenitas ruang, semakin heterogen suatu lingkungan fisik semakin kompleks komunitas flora dan fauna di suatu tempat tersebar dan semakin tinggi keragaman jenisnya.
3. Kompetisi, terjadi apabila sejumlah organisme menggunakan sumber yang sama yang ketersediaannya kurang, atau walaupun ketersediaannya cukup, namun persaingan tetap terjadi juga bila organisme-organisme itu memanfaatkan sumber tersebut, yang satu menyerang yang lain atau sebaliknya.
4. Pemasangan, yang mempertahankan komunitas populasi dari jenis bersaing yang berbeda di bawah daya dukung masing-masing selalu memperbesar kemungkinan hidup berdampingan sehingga mempertinggi keragaman, apabila intensitas pemasangan terlalu tinggi atau rendah dapat menurunkan keragaman jenis.
5. Kestabilan iklim, yaitu kestabilan suhu, kelembaban, salinitas, pH dalam suatu lingkungan subur. Lingkungan yang stabil, lebih memungkinkan keberlangsungan evolusi.
6. Produktivitas, hal ini juga dapat menjadi syarat mutlak untuk keanekaragaman yang tinggi.

Keenam faktor ini saling berinteraksi untuk menetapkan keanekaragaman jenis dalam komunitas yang berbeda. Keanekaragaman spesies sangatlah penting dalam menentukan batas kerusakan yang dilakukan terhadap sistem alam akibat turut campur tangan manusia (Pelawi, 2009).

F. Tanah

Lingkungan tanah adalah lingkungan yang terdiri dari lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Gabungan dari kedua lingkungan ini menghasilkan suatu wilayah yang dapat dijadikan tempat tinggal bagi beberapa jenis makhluk hidup, salah satunya adalah serangga tanah. Tanah dapat didefinisikan sebagai medium alami untuk pertumbuhan tanaman yang tersusun atas mineral, bahan organik, dan organisme hidup. Kegiatan biologis seperti pertumbuhan akar dan metabolisme mikroba dalam tanah berperan dalam membentuk tekstur dan kesuburannya (Rao, 1994).

Tanah merupakan salah satu dari ekosistem darat yang di tempati serangga. Kehidupan serangga tanah sangat tergantung habitatnya, karena keberadaan dan kepadatan populasi suatu jenis serangga tanah di suatu daerah sangat ditentukan oleh daerah tersebut. Dengan kata lain keberadaan dan kepadatan populasi bagian dari ekosistem tanah, oleh karena itu dalam mempelajari ekologi serangga tanah faktor fisika-kimia tanah selalu diukur (Suin, 1997).

Secara ekologis tanah tersusun oleh tiga kelompok material, yaitu material hidup (faktor biotik) berupa biota (jasad-jasad hidup), faktor abiotik berupa bahan

organik, dan faktor abiotik berupa pasir (sand), debu (silt), dan liat (clay). Umumnya sekitar 5% penyusun tanah merupakan biomassa (biotik dan abiotik). Meskipun hanya 5% biomassa berperan sangat penting sebagai bahan koloidal tanah, disamping koloidal liat, yang mempengaruhi sifat-sifat kimiawi tanah seperti dalam proses pertukaran kation dan anion, dan sifat-sifat fisik tanah seperti struktur dan erodibilitas tanah, dan juga berperan penting sebagai sumber hara (nutrition) tanah yang akan tersedia (available) bagi tanaman (juga mikrobia) setelah bahan organik mengalami perombakan menjadi senyawa-senyawa sederhana (dekomposisi atau mineralisasi) (Hanafiah dkk., 2007).

Bagi ekosistem darat, tanah merupakan titik pemasukan sebagian besar bahan ke dalam tumbuhan. Melalui akar-akarnya tumbuhan menyerap air, nitrat, fosfat, sulfat, kalium, tembaga, seng, dan mineral esensial lainnya. Dengan semua ini, tumbuhan mengubah karbondioksida (dimasukkan melalui daun) menjadi protein, karbohidrat, lemak, asam nukleat, dan vitamin yang dari semuanya itu tumbuhan dan semua makhluk heterotrof bergantung. Bersamaan dengan suhu dan air, tanah merupakan penentu utama dalam produktivitas bumi (Kimball, 1999).

Suhu tanah merupakan salah satu faktor fisika tanah yang sangat menentukan kehadiran dan kepadatan organisme tanah, dengan demikian suhu tanah akan menentukan tingkat dekomposisi material organik tanah. Fluktuasi suhu tanah lebih rendah dari suhu udara, dan suhu tanah sangat tergantung dari suhu udara. Suhu tanah lapisan atas mengalami fluktuasi dalam satu hari satu malam dan tergantung musim.

Fluktuasi itu juga tergantung pada keadaan cuaca, topografi daerah dan keadaan tanah (Suin, 1997).

G. Tinjauan Umum Kecamatan Pattallassang

Kecamatan Pattallassang merupakan satu dari 18 kecamatan yang ada di kabupaten Gowa, provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2005. Secara administratif terbagi kedalam delapan desa/kelurahan masing-masing: Timbuseng, Sunggumanai, Pattallassang, Paccellekang, Pallantikang, Borong Pa'lala, Panaikang dan Je'nemadinging. Kecamatan Pattallassang terletak di batas wilayah sebelah Utara Kabupaten Maros, sebelah Selatan Kecamatan Bontomarannu, sebelah Barat Kecamatan Somba Opu dan Kota Makassar, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Parangloe (Denassa, 2016).

Pattallassang merupakan ibukota kecamatan Pattallassang berjarak sekitar 13 km dari Sungguminasa ibukota Kabupaten Gowa. Jumlah penduduk kecamatan Pattallassang pada tahun 2009 sebesar 19.780 jiwa, terdiri dari laki-laki sebesar 9.645 jiwa dan perempuan sebesar 10.135 jiwa. Dari populasi ini sekitar 99,00 persen beragama Islam (Denassa, 2016).

Penduduk Kecamatan Pattallassang umumnya berprofesi sebagai petani dengan komoditas utama padi, palawija, dan sayuran. Terdapat pula penduduk yang bergerak di sektor non pertanian seperti lapangan usaha perdagangan dan jasa (Denassa, 2016).

H. Pandangan Islam Tentang Serangga Tanah

Al-Qur'an sebagai kitab Allah yang terakhir banyak sekali memuat ayat-ayat yang menjelaskan hewan ciptaan-Nya salah satunya adalah fauna tanah. Berikut ini adalah beberapa contoh ayat - ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang fauna tanah:

1. Surat Al-Naml/27: 18 (Semut)

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمَلَةٌ يَتَأْتِيهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا
تَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya :

Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari" (Kementrian Agama RI, 2012).

Ayat tersebut menggambarkan semut-semut tersebut sedang mencari makan untuk di bawa ke sarangnya, salah satu semut melihat Nabi Sulaiman dan tentaranya akan melewati tempat tersebut sehingga semut tersebut menyuruh teman-temannya untuk kembali ke sarang. Begitu besar jumlah tentara itu yang akan melintas di sini, sedang kamu adalah makhluk yang sangat kecil. Kamu pasti akan hancur terkena injak kakinya dan kaki kendaraanya. Beribu-ribu kamu akan binasa, sedang Sulaiman dan tentaranya tidaklah akan sadar atau meskipun mereka tahu, meskipun mereka melihat bangkai semut telah bergelimpangan tidaklah akan jadi perhatian mereka,

karena kita bangsa semut adalah makhluk kecil saja dibandingkan dengan mereka. Semut mampu memikul beban yang jauh lebih besar dari badannya (Shihab, 2003).

Ayat tersebut menunjukkan kebesaran makhluk ciptaan Allah yaitu semut yang mampu berkomunikasi dan saling mengingatkan kelompoknya dari bahaya yang mungkin akan menimpanya. Dan hal ini merupakan bukti bahwa dalam kehidupan semut mempunyai bahasa percakapan (Pasya, 2004).

2. Surat Al - A'raaf /7: 133 (Belalang)

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ ءَايَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ
فَأَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ

Terjemahnya:

Maka Kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa (Kementrian Agama RI tahun 2012).

Ayat tersebut menjelaskan tentang tanda-tanda permulaan terjadinya kebinasaan yang di janjikan Musa kepada Fir'aun dan kaumnya. Dengan demikian Allah menurunkan bencana kepada Fir'aun dan kaumnya dari waktu ke waktu. Kejadian itu merupakan peringatan bagi siapapun yang mendengarnya dan pencegah supaya mereka jangan meniru kaum kafir yang mendustakan para rasul sehingga tidak akan dituruni bencana seperti yang telah menimpa Fir'aun dan kaumnya (Al-Maraghi, 1994).

3. Surat Saba'/ 34 : 14 (Rayap)

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَهَمَهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِن سَأْتِهِ ۖ فَلَمَّا
 خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Maka tatkala Kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang ghaib tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. (Kementrian Agama RI, 2012).

Ayat tersebut menggambarkan betapa besar anugrah Allah SWT kepada Nabi Sulaiman, serta betapa luas kekuasaan dan dilimpahkan kepadanya. Ini boleh jadi mengantar seseorang menduga bahwa hidupnya akan kekal, karena itu ayat di atas melukiskan kematiannya dan betapa mudah Allah SWT mencabut nyawanya. Sekaligus menunjukkan betapa lemahnya jin dan betapa banyaknya dugaan menyangkut makhluk ini yang tidak benar (Shihab, 2003).

4. Surat Al - Hajj/22: 73 (Lalat)

يَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ ۖ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن
 تَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۗ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ۗ ضَعُفَ
 الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾

Terjemahannya:

Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, Maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu menciptakannya dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, Tiadalah

mereka merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan Amat lemah (pulalah) yang disembah (Kementrian Agama RI, 2012)

Ayat tersebut menjelaskan tentang peringatan kepada manusia untuk tidak menyembah berhala. (Wahai manusia), Kami akan menampakkan suatu kenyataan yang aneh di depan mata kalian. Maka dengarkanlah dan renungkan. Berhala-berhala itu tidak akan mampu menciptakan apa pun, termasuk seekor lalat, makhluk yang hina dan tidak berarti, meskipun mereka saling membantu untuk menciptakannya. Bahkan apabila makhluk yang tidak berarti itu mengambil sebagian dari binatang persembahan, berhala-berhala itu tidak mampu menghalangi atau mengambilnya kembali. Alangkah lemahnya sesuatu yang dikalahkan oleh lalat karena tidak mampu mengambil kembali sesuatu yang telah diambil darinya. Padahal lalat itu sendiri sudah lemah. Keduanya memang sama-sama lemah, tetapi berhala-berhala itu tampak lebih lemah. Oleh karena itu, bagaimana seorang manusia yang berakal sampai hati untuk menyembah dan mencari manfaat dari berhala-berhala seperti itu (Shihab, 2003).

5. Surat Al - Nahl/16: 68 (Lebah)

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦٨﴾

Terjemahannya:

Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia (Kementrian Agama RI, 2012)

Wahai Nabi, Tuhanmu telah memberi ilham pada lebah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut berbagai faktor-faktor dan sarana-sarana untuk mempertahankan hidup. Dalam hal ini, Allah memerintahkan lebah untuk menjadikan gua-gua dipegunungan, celah-celah pepohonan dan puncak-puncak rumah sebagai tempat tinggal mereka (Shihab, 2003).

6. Surat Al – Ankabut/29: 41 (Laba-Laba)

مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui (Kementerian Agama RI, 2012).

Keadaan orang-orang yang mendustakan dan tunduk kepada selain Allah, dalam hal kelemahan dan ketergantungan mereka kepada yang tidak dapat dijadikan tempat bergantung adalah bagaikan laba-laba yang menjadikan rumahnya sebagai tempat berlindung. Kalau seandainya orang-orang yang mendustakan adalah orang-orang yang berilmu, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Sarang laba-laba yang dijadikan sebagai tempat tinggal dan perangkap untuk menangkap mangsanya, memang pembuatannya sangat rumit karena terbuat dari benang-benang yang sangat halus yang melebihi sehalusnya sutera. Kehalusan sarang laba-laba inilah yang


membuat susunannya menjadi rumah paling lemah yang dijadikan tempat berlindung oleh hewan apapun (Shihab, 2003).

Dalam surat Al-Naml dijelaskan tentang semut, Al-A'raaf menjelaskan tentang belalang, Saba' menjelaskan tentang rayap, Al-Hajj menjelaskan tentang lalat, Al-Nahl menjelaskan tentang lebah, dan Al-Ankabut menjelaskan tentang laba-laba. Makna dari ayat-ayat tersebut bahwa Allah menciptakan suatu hal di bumi ini tidak ada yang sia-sia. Dalam hal ini Allah menciptakan serangga tanah seperti semut, belalang, laba-laba, rayap, lalat, dan lebah. Semut, laba-laba, belalang, lalat, lebah dan rayap merupakan serangga tanah yang memegang peran penting sebagai *soil engineer*, *litter transformer*, *soil decomposer* dan predator. Serangga tanah sebagai litter transformer dan soil decomposer masing-masing melakukan fragmentasi dan degradasi bahan organik seperti tumbuh – tumbuhan, hewan, dan juga feses yang membusuk. Dari proses tersebut maka akan menghasilkan garam mineral yang digunakan sebagai nutrisi tumbuhan untuk proses pertumbuhan.

Proses dekomposisi bahan-bahan organik berlangsung sebagai berikut: pertama-tama perombak yang besar atau makrofauna (contohnya rayap dan semut) meremah-remah substansi yang telah mati, kemudian materi ini akan melalui usus dan akhirnya menghasilkan butiran-butiran feses. Butiran – butiran feses tersebut akan dimakan oleh mesofauna (Collembola) yang hasil akhirnya akan dikeluarkan dalam bentuk feses pula. Feses tersebut selanjutnya akan dimakan oleh mikrofauna dengan bantuan enzim spesifik yang terdapat dalam saluran pencernaannya. Penguraian akan menjadi lebih sempurna apabila hasil ekskresi dari mikrofauna

dihancurkan dan diuraikan lebih lanjut oleh mikroorganisme terutama bakteri hingga sampai pada proses mineralisasi. Melalui proses tersebut, mikroorganisme yang telah mati akan menghasilkan garam-garam mineral yang akan digunakan oleh tumbuhan (Rahmawaty, 2006).

I. Kerangka Fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu mengadakan kegiatan pengumpulan data, menganalisis data dan menginterpretasikan data yang bertujuan membuat deskripsi mengenai kejadian yang terjadi pada penelitian dan teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi secara langsung di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-eksploratif yang dilengkapi dengan pemeriksaan laboratorium. Melalui kegiatan deskriptif-eksploratif ini untuk mengetahui jenis dan keanekaragaman serangga tanah yang ada di perkebunan Desa Pattalassang Kabupaten Gowa.

C. Variabel Penelitian

Penelitian ini memiliki variabel tunggal yaitu serangga tanah.

D. Defenisi Operasional

1. Identifikasi adalah proses pengenalan, menempatkan obyek atau individu dalam suatu kelas sesuai dengan karakteristik tertentu.

2. Serangga tanah adalah serangga yang hidup di tanah, baik itu yang hidup di permukaan tanah maupun di dalam tanah yang diambil dengan menggunakan metode *Pitfall Trap*.
3. *Pitfall Trap* adalah piranti yang biasa digunakan untuk menangkap hewan khususnya untuk hewan yang dipermukaan tanah.

E. Populasi dan Sampel

Populasi yang diamati adalah seluruh serangga tanah di lokasi penelitian di Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah serangga tanah yang tertangkap dengan teknik sampling *Pitfall Trap*.

F. Instrumen Penelitian

1. Alat

Peralatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah, alat tulis menulis, atap sumuran, botol sampel, jarum pentul, gunting, pisau, kamera, kaca pembesar, kantong plastik, mikroskop dan Buku Identifikasi *Ie Guides to Insects of Importance to Man* (Booth, 1996).

2. Bahan

Bahan digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah Alkohol 70% dan Detergen.

G. Prosedur Kerja

1. Penentuan Plot Pengamatan


Pengamatan dilakukan pada 5 titik stasiun. Pada tiap stasiun dibuat satu transek yang berukuran 40 m kemudian pada tiap transek terdapat lima perangkat yang diletakkan pada lima plot. Pada tiap-tiap plot dipasang satu perangkat sumuran (*Pitfall Trap*). Jarak antara satu perangkat dengan yang lainnya adalah 10 m. Penelitian dilakukan dalam tiga kali pengulangan.



Gambar 3.1 Peta Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa
(Sumber: <http://www.GoogleEarth.com>)

Keterangan:

- Stasiun 1 : Sebelah Timur
- Stasiun 2 : Sebelah Utara
- Stasiun 3 : Sebelah Barat
- Stasiun 4 : Sebelah Selatan
- Stasiun 5 : Titik Tengah



Gambar 3.2 Disain letak *Pitfall Trap*

2. Pemasangan Perangkap

Perangkap yang digunakan ialah perangkap sumuran *Pitfall Trap* yang biasanya digunakan untuk serangga yang aktif di permukaan tanah. Pada tiap plot pengamatan di pasang 15 perangkap, penempatan perangkap dilakukan dengan cara membenamkan perangkap ke dalam tanah dengan permukaan perangkap sejajar dengan permukaan tanah. Perangkap tersebut berisi air sabun secukupnya dan dipasangkan atap setinggi ± 30 cm dari permukaan tanah dan untuk mencegah masuknya air apabila turun hujan maka di buatkan parit kecil di sebelah depan dan belakang perangkap.

3. Pengambilan Serangga

Metode sampel serangga dilakukan dengan menggunakan *Pitfall Trap* pada pagi hari yang di pasang pada setiap lokasi selama satu minggu dan diganti setiap minggu. Penelitian dilakukan selama dua bulan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan di perkebunan Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa diperoleh 14 spesies yang tercakup kedalam 13 famili. Umumnya spesies yang ditemukan adalah spesies Gryllidae (Jangkrik). Adapun hasil identifikasi yang telah dilakukan di perkebunan Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, disajikan pada tabel 4.1

Tabel 4.1 Hasil Identifikasi Serangga tanah di perkebunan Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.

No	Nama Famili	Spesies	Stasiun					Jumlah
			I	II	III	IV	V	
1.	Formicidae	<i>Dolichoderus thoracicus</i>	6	0	7	7	9	29
		<i>Formica pallidefulva</i>	2	0	0	3	0	5
2.	Micropezidae	<i>Rainieria antennaepes</i>	0	0	1	0	0	1
3.	Acrididae	<i>Dichromorpha viridis</i>	1	0	1	7	7	16
4.	Aranae	<i>Xysticus fervidus</i>	2	1	0	5	6	14
5.	Gryllidae	<i>Gryllus vernalis</i>	2	3	41	1	1	48
6.	Muscidae	<i>Muscina pascuorum</i>	0	0	5	1	6	12
7.	Scarabaeidae	<i>Megasoma vogti</i>	1	0	0	0	0	1
8.	Hydrophilidae	<i>Cercyon</i>	0	0	0	1	0	1

		<i>praetextatus</i>						
9.	Trachelidae	<i>Trachelas volutus</i>	0	6	3	0	0	9
10.	Anisolabididae	<i>Maritime Earwig</i>	0	0	0	1	0	1
11.	Drosophilidae	<i>Drosophila melanogaster</i>	0	0	4	1	0	5
12.	Chrysomelidae	<i>Charidotella sexpunctata</i>	0	0	0	0	1	1
13.	Silphidae	<i>Oiceoptoma rugulosum</i>	1	0	0	0	0	1
Jumlah			15	10	62	27	30	144

Jumlah serangga tanah yang didapat berdasarkan lokasi (stasiun) di perkebunan Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan berbeda beda. Serangga yang ditemukan di perkebunan Desa Pattallassang yang paling banyak didapat di stasiun III yaitu 62 spesies. Ini berarti di stasiun III kondisi lingkungannya masih terjaga dan sumber makanannya masih tersedia. Hasil identifikasi serangga tanah di perkebunan Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan disajikan pada Gambar 4.1



Gambar 4.1 Diagram Kelimpahan Serangga Tanah

B. Pembahasan

Spesies yang paling banyak di temukan adalah *Gryllus vernalis*, dimana jumlahnya sebanyak 48 spesies. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan populasi dari *Gryllus vernalis* yang cepat sehingga dapat mengakibatkan tingginya jumlah anggota populasi, hal inilah yang mengakibatkan *Gryllus vernalis* lebih banyak populasinya yang mendominasi di perkebunan Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi perkembangbiakan dan tingkat produktivitas dari setiap jenis serangga tanah tidak sama masanya dan hal ini juga dapat menyebabkan adanya jenis yang mendominasi di lingkungan tersebut. Pada

waktu masa reproduktif maka jumlah individu dalam populasi tersebut meningkat, sedangkan pada waktu tidak reproduktif maka jumlahnya mengalami penurunan.

Jumlah spesies yang paling sedikit yaitu *Rainieria antennaepe*s, *Megasoma vogti*, *Cercyon praetextatus*, *Maritime Earwig*, *Charidotella sexpunctata*, dan *Oiceoptoma rugulosum*, dimana jumlah masing-masingnya 1. Hal ini disebabkan karena adanya suatu jenis yang mendominasi dan kondisi lingkungan yang tidak baik untuk tempat pertumbuhan dan perkembangan populasinya.

Sejalan dengan pengaruh pertumbuhan populasi dan masa reproduksi yang berbeda, adanya kompetisi dan pemangsa yang terjadi antar spesies juga berpengaruh terhadap pengurangan dan penambahan jenis maupun jumlah penyusun komunitas yang akhirnya juga menyebabkan adanya suatu jenis yang mendominasi pada komunitas tersebut.

Gambar 4.1 menunjukkan individu yang diperoleh dari titik stasiun diperkebunan Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa. Individu yang paling banyak ditemukan pada stasiun III, dimana jumlah individunya berjumlah 62. Banyaknya individu yang diperoleh pada stasiun III karena melimpahnya makanan yang tersedia serta kondisi lingkungan yang sesuai bagi pertumbuhan jenis serangga tersebut.

Jumlah individu yang paling sedikit ditemukan yaitu pada stasiun II, dimana jumlah individunya 10. Sedikitnya jumlah individu pada stasiun II disebabkan karena berkurangnya sumber makanan serta kondisi lingkungan yang tidak sesuai untuk pertumbuhan serangga.

Banyaknya jumlah spesies maupun individu yang ditemukan disebabkan karena serangga-serangga tanah bersifat *mobile*, sehingga bila kondisi lingkungan tidak baik maka serangga tanah tersebut akan berpindah tempat. Secara teoritis hewan secara aktif akan berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain, apabila terjadi perubahan lingkungan sementara misalnya hujan. Dengan berpindah dari lingkungan yang berubah, hewan akan dapat tinggal pada rentangan kondisi lingkungan yang optimum bagi mereka.

Kehidupan serangga tanah tergantung habitatnya, karena keberadaan dan kepadatan populasi suatu jenis serangga tanah di suatu daerah sangat ditentukan oleh keadaan daerah tersebut. Dengan kata lain keberadaan dan kepadatan populasi suatu jenis serangga di suatu daerah sangat tergantung dari faktor lingkungan, yaitu lingkungan biotik dan abiotik.

Serangga tanah berperan sangat besar dalam perbaikan kesuburan tanah. Serangga-serangga yang ditemukan di perkebunan Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, terdapat spesies-spesies yang berperan sebagai Polinator, Dekomposer, Predator, Parasitoid dan Bioindikator. Adapun spesies-spesies yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. *Dolichoderus thoracicus* (Semut hitam)

Dolichoderus thoracicus memiliki ukuran tubuh 1 cm, berwarna hitam, mempunyai 1 pasang antena, bentuk kepalanya oval, mata oval dan terletak agak kesamping dengan tipe mulut menggigit, tungkai 3 pasang dan abdomennya kelihatan

menyempit. Fauna ini berperan sebagai predator yang memakan insecta kecil dan juga nectar.

Ditemukanya *Dolichoderus thoracicus* di perkebunan Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, disebabkan karena faktor lingkungan yang sesuai dengan kehidupan serangga ini. Faktor lingkungan tersebut bisa jadi faktor biotik dan abiotiknya. Faktor biotik bisa berupa ketersediaannya jumlah makanan yang ada pada lahan perkebunan Desa Pattallassang, Kabupaten Gowa dan kurangnya musuh alami dari serangga tersebut.

Dolichoderus thoracicus ini merupakan kelompok hewan terestrial paling dominan di daerah tropik. *Dolichoderus thoracicus* berperan penting dalam ekosistem terestrial sebagai predator, scavenger, herbivora, detritivora, dan granivora, serta memiliki peranan yang unik dalam interaksinya dengan tumbuhan atau serangga lain. *Dolichoderus thoracicus* merupakan salah satu hewan permukaan tanah yang berperan penting dalam proses pembentukan tanah. *Dolichoderus thoracicus* ini mampu menghancurkan serasah atau materi organik yaitu dengan cara memakannya. *Dolichoderus thoracicus* memainkan peran penting dalam ekosistem, dominasi mereka di habitat semi-kering memiliki efek regulasi pada serangga lain. Selain itu, mereka adalah sumber makanan untuk kadal, mamalia predator kecil, burung pemakan serangga dan arthropoda termasuk laba-laba, semut-singa dan kumbang.

Klasifikasi :

Kingdom	: Animalia
Filum	: Arthropoda
Kelas	: Insecta
Ordo	: Hymenoptera
Famili	: Formicidae
Sub Famili	: Dolichoderinae
Genus	: Dolichoderus
Spesies	: <i>Dolichoderus thoracicus</i> (Borror dkk, 1992)

2. *Rainieria antennaepes* (Lalat rimpang).

Rainieria antennaepes memiliki ukuran tubuh 1 cm, berwarna hitam kecoklatan, memiliki abdomen yang panjang dan meruncing yang merupakan ciri khas dari famili ini dan memiliki bentuk sayap yang panjang dan ramping. Fauna ini berperan sebagai predator yang memakan serangga kecil dan juga tertarik dengan hal-hal membusuk.

Rainieria antennaepes ini biasanya berada di atas rumput-rumput yang tinggi. Habitat *Rainieria antennaepes* biasanya berada di Phytotelmata (habitat air tawar umum di daerah pemukiman, terutama di daerah tropis lembab dipegang oleh hidup atau tanaman terestrial mati). *Rainieria antennaepes* termasuk fauna predator yang memakan serangga kecil dan juga tertarik dengan hal-hal membusuk. *Rainieria antennaepes* ini biasanya ditemukan pada daun, bunga, membusuk buah-buahan dan kotoran. *Rainieria antennaepes* aktif disiang hari untuk mencari makan.

Rainieria antennaepes ini umumnya mempunyai peranan yang sangat penting bagi ekosistem, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa kehadiran suatu famili ini, maka kehidupan suatu ekosistem akan terganggu dan tidak akan mencapai suatu keseimbangan. Peranan serangga dalam ekosistem diantaranya adalah sebagai polinator, dekomposer, predator (pengendali hayati), parasitoid (pengendali hayati), hingga sebagai bioindikator bagi suatu ekosistem.

Dalam hal ini *Rainieria antennaepes* berperan sebagai Polinator. Secara umum serangga tidak berperan langsung pada proses polinasi, serangga hanya bertujuan memperoleh nektar dari bunga yaitu sebagai sumber makanannya. Namun dalam hal ini serangga memiliki peran yang sangat penting, secara tidak sengaja polen atau serbuk sari menempel dan terbawa pada tubuh serangga hingga polen tersebut menempel pada kepala putik bunga lain dan terjadilah proses polinasi. *Rainieria antennaepes* ini aktif pada siang hari karena fauna ini biasanya ada pada permukaan daun-daunan atau hinggap pada daun, kulit kayu, agar tubuhnya terkena sinar matahari.

Klasifikasi :

Kingdom	: Animalia
Filum	: Arthropoda
Kelas	: Insecta
Ordo	: Diptera
Famili	: Micropezidae
Sub Famili	: Taenipterinae
Genus	: Rainieria
Spesies	: <i>Rainieria antennaepes</i> (Boror dkk, 1992)

3. *Dichromorpha viridis* (Belalang kayu)

Dichromorpha viridis memiliki ukuran tubuh 2 cm, mempunyai antenna yang pendek, abdomennya terdiri dari 11 segmen, dan warna tubuh dari fauna ini kecoklatan, mempunyai 3 pasang (Femur pada tungkai belakangnya besar). Fauna ini aktif pada siang hari. Fauna ini berperan sebagai herbivore (pemakan tumbuhan).

Dichromorpha viridis hidup di berbagai tipe lingkungan atau ekosistem seperti hutan, semak atau belukar, lingkungan perumahan, dan lahan pertanian. *Dichromorpha viridis* ini biasanya terbang diatas rumput-rumput, fauna ini dikenal sebagai hewan pemakan rumput. Keberadaannya di padang rumput memainkan peranan penting dalam laju aliran energi atau rantai makanan.

Keberadaan *Dichromorpha viridis* ini sangat ditentukan oleh aktifitas reproduksinya yang didukung oleh lingkungan yang cocok dan tercukupinya kebutuhan sumber makanannya. Kelimpahan dan aktifitas reproduksi serangga di daerah tropik sangat dipengaruhi oleh musim, karena musim berpengaruh kepada ketersediaan sumber pakan dan kemampuan hidup serangga yang secara langsung mempengaruhi kelimpahan

Dichromorpha viridis termasuk serangga herbivora yang dapat menyebabkan kehilangan hasil (kerusakan), baik secara langsung memakan jaringan tanaman atau sebagai vektor dari patogen tanaman. Di samping itu sebenarnya terdapat fungsi lain dari serangga ini yaitu sebagai pengontrol kemelimpahan tumbuhan. Serangga herbivora dimanfaatkan untuk mengendalikan pertumbuhan tumbuhan gulma. Fauna

ini aktif disiang hari untuk mencari makan dan fauna ini juga tidak memiliki sarang atau wilayah dan terus berpindah tempat untuk mencari makanan.

Klasifikasi :

Kingdom	: Animalia
Filum	: Arthropoda
Kelas	: Insecta
Ordo	: Orthoptera
Famili	: Acrididae
Sub Famili	: Gomphocerinae
Genus	: <i>Dichromorpha</i>
Spesies	: <i>Dichromorpha viridis</i> (Borrer dkk, 1996).

4. *Xysticus fervidus* (Laba-laba kebun)

Xysticus fervidus memiliki ukuran tubuh 1,90 cm, berwarna coklat kehitaman, tubuhnya berambut, mempunyai pola mata yang jelas, dan biasanya terdapat garis-garis putih pada tubuhnya. Fauna ini menyukai kondisi kering dan hidup tinggal didalam lipatan daun sambil menunggu mangsanya. Fauna ini adalah sebagai predator serangga yang berukuran kecil.

Keberadaan *Xysticus fervidus* di perkebunan Desa Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa yang terjebak dalam *Pitfall Trap* dikarenakan aktifitasnya mencari mangsa. Kebanyakan serangga ini aktif berjalan diatas permukaan tanah. *Xysticus fervidus* merupakan predator (pemangsa) penyergap, yang menunggu mangsa lewat di dekatnya sambil bersembunyi di balik daun, lapisan daun bunga, celah bebatuan, atau lubang di tanah. Beberapa jenis memiliki pola warna

yang menyamarkan tubuhnya di atas tanah, batu atau pepagan pohon, sehingga tidak perlu bersembunyi.

Xysticus fervidus ini memiliki peranan penting di dalam kehidupan manusia, terutama di bidang pertanian. Manusia selalu lebih sering melihat serangga secara antroposentris yaitu sebagai kelompok organisme yang lebih banyak mendatangkan kerugian daripada keuntungan bagi kehidupan manusia. Namun pada hakekatnya aspek-aspek positif dan manfaat serangga bagi kehidupan manusia jauh lebih besar daripada aspek-aspek yang merugikan karena fauna memiliki arti penting dalam ekosistem, melalui perannya sebagai musuh alami, serangga sangat membantu manusia dalam usaha pengendalian hama. Selain itu serangga juga membantu dalam menjaga kestabilan jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem pertanian.

Xysticus fervidus ini merupakan predator polifag sehingga berperan penting dalam mengontrol populasi serangga. Pada ekosistem Pertanian mampu mengendalikan serangan kepik yang merupakan pemangsa wereng yang efektif. *Xysticus fervidus* ini aktif di malam hari untuk mencari makan. Habitat *Xysticus fervidus* ini yang hidup di serasah, daun-daun yang gugur di hutan merupakan habitat yang sesuai baginya. Jumlahnya meningkat lebih banyak ketika lapisan serasah semakin tebal karena lebih banyak tempat tersedia untuk bersembunyi dan terhindar dari suhu. *Xysticus fervidus* ini pemangsa hewan-hewan kecil. Peran fauna ini memangsa spesies yang lebih kecil untuk menjaga keseimbangan ekologi atau sebagai agen pengendali alami di dalam ekosistem.

Klasifikasi :

Kingdom	: Animalia
Filum	: Arthropoda
Kelas	: Arachnida
Ordo	: Aranae
Famili	: Thomisidae
Genus	: Xysticus
Spesies	: <i>Xysticus fervidus</i> (Borror, 1992).

5. *Gryllus vernalis* (Jangkrik)

Gryllus vernalis mempunyai ukuran tubuh 1,90 cm, berwarna hitam dan memiliki 1 pasang antenna, toraks halus tidak ditumbuhi rambut, tungkai 3 pasang (femur tungkai belakang besar), dan 1 pasang embelan pada abdomen. Fauna ini aktif pada malam hari. Fauna ini berperan sebagai herbivora.

Gryllus vernalis di perkebunan Desa Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa yang terjebak dalam *Pitfall Trap* dikarenakan aktifitasnya di malam hari untuk mencari makan dan aktif berjalan di permukaan. Habitat hidup di berbagai habitat baik lingkungan basah maupun kering terutama lingkungan yang dinaungi rumput-rumput. *Gryllus vernalis* aktif di malam hari untuk mencari makan. *Gryllus vernalis* ini juga suka mengeluarkan suara di malam hari.

Habitat dari fauna ini menyebar dan dapat ditemukan diseluruh dunia. Mereka dapat ditemukan dan bertahan hidup hampir di setiap jenis lingkungan, dari padang rumput, hutan dan rawa-rawa. Selama musim panas mereka sebagian besar ditemukan di ladang atau di bawah puing-puing. *Gryllus vernalis* ini termasuk

herbivora pemakan tumbuhan dan hewan lainnya atau disebut omnivora dengan memakan bahan organik, termasuk bahan tanaman membusuk, dan jamur.

Gryllus vernalis ini adalah serangga pemakan tumbuhan. Jumlah spesiesnya hanya 26% dari seluruh spesies serangga yang ada. Fauna-fauna pemakan tumbuhan yang hidup dengan memakan gulma dapat bermanfaat dalam pengendalian gulma. Beberapa spesies serangga seperti ini telah digunakan dalam pengendalian gulma secara hayati. Sebagai pemakan tumbuhan serangga-serangga fitofag dapat memakan berbagai macam bagian tumbuhan mulai dari akar, batang, daun, bunga dan buah.

Klasifikasi :

Kingdom	: Animalia
Filum	: Arthropoda
Kelas	: Insecta
Ordo	: Orthoptera
Famili	: Gryllidae
Sub Famili	: Gryllinae
Genus	: Gryllus
Spesies	: <i>Gryllus vernalis</i> (Boror dkk, 1996).

6. *Formica pallidefulva* (Semut api)

Formica pallidefulva memiliki ukuran tubuh 1cm, berwarna hitam merah, memiliki 1 pasang antena, kepala oval, toraks melengkung, tungkai 3 pasang, tidak memiliki sayap, bentuk tungkai pedicel (metasoma), sungut menyiku dan pada ruas pertama sangat panjang, ruas metasoma kedua mengandung satu punuk (bungkul) dan

abdomen oval. Dalam ekosistem fauna ini berperan sebagai predator yang dapat menghancurkan serasah atau materil organik dengan cara memakannya.

Keberadaan *Formica pallidefulva* di perkebunan Desa Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa yang terjebak dalam *Pitfall Trap* dikarenakan aktifitasnya mencari mangsa. *Formica pallidefulva* telah menguasai hampir seluruh bagian tanah di Bumi. Hanya di beberapa tempat seperti di Islandia, Greenland dan Hawaii, mereka tidak menguasai daerah tersebut. Di saat jumlah mereka bertambah, mereka dapat membnetuk sekitar 15 - 20% jumlah biomassa hewan-hewan besar.

Formica pallidefulva mampu mengindera lingkungannya yang kompleks untuk mencari makanan dan kemudian kembali ke sarangnya dengan meninggalkan zat feromon pada jalur-jalur yang mereka lalui. Feromon adalah zat kimia yang berasal dari kelenjar endokrin dan digunakan oleh makhluk hidup untuk mengenali sesama jenis, individu lain, kelompok, dan untuk membantu proses reproduksi.

Formica pallidefulva merupakan salah satu jenis musuh alami. Semut ini memiliki cara hidup yang khas yaitu merajut daun-daun pada pohon untuk membuat sarang. *Formica pallidefulva* menyukai udara yang segar sehingga tidak mungkin ditemukan di dalam rumah. Hal itu pula yang menyebabkan mereka tidak membuat sarang di dalam tanah melainkan pada pohon. Selain perilakunya yang khas dalam membuat sarang, perilakunya lebih agresif daripada semut lainnya.

Manfaat *Formica pallidefulva* untuk tanaman telah dikenal di banyak negara. Demikian pula, petani-petani di Delta Mekong (Vietnam) dan di Kalimantan Timur

(Indonesia) mempunyai pengalaman mengenai semut ini yang dapat meningkatkan kualitas buah. Buah yang dihasilkan menjadi lebih menarik dan lebih segar. Sebagai Predator semut ini dapat mengganggu, menghalangi atau memangsa berbagai jenis hama seperti kepik hijau, ulat pemakan daun, dan serangga-serangga pemakan buah. Populasinya yang tinggi dapat mengurangi permasalahan hama tungau, pengorok daun dan penyakit *greening* pada kebun jeruk.

Klasifikasi:

Kingdom	: Animalia
Filum	: Arthropoda
Kelas	: Insecta
Ordo	: Hymenoptera
Famili	: Formicidae
Sub Famili	: Formicinae
Genus	: Formica
Spesies	: <i>Formica pallidefulva</i> (Borror dkk, 1996).

7. *Muscina pascuorum* (Lalat rumah)

Muscina pascuorum mempunyai ukuran tubuh 0,51 cm, berwarna hitam, mempunyai rambut disekitar daerah toraks. Pada bagian sayap lebih besar dari pada thoraks. Terdapat garis pada bagian venasi sayap. Bentuk sayap bulat telur. Fauna ini berperan sebagai vektor penyakit.

Keberadaan *Muscina pascuorum* di perkebunan Desa Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa yang terjebak dalam *Pitfall Trap* dikarenakan serangga ini terbang berpindah-pindah tempat untuk mencari makan.

Aktivitas *Muscina pascuorum* dipengaruhi oleh sinar (memiliki sifat fototrafik), temperatur, kelembaban, air, makanan, dan tempat perindukan. Pada malam hari tidak aktif, kecuali bila ada sinar buatan.

Muscina pascuorum ini aktif disiang hari untuk mencari makan. Fauna ini dimata manusia pada umumnya memiliki reputasi yang menjijikan dan cukup buruk, yang dimana banyak dikenal sebagai salah satu penyebab gagal panen, biang penyebar penyakit diare sampai penyakit tidur. Serangga yang hanya memiliki sepasang sayap ini memang memiliki sejarah yang cukup panjang dengan manusia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa keberhasilan dari sebuah ekosistem di dunia ini adalah terdapatnya produsen, konsumen dan pengurai yang seimbang. Buah-buahan yang tidak termakan oleh konsumen, akan diurai oleh ragi dan beberapa jenis serangga, salah satunya adalah *Muscina pascuorum* ini. Sebagai pengurai, lalat memiliki peranan yang sangat penting sebagai pengurai kotoran dan bangkai hewan.

Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali-imran ayat (190-191) yang berbunyi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam

keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka” (Kementrian Agama RI, 2012).

Dalam Surat Ali-imran ayat 190-191 dijelaskan bahwa Allah tidaklah menciptakan langit dan bumi (beserta semua yang ada di dalamnya atau di antara keduanya) dengan sia-sia. Hal itu menunjukkan bahwa semua ciptaan Allah itu bermanfaat salah satu contohnya yaitu lalat. Walaupun lalat ini di mata manusia banyak dikenal sebagai biang pembawa penyebar penyakit, tapi lalat memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai pengurai kotoran dan bangkai hewan.

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ini terdapat banyak sekali tanda-tanda kekuasaan-Nya bagi orang yang mau berpikir (berakal). Oleh karena diharapkan berbagai rangkaian proses dan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk mengenal siapa diri kita dan siapa pencipta kita serta apa yang Allah inginkan agar kita lakukan untuk mendekati-Nya.

Fungsi pengurai serangga di sini memang mungkin tidak sebagai pengurai sejati seperti jamur dan bakteri, tetapi memang berfungsi sebagai jembatan rantai makanan untuk jamur dan bakteri untuk diurai lebih lanjut. Aksi dari larva-larva lalat sebagai contohnya adalah membuat bangkai menjadi sebuah cairan yang nantinya akan diurai kembali oleh mikroorganisme. Fungsi dari larva lalat sebagai dekomposer juga digunakan oleh pihak kepolisian untuk menganalisa waktu dan lokasi kejadian dari kasus pembunuhan. Studi ini dikenal sebagai Forensik Entomologi.

Klasifikasi :

Kingdom	: Animalia
Filum	: Arthropoda
Kelas	: Insecta
Ordo	: Diptera
Famili	: Muscidae
Sub Famili	: Azeliinae
Genus	: Muscina
Spesies	: <i>Muscina pascuorum</i> (Borror dkk, 1992).

8. *Megasoma vogti* (Kumbang tanduk)

Megasoma vogti tubuh 1,51 cm, berwarna hitam, mempunyai 3 pasang kaki dibagian thoraks, dan pada bagian tubuhnya terdapat bulu-bulu. Tipe mulut penggigit. Larva ini dikenal dengan nama lundi, bertubuh silinder dengan bentuk melengkung atau menyerupai huruf C.

Adanya *Megasoma vogti* di perkebunan Desa Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa yang terjebak dalam *Pitfall Trap* dikarenakan fauna ini aktif berpindah tempat untuk mencari makan. Famili ini apabila sudah diganggu habitatnya maka dia akan berpindah tempat. Terganggu habitatnya karena aktifitas manusia di lahan perkebunan.

Dalam penelitian tentang sensor fisiologi seperti suhu, larva *Megasoma vogti* tertarik pda suhu 27-29 °C dan menghindari suhu yang lebih rendah. Tingkah laku larva didominasi oleh faktor cahaya, larva bergerak dipengaruhi oleh cahaya yang muncul secara tiba-tiba. Di lingkungan alami, jika larva ditempatkan pada permukaan

medium perkembangbiakan larva akan cepat bergerak turun menjauhi cahaya, larva bergerak mengikuti phototaksis negatif, kemungkinan hal ini merupakan adaptasi untuk menghindar dari pemangsa.

Megasoma vogti ini hidup pada tinja namun tidak termasuk kelompok kumbang tinja karena mereka tidak mengkonsumsi tinja tetapi predator dari arthropoda yang hidup pada tinja. *Megasoma vogti* di hutan dapat berfungsi sebagai pendegradasi materi organik yang berupa tinja satwa liar terutama mamalia, dan kadang-kadang burung dan reptil. Tinja diuraikan oleh kumbang menjadi partikel dan senyawa sederhana dalam proses yang dikenal dengan daur ulang unsur hara atau siklus hara. Peran lain dari kumbang tinja di alam adalah sebagai penyebar pupuk alam, membantu aerasi tanah, pengontrol parasit, dan penyerbuk bunga Araceae. Oleh karena fungsinya yang sangat penting dalam ekosistem, maka kumbang tinja merupakan jenis kunci (keystone species) pada suatu ekosistem.

Megasoma vogti ini juga banyak digunakan sebagai bioindikator stabilnya ekosistem karena tersebar luas diberbagai ekosistem, spesiesnya beragam, mudah dicuplik memiliki peran penting secara ekologis. *Megasoma vogti* berperan dalam penguraian kotoran hewan sehingga terlibat dalam siklus hara dan penyebaran biji pada tumbuh-tumbuhan yang terbawa melalui kotoran. Dengan demikian, *Megasoma vogti* merupakan bagian yang penting dalam ekosistem untuk mempertahankan keseimbangan alam dan rantai makanan.

Klasifikasi :

Kingdom	: Animalia
Filum	: Arthropoda
Kelas	: Insecta
Ordo	: Coleoptera
Famili	: Scarabaeidae
Sub Famili	: Dynastinae
Genus	: Megasoma
Spesies	: <i>Megasoma vogti</i> (Borror,1992).

9. *Cercyon praetextatus* (Kumbang air)

Cercyon praetextatus mempunyai ukuran tubuh 0,51 cm, bentuk tubuhnya oval, kepala tidak memanjang, mempunyai 2 pasang sayap yang keras, tipe mulutnya penggigit, dan warna tubuhnya hitam, pada sayap terdapat bintik kuning, tungkainya 3 pasang.

Ditemukan *Cercyon praetextatus* di perkebunan Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa disebabkan karena fauna ini aktif berjalan untuk mencari makan dengan cara berjalan diatas permukaan tanah. *Cercyon praetextatus* termasuk kumbang air yang memiliki bentuk tubuh lonjong atau bulat. Sebagian besar spesies ini adalah berukuran kecil, tetapi ada juga yang sangat besar. Spesies dalam subfamili *Hydrophilinae* hidup di air, sedangkan perwakilan dari subfamili *Sphaeridiinae* biasanya ditemukan pada tanah, di kotoran, atau sisa-sisa sayuran.

Serangga ini mempunyai fase larva dan imago di air (akuatik), untuk serangga dewasa bisa meninggalkan air dan mendekati cahaya. Larvanya bersifat predator, sedangkan imagonya bersifat omnivora, pemakan bangkai.

Cercyon praetextatus hidup di daerah terestrial seperti di kotoran, kompos, bangkai, dan bahan organik yang membusuk lainnya. Makanan serangga ini adalah tanaman dan hewan yang telah mati dan ada pula yang predator. Beberapa spesies yang hidup di darat memakan berbagai bahan yang telah membusuk dan belatung. Dengan perilaku makan (bahan organik yang telah membusuk) dan reproduksi, maka serangga ini sangat membantu menyebarkan dan menguraikan bahan-bahan organik yang menumpuk di suatu tempat. Aktifitas ini secara umum berpengaruh terhadap struktur tanah dan siklus hara sehingga juga berpengaruh pada tumbuhan disekitarnya. Dengan membenamkan bahan-bahan organik yang telah membusuk, *Cercyon praetextatus* ini dapat memperbaiki kesuburan dan aerasi tanah, serta meningkatkan siklus laju nutrisi.

Klasifikasi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kingdom : Animalia

Filum : Arthropoda

Kelas : Insecta

Ordo : Coleoptera

Famili : Hydrophilidae

Genus : *Cercyon*

Spesies : *Cercyon praetextatus* (Lilies, 1992).

10. *Trachelas volutus* (Laba-laba pertapa)

Trachelas volutus memiliki ukuran tubuh 0,24 cm , berwarna hitam mengkilap berwarna. Memiliki 4 pasang kaki. Tidak bersayap, dan tidak memiliki mulut pengunyah. Memiliki Dua segmen itu adalah *prosoma* (kepala dan dada) dan *abdomen* (perut). Kaki berada di *prosoma*. Fauna ini adalah sebagai predator serangga yang berukuran kecil. Fauna berperan sebagai predator.

Ditemukan *Trachelas volutus* di perkebunan Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa disebabkan karena fauna ini aktif berjalan untuk mencari makan dengan cara berjalan diatas permukaan tanah terutama pada tempat yang banyak daun-daun kering dan serasah.

Trachelas volutus ini banyak ditemukan dimana-mana yaitu dalam tanah, di bawah batu, di rumput dan di cabang pohon. Bagi fauna yang hidup diserasah, daun-daun yang gugur di perkebunan merupakan habitat baginya. Jumlahnya akan meningkat lebih banyak ketika lapisan serasah semakin tebal karena lebih banyak tempat tersedia untuk bersembunyi dan terhindar dari suhu yang ekstrim. Fauna ini berperan sebagai predator yang memakan serangga kecil lainnya.

Fauna ini memiliki peran penting dalam ekosistem. Banyaknya jumlah Fauna ini dalam suatu ekologi akan berdampak positif karena fauna ini dapat mengurai (memecahkan tanaman dan hewan yang mati dan mengubah mereka menjadi nutrisi tumbuhan). Ini merupakan peran penting karena memasok tanaman dengan mineral

dan nutrisi yang di perlukan bagi kehidupan. Hal ini juga membuat bahan mati tidak terakumulasi dilingkungan.

Klasifikasi :

Kingdom : Animalia
 Filum : Arthropoda
 Kelas : Arachnida
 Ordo : Araneae
 Famili : Trachelidae
 Genus : Trachelas
 Spesies : *Trachelas volutus* (Lilies, 1992).

11. *Maritime Earwig* (Cocopet)

Maritime Earwig memiliki ukuran tubuh 1,20 cm, berwarna hitam mengkilat, pada bagian caput terdapat sepasang mata, memiliki antenna yang panjang, terdapat 3 pasang kaki dan terdapat cerci seperti capit. Fauna ini berperan sebagai predator.

Ditemukannya *Maritime Earwig* di perkebunan Desa Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa yang terjebak dalam *Pitfall Trap* dikarenakan serangga dari famili ini aktif berpindah tempat dan berjalan di permukaan tanah untuk mencari makan, terutama pada tempat yang kering.

Maritime Earwig merupakan predator yang bisa memangsa hama perusak tanaman. *Maritime Earwig* tergolong dalam ordo Dermaptera yang mudah dikenal dengan ciri cerci atau capit pada ujung abdomen. Capit digunakan untuk mengambil dan memegang mangsa serta sebagai alat pertahanan diri. Kebanyakan jenis *Maritime*

Earwig bersifat nokturnal yaitu aktif mencari mangsa pada malam hari dan bersembunyi dalam tanah atau pada bagian tanaman pada siang hari.

Maritime Earwig biasanya terdapat di lahan yang kering dan bersarang dalam tanah pada pangkal batang tanaman. Fauna ini kadang-kadang memanjat daun dalam upaya untuk mencari mangsa. Fauna ini aktif pada malam hari. Berperan sebagai predator, rata-rata dapat memangsa 20-30 ekor mangsa/hari. Peran dari *Maritime Earwig* ini dalam ekosistem yaitu sebagai agen pengendali alami.

Klasifikasi :

Kingdom : Animalia
 Filum : Arthropoda
 Kelas : Insecta
 Ordo : Dermaptera
 Famili : Anisolabididae
 Genus : Anisolabis
 Spesies : *Maritime Earwig* (Borror, 1992).

12. *Drosophila melanogaster* (Lalat buah)

Drosophila melanogaster mempunyai ukuran tubuh 1 cm, berwarna kuning kecoklatan dengan cincin berwarna hitam di tubuh bagian belakang. Bentuk tubuhnya bulat panjang, terdapat satu pasang mata majemuk, mempunyai sepasang sayap, pada ujung abdomen terdapat ovopositor, mulutnya agak-agak menonjol dari bagian kepala dan berbentuk kerucut.

Ditemukannya *Drosophila melanogaster* di perkebunan Desa Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa yang terjebak dalam *Pitfall Trap*

dikarenakan serangga ini aktif berpindah tempat dengan cara berterbang dari satu pohon, atau rerumputan dan daun-daunan untuk mencari makan.

Fauna ini berkembang biak di tanaman membusuk dan jamur yang paling umum. Fauna ini merupakan contoh serangga yang mengalami metamorphosis sempurna yang keberadaannya lebih kurang 4500 spesies. Hal ini disebabkan oleh ukuran tubuhnya yang kecil, cepat berkembang biak, siklus hidupnya yang singkat. Fauna ini merupakan hewan yang habitatnya kosmopolitan, artinya bisa hidup dimana saja sesuai dengan habitatnya. Fauna ini menyukai bunga, dan buah yang matang. Fauna *Drosophilidae melanogaster* dewasa umumnya ditemui hidup bergerombolan pada buah-buahan yang masak yang mengandung air, misalnya buah nanas (*Ananas comunis*), pepaya (*Carica papaya*), pisang (*Musa sp.*) dan buah lainnya. Sedangkan larvanya tumbuh dan berkembang pada buah yang membusuk.

Fauna ini pada umumnya mendatangi makanannya pada waktu pagi dan sore hari. *Drosophila melanogaster* ini berperan sebagai herbivora yang memangsa buah-buahan. Fauna ini berperan penting dalam ekosistem yaitu sebagai pengurai dan penyerbukan.

Klasifikasi :

Kingdom	: Animalia
Filum	: Arthropoda
Kelas	: Insecta
Ordo	: Diptera
Famili	: Drosophilidae
Sub Famili	: Drosophilinae
Genus	: Drosophila
Spesies	: <i>Drosophila melanogaster</i> (Borror, 1992).

13. *Charidotella sexpunctata* (Kumbang daun atau kumbang kepik)

Charidotella sexpunctata mempunyai ukuran tubuh 1 cm, berwarna merah, mempunyai sepasang antenna yang bersegmen di depan kepalanya, tipe mulut pengunyah, Memiliki sepasang sayap lembut yang terlipat dan dilindungi oleh penutup luar (cangkang) yang keras. Fauna ini berperan sebagai herbivore (pemakan daun-daunan).

Ditemukannya *Charidotella sexpunctata* di perkebunan Desa Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa yang terjebak dalam *Pitfall Trap* dikarenakan serangga ini berpindah tempat untuk mencari makan, serangga ini juga sering berpindah tempat terutama pada daun-daun.

Charidotella sexpunctata merupakan kumbang daun yang bersifat pemangsa tumbuh-tumbuhan, beberapa larva adalah pemakan tumbuhan, beberapa lain sebagai penggerek-penggerek daun dan beberapa makan akar. Banyak dari famii sebagai

hama-hama dari tanaman budidaya atau perkebunan. Fauna ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses dekomposisi terutama di tanah.

Klasifikasi :

Kingdom	: Animalia
Filum	: Arthropoda
Kelas	: Insecta
Ordo	: Coleoptera
Famili	: Chrysomelidae
Sub Famili	: Cassidinae
Genus	: Charidotella
Spesies	: <i>Charidotella sexpunctata</i> (Borrer, 1992).

14. *Oiceoptoma rugulosum* (Kumbang bangkai)

Oiceoptoma rugulosum mempunyai ukuran tubuh 0,34 cm berwarna coklat, tubuh tersusun atas segmen, memiliki 6 kaki, dan ekor pegas, kepala berbentuk oval kecil dan terdapat sepasang antenna. Abdomen lebih kecil dari chepalothorak, ujung abdomen seperti sumpit yang tajam. Fauna ini berperan sebagai predator yang memakan bangkai.

Ditemukannya *Oiceoptoma rugulosum* di perkebunan Desa Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa yang terjebak dalam *Pitfall Trap* dikarenakan serangga ini sering berpindah tempat terutama atua aktif berjalan dipermukaan tanah.

Oiceoptoma rugulosum adalah keluarga kumbang yang umumnya dikenal sebagai kumbang bangkai besar. Fauna ini suka memakan hewan mati yang sudah

membusuk. Jumlah spesies relatif kecil dan sekitar dua ratus. Mereka lebih beragam di wilayah beriklim meskipun beberapa endemi tropis.

Oiceoptoma rugulosum sangat penting perannya dalam ekosistem karena fauna dari famili ini dapat melakukan deskompser (dengan cara mengurai atau memakan fauna vertebrata yang sudah mati menjad ibahan organik). Fauna ini berperan sebagai predator yang memakan hewan vertebrata yang telah membunuh seperti tikus, kelelawar dan belatung.

Klasifikasi :

Kingdom : Animalia
Filum : Arthropoda
Kelas : Insecta
Ordo : Coleoptera
Famili : Silphidae
Genus : *Oiceoptoma*
Spesies : *Oiceoptoma rugulosum* (Borrer, 1992).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan di perkebunan Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa diperoleh 14 spesies yang tercakup kedalam 13 famili. Spesies- spesies yang di temukan yaitu: *Dolichoderus thoracicus*, *Formica pallidefulva*, *Rainieria antennaepes*, *Dichromorpha viridis*, *Xysticus fervidus*, *Gryllus vernalis*, *Muscina pascuorum*, *Megasoma vogti*, *Cercyon praetextatus*, *Trachelas volutus*, *Maritime Earwig*, *Drosophila melanogaster*, *Charidotella sexpunctata*, dan *Oiceoptoma rugulosum*. Umumnya spesies yang ditemukan adalah spesies Gryllidae.

B. Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang keanekaragaman serangga permukaan tanah dengan menggunakan metode yang lain. Pengamatan di lokasi yang lain perlu diamati untuk membandingkan populasi keanekaragaman serangga tanah. Proses perulangan pengambilan serangga tanah juga harus lebih banyak serta bervariasi metode penelitian jangan cuma menggunakan metode *Pitfall Trap* tapi harus juga dengan menggunakan metode lain seperti metode *Corong Barlese Tullgren*.

KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an al-Karim

Adianto. 1980. *Fauna Tanah dan Peranannya Di Dalam Ekosistem*. Jakarta Depdikbud. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pendidikan Umum.

Arief, A. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Jakarta: Kanisius.

Barnes, B. V., Donald R. Z, Shiley R. D and Stephen H. S. 1997. *Forest Ecology*. New York. John Wiley and Sons Inc.

Booth, R.G, Cox, M. L, and Madge, R. B. 1996. *Iie Guides to Insects of Importance to Man*. The Natural History Museum

Borrer, D. J., C. A. Triplehorn dan N. F. Johnson. 1997. *Pengenalan Pelajaran Serangga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Campbell, N. A., Jane . B. R., and Lawrence. G. M. 1999. *Biologi*. Edisi Kelima Jilid dua. Jakarta: Erlangga.

Daly, U. Howell. 1981. *Introduction to Insect Biology and Diversity*. Kagasuka: Mc Graw Hill International Book Company.

Dindal, D.L. 1991. *Soil Biologi Guide*. New York: The Mac Millan Company.

Denassa, D. 2016. The Gowa Center. <http://www.thegowacenter.org>. (1 September 2016).

Echo. 2017. Morfologi Serangga. <http://www.imageinsecta>. (10 Maret 2017).

Firman, A. 2017. Morfologi Serangga. <http://www.gambar-insecta>. (10 Maret 2017).

Hanafiah, K.A., A. Napoleon dan N. Ghoffar. 2007. *Biologi Tanah: Ekologi dan Makrobiologi Tanah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Herlinda, S. Waluyo, S.P. Estuningsih, dan C. Irsan. 2008. Perbandingan Keanekaragaman Spesies dan Kelimpahan Arthropoda Predator Penghuni di Sawah Lebak yang Diaplikasi dan Tanpa Aplikasi Insektisida. *J. Entomologi Indonesia*. 2:96-107.

Katsir, I. 2008. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Penerbit Pustaka Imam-Syafi'i.

- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2012. *Al-Qur'an Terjemahan*. PT. syamil Cipta Media. Jakarta.
- Kimball, J. W. 1999. *Biologi*. Jilid Tiga. Jakarta: Erlangga.
- Kramadibrata, I. 1995. *Ekologi Hewan*. Bandung: ITB.
- Lilies, S. C. 1992. *Kunci Determinasi Serangga*. Jakarta: Kanisius.
- Maraghi, A. M. 1994. *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi 9 dan 23 Semarang*. Toha Putra
- Notohadiprawiro, T. 1999. *Tanah dan Lingkungan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nuriyanti, F. 2017. Morfologi Serangga Tanah. <http://www.gambarinsecta> (10 Maret 2017).
- Odum, E. P. 1998. *Dasar-Dasar Ekologi Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. *Jurnal Pendidikan Biologi*. Volume 2 Nomor (1 April 2013).
- Pasya, AF. 2004. *Dimensi Sains Al-Qur'an*. Solo. Tiga serangkai.
- Pelawi. 2009. *Indeks Keanekaragaman Jenis Serangga Pada Beberapa Ekosistem di Areal Perkebunan PT. Umbul Mas Wisesa Kabupaten Labuhanbatu*. Skripsi S1. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara.
- Purwowidodo. 2003. *Panduan Praktikum Ilmu Tanah Hutan: Mengenal Tanah*. Fakultas Kehutanan IPB, Bogor.
- Rahmawaty. 2000. *Keanekaragaman Serangga Tanah dan Perannya pada Komunitas Rhizophora spp. Dan Komunitas Ceriops tagal di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, Sulawesi Tenggara*. Tesis Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor. 73 hal.
- Rao, N. N. S. 1994. *Mikroorganisme Tanah dan Pertumbuhan Tanaman*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Ross. H. H 1965. *A Teks Book Of Entomologi*. Singapura.
- Rudy, M. 2017. *Macrotermes gilvus*. <http://www.insecta>. (11 Maret 2017).
- Ruslan, H. 2009. *Komposisi Dan Keanekaragaman Serangga Permukaan Tanah pada Habitat Hutan Homogen Dan Heterogen di Pusat Pendidikan*

konservasi Alam (PPKA) Bodogol, Sukabumi, Jawa Barat. Fakultas Biologi Universitas Nasional, Jakarta.

Sebastian, C. 2017. Serangga tanah. <http://gambar-morfologi-serangga>. (10 Maret 2017).

Setiadi, Y. 1989. *Pemanfaatan Mikroorganisme dalam Kehutanan*. Bogor: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Pusat Antara Universitas Bioteknologi IPB.

Shihab, M. Quraish. 2003. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*. Volume. 11 Jakarta: Lentera Hati.

Suin, N. M., 1991. *Perbandingan Komunitas Hewan Tanah Antara Ladang dan Hutan di Bukit Pinang-Pinang Sumatera Barat*. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dirjen Dikti. Jakarta.


Suin, N. M. 1997. *Ekologi Fauna Tanah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Suhardjono, Y. R. 1997. Perbedaan Lima Macam Larutan yang Digunakan dalam Perangkap Sumuran pada Pengumpulan Serangga Permukaan Tanah. *Prosiding Seminar Biologi XV*. Perhimpunan Biologi Indonesia. Universitas Lampung: Lampung.


Soegianto, A. 1994. *Ekologi Kuantitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.

Wallwork, J. A. 1970. *Ecology of Soil Animals*. London: Mc Graw Hill.

Yasin, M. 1984. *Sistematika Hewan Invertebrata dan Vertebrata*. Surabaya: Sinar Jaya.



6.1 Hasil Identifikasi

No	Spesies	Gambar
1.	<i>Dolichoderus thoracicus</i> (Semut hitam)	
2.	<i>Rainieria antennaepes</i> (Lalat rimpang)	
3.	<i>Dichromorpha viridis</i> (Belalang kayu)	
4.	<i>Xysticus fervidus</i> (Laba-laba kebun)	

5.	<i>Gryllus vernalis</i> (Jangkrik)	
6.	<i>Formica pallidefulva</i> (Semut api)	
7.	<i>Muscina pascuorum</i> (Lalat rumah)	
8.	<i>Megasoma vogti</i> (Kumbang tanduk)	
9.	<i>Cercyon praetextatus</i> (Kumbang air)	

10.	<i>Trachelas volutus</i> (Laba-laba pertapa)	
11.	<i>Maritime Earwig</i> (Cocopet)	
12.	<i>Drosophila melanogaster</i> (Lalat buah)	
13.	<i>Charidotella sexpunctata</i> (Kumbang daun)	
14.	<i>Oiceoptoma rugulosum</i> (Kumbang bangkai)	

6.2 Alat dan Bahan Penelitian



Gambar Botol sampel



Gambar Gabus



Gambar Gunting



Gambar Pisau



Gambar Alkohol 70%



Gambar Detergen

Gambar 6.3 Proses Penelitian



Gamabar Penggalian tanah



Gambar Pemasangan *Pitfall Trap*



Gambar Pengambilan sampel

ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



Penulis di lahirkan pada tanggal 17 Mei 1993 di Flores, kelurahan Koliropa, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo. Anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan ayahanda Muthalib Usman dan ibu Nurhayati Palancoi.

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ameaba pada tahun 2006, Madrasah Tsanawiya Negeri (MTsN) Mbay pada tahun

2009, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Mbay pada Tahun 2012. Ditahun yang sama penulis diterima sebagai Mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) melalui Jalur UMM.

Penulis aktif di dunia organisasi saat Mahasiswa yaitu pada tahun 2013, yaitu di UKM Sepak Bola Uin Alauddin Makassar. Dengan keyakinan dan usaha alhamdulillah penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir (Skripsi) dengan Judul: “Identifikasi Serangga Tanah di Perkebunan Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R