

**PENGARUH KONSENTRASI POLIVINIL ALKOHOL (PVA)
TERHADAP KADAR KETOPROFEN YANG TERDISOLUSI
DALAM SISTEM DISPERSI PADAT**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi
Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
Oleh
M A K A S S A R

ASRIANA SULTAN
NIM 70100106003

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, Juli 2010

Penulis,

Asriana Sultan
NIM 70100106003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Konsentrasi Polivinil Alkohol (PVA) terhadap Kadar Ketoprofen yang Terdisolusi dalam Sistem Dispersi Padat”, yang disusun oleh Asriana Sultan, NIM : 70100106003, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2010 M, bertepatan dengan 16 Sya’ban 1431 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 28 Juli 2010 M.
16 Sya’ban 1431 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Nur Ida, S.Si., M.Si., Apt. (.....)

Sekretaris : Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt. (.....)

Penguji I : Nursalam Hamzah, S.Si., Apt. (.....)

Penguji II : Drs. Lomba Sultan, M.Ag. (.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

dr.H.M. Furqaan Naiem, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19580404 198903 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah swt. karena atas rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang memberikan bantuan, arahan, dan dukungan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta, Drs. H. Sultan Bani, M.Si. dan Ratnawati P. (Alm.) yang telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan materi, nasehat, dan doa yang tulus sehingga memperlancar penyelesaian skripsi ini, juga kepada kakak dan adikku tercinta yang menjadi inspirasi penulis dan seluruh keluarga yang terus memberikan dukungannya.
2. Nur Ida, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing pertama dan Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing kedua yang penuh kasih sayang, sabar, dan pengertian dalam memberikan bimbingan dan arahan serta berbagai bantuan baik secara fisik maupun mental selama penelitian hingga penyusunan akhir skripsi ini.

3. Nursalam Hamzah, S.Si., Apt. selaku penguji utama dan Drs. Lomba Sultan, M.Ag. selaku penguji agama.
4. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si, Apt. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan sekaligus penasehat akademik yang telah memberikan kemudahan dalam penelitian ini.
5. Abdul Rahim, S.Si., M.Si., Apt. atas segala dukungan dan masukannya yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini dan Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, Apt. selaku koordinator seminar.
6. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pembantu Dekan I bidang kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Alauddin.
7. Kepala Laboratorium Kimia Farmasi Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin atas fasilitas peralatannya dan Fibiyanthy selaku laboran atas bantuannya dalam penelitian ini.
8. Ketua Jurusan Farmasi Politeknik Kementerian Kesehatan RI atas fasilitas peralatannya dan Hendra selaku laboran atas bantuannya dalam penyelesaian penelitian ini.
9. Ririn di Laboratorium Farmasetika Fakultas Farmasi Universitas Muslim Indonesia atas fasilitas bahan yang telah diberikan.
10. A. Armisman Edy Patturusi, S.Farm. dan Muhammad Rusdy, S.Farm. selaku laboran di laboratorium Universitas Islam Negeri Alauddin yang telah sabar dalam mendukung penelitian ini.

11. Zul Rahmat, S.Farm. atas berbagai informasi yang telah diberikan dan Rizky Afdaliah, S.Farm. sebagai senior sekaligus saudaraku tersayang atas segala dukungannya.
12. Rekan-rekan mahasiswa farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin pada umumnya dan teman-teman seperjuangan angkatan 2006 khususnya, Rani sahabat suka dan duka, Jayadi, Arie, Uni, Wahid, Hermin, Jume, Auliyaa, Dian, Nisa, Budhy, Arul, Munifah, dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah dan akan terus memberikan semangat serta bantuan baik berupa dukungan mental maupun materi selama penyelesaian skripsi ini.

Dalam skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi selanjutnya. Akhir kata, semoga skripsi yang telah dibuat dapat menjadi inspirasi dan memberikan manfaat untuk masa depan, baik bagi penulis sendiri maupun orang lain.

Makassar, Juli 2010

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Dispersi Padat	6
B. Disolusi	22
C. Uraian Umum Ketoprofen	26
D. Uraian Bahan	28

E.	Tinjauan Pengobatan dalam Islam	30
BAB III	METODE PENELITIAN	38
A.	Alat dan Bahan yang Digunakan	38
B.	Metode Kerja	38
C.	Evaluasi Dispersi Padat	40
D.	Uji Disolusi	40
E.	Penetapan Kadar Hasil Uji Disolusi	41
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A.	Hasil	42
B.	Pembahasan	43
BAB V	PENUTUP	47
A.	Kesimpulan	47
B.	Implikasi Penelitian	47
DAFTAR PUSTAKA	48
RIWAYAT HIDUP	64



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Tipe-tipe dispersi padat	6
Tabel 2	Rancangan Formula Dispersi Padat dan Campuran Fisik Ketoprofen – PVA	38
Tabel 3	Persen Ketoprofen Rata-rata yang Terdisolusi dalam Media Cairan Lambung Buatan Tanpa Pepsin dari Dispersi Padat dan Campuran Fisik Ketoprofen – PVA ..	43
Tabel 4	Hasil Uji Intervensi Pembawa PVA terhadap Panjang Gelombang Maksimum Ketoprofen dalam Cairan Lambung Buatan Tanpa Pepsin	51
Tabel 5	Hasil Pengukuran Serapan Ketoprofen dalam Larutan Dapar Fosfat pH 7,4 pada Panjang Gelombang 260 nm untuk Pembuatan Kurva Baku	52
Tabel 6	Hasil Pengukuran Serapan Ketoprofen dalam Media Disolusi Cairan Lambung Buatan Tanpa Pepsin yang Dilepaskan Tiap Satuan Waktu dari Campuran Fisik dan Dispersi Padat Ketoprofen – PVA	53
Tabel 7	Kadar Ketoprofen yang Terdisolusi (mg) dari Campuran Fisik dan Dispersi Padat Ketoprofen – PVA dalam Media Disolusi Cairan Lambung Buatan Tanpa Pepsin yang Dilepaskan Tiap Satuan Waktu	54
Tabel 8	Perhitungan kadar (mg) dan persen terdisolusi ketoprofen dari dispersi padat dan campuran fisik ketoprofen – PVA dalam cairan lambung buatan	59
Tabel 9	Analisis Statistika Formula Dispersi Padat dan Campuran Fisik menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial	60
Tabel 10	Tabel Anava	62

Tabel 11	Nilai rata-rata yang diurutkan mulai dari yang terbesar ke terkecil	62
Tabel 12	Selisih rata-rata formula	63
Tabel 13	Kesimpulan hasil notasi	63



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Diagram fase campuran eutektikum sederhana dengan kelarutan padat yang diabaikan 9
Gambar 2	Pembentukan larutan padat substitusi 11
Gambar 3	Pembentukan larutan padat sisipan 12
Gambar 4	Larutan padat amorf 13
Gambar 5	Disolusi dan absorpsi obat kedalam tubuh dari senyawa atau kompleks, K_1 dan $K_2 =$ tetapan laju disolusi, n dan $m =$ koefisien reaksi 14
Gambar 6	Penyajian skematis tiga bentuk penggabungan partikel obat dalam dispersi padat 19
Gambar 7	Kurva Baku Ketoprofen 55
Gambar 8	Hubungan kadar ketoprofen terdisolusi (%) dengan waktu (menit) 56

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Skema Kerja Penentuan Pengaruh Konsentrasi Polivinil Alkohol (PVA) terhadap Kadar Ketoprofen yang Terdisolusi dalam Sistem Dispersi Padat	56
Lampiran 2 Hasil Contoh Perhitungan Kadar (mg) dan Jumlah (%) Ketoprofen yang Terdisolusi	57
Lampiran 3 Analisis Statistika Formula Dispersi Padat dan Campuran Fisik menggunakan Rancangan Faktorial	59



ABSTRAK

Nama Penulis : Asriana Sultan
NIM : 70100106003
Judul Skripsi : Pengaruh Konsentrasi Polivinil Alkohol (PVA) terhadap
Kadar Ketoprofen yang Terdisolusi dalam Sistem
Dispersi Padat

Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh PVA dalam berbagai perbandingan konsentrasi terhadap kadar ketoprofen yang terdisolusi dalam bentuk dispersi padat dan campuran fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kadar ketoprofen yang terdisolusi dari dispersi padat dan campuran fisik serta menentukan perbandingan yang memberikan kadar terdisolusi terbesar tiap satuan waktu. Dispersi padat dan campuran fisik dari ketoprofen – PVA dibuat dengan perbandingan 1:1, 1:2 dan 1:4, dengan pembanding ketoprofen baku. Evaluasi dispersi padat meliputi uji intervensi matriks PVA terhadap panjang gelombang maksimum ketoprofen baku dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis dan uji disolusi dalam media cairan lambung buatan tanpa pepsin pH \pm 1,2 pada suhu $37 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ menggunakan pengaduk keranjang kecepatan 50 rpm. Pengambilan larutan contoh dilakukan pada menit ke- 10, 20, 30, 45, dan 60. Jumlah ketoprofen yang terdisolusi ditetapkan dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 260 nm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terjadi pergeseran panjang gelombang maksimum pada dispersi padat maupun campuran fisiknya. Dispersi padat yang dibuat menunjukkan kadar ketoprofen yang terdisolusi lebih besar dibanding campuran fisik dan ketoprofen baku. Kadar ketoprofen terdisolusi terbesar diperlihatkan oleh dispersi padat pada perbandingan 1:1.

Kata kunci : dispersi padat, campuran fisik, disolusi, ketoprofen, PVA

ABSTRACT

Name of author : Asriana Sultan
NIM : 70100106003
Title of thesis : The Influence Concentration of Polivinil Alcohol (PVA)
to Amount Dissolution of Ketoprofen in Solid Dispersion
System

The influence PVA in various concentration ratio to amount dissolution of ketoprofen in the form of solid dispersion and physical mixture have been conducted by research. This research aim to know a biggest amount dissolution of ketoprofen from solid dispersion and physical mixture and also determine the comparison giving biggest amount dissolution of ketoprofen every set of time. Solid dispersion and physical mixture from ketoprofen – PVA made with the composition comparison 1:1, 1:2 and 1:4, with the pure comparator ketoprofen. Evaluate the solid dispersion cover the test of intervence of matrix PVA to maximum wavelenght of ketoprofen by using spectrophotometer UV-Vis and test the solution in simulated gastric fluid without pepsin pH \pm 1,2 at temperature $37 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ using basket stirrer of speed crate 50 rpm. Condensation intake follow the example conducted at 10, 20, 30, 45, and 60 minutes. Amount ketoprofen which release measured by spectrophotometer UV-Vis at wavelength 260 nm. Result of research indicate that is not happened the maximum wavelength friction in solid dispersion and also its physical mixture. Solid dispersion which made show the biggest amount dissolution of ketoprofen than the physical mixture and pure ketoprofen. The biggest amount dissolution of ketoprofen showed by solid dispersion at comparison 1:1.

Key words : solid dispersion, physical mixture, dissolution, ketoprofen, PVA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Efek terapeutik suatu obat ditentukan oleh proses melepasnya bahan obat dalam cairan tubuh dan terabsorpsi ke dalam aliran darah. Suatu obat yang dapat diabsorpsi, pertama kali harus dapat terlarut (terdispersi molekular) dalam cairan dimana obat tersebut akan diabsorpsi (Saifullah, 2008). Laju pelarutan obat-obat dalam saluran cerna akan mengendalikan laju absorpsi sistemik obat dan menjadi penentu bioavailabilitas obat. Jika suatu obat diabsorpsi secara sempurna setelah pelarutan, maka akan menghasilkan konsentrasi obat dalam plasma yang lebih tinggi (Shargel, 2005).

Pada tahun 1897, Noyes dan Whitney menunjukkan bahwa kelarutan obat dalam air merupakan faktor utama yang menentukan laju disolusi. Sebenarnya, beberapa studi telah menunjukkan bahwa data kelarutan bahan obat dapat digunakan sebagai prediksi kasar kemungkinan masalah kedepan mengenai bioavailabilitas, yang merupakan suatu faktor pertimbangan dalam desain formulasi sediaan (Gennaro, 1990).

Obat-obat yang kelarutannya sangat kecil dalam air sering banyak menimbulkan masalah pada proses absorpsinya setelah obat diberikan, karena obat dapat diabsorpsi oleh tubuh bila sudah dalam bentuk terdistribusi secara molekular di tempat proses absorpsi berlangsung. Upaya mengatasinya antara lain dapat dilakukan melalui peningkatan kecepatan disolusinya.

Teknik alternatif yang digunakan seperti dispersi padat dapat digunakan untuk meningkatkan laju disolusi bahan obat dengan kelarutan yang buruk dan telah dibuktikan dapat meningkatkan jumlah obat terlarut pada daerah absorpsi yang secara konsekuen meningkatkan bioavailabilitas (Drooge, 2006). Sekiguchi dan Obi pada tahun 1961 memperkenalkan teknik ini dengan tujuan untuk memperkecil ukuran partikel, meningkatkan laju disolusi dan absorpsi obat yang tidak larut dalam air. Pada tahun 1965, konsep tersebut dikembangkan Tachibana dan Nakamura dengan menggunakan polivinilpirolidon (PVP) sebagai pembawa dan dispersi dibuat melalui metode pelarutan (Leuner, 2000, Serajuddin, 1999). Sekiguchi dan Obi menyatakan bahwa obat berada dalam bentuk campuran eutektik dalam bentuk mikrokristal, tetapi setelah beberapa tahun Goldberg melaporkan bahwa semua obat dalam dispersi padat tidak hanya dalam bentuk mikrokristal, tetapi sebagian fraksi obat terdispersi molekular dalam matriks dalam suatu bentuk larutan padat (Chaudhari, 2006).

Perkembangan beberapa tahun terakhir memperkenalkan beberapa jenis polimer yang dapat mengontrol drug delivery. Polimer sintetik menjadi pilihan matriks untuk sistem dispersi padat karena sifatnya yang inert, peka, mengontrol pelepasan obat dengan efektif, dan mudah terbiodegradasi. Berbagai polimer seperti, polietilenglikol (PEG), polivinilpirolidon (PVP), polivinilalkohol (PVA), dan beberapa poliaminoacid yang lain.

Ketoprofen atau asam 2-(3-benzoilfenil) propionat merupakan suatu obat anti inflamasi nonsteroid yang digunakan secara luas untuk mengurangi nyeri, dan inflamasi yang disebabkan oleh beberapa kondisi seperti, osteoarthritis dan

rheumatoid arthritis dengan dosis 25-50 mg dan mempunyai bioavailabilitas 90% (Tan, 2003). Namun, ketoprofen praktis tidak larut dalam air, sehingga kecepatan disolusi dan ketersediaan hayatinya rendah (Parfitt, 1999). Oleh karenanya, ketoprofen menjadi salah satu objek yang penting untuk ditingkatkan bioavailabilitasnya pada pemberian oral melalui pembuatan obat dalam sistem dispersi padat.

Obat sintetik dianggap racun dalam tubuh manusia karena efek sampingnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan laju disolusi obat agar cepat memberikan efek dan tereliminasi, sehingga obat tidak lama tinggal dalam tubuh yang mungkin dapat memberikan efek yang lebih buruk. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah saw., “Barangsiapa meminum racun, maka kelak racun itu ada di tangannya dan diminumnya terus menerus di neraka Jahannam, kekal abadi di dalamnya” (Muttafaq ‘Alayh). Juga sebuah riwayat dari Abu Hurayrah, ia berkata, “Rasulullah saw. melarang khabits” (HR. Abu Dawud, Turmudzi, dan Ibn Majah). Para ‘ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan khabits adalah racun.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
 وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q.S. Yunus (10) : 57)

Fikri Alatas, Sundani Nurono S., dan Sukmadjaja Asyarie (2006) telah melakukan penelitian untuk meningkatkan laju disolusi ketoprofen dengan menggunakan PEG 4000 sebagai pembawa dalam bentuk dispersi padat. Penelitian sebelumnya juga telah banyak dilakukan, seperti dispersi padat ketoprofen-PEG 6000 (Arias, 1995) dan Kollicoat IR dengan matriks PVA – PEG graft copolymer (Sandrien Janssens, 2006). Dispersi padat ketoprofen dengan matriks polimer PEG telah terbukti dapat meningkatkan laju disolusi ketoprofen. Berdasarkan hal tersebut, untuk menambah data valid dari dispersi padat ketoprofen, maka dalam penelitian ini akan dikembangkan pola dispersi padat dengan polimer lain yaitu PVA.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan bahwa :

1. Apakah PVA dapat meningkatkan kadar ketoprofen terdisolusi dalam sistem dispersi padat?
2. Pada perbandingan berapa ketoprofen – PVA mampu meningkatkan kadar ketoprofen terdisolusi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah PVA dapat meningkatkan kadar ketoprofen terdisolusi dalam sistem dispersi padat.

2. Untuk mengetahui pada perbandingan berapa ketoprofen – PVA mampu meningkatkan kadar ketoprofen terdisolusi.

D. Manfaat Penelitian

1. Mengembangkan proses perbaikan masalah disolusi beberapa obat-obat yang memiliki kelarutan yang buruk dalam air yang mempengaruhi bioavailabilitas dan mengurangi efek teraupetiknya, sehingga dapat diformulasi kembali dalam bentuk sediaan yang lebih baik.
2. Mengatasi masalah disolusi ketoprofen, sehingga dapat dirancang suatu formulasi baru dari ketoprofen yang memiliki efek yang lebih cepat dan penggunaannya lebih luas.
3. Memperkaya bentuk formulasi sediaan farmasi modern.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Dispersi Padat

1. Definisi dispersi padat

Istilah dispersi padat diartikan ke dalam kelompok produk padat yang mengandung paling sedikit dua komponen, umumnya suatu matriks hidrofilik dan bahan obat hidrofobik. Matriks dapat berupa kristal atau amorf. Bahan obat dapat terdispersi secara molekular, dalam bentuk partikel amorf atau partikel kristal (Drooge, 2006).

2. Tipe-tipe dispersi padat

Tabel 1. Tipe-tipe dispersi padat

No. Tipe	Tipe Dispersi Padat	Matriks *	Obat **	Penjelasan	No. Fase
I	Eutektik	C	C	tipe pertama solid dispersi yang dibuat	2
II	Presipitasi amorf dalam matriks Kristal	C	A	jarang ditemui	2
III	Larutan padat				
	Larutan padat kontinyu	C	M	semua komposisi tidak bercampur, tidak pernah dibuat	1
	Larutan padat diskontinyu	C	M	sebagian tidak bercampur, sekalipun 2 fase obat terdispersi molekular	2
	Larutan padat substitusional	C	M	diameter molekular obat (solut) berbeda	1 atau

No. Tipe	Tipe Dispersi Padat	Matriks *	Obat **	Penjelasan	No. Fase
				kurang dari 15% dari diameter matriks (solvent). Dalam kasus ini, obat dan matriks substitusional. Dapat kontinyu atau diskontinyu. Ketika diskontinyu : sekalipun 2 fase obat terdispersi molekular	2
	Larutan padat interstisial	C	M	diameter obat (solut) molekular kurang dari 59% diameter matriks (solvent). Biasanya ketercampuran dikurangi, diskontinyu. Contoh : obat dalam daerah interstisial helix PEG	2
IV	Suspensi gelas	A	C	ukuran partikel fase terdispersi bergantung pada tingkat pendinginan atau evaporasi. Dihasilkan setelah kristalisasi obat dalam matriks amorf	2
V	Suspensi gelas	A	A	ukuran partikel fase terdispersi bergantung pada tingkat pendinginan atau evaporasi berbagai dispersi padat tipe ini	2
VI	Larutan gelas	A	M	memerlukan ketidakcampuran/ketid aklarutan padatan, formasi kompleks atau pada	1

No. Tipe	Tipe Dispersi Padat	Matriks *	Obat **	Penjelasan	No. Fase
				pendinginan/evaporasi cepat selama pembuatan, banyak contoh terutama dengan PVP	
	Formasi kompleks	C/A	M	obat dan matriks berinteraksi kuat dan membentuk kompleks dalam lingkungan berair, seperti siklodextrin atau surfaktan padat	1
	Monotektik	C	C	sama dengan eutektik tapi peleburan eutektik berkumpul dengan bahan murni, untuk melengkapi sistem non-interaksi	2
	Co-presipitat	?	?	dibuat melalui penambahan non-solvent ke larutan obat dan matriks	?
	Co-presipitat	?	?	dibuat melalui vacuum drying, spray drying, freeze drying, dan spray-freeze drying, dan lain-lain	?

Keterangan :

* : A: matriks dalam bentuk amorf

C: matriks dalam bentuk kristal


** : A: obat terdispersi sebagai kluster amorf dalam matriks

C: obat terdispersi sebagai kristal dalam matriks

M: obat terdispersi molekular seluruhnya dalam matriks

a. Campuran Eutektikum Sederhana

Campuran eutektikum sederhana biasanya dibentuk dari pemadatan yang cepat leburan dua komponen yang tercampur sempurna pada keadaan cair dan dengan kelarutan padat yang dapat diabaikan. Sifat-sifatnya dapat digambarkan dalam diagram fase dibawah ini



Gambar 1. Diagram fase campuran eutektikum sederhana dengan kelarutan padat yang diabaikan (Chiou, 1971)

Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kecepatan disolusi bahan obat yang terdispersi dalam campuran eutektikum sederhana adalah:

- (1) Kristal padat berada dalam ukuran yang sangat kecil.
- (2) Pengaruh pelarutan oleh pembawa dalam lapisan difusi.
- (3) Tidak adanya agregasi dan aglomerasi antara kristal halus zat aktif yang hidrofob.
- (4) Terdispersi dan terbasahnya zat aktif karena kristal tunggal zat aktif dikelilingi oleh pembawa yang larut.

- (5) Zat aktif terdapat dalam bentuk kristal yang metastabil setelah proses pemadatan leburan (Chiou, 1971).

b. Larutan Padat

Larutan padat sering disebut campuran kristal, sebab dua komponen mengkristal bersama-sama dalam sistem satu fase yang homogen. Menurut Goldberg dan kawan-kawan, larutan padat menghasilkan kecepatan disolusi yang lebih cepat daripada campuran eutektik, sebab ukuran partikel obat dalam larutan padat dikurangi sampai tingkat yang minimum dari ukuran molekulernya.

Berdasarkan ketercampuran antara dua komponen, larutan padat dikelompokkan menjadi dua, yaitu larutan padat kontinyu dan larutan padat tidak kontinyu, sedangkan berdasarkan struktur kristalnya, larutan padat dikelompokkan menjadi larutan padat substitusi dan larutan padat sisipan (Chiou, 1971).

(1) Larutan Padat Kontinyu


Dalam sistem ini dua komponen bercampur atau larutan padat dalam semua perbandingan. Kecepatan disolusi yang lebih besar diperoleh jika obat berada sebagai komponen yang kecil. Adanya sejumlah kecil pembawa yang larut pada kisi-kisi kristal zat aktif yang sukar larut dapat menghasilkan kecepatan disolusi yang lebih cepat daripada senyawa murni dengan ukuran partikel yang sama.

(2) Larutan Padat Tidak Kontinyu

Berbeda dengan larutan padat kontinyu, maka pada larutan padat tidak kontinyu zat terlarut mempunyai kelarutan yang terbatas dalam pelarut padat. Peningkatan kecepatan disolusi dan absorpsi dalam sistem ini mungkin disebabkan bahan obat berada dalam bentuk amorf (Chiou, 1971).

(3) Larutan Padat Subtitusi

Dalam sistem ini molekul zat terlarut menggantikan molekul dalam kisi-kisi kristal pelarut padat, seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini :




Gambar 2. Pembentukan larutan padat subtitusi (Chiou, 1971)

Sistem larutan padat subtitusi dapat membentuk larutan padat kontinyu atau tidak kontinyu. Faktor ruang dan ukuran molekul zat terlarut memegang peranan penting dalam pembentukan larutan padat. Ukuran molekul zat terlarut harus mendekati ukuran molekul pelarut (Chiou, 1971).

(4) Larutan Padat Sisipan

Dalam sistem ini molekul zat terlarut menempati ruang celah kisi-kisi pelarut, seperti yang terlihat dibawah ini :



Gambar 3. Pembentukan larutan padat sisipan (Chiou, 1971)

Biasanya sistem larutan padat sisipan hanya dapat membentuk larutan padat tidak kontinyu. Ukuran molekul zat terlarut harus menyesuaikan dengan ruang celah molekul pelarut oleh karena itu diameter atom zat terlarut harus kurang dari 0,59 kali molekul pelarut (Chiou, 1971).

c. Larutan Gelas

Larutan gelas adalah sistem serupa gelas yang homogen dimana zat terlarut melarut dalam pelarut seperti gelas. Konsep pembentukan larutan gelas pertama kali diperkenalkan oleh Chiou dan Riegelman. Keadaan seperti gelas atau kaca ini diperoleh dengan pendinginan yang tiba-tiba dari leburan senyawa murni atau campuran senyawa.

Pada pengamatan sinar X, gelas berada dalam bentuk amorf. Biasanya kecepatan disolusi bentuk amorf lebih besar daripada

bentuk kristal. Polivinilvirilidon dan beberapa polimer lain bila dilarutkan dalam pelarut organik dapat menjadi seperti gelas setelah pelarutan diuapkan (Chiou, 1971).

d. Pengendapan Amorf dalam Pembawa Kristal

Selain membentuk campuran eutektikum sederhana dimana obat pembawa kristal dibuat dengan metode peleburan dan pelarutan, obat dapat pula diendapkan sebagai bentuk amorf dimana didalam pembawa kristal. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini:




Gambar 4. Larutan padat amorf (Chiou, 1971)

Oleh karena bentuk amorf senyawa murni mempunyai energi yang tinggi, maka pada semua kondisi menghasilkan kecepatan disolusi dan absorpsi yang lebih cepat dibandingkan bentuk kristal, walaupun senyawa kristal tersebut didispersikan dalam pembawa.

e. Pembentuk Kompleks atau Senyawa

Modifikasi bentuk sediaan dan pembentukan senyawa atau kompleks (DnCm) antara obat (D) dan pembawa inert yang larut tidak dapat diklasifikasikan dalam sistem dispersi padat. Akan tetapi pembentukan senyawa atau kompleks sering terjadi selama

pembuatan dispersi padat. Disolusi dan absorpsi obat kedalam tubuh dari senyawa atau kompleks secara skematis digambarkan sebagai berikut :



Gambar 5. Disolusi dan absorpsi obat kedalam tubuh dari senyawa atau kompleks, K_1 dan K_2 = tetapan laju disolusi, n dan m = koefisien reaksi (Chiou, 1971)

3. Matriks-matriks yang biasa digunakan dalam sistem dispersi padat

Bahan-bahan fungsional yang semakin berkembang, seperti pembawa aktif permukaan yang semakin luas penggunaannya dalam sediaan farmasi. Ini meliputi, bergantung pada tipe produk, peningkatan kelarutan atau stabilitas obat dalam sediaan cairan, penstabil dan modifikasi tekstur sediaan semisolid, atau mengubah aliran bahan dari bentuk akhir sediaan tablet. Dalam penambahannya sebagai bahan tambahan untuk meningkatkan karakteristik fisik dan kimia dari formulasi, pembawa aktif permukaan dapat dikelompokkan untuk meningkatkan kemampuan atau penampilan biologik produk.

4. Metode-metode pembuatan dispersi padat

Ragam metode pembuatan dispersi padat telah dilaporkan dalam literatur. Metode ini menunjukkan cara pencampuran matriks dan bahan obat, pada level molekular, dimana matriks dan obat secara umum agak tercampur, dan formasi perbedaan fase terlihat. Pemisahan fase seperti kristalisasi atau bentuk kluster obat amorf sulit untuk dikontrol dan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini telah diakui oleh salah satu penelitian pertama pada dispersi padat bahwa pemisahan fase yang luas dapat disederhanakan melalui prosedur laju pendinginan. Umumnya, pemisahan fase dapat dicegah melalui pengawasan perpindahan molekular yang lambat dari matriks dan obat selama pemisahan. Pada penelitian lain, pemisahan fase dicegah melalui pengawasan pengendalian ikatan untuk pemisahan fase lambat, sebagai contoh melalui menjaga campuran pada temperatur yang dielevasi. Ternyata, konflik pernyataan-pernyataan akan dilihat pada tujuan proses pembuatan yang memadai (Drooge, 2006).

a. Metode Peleburan

Metode peleburan dimulai pada dispersi antara matriks dan bahan obat yang dilebur menggunakan campuran fisis pada komposisi eutektik, yang diikuti oleh tahap pendinginan. Komposisi eutektik dipilih untuk memperoleh kristalisasi yang seragam dari obat dan matriks selama pendinginan (Drooge, 2006).

Metode peleburan meliputi peleburan bahan-bahan dan komponen pembawa secara bersama dalam temperatur pada atau diatas titik lebur semua komponen. Dalam proses peleburan, peneliti mencampur bahan dan pembawa dalam alat pencampur yang cocok. Mereka memanaskan, meleburkan campuran dan kemudian mendinginkan campuran peleburan dengan cepat untuk membuat massa kental. Mereka menggiling massa ini untuk menghasilkan serbuk pada batas ukuran partikel yang diinginkan.

b. Metode Pelarutan

Langkah awal dalam metode pelarutan adalah menyiapkan larutan yang mengandung bahan obat dan matriks. Langkah kedua meliputi penhilangan pelarut dari formasi dispersi padat. Metode pelarutan dasar umumnya digunakan kosolven untuk membuat dispersi yang baik atau melarutkan obat dan pembawa secara bersama, dan kemudian menguapkan pelarut dengan evaporasi. Kemudian, peneliti mengumpulkan dispersi padat tersebut sebagai massa serbuk. Proses ini lama dan mahal (Drooge, 2006).

c. Metode Peleburan-pelarutan

Suatu senyawa cair dapat disatukan kedalam PEG 6000 tanpa kehilangan yang berarti sifat padatnya. Oleh sebab itu, dispersi padat dapat dibuat dengan cara ini, yaitu mula-mula melarutkan bahan obat dalam pelarut yang cocok, kemudian larutan tersebut disatukan secara langsung kedalam leburan polietilenglikol pada

suhu dibawah 70°C tanpa diikuti penguapan pelarut. Keuntungan metode ini merupakan gabungan keuntungan metode peleburan dan metode pelarutan, tetapi metode ini secara praktis hanya dapat digunakan untuk obat yang mempunyai dosis terapeutik yang rendah, misalnya dibawah 50 mg (Chiou, 1971).

5. Mekanisme peningkatan kelarutan dalam dispersi padat

Ada beberapa mekanisme dalam peningkatan kelarutan dalam sistem dispersi padat diantaranya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Reduksi ukuran partikel obat.
- b. Mengganti karakteristik permukaan dari partikel obat untuk meningkatkan kemampuan membasahi.
- c. Pembentukan padat energi tinggi, seperti amorf dari bulk material obat. Mekanisme spesifik yang terlibat tergantung terhadap bentuk padat dari obat dan tipe sistem pembawa obat.

Dispersi dari molekul atau partikel-partikel obat yang baik dalam sebuah pembawa provid fisik dari komposisi obat. Hal ini memungkinkan memfasilitasi pembasahan dan menjadikan agregasi partikel.


Mekanisme dari disolusi cepat meningkatkan pembasahan dengan cara mengurangi sudut kontak dari bahan yang didispersikan (tidak ada interaksi atau reduksi dari pengkristalan obat yang diobservasi), juga beberapa pembawa seperti PEG dan PVP dapat meningkatkan kelarutan dari obat.

Tipe dispersi padat melibatkan pembentukan dari bentuk energi tinggi dari bulk substansi obat, bentuk energi tinggi dari obat dapat berupa amorf atau bentuk kristal metastabil.

6. Analisis partikel dalam sistem dispersi padat

a. Deteksi kristal dalam dispersi padat

Beberapa struktur molekul obat yang berbeda dapat dipertemukan dalam dispersi padat (lihat gambar 1.). Berbagai percobaan dilakukan untuk menganalisis susunan molekul dalam dispersi padat. Banyak uji coba yang dilakukan untuk menghilangkan pembatas antara material amorf dan kristal. Pastinya, untuk tujuan itu banyak teknik yang cocok yang dapat mendeteksi jumlah material kristal dalam dispersi ini. Jumlah material amorf tidak dapat ditentukan secara langsung tapi kebanyakan diperoleh dari jumlah material kristal dalam sampel. Ini dapat dijadikan catatan bahwa penaksiran kristalinitas sebagai metode untuk penentuan jumlah material amorf tidak akan dinyatakan ketika bahan obat berada sebagai partikel amorf atau molekul-molekul yang terdispersi molekular seperti dispersi padat tipe II atau III dan V atau VI (Drooge, 2006).



Gambar 6. Penyajian skematis tiga bentuk penggabungan partikel obat dalam dispersi padat (Drooge, 2006)

Saat ini, berbagai teknik sesuai untuk mendeteksi material kristal ;

- (1) Difraksi serbuk sinar-X dapat digunakan untuk deteksi kualitatif material dengan tingkat range yang panjang. Difraksi puncak yang tajam mengindikasikan material kristal. Pengembangan terkini perlengkapan sinar-X semi-kuantitatif.
- (2) Spektrofotometer Infrared (IR) dapat digunakan untuk mendeteksi variasi dalam interaksi distribusi-energi antara bahan obat dan matriks. Ikatan vibrasi yang tajam mengindikasikan pengkristalan. Spektrofotometer FT-IR digunakan untuk deteksi secara akurat batasan kristal dari 1 sampai 99% dalam material murni. Bagaimanapun dalam dispersi padat hanya deteksi kualitatif yang memungkinkan.
- (3) Penyerapan uap air dapat digunakan untuk membedakan antara material amorf dan kristal ketika ke higroskopikannya berbeda. Metode ini menunjukkan data yang akurat pada

kehidroskopikan kristal secara lengkap dan sampel amorf secara lengkap.

- (4) Mikrokalorimeter Isotermal mengukur energi kristalisasi material amorf yang dipanaskan diatas suhu T , walaupun teknik ini kurang digunakan. Pertama, teknik ini hanya dapat diaplikasikan jika stabilitas fisik yang hanya selama pengukuran kristalisasi berubah. Kedua, ini dapat diasumsikan bahwa semua material amorf dapat mengkristal. Ketiga, dalam campuran biner dua bahan amorf perbedaan antara energi kristalisasi bahan obat dan matriks sangat sulit.
- (5) Kalorimeter Disolusi mengukur energi disolusi, yang mana bergantung pada kristalisasi sampel. Biasanya, disolusi material kristal adalah endotermik. Energi disolusi dari dua komponen dalam bentuk kristal dan amorf dapat ditetapkan dalam beberapa percobaan dalam tujuan penggunaan teknik ini secara kuantitatif. Sebagaimana juga interaksi obat-matriks akan memberikan energi disolusi dalam dispersi padat.
- (6) Teknik makroskopik mengukur properti mekanis yang berbeda dari material amorf dan kristal yang mengindikasikan untuk derajat kristalisasi (Drooge, 2006).

b. Deteksi struktur molekul dalam dispersi padat amorf

Bahan-bahan penyusun dispersi padat sangat dipengaruhi oleh keseragaman distribusi obat dalam matriks. Stabilitas dan cara disolusi akan berbeda untuk dispersi padat yang tidak mengandung partikel-partikel obat kristal, seperti dispersi padat tipe V dan VI atau untuk tipe II dan III. Bagaimanapun, tidak hanya pengetahuan tentang bentuk fisik (kristal atau amorf) yang penting, distribusi obat sebagai partikel amorf atau Kristal atau sebagai bagian molekul-molekul obat juga relevan untuk bahan-bahan dispersi padat. Namun, hanya sebagian kecil studi yang fokus pada perbedaan antara partikel gabungan amorf dengan distribusi molekular atau campuran homogen (Drooge, 2006).

- (1) Spektrofotometer Raman Konfokal digunakan untuk mengukur homogenitas campuran padat bahan obat dalam matriks, contohnya campuran padat ibuprofen dalam PVP. Ini menggambarkan bahwa standar deviasi dalam kandungan obat lebih kecil dari 10% mengindikasikan distribusi homogen. Karena ukuran pixel $2 \mu\text{m}^3$, menandakan ketidakpastian tentang adanya partikel obat amorf yang dinano-sizekan.
- (2) Penggunaan IR atau FTIR, interaksi yang lebih luas antara obat dan matriks dapat diukur. Interaksi ini mengindikasikan untuk bentuk penggabungan obat, karena pemisahan molekul

obat terdispersi akan membentuk interaksi obat-matriks kemudian pada saat obat berada dalam kluster amorf atau susunan multi-molekul yang lain.

- (3) Scan Kalorimetri Modulasi Perbedaan Temperatur atau Temperatur Modulated Differential Scanning Calorimetry (TMDSC) dapat digunakan untuk menaksir tingkat pencampuran penggabungan obat. Adanya modulasi, bentuk reversible dan irreversible dapat dipisahkan. Sebagai contoh, peralihan bentuk gelas (reversible) dipisahkan dari kristalisasi atau relaksasi (irreversible) dalam bahan amorf. Dalam hal matriks amorf, TMDSC dapat digunakan untuk membedakan antara dispersi padat tipe V dan VI (Drooge, 2006).

B. Disolusi

Aplikasi kombinasi bahan kimia dan hasil skrining selama penemuan obat, mayoritas kandidat obat baru memperlihatkan kelarutan yang buruk dalam air, hal ini sangat menambah tantangan bagi para formulator dalam pengembangan bioavailibilitas dosis obat (Chaudhari, 2006).

Bahan yang sukar larut air secara klasik didefinisikan sebagai suatu bahan yang larut dalam kurang dari 1 bagian dalam 10000 bagian air.

Suatu tablet atau sediaan obat lainnya bila dimasukkan ke dalam saluran cerna (saluran gastrointestinal), obat tersebut mulai masuk ke dalam larutan dari bentuk padatnya. Kalau tablet tersebut tidak dilapisi polimer,

matriks padat juga mengalami disintegrasi menjadi granul-granul, dan granul-granul ini mengalami pemecahan menjadi partikel-partikel yang halus. Disintegrasi, deagregasi dan disolusi bisa berlangsung secara serentak dengan melepasnya suatu obat dari bentuk di mana obat tersebut diberikan (Martin, 1993).

Efektivitas dari suatu tablet dalam melepas obatnya untuk absorpsi sistemik agaknya bergantung pada laju disintegrasi dari bentuk sediaan dan deagregasi dari granul-granul tersebut. Seringkali disolusi merupakan tahapan yang membatasi atau tahap yang mengontrol laju bioabsorpsi obat-obat yang mempunyai kelarutan rendah, karena tahapan ini seringkali merupakan tahapan yang paling lambat dari berbagai tahapan yang ada dalam penglepasan obat dari bentuk sediaan dan perjalannya ke dalam sirkulasi sistemik (Martin, 1993).

Laju disolusi bahan obat dalam suatu pelarut bergantung pada kelarutannya. Kelarutan adalah jumlah obat yang dapat terdispersi secara molekular dalam sejumlah pelarut yang diberikan. Laju disolusi merupakan laju dimana solut berubah dari kristal, serbuk, cairan, atau bentuk lain menjadi molekular terdispersi dalam pelarut. Laju disolusi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya akan semakin penting dalam penentuan ketersediaan biologik bahan obat (Martin, 1971).

Seorang farmasis harus lebih terbuka dengan masalah kelarutan obat dalam waktu yang singkat. Laju disolusi bergantung pada banyak faktor, seperti (Martin, 1971) :

1. Ukuran partikel solut. Semakin kecil ukuran partikel, semakin besar luas permukaannya dan dengan demikian semakin banyak kontak dengan pelarut yang hasilnya meningkatkan laju disolusi.
2. Kondisi pada permukaan partikel. Adsorpsi gas pada permukaan serbuk partikel dapat mencegah pembasahan dan mengurangi laju disolusi.
3. Viskositas pelarut. Jika pelarut memiliki viskositas yang tinggi, laju difusi molekul terlarut dari permukaan partikel ke pertengahan bulk dikurangi dan laju disolusi mungkin dipengaruhi.
4. Suhu meningkatkan energi kinetik pelarut dan molekul terlarut, mengurangi viskositas, dan mempercepat proses difusi, kemudian berakibat pada peningkatan laju disolusi.
5. Agitasi mekanik meningkatkan laju disolusi tetapi komplikasi timbul dalam penyiapan larutan surfaktan, pembentukan film makromolekul, dan produk biologis sensitif seperti enzim.
6. Kelarutan zat aktif

Pada umumnya zat aktif bentuk garam lebih larut dalam air dari pada bentuk asam atau basanya. Dalam lambung, garam ini akan terionisasi dan asam yang tidak larut akan mengendap sebagai partikel yang sangat halus dan basah sehingga mudah diabsorpsi (Martin, 1971).

Pada umumnya bentuk anhidrat mempunyai kelarutan yang lebih besar dan disolusi yang lebih cepat daripada bentuk hidratnya.

Hidrat dan solvat dapat terbentuk sendiri baik pada waktu sintesa maupun pada waktu disolusi zat aktif (Gennaro, Alfonso, 1990).

Polimorfisme adalah suatu fenomena dimana suatu zat mempunyai bentuk kristal lebih dari satu. Secara umum bentuk polimorfisme yang metastabil mempunyai kelarutan dalam air yang lebih besar daripada bentuk stabil, sehingga disolusinya pun lebih cepat (Martin, 1971).

Bahan kompleks tidak dapat melewati membran absorpsi, karena itu tidak mempunyai aktivitas biologis. Tetapi biasanya suatu pengompleks lebih larut daripada bebasnya, sehingga meskipun sangat sedikit kompleks yang terabsorpsi dalam tubuh, kompleksasi akan menambah kecepatan absorpsi zat aktif yang sedikit larut (Martin, 1971).

7. Faktor yang berhubungan dengan lingkungan uji disolusi, yaitu :

a. Pengadukan

Ketebalan lapisan difusi berbanding terbalik dengan kecepatan pengadukan. Makin cepat intensitas pengadukan maka makin tipis lapisan difusi, sehingga disolusi makin cepat.

b. Sifat media disolusi

Sifat media disolusi memegang peranan penting dalam mempengaruhi kecepatan disolusi yaitu antara lain :

(1) pH media

Zat aktif yang bersifat asam lemah akan naik kecepatan disolusinya dengan naiknya pH, sebaliknya zat aktif yang bersifat basa lemah disolusinya menurun dengan naiknya pH.

(2) Suhu media

Kecepatan disolusi akan bertambah besar dengan kenaikan suhu.

(3) Viskositas

Bertambah besarnya viskositas media akan menyebabkan turunnya kecepatan disolusi.

(4) Tegangan permukaan

Penambahan surfaktan pada media disolusi akan menaikkan kecepatan disolusi zat hidrofob karena surfaktan memperkecil tegangan antarmuka antara zat tersebut dengan media disolusi.

C. Uraian Umum Ketoprofen

1. Sifat Fisika Kimia

Ketoprofen dengan rumus kimia $C_{16}H_{14}O_3$, suatu obat analgesik dan antiinflamasi non steroid (OAINS) merupakan turunan asam 2-arylpropionat dengan struktur kimia ditunjukkan pada gambar 5. Berat molekul ketoprofen 254,3 dengan titik lebur $93^{\circ}C - 96^{\circ}C$, praktis tidak larut dalam air, larut dalam etanol, kloroform, eter dan metanol

(Reynolds, 1993, Anonim, 1995 dan Anonim, 2005). Spektrum ultravioletnya dalam variasi pelarut dengan pH 1,2 – 12,9 memberikan absorpsi maksimum pada panjang gelombang sekitar 261 nm, jika pelarutnya adalah etanol maka λ_{\max} berada pada 255 nm (Darnpanid, 2004), sedangkan jika pelarutnya adalah Metanol 75% maka λ_{\max} berada pada 258 nm (Anonim, 1995).

2. Stabilitas

Ketoprofen harus terlindung dari cahaya dan lembab. Dalam bentuk serbuk, ketoprofen stabil pada temperatur ruang. Ketoprofen dalam larutan etil asetat yang disimpan selama beberapa minggu pada suhu 4°C tidak mengalami peruraian, demikian pula jika dipanaskan 98°C selama 30 menit dalam larutan asam pH 1. Akan tetapi jika larutan ketoprofen dalam air terpapar sinar UV 254 nm, atau sinar matahari (siang hari) selama 1 jam pada temperatur kamar, maka akan mengalami peruraian menjadi senyawa etana, selanjutnya menjadi senyawa etanol dan etanon (Darnpanid, 2004).

3. Farmakologi

Ketoprofen adalah salah satu bahan obat dari golongan analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi non steroid (AINS), digunakan untuk penanganan spondilitas ankilosa, rheumatoid arthritis, osteoarthritis dan dismenore primer. Efeknya menurunkan inflamasi, nyeri ringan sampai sedang dan demam dengan penghambatan sintesis prostaglandin melalui

mekanisme penghambatan aktivitas *cyclooxygenase* dan *lipoxigenase* (Tatro, 2003).

Pada pemberian oral, ketoprofen diabsorpsi cepat dan hampir lengkap di saluran cerna. Kadar puncak plasma dicapai setelah $\frac{1}{2}$ - 2 jam. Waktu paruh eliminasinya berkisar 1 – 4 jam, termasuk dalam OAINS dengan waktu paruh yang relatif pendek, Untuk kondisi inflamasi, ketoprofen diberikan dengan dosis 150 – 200 mg sehari dalam dosis terbagi 3-4 kali sehari (Reynolds, 1993).

Ketoprofen seperti halnya OAINS yang lain, dapat menyebabkan ulcer. Ulcer yang terjadi dapat berupa perdarahan yang serius dan atau perforasi yang memerlukan penanganan rumah sakit bagi penderita, beberapa dapat menyebabkan kematian dari komplikasi tersebut (Anonim, 2005). Karena efek samping yang dapat memperparah *lesi* pada gastrointestinal (GI), maka obat ini sebaiknya tidak diberikan pada pasien dengan tukak lambung atau yang mempunyai riwayat tukak lambung. Pada pasien tanpa kelainan GI, pemberiannya pun harus disertai dengan makanan untuk meminimalkan gangguan GI (Tatro, 2003).

D. Uraian Bahan


1. Ketoprofen (Gennaro, 1990), (Anonim, 1995)

Nama lain : Ketoprofenum

Rumus molekul : $C_{16}H_{14}O_3$

Bobot molekul : 254,3

Rumus struktur :



Pemerian : serbuk hablur, putih atau hampir putih, tidak atau hampir tidak berbau.

Titik lebur : 93° sampai 96°

Kelarutan : mudah larut dalam etanol, dalam kloroform dan dalam eter, praktis tidak larut dalam air.

Farmakologi : Ketoprofen atau asam 2-(3-benzoilfenil) propionat merupakan suatu obat anti inflamasi nonsteroid yang digunakan secara luas untuk mengurangi nyeri, dan inflamasi yang disebabkan oleh beberapa kondisi seperti, osteoarthritis dan rheumatoid arthritis (Parfitt, 1999).


2. Polivinil Alkohol (Kibbe, 2000)

Sinonim : Airvol, Elvanol, Polyviol, Poval, PVA.

Rumus molekul : $(C_2H_4O)_n$

Bobot molekul : 30000 – 200000

Rumus struktur :



Pemerian : serbuk granul yang tidak berbau, berwarna putih sampai cream.

Titik lebur : 228°C untuk tingkat terhidrolisis sempurna
180 - 190°C untuk tingkat terhidrolisis sebagian

Kelarutan : larut dalam air; sukar larut dalam etanol; tidak larut dalam pelarut organik.

E. Tinjauan Pengobatan dalam Islam

Allah swt. menciptakan makhluk-Nya dengan memberikan cobaan dan ujian, lalu menuntut konsekuensi kesenangan, yaitu bersyukur; dan konsekuensi kesusahan, yaitu sabar. Hal ini bisa terjadi dengan Allah membalikkan berbagai keadaan manusia sehingga peribadahan manusia kepada Allah menjadi jelas. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa musibah, penderitaan dan penyakit merupakan hal yang lazim bagi manusia dan semua itu pasti menimpa mereka, untuk mewujudkan peribadahan kepada Allah semata, serta untuk melihat siapa yang paling baik amalnya (Yazid, 2010).

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٧﴾

Terjemahnya :

Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Q..S. Al Mulq (67) : 2)

Penyakit merupakan bagian dari cobaan Allah yang diberikan kepada hamba-Nya. Sesungguhnya, cobaan-cobaan itu merupakan *Sunnatullah* yang telah ditetapkan berdasarkan rahmat dan hikmah-Nya. Ketahuilah, Allah tidak menetapkan sesuatu, baik berupa takdir kauni (takdir yang pasti berlaku di alam semesta ini) atau syar'i, melainkan di dalamnya terdapat hikmah yang amat besar, sehingga tidak mungkin bisa dinalar oleh akal manusia. Berbagai cobaan, ujian, penderitaan, penyakit dan kesulitan, semua itu mempunyai manfaat dan hikmah yang sangat banyak.

Perkembangan zaman juga meningkatkan jumlah penyakit yang menyerang manusia. Penyakit tertentu ada yang sudah diketahui obatnya dan ada pula yang belum diketahui. Namun, Allah tidak memberikan cobaan kepada hamba-Nya tanpa melewati batas kemampuan mereka. Setiap penyakit pasti ada obatnya, seperti sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu.

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

Artinya :

Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan pasti menurunkan obatnya. (HR. Al Bukhari)

Sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Jabir Radhiyallahu ‘anhu.

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya :

Sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan (obat) yang haram. (HR. Muslim)

Alquran sebagai salah satu sumber *Thibbun nabawi*. Banyak ayat dalam Alquran yang berhubungan dengan penyakit dalam tubuh dan pikiran serta cara penyembuhannya. Alquran berbicara tentang kesehatan fisik dan mental yang buruk/penyakit hati. Alquran memuat tentang doa untuk kesehatan yang baik sebagaimana panduan terapi khusus seperti madu, hanya memakan makanan yang sehat dan halal, menghindari makanan yang haram dan tidak sehat, serta tidak makan dalam jumlah yang berlebihan. Alquran bukanlah buku teks kesehatan, tetapi sebuah kitab bimbingan moral berisikan informasi dan pedoman dasar mengenai masalah kesehatan yang memberikan kesempatan manusia untuk melakukan penelitian dan menambah keterangan lebih detail. Menyempitkan jenis obat hanya sesuai dengan ayat-ayat Alquran akan membuatnya sangat terbatas karena Alquran sangat selektif dalam pengawasan secara khusus terhadap hal-hal mendetail yang memungkinkan lahan terbuka bagi manusia untuk berobservasi, mencari tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi (Kasule, 2008).

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا

خَسَارًا

Terjemahnya :

Dan Kami turunkan dari Alquran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Alquran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. (Q.S. Al-Israa` (17) : 82)

Selain Alquran, hadis juga sebagai sumber *Thibbun nabawi*. Bentuk-bentuk dari pengajaran kesehatan oleh Rasulullah, seperti sabda Rasul tentang masalah pengobatan, perawatan medis yang dipraktekkan orang lain pada masa Rasulullah, perawatan medis yang diamati Rasul, prosedur medis yang Rasul dengar/ketahui tentangnya dan tidak melarang. Jumlah keseluruhan hadis tentang pengobatan sekitar 300, banyak yang tidak mencapai tingkatan hasan. Bukhari dalam Sahihnya menceritakan 299 hadis yang secara langsung berhubungan dengan pengobatan. Beliau menyumbangkan dua buah buku kesehatan, yaitu kitab al Tibb dan kitab al Mardha (Kasule, 2008). Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Al-Darda ra, bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: "Allah telah menurunkan penyakit dan penawarnya, dan Dia telah menentukan setiap penawar untuk setiap penyakit. Jadi rawatlah dirimu sendiri dengan menggunakan obat-obatan sekuatmu, tetapi jangan menggunakan sesuatu yang jelas-jelas dilarang" (HR. Abu Dawud).

Alquran dan hadis merupakan pedoman kita untuk melakukan berbagai pengobatan, agar tidak keluar dari syariat Islam. Terapi pengobatan dan doa

tidak dapat dipisahkan, kesembuhan yang sebenarnya hanya berasal dari-Nya. Namun, doa saja tentu tidak cukup tetapi harus ada upaya pengobatan, misalnya pengobatan tradisional ataupun secara pengobatan medis. Doa dan pengobatan fisik perlu disinergikan, karena keduanya saling mendukung satu sama lain. Berkaitan dengan hal ini, Aisyah rahimahullah ta'ala meriwayatkan: "Ketika Rasulullah menderita sakit, dia membaca surat *Mu'awwidzatain* dalam hatinya dan meniupkannya ke bagian-bagian yang sakit. Ketika penyakitnya semakin parah, aku membacakan ayat-ayat tersebut kepadanya dan memukulkan secara perlahan pada bagian yang sakit tersebut melalui tangannya sendiri dengan harapan mendapat hidayat-Nya" (HR. Abu Dawud). Tetapi, bukan berarti semua penyakit yang mendapat pengobatan dari Rasulullah. Dia juga amat konsekuen untuk menyerahkan sesuatu pekerjaan kepada ahlinya. Sa'd rahimahullah ta'ala meriwayatkan: "Suatu ketika aku pernah menderita suatu penyakit. Rasulullah datang menjengukku. Dia meletakkan tangannya di dadaku dan aku merasakan hawa dingin di jantung ini. Baginda Rasulullah berkata: 'Kamu menderita penyakit jantung. Pergilah kepada Al-Harith Ibnu Kaladah, saudara Thaqif. Dia seseorang yang bisa memberikan perawatan bagi penyakitmu. Dia akan mengambil tujuh buah kurma Madinah kualitas terbaik dan menghancurkannya dengan alat penghancur dan meletakkannya di mulutmu' (HR. Abu Dawud).

Islam tidak membatasi umatnya dalam melakukan berbagai kemajuan, khususnya dalam ilmu obat-obatan. Penelitian-penelitian ilmiah telah dilakukan untuk mengembangkan dan mempercepat cara pengobatan. Obat-

obatan tradisional maupun sintetis diformulasi secara lebih baik untuk meningkatkan efek kerja obat di dalam tubuh, sehingga penyembuhan penyakit dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى

وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (Q.S. Yunus (10) : 57)

Obat sintetis dianggap racun dalam tubuh manusia karena efek sampingnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk meningkatkan laju disolusi obat agar cepat memberikan efek dan tereliminasi, sehingga obat tidak lama tinggal dalam tubuh yang mungkin dapat memberikan efek yang lebih buruk. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah saw., “Barangsiapa meminum racun, maka kelak racun itu ada di tangannya dan diminumnya terus menerus di neraka Jahannam, kekal abadi di dalamnya” (Muttafaq ‘Alayh). Juga sebuah riwayat dari Abu Hurayrah, ia berkata, “Rasulullah saw. melarang khabits” (HR. Abu Dawud, Turmudzi, dan Ibn Majah). Para ‘ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan khabits adalah racun.

هَذَا بَصِيرَةٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya :

Alquran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. (Q.S. Al-Jaatsiyah (45) : 20)

Berbuat baik yang diperintahkan oleh Allah yaitu melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, berlaku adil, dan menunaikan kewajiban terhadap makhluk menurut kadar hak-hak yang didapatkan serta berbuat baik yang dianjurkan yaitu apa yang lebih dari itu berupa mencurahkan potensi diri, harta, perbuatan, dan bimbingan untuk kebaikan ukhrawi atau kemaslahatan duniawi. Sehingga sesuai dengan perintah ini maka sebagai seorang farmasis yang sadar maka dilakukanlah penelitian ini yaitu meningkatkan kelarutan atau disolusi ketoprofen sebagai obat analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi, sehingga manfaat dan penggunaan obat ini dapat digunakan kembali dan secara luas digunakan dalam pengobatan dengan menekan efek samping. Peningkatan disolusi dan kelarutan obat ini dapat bermanfaat bagi manusia.

Soal penyakit adalah salah satu bentuk ujian dan cobaan dari Allah. Ujian ini antara lain bermaksud agar setiap orang menyadari, bahwa manusia adalah hamba Allah, yang tidak bisa melepaskan diri dari genggamannya. Dia-lah yang menurunkan dan menyembuhkan penyakit bagi hamba-Nya. Tidak semua pasien yang sembuh dari penyakit yang dideritanya, betapapun kualitas obat yang diberikan, dan betapapun ahlinya dokter yang merawatnya. Ini sebagai bahan renungan kepada setiap hamba, bahwa ada Maha Kekuatan

yang abstrak yang Maha Mengatur dan Maha Menetapkan segala urusan.

Itulah *qadha dan qadar*.

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾

Terjemahnya :

"(Yaitu Tuhan); Yang telah menciptakan aku, maka Dia-lah yang menunjuki aku. Dan Tuhanku; Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku. 'Dan apabila aku sakit, Dia-lah yang menyembuhkan aku'. Dan yang akan mematikan aku, dan akan menghidupkan aku (kembali)." (Q.S. Asy-Syu'araa (26) : 78-91).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Alat dan Bahan yang Digunakan

1. Alat-alat yang digunakan

Alat-alat gelas, aluminium foil, alat uji disolusi (*Erweka DT6*), cawan petri, desikator, karet pengisap, kertas indikator pH, pipet volume 1,0 ml; 2,0 ml; 3,0 ml; dan 5,0 ml, spektrofotometer UV-VIS (*Jenway 6505*), timbangan analitik, dan alat-alat lain yang lazim digunakan di laboratorium.

2. Bahan-bahan yang digunakan

Air suling, asam klorida pekat (*E-Merck*), dinatrium hidrogen fosfat (*E-Merck*), etanol (96% P) (*E-Merck*), natrium dihidrogen fosfat (*E-Merck*), natrium klorida (*E-Merck*), ketoprofen (*PT. Pharos*), dan polivinil alkohol (PVA) (*E-Merck*).

B. Metode Kerja

1. Rancangan Formula Dispersi Padat dan Campuran Fisik

Tabel 2. Rancangan Formula Dispersi Padat dan Campuran Fisik Ketoprofen – PVA

No.	Rancangan Formula	Perbandingan
1.	Dispersi padat ketoprofen : PVA	1 : 1
		1 : 2

		1 : 4
2.	Campuran fisik ketoprofen : PVA	1 : 1
		1 : 2
		1 : 4

2. Pembuatan Dispersi Padat dan Campuran Fisik

a. Pembuatan dispersi padat ketoprofen – PVA

Dispersi padat ketoprofen – PVA dibuat dengan metode pelarutan dalam perbandingan ketoprofen dan PVA, yaitu 1:1; 1:2 dan 1:4. Ditimbang masing-masing zat sesuai perbandingan. Dilarutkan PVA dalam air suling (1:5) dengan pemanasan diatas magnetik stirer pada suhu 70°C. Kemudian ketoprofen dilarutkan dalam etanol (96% P) dan ditambahkan ke dalam larutan PVA. Campuran ketoprofen dan PVA tersebut diuapkan pelarutnya, kemudian disimpan dalam desikator berisi silika gel selama 21 hari. Setelah kering, selanjutnya diserbukkan dan diayak dengan ayakan mesh 60.

b. Pembuatan campuran fisik ketoprofen – PVA

Ditimbang masing-masing zat sesuai dengan perbandingan yang diinginkan kemudian dihaluskan dan diayak dengan pengayak mesh 60. Hasil ayakan dicampur tanpa perlakuan khusus dengan perbandingan 1:1; 1:2 dan 1:4.

C. Evaluasi Dispersi Padat

Uji intervensi PVA dalam dispersi padat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Sebanyak 50 mg ketoprofen dilarutkan dalam 100 ml larutan dapar fosfat pH 7,4 kemudian dilakukan pengenceran hingga konsentrasi 10 bpj, lalu ditentukan panjang gelombang maksimumnya.
2. Dilakukan pengenceran terhadap dispersi padat ketoprofen – PVA yang mengandung 50 mg ketoprofen dengan menggunakan cairan lambung buatan hingga konsentrasi 10 bpj, kemudian dilakukan pengukuran panjang gelombang maksimumnya.

D. Uji Disolusi Dispersi Padat

1. Penyiapan Media Disolusi

Media disolusi yang digunakan adalah cairan lambung buatan tanpa pepsin yang dibuat dengan cara melarutkan 2,0 g natrium klorida P dalam 7,0 ml asam klorida pekat dan dicukupkan volume dengan air suling hingga 100,0 ml. Diukur larutan pada pH 1,2 (Anonim, 1979).

a. Pelaksanaan Uji Disolusi

Uji disolusi dilakukan menggunakan pengaduk keranjang, yaitu dengan cara masing-masing dispersi padat dan campuran fisik ketoprofen – PVA yang setara dengan 50 mg ketoprofen dimasukkan dalam keranjang disolusi, kemudian keranjang dicelupkan kedalam labu

disolusi yang berisi 900 ml media dengan suhu $37\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Selanjutnya keranjang diputar dengan kecepatan 50 putaran per menit. Pengambilan larutan contoh dilakukan pada menit ke 10, 20, 30, 45, dan ke-60 masing-masing sebanyak 10 ml. Setiap pengambilan larutan contoh, segera ditambahkan kembali kedalam labu disolusi larutan media disolusi yang baru dengan volume dan suhu yang sama (Anonim, 1995).

E. Penetapan Kadar Hasil Uji Disolusi

1. Pembuatan kurva baku

Dibuat satu seri pengenceran larutan ketoprofen dalam larutan dapar fosfat pH 7,4 dengan konsentrasi 2, 3, 4, 5, 6, 10 dan 20 bpj, kemudian masing-masing diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum. Selanjutnya dibuat kurva antara serapan dengan konsentrasi.

2. Penetapan kadar

Jumlah ketoprofen yang terdisolusi tiap satuan waktu tertentu ditentukan dengan mengukur serapan pada panjang gelombang maksimum dan dihitung kadarnya dengan menggunakan kurva baku.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Penentuan Panjang Gelombang Maksimum Ketoprofen

Penentuan panjang gelombang maksimum ketoprofen dalam larutan buffer fosfat pH 7,4 memberi nilai serapan pada panjang gelombang maksimum 260 nm.

2. Pembuatan Kurva Baku Ketoprofen

Pada pembuatan kurva baku larutan ketoprofen dalam dapar fosfat pH 7,4 diperoleh persamaan garis lurus $y = 0,0618 + 0,0126x$ dengan koefisien korelasi (r) = 0,999. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 5.

3. Evaluasi Dispersi Padat

Hasil uji intervensi pembawa PVA terhadap panjang gelombang maksimum ketoprofen memperlihatkan bahwa dispersi padat serta campuran fisik ketoprofen – PVA tidak mengalami pergeseran panjang gelombang dan mempunyai nilai serapan yang relatif sama dengan ketoprofen baku yakni memberikan serapan pada panjang gelombang maksimum 260 nm. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.

4. Kadar Ketoprofen yang Terdisolusi

Tabel 3. Persen Ketoprofen Rata-rata yang Terdisolusi dalam Media Cairan Lambung Buatan Tanpa Pepsin dari Dispersi Padat dan Campuran Fisik Ketoprofen – PVA

No.	Sampel	Perbandingan	Persen ketoprofen terdisolusi tiap satuan waktu (menit)				
			10	20	30	45	60
1.	Ketoprofen baku (ketoprofen : PVA)	1 : 0	0,6	1,3	1,4	1,6	2,0
2.	Dispersi padat ketoprofen – PVA	1 : 1	19,5	26,1	26,3	26,5	26,6
		1 : 2	17,8	23,1	26,6	28,9	31,6
		1 : 4	13,3	18,2	22,8	26,5	28,8
3.	Campuran fisik ketoprofen – PVA	1 : 1	2,5	3,7	4,4	4,9	5,7
		1 : 2	2,9	4,1	4,6	5,5	6,1
		1 : 4	3,8	5,0	5,4	6,3	6,8

B. Pembahasan

Dispersi padat diformulasi untuk meningkatkan laju disolusi suatu obat sehingga dapat memberikan efek terapeutik yang lebih cepat. Jenis matriks dari golongan polimer larut air paling umum digunakan dalam memformulasi dispersi padat karena kelarutannya yang baik dan bersifat inert. Polimer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu polivinil alkohol (PVA). PVA termasuk golongan polimer yang larut dalam air, tetap stabil pada perubahan pH, tidak memiliki batas toksisitas pemakaian, dan inert (Kibbe, 2000). Matriks yang digunakan sebagai bahan pembawa obat dalam dispersi padat tidak boleh menyebabkan terjadinya pergeseran panjang gelombang bahan obat, maka dilakukan uji intervensi. Uji intervensi bertujuan untuk melihat adanya kemungkinan pergeseran panjang gelombang akibat reaksi antara bahan obat dengan pembawa.

Identifikasi dari uji intervensi dapat dilakukan dengan spektrofotometer UV-Vis. Pergeseran panjang gelombang maksimum suatu senyawa dengan baku pembandingan pada interval maksimum dan minimum merupakan salah satu indikator kemurnian suatu senyawa karena dipengaruhi oleh eksitasi elektron yang dapat menyebabkan perubahan sifat fisika-kimia suatu molekul senyawa. Uji intervensi matriks PVA terhadap panjang gelombang maksimum ketoprofen menunjukkan bahwa dispersi padat dan campuran fisik ketoprofen – PVA tidak menyebabkan terjadinya pergeseran panjang gelombang dan mempunyai serapan yang hampir sama dengan ketoprofen baku. Dispersi padat dan campuran fisik ketoprofen – PVA terukur serapannya pada panjang gelombang maksimum 260 nm. Pada pelarut dengan pH 1,2 – 12,9 ketoprofen memberikan serapan maksimum pada panjang gelombang 260 nm (Darnpanid, 2004). Ini menunjukkan bahwa tidak terjadi reaksi antara ketoprofen dan PVA.

Dispersi padat ketoprofen – PVA dalam penelitian ini dibuat melalui metode pelarutan. Dibandingkan dengan metode peleburan dan peleburan-pelarutan, metode ini dipilih karena lebih efisien dimana pelarut PVA mudah bercampur dengan pelarut ketoprofen. Selain itu, PVA memiliki titik lebur yang terlalu tinggi, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan peleburan.

Penentuan kadar ketoprofen yang terdisolusi dari dispersi padat dan campuran fisik ketoprofen – PVA dengan pembandingan ketoprofen baku dilakukan dalam media cairan lambung buatan tanpa pepsin yang bertujuan untuk membuat suatu kondisi yang sama dimana ketoprofen memiliki kelarutan yang rendah dalam lambung tetapi permeabilitasnya tinggi, sedangkan dalam usus sebaliknya..

Dalam lambung, ketoprofen dapat terdisolusi dalam keadaan molekular, sehingga dapat diabsorpsi melintasi membran fisiologis. Dari hasil disolusi yang dilakukan dengan alat uji disolusi diperoleh kadar ketoprofen yang terdisolusi tiap satuan waktu yang diuji dari dispersi padat dan campuran fisik ketoprofen – PVA menunjukkan adanya pengaruh yang besar dengan adanya penambahan matriks PVA. Kadar ketoprofen yang terdisolusi paling besar terlihat pada dispersi padat. Terjadinya peningkatan kadar ketoprofen terdisolusi kemungkinan disebabkan karena terbentuknya larutan padat diskontinyu ketoprofen – PVA, dimana ketoprofen dan matriks PVA sebagian tidak tercampur, tetapi ketoprofen telah terdispersi secara molekular, sehingga menghasilkan kadar ketoprofen terdisolusi yang lebih besar. Namun, penentuan tipe dispersi padat diatas belum dapat dinyatakan secara valid karena membutuhkan pengujian lebih lanjut.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara dispersi padat dengan campuran fisik dan ketoprofen baku dalam meningkatkan kadar ketoprofen terdisolusi. Penggunaan matriks PVA sangat jelas pengaruhnya dalam meningkatkan kadar ketoprofen terdisolusi. Namun, persen terdisolusi terbesar ditunjukkan oleh dispersi padat. Hal ini terjadi karena bahan obat dan matriks yang dibuat dalam bentuk dispersi padat telah berada dalam keadaan molekular, dibandingkan dengan campuran fisik yang tidak diberi perlakuan khusus, sehingga masih berada dalam keadaan partikulat. Suatu obat yang dapat diabsorpsi, pertama kali harus dapat terlarut (terdispersi molekular) dalam cairan dimana obat tersebut akan diabsorpsi (Saifullah, 2008). Laju pelarutan obat-obat dalam saluran cerna akan mengendalikan laju absorpsi

sistemik obat dan menjadi penentu bioavailabilitas obat. Jika suatu obat diabsorpsi secara sempurna setelah pelarutan, maka akan menghasilkan konsentrasi obat dalam plasma yang lebih tinggi (Shargel, 2005).

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa dengan penambahan PVA sebagai matriks terbukti mampu meningkatkan kadar ketoprofen yang terdisolusi. Data dianalisis secara statistik menggunakan rancangan acak lengkap faktorial. Data menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Oleh karena itu, dilanjutkan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) untuk mencari perbandingan yang paling baik dalam memberikan kadar ketoprofen yang terdisolusi. Dari hasil uji ditunjukkan bahwa dispersi padat pada ketiga perbandingan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dispersi padat yang memberikan kadar ketoprofen terdisolusi paling baik ditunjukkan oleh dispersi padat ketoprofen – PVA 1:1 sebesar 26,6%.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Polivinil alkohol (PVA) dalam sistem dispersi padat maupun campuran fisik dengan ketoprofen dapat meningkatkan kadar ketoprofen terdisolusi.
2. Kadar ketoprofen terdisolusi terbesar diperlihatkan oleh dispersi padat ketoprofen – PVA pada perbandingan 1:1.

B. Implikasi Penelitian

Penulis mengharapkan adanya pengujian lanjutan terhadap bioavailibilitas dari dispersi padat yang memiliki laju disolusi tercepat dan dapat diformulasi menjadi bentuk sediaan yang lebih baik, seperti tablet.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Farmakope Indonesia edisi III*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1979
- Anonim. *Farmakope Indonesia edisi IV*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1995 (487)
- Anonim. *Material Safety Data Sheet Ketoprofen*, Sigma – Aldrich, (online), (www.MSDSketo.cayman.com, Diakses 28 Sept. 2009), 2005
- Ansel, Howard C. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi edisi IV*, Jakarta: Penerbit UI Press, 1989
- Chaudhari P.D. *Current Trends in Solid Dispersions Techniques*, Journal of Pharmainfo, 2006 (1)
- Chiou, W.L., Riegelman, S. *Pharmaceutical Applications of Solid Dispersion Sistem*, Journal of Pharmaceutical Science, 1971
- Darnpanid. *The Effect of Phospholipid as Penetration Enhancer on Skin Permeation of Ketoprofen*, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, 2004
- Drooge, D.J. *Production, stability, and dissolution of solid dispersions to improve the bioavailability of class II lipophilic drugs*. Dissertation of Science, 2006 (13, 15-18, 32, 33)
- Ganiswarna, Sulistia G. *Farmakologi dan Terapi edisi 4*, Jakarta: Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1995
- Gennaro, Alfonso R., et al. *Remington's Pharmaceutical Science* 18th edition, Pennsylvania: Mack Publishing Company, 1990 (591, 697, 1119)

- Kasule, Omar Hasan. *Pengobatan ala Nabi*, (<http://omarkasule.tripod.com>, Diakses 13 Juli 2010), 2008
- Kibbe, Arthur H. *Handbook of Pharmaceutical Excipients* 3rd edition, Washington, DC: Publishing by American Association, 2000 (424)
- Leuner, C. and Dressman, J. *Improving drug solubility for oral delivery using solid dispersion*. Eur. J. Pharm. Biopharm., 2000 (50, 47-60)
- Martin, Alfred S. *Farmasi Fisik* edisi II, Jakarta: UI-Press, 1993 (845-846)
- Martin, Eric W. *Dispensing of Medicine* 7th edition, USA: Mack Publishing Company, 1971 (500-501)
- Mulja, Muhammad., Suharman. *Analisis Instrumental*, Surabaya: Airlangga University Press, 1995
- Parfitt, K. Martindale, *The Complete Drug Reference*, Vol.1, London: Pharmaceutical Press, 1999 (48-49)
- Reynolds, J.EP. *Martindale The Extra Pharmacopoeia* 28th, New York: Pharmaceutical Press, 1993 (261)
- Ronny, *Perbandingan Laju Disolusi Piroksikam-PVP K-30 dalam Bentuk Dispersi Padat terhadap Campuran Fisisnya*, Skripsi Jurusan Farmasi FMIPA, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2004
- Saifullah, T.N. *Teknik Peningkatan Disolusi dan Bioavailabilitas*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2008
- Serajuddin ATM. *Solid Dispersion Of Poorly Water-Soluble Drugs: Early Promises, Subsequent Problems, And Recent Breakthroughs*, Journal of Pharmaceutical Science, 1999 (351)
- Shargel, L., Yu A. *Biofarmasetika dan Farmakokinetika Terapan* edisi kedua, Surabaya: Airlangga University Press, 2005 (96)

Tan H. Tjay, dan Raharja K. *Obat-obat Penting, Khasiat, Penggunaan dan Efek-efek Sampingnya* edisi IV, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1986

Tatro, David S. *A to Z Drug Facts*, Book@Ovid, Electronic version, 2003

Widodo, E. *Pengaruh Pembawa PEG 6000 terhadap Laju Disolusi Piroksikam dalam Bentuk Dispersi Padat yang dibuat dengan Metode Pelarutan*, Skripsi Jurusan Farmasi FMIPA, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2004

Yazid bin Abdul Qadir Jawas. *Pentingnya Penyembuhan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (<http://www.almanhaj.or.id/content/2416/slash/0>), Diakses 13 Juli 2010), 2010



Tabel 4. Hasil Uji Intervensi Pembawa PVA terhadap Panjang Gelombang Maksimum Ketoprofen dalam Cairan Lambung Buatan Tanpa Pepsin

Konsentrasi Ketoprofen : PVA (bpj)	Panjang Gelombang (nm)
10 : 0	260*
10 : 10	260
10 : 20	260
10 : 40	260

Keterangan :

* Pada perbandingan ketoprofen : PVA (10 : 0) atau ketoprofen murni diukur serapannya dalam larutan dapar fosfat pH 7,4.

Konsentrasi larutan ketoprofen yang diukur adalah 10 bpj.



Tabel 5. Hasil Pengukuran Serapan Ketoprofen dalam Larutan Dapar Fosfat pH 7,4 pada Panjang Gelombang Maksimum 260 nm untuk Pembuatan Kurva Baku

Konsentrasi (bpj)	Serapan
2	0,137
3	0,196
4	0,257
5	0,348
6	0,367
10	0,622
20	1,253

Keterangan :

Persamaan garis $y = a + bx$

y adalah serapan

x adalah konsentrasi (bpj)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi, maka diperoleh nilai :

$a = 0,0126$

$b = 0,0618$

$r = 0,999$

maka persamaan garis regresinya adalah :

$y = 0,0126 + 0,0618x$

Tabel 6. Hasil Pengukuran Serapan Ketoprofen dalam Media Disolusi Cairan Lambung Buatan Tanpa Pepsin yang Dilepaskan Tiap Satuan Waktu dari Campuran Fisik dan Dispersi Padat Ketoprofen – PVA

Formula	Serapan pada menit ke-				
	10	20	30	45	60
a	0,032	0,057	0,061	0,066	0,081
b	0,099	0,138	0,160	0,180	0,201
c	0,114	0,153	0,168	0,197	0,216
d	0,142	0,185	0,196	0,225	0,237
e	0,684	0,881	0,891	0,905	0,908
f	0,624	0,801	0,910	0,983	1,060
g	0,469	0,633	0,785	0,903	0,973

Keterangan :


- a : Ketoprofen : PVA (1:0) (ketoprofen murni)
- b : Campuran Fisik Ketoprofen : PVA (1:1)
- c : Campuran Fisik Ketoprofen : PVA (1:2)
- d : Campuran Fisik Ketoprofen : PVA (1:4)
- e : Dispersi Padat Ketoprofen : PVA (1:1)
- f : Dispersi Padat Ketoprofen : PVA (1:2)
- g : Dispersi Padat Ketoprofen : PVA (1:4)

Tabel 7. Kadar Ketoprofen yang Terdisolusi (mg) dari Campuran Fisik dan Dispersi Padat Ketoprofen – PVA dalam Media Disolusi Cairan Lambung Buatan Tanpa Pepsin yang Dilepaskan Tiap Satuan Waktu


Formula	Kadar ketoprofen yang terdisolusi (mg) pada menit ke-				
	10	20	30	45	60
a	0,283	0,708	0,650	1,007	0,799
b	1,251	1,841	2,181	2,496	2,829
c	1,469	2,061	2,303	2,742	3,056
d	1,877	2,524	2,719	3,172	3,381
e	9,771	18,515	13,243	13,038	13,324
f	8,897	11,573	13,295	14,497	15,782
g	6,654	9,102	11,423	13,259	14,423

Keterangan :

- a : Ketoprofen : PVA (1:0) (ketoprofen murni)
- b : Campuran Fisik Ketoprofen : PVA (1:1)
- c : Campuran Fisik Ketoprofen : PVA (1:2)
- d : Campuran Fisik Ketoprofen : PVA (1:4)
- e : Dispersi Padat Ketoprofen : PVA (1:1)
- f : Dispersi Padat Ketoprofen : PVA (1:2)
- g : Dispersi Padat Ketoprofen : PVA (1:4)




Gambar 7. Kurva Baku Ketoprofen



Gambar 8. Hubungan kadar ketoprofen terdisolusi (%) dengan waktu (menit)

LAMPIRAN 1

Skema Kerja Penentuan Pengaruh Konsentrasi Polivinil Alkohol (PVA) terhadap Kadar Ketoprofen yang Terdisolusi dalam Sistem Dispersi Padat



LAMPIRAN 2

Contoh Perhitungan Kadar (mg) dan Jumlah (%) Ketoprofen yang Terdisolusi
Tiap Satuan Waktu dengan Persamaan Garis Kurva Baku

Persamaan kurva baku :

$$y = a + bx$$

$$y = 0,0126 + 0,0618x$$

sehingga :

$$x = \frac{y - 0,0126}{0,0618}$$

dimana :

x = konsentrasi

y = serapan

a = perpotongan garis dengan sumbu y (intersep)

b = kemiringan garis (slope)

r = 0,999



Tabel 8. Perhitungan kadar (mg) dan persen terdisolusi ketoprofen dari dispersi padat dan campuran fisik ketoprofen – PVA dalam cairan lambung buatan

t (menit)	Serapan	Konsentrasi (bpj)	Konsentrasi dalam ml (mg)	Konsentrasi dalam 10ml (mg)	Konsentrasi dalam 900ml (mg)	Koreksi	Konsentrasi dalam 900ml (mg)	Jumlah ketoprofen terdisolusi (%)
10	0,031	0,29773	0,0003	0,00298	0,26796	-	0,26796	0,53592
20	0,041	0,45955	0,00046	0,0046	0,41359	0,00298	0,41657	0,83314
30	0,054	0,6699	0,00067	0,0067	0,60291	0,00757	0,61049	1,22097
45	0,061	0,78317	0,00078	0,00783	0,70485	0,01427	0,71913	1,43825
60	0,052	0,63754	0,00064	0,00638	0,57379	0,0221	0,59589	1,19178

LAMPIRAN 3

Analisis Statistika Formula Dispersi Padat dan Campuran Fisik menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial

Tabel 9. Analisis Statistika Formula Dispersi Padat dan Campuran Fisik menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial

Formula	Replikasi	Waktu (menit)					Jumlah	Rata-rata
		10	20	30	45	60		
a	1	0,54	0,83	1,22	1,44	1,19	13,79	1,37
	2	0,59	1,99	1,38	2,59	2,01		
sub total		1,13	2,83	2,60	4,03	3,19		
b	1	2,34	3,65	4,39	5,17	5,59	42,39	4,23
	2	2,66	3,71	4,34	4,82	5,72		
sub total		5,00	7,36	8,72	9,98	11,32		
c	1	3,04	4,44	4,73	5,65	6,38	46,53	4,65
	2	2,84	3,8	4,48	5,32	5,84		
sub total		5,88	8,24	9,21	10,97	12,22		
d	1	2,87	3,74	4,37	5,35	5,96	54,69	5,47
	2	4,64	6,36	6,51	7,34	7,57		
sub total		7,51	10,10	10,88	12,69	13,52		
e	1	21,79	31,13	25,49	27,90	27,01	250,08	25,00
	2	17,29	21,47	27,47	24,25	26,28		
sub total		39,08	52,59	52,97	52,15	53,29		
f	1	14,25	23,70	28,16	28,91	34,46	256,17	25,62
	2	21,33	22,59	25,02	29,08	28,67		
sub total		35,59	46,29	53,18	57,99	63,13		
g	1	15,04	21,79	22,32	25,19	27,21	219,44	21,94
	2	11,58	14,62	23,37	27,85	30,48		
sub total		26,62	36,41	45,69	53,04	57,69		
Total		120,8	163,8	183,3	200,8	214,4	883,09	

Keterangan :

- a : Ketoprofen : PVA (1:0) (ketoprofen murni)
- b : Campuran Fisik Ketoprofen : PVA (1:1)
- c : Campuran Fisik Ketoprofen : PVA (1:2)
- d : Campuran Fisik Ketoprofen : PVA (1:4)
- e : Dispersi Padat Ketoprofen : PVA (1:1)
- f : Dispersi Padat Ketoprofen : PVA (1:2)
- g : Dispersi Padat Ketoprofen : PVA (1:4)

Faktor Koreksi (Fk)

$$Fk = \frac{(883,09)^2}{7 \times 5 \times 2} = 11140,59$$

Jumlah Kuadrat (JK)

$$\begin{aligned} \text{JK Total} &= \{(0,54)^2 + (0,59)^2 + \dots + (30,48)^2\} - 11140,59 \\ &= 19171,66 - 11140,59 \\ &= 8031,07 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Perlakuan} &= \frac{\{(1,13)^2 + (2,83)^2 + \dots + (57,69)^2\}}{2} - 11140,59 \\ &= 19004,47 - 11140,59 \\ &= 7863,88 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Formula} &= \frac{\{(13,79)^2 + (42,39)^2 + \dots + (219,44)^2\}}{5 \times 2} - 11140,59 \\ &= 18346,19 - 11140,59 \\ &= 7205,60 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Waktu} &= \frac{\{(120,81)^2 + (163,83)^2 + \dots + (214,37)^2\}}{7 \times 2} - 11140,59 \\ &= 11521,61 - 11140,59 \\ &= 381,02 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK F*T} &= \text{JK Perlakuan} - \text{JK Formula} - \text{JK Waktu} \\ &= 7863,88 - 7205,60 - 381,02 \\ &= 277,26 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{JK Galat} &= \text{JK Total} - \text{JK Perlakuan} \\ &= 8031,07 - 7863,88 \\ &= 167,19 \end{aligned}$$

Tabel 10. Tabel Anava

Sumber Keragaman	DB	JK	KT	F hitung	F tabel	
					1%	5%
Perlakuan	34	7863,88				
Formula	6	7205,60	1200,93	251,41	3,35	2,36
Waktu	4	381,02	95,26	19,94	3,89	2,63
F*T	24	277,26	11,55	2,42	2,35	1,82
Galat	35	167,19	4,78			
Total	69	8031,07				

Karena F hitung > F tabel 1% dan 5% maka data sangat signifikan

Uji dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT)

$$\begin{aligned}
 \text{BNT}_{0,01} &= t_{0,01;24} \sqrt{\frac{2KTG}{n}} \\
 &= 2,797 \sqrt{\frac{2(4,78)}{2}} \\
 &= 2,797 \cdot 2,186 \\
 &= 6,12
 \end{aligned}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Tabel 11. Nilai rata-rata yang diurutkan mulai dari yang terbesar ke terkecil

Formula	Rata-rata
f	25,62
e	25,00
g	21,94
d	5,47
c	4,65
b	4,24
a	1,38

Tabel 12. Selisih rata-rata formula

Formula	Rata-rata formula (x_r)	Beda (selisih)						BNT 1%
		($x_r - a$)	($x_r - b$)	($x_r - c$)	($x_r - d$)	($x_r - g$)	($x_r - e$)	
f	25.62	24,24*	21,38*	20,97*	20,15*	3,68	0,62	6,12
e	25	23,62*	20,76*	20,35*	19,53*	3,06		
g	21.94	20,56*	17,7*	17,29*	16,47*			
d	5.47	4,09	1,23	0,82				
c	4.65	3,27	0,41					
b	4.24	2,86						
a	1.38							

Keterangan :

Tanda * : selisih yang lebih besar dari BNT 1% = 6,12

Tabel 13. Kesimpulan hasil notasi

Formula	a	b	c	d	e	f	g
a	-	NS	NS	NS	S	S	S
b	NS	-	NS	NS	S	S	S
c	NS	NS	-	NS	S	S	S
d	NS	NS	NS	-	S	S	S
e	S	S	S	S	-	NS	NS
f	S	S	S	S	NS	-	NS
g	S	S	S	S	NS	NS	-

Keterangan :

NS : Non signifikan

S : Signifikan

RIWAYAT HIDUP



Asriana Sultan, lahir di Polewali pada tanggal 26 September 1988, anak kedua dari 3 bersaudara, buah cinta dari pasangan Drs. Sultan Bani, M.Si. dan Ratnawati P. (Alm.). Pendidikan dimulai sejak tahun 1993 di TK Raudhatul Athfal Palu, dilanjutkan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 6 Palu. Dari tahun 1994 sampai tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Palu hingga tahun 2003. Menyelesaikan pendidikan tingkat sekolah di Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri 1 Palu pada tahun 2006. Setelah mengikuti ujian Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Lokal, akhirnya diterima menjadi mahasiswi pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada bulan September tahun 2006. Penulis mengikuti pendidikan dibangku kuliah sebagai mahasiswi Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan selama 4 tahun dan menyelesaikan skripsi pada tahun 2010 ini untuk meraih gelar Sarjana Farmasi (S.Farm.). Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah menyumbangkan segenap tenaga, pikiran dan materi untuk memberikan hasil yang terbaik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan mengharapkan sambutan yang baik dari para pembaca, kiranya dapat memberikan manfaat yang berguna.