

**PERBANDINGAN PRODUKSI ASI PADA IBU MENYUSUI ANTARA
PERSALINAN SPONTAN DENGAN PERSALINAN SEKSIO SESARIA
DI RSIA PERTIWI MAKASSAR**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

OLEH

HAMDANA

NIM.70300106046

**JURUSAN KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 Juli 2010

Penyusun,



HAMDANA

NIM. 70300106046

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Perbandingan Produksi ASI pada Ibu menyusui antara Persalinan Spontan dengan Persalinan Seksio Sesaria” yang disusun oleh Hamdana, Nim: 70300106046, mahasiswa Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2010 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Keperawatan (dengan berbagai perbaikan).

Makassar, 24 Juli 2010M

12 Sya’ban 1431H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Risnah SKM, S.Kep, Ns, M.Kes ()

Sekretaris : Nur Hidayah S.Kep, Ns, M.Kes ()

Penguji I : Prof. DR. H. Abd Rahim Yunus, MA ()

Penguji II : Hasnah S. Sit, M.Kes ()



Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

dr. H.M.Furqaan Naiem, M.Sc, Ph.D

NIP.19580404 198903 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan, rahmat, karunia-Nya dan hidayah-Nya yang selalu menyertai penulis dengan menyusun skripsi yang berjudul “Perbandingan Produksi ASI pada Ibu Menyusui Antara Persalinan Spontan dengan Persalinan Seksio Sesaria Di RSIA Pertiwi Makassar”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun merupakan input dalam penyempurnaan selanjutnya. Semoga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang dan masyarakat pada umumnya.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan serta dukungan moril maupun material dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan banyar terima kasih yang tak terhingga dan sembah sujudku kepada Ayahanda Saeh, S. Ag dan Ibunda Suriani S.Ag serta kepada mama Siti Khadijah yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan penulis dengan segala usaha, doa dan cucuran keringatnya dengan harapan demi suksesnya studi penulis. Melalui kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Azhar Arsyad. MA selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.
2. Bapak dr. HM. Furqan Naiem, M. Sc, Ph.D selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kemudahan selama masa pendidikan.

3. Ibu Nur Hidayah S.Kep Ns, M.Kes selaku ketua jurusan prodi keperawatan sekaligus sebagai pembimbing II dan Ibu Risnah SKM, S.Kep Ns, M.Kes sebagai dosen pembimbing I yang dengan kerelaan dan keikhlasannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta perhatian kepada penulis dari awal hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
4. Prof. DR. H. Abd Rahim Yunus. MA dan Ibu Hasnah S.SiT, M.Kes selaku penguji yang senantiasa memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan mendidik penulis selama masa pendidikan khususnya kepada kakanda Arbianingsih.
6. Kepada Direktur RSIA Pertiwi Makassar beserta seluruh stafnya yang telah memfasilitasi dan memberikan izin penelitian kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada sepupu-sepupuku tersayang (Dia, Dian, Echa) yang tak pernah bosan membantu dan memberikan semangat dalam mengerjakan karya tulis ini, semoga kalian semua tahun ini masuk Universitas yang kalian inginkan!!!
8. Kepada keluarga besar yang selama ini mendukung dan selalu memotivasi saya, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.
9. Kepadas sahabatku Sri dan Eka, yang telah banyak membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini, yang selalu menemani hari-hariku, yang selalu memberikan semangat, semoga tahun ini kita sama-sama keluar dari UIN dengan gelar sarjana!!!
10. Kepada Hamdan, terima kasih untuk segala berian semangatnya, segala masukannya selama penulisan skripsi ini dan terima kasih untuk semua bantuannya, semoga tahun ini kita sama-sama keluar dari UIN dengan gelar sarjana!!!
11. Kepada sahabat-sahabatku “Benzena Team” (Imma, Risna, Kia), yang telah banyak memberikan


motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.

12. K Jannah, K Inna, Ayu, Wulan, K Fitri, dan kepada semua teman-teman yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas segala masukan, motivasi dan bantuannya selama saya mengerjakan skripsi ini.

13. Kepada semua teman-teman di Fakultas Kesehatan khususnya di Jurusan Keperawatan, terima kasih atas semua hari-hari yang indah yang kita ukir bersama.

Akhirnya penulis memohon kehadiran Allah SWT, semoga mereka yang telah membantu penulis selama ini mendapat rahmat, hidayah dan keselamatan di dunia dan akhirat, Amin!

Billahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu Alaikum Wr.Wb



Makassar, 25 Juli 2010 M
12 Sya'ban 1431 H


Penulis

HAMDANA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum Tentang Persalinan	6
B. Tinjauan Umum Tentang Masa Nifas	28
C. Tinjauan Umum Tentang Ibu Menyusui.....	32
D. Tinjauan Umum Tentang Produksi ASI	33
BAB III KERANGKA KONSEP	50
A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti.....	50
B. Hipotesis Penelitian	52
C. Definisi Operasional	52

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	53
A. Desain Penelitian	53
B. Populasi dan Sampel.....	53
C. Instrumen Penelitian	55
D. Lokasi dan Waktu Penelitian	55
E. Prosedur dan Pengambilan Data	55
F. Analisa Data.....	56
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Hasil Penelitian	57
B. Pembahasan	60
BAB VI PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 : Distribusi Responden Persalinan Spontan Berdasarkan Umur Ibu Di RSIA Pertiwi.....	57
Tabel 5.2 : Distribusi Responden Persalinan Seksio Sesaria Berdasarkan Umur Ibu Di RSIA Pertiwi.....	57
Tabel 5.3 : Distribusi Responden Persalinan Spontan Berdasarkan Pendidikan Ibu Di RSIA Pertiwi.....	58
Tabel 5.4 : Distribusi Responden Persalinan Seksio Sesaria Berdasarkan Pendidikan Ibu Di RSIA Pertiwi.....	58
Tabel 5.5 : Analisis Crosstabulation Perbandingan Produksi ASI pada Persalinan Spontan dengan Persalinan Seksio Sesaria.....	59

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner Perbandingan Produksi ASI pada Ibu Menyusui dengan Persalinan Spontan dengan Persalinan Seksio Sesaria.
2. Tabulasi Data.
3. Analisis Data.
4. Surat Rekomendasi Izin Pengambilan Data Dari Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Surat Rekomendasi Izin Penelitian Dari Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Surat Rekomendasi Izin Penelitian Dari Kantor Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
7. Surat Izin Penelitian Dari RSIA Pertiwi Makassar.
8. Daftar Riwayat Hidup.



ABSTRAK

Perbandingan Produksi ASI pada Ibu Menyusui Persalinan Spontan dengan Persalinan Seksio Sesaria Di RSIA Pertiwi Makassar (Dibimbing Oleh Risnah Dan Nur Hidayah)

Persalinan merupakan pengeluaran hasil konsepsi (janin) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri).

Setelah persalinan ibu akan mengalami masa nifas, pada masa ini akan terjadi proses laktasi. Namun pada masa kehamilan hormon prolaktin dari plasenta meningkat tetapi ASI biasanya belum keluar karena masih dihambat oleh kadar estrogen yang tinggi, pada hari kedua atau ke tiga pasca persalinan, kadar estrogen dan progesteron turun drastis, sehingga pengaruh prolaktin lebih dominan dan pada saat inilah mulai terjadi sekresi ASI, dengan menyusukan lebih dini terjadi perangsangan puting susu, terbentuklah prolaktin oleh hipofisis, sehingga sekresi ASI semakin lancar.

Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi produksi ASI di antaranya adalah makanan ibu, ketenangan jiwadatan pikiran ibu, perawatan payudara dan pemakaian obat-obatan.

Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui perbandingan produksi ASI antara persalinan spontan dengan persalinan seksio sesaria.

Desain penelitian adalah deskriptif analitik dengan metode *cross sectional study*. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu-ibu yang sedang menyusui dengan jumlah sampel yang terlibat dalam penelitian ini adalah 100 orang dengan masing-masing 50 orang untuk jenis persalinan spontan dan 50 orang untuk jenis persalinan seksio sesaria.

Hasil penelitian ini secara teori ditemukan tidak adanya pengaruh jenis persalinan terhadap banyaknya jumlah produksi ASI. Secara statistik ada perbedaan yang tidak signifikan untuk dikatakan terdapat perbedaan jumlah produksi ASI pada jenis persalinan spontan dan jenis persalinan seksio sesaria.

Kata Kunci : ASI, Menyusui

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persalinan adalah pengeluaran hasil konsepsi (janin) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri). (Sarwono, 2005)

Persalinan spontan adalah suatu proses persalinan yang berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri, tetapi persalinan setiap saat terancam penyulit yang membahayakan ibu dan janinnya sehingga memerlukan pengawasan, pertolongan dan pelayanan dengan fasilitas yang memadai. Dimana persalinan ini dibagi menjadi empat tahap. persalinan dapat terjadi karena adanya kekuatan yang mendorong janin. (Siti Bandiyah, 2009)

Selain itu ada juga jenis persalinan yang disebut seksio sesaria merupakan prosedur pembedahan yang digunakan untuk melahirkan bayi melalui sayatan yang dibuat pada perut dan rahim. (Denny, Janet dan Ann, 2007)

Badan kesehatan dunia memperkirakan angka persalinan dengan seksio sesaria adalah sekitar 10 persen hingga 15 persen dari semua proses persalinan di negara-negara berkembang. sedangkan di Britania Raya dan Amerika Serikat masing-masing sebesar 20 persen dan 23 persen, begitu pula Kanada yang pada tahun 2003 memiliki angka sebesar 21 persen. (Wikipedia Ensiklopedia Indonesia, 2003)

Jumlah seksio sesaria mengalami peningkatan yang drastis di Amerika Serikat dan Kanada sejak tahun 1970, ketika kira-kira satu dari dua puluh wanita (5,5 persen) mengalami melahirkan *Caesar*, sampai tahun 1980-an ketika satu dari empat wanita (25 persen) di Amerika Serikat dan satu dari lima wanita (20persen) di Kanada mengalami pembedahan ini. kenaikan jumlah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan ahli karena angka caesar yang tinggi tidak menghasilkan perbaikan yang diharapkan pada

bayi maupun pada ibu. Pada tahun 1990-an, angka ini berfluktuasi antara 21 persen - 24% persen. Meskipun beberapa spesialis kandungan yang ternama membela angka bedah yang tinggi ini, kebanyakan organisasi masyarakat dan profesional yang ternama mulai melakukan upaya untuk menurunkan angka seksio sesaria tersebut. (Denny, Janet dan Ann, 2007)

Saat sekarang seksio sesaria sudah merupakan alternatif yang dapat dipilih seorang ibu yang akan melahirkan, walaupun ibu hamil tersebut masih dapat melahirkan secara normal. Seksio sesaria tidaklah dianjurkan bagi ibu yang masih dapat melahirkan secara normal. Alasan umum memilih seksio sesaria daripada melahirkan secara normal adalah agar terhindar dari rasa sakit sewaktu persalinan. Alasan ini sebenarnya tidaklah tepat. Melahirkan secara normal lebih ringan resikonya dibandingkan dengan seksio sesaria. (Handoko, 2000)

Di RSIA Pertiwi pada tahun 2009 tercatat 1560 orang yang melakukan persalinan spontan dan sebanyak 213 orang yang melakukan persalinan seksio sesaria. (RSIA Pertiwi, 2009)

Setelah persalinan ibu akan mengalami masa nifas, pada masa ini akan terjadi proses laktasi. Namun selama kehamilan hormon prolaktin dari plasenta meningkat tetapi ASI biasanya belum keluar karena masih dihambat oleh kadar estrogen yang tinggi, pada hari kedua atau ketiga pasca persalinan, kadar estrogen dan progesteron turun drastis, sehingga pengaruh prolaktin lebih dominan dan pada saat inilah mulai terjadi sekresi ASI dengan menyusukan lebih dini terjadi perangsangan puting susu, terbentuklah prolaktin oleh hipofisis, sehingga sekresi ASI semakin lancar. Dua refleks pada ibu yang sangat penting dalam proses laktasi yaitu refleks prolaktin dan refleks aliran timbul akibat perangsangan puting susu oleh hisapan bayi. (Eni dan Diah, 2009)

Bagi bayi, ASI dapat membantu memulai kehidupannya dengan baik, dimana ASI mengandung komposisi yang tepat dan mengandung antibodi, ASI mampu memberi perlindungan baik secara aktif maupun pasif. ASI juga mengandung zat anti infeksi dimana bayi akan terlindung dari berbagai macam penyakit infeksi baik yang disebabkan oleh bakteri, virus, jamur atau parasit. (Diah wulandari, 2009)

Jumlah ibu yang menyusui anaknya di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2007 tercatat 720.346

orang, dan khususnya di daerah Makassar tercatat 116.978 orang. (BPS, 2008)

Dengan mengetahui bagaimana jenis persalinan mempengaruhi produksi ASI, diharapkan dapat menjadi bahan analisa dan evaluasi terhadap langkah dan kebijaksanaan yang telah dan akan ditempuh pada saat seorang ibu ingin bersalin, mengingat begitu pentingnya produksi ASI bagi anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka kami dapat mengangkat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana perbandingan produksi ASI pada ibu menyusui persalinan spontan dengan persalinan seksio sesaria?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui perbandingan produksi ASI pada ibu menyusui persalinan spontan dengan seksio Sesaria.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran produksi ASI pada persalinan spontan.
- b. Untuk mengetahui gambaran produksi ASI pada persalinan seksio sesaria.
- c. Untuk mengetahui perbandingan produksi ASI pada persalinan spontan dan seksio sesaria.



D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat aplikatif

a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan masukan bagi kita semua serta Departemen Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka memberikan arah kebijaksanaan pada masa yang akan datang.

b. Untuk wilayah penelitian, merupakan masukan yang berharga dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayahnya.

2. Manfaat keilmuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

3. Manfaat bagi institusi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan masukan bagi kita semua khususnya pada Fakultas Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN).

4. Manfaat bagi peneliti

Merupakan pengalaman berharga dalam memperluas wawasan keilmuan dan cakrawala pengetahuan serta pengembangan diri, khususnya dibidang penelitian lapangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Persalinan

Persalinan adalah pengeluaran hasil konsepsi (janin dan uri) yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan sendiri). (Sarwono, 2005)

Kehamilan yang terjadi kurang lebih selama 9 bulan (36 minggu) mengalami berbagai macam proses dalam kandungan sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadist Nabi Muhammad saw.



عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَسَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ. فَوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا

رواه البخاري ومسلم

Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radiallahuanhu beliau berkata : Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan : Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan empat perkara : menetapkan rizqinya, ajalnya, amalnya dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada Ilah selain-Nya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga

jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga maka masuklah dia ke dalam surga. (Riwayat Bukhori dan Muslim)

Hadits ini menjelaskan bahwa selama seratus dua puluh hari, janin mengalami tiga kali perubahan. Perubahan-perubahan tersebut terjadi setiap empat puluh hari. Empat puluh hari pertama janin masih berbentuk nuthfah, percampuran antara sperma dan sel telur wanita, empat puluh hari berikutnya berbentuk gumpalan darah, dan empat puluh hari berikutnya menjadi segumpal daging. Setelah seratus dua puluh hari, Malaikat kemudian meniupkan ruh ke dalamnya, dan pada saat itulah ditetapkan bagi janin tersebut beberapa kalimat (ketentuan).

Demikianlah proses penciptaan manusia yang dijelaskan dalam Hadist, yang ditentukan tahap-tahap dan prosesnya sebagai bayi dengan berbagai bentuk persalinan agar manusia dapat mengambil hikmah didalamnya dari peristiwa tersebut. Dimana Allah menciptakan berbagai macam proses dikeluarkannya manusia dari rahim ibu (persalinan) sebagai seorang bayi.

1. Teori yang menjelaskan tentang persalinan spontan

a. Defenisi persalinan spontan

Persalinan spontan adalah suatu proses yang akan berlangsung dengan sendirinya, tetapi persalinan pada manusia setiap saat terancam penyulit yang membahayakan ibu dan janinnya sehingga memerlukan pengawasan, pertolongan dan pelayanan dengan fasilitas yang memadai. Persalinan pada manusia dibagi menjadi empat tahap tersebut. Persalinan dapat terjadi karena adanya kekuatan yang mendorong janin. (Siti Bandiyah, 2009)

Selama persalinan berlangsung dapat terjadi kontraksi ringan pada seluruh rahim, tanpa rasa sakit dan tanpa koordinasi yang disebut “*Broxton Hicks*”. Kontraksi ini lebih lanjut akan menjadi kekuatan untuk

persalinan. (Siti Bandiyah, 2009)

b. Proses persalinan

Perlu diketahui bahwa ada dua hormon yang dominan saat hamil, yaitu:

(1) Estrogen

(a) Meningkatkan sensitivitas otot rahim

(b) Memudahkan penerimaan rangsangan dari luar seperti rangsangan oksitosin, rangsangan prostaglandin, rangsangan mekanis

(2) Progesteron

(a) Menurunkan sensitivitas otot rahim

(b) Menyulitkan penerimaan rangsangan dari luar seperti rangsangan oksitosin, rangsangan prostaglandin, rangsangan mekanis

(c) Menyebabkan otot rahim dan otot polos relaksasi

Estrogen dan progesteron terdapat dalam keseimbangan sehingga kehamilan dapat dipertahankan.

Perubahan keseimbangan estrogen dan progesteron menyebabkan oksitosin yang dikeluarkan oleh hipofise parts posterior dapat menimbulkan kontraksi dalam bentuk *Braxton Hicks*, kontraksi *Braxton Hicks* akan menjadi kekuatan dominan saat mulainya persalinan. Oleh karena itu makin tua kehamilan frekuensi kontraksi makin sering.

Oksitosin diduga bekerja bersama atau melalui prostaglandin yang makin meningkat mulai dari kehamilan minggu ke-15. Di samping itu faktor gizi ibu hamil dan regangan otot rahim dapat memberikan pengaruh penting untuk dimulainya kontraksi rahim.

Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan beberapa teori yang menyatakan kemungkinan proses persalinan:

(1) Teori penurunan progesteron

(a) Proses penebaran plasenta terjadi mulai umur hamil 28 minggu, di mana terjadi penimbunan jaringan ikat. Pembuluh darah mengalami penyempitan dan buntu.

(b) Produksi progesteron mengalami penurunan, sehingga otot rahim lebih sensitif terhadap oksitosin.

(c) Akibat otot rahim mulai berkontraksi setelah tercapai tingkat penurunan progesteron tertentu.

(2) Teori oksitosin internal

(a) Oksitosin dikeluarkan oleh kelenjar hipofisis parts posterior

(b) Perubahan keseimbangan estrogen dan progesteron dapat mengubah sensitivitas otot rahim, sehingga otot rahim lebih sensitif terhadap oksitosin

(c) Akibatnya otot rahim mulai berkontraksi setelah tercapai tingkat penurunan progesteron tertentu

(3) Teori prostaglandin

(a) Konsentrasi prostaglandin meningkat sejak umur 15 minggu, yang dikeluarkan oleh desidua

(b) Pemberian prostaglandin saat hamil dapat menimbulkan kontraksi otot rahim sehingga hasil konsepsi dikeluarkan

(c) Prostaglandin dianggap dapat merupakan pemicu terjadinya persalinan

(4) Teori hipotalamus-pituitari dan glandula suprarenalis


(a) Teori ini menunjukkan pada kehamilan dengan anensefalus sering terjadi keterlambatan persalinan karena tidak terbentuk hipotalamus

(b) Malpar pada tahun 1933 mengangkat otak kelinci percobaan, hasilnya kehamilan kelinci berlangsung lebih lama

(c) Pemberian kortikosteroid yang dapat menyebabkan maturitas janin, induksi (mulainya) persalinan

(d) Dari percobaan tersebut disimpulkan ada hubungan antara hipotalamus-pituitari dengan mulainya persalinan

(e) Glandula suprarenal merupakan pemicu terjadinya persalinan



Bagaimana terjadinya persalinan masih tetap belum dapat dipastikan, besar kemungkinan semua faktor bekerja bersama-sama, sehingga pemicu persalinan menjadi multifaktor.

c. Permulaan terjadi persalinan

Dengan penurunan hormon progesteron menjelang persalinan dapat terjadi kontraksi. Kontraksi otot rahim menyebabkan:

(1) Turunnya kepala, masuk pintu atas panggul, terutama pada primigravida minggu ke-36 dapat menimbulkan sesak di bagian bawah, di atas simfisis pubis dan sering ingin kencing karena kandung kemih tertekan kepala.

(2) Perut lebih melebar karena fundus uteri turun.

(3) Terjadi perasaan sakit di daerah pinggang karena kontraksi ringan otot rahim dan tertekannya pleksus Frankenhauser yang terletak sekitar serviks (tanda persalinan palsu-*false labour*).

(4) Terjadi pelunakan serviks karena terdapat kontraksi otot rahim.

(5) Terjadi pengeluaran lendir, dimana lendir penutup serviks dilepaskan.

d. Tanda persalinan

Gejala persalinan sebagai berikut:

(1) Kekuatan his makin sering terjadi dan teratur dengan jarak kontraksi yang semakin pendek

(2) Dapat terjadi pengeluaran pembawa tanda, yaitu:

(a) Pengeluaran lendir

(b) Lendir bercampur darah

(3) Dapat disertai ketuban pecah

(4) Pada pemeriksaan dalam, dijumpai perubahan serviks:

(a) Perlunakan serviks

(b) Pendataran serviks

(c) Terjadi pembukaan serviks

Faktor-faktor penting dalam persalinan:

(1) Power

(a) His (kontraksi otot rahim)

(b) Kontraksi otot dinding perut

(c) Ketegangan dan kontraksi ligamentum retundum

(2) Pasanger

Janin dan plasenta

(3) Passange

Jalan lahir lunak dan tulang



e. Kekuatan yang mendorong janin dalam persalinan

Seperti diketahui bahwa otot rahim terdiri dari tiga lapis yang teranyam dengan sempurna, yaitu lapisan otot longitudinal di bagian luar, lapisan otot sirkuler di bagian dalam, dan lapisan otot menyilang di antara keduanya. Dengan susunan demikian, pembuluh darah yang terdapat di antara otot rahim, akan tertutup rapat saat terjadinya kontraksi postpartum sehingga menghindari perdarahan.

Pada saat inpartu perlu dilakukan observasi seksama karena tertutupnya pembuluh darah mengurangi oksigen ke peredaran darah retroplasenter, sehingga dapat menimbulkan asfiksia intrauterin, dengan demikian pengawasan dan pemeriksaan denyut jantung janin segera setelah kontraksi rahim, terutama pada kala dua (pengusiran), sangat penting sehingga dengan cepat dapat diketahui terjadinya asfiksia janin. Kontraksi otot rahim bersifat otonom, artinya tidak dapat dikendalikan oleh parturein, sedangkan serat saraf simpatis dan parasimpatis hanya bersifat koordinasi.

Beberapa sifat kontraksi rahim dijabarkan sebagai berikut:

(1) Amplitudo

(a) Kekuatan his diukur dengan mmHg

(b) Cepat mencapai puncak kekuatan dan diikuti relaksasi yang tidak lengkap, sehingga kekuatannya tidak mencapai 0 mmHg

(c) Setelah kontraksi otot rahim mengalami retraksi (tidak kembali kepanjang semula)

(2) Frekuensi

Jumlah terjadinya his 10 menit

(3) Durasi his

(a) Lamanya his yang terjadi pada setiap saat

(b) Diukur dengan detik

(4) Interval his

Tenggang waktu antara kedua his

(5) Kekuatan his

Perkalian antara amplitudo dengan frekuensi yang ditetapkan dengan satuan Montevideo.

f. Periode persalinan meliputi 4 fase/kala

Kala I. Observasi pada kala satu sangat penting dilakukan untuk mengetahui kekuatan his rahim, pembukaan dan denyut jantung janin, bila mungkin dengan memperdengarkannya pada ibu. (Siti Bandiyah, 2009)

Kala II. Pada kala ini ibu bersalin harus tetap ditemani oleh karena setiap saat terancam oleh keadaan gawat yang memerlukan pertolongan. Pengawasan persalinan kala II, diperlukan observasi yang ketat dan terutama kerjasama antara ibu bersalin dengan penolongnya. (Siti Bandiyah, 2009)

Kala III. Pertolongan kala III bukan merupakan masalah ringan, karena bahaya perdarahan selalu

menganam. Kala III berlangsung sekitar 10-15 menit, tetapi tetap merupakan bahaya yang perlu diperhatikan. (Siti Bandiyah, 2009)

Kala IV. Kala ini berlangsung mulai dari lahirnya plasenta (ari-ari) dan lamanya 2 jam. Pada saat ini diamati apakah terjadi perdarahan pasca persalinan.

g. Jalan lahir

Otot rahim tersusun oleh tiga lapis sumbernya dari kedua tanduk rahim yaitu longitudinal (memanjang), melingkar, dan miring. Susunan demikian menguntungkan karena segera setelah persalinan, akan dapat menutup pembuluh darah dan menghindari terjadinya perdarahan dari tempat implantasi plasenta (ari-ari). Disamping kontraksi yang dominan dibagian fundus (bagian atas rahim) pada kala pertama persalinan menyebabkan terjadi pembukaan secara pasif mulut rahim, mendorong bagian janin terendah menuju jalan lahir sehingga ikut aktif dalam membuka mulut rahim. (Siti Bandiyah, 2009)

Kedudukan janin dalam rahim sekitar 97 persen adalah letak kepala sehingga persalinan berlangsung secara spontan (dengan kekuatan sendiri) cukup bulan dan hidup. Bila dijumpai kejadian persalinan demikian berarti keadaan panggul dan janin yang normal dan kerja sama antar tiga kekuatan his dan mengejan, passenger (janin dan ari-ari), dan passange (jalan lahir) tulang dan lunak telah menunjukkan keserasian.

h. Kekuatan mengejan

Pada kala kedua (pengeluaran bayi) terjadi rangsangan terhadap fleksus (kumpulan saraf) Frankenhauser disekitar mulut rahim sehingga terjadi refleks mengejan, yang merupakan tambahan

kekuatan untuk melahirkan janin (bayi). Bila his tidak dapat dikendalikan oleh ibu maka kekuatan mengejan dapat dikendalikan sehingga hasil kedua kekuatan mempercepat proses persalinan. Pada persalinan oleh dokter atau bidan sehingga dapat dikoordinasikan dengan baik sekalipun refleks mengejan terjadi spontan, tetapi sering kekuatan itu malah tertahan dibagian leher, sehingga leher ibu tegang, wajah merah bengkak bahkan terjadi perdarahan pada mata. (Siti Bandiyah, 2009)

Salah satu tanda penting pada kehamilan pertama adalah masuknya kepala janin kepintu atas panggul, pada minggu ke-36 disebabkan oleh kekuatan kontraksi *Braxton Hicks*, tekanan dari diafragma (sekat rongga badan), tegangan ligamentum rahim dan dinding perut, serta gaya berat kepala janin. Dengan masuknya kepala janin sudah dapat diperkirakan kerjasama 3 kekuatan akan berlangsung aman, asalkan mampu melakukan pimpinan persalinan.

Gerakan utama kepala janin dan persalinan tubuh janin secara berurutan seperti dibawah ini:

Tipe masuknya kepala janin ke pintu atas panggul

- (1) Sinklitismus ialah arah sumbu kepala janin tegak lurus dengan bidang pintu atas panggul (PAP)
- (2) Yang Asinklitismus dimana arah sumbu kepala janin miring terhadap PAP. asinktismus terbagi dua jenis
 - (a) Anterior, yaitu arah sumbu kepala membuat sudut lancip kedepan terhadap bidang PAP, sedangkan
 - (b) Asinktismus posterior merupakan kebalikan dari asinktismus anterior

Turun dan masuknya kepala janin dipintu atas panggul. Pada ibu yang baru pertama kali hamil

(primigravida) kepala sudah masuk ke pintu atas panggul dan minggu ke 36. Sedangkan pada ibu yang hamil lebih dari satu (multigravida) bersamaan dengan mulainya persalinan (dapat juga masuk saat kehamilan cukup bulan).

i. Kepala janin mengalami fleksi

Kepala janin masuk pintu atas panggul dalam keadaan menekuk (fleksi) ringan. Kekuatan his dan bentuk jalan lahir menyebabkan terjadinya fleksi ini yaitu menempelnya dagu di dada janin.

j. Putar paksi dalam

Putar paksi dalam adalah usaha menyesuaikan kepala janin dengan jalan lahir sehingga titik putar (hipomoklion) berada tepat dibawah tulang kemaluan (simfisis pubis). Putar paksi kepala dalam terjadi karena faktor kepala janin dan faktor jalan lahir.

k. Terjadi ekstensi dan ekspulsi

Dengan kekuatan his dan refleks mengejan, terjadi ekstensi (defleksi) kepala janin sehingga berturut-turut lahir ubun-ubun, dahi, mulut dan dagu. Selanjutnya diikuti persalinan belakang kepala sehingga seluruh kepala janin dapat lahir.

l. Putar paksi luar

Sementara kepala bayi lahir, bahu bayi masuk atas panggul mengikuti jalan lahir. Kepala bayi yang telah berada diluar melakukan putar paksi luar yaitu menyesuaikan diri dengan punggung bayi, yang mulai terjadi dengan bahu depan (dekat tulang kemaluan ibu) sebagai titik putarnya. Persalinan bahu

dan badan bayi dibantu dengan menarik kepala curam kebawah untuk melahirkan bahu depan, curam keatas untuk melahirkan bahu belakang, setelah kedua bahu lahir ketika bayi dikaitkan dengan telunjuk untuk melahirkan sisa badannya. Dengan demikian seluruh bayi lahir. Setelah mulut, hidung dan jalan nafas dibersihkan dan bayi menangis, tali pusat dipotong diikat dan bayi dibungkus lalu diletakkan pada dada ibu, kemudian dibersihkan.

m. His kala uri (plasenta)

Setelah bayi lahir otot rahim memerlukan istirahatsekitar 10-15 menit dan his timbul untuk melahirkan plasenta (ari-ari). Persalinan plasenta pun perlu dibantu, sehingga dapat diketahui kelengkapannya. Dengan lahirnya janin (bayi) terjadi pengerutan otot rahim, artinya setelah kontraksi otot rahim tidak kembali pada panjang semula, tetapi memendek dan menyebabkan plasenta tidak dapat mengikuti perpendekan dan melepaskan diri. Plasenta yang telah lepas diperiksa kelengkapannya, sehingga tidak terdapat sisa plasenta yang menyebabkan perdarahan berkepanjangan/berulang. Infeksi setelah persalinan atau mengalami degenerasi ganas atau polip. Bila diduga terdapat sisa plasenta dilakukan eksplorsi atau dilakukan kuretase.

n. His kala empat

Setelah plasenta lahir otot rahim terus berkontraksi untuk dapat menutup pembuluh darah dari bekas implantasi plasenta. Dengan persalinan terdapat penurunan hormon kehamilan yang menyebabkan pengecilan otot rahim sehingga kembali pada besar dan bentuk semula setelah 42 hari (6 minggu atau satu bulan tujuh hari). Bila persalinan berjalan normal, diharapkan dapat melakukan mobilisasi segera sehingga peredaran darah kembali dan sisa darah yang terdapat dalam rahim dapat dikeluarkan. Mobilisasi dini menguntungkan dan dapat mengurangi kemungkinan infeksi setelah persalinan.

Gambaran persalinan secara klinis penting dimasyarakat sehingga ibu datang pada waktunya, untuk persiapan pertolongan. Bagi masyarakat awam, bila terjadi dan terdapat salah satu gejala tersebut sebaiknya datang kerumah sakit untuk mendapat pertolongan.

o. Gejala lightening (perasaan lebih ringan)

(1) Gejala sesak makin berkurang, terasa sesak pada bagian bawah. Mengalami sering berkemih oleh karena tekanan kepala bayi, disebabkan oleh masuknya kepala janin ke PAP sehingga tinggi rahim turun. Pada pemeriksaan dijumpai puncak rahim telah turun kebagian terendah masuk PAP, pada pemeriksaan dalam mulut rahim telah matang untuk menyongsong persalinan.

(2) Terdapat his pendahuluan. His pendahuluan merupakan peningkatan kontraksi *Braxton Hicks* dengan tanda kontraksi pendek dan tidak teratur, rasa nyeri hanya dibagian bawah, bila bergerak kontraksi rahim dapat berkurang, pada pemeriksaan belum terjadi kematangan mulut rahim.

(3) Tanda persalinan berlangsung. Kontraksi *Braxton Hicks* makin meningkat, makin kuat dan teratur sebagai his persalinan dengan gejala rasa sakit dari pinggang ke depan, interval teratur dan makin lama makin kuat, bila bergerak his bertambah, mulut rahim sudah terjadi perubahan, pendataran, perlunakan dan pembukaan. Terdapat tanda pengeluaran lendir kental dan lendir bercampur darah. Pada keadaan abnormal terdapat pengeluaran cairan yang banyak karena pecah ketuban dan pengeluaran darah.

2. Tinjauan Umum Tentang Seksio Sesaria

a. Defenisi Seksio Sesaria

Suatu persalinan dimana janin dilahirkan melalui suatu insisi pada dinding perut dan dinding rahim

dengan syarat rahim dalam keadaan utuh serta berat janin diatas 500 gram. (Sarwono, 2007)

Seksio sesaria digunakan untuk mengakhiri kehamilan atau persalinan bila tak mungkin melakukan persalinan pervaginam. Sehingga tak perlu mencari indikasi khusus untuk melakukan operasi ini. Hanya keadaan abnormal yang terpenting yang ditemukan saat ini dalam praktek kebidananyang akan ditinjau. Telah jelas bahwa sering banyak indikasi diberikan pada kasus tertentu. Ini menyukarkan memisahkan indikasi fetus dari indikasi ibu. Lebih lanjut, seksio primer telah dianggap terpisah dari operasi berulang. Harus selalu diusahakan mengenai kelainan yang akan membenarkan seksio sedini mungkin.

Seksio dalam hukum Islam dibolehkan sesuai dengan dasar hukum bahwa melahirkan secara caesar sebenarnya diperbolehkan jika memang ada alasan medis yang darurat. Misalnya karena posisi bayi sungsang, bayi terlalu besar, atau hal-hal lain yang bisa membahayakan ibu dan anak bila dilakukan proses melahirkan secara normal.

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh seorang ulama Dr. Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya *Fatawa Muashiroh*. Iya berkata: “ hal ini berarti keberadaan janin akan membahayakan sang ibu, padahal ibu adalah induk sedangkan anak adalah cabang, oleh karena itu tidak boleh mengorbankan induk demi cabang. ([Yusuf Al-Qardhawi](#), Konsultasi syariah)

b. Indikasi Seksio Sesaria

(1) Indikasi fetus

Belakangan ini pertimbangan fetus telah menjadi indikasi terkemuka, karena teknik diagnostik untuk menilai kesejahteraan fetus intrauterus telah diperbaiki.

Sebelum persalinan, Seksio untuk kepentingan fetus bisa dilakukan sebelum mulainya persalinan,

tersering karena insufisiensi plasenta, hipoksia akan jelas pada kelainan pola denyut jantung pada tes stres oksitosin dan pada pewarnaan mekonium dalam cairan amnion, keduanya indikator diagnostik yang bermakna. Inisiasi kronik dijelaskan oleh dokumentasi sonografi adanya retardasi pertumbuhan maupun penurunan HPL dan estriol. Seksio dibenarkan pada keadaan ini jika keadaan serviks tak akan memungkinkan induksi persalinan. (Silvia, 2002).

Kehamilan beresiko tinggi dapat dibandingkan dalam hal ini karena kekhawatiran untuk mengantisipasi resiko bagi unit fetoplasenta seperti yang timbul pada primigravida tua dan wanita dengan hipertensi yang diinduksi kehamilan diabetes melitus atau riwayat infertilitas. Jika fetus dalam bahaya, maka indikasi seksio sesaria bersifat bebas saat ini terutama pada kasus dengan serviks yang tak menguntungkan.

Dalam Persalinan, Seksio bisa juga dilakukan dalam perjalanan persalinan untuk alasan fetus. Tersering karena kelainan pola denyut jantung mungkin dikonfirmasi dengan pH darah kulit kepala. Persalinan bedah diperlukan bila bahaya tidak dapat dihindarkan dengan resusitasi intrauterus atau persalinan pervaginam segera.

Prolapsus tali pusat pada persalinan menjadi indikasi khusus lainnya untuk seksio sesaria, ia memerlukan seksio tanpa pengecualian. Seksio juga dilakukan pada korioamnionitis, suatu keadaan yang membahayakan fetus, didiagnosis dengan demam diatas 38 C per rektal disertai dengan cairan amnion yang berbau busuk. Cairan perabdominan harus dilakukan jika demam menetap lebih dari dua jam dan tak berespon terhadap antibiotik.

Batas persalinan yangberlarut-larut pada nulipara selama 12 jam, pada multipara selama 8 jam, ini menggambarkan bahwa resiko fetus lebih besar pada multipara daripada nulipara. Harus

dipertimbangkan mengakhiri persalinan dengan seksio bila sudah tak memungkinkan lagi melakukan persalinan pervaginam.

Penatalaksanaan pasien dengan ketubanpecah prematur bervariasi sesuai dengan masa laten antara pecah dan mulainya persalinan, keadaan serviks (dalam arti kemungkinan menginduksi persalinan) dan manifestasi infeksi ascendens (seperti demam dan leukositosis). Jika serviks tak menguntungkan, jika masa laten sebelum kontraksi lebih dari 12-14 jam, jika usaha menginduksi persalinan dengan obat uterotonikum gagal dan terutama jika ada tanda objektif omnionitis, maka harus segera dilakukan seksio sesaria.

(2) Indikasi ibu

Mengingat indikasi preventif janin menjadi menonjol, indikasi klasik untuk seksio yang telah lamaditerima untuk kepentingan ibu masih sangat penting. Ia terdiri dari sekitar 20 persen indikasi untuk seksio sesaria. (Silvia, 2002)

Sebelum persalinan. Secara khas, seksio sebelum persalinan bisa dilakukan untuk ketidakseimbangan sefalopelvik yang absolut, walaupun jarang ditemukan. Ia dapat didiagnosis dengan sefalometri sonografi yang dikombinasi dengan pengukuran pelfimetri yang didapat dengan sonografi atau sinar X. Frekuensi masalah ini kurang dari 0,5 persen dari semua persalinan saat ini. (G.Martius, 2002)

Tumor uterus dan ovarium dalam kehamilan yang menyumbat jalan lahir atau memerlukan intervensi bedah dengan sendirinya berlaku sebagai indikasi untuk seksio sesaria dapat saat cukup bulan. Setelah uterus dikosongkan, tumor dapat di extirpas.(Silvia, 2002)

Karsinoma serviks selalu memerlukan persalinan perabdominan, walaupun itu tidak menyebabkan

halangan bagi proses persalinan. Persalinan normal melalui serviks yang menderita kanker jelas memperburuk serviks. (Silvia, 2002)

Pada persalinan jarang perlu melakukan seksio pada persalinan multigravida karena kepentingan ibu. Biasanya kelainan akut yang timbul pada persalinan membahayakan janin dalam tingkat yang sama. Perdarahan yang hebat bersama dengan kematian fetusintrauterus atau kecurigaan ruptura uteri semata-mata merupakan indikasi ibu.(Silvia, 2002)

(3) Kombinasi Indikasi Ibu dan fetus

Beberapa keadaan abnormal menimbulkan resiko serentak bagi ibu dan anak. Dalam hal ini, resiko relatifnya tak dapat dipisahkan dengan mudah.

Perdarahan Pervaginam Akut, Biasanya perdarahan mendadak selama kehamilan atau persalinan disebabkan oleh plasenta previa atau pelepasan prematur plasenta yang terimplantasi normal. Jika perdarahan mendekati proporsi yang mengancam nyawa ibunya maka harus dilakukan seksio segera tanpa harus memperhatikan usia kehamilan ataupun keadaan janin. Bila perdarahan lebih ringan, maka letak plasenta ditentukan dengan sonografi. Jika dilihat memungkinkan persalinan dengan pervaginam maka mungkin dipilih amniotomi atau stimulasi uterotonikum, tingkat bahaya bagi janin dapat ditentukan dengan menentukan proporsi eritrosit fetus didalam darah di vagina. (Silvia, 2002)

Operasi Uterus Sebelumnya, Sekarang semakin sering melakukan seksio pada wanita yang sebelumnya telah mendapat insisi uterus, misalnya miomektomi, mertoplasti strassman atau implantasi tuba. (Silvia, 2002)

Keputusan cara menata laksana suatu persalinan setelah operasi uterus memperhitungkan banyak

pertimbangan khusus. Yang terpenting diantaranya meliputi teknik operasi, perjalanan pasca bedah, status jaringan parut selama persalinan terakhir dan keadaan kandungan saat ini. Jika yang menyebabkan seksio pertama ada lagi (misalnya malpresentasi) harus dilakukan seksio sesaria ulangan. Selama suatu partus percobaan, kelambatan dalam perjalanan dilatasi akan meningkatkan kemungkinan dehisensi jaringan parut. (Silvia, 2002)

Letak Lintang, Jika persalinan dibiarkan berkembang bersama dengan malpresentasi maka akan timbul retraksi progresif pada segmen bawah. Hal ini bisa membatasi aliran darah uteroplasenta dan membahayakan fetus. Kemudian uterus bisa ruptur dan juga membahayakan ibu. (Silvia, 2002).

Ketidakseimbangan sefalopelvik relatif dan distosia, indikasi khas dari jenis kombinasi ibu dan janin berupa ketidakseimbangan relatif antara bagian fetus yang dipresentasikan dan tulang pelvis. Ini didiagnosis selama perjalanan persalinan. Juga obstruksi mekanis bagi persalinan dalam bentuk distosia posisi yang persisten bisa timbul selama persalinan, seksio akan diindikasikan pada keadaan ini jika timbul pola persalinan disfungsi atau terbukti timbul gawat janin. Indikasi sebanding meliputi kelainan pola kontraksi uterus seperti hipersistole atau polisistole atau cincin retraksi yang tidak berespon terhadap obat perelaksasi uterus (misalnya betamimetik). (Silvia, 2002)

c. Resiko seksio sesaria

Terdapat beberapa bahaya yang telah dikenal bagi fetus bila persalinan dilakukan dengan seksio sesaria, terlepas yang ditunjukkan oleh keadaan abnormal, resiko ini meliputi: (Silvia, 2002)

- (1) Hipoksia akibat sindroma hipotensi terlentang
- (2) Depresi pernapasan karena anestesia

(3) Sindrom gawat pernafasan, jelas lebih lazim pada bayi yang dilahirkan dengan seksio

Dengan mengenal masalah yang mungkin terjadi ini, harus dilakukan pencegahan yang tepat dengan meninggikan sisi kiri pasien pada meja operasi, memilih tindakan anestesi dengan teliti, dan jika waktu memungkinkan, tentukan sebelumnya rasio L/S cairan amnion atau berikan betametason untuk tujuan mematangkan paru.

Mortalitas perinatal bagi bayi yang dilahirkan dengan seksio sesaria berkisar antara 2-4 persen pada saat ini.

Resiko ibu karena seksio sesaria harus dianggapi lebih serius karena mereka berhubungan langsung dengan operasi.

Komplikasi berikut ini bersifat relevan:

(1) Infeksi yang didapat di rumah sakit, terutama setelah dilakukan seksio sesaria pada persalinan

(2) Fenomena tromboemboli, terutama pada multipara dengan varikosisitas

(3) Ileus, terutama karena peritonitis dan kurang sering karena dasar obstruksi

(4) Kecelakaan anestesi

B. Tinjauan Umum Tentang Masa Nifas

Masa nifas (*peurperium*) dimulai saat plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Wanita yang melalui periode *peurperium* disebut *peurpura*, nifas berlangsung selama 42 hari, merupakan waktu yang

diperlukan untuk pulihnya alat kandungan pada keadaan yang normal. (Eni dan Diah 2009)

Masa nifas adalah masa pulih kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti pra-hamil. (Eni dan Diah 2009)

Batasan waktu nifas yang paling singkat tidak ada batasan waktunya, bahkan bisa jadi dalam waktu yang relatif singkat darah sudah keluar, sedangkan batasan maksimumnya adalah 40 hari.

1. Tujuan Asuhan Masa Nifas

Asuhan masa nifas diperlukan dalam periode ini karena merupakan masa kritis baik ibu maupun bayinya. Di perkirakan 60 persen kematian ibu akibat kehamilan terjadi setelah persalinan dan 50 persen dan kematian masa nifas terjadi dalam 24 jam pertama.

Masa neonatus merupakan masa kritis bagi kehidupan bayi, 2/3 kematian bayi terjadi dalam 4 minggu setelah lahir. Dengan pemantauan melekat dan asuhan pada ibu dan bayi pada masa nifas dapat mencegah beberapa kematian ini.

Tujuan asuhan masa nifas normal dibagi 2 yaitu:

a. Tujuan Umum

Membantu ibu dan pasangannya selama masa transisi awal mengasuh anak.

b. Tujuan Khusus

- (1) Menjaga kesehatan ibu dan bayi baik fisik maupun psikologiknya
- (2) Melaksanakan skrining yang komprehensif, mendeteksi masalah, mengobati atau merujuk bila terjadi komplikasi pada ibu dan bayinya.
- (3) Memberikan pendidikan kesehatan.
- (4) Tentang perawatan kesehatan diri, nutrisi, KB, menyusui, pemberian imunisasi, dan perawatan bayi sehat.

(5) Memberikan pelayanan keluarga berencana

2. Peran dan tanggung jawab Bidan/perawat Dalam Masa Nifas

Peran dan tanggung jawab bidan/perawat dalam masa nifas adalah:

- a. Mendeteksi komplikasi dan perlunya rujukan
- b. Memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara mencegah perdarahan, mengenai tanda-tanda bahaya, menjaga gizi yang baik, serta mempraktekkan kebersihan yang aman
- c. Memfasilitasi hubungan dan ikatan batin antara ibu dan bayi
- d. Memulai dan mendorong pemberian ASI

3. Tahapan Masa Nifas

Nifas dibagi menjadi tiga tahap:

- a. Perperiode dini

Kepulihan dimana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Dalam agama islam dianggap telah bersih dan boleh bekerja setelah 40 hari.

- b. Perperiode intermedial

Kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya 6-8 minggu.

- c. Remote perperiode

Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna bisa berminggu-minggu, bulanan, tahunan.

4. Program dan Kebijakan Teknis

Paling sedikit 4 kali kunjungan masa nifas dilakukan untuk menilai status ibu dan BBL, dan untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani masalah-masalah yang terjadi dalam nifas. Dengan waktu

kunjungan: (Irma, 4 kali kunjungan masa nifas)

- a. Kunjungan pertama: 6-8 jam PP
- b. Kunjungan kedua : 6 hari PP
- c. Kunjungan ketiga : 2 minggu PP
- d. Kunjungan keempat: 6 minggu PP

5. Nifas Dalam Tinjauan Hukum Islam

Wanita yang sedang nifas sama dengan hal-hal yang diharamkan oleh wanita yang sedang haidh, yaitu :

a. Salat

Seorang wanita yang sedang mendapatkan nifas diharamkan untuk melakukan salat. begitu juga mengqada` salat. Sebab seorang wanita yang sedang mendapat nifas telah gugur kewajibannya untuk melakukan salat.

b. Berwudu` atau mandi janabah

As-Syafi`iyah dan al-Hanabilah mengatakan bahwa:

wanita yang sedang mendapatkan haid diharamkan berwududan mandi janabah. Adapun sekedar mandi biasa yang tujuannya membersihkan badan, tentu saja tidak terlarang. Yang terlarang disini adalah mandi janabah dengan niat mensucikan diri dan mengangkat hadats besar, pada hal dia tahu dirinya masih mengalami nifas atau haidh.

c. Puasa

Wanita yang sedang mendapatkan nifas dilarang menjalankan puasa dan untuk itu ia diwajibkannya untuk menggantikannya dihari yang lain.

d. Tawaf

Seorang wanita yang sedang mendapatkan nifas dilarang melakukan tawaf. Sedangkan semua praktek ibadah haji tetap boleh dilakukan. Sebab tawaf itu mensyaratkan seseorang suci dari hadas besar.

- e. Menyentuh Mushaf dan Membawanya
- f. Melafazkan Ayat-ayat Al-Quran
- g. Masuk ke Masjid
- h. Bersetubuh

Wanita yang sedang mendapat haid haram bersetubuh dengan suaminya. (Sarwat Ahmad, Fiqih Islam, 2008)

C. Tinjauan Umum Tentang Ibu Menyusui

Ibu menyusui adalah semua ibu yang memberikan ASI kepada bayinya, dengan payudara kanan dan kiri secara bergantian. Menyusui dapat dilakukan dengan duduk maupun dengan berbaring tapi jangan sampai ibu tertidur ketika sedang menyusui.

Ibu menyusui segera setelah bayi lahir, air susu pertama mencegah dari penyakit infeksi, segera setelah bayi menghisap puting payudara. ASI akan keluar dan memproduksi.

Sampai berumur 6 bulan berikan ASI saja, setelah berumur 6 bulan tetap berikan ASI dan makanan tambahan hingga bayi berumur 2 tahun.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 233:

الرَّضَاعَةُ يُتِمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلِينَ حَوْلِينَ أَوْلَادَهُنَّ يُرْضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ ...

Terjemahan:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...

Frekuensi penyusuan ini berkaitan dengan kemampuan stimulasi hormon dalam kelenjar payudara. Begitu besarnya manfaat ASI sehingga dianjurkan bagi seorang ibu untuk meningkatkan frekuensi penyusuan pada periode awal melahirkan, ini harus sesuai dengan produksi dan pengeluaran ASI yang cukup oleh seorang ibu walaupun ini bergantung dengan kemampuan stimulasi hormon dalam kelenjar

payudara tetapi produksi ASI merupakan sebuah jaminan bahwa seorang ibu akan mampu memproduksi ASI bisa sampai selama dua tahun walaupun dalam prakteknya tidak semua ibu mampu menyusui dan memproduksi ASI karena berbagai macam faktor yang mempengaruhi, ini sejalan dengan penjelasan didalam Al-Qur'an yaitu seorang ibu akan mampu menyusui dan memproduksi ASI selama dua tahun kemudian Al-Qur'an juga menjelaskan bagaimana anjuran untuk menyempurnakan penyusuan bagi bayi pada periode awal bahkan bisa sampai selama dua tahun tetapi itu hanya sebuah anjuran apabila kedua orang tuanya tidak ingin menyempurnakan penyusuan sebelum dua tahun maka hal tersebut tidak apa-apa dan tidak ada dosa bagi keduanya.

D. Tinjauan Umum Tentang Produksi ASI

Selama kehamilan, hormon prolaktin dari plasenta meningkat tetapi ASI biasanya belum keluar karena masih di hambat oleh kadar estrogen yang tinggi, pada hari kedua atau ketiga pasca persalinan, kadar estrogen dan progesteron turun drastis, sehingga pengaruh prolaktin lebih dominan dan pada saat inilah mulai terjadi sekresi ASI, dengan menyusukan lebih dini terjadi perangsangan puting susu, terbentuklah prolaktin oleh hipofisis, sehingga sekresi ASI semakin lancar. Dua refleks pada ibu yang sangat penting dalam proses laktasi yaitu refleks prolaktin dan refleks aliran timbul akibat perangsangan puting susu oleh hisapan bayi. (Eni dan Diah, 2009)

Refleks prolaktin sewaktu bayi menyusui, ujung saraf peraba yang terdapat pada puting susu terangsang. Rangsangan tersebut oleh serabut afferent dibawa kehipotalamus di dasar otak, lalu memacu hipofise anterior untuk mengeluarkan hormon prolaktin kedalam darah. Melalui sirkulasi prolaktin memacu sel kelenjar (alveoli) untuk memproduksi air susu. Jumlah prolaktin yang disekresi dan jumlah susu yang diproduksi berkaitan dengan stimulus isapan, yaitu frekuensi, intensitas dan lamanya bayi mengisap.

Refleks aliran rangsangan yang ditimbulkan oleh bayi saat menyusui selain mempengaruhi hipofise anterior mengeluarkan hormon prolaktin juga mempengaruhi hipofise posterior mengeluarkan hormon

oksitosin. Dimana setelah oksitosin dilepas kedalam darah akan mengacu otot-otot polos yang mengelilingi alveoli dan duktulus berkontraksi sehingga memeras air susu dari alveoli, duktulus, dan sinus menuju puting susu.

Refleks *let-down* dapat dirasakan sebagai sensasi kesemutan atau dapat juga ibu merasakan sensasi apapun, tanda-tanda lain dari *let-down* adalah tetesan pada payudara lain yang sedang dihisap oleh bayi. Refleks ini dipengaruhi oleh kejiwaan ibu.

1. Defenisi Menyusui

Menyusui adalah proses pemberian susu kepada bayi atau anak kecil dengan air susu ibu dari payudara ibu. Bayi menggunakan refleks mengisap untuk mendapatkan dan menelan susu. (Suryani Manurung, Program laktasi)

Pengertian menyusui adalah Keterampilan yang dipelajari ibu dan bayi, dimana keduanya membutuhkan waktu dan kesabaran untuk pemenuhan nutrisi pada bayi. selama kurang lebih enam bulan, merupakan perlindungan terbaik yang dapat diberikan kepada bayi. (Suryani Manurung, Program laktasi)

2. Keuntungan Menyusui

a. Bagi Bayi

(1) Dapat membantu kehidupannya dengan baik. Bayi yang mendapatkan ASI mempunyai kenaikan berat badan yang baik setelah lahir, pertumbuhan setelah periode perinatal baik, dan mengurangi kemungkinan obesitas. (Eni dan Diah, 2009)

(2) Mengandung antibodi, mekanisme pembentukan antibodi pada bayi adalah sebagai berikut: apabila ibu mendapat infeksi maka tubuh ibu akan membentuk antibodi dan akan disalurkan dengan bantuan jaringan limposit. Antibodi di payudara disebut *mammae associated immunocompetent lymphoid tissue* (MALT). Kekebalan terhadap penyakit saluran nafas bagian atas yang ditransfer

disebut *bronchus associated immunocompetent tissue* (BALT) dan untuk penyakit saluran pencernaan ditransfer melalui *gut associated immunocompetent lymphoid tissue* (GALT). (Eni dan Diah, 2009)

Dalam tinja bayi yang mendapat ASI terdapat antibodi terhadap bakteri *E. Coli* dalam konsentrasi yang tinggi sehingga jumlah bakteri yang tinggi dalam tinja bayi tersebut juga rendah. Di dalam ASI kecuali antibodi terhadap enterotoksin *E.coli*, juga pernah dibuktikan adanya antibodi *salmonella typhi*, *shigela* dan antibodi terhadap virus, seperti rota virus, polio dan campak. (Eni dan Diah, 2009)

(3) ASI mengandung komposisi yang tepat. Yaitu dari berbagai bahan makanan yang baik untuk bayi yaitu terdiri dari proporsi yang seimbang dan cukup kuantitas semua zat gizi yang diperlukan untuk kehidupan 6 bulan pertama. (Eni dan Diah, 2009)

(4) Mengurangi kejadian karirs dentis. Insidens karirs dentis pada bayi yang mendapat susu formula jauh lebih tinggi dibanding yang mendapat ASI, karena kebiasaan menyusui dengan botol dan dot terutama pada waktu akan tidur menyebabkan gigi lebih lama kontak dengan susu formula dan menyebabkan asam yang terbentuk akan merusak gigi. (Eni dan Diah, 2009)

(5) Memberikan rasa nyaman dan aman pada bayi dan adanya ikatan antara ibu dan bayi. (Eni dan Diah, 2009)

(6) Terhindar dari alergi. Pada bayi baru lahir sistem IgE belum sempurna. Pemberian susu formula akan merangsang aktivasi sistem ini dan dapat menimbulkan alergi, ASI tidak menimbulkan efek ini, pemberian protein asing yang ditunda sampai umur 6 bulan akan mengurangi kemungkinan alergi. (Eni dan Diah, 2009)

(7) ASI meningkatkan kecerdasan bayi. Lemak pada ASI adalah lemak tak jenuh yang mengandung omega 3 untuk pematangan sel-sel otak sehingga jaringan otak bayi yang mendapat ASI eksklusif akan tumbuh optimal dan terbebas dari rangsangan kejang sehingga menjadikan anak lebih cerdas dan terhindar dari kerusakan sel-sel saraf otak. (Eni dan Diah, 2009)

(8) Membantu perkembangan rahang dan merangsang pertumbuhan gigi karena gerakan mengisap mulut bayi pada payudara. Telah dibuktikan bahwa salah satu penyebab mal oklusi rahang adalah kebiasaan lidah yang mendorong ke depan akibat menyusu dengan botol atau dot. (Eni dan Diah, 2009)

b. Bagi Ibu

(1) Aspek kontrasepsi

Hisapan mulut pada puting susu merangsang ujung saraf sensorik sehingga post anterior hipofise mengeluarkan prolaktin. Prolaktin masuk ke indung telur, menekan produksi estrogen akibatnya tidak ada ovulasi. Menjarangkan kehamilan, pemberian ASI memberikan 98 persen metode kontrasepsi yang efisien selama 6 bulan pertama sesudah kelahiran bila diberikan ASI saja (eksklusif) dan belum terjadi menstruasi kembali. (Eni dan Diah, 2009)

(2) Aspek kesehatan

Isapan bayi pada payudara akan merangsang terbentuknya oksitosin oleh kelenjar hipofisis. Oksitosin membantu terbentuknya involusi uterus dan mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan. Penundaan haid dan berkurangnya perdarahan pasca persalinan mengurangi prevalensi anemia defisiensi besi. Kejadian karsinoma mammae pada ibu yang menyusui lebih rendah dibanding yang tidak menyusui. Mencegah kanker hanya dapat diperoleh ibu yang menyusui anaknya secara eksklusif memiliki resiko terkena kanker payudara dan kanker ovarium 25 perse lebih kecil dibanding daripada yang tidak menyusui secara eksklusif. (Eni dan Diah, 2009)

(3) Aspek penurunan berat badan

Ibu yang menyusui eksklusif ternyata lebih mudah dan lebih cepat kembali ke berat badan semula seperti sebelum hamil. Pada saat hamil, badan bertambah berat, selain karena ada janin, juga karena penimbunan lemak pada tubuh, cadangan lemak ini sebetulnya memang disiapkan sebagai sumber tenaga dalam proses produksi ASI. (Eni dan Diah, 2009)

(4) Aspek psikologis

Keuntungan menyusui bukan hanya bermanfaat bagi bayi, tetapi juga untuk ibu. Ibu akan merasa bangga dan diperlukan, rasa yang dibutuhkan oleh semua manusia. (Eni dan Diah, 2009)

3. Komposisi Air Susu Ibu

ASI adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktose dan garam organik yang disekresi oleh kedua belah kelenjar payudara ibu, sebagai makanan utama bagi bayi. Komposisi ASI tidak sama dari waktu ke waktu, hal ini berdasarkan stadium laktasi. (Eni dan Diah, 2009)

Perubahan kolostrum menjadi air susu yang matur berlangsung bertahap selama 14 hari pertama kehidupan bayi. Kadang-kadang fase peralihan ini bahkan memerlukan waktu yang lebih lama, dan sangat bergantung pada apakah jaringan glandula mammae telah diaktifkan sebelumnya atau baru pertama kali. Keadaan tersebut juga bergantung pada seberapa cepat dan seberapa efektif bayi belajar mengisap. Bahkan air susu yang telah mengalami maturasi juga terdapat variasi yang besar dalam komposisi dan nilai kalori air susu ibu, yaitu bergantung pada masing-masing individu, waktu dalam hari, dan bahkan selama satu kali menyusukan bayi. Misalnya kandungan lemak lebih besar pada tengah hari, dan pada air susu kedua, sedangkan air susu pertama selalu lebih banyak mengandung air dan protein. Air susu ibu yang kemudian merupakan cairan yang alkalis (basa), berwarna putih kebiruan. Komposisi ASI dibedakan menjadi 3 macam :

a. Kolostrum

ASI yang dihasilkan pada hari pertama sampai hari ketiga setelah bayi lahir. Kolostrum merupakan cairan yang agak kental berwarna kekuning-kuningan, lebih kuning dibanding dengan ASI matur, bentuknya agak kasar karena mengandung butiran lemak dan sel-sel epitel, dengan kasiat kolostrum sebagai berikut:

(1) Sebagai pembersih selaput usus BBL sehingga saluran pencernaan siap untuk menerima makanan.

- (2) Mengandung kadar protein yang tinggi terutama gama globulin sehingga dapat memberikan perlindungan tubuh terhadap infeksi
- (3) Mengandung zat antibodi sehingga mampu melindungi tubuh bayi dari berbagai penyakit infeksi untuk jangka waktu s/d 6 bulan.

b. ASI masa transisi

ASI yang dihasilkan mulai hari keempat sampai hari kesepuluh.

c. ASI matur

ASI yang dihasilkan mulai hari kesepuluh sampai seterusnya.

Untuk lebih jelas perbedaan kadar gizi yang dihasilkan kolostrum, ASI transisi, dan ASI matur dapat dilihat pada penjelasan berikut ini. Rata-rata sampel air susu ibu yang dikumpulkan selama 24 jam mengandung, protein 1,5 persen, lemak 3,5 persen, karbohidrat 7,0 persen, nilai kalori sama dengan 80 kilo joule per 30 ml, garam mineral 0,2 persen, air 87,7 persen, dan vitamin.

Protein, jauh lebih mudah dicerna bayi jika dibandingkan dengan protei air susu sapi. Protein dari susu (curd) disebut kasein, kadar protein yaitu laktalbumin dan laktoglobulin lebih besar pada air susu ibu disamping air susu sapi.

Lemak, Air susu ibu mengandung lemak tidak jenuh dan lemak jenuh yang sama kadarnya, yang dapat diabsorpsi oleh bayi secara lebih mudah daripada butir-butir lemak yang terdapat pada susu sapi. Kadar kolesterol lebih tinggi dibanding air susu sapi. Diduga bahwa karena bayi telah belajar mengelola kolesterol pada tahap awal ini, maka terdapat insiden penyakit jantung yang lebih rendah pada masa dewasanya.

Karbohidrat, mengandung faktor bifidus dan faktor ini tidak terdapat didalam air susu sapi.

Garam mineral (*natrium, fosfor, dan magnesium*) dalam kadar yang ideal untuk bayi manusia. Kadarnya

dalam air susu ibu lebih cocok untuk bayi dibanding kadarnya yang lebih tinggi pada air susu sapi.

Zat besi, kadar zat besi yang rendah tidak mengurangi sifat anti in-fektif laktoferin.

Vitamin, kadar vitamin A, B, C, D, dan E lebih tinggi dibanding kadarnya dalam air susu sapi, tetapi terdapat lebih sedikit vitamin K dalam air susu ibu. Dengan demikian para ahli penyakit anak akan memberikan suntikan vitamin K kepada semua bayi yang baru lahir, tetapi cara demikian bukan merupakan prosedur yang diterima secara umum.

Faktor pelindung, terdapat didalam air susu ibu maupun didalam kolostrum, Immunoglobulin protektif, Laktoferin, Lisosom, Faktor antitripsin, Faktor bifidus.

4. Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu

a. Kesadaran terhadap sikap

Beberapa wanita remaja dan dewasa didalam masyarakat modern memandang payudara lebih merupakan simbol seks daripada sebagai organ fungsional. Payudara dinilai sebagai alat untuk menarik pasangan pria, tetapi fungsi payudara yang dimaksudkan untuk memberikan nutrient kepada bayi jarang dimasukkan kedalam pikiran mereka. Hal ini bukan merupakan cara kita untuk memberikan bimbingan dan pelajaran kepada mereka.

Walaupun demikian, beberapa wanita lain yang mengetahui fungsi payudara merasa takut, jika pemberian air susu ibu telah mantap dan berlangsung beberapa bulan, bentuk dan kesintalan payudara mereka juga akan terpengaruh sedemikian rupa sehingga daya tarik seksual mereka akan hilang.

Dalam hal yang sama, ada beberapa suami yang menyatakan bahwa tidak ingin istri mereka memberi air susuya kepada bayi mereka, kekaguman pada bentuk payudara istri dan kemungkinan rasa cemburu kepada bayinya mengenai payudara ini merupakan dua alasan yang sering dikemukakan.

Beberapa wanita karier mempunyai kecemasan lain, yaitu bahwa memberikan air susu ibu kepada bayi selama 4 sampai 6 bulan akan mempengaruhi kegiatan profesi dan kemasyarakatan mereka dan

mungkin akan merusak prospek peningkatan karier mereka, ini semua merupakan masalah besar yang telah berkembang pada kebudayaan barat dan masalah ini sangat nyata bagi para wanita yang menghadapinya.

Dalam dunia yang ideal persiapan pemberian air susu ibu yang berhasil tidak dimulai hanya dengan keberhasilan setiap bayi minum air susu ibu. tetapi harus diteruskan sampai anak yang lain melihat ibu mereka memberikan air susu kepada adik-adik mereka yang lebih kecil, dan dengan bahagia menyapah mereka. Mereka tidak hanya perlu belajar bahwa air susu ibu adalah normal. Harus dimulai sama semua anak yang diasuh oleh orang tua mereka dengan kasih sayang, dalam lingkungan rumah yang aman dan penuh perhatian dengan perkembangan hubungan masa bayi, masa kanak-kanak dan masa dewasa. Seorang wanita yang secara pribadi pernah mengalami diasuh orang tua seperti diatas, dan yang juga sepenuhnya menerima identitas seksual mereka, jauh lebih kuat keinginannya untuk memberikan air susu ibu kepada mereka dan juga untuk meneruskannya.

b. Pendidikan

Banyak ahli pendidikan setempat sekarang mempunyai program pendidikan yang lebih jelas meliputi modal 'pendidikan untuk hidup, sebagai subjek (mata pelajaran) akademik tambahan. Kapan pun dan dimana mungkin, bidan harus dengan yakin menerima kesempatan untuk ikut berperan dalam kelas-kelas "pendidikan kesehatan", kursus perawatan anak dan persiapan menjadi orang tua yang sekarang dilaksanakan dibanyak sekolah dan pendidikan lanjut. Dapat terjadi pertukaran pikiran dan gagasan yang bermanfaat dengan orang-orang muda yang merupakan generasi berikutnya setelah orang tua mereka. Selain dari itu semua, mendengarkan mereka, bersikap peka terhadap sesuatu yang tidak ingin mereka katakana, mendorong mereka untuk menyatakan gagasan dan tanggapan mereka, membantu mereka untuk mengungkapkan hambatan dan emosi mereka. Apabila mungkin, izinkan mereka bertemu dengan seorang ibu yang baru melahirkan bersama bayinya, dan membicarakan sikap ibu tersebut terhadap bayinya terutama dalam hubungannya dengan pemberian air susu ibu. Sikap orang

mudah dapat sangat dipengaruhi oleh kunjungan ke bangsal postnatal yang dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, dimana mereka dapat berbicara dengan bebas dengan para ibu yang memberikan air susu ibu dengan berhasil. Kunjungan mereka juga akan membantu untuk menghilangkan salah pengertian yang populer, yaitu bahwa payudara secara ajaib terisi air susu yang berlimpah yang bebas dan masuk kemulut bayi dengan mudah apabila membuka mulutnya.

c. Faktor emosi

Untuk memperoleh air susu ibu merupakan hak lahir bayi pemberian air susu ibu memberikan rasa aman pada bayi dan merupakan landasan yang baik bagi perkembangan semua hubungan pribadi. Bagi ibu, memberikan air susu ibu tentunya membawa perasaan keberhasilan akhir yang merupakan puncak kehamilan..

Dari keberhasilan ibu tersebut muncul kesadaran diri yang penuh pada bayi dengan kegembiraan, dan perkembangan status sebagai pribadi yang dicintai dan dipuaskan. Hal ini merupakan cara normal untuk kemandirian, keamanan diri, dan motivasi diri. Hal ini merupakan dasar hubungan yang matang (dewasa) dalam hidupnya nanti.

5. Keuntungan Pemberian Air Susu Ibu (Eni dan Diah, 2009)

a. Resiko kontaminasi lebih kecil

Air susu ibu yang diisap langsung oleh bayi dari payudara lebih kecil kemungkinannya terkontaminasi kuman pathogen, dan dengan demikian insidensi infeksi neonatal akan berkurang.

Dalam abad dimana bahaya terkontaminasi debu radioaktif sangat banyak dibicarakan, maka perlu dicatat bahwa air susu mengandung strontium-90 yang jauh lebih rendah dibanding air susu sapi.

b. Perlindungan

Faktor-faktor perlindungan ada didalam kolosrtum dan air susu ibu, seperti yang telah disebutkan, ialah imunoglobulin, laktoferin, lisosom, faktor bifidus, dan faktor antitripsin. Terutama insiden

gastroenteritis pada bayi-bayi yang diberi air susu ibu sangat berkurang. Fungsi perlindungan imunoglobulin dalam hubungannya dalam alergi juga telah disebutkan. Apabila terdapat riwayat penyakit keluarga seperti asma dan akzema, maka sangat perlu ibu mempertimbangkan pemberian air susu ibu.

c. Komposisi

Air susu manusia memberikan unsur-unsur makanan dengan keseimbangan yang tepat bagi pertumbuhan manusia. Di lain pihak, air susu sapi harus dengan berbagai cara sebelum dapat diterima oleh bayi manusia yang kecepatan pertumbuhan yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan anak sapi.

6. Untuk mengetahui banyaknya ASI, beberapa kriteria yang dapat dipakai sebagai patokan untuk mengetahui jumlah ASI cukup atau tidak adalah: (Eni dan Diah, 2009).

- a. ASI yang banyak dapat merembes melalui puting
- b. Sebelum disusukan payudara terasa tegang
- c. Berat badan naik dengan memuaskan sesuai dengan usia

Umur Kenaikan berat badan rata-rata

1-3 bulan	700 gr/bulan
4-6 bulan	600 gr/bulan
7-9 bulan	400 gr/bulan
10-12 bulan	300 gr/bulan

Pada umur dua bulan tercapai 2x berat badan waktu lahir, pada umur satu tahun tercapai 3x berat badan waktu lahir, pada umur lebih dari 1-3 tahun pertambahan rata-rata tiap tahun 2-3 kg.

d. Rata-rata volume ASI berdasarkan kelompok umur

Umur	Vol ASI
0-1 bulan	605 ml/hari
>1-3 bulan	824 ml/hari
>3-6 bulan	917 ml/hari
>6-9 bulan	834 ml/hari
>9-12 bulan	729 ml/hari
>12-18 bulan	500 ml/hari
>18-24 bulan	200 ml/hari

- e. Jika ASI cukup, setelah menyusui bayi akan tertidur/tenang selama 3-4 jam
- f. Bayi kencing lebih sering, sekitar 8 kali sehari
- g. Bayi paling sedikit menyusu 10 kali dalam 24 jam
- h. Bayi sering BAB berwarna kekuningan berbiji
- i. Normalnya ibu menyusui untuk dua payudara selama 30 menit
- j. Payudara terasa kosong pada saat selesai menyusui

Ibu yang normal dapat menghasilkan produksi ASI kira-kira 550-1000 ml setiap hari. (Eni dan Diah, 2009)

7. Produksi ASI ibu dipengaruhi oleh:

Makanan Ibu, Produksi ASI sangat dipengaruhi oleh makanan yang dimakan ibu, apabila makanan itu secara teratur dan mengandung cukup gizi yang diperlukan akan mempengaruhi produksi ASI, karena kelenjar produksi ASI tidak dapat bekerja dengan sempurna tanpa makanan yang cukup untuk membantu produksi ASI. Makanan ibu harus memenuhi kalori, lemak, protein, dan vitamin serta

mineral yang cukup. Selain itu ibu dianjurkan minum lebih banyak kira-kira 8-12 gelas sehari. Bahan makanan yang dibatasi untuk ibu menyusui adalah:

- a. Yang merangsang: merica, jahe, kopi, alkohol dan cabe
- b. Yang membuat kembung: ubi, singkong, kol, sawi dan bawang
- c. Bahan makanan yang banyak mengandung gula dan lemak

Ketenangan Jiwa dan Pikiran Ibu, Produksi ASI sangat dipengaruhi oleh kejiwaan, perasaan ibu dapat menghambat atau meningkatkan pengeluaran oksitosin seperti takut, gelisah, marah, sedih, cemas, kesal, malu, dan nyeri hebat akan mempengaruhi refleks oksitosin yang pada akhirnya akan menekan produksi ASI sebaliknya, perasaan ibu yang bahagia, senang, perasaan menyayangi bayi, mencium, dan mendengar bayinya menangis atau perasaan bangga dapat menyusui anaknya akan meningkatkan produksi ASI. Ibu yang sedang menyusui jangan terlalu banyak dibebani oleh urusan rumah tangga, urusan kantor dan lainnya. Karena hal itu dapat mempengaruhi produksi ASI.

Perawatan Payudara Ibu, Perawatan payudara sebaiknya dimulai pada masa kehamilan dan pada saat menyusui, untuk ibu yang mempunyai masalah puting susu misalnya puting susu masuk ke dalam atau datar, perawatannya dilakukan pada kehamilan tiga bulan sedangkan apabila tidak ada masalah puting dilakukan mulai kehamilan enam bulan sampai menyusui. Adanya luka atau iritasi pada puting susu akan menyebabkan ibu merasa nyeri pada waktu menyusui yang menyebabkan ibu takut menyusui bayinya sehingga mempengaruhi refleks oksitosin. Tujuan perawatan payudara selama menyusui adalah:

- a. Menjaga kebersihan payudara
- b. Memperbanyak dan memperlancar produksi ASI

Pemakaian Obat-obatan, Pemakaian obat-obatan dapat menghambat produksi ASI Klorotranizom (TACE), Deladumone OB (kombinasi estrogen ditambah androgen dalam bentuk estradiol valerat dan

testosteron enantat), atau Bromokriptin mesilat (Parlodel). Dua obat pertama adalah substansi estrogen yang menekan laktasi melalui efek penghambat lokal pada sel-sel alveolar payudara, obat ketiga, suatu agonis reseptor dopamin adalah bukan hormon dan bekerja pada tingkat sistemik pada kelenjar pituitari anterior dan menghambat sekresi prolaktin.



BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti

Berdasarkan ulasan yang telah dikemukakan pada tinjauan pustaka yang merupakan landasan konsep secara teori dari penelitian ini, maka telah diidentifikasi beberapa variabel yang terlibat dalam model asumsi yang berdasarkan pada beberapa pandangan teoritis.

Berdasarkan teori ada 3 jenis persalinan yaitu:

1. Persalinan spontan

Bila persalinan seluruhnya berlansung dengan kekuatan ibu sendiri

2. Persalinan buatan

Bila proses persalinan dengan bantuan tenaga dari luar

3. Persalinan anjuran

Bila kekuatan yang diperlukan untuk persalinan ditimbulkan dari luar dengan jalan rangsangan


Dalam hal ini peneliti ingin membandingkan apa ada perbedaan produksi ASI pada jenis persalinan spontan dan jenis persalinan seksio sesaria, kalau memang ada maka jenis persalinan mana yang menghasilkan produksi ASI paling banyak, mengingat betapa pentingnya produksi ASI bagi bayi misalnya saja menjadi sumber makanan dan sebagai sumber imunitas tubuhnya sesuai yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka.

Variabel Yang Diteliti

Berdasarkan kerangka konsep seperti ditemukan diatas, disusunlah pola pikir sebagai berikut:

Independent

Dependent



B. Hipotesis Penelitian

1. Ada perbandingan produksi ASI pada persalinan spontan dan seksio sesaria.
2. Tidak ada perbandingan produksi ASI pada persalinan spontan dan seksio sesaria.

C. Definisi Operasional

1. Persalinan Spontan

Persalinan spontan pada penelitian ini adalah ibu hamil yang persalinannya berlangsung dengan kekuatan ibu sendiri.

2. Persalinan Buatan

Persalinan buatan pada penelitian ini adalah ibu hamil yang melakukan persalinan dengan bedah sesar.


3. Produksi ASI

Produksi ASI pada penelitian ini adalah air susu ibu yang dihasilkan dari payudara ibu.

Kriteria Obyektif

Cukup : Jika responden menjawab $\geq 75\%$ yang memenuhi kriteria yang mengatakan ASI cukup

Kurang: Jika responden menjawab $< 75\%$ yang memenuhi kriteria yang mengatakan ASI cukup



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan metode *cross-sectional study*, yaitu melakukan pengumpulan data sekaligus pada suatu saat (*point time approach*). Dimana peneliti mengumpulkan informasi dari ibu-ibu menyusui tentang produksi ASI, dimana produksi ASI menjadi variabel dependen dan jenis persalinan normal dan persalinan seksio sesaria menjadi variabel independen. (Nursalam, 2009).

B. Populasi Dan Sampel

1. Populasi: Semua ibu menyusui RSIA Pertiwi kota Makassar
2. Sampel: Semua ibu menyusui di RSIA Pertiwi dengan besar sampel sebagai berikut:

Adapun besar sampel ditetapkan dengan menggunakan rumus (Saryono, 2008)

$$n = \frac{N}{1+N(d)^2}$$

Keterangan:

n = perkiraan besar sampel

N= perkiraan besar populasi

d = jumlah signifikan (0,05)

Berdasarkan rumus di atas maka dapat ditentukan besar sampel sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{1.773}{1 + 1.773 (0,05)^2} \\ &= \frac{1.773}{1 + 1.773(0,0025)} \\ &= \frac{1.773}{4,4} \\ &= 402 (25\%) \\ n &= 100 \text{ responden} \end{aligned}$$

Jadi sampel yang digunakan sebesar 100 responden, dengan 50 responden yang persalinan spontan dan 50 persalinan seksio sesaria

3. Teknik pengambilan sampel:

Cara penarikan sampel dilakukan dengan cara non-probability dengan menggunakan metode “*purposive sampling*”. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Dilakukan pendataan pada ibu menyusui yang berada di RSIA Pertiwi Makassar
- b. Ditanya berapa banyak produksi ASI dalam sehari

4. Kriteria Inklusi

- a. Ibu menyusui persalinan spontan
- b. Ibu menyusui persalinan seksio sesaria
- c. Ibu menyusui yang bersedia menjadi responden

5. Kriteria Eksklusi

- a. Ibu yang tidak menyusui

- b. Ibu menyusui yang bayinya dirawat dalam inkubator
- c. Ibu menyusui yang mempunyai masalah dengan puting susunya
- d. Ibu menyusui yang minum obat pelancar ASI
- e. Ibu menyusui yang bayinya memakai popok
- f. Ibu menyusui yang bayinya bermasalah
- g. Ibu menyusui yang tidak bersedia menjadi responden

C. Instrumen Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada ibu menyusui, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana proses persalinan yang dialaminya dan berapa banyak produksi ASI sehari.

D. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan di RSIA Pertiwi Makassar, waktu penelitian dilaksanakan 1 Juni – 1 Juli 2010

E. Prosedur Dan Pengambilan Data

Data primer: diperoleh melalui kuesioner langsung kepada responden yaitu ibu yang menyusui.

Data sekunder: diperoleh dari instansi rumah sakit terkait

F. Analisa Data

Setelah dilakukan tabulasi data, kemudian diolah dengan menggunakan metode uji Mann-Whitney Test.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Penelitian dengan judul “Perbandingan produksi ASI Pada Ibu Menyusui Persalinan Spontan Dengan Persalinan Seksio sesaria Di RSIA Pertiwi Makassar” ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni - 1 Juli 2010. Penelitian ini menggunakan desain *cross-sectional study* dengan jumlah responden sebanyak 100 orang yang masing-masing terdiri atas 50 responden dengan persalinan spontan dan 50 responden untuk persalinan seksio sesaria.

A. Karakteristik Responden

a. Distribusi Responden Berdasarkan Umur

Data penelitian diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada masing-masing 50 responden ibu menyusui persalinan spontan dan 50 responden ibu persalinan seksio sesaria. Berdasarkan hasil kuesioner, dapat diketahui umur ibu persalinan spontan frekuensi terbanyak adalah yang berusia 28-31 tahun yakni 34 persen, dan yang terkecil frekuensinya adalah yang berusia 40-43 tahun yakni 2 persen. Sedangkan pada persalinan seksio sesaria frekuensi terbanyak adalah yang berusia 28-31 tahun yakni 52 persen, dan yang terkecil frekuensinya adalah yang berusia 36-39 tahun yakni 16 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1

**Distribusi Responden Persalinan Spontan Berdasarkan Umur Ibu
Di RSIA Pertiwi Makassar**

No	Umur Ibu	Jumlah	Persentase
1	20-23	7	14
2	24-27	12	24
3	28-31	17	34
4	32-35	5	10
5	36-39	8	16
6	40-43	1	2
	Jumlah	50	100

Sumber: Data Primer, 2010

Tabel 5.2

**Distribusi Responden Persalinan Seksio Sesaria Berdasarkan Umur Ibu
Di RSIA Pertiwi Makassar**

No	Umur Ibu	Jumlah	Persentase
1	24-27	5	10
2	28-31	26	52
3	32-35	11	22
4	36-39	8	16
	Jumlah	50	100

Sumber: Data Primer, 2010

b. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

Untuk persalinan spontan frekuensi terbanyak adalah S1 yakni 62 persen, dan yang terkecil frekuensinya adalah D3 yakni 2 persen. Sedangkan pada persalinan seksio sesaria frekuensi terbanyak adalah S1 yakni 58 persen, dan yang terkecil frekuensinya adalah S3 yakni 2 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3

**Distribusi Responden Persalinan Spontan Berdasarkan Pendidikan Ibu
Di RSIA Pertiwi Makassar**

Pendidikan Ibu	Jumlah	Persentase
SMP	2	4
SMA	14	28
D2	2	4
D3	1	2
S1	31	62
Jumlah	50	100

Sumber: Data Primer, 2010

Tabel 5.4

**Distribusi Responden Persalinan Seksio Sesaria Berdasarkan Pendidikan
Di RSIA Pertiwi Makassar**

Pendidikan Ibu	Jumlah	Persentase
SMA	20	40
S1	29	58
S3	1	2
Jumlah	50	100

Sumber: Data Primer, 2010

B. Analisis perbandingan produksi ASI antara persalinan spontan dengan persalinan seksio sesaria

Berdasarkan hasil tabulasi silang antara persalinan spontan dengan persalinan seksio sesaria diperoleh data pada kelompok persalinan spontan 43 responden yang memiliki produksi ASI cukup (43 persen) dan kategori kurang 7 responden (7 persen). Sedangkan pada kelompok persalinan seksio sesaria diperoleh data 41 responden yang memiliki produksi ASI cukup (41 persen) dan kategori kurang 9 responden (9 persen). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5

Analisis Crosstabulation Perbandingan Produksi ASI pada Persalinan Spontan dengan Persalinan seksio sesaria

			ASIKat		
			Cukup	Kurang	Total
Persalinan	Spontan	Count	43	7	50
		% of Total	43.0%	7.0%	50.0%
	SC	Count	41	9	50
		% of Total	41.0%	9.0%	50.0%
Total		Count	84	16	100
		% of Total	84.0%	16.0%	100.0%

B. PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dengan menggunakan kuesioner, penelitian ini dilakukan untuk melihat perbandingan produksi ASI pada ibu menyusui persalinan spontan dengan persalinan seksio sesaria di RSIA Pertiwi Makassar. Setelah itu dilakukan pengolahan data dan analisis data maka akan didapatkan hasil sebagai berikut:

Umur responden pada persalinan spontan saat penelitian frekuensi terbanyak adalah 28-31 tahun (34 persen) dengan kriteria ASI rata-rata cukup sedangkan yang terkecil adalah 40-43 tahun (2 persen) dengan kriteria ASI juga cukup, Sedangkan pada persalinan seksio sesaria frekuensi terbanyak adalah 28-31 tahun (52 persen) dengan kriteria ASI rata-rata cukup sedangkan yang terkecil adalah 36-39 tahun (16 persen) dengan rata-rata produksi ASI juga cukup.

Pendidikan responden pada persalinan spontan saat penelitian yang terbanyak adalah S1 (62 persen) dengan kriteria ASI rata-rata cukup, sedangkan yang terkecil adalah D3 (2 persen) dengan kriteria ASI cukup. Sedangkan untuk responden pada persalinan seksio sesaria frekuensi terbanyak adalah S1 (58 persen) dengan kriteria ASI rata-rata cukup dan untuk yang terkecil adalah S3 (2 persen).

Untuk mengetahui perbandingan produksi ASI antara persalinan spontan dengan seksio sesaria dilakukan analisa statistik uji Mann-Whitney Test dengan hasil nilai rata-rata pada persalinan spontan 51,5 nilai rata-rata tersebut besar jika dibandingkan dengan nilai rata-rata pada persalinan seksio sesaria yaitu 49,5, dari nilai rata-rata yang dimiliki oleh kedua kelompok tersebut terdapat selisih namun dari nilai signifikansi yang ditampilkan dari hasil analisis SPSS diperoleh nilai $p = 0,58$, nilai ini lebih besar dari nilai α (alfa) yang ditetapkan yaitu 0,05. Ini berarti meskipun terdapat selisih nilai rata-rata antara kedua kelompok tersebut namun, tidak signifikan untuk menunjukkan adanya perbedaan pada kedua jenis persalinan tersebut.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tidak signifikan untuk dikatakan terdapat perbedaan jumlah produksi ASI pada kedua jenis persalinan, dilihat dari nilai rata-rata pada persalinan spontan 51,5 dan pada persalinan seksio sesaria 49,5 yang tidak berbeda jauh dan dapat dilihat dari nilai $p = 0,58 > \alpha = 0,05$.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa bukanlah jenis persalinan yang mempengaruhi produksi ASI. Beberapa hasil penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa proses melahirkan dengan sesar akan menghambat proses terbentuknya produksi ASI. Meskipun demikian, menyusui sesering mungkin setelah proses kelahiran dengan seksio sesaria meminimalisasi masalah-masalah tersebut, bahkan beberapa ibu yang melahirkan dengan seksio sesaria memiliki produksi ASI yang berlimpah.

Hal ini sesuai dengan tinjauan pustaka yang disebutkan bahwa hal-hal yang mempengaruhi produksi ASI adalah makanan ibu, dimana, apabila makanan itu secara teratur dan mengandung cukup gizi yang diperlukan akan mempengaruhi produksi ASI. Ketenangan jiwa dan pikiran ibu, dimana, produksi ASI sangat dipengaruhi oleh kejiwaan, perasaan ibu dapat menghambat atau meningkatkan pengeluaran oksitosin seperti takut, gelisah, marah, dll dapat menekan produksi ASI. Sebaliknya, perasaan ibu yang bahagia, senang, perasaan menyayangi bayi, dll akan meningkatkan produksi ASI. Perawatan payudara ibu, perawatan payudara sebaiknya dimulai pada masa kehamilan dan pada saat menyusui, untuk ibu


yang mempunyai masalah puting misalnya puting susu masuk kedalam atau datar, perawatannya dilakukan pada kehamilan tiga bulan sedangkan apabila tidak ada masalah puting dilakukan mulai kehamilan enam bulan sampai menyusui. Dan pemakaian obat-obatan juga mempengaruhi produksi ASI misalnya saja obat yang menekan laktasi melalui efek penghambat lokal pada sel-sel alveolar payudara (Klorotranizom dan Deladumone OB), ada juga obat yang merupakan agonis reseptor dopamine adalah bukan hormon dan bekerja pada tingkat sistemik pada kelenjar pituitari anterior dan menghambat sekresi prolaktin (Bromokriptin mesilat/parlodel). (Eni dan Diah, 2009)

Dalam sumber lain juga menambahkan hal-hal yang mempengaruhi produksi ASI adalah penggunaan alat kontrasepsi, penggunaan alat kontrasepsi pada ibu menyusui, perlu diperhatikan agar tidak mengurangi produksi ASI. Contoh alat kontrasepsi yang dapat digunakan kondom, IUD, pil khusus menyusui ataupun suntik hormonal 3 bulanan. Perawatan payudara, perawatan payudara bermanfaat merangsang payudara mempengaruhi hipofise untuk mengeluarkan hormon prolaktin dan oksitosin. Anatomis payudara, Jumlah lobus dalam payudara juga mempengaruhi produksi ASI. Selain itu, perlu diperhatikan juga bentuk anatomis papilla atau puting susu ibu. Konsumsi rokok dan alkohol, merokok dapat mengurangi produksi ASI karena akan mengganggu hormon prolaktin dan oksitosin untuk produksi ASI. Merokok akan menstimulasi pelepasan adrenalin dimana adrenalin akan menghambat pelepasan oksitosin. Faktor fisiologis, ASI terbentuk oleh karena pengaruh dari hormon prolaktin yang menentukan produksi dan mempertahankan sekresi air susu. Pola istirahat, faktor istirahat mempengaruhi produksi dan pengeluaran ASI. Apabila kondisi ibu terlalu capek, kurang istirahat maka ASI juga berkurang. Faktor isapan anak atau frekuensi penyusuan, semakin sering bayi menyusu pada payudara ibu, maka produksi dan pengeluaran ASI akan semakin banyak. Akan tetapi, frekuensi penyusuan pada bayi prematur dan cukup bulan berbeda. Studi mengatakan bahwa pada produksi ASI bayi prematur akan optimal dengan pemompaan ASI lebih dari 5 kali perhari selama bulan pertama setelah melahirkan. Pemompaan dilakukan karena bayi prematur belum dapat menyusu. Sedangkan

pada bayi cukup bulan frekuensi penyusuan 10 kali perhari selama 2 minggu pertama setelah melahirkan berhubungan dengan produksi ASI yang cukup. Sehingga direkomendasikan frekuensi penyusuan paling sedikit 8 kali perhari pada periode awal setelah melahirkan. Frekuensi penyusuan ini berkaitan dengan kemampuan stimulasi hormone dalam kelenjar payudara. Berat lahir bayi, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) mempunyai kemampuan menghisap yang lebih rendah dibanding bayi yang berat lahir normal (>2500 gr). Kemampuan menghisap yang lebih rendah ini meliputi frekuensi dan lama penyusuan yang lebih rendah dibanding bayi berat lahir normal yang akan mempengaruhi stimulasi hormon prolaktin dan oksitosin dalam memproduksi ASI.

Selain itu, umur kehamilan saat melahirkan, umur kehamilan dan berat lahir mempengaruhi produksi ASI. Hal ini disebabkan bayi yang lahir prematur (umur kehamilan kurang dari 34 minggu) sangat lemah dan tidak mampu untuk menghisap secara efektif sehingga produksi ASI lebih rendah daripada bayi yang lahir cukup bulan. Lemahnya kemampuan menghisap pada bayi prematur dapat disebabkan berat badan yang rendah dan belum sepenuhnya fungsi organ.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al- Hajj Ayat 5 :




Terjemahan :

Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), Maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. dan kamu Lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.

Manusia diciptakan dengan sebuah proses yang panjang dari setetes mani, segumpal darah, segumpal daging yang kemudian disempurnakan kejadiannya sampai ditetapkan ke dalam rahim yang kokoh dan ditentukan waktunya untuk dikeluarkan sebagai seorang bayi, demikianlah umur kehamilan manusia yang telah ditetapkan lamanya umur kehamilan ini tergantung proses yang didalam penciptaan manusia di dalam rahim dan ini yang mempengaruhi bagaimana bentuk, berat, dan jenis kelamin seorang bayi, hal ini juga seiring dengan perbandingan yang sesuai dengan umur kehamilan dan berat lahir bayi yang mempengaruhi produksi ASI.

Sebagaimana juga dijelaskan dalam Q.S Al-Fushilat ayat 47 :



Terjemahan :

Kepada-Nyalah dikembalikan pengetahuan tentang hari Kiamat.dan tidak ada buah-buahan keluar dari kelopaknya dan tidak seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya.

Demikian penjelasan Al-Qur'an bagaimana Allah menentukan manusia mengandung dan melahirkan dengan izin dan sepengetahuannya, bagaimana seorang bayi lahir dengan segala ketetapan pada dirinya

beserta kemampuan alamiah yang telah ditetapkan sang pencipta, seorang bayi lahir dalam berbagai bentuk dan cara, seorang bayi dapat lahir dengan normal dan berat badan yang sempurna atau normal, disertai kemampuan alamiah untuk menyusui, dan adapula bayi yang lahir dalam keadaan tidak normal dan itulah ketetapan dari sang pencipta.



BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian dengan judul “Perbandingan produksi ASI Pada Ibu Menyusui Persalinan Spontan Dengan Persalinan Seksio sesaria Di RSIA Pertiwi Makassar” ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni - 1 Juli 2010. Penelitian ini menggunakan desain *cross-sectional study* dengan jumlah responden sebanyak 100 orang yang masing-masing terdiri atas 50 responden dengan persalinan spontan dan 50 responden untuk persalinan seksio sesaria, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa rata-rata produksi ASI pada kelompok persalinan spontan berada dalam kategori cukup dengan nilai rata-rata 51,5, sedangkan pada persalinan seksio sesaria rata-rata produksi ASI memiliki nilai rata-rata 49,5 yang juga berada pada kategori cukup

Dari hasil analisis uji Mann-Whitney Test diperoleh informasi bahwa rata-rata produksi ASI pada persalinan spontan lebih tinggi dibanding pada persalinan seksio sesaria. Namun, perbedaan nilai rata-rata tersebut belum cukup signifikan untuk menyatakan bahwa kedua jenis persalinan tersebut berbeda, hal ini dapat juga dilihat pada nilai $p = 0,58 > \alpha = 0.05$.

Adapun hal-hal yang mempengaruhi produksi ASI adalah makanan, ketenangan jiwa dan pikiran, penggunaan alat kontrasepsi, perawatan payudara, anatomis payudara, faktor fisiologi, pola istirahat, faktor isapan anak atau frekuensi penyusuan, faktor obat-obatan, berat lahir bayi, umur kehamilan saat melahirkan dan konsumsi rokok dan alkohol.

B. SARAN

1. Dianjurkan kepada ibu-ibu yang menyusui untuk memperhatikan hal-hal apa saja yang mempengaruhi produksi ASI
2. Dianjurkan kepada petugas kesehatan untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu yang menyusui tentang hal-hal apa saja yang mempengaruhi produksi ASI

3. Peneliti harapkan supaya ada peneliti berikutnya yang melanjutkan penelitian ini dengan variabel yang berbeda dan lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahannya*. Medinah Munawwarah : Mujamma' Khadim al-Haramainasy Syarifain al Malik Fahd li thiba'at al Mush-haf asy Syarif
- Bandiyah, Siti. *Kehamilan, Persalinan dan Gangguan Persalinan*. Yogyakarta: Media Book.2009
- BPS, 2008
- Brooker, Christine. *Kamus Saku Keperawatan*. Jakarta:Penerbit Buku Kedokteran. EGC.2001.
- Denny, Janet, Ann. *Panduan Lengkap Kehamilan, Melahirkan, dan Bayi*. Jakarta: Arcan.2007.
- Handoko. *Sembilan Bulan Yang Menakjubkan, Seri Ayah Bunda*. Jakarta: Penerbit Gaya Favorit. 2000
- Manuaba, Bagus. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.1998
- Mansjoer, Arief. *Kapita Selekta*. Ed. 3. Jakarta: Media Aesculapius. 2000
- Martius. *Bedah Kebidanan Martius*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, EGC.2002
- Nursalam. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pedoman Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika. 2009
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Bedah Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka.2007
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Islam*. Jakarta: Kampus Syariah. 2008
- Saryono. *Metidologi Penelitian Kesehatan Penuntun Praktis Bagi Pemula*. Jakarta: Mitra Candika.2008
- Sutanto, P. *Statistik Kesehatan*. Jakarta: Terbitan Raja Grafindo.2008
- Verralls, Silvia. *Anatomi dan Fisiologi Terapan Dalam Kebidanan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.2002
- Wasis. *Pedoman Riser Praktis Untuk profesi Keperawatan*. Jakarta: EGC.2008
- Wulandari, diah. Ambarwati, Eni. *Asuhan Kebidanan Nifas*. Yogyakarta: Penerbit Buku Kesehatan.2009
- Manurung, Suryani. *Menyusui*. [http://www. Programlaktasi. Com](http://www.Programlaktasi.Com). (Senin, 1 maret 2010)
- Anonim. *Angka Persalinan*. <http://www.Wikipedia Ensiklopedia Bahasa Indonesia.com>. (Senin, 1 Maret 2010)
- Irma, *Kunjungan Masa Nifas*. [http://www.4 kali kunjungan masa nifas. com](http://www.4kali.kunjungan.masa.nifas.com). (Senin, 1 Maret 2010)
- Anonim. *Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI*. <http://www.Produksi ASI dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.yahoo.com>. (Sabtu, 20 juni 2010)
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Konsultasi agama tentang persalinan*. <http://www.Konsultasi syariaah tentang persalinan>.

QUESTIONER

JUDUL: PERBANDINGAN PRODUKSI ASI PADA IBU MENYUSUI ANTARA PERSALINAN SPONTAN DENGAN PERSALINAN SEKSIO SESARIA

Petunjuk pengisian :

A. Identitas Khusus Responden

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Alamat :

Jenis Persalinan : Spontan () seksio Sesaria ()

B. Pertanyaan Wawancara


NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1	Sebelum menyusui, payudara terasa tegang?		
2	Setelah menyusui, payudara terasa kosong?		
3	Untuk satu payudara bayi menyusu selama 10-15 menit?		
4	Produksi ASI dalam sehari merembes melalui puting?		
5	Bayi sering BAB berwarna kuning berbiji?		
6	Bayi setelah menyusu, tertidur/tenang selama 3-4 jam?		
7	Dalam sehari bayi kencing 6-8 kali dalam 24 jam?		
8	Bayi ibu menyusu sekitar 10 kali dalam 24 jam?		

Master tabel

Persalinan spontan

No. Resp.	umur	Pend.	Kriteria ASI
1	26	5	2
2	28	5	2
3	26	2	2
4	31	2	2
5	36	5	2
6	28	5	2
7	24	2	2
8	20	2	2
9	25	5	2
10	22	2	2
11	26	5	2
12	38	5	2
13	30	5	2
14	34	2	2
15	26	4	2
16	39	5	2
17	32	2	2
18	36	5	2
19	28	3	2
20	30	2	2
21	20	1	2
22	38	2	2
23	30	5	2
24	39	5	2
25	25	5	2
26	30	2	2
27	32	2	2
28	37	5	2
29	24	5	2

30	40	5	2
31	39	5	2
32	30	5	2
33	29	5	2
34	28	5	2
35	23	1	2
36	27	5	2
37	28	5	2
38	34	5	2
39	37	5	2
40	33	2	2
41	23	3	2
42	28	5	2
43	30	5	2
44	25	5	1
45	23	2	1
46	23	2	1
47	27	5	1
48	25	5	1
49	30	5	1
50	31	5	1



Keterangan:

Pendidikan

1 = SMP

2 = SMA

3 = D2

4 = D3

5 = S1

6 = S3

kriteria produksi ASI

1 = Kurang

2 = cukup


ALAUDDIN
M A K A S S A R

Master tabel

Persalinan seksio sesaria

No. Resp.	umur	Pend.	Kriteria ASI
1	32	2	2
2	28	2	2
3	34	2	2
4	36	2	2
5	39	2	2
6	34	5	2
7	27	2	2
8	29	5	2
9	28	5	2
10	30	5	2
11	35	5	2
12	29	2	2
13	28	5	2
14	30	2	2
15	31	5	2
16	39	5	2
17	36	2	2
18	28	5	2
19	28	2	2
20	28	5	2
21	32	2	1
22	26	5	1
23	28	5	1
24	29	5	1
25	33	5	1
26	38	2	1
27	26	5	1
28	38	2	1
29	30	2	2

30	31	2	1
31	30	6	2
32	30	5	2
33	29	5	2
34	35	5	2
35	31	2	2
36	38	2	2
37	38	2	2
38	32	5	2
39	26	5	2
40	30	5	2
41	29	5	2
42	35	2	2
43	32	2	2
44	28	5	2
45	28	5	2
46	30	5	2
47	27	2	2
48	32	5	2
49	30	5	2
50	30	5	2



Keterangan:

Pendidikan

1 = SMP

2 = SMA

3 = D2

4 = D3

5 = S1

6 = S3

kriteria produksi ASI

1 = Kurang

2 = cukup

ALAUDDIN
MAKASSAR

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test							
		ScUmur	ScPendidikan	ScASI	SpUmur	SpPendidikan	SpASI
N		50	50	50	50	50	50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	31.2000	3.7600	1.8200	29.4600	3.9000	1.8600
	Std. Deviation	3.68117	1.51940	.38809	5.37648	1.47427	.35051
Most Extreme Differences	Absolute	.188	.373	.499	.120	.392	.515
	Positive	.188	.297	.321	.120	.228	.345
	Negative	-.092	-.373	-.499	-.088	-.392	-.515
Kolmogorov-Smirnov Z		1.328	2.636	3.526	.849	2.773	3.643
Asymp. Sig. (2-tailed)		.059	.000	.000	.468	.000	.000

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

NPar Tests

Descriptive Statistics					
	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Kualitas ASI	100	1.8400	.36845	1.00	2.00
Jenis Persalinan	100	1.5000	.50252	1.00	2.00

Mann-Whitney Test

Ranks				
	Jenis Persalinan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Kualitas ASI	Spontan	50	51.50	2575.00
	SC	50	49.50	2475.00
	Total	100		

Test Statistics ^a	
	Kualitas ASI
Mann-Whitney U	1200.000
Wilcoxon W	2475.000
Z	-.543
Asymp. Sig. (2-tailed)	.587

a. Grouping Variable: Jenis Persalinan

NPar Tests

Descriptive Statistics					
	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
ScUmur	50	31.2000	3.68117	26.00	39.00
ScPendidikan	50	3.7600	1.51940	2.00	6.00
ScASI	50	1.8200	.38809	1.00	2.00
SpUmur	50	29.4600	5.37648	20.00	40.00
SpPendidikan	50	3.9000	1.47427	1.00	5.00
SpASI	50	1.8600	.35051	1.00	2.00

Crosstabs

Case Processing Summary						
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Jenis Persalinan * Kualitas ASI	100	100.0%	0	.0%	100	100.0%

Jenis Persalinan * Kualitas ASI Crosstabulation					
			Kualitas ASI		Total
			Kurang	Cukup	
Jenis Persalinan	Spontan	Count	7	43	50
		% of Total	7.0%	43.0%	50.0%
	SC	Count	9	41	50
		% of Total	9.0%	41.0%	50.0%
Total		Count	16	84	100
		% of Total	16.0%	84.0%	100.0%

Chi-Square Tests					
	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.298 ^a	1	.585		
Continuity Correction ^b	.074	1	.785		
Likelihood Ratio	.298	1	.585		
Fisher's Exact Test				.786	.393
Linear-by-Linear Association	.295	1	.587		
McNemar Test				.000 ^c	
N of Valid Cases	100				

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.00.

b. Computed only for a 2x2 table

c. Binomial distribution used.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hamdana
Tempat tanggal lahir : Kulo, 27 Oktober 1988
Suku/ Bangsa : Bugis/ Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat : BTN Pao-Pao Blok G2. No. 2

Riwayat pendidikan :

1. Tahun 2000 : SD Negeri 60 Tanete Kab. Bulukumba
2. Tahun 2003 : MTs Negeri 410 Tanete Kab. Bulukumba
3. Tahun 2006 : MA Negeri Tanete Kab. Bulukumba
4. Masuk tahun 2006 : Jurusan Keperawatan,

Fakultas Ilmu Kesehatan,

Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar.